私の手術—痔核—

倉敷・チクバ外科

竹 馬 浩

痔核の手術手技に関しては Milligan-Morgan, Turell, Bacon, Stone, Goligher らによってすでに語りつくされているが、私なりに細部にわたって工夫していることがらを、I. 手術適応, II. 術前・術後の管理, III. 手術手技, IV. 肛門外科医として一言の項目にわけて述べてみた。私が特に記述しなかった点は、術前 routine sigmoidoscopy と術後管理の中で肛門手術創の洗浄、食餌制限の撤廃、排便指導などで、昔から医治の常識と考えられていることの中にも足らざる点や、無用なことが沢山ある点である。手術の手技は各人各様それぞれ長短があるが、何年かかかって自然にでき上がる自分の流儀というものをあらためてここに記し諸賢のご批判を仰ぐことは大いに意味のあることと考え、非才を省みずあるがままを記述させて頂いた。

I. 手術適応

血栓性外痔核は原則として局麻下に外来で thrombectomy を、内痔核の非出血性のものについては生活上の注意を与えながら一応は保存的に通院治療、貧血高度なものや出血が長期に及ぶものについては入院手術。またかんとん状態で来院するものについてはゼロイドや cryosurgery を試みたり、疼痛著しい場合は入院の上インドメサジン坐剤を使用し消炎酵素と臥床入浴で浮腫の消褪をはかりながら、手術の可否を決めている。かんとんも比較的容易に整復できるものについては必ずしも手術をすすめない¹⁾。痔核手術で絶対適応は少ない。

II. 術前・術後の管理

私の手術で特徴的なのは本項で、私なりに種々工夫しており以下列挙してみたい。

(1) 術前 routine examination

- A) 検血一般 (赤, 白, Ht, Hb, 白血球分類)
- 血型, 出血傾向 (PTT, PT)

白血病を3例手術した苦い経験²⁾から以上の check を routine 化している。また術前輸血の要否もしらべておく必要がある。

- B) 肝機能検査 (GOT, GPT, Al-p, モイレングラハト, Au 抗原その他)

- C) 血清 TPHA

- D) 検尿一般 (糖・蛋白・ウロビリ・沈渣)

- E) 胸部 X-P—心肥大や肺結核をみる。

- F) ECG—60歳以上

G) 術直前に直腸鏡検査—全例に一約2,000例の routine な検査で3例の悪性腫瘍を発見したが、肛門手術を前提として無愁訴の直腸悪性疾患を発見した意義は大きいし、直腸ポリープや良性疾患 (たとえば潰瘍性大腸炎など) の診断的意義もあり proctologist を自負するものは今や必ずやるべき検査と考える。

(2) 術前処置

原則として午前中に入院検査、午後手術をしているが異常所見が発見された場合、精査のため手術が延期されることがある。手術当日は朝食は軽く摂らせ入院後は絶食。入院時グリセリン浣腸30ml, 前麻酔は術前40分硫酸アトロピン及びマイナートランキライザーの筋注のほかは何もしない。麻薬は一切用いない。

(3) 術後管理

- A) 術直後1時間程度 sims 体位で臥床、以後自由

- B) 入浴は2日目から許可

- C) 肛門手術創の洗浄

超音波を利用した ultrasonic sitz bath apparatus³⁾ (へモクリーナー) を一日2~3回各自に使用させている—病棟トイレに常備 (Fig. 1)。

D) 手術創の清拭 清拭綿と紙ガーゼを術後患者に配布しておき、すべて各自でやらせ看護婦の手をわずらわせないよう指導。

E) 食餌制限のないこと 術後数時間を経たら全くの普通食を与え、セルロースの多いものを与え便秘に傾かぬよう献立は注意するが、カレーライスや香辛料も普

Fig. 1 トイレに常備しているヘモクリーナー

通に食べさせ何ら問題はない。アルコール類も退院後は制限するようなことはない。

F) 排便指導 痔核のできる人の多くは排便習慣に問題があるように思えるので特に注意を与え指導を強化。三枝の提言する一分間排便法⁹⁾とまではゆかぬがトイレに5分間以上しゃがむことを厳にいましめ、快便を得るための食餌・水分の摂取など“退院後の注意”なるパンフレットを配って術後患者に与えている。また患者の趣味、仕事の内容、姿勢などが痔核発生と関係が深いので生活上の注意を個々に与えている。入院中は1日1～2回の排便が得られるようにセンノサイド剤の内服をさせる。

G) 抗生物質を用いない open method による肛門手術は drainage op であるので原則として抗生物質は無用と考えるが大腿リンパ節の腫大や発熱をみる場合使用することもある。

H) 鎮痛剤と坐剤

術直後肛門に挿入したインドメサジン坐剤2ヶ(50mg × 2)でほとんどの場合疼痛はない。肛門疾患治療薬として市販されている種々の坐剤、軟膏類も使用しないことはないが効果は不確かであるように思える⁹⁾。

III. 手術手技

痔核手術の原則は Milligan-Morgan, Turell, Bacon, Stone らによって既に語りつくされている感があるが¹⁰⁾、そうした先駆者の真似を試みても、使う器具の違いや術者の外科医として育ってきた環境の違いからそこに自ずとその人独自の手技が生れてくるように思える。一例一例の手術を今日こそは満足のゆく手術にしたいと自分にいい聞かせながらメスを握るのは私だけではあるまい。簡単に思えて痔核の手術はほんとにむづかしい。ここでは私なりに細かい点で工夫している点を述べながら“私の手術手技”を披露する。

A) 麻酔 low spinal anesthesia—Neo-percamine S 1.2～1.5ml, 右側臥位, 頭部 $\angle 5\sim 8^\circ$ 傾斜にて施行, 直ちに腹臥位をとる。局麻は手術野が得難いので行わない。

B) 肛門手術野の確保と消毒

殿部にガムテープ(布絆より低廉で操作が楽)を用いて Fig. 2 のように手術台の両側に固定, ついで肛門周囲を径10cm 程剃毛し, 直後に sigmoid fiberscopy をおこなう。肥絆者では Jackknife position をとることもある。手術野の消毒は極く簡単におこない, シーツは一枚しか使わない。

Fig. 2 荷作り用ガムテープを用いて両殿部を外方に引っ張り手術野を拡げる

Fig. 3 脱出痔核の確認

C) 直腸触診, 双合診, 肛門鏡検査
合併病変の有無を確認し, 手術にうつるが手術用には好んで三輪式肛門鏡⁹⁾を用いている。

D) 脱出性痔核の確認には Fig. 3 のごとく肛門鏡を用いて直腸内に挿入したガーゼを引き抜きながら, ガ

Fig. 4 血管縫合針を用いて動脈結紮糸をかけているところ

Fig. 5 痔核の剝離

ーゼについて出てくる痔核を確かめるようにしている。

E) 痔核の把持は脱出痔核の中心で歯状線の外約3～5mmの部をモスキート氏止血鉗子でつまみ、これを左手に持って、右示指頭で動脈拍動を触知する。

F) 血管結紮は粘膜面からなるべく出血させない配慮から燃糸付血管縫合針 No. 000 を用い、痔核切除に先立って、切除核痔の頂点に一針かける。この糸は切除端の目標となるので最後まで切らないで別の止血鉗子でとめておく (Fig. 4)。

G) 皮ふ切開 外括約筋外縁に平行に Goligher の述べているように⁹⁾、外に大きく三角形の底辺がくるようにメスで切り込みを入れる。

H) 痔核の剝離操作には出血を伴うので、出血点はモスキート氏鉗子でいねいに止血しながら、Fig. 5のごとく、左手に痔核把持鉗子を持ち右手に電気メスを持って凝固止血しながら、先に目印として残していた血管結紮糸に向って剝離をすすめてゆく、この時粘膜の切除線決定は電気メスで軽く焼いて型どりをするとデザインが楽にできる。止血鉗子はすべてモスキート氏鉗子を用い微少出血も見逃がさず3号絹糸で結紮、糸は短かく切って抜糸はしない。集束結紮よりこの方が時間を要す

るが secondary bleeding¹⁰⁾防止にはよい。電気メスを用いて止血して上皮形成が遅れたり出血が多いというようなことはないように思える¹¹⁾。痔核根部まで剝離が進んだら、そこで一度緊張をとり出血のないことを十分確かめてから、根部結紮糸の保護の目的で Turell の手技¹²⁾にならって粘膜縁に1～2針をおく。これで切除完了。そこで切除部分を肛門内にもどし今一度創の形を修正 (高野¹³⁾のいうトリミング)、ドレナージがよく効くか、止血が完全かを今一度確かめる。

痔核が多数の場合、以上の操作を3ヶ所まではおこなうが、一ヶ所で済めば一ヶ所ですぐに予防的切除ということはやらない。なぜなら“切りすぎた肛門は元に戻らない”からで、切り足しはいつでもできるからである。

手技上、私にとって一番むづかしく思えるのは肛門の切除デザインで、一見して連続してみえる痔核も主、副に見わけられ、切除をなるべく少なくかつ術後再発の少ないことを願うとき、結紮切除術式の奥の深さがあるように思える。術後創の修復過程を考慮に入れて肛門機能の損なわれない切除をするための切離線の決定にはよほどの経験と直感力が必要でしばしば困惑を覚えるが、腐蝕剤注射など液の拡がり方まで計算に入れてやられる方々はよほど神がかっておられるのだらうと感心している。

IV. 肛門外科医として一言

私の小医院では肛門外科手術年間約600例、岡山県下では proctologist といわれる人はまだ非常に少なく、大半の病院では今もって旧式の治療法に終始している現状を考えると、学会の力を借りて新しい肛門外科治療法の開発に乗り出さねばならないと考えるが、その壁は①大学医学部に proctology の専門医がおらず学生教育は勿論医局員のレベルアップすらできていない。②地方に専門医会がないから学術的交流がなく、自問自答、試行錯誤をくり返している。③健康保険で新しい治療法に対する正当な評価がないので進歩向上意欲をそがれる。④今だに腐蝕剤の注射療法が横行しその後仕末だけでも大変など枚挙に暇がない。私はその中であって後輩の指導、地方学会への発表、保険医療の改善、一般市民への治療をおこないながら、肛門外科治療法の進歩向上にこれからも努力を続けてゆく所存であり、誌上をかりて学会諸先輩のご指導を切にお願いして稿を終りたい。

文 献

- 1) 隅越幸男：総合臨床，Vol. 21，No. 6，1161 (1972)。
- 3) 守山 稔・竹馬 浩：臨床外科，Vol. 30，No. 8，1031 (1975)。

- 3) 竹馬 浩：大腸肛門誌，Vol. 25, No. 2, 114 (1972).
- 4) 三枝純郎：“痔のなおし方” 217, 主婦の友社, (1969).
- 5) 三枝純郎：肛門外科の臨床, 32, 金原出版 (1968).
- 6) 浜口栄祐ほか：腹部外科手術書, 541-551, 南山堂 (1968).
- 7) 牧野惟義：肛門外科—その理論と実際—32, 金原出版 (1968).
- 8) 三輪徳定：大腸肛門誌, Vol. 23, No. 4, 29 (1971).
- 9) Goligher: Surg. of the Anus, Rectum and Colon, 105, Fig. 64.
- 10) 隅越幸男：痔核, 痔瘻診療の実際, 28, 金原出版 (1973).
- 11) 隅越幸男：痔核, 痔瘻診療の実際, 107, 金原出版 (1973).
- 12) Turell: Diseases of the Colon and Anorectum, Vol. II 923.
- 13) 高野正博：熊本市立市民病院 (元社会保険中央病院肛門病センター).

Specials

1. Operative Treatment of Haemorrhoids

K. Masuda

Masuda Clinic, Kyoto

Haemorrhoidectomy, which is performed in my clinic, is not my original method. In almost of all cases, ligation and excision method is performed as surgical treatment of third grade haemorrhoids.

In some cases, ligature method is used as a treatment of small internal haemorrhoids and hypertrophied papilla.

2. My Operation—Hemorrhoidectomy

H. Chikuba

Chikuba surgical clinic, Okayama

In this text, author described surgical indications and details of operative procedure of hemorrhoidectomy, and discussed practically important points for management of troublesome postoperative cases, emphasizing the usefulness of ultrasonic sitz bath for cleansing of surgical wound under normal intake of regular diet with controlled daily smooth bowels.

The necessity of routine preoperative sigmoid fiberoptic examination was also declared in order to rule out combined disorders occasionally coexist (cf. recto-sigmoid cancer).

3. My Procedure of the Operation of Anal Fistule

J. Wakisaka and H. Isomoto

First Department of Surgery, Kurume University School of Medicine,
Fukuoka

Reported here is the surgical procedure of the anal fistule being performed in our department.

After elucidating the internal opening and track of the fistule by preoperative examination, the track is principally cleared away and the wound is kept open.

Anal sphincter muscles are cut off, considering the localization, depth, number of the track and so on.

Open wound is effectively treated with free drainage and margin of the wound is cleaned by debridement, and if necessary, followed by partial suture of the wound or prosthesis of muscles. In our procedure of sphincter preserving operation.