裂肛の手術療法

社会保険中央総合病院大腸肛門病センター

住 江 正 治 石 田 裕 坂 田 寛 人
岡 田 光 生 隅 越 幸 男

裂肛は慢性化するにしがたい、炎症性変化が進行し、種々の合併病変を生じるもので合併病変を確実に診断し、治療法を選択すべきである。現在まで、手術法も多数報告され、各術式に対する評価も定まってきたように思われるが、側方内括約筋切開術のように、まだ検討の余地ある術式もある。大部分の症例は、内括約筋の spasm を除く conservative な術式で治療するもので、画一的に特定の術式のみに、こだわる必要はないと考えているが、進行した症例には、裂肛切除（内括約筋切開）+皮膚弁移動術が、radical plastic operation として最良といえるであろう。

はじめに

裂肛の原因は、未だ十分に解明されていない。有力な病因論的学説として、便秘の排出によって生じた肛門上皮の外傷が、局所の何らかの要因によって治癒しないという「外傷説」と、他方では anal gland, crypt の感染によって、肛門上皮の破壊が生じ、裂肛が、発生するという「感染説」の2つの代表的理論がある。また少数例であるが、周辺を含めた裂肛の別出標本の病理学的検討では、anal gland に感染をきたしている例は稀で、anal gland の感染は二次的なものと考えられる。しかし、裂肛にかぎらず、病変部に近接して deep crypt が存在する場合、手術創(変病部)が治癒遅延することは、ときに経験するもので、deep crypt が存在する場合 cryptotomy が必要であると考えている。

以上のように、病因論的には不明な点があるが、治療上の重要なポイントは解明されてきたように思われる。まず第1に重要な点は「内括約筋の spasm の除去」であり、第2の点は、線維化によって失われた肛門管の伸展性をとり戻し、排便をスムーズにすることにあると考えられる。

裂肛の進行過程を考えると、初期の裂肛は浅在性で創底部は縦走筋線維よりなっている。慢性化すると潰瘍化し、創底部の内括約筋が露出し、潰瘍は感染の溜り場となる。その結果、裂肛周辺の上皮および内括約筋には炎症による線維化を生じ、肥大乳頭、skin tag が発生し、器質的肛門狭窄に至り、肛門管の伸展性は失われる。皮下痔瘻、低位筋間痔瘻、および内痔核の合併もしばしばみられるようになる。以上のように、慢性化するにした

がって、合併病変を随伴しやすくなる。

手術適応となるものは、慢性例、保存療法で治癒傾向のないもの、および疼痛のはげしい例などであるが、その進行度および合併病変によって、治療法を選択することが望ましいと思われる。内痔核、痔瘻合併の有無、肛門狭窄の程度、deep crypt の有無などに対する観察が重要と考えられる。もちろん、結核、梅毒などの特異性病変やクローン病などを鑑別しておくことは言うまでもない。

裂肛の手術術式は、あまり行われないう歴史的な方法もあるが、主なる術式の平技、適応、再発率、術後の肛門機能について検討し、さらに皮膚弁移動術で行った症例の術後アンケート調査も報告する。

1. 肛門拡張法

Recamier²⁾ (1831)が最初に行ったとされている、「内括約筋の spasm を除去する」ことに本術式の目的がある。疼痛のはげしい症例で合併病変の少ない例が適応であろう。

麻酔は低位腰麻酔、あるいは肛門浸潤麻酔でも可能である。まず、両方の示指を入れて徐々に拡張し、つぎに両方の中指を挿入し、合計4本の指で緩徐に左右、前後に拡張する。拡張時に内括約筋が硬く輪状に収縮しているのを確認できるが、その緊張が消失する程度に拡張する必要がある。この操作により、肛門管の奥に埋没されたような状態にあった裂肛は外側に引き出された形となる。

本法は術式として簡単であり、手術創も形成されず、早期に仕事に復帰できる利点がある。しかし、Watts³⁾

(1964)らの報告によると、再発率は16%で、soiling, imperfect control of flatusなどの minor incontinence を訴えた例が28%あったと報告している。

Duthie⁹⁾ (1964)の報告によると、肛門拡張後の内括約筋は8日目には正常に戻ると述べており、本術式は内括約筋の spasm を除くという点で十分でなく、再発率が高いのも理解できる。したがって、不十分な拡張では効果は不確実であり、急激で暴力的な拡張は避ける必要があるが、十分な拡張を行うことが本術式の成功する条件と思われる。ちなみに、肛門拡張後の再発例に再び本術式を行っても効果はないと Goligher¹⁰⁾は述べている。

2. 裂肛切除術

Gabriel¹¹⁾ (1930)によって最初に報告された方法である。原法では後正中線上で裂肛と共に周囲皮膚を三角形に切除後、内括約筋の下端部を切開し、肛門拡張も併用している。Gabrielの方法は内括約筋の一部を切開すること、ドレナージ創を広くおくこと、肛門拡張術も併用するなどの点で合理的な術式であるが、開放創として二次的治癒を計るために治癒期間が長期化し、治癒過程で創が難治性になりやすく、ときに再発がみられた¹²⁾。

したがって、原法どおりの術式はあまり行われないうと思われるが、裂肛に近接して脱出性内痔核、痔瘻を合併する場合には必然的に裂肛切除術が行われる。痔瘻を合併する場合には、瘻管を切開後ドレナージ創に含めて裂肛を切除し、脱出性内痔核の合併例も結紮切除創に含めて裂肛を切除する方法をとることが多い。

Gabriel法のように、肛門の後正中線上にドレナージ創の中心をおく方法は正中線上の創が難治性になりやすく、このドレナージ法は避けたほうがよいと考えている。

3. 内括約筋切開術

(1) 後方内括約筋切開術

裂肛の治療に内括約筋を正しく認識し、切開する方法を最初に行ったのは Eisenhammer (1951) である。その手技は、後正中線上の裂肛部分で歯状線より肛門縁までの内括約筋を切開後、肥大乳頭、skin tag を切除し、創は開放創として二次的治癒を計った。その後 Benett¹³⁾ (1962)、Magee¹⁴⁾ (1966)らによって、後方内括約筋切開術の再発率は3~7%と低く、内括約筋切開の効果が証明されたが、同時に2つの欠点も明らかとなった。第1に開放創として治癒を計るために、治癒期間が平均7週間を要するほど長期化すること。第2に soiling, imperfect control of flatusなどの minor incontinence が、しば

しばみられることである。Goligher¹⁵⁾も127例の43%に何らかの minor incontinence の症状があったと報告している。

この原因は内括約筋切開後の二次的治癒によって、肛門の後正中線上に溝状の瘻痕が形成され、肛門の開鎖が不完全になるためであり、Goligherはこれを key hole deformity と称している。これらの欠点のために、Goligher は最初に試みる処置として、その当時は肛門拡張法を推奨している。

(2) 側方内括約筋切開術

Parks (1967) が側方の肛門縁に輪状切開をおき、内括約筋を切開する方法を推奨したのが最初の報告のようで、1968年代より欧米においては、本法が流行しているようである。

手術的には、肛門上皮あるいは周囲皮膚を切開後、直視下に内括約筋を切開する open method と、皮膚は切開しないでメスを刺入して行う blind sphincterotomy technique に2大別される。術後の合併症として、出血、血腫形成、腫瘍、瘻孔形成、内痔核の脱出などが少数例に報告されているが、ほとんど起こらなかったという報告も多い。テクニックにより差があるように思われる。また、soilingなどの minor incontinence は0~7%と少なく、再発率も0~3%と低く、後方内括約筋切開術に比較し優秀な成績が報告されている。

低位筋間痔瘻、筋間膿瘍などを合併していない症例が本法の適応であろう。本法は、確実に内括約筋切開が行われ、合併症を起さない配慮を払えば、皮膚弁移動術と同様に根治性も高く優秀な術式と考えられるが、裂肛の線維化が強く、肛門管の伸展が失われ、肛門狭窄も高度な進行病変には皮膚弁移動術が安全で確実な方法かもしれない。

前述したように、脱出性内痔核を伴う裂肛は結紮切除創に含めて裂肛を切除する。このとき、肛門が狭窄傾向の場合、あるいは括約筋の spasm が強い場合には側方内括約筋切開術を最近の症例は併用している。本法の併用は術後疼痛の軽減、ならびに術後難治創を予防するうえで有効な手段と考えている。

側方内括約筋切開術の手技は細部の点では、報告者によってかなり異っているが、著者の少数例の経験からは、Notaras方法が簡単な術式で、合併症も少ない印象を受ける。以下に代表的術式について述べる。

(A) Open technique

① Abcarian¹⁶⁾法：右側方で放射状に歯状線から肛門縁までの皮膚を切開後、内括約筋を直視下に切開し、血腫、感染予防のため切開創は開放とし閉鎖しない。

② Ray¹⁷⁾法：左肛門縁で肛門を中心に放射状の皮膚

切開を2cm おき、内括約筋を直視下に歯状線まで切断し、創はcatgutで縫合閉鎖する。open法は内括約筋を直視下に切断できる点で確実であり、著者もこの方法を当初は試み、その中の1例に、血腫形成によると思われる腫瘍を経験した。

③ Parks法 (Hawley¹³) : 肛門縁で約2cmの輪状皮膚切開をおき、内括約筋を直視下に歯状線まで切断し、創はcatgutで閉鎖する。

(B) Blind technique

① Notaras¹²法 : 左側方の肛門縁より幅の狭いメスを内括約筋と肛門上皮のあいだに刺入し、メスの先端が歯状線に達したのち刃面を内括約筋に向けて外側に切離し、内括約筋切開部を上皮面より圧迫止血する。メスの刺入創は閉鎖しない。内括約筋切開はblindで行われるので合併症を予防するうえで圧迫止血が重要で、内痔瘻瘻管を損傷しないようにメスの先端は歯状線を越えないように注意する必要がある。術式は簡単であり合併症も少なく、minor incontinence もほとんどないようである。

② Hoffman¹⁴法 : メスを内括約筋の外側より刺入し中心部に向けて内括約筋を切断し、メスの抜去後強く圧迫止血する。肛門上皮を損傷しない注意が必要である。

4. 裂肛切除・皮膚弁移動術

本術式の過程は4段階に分けることができる。

(1) 裂肛および周辺の線維化した部分をすべて切除し、病変部を弾力性のある状態にする。

(2) 内括約筋を切開し、肛門を正常の広さに戻し、肛門狭窄を解消する。

(3) 裂肛の切除創を周囲皮膚で被覆する。

(4) 被覆した皮膚が粘膜と確実に癒合するように、皮膚側へ減張切開をくわえ、有茎皮膚弁として肛門管側へスライドさせる。

本術式も内括約筋切開が基本であるが、裂肛切除創を上皮で被覆するという点が重要な要素で、Gabrielの裂肛切除術と異なり、二次的治癒による後正中線上のkey hole deformityを防ぐことができる。上皮で被覆するという点で、Hughes¹⁵の裂肛切除・皮膚移植術と考え方において類似する点があるが、Hughesの方法はThiersch法による無茎植皮術であるため、術後は植皮片の圧迫、便止めなどの術後管理が必要で、煩雑な術式という印象を受ける。その他、種々のplastic operationが報告されているが、いずれも簡単な術式とはいえないようである。皮膚弁移動術は簡単な術式で再発はみられず、radical plastic operationといえるであろう。以下に本術式の手法を述べる。

1. 麻酔は低位腰麻で、3% Xylocaine 1mlを使用し、体位はジャックナイフ体位である。

2. 隅越式手術用肛門鏡を挿入し、肛門を開大する。肛門狭窄が高度なため肛門鏡を挿入できないことが多いが、このような場合は裂肛部分で内括約筋を少し切開したあと肛門鏡を挿入する。

3. 触診で硬結および瘻管の有無、すなわち痔瘻の合併の有無を確認し、つぎに視診で裂肛に近接するcryptを観察し、deep cryptが存在すればcrypt hookでcryptotomyを行う。通常、deep cryptは裂肛底部に連続している。さらに裂肛および周辺の瘻管組織、肥大乳頭、skin tagを切除する。skin tagを切除するとき縫合することを考え、周囲皮膚まで広く切除しない。

4. 内括約筋をメスで徐々に切開する。内括約筋切開は示指、中指が肛門管内にらくに挿入できる2.5指程度とし、それ以上の切開は術後肛門機能の点で避けたほうがよいと考えている(図1)。

図1 Skintag, 肥大乳頭切除, 内括約筋切開

5. 直腸粘膜と皮膚を環状に絹糸で4~5針縫合する。このさい粘膜側は筋層にかかる程度に針はでや深くかけ、つぎに死腔を作らないように、裂肛切除創の創底部にも針を通したのち皮膚は浅く針をかける(図2, 3)。

6. 縫合線から5~10mmはなれた皮膚に縫合線と平行に浅く切開する。このとき縫合糸を前方に引きながら行うと皮膚切開が行いやすく、皮膚弁は縫合線方向に牽引されて移動する。この皮膚切開は浅く行い、皮下脂肪層の部分まで切開しないことが重要である。皮下脂肪層まで切開すると、切開創には緊張が若干あるため、治癒

図2 直腸粘膜、創底部、皮膚の順に針をかける

図3 4~5針糸状に縫合する

後に瘻管形成が強くみられることがあり、術後愁訴の原因ともなる。

さらにコの字形に移動皮膚弁の両側を切開すると、皮膚弁の移動が確実となる。この切開創はドレナージの効果もある(図4)。

7. 縫合線の両側に内外痔瘻源が腫脹しているときには切除する。

術後アンケート調査

昭和50~51年度に肛門部後方で皮膚弁移動術を行った

図4 縫合線から5~10 mm 離れた皮膚で切開する(皮膚弁移動)

症例の中から無作為に100例を抽出し、術後の疼痛、排便障害、肛門機能についてアンケート調査を行い、73例の解答が得られたので若干の考察をくわえ報告する。

① 術後疼痛の消失期間

38例(53%)が術後1週間以内に疼痛が消失し、25例(34%)が8~14日、10例(13%)が15~30日であった。過半数は術後1週間以内に疼痛は消失している。内括約筋切開により内括約筋の spasm がいないため、結紮切除術に比較すると疼痛は軽微であるのが通常である。

② 排便障害

便柱の狭小、便秘、残便感などの排便障害は、裂肛では高頻度に伴うが、術後それらの排便障害は大部分の症例で改善されスムーズな排便が可能になったという好結果を得た。これは、肛門痛、肛門狭窄に起因する排便障害が解消された結果と思われる。

③ 肛門機能

ガス漏れ imperfect control of flatus, 便の漏れ imperfect control of faeces, 下着の汚染 soiling of underclothes などの minor incontinence の頻度、およびその程度についての調査結果では、「機能障害がまったくない」症例が56例(77%)、「ガス漏れ—しばしば」と解答した例が4例(5%)、「ガス漏れ—ときにあり」と解答した例は13例(18%)で、このなかには下痢便のとき、「便の漏れ—ときにあり」と解答した例も数例みられる。

「機能障害がある」と解答した症例は73例中17例(23%)であるが、大部分は軽微で重症例は4例(5%)という結果であった。「機能障害がある」と解答した17例を、すべて手術に起因する機能障害とするのは問題があるが、機能障害の傾向としてガス漏れが大部分を占め

る。

後方内括約筋切開術だけの場合、Benett⁸⁾の報告では soiling は28%と高頻度にみられ、3年以上経過しても改善されないという。皮膚弁移動術では soiling は少ない。その理由として、皮膚弁移動術では後正中線上の瘻管形成 key hole deformity がないためと考えられる。

「ガス漏れ」は後正中線上で内括約筋切開が必要以上に行なわれたことによると思われるが、吻合部が離開し二次的治療をした例に多くみられるようである。

以上の結果から、以下の点が手技上重要と考えられる。

③裂肛および周辺の瘻管組織を切除し、弾力性のある状態にする。

④ sphincterotomy は後正中線上だけで深く行わず、後正中線よりやや側方の部分でも浅く数力所で徐々に切開し、肛門管内に2指が楽に挿入できる程度とする。

⑤創底部にも針糸をかける。これによって死腔が形成されず、創の接着も確実となり吻合部離開の予防となる。

文 献

- 1) 高野正博ほか：裂肛の発生因子による分類，臨床外科，27：107-111，1972。
- 2) Récamier：Quoted by Goodsall, D. H. and Miles, W. E: Diseases of the anus and rectum. London, Longmans, Green and Co., 1900, Part I, 1311.
- 3) Watts, J. M., et al.: Stretching of anal sphincter in treatment of fissure-in-ano. Brit. Med. J., 2: 342-343, 1964.
- 4) Duthie, H. L., et al.: Anal sphincteric pr-

essure in fissure-in-ano, Surg. Gynecol. Obstet., 119: 19-21, 1964.

- 5) Goligher, J. C.: An evaluation of internal sphincterotomy and simple sphincter-stretching in the treatment fissure-in-ano. Surg. Clin. N. Amer. 45: 1299-1304, 1965.
- 6) Gabriel, W. B: Principles and practice of rectal surgery. Fourth edition. London, Lewis, 1948.
- 7) 隅越幸男ほか：裂肛の手術手技，外科治療，26：386-396，1972。
- 8) Benett, R. C. et al.: Results of internal sphincterotomy for anal fissure, Brit. Med. J. 62: 1500-1503, 1962.
- 9) Magee, H. R., et al.: Internal anal sphincterotomy as an out-patient operation. Gut, 7: 190-193, 1966.
- 10) Abcarian, H.: Lateral internal sphincterotomy. Surg. Clin. North. Am, 55: 143-150, 1975.
- 11) Ray, J. E., et al.: Lateral subcutaneous internal anal sphincterotomy for anal fissure. Dis. Colon & Rectum, 17: 139-144, 1974.
- 12) Hawley, P. R.: The treatment of chronic fissure-in-ano. Brit. J. Surg. 56: 915-918, 1969.
- 13) Notaras, M. J.: The treatment of anal fissure by lateral subcutaneous internal sphincterotomy-a technique and results. Brit. J. Surg. 58: 96-100, 1971.
- 14) Hoffman, D. C., et al.: Lateral subcutaneous internal sphincterotomy in treatment of anal fissure. Brit. Med. J. 3: 673-675, 1970.
- 15) Hughes, E. S. R.: Anal fissure. Brit. M. J. 10: 803-805, 1953.

(昭和52年7月8日受領)

V. Surgical Treatment of Anal Fissure

M. Sumie, H. Ishida, H. Sakata, M. Okada
and Y. Sumikoshi

Colo-proctology Center, Social Insurance Central Hospital, Tokyo

Because inflammatory changes more progress and various complicated lesions are caused as anal fissure becomes chronic, accurate diagnosis of the complicated lesions should be made and treatment should be selected. There are many reports on surgical treatments and each surgical treatment is evaluated definitely. However, there still remain methods, such as the lateral sphincterotomy, which requires further investigation. Many cases are cured easily by the conservative techniques which remove spasm of the internal sphincter, and therefore, it doesn't seem to be necessary to decide only one specific method. However, it can be said that the sliding skin graft is the best radical plastic operation for the progressive cases.

Original Articles

1. Typical Crohn's Disease of the Colon: Report of a Case

K. Matsuura, T. Murakami, Y. Yokoyama, M. Harada,
K. Mtauda, J. Inamoto and M. Konn

Department of Surgery,

T. Kanazawa

Second Department of Internal Medicine,

A. Munakata

First Department of Internal Medicine, School of Medicine,

Hiroaki University, Aomori

A 29-year-old female who had suffered from anal pain and diarrhea for 11 years was admitted to our clinic with complaints of anal fistula, anemia and emaciation on February, 1974. Barium enema showed cobblestone appearance of left colon and colonofiberscopy demonstrated granulomatous colitis. Sphincter saving operation through staged-procedure was planned.

1st Operation:

Left hemicolectomy, single-barrelled transverse colostomy with exclusion of rectal stump and incision of anorectal fistula were performed through median incision on 4 April, 1974.

Multiple ulcers, cobblestone appearance and skip lesion were recognized throughout the resected descending colon and sigmoid colon. Microscopic examination revealed chara-