症例報告

大腸子宮内膜症の2例

日本赤十字社医療センター消化器外科

奥村俊子 板東隆文 豊島宏
太中弘

同 病理

武村民子

症例1は、36歳女性。子宮頸部筋腫の診断で開腹したところ、腫瘤は子宮後面直腸壁内に存在しており、直腸低位前方切除術を施行した。腫瘤は $2 \times 1 \times 0.8\text{cm}$ で硬く、粘膜面に変化なく、組織学的に子宮内膜症であった。

症例2は、46歳女性。子宮筋腫の診断で、子宮全剔及び両側付属器切除術施行中、S字状結腸に拇指頭大の硬い腫瘤を発見。注腸造影、直腸鏡検査で、肛門輪より13cmにある粘膜下腫瘍の診断で再開腹し、結腸部分切除術を施行した。病変は $4 \times 2\text{cm}$ の半球状隆起性粘膜下腫瘍で、組織学的に子宮内膜症であった。

子宮内膜症は、欧米に比し、本邦では少ないとされていたが、近年増加の傾向にあり、我々の蒐集し得た大腸子宮内膜症は、1960年以降28例に達している。本症の診断は、癌との鑑別が非常に困難な例が多く、種々の鑑別点はあげられてはいるが、術中生検を積極的に行ない、過大な侵襲が加えられないよう、慎重に術式を決定すべきと考える。

《はじめに》

子宮内膜症は、子宮内膜組織が子宮内膜面以外の部分に異所増殖したもので、子宮体部筋層内に発生する内性子宮内膜症と、それ以外に発生する外性子宮内膜症に大別される。

1860年、Rokitanskyによって初めて記載されて以来、その概念は次第に確立され、婦人科疾患の中で占める割合は、炎症性疾患の減少とともに、明らかな増加傾向が認められている。腸管子宮内膜症は、比較的少ないもので、外科、婦人科境界領域に属し、婦人科手術中に発見されることも多いが、我々の立場としては、癌との鑑別上、重要な疾患と考える。我々は最近、2例を経験したので、これを報告するとともに、1960年以降報告された本邦例28例の検討ならびに若干の文献的考察を加えた。

《症例1》

32歳、女性、既婚、妊娠2回分娩2回

主訴：性器出血

家族歴：特記すべきことはない

既往歴：19歳虫垂切除術

現病歴：2年前に機能性出血で服薬治療を受け軽快。

3カ月前から再び性器出血があり、子宮頸部腫瘤の診断で、昭和47年7月、本院婦人科入院。

現症：体格中、全身状態良好で、理学的に異常所見を認めない。内診で子宮後屈があり、子宮頸部後面に拇指頭大の腫瘤を触知する。腹痛、排便異常などの消化器症状は認めない。

検査所見：胸腹部 X-P では異常はない。肝機能、腎機能正常、貧血なく、心電図上異常を認めない。

手術所見：子宮頸部筋腫の診断の下に、下腹正中切開で開腹したところ、腫瘤は子宮後面、直腸壁内に存在、両者は炎症性に癒着している。直腸粘膜下腫瘍の診断で、子宮と腫瘤の間を鈍的に剝離し、直腸低位前方切除術を施行し、端々吻合を行なった。

剔出標本：腫瘤は $2 \times 1 \times 0.8\text{cm}$ で直腸粘膜下にある。粘膜面に変化なく、粘膜下から漿膜面へかけて線維化して硬い。筋層は 0.5cm に肥厚しており、剖面には、嚢胞状の部分が見られる。組織学的に、粘膜下層、筋層に発生した子宮内膜症であった（写真1）。

《症例2》

46歳、女性、未婚、妊娠歴なし

主訴：腹部腫瘤

写真 1

写真 2

写真 3

家族歴：父が胃癌で死亡したほかは、特記すべきことはない。

既往歴：特記すべきことはない。

現病歴：某病院で偶然腹部腫瘍を指摘され、子宮筋腫の診断で本院婦人科入院。子宮全剝及び両側付属器切除術施行。術中、S字状結腸に拇指頭大の硬い腫瘍を認め、S字状結腸癌の疑いで、再手術目的のため、昭和51年12月、外科へ転科入院。

現症：体格やせ型、全身状態良好。理学的に異常所見を認めない。腹痛、排便異常、下血などの消化器症状は全く認められない。月経異常もない。

検査所見：胸腹部 X-P に異常所見なく、肝機能、腎機能は正常、貧血なく、心電図上、WPW 症候群を認めるが、自覚症状、頻脈発作は、マスター試験でも発現しない。

注腸造影所見：肛門から約15cm の部位に、辺縁平滑な隆起性病変を認める(写真2)。

内視鏡所見：肛門輪から13cm に、内腔に突出した腫瘍を認めるが、粘膜表面には明らかな潰瘍形成はなく、周囲粘膜とはほぼ同様で、癌よりはむしろ粘膜下腫瘍と考えられた。生検の結果は、正常粘膜のみであった(写真3)。

手術所見：S字状結腸粘膜下腫瘍の術前診断で開腹。主病変は、腹膜翻転部から5cm、S字状結腸の腸間膜対側にあり、くるみ大であった。漿膜面は平滑で、腫瘍中央に集中するようなヒダを認める。腫瘍の口側約20cm にわたり、米粒大灰白色の斑点を多数認める。(この変化は前回手術時には存在しなかった。)この斑点と腫瘍の漿膜面の一部を凍結標本で検査した結果、悪性所見は認められなかったので、S字状結腸の部分切除を施行、端々吻合を行なった。

剔出標本：4×2cm 大の半球状隆起性粘膜下腫瘍で、粘膜表面には潰瘍、色調の変化等を認めない(写真4)。

漿膜面には所々、小さなひきつれ、または線維化を認める。断面は、主として漿膜下を中心とした均一の線維組織の増殖で、筋層、粘膜下にも達している。組織学的には、典型的な子宮内膜症であった(写真5)。

《考 案》

婦人科疾患の中で子宮内膜症の占める割合は、欧米では手術例中15~18%であるが、本邦では、中西¹⁾の1.18%、高邑²⁾の6.56%、川島³⁾の11%、安藤⁴⁾の10.6%など、欧米に比べて少ないことが目立つ。しかし、近年この疾患に関心が払われるようになったのと、組織学的検査の普及で、増加傾向にあるように思われる。

これらの子宮内膜症のうち、腸管を侵すものは、Masson⁵⁾の13.3%、Macafee⁶⁾の12%、Scott⁷⁾の9.1%、

写真 4

写真 5

Burns⁹⁾ の9.7%などの報告があり、直腸、S字状結腸の占める割合が最も多い。本邦では、まとまった報告例は少なく、中西¹⁾ の208例中4例、高邑²⁾ の182例中2例など、極めて低頻度である。

今回我々が集め得た28例は、直腸11例、S字状結腸7例、両方にまたがるもの1例、回盲部2例、直腸膈中隔1例、不明6例である(表1)。このほかに、虫垂1例、回腸1例、肛門部1例の報告例があった。

好発年齢は、性成熟期後半といわれ、どの報告も30～40代が圧倒的に多く、本邦例でも30～40代が86%を占めている(表2)。10代及び閉経後の発生は、本邦では見当らないが、外国例では散見されている^{10),11)}。

発生原因には、種々の説があり、単一なものとは考えにくい、次の説が代表的である。

① Sampson の移植説——月経時に剝脱した子宮内膜組織片が、卵管を通して逆行性に腹腔内に流れ出て、骨盤内臓器に移植、増殖する。この説を支持する研究、実

表 1

部 位	
回 盲 部	2
S 字 状 結 腸	7
直 腸	11
S 字 状 結 腸 ～ 直 腸	1
膈 直 腸 中 隔	1

表 2

年 齢	
20 ～ 24	1
25 ～ 29	2
30 ～ 34	4
35 ～ 39	8
40 ～ 44	5
45 ～ 49	1

証する臨床例は多数報告されているが、Meyer, Novak は反対説を述べている。

② Meyer の上皮細胞化生説——漿膜の扁平上皮が化生により腺上皮となり増殖する。

③ Halban のリンパ道転移説——子宮内膜小片がリンパ管内に流れこみ撒布される。

④機械的移植説——手術、子宮卵管造影などによる、子宮内膜組織の移植。

症状は、発生部位により異なることは当然であるが、本邦の大腸子宮内膜症では、腹痛、腰痛が10例と最も多く、下血粘血便、下痢又は便秘亢進がこれに次ぐ。月経との関連性は約半数に見られるが、関連がなくとも子宮内膜症の可能性は十分考えられる(表3)。

表 3 主 訴

	月経との関連性		
	⊕	⊖	
腹痛・腰痛	6	4	10
下血・粘血便	2	3	5
下痢・便秘亢進	4	0	4
腸 管 閉 塞	0	2	2
性 器 出 血	0	1	1
なし(術中発見)	0	3	3
	12	13	25

診断は、月経と明らかに関連した臨床症状がある場合は比較的容易であるが、癌などの鑑別が非常に困難なことが多い。

表4のように、疑診及び術中生検を含めても、子宮内膜症の診断がついたものは6例に過ぎず、癌と誤診した例が8例もあり、そのうち、直腸切断術を施行したものが6例にものぼっている。このような良性疾患に対する

表 4 術前診断と治療

	直腸 切断術	結腸部 分切除	保存的 療 法	不 明	
直腸癌	5	0	0	0	5
S状結腸癌	1	0	0	0	1
回盲部癌	0	1	0	0	1
子宮癌浸潤	0	1	0	0	1
直腸粘膜下腫瘍	0	4	0	0	4
S状結腸粘膜下腫瘍	0	2	0	0	2
回腸部腫瘍	0	0	0	1	1
潰瘍性大腸炎	1	0	0	0	1
子宮内膜症	0	2	4	0	6
	7	10	4	1	

表 5 癌との鑑別

	子宮内膜症	癌
年 齢	30～40歳	50歳以上
性	女性のみ	60%男性
不 妊	50%	無関係
便 潜 血	ほとんど⊖	しばしば
便 秘	間歇的、周期性	進行性
内 視 鏡 所 見	正常粘膜	潰瘍形成、出血など
注 腸 造 影	粘膜面正常	不整
	広汎な陰影欠損	限局した陰影欠損
	性周期による変化	変化なし
手術時肉眼所見	(鑑別不能)	

過剰な術式は厳につつしむべきであり、癌の確診がつかない場合は、常にこの疾患を念頭において、術中生検を参考にして、手術術式の決定にあたっては、慎重でなければならない。

癌との主要な鑑別点を表5にあげた。閉経前の女性で、全身状態が良く、不妊又は月経困難などを合併するものでは、子宮内膜症も考えるべきであろう。しかしながら、武田⁹⁾の例のように、体重減少著明で粘血便があり、直腸鏡でも正常粘膜を欠く症例もあり、診断が困難な場合もある。また、術前、粘膜下腫瘍と診断されながら、術中肉眼所見があまりにも癌と類似しているため、直腸切断術に至った例もある。我々の第2例でも、婦人科手術中の所見では癌の診断であったが、注腸造影、内視鏡所見及び第1例の経験から、本症の疑診をおいた。しかしながら、臨床症状を欠如しており、確診にはいたらなかった。

注腸造影所見については、Whalley¹¹⁾、Burns⁹⁾、Elliott¹⁰⁾らが詳述しているのをまとめると、①粘膜面が正常で辺縁平滑であること、②陰影欠損部が癌に比較し、広範囲に及んでいること (long filling defect)、③腸管の固定及び圧痛があること、④月経周期による像の変化があること、などである。

欧米文献では、閉塞症状ないし、レントゲン所見上、閉塞所見を見るものが比較的多いようであるが、本邦例では2例に過ぎなかった。

以上のことから、癌及び他の疾患との鑑別診断にあたっては十分な検討を行ない、積極的に術中生検を施行することが望ましい。

治療は、原則として病巣の完全剔除が望ましいが、年齢、病巣の部位、拡大度、症状の程度、妊娠希望の有無などを参考にしなければならない。若年者、手術可能例、狭窄症状の強度のもの、頻回の出血例は、手術の適応となろう。40歳以降の者には完全生殖器官剔除術を主張する者もあるが、卵巣剔除に起因する種々合併症を考慮のうえ、慎重に決定されなければならない。主病巣剔除不能例では、腫瘍の性格上、卵巣剔除、X線照射による去勢、ホルモン療法などが行なわれることがある。

ホルモン療法は、一時的効果しか望めないという批判もあるが、2年以上にわたり継続し、良好な結果を得た例が報告されており¹²⁾¹³⁾、古山¹³⁾は、まずホルモン療法試みるべきであると主張している。

結 語

32歳、46歳女性の大腸子宮内膜症を2例経験したので報告するとともに、1960年以降報告された本邦例28例の検討ならびに若干の文献的を考察を加えた。

文 献

- 1) 中西仁智雄：エンドメトリオーゼに関する研究，日医大誌，17：755，1950.
- 2) 高邑昌輔：子宮内膜症の臨床的観察，産婦の世界，11：183，1959.
- 3) 川島吉良：子宮内膜症の臨床，新臨床医学文庫，195，金原出版，東京，1972.
- 4) 安藤勝也ほか：子宮内膜症の統計的観察，日本不妊学会誌，20 (2)：102，1975.
- 5) Masson, J. C.: Surgical Significance of Endometriosis. Ann. Surg., 102：819，1935.
- 6) Macafee, C. H. G. et al.: Intestinal Endometriosis. J. Obst. Gynec. Brit. Comm., 67：539，1960.
- 7) Scott, R. B. et al.: External Endometriosis—the scourge of the private patient. Ann. Surg., 131：697，1950.
- 8) Burns, F. J.: Endometriosis of the Intestines. Dis. Colon Rect., 10：344，1967.
- 9) 武田雄一ほか：直腸癌と誤診した子宮内膜症の1例，外科，28 (11)：1187，1966.
- 10) Elliott, G. B. et al.: Invasive Endometriosis of the Intestine. Can. J. Surg., 13：387，1970.
- 11) Whalley, R. C.: Endometriosis of the Colon. Brit. J. Surg. 54：805，1967.
- 12) 長谷川敬三ほか：外性子宮内膜症の興味ある症

- 例について. 産科と婦人科, 35 (5) : 761, 1968.
- 13) 古山米一ほか : 結腸の子宮内膜症について. 日消会誌, 67 (9) : 817, 1970.
- 14) 小野節ほか : 直腸癌と誤診した骨盤 Endometriosis. 外科治療, 10 : 498, 1964.
- 15) 矢内謙ほか : 直腸壁子宮内膜症の一例. 臨床外科, 15 : 847, 1960.
- 16) 福田明恒ほか : 直腸腔中隔エンドメトリオーシスの症例. 鹿児島医学会誌, 33 : 805, 1960.
- 17) Lilja, B. et al. : Intestinal Endometriosis. Acta Radiol. Diagn., 4 : 545, 1966.
- 18) Ponka, J. L. et al. : Colorectal Endometriosis. Dis. Colon Rectum, 16 : 490, 1973.
- 19) McSwain, B. et al. : Endometriosis of the Colon. South Med. J., 67 : 651, 1974.
- 20) Davis, C. Jr. et al. : Surgery of Endometrioma of the Ileum and Colon. Amer. J. Surg., 105 : 250, 1963.

(昭和53年2月13日受領)

From this experiment we conclude that this new instrument could be used for clinical cases with much advantage.

III. The Prognosis of Cancer of the Colon and Rectum : with Special Reference to the Relative Survival Rate

K. Shoji, H. Watanabe and Y. Goto

The Third Department of Internal Medicine, Tohoku University

School of Medicine, Sendai

M. Hayakawa

The First Department of Surgery, Tohoku University School of Medicine, Sendai

One hundred and ninety six cases with cancer of the colon and rectum who had recieved curative resection were classified according to the stage classification which was settled by Japanese Research Society for Cancer of Colon and Rectum. The relative survival rate was calculated and the long term prognosis was evaluated in each stage. The following result was obtained: Cancer of the colon and rectum is considered to be a curable disease, if it is discovered and resected at the stage I in which the cancerous proliferation is limited to the proper muscle layer without any metastasis.

Case Reports

I. Two Cases of Colonic Endometriosis

T. Okumura, T. Bandoh, H. Toyoshima and H. Futonaka

Department of Surgery, Japan Red Cross Medical Center, Tokyo

T. Takemura

Department of Pathology, Japan Red Cross Medical Center, Tokyo

The first case is a 32-year-old female who visited our hospital complainig of genital bleeding. Though laparotomy was performed under the diagnosis of myoma of the cervix in our gynecological department, there was a tumor at the anterior wall of the rectum. As it looked submucosal tumor of the rectum, partial resection of the rectum was performed. The tumor was hard and measured 2×1×0.8 cm. Histopathological examination revealed it was endometroiosis.

The second case is a 46-year-old female who visited our hospital complaining of abdominal tumor. Total hysterectomy and bilateral salpingoophorectomy were performed in the gynecological department, and the tumor of the sigmoid colon, which seemed carcinoma

was found. Sigmoidectomy was performed under the diagnosis of submucosal tumor of the sigmoid colon after barium enema and proctoscopic examination. The tumor was measured 4×2 cm. Histopathological examination revealed it was endometriosis.

It is difficult to distinguish between carcinoma and endometriosis of the colon except on histological grounds though the chances of making correct diagnosis are enhanced if the symptoms occur or are increased during menstruation. The necessity of operative biopsy should be persisted.

The treatment should be determined carefully by reference to the age of the patient and the severity of the symptoms.

II. A Case of Ischaemic Colitis Examined by Colonoscope

M. Tada

Fukuchiyama National Hospital

M. Shimono

Dept. of 3rd Internal Medicine

K. Nakamura, Y. Nishimura, T. Ueda and M. Sakita

Dept. of 1st Surgery, Kyoto Prefectural University of Medicine

Ischaemic colitis is a well recognized entity which results from sudden occlusion of a main trunk or a branch of a mesenteric artery or from hypoxia with non-occlusive mesenteric arterial disease. Although ischaemic colitis is not rare in the older age groups with episodes of ischaemia involving the heart or brain, its endoscopic findings are rarely reported.

A 54 year old male complaining of dull left hypochondrial pain, was examined using a colonoscope. Endoscopic appearances such as longitudinal ulcers without cobble-stone appearance, stricture of the canal of splenic flexure, diffuse capillary dilatation and congestion etc. were different from other specific or non-specific inflammatory bowel diseases.

Endoscopic diagnosis of ischaemic colitis is not so easy, because its endoscopic findings are not uniform according to its stage or severity. Therefore, more description of the cases in each stage and severity will be necessary to make more effective differential diagnosis of ischaemic colitis.