特 集

潰瘍性大腸炎の治療：治療方針

弘前大学第一内科

吉 田 豊 金 城 福 則

潰瘍性大腸炎の治療方針は以下の3点に基づいている。すなわち、1) 本症は大腸の慢性炎症であり、大腸が過敏な状態にある。2) 本症の発生病理の一部に免疫学的機序が関与している。3) 一部の重症例や重大な合併症のある症例は外科的治療の対象となる。実際の治療は一般療法として心身の安静、腸管の安静、食餌療法、全身状態の改善を行い、薬物療法は重症度に応じた治療内容が決められている。すなわち、軽症・中等症にはまずサラゾピリン、ステロイド注腸の順に治療を試み、これらの無効例と重症例に対してはステロイドの経口投与を行う。電撃型には絶食の上経静脈栄養を行い、ステロイドや抗生物質を血管内投与する。無効例は速かに外科治療を行う。内科的治療が当初より期待できないか、行っても改善のないものが外科治療の適応であり、その転換の時期の早いものほど治療成績がよい。緩解維持療法としては6カ月以上のサラゾピリン投与を行う。

はじめに

潰瘍性大腸炎は松永(1958)の日本内科学会での宿題報告¹⁾以来報告例も増加し、現在では一般に知られた疾患として全国に3000~5000人の患者がいると推定される。“主として粘膜をおかし、しばしばびらんや潰瘍を形成する大腸の原因不明のびまん性非特異性炎症”(潰瘍性大腸炎調査研究班, 1974)²⁾と定義されるように、今日なお病因はもちろんのこと、発生病理も一部を除いてはほとんどがわかっていない。治療も原因療法がないだけに難しく厳密な意味では治癒は期待できない。したがって、現段階の内科的治療では無症状となる緩解を目標とするが、病態が十分にコントロールされた状態では患者の社会復帰も可能であり、重大な合併症のない限り治療は内科的に行うのが原則である。

治療方針は以下の3点に基づいており、治療に際してこれらは忘れられない。すなわち、1) 本症は大腸の慢性炎症であり、大腸が過敏な状態にある。2) 本症の発生病理の一部に免疫学的機序が関与している。3) 一部の重症例や重大な合併症のある症例は外科的治療の対象となる。

I. 内科的治療

適切な治療は、いかなる疾患の場合にも、精密な、そして慎重な診断の下で成り立つことは論をまたないが、本症の場合、その確実な診断の下での普遍的療法に加え

て、個々の症例に即したきめ細かい療法が特に求められる。さらに重症例や重大な合併症のある例では時期を逸しない外科的治療が必要であることを念頭において治療しなければならない。本症の内科的治療はTable 1に示すごとく一般療法と薬物療法とに分けられる。

1. 一般療法

一般療法は症例によって大きな幅をもつが、炎症の治療原則は局所の安静であり、次に栄養補給による組織の修復機転の増強にあるので、ここでは特にこれらの点に注意したい。

a 心身の安静

活動期には心身の安静のためにも入院治療が望ましく、特に重症例や電撃型の症例では入院・安静が必要である。自律神経に支配される腸管の動きは精神的ストレスにも敏感なので、精神安定剤がほとんどルーチンに用いられ、心身の安静とともに大腸局所の安静を得るにも有効と考えられる。

現在、病因論としての心理的要因は否定的であるが、心理的因子が病状に大きく影響することは一般に認められている。症例によっては専門家(心療内科)による心理療法も考慮すべきであるが、一般には患者の心理状態をよく把握して、それなりのアプローチをするという臨床医としてごく当り前のことを行うことが、患者にとっては最もよい心理療法であろう。医師に対して信頼感を抱くことだけで患者は心理的に安静が得られるものであり、具体的には、平易な言葉で病態を説明し、治療に対

Table 1 潰瘍性大腸炎の内科的治療

一般療法

心身の安静（入院，精神安定剤）
 腸管の安静（鎮痙剤，止瀉剤）
 食事療法（高カロリー，低残渣食）
 全身状態の改善（輸血，補液）

薬物療法

抗生物質およびサルファ剤
 ACTH または副腎皮質ステロイド
 サラゾピリン
 免疫抑制剤

する期待も大きいことを語りながら良好な Patient-Doctor Relationship を確立する。専門家による心理療法としては，交流分析療法，行動療法，自律訓練法などがあり，教室ではストレスの解消と心身の安静を目的として主として自律訓練法を指導しているが⁹⁾，治療だけではなく再燃の予防にも有効な方法と考えている。

b 腸管の安静

前述のように心身の安静も腸管局所の安静に通ずるのであるが，直接的には鎮痙剤や止瀉剤などが症状に応じて用いられる。さらに過敏状態にある大腸に食物残渣が多くはいることは腸管への物理的・化学的刺激となるため，低残渣の食事が望まれる。

c 食事療法および輸液療法

腸管の安静を図るために低残渣食が望まれる一方，他方では，本症が消耗性疾患であり，全身状態の改善および炎症局所の修復機転の増強のためには十分なる栄養のある食事が望まれるというジレンマもある。しかし，本症の基本食は，病巣すなわち大腸を刺激しない範囲で栄養の向上を考え，あくまでも高蛋白，高糖質，ビタミン豊富食であり，全病期を通じて高カロリー食が原則である。しかし，急性活動期にはある程度の食事制限はやむを得ない。すなわち，患者にとってアレルゲンとなる食物の摂取が禁物であることはもちろんであるが，大量の糖質も不消化性，醗酵性の下痢をおこすので避ける。特に日本人では牛乳不耐症が多いので，牛乳や高乳糖食は摂らないようにする。高残渣食といわれるリンゴ，生たまご，オレンジ，セロリ，キャベツ，トマト，イチゴ等や香辛料のなんばん，カレー，こしょうなども避けるべき食品であろう。また，本症の電撃型・再燃劇症型においては絶食を必要とし，重症例においても急性期では悪心などにより食欲不振が強いことがあるので経静脈的栄養補給を十分に行う必要がある。近年，経静脈的高カロリー輸液法は，実施方法の簡便化や合併症・副作用対策の進歩によって適応が大きく広げられたが，本症の治療においても絶食を必要とするような症例ではきわめて有効

であり⁴⁾，推奨したい。

2. 薬物療法

本症に対する薬物療法の目的は前述のように緩解の導入であり，それを長期間維持することにある。

a 薬物の種類と薬理作用

薬物療法では副腎皮質ステロイド(SH 剤)または副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) とサラゾピリンの2本の柱を中心に抗生物質またはサルファ剤，免疫抑制剤の組み合わせが症例に応じて選択される。SH 剤および ACTH は直接・間接的に抗炎症作用，免疫抑制作用を有していることが治療に用いられる薬理学的根拠となっている⁹⁾。サラゾピリンは一般名が Salazosulfapyridine というサルファ剤であるが，本剤は大腸の結合組織と著しい親和性をもち，摂取された本剤はそこに高濃度に蓄積し，さらにスルファピリジンとサリチル酸に分解して抗炎症作用を発揮する⁹⁾といわれ本症に対する有効性が認められた。

本症の病因論研究の発展に伴い，発生病理に自己免疫現象の関与が示唆され⁷⁾，SH 剤や ACTH の使用はもともと抗炎症作用を利用した経験的使用に始まったものであるが，今日では免疫現象の抑制という大きな理論的根拠を背景として使用されるようになったのである。同様の理論で他の免疫抑制剤も使用されその有効性も認められるようになった⁹⁾。また，最近外国においてはアレルギー反応に関与する化学伝達物質の遊離を阻害することにより喘息発作を抑制する disodium cromoglycate (Intal) が本症の緩解導入や維持に有効であると報告されており⁹⁾，本症の治療法も多様化しつつある。広域スペクトルの抗生物質やサルファ剤も重症例で二次感染の治療と予防に使用されるが，あくまでも発熱や白血球増多のある期間だけであり，本症に対する直接の治療効果を期待した使用ではない。

薬物治療に際してはその効果だけではなく副作用についての認識も必要である。SH 剤，ACTH や免疫抑制剤の副作用が少なくないことは一般によく知られているところであるが⁹⁾，サラゾピリンにも発疹・発熱などの過敏反応・中毒性肝炎¹⁰⁾のほか腎障害¹¹⁾や無顆粒球症，Heiz 小体貧血¹²⁾などが稀にみられ，使用に際してはそれらにも注意する必要がある。

b 薬物療法の実際

本症の病態や経過の複雑さにとまう治療法の多様化もあり，従来は治療者各自の判断のもとに治療法が症例ごとに選択されていたので，系統的な治療法が行われ評価されるということはなかった。そこで1975年に厚生省潰瘍性大腸炎調査研究班ではこれまでの欧米および本邦での治療成績から一応の内科的治療基準(案)を作成

し、その治療法の効果を検討している¹³⁾。この案では、臨床重症度に応じて治療内容を決めており、8割以上を占める軽症・中等症の第一選択薬はサラゾピリン、第二選択はステロイド注腸、これらの無効例と重症例に対してステロイドの経口投与となっている。さらにこれまで不十分であった再発への対策として、緩解維持療法として6カ月以上のサラゾピリン投与をすすめている。最近、われわれもこの基準案に沿った治療を試み良好な成績を得ているので、薬物療法の実際として以下にその方法を紹介する。

1) 軽症・中等症

サラゾピリン3～4g、または0.06k/kgを経口投与し(1日4回分服)、2週間以内に明らかな改善があれば、引き続きこの量を投与する。内視鏡的にも緩解が得られたら徐々に減量し、最後は再発予防の目的で1日2gを維持量として6カ月以上続ける。直腸炎型では本剤の坐薬がとくに有効な場合がある。

サラゾピリンによる治療で2週間後にも明らかな改善がない場合は、Prednisolone 20mg 注腸を加える。SH剤注腸を加えて、なお2週間以内に明らかな改善がない場合は注腸を中止し、サラゾピリンに加えて Prednisolone 30mgを経口投与する(4回分服)。

以上の療法で2週間後にもなお明らかな改善がない場合には、重症例の治療に変える。

2) 重症

当初より Prednisolone 40～60mg(4回分服)と、広域スペクトルの抗生物質を使用する。ただし抗生物質の使用は発熱または白血球増多のある時期のみとする。これで有効な場合は減量しないで緩解まで続け、緩解後は漸減し、Prednisolone 10mgに減量できた時期にサラゾピリン2gを併用し、最後はサラゾピリンの長期単独投与を続ける。

この療法で効果がみられない場合は ACTH 療法を加

え、なお無効な場合に免疫抑制剤の投与か SH 剤の動脈注入療法を考慮する。動注療法は2、3日で効果が現れるので、なお無効の場合にはただちに外科的療法が考慮されねばならない。

3) 電撃型または再燃劇症型

高熱、激しい下痢(1日20回以上)、白血球増多、強い食欲不振、腹痛、大出血などの激しい症状をもって発症するもので、水分以外の経口摂取を禁じ、速やかに次の治療を行う。すなわち、輸血を含めた経静脈的栄養補給を十分に行いながら、Prednisolone 30mgの動注療法、または40～60mg(分4注)の静脈療法を行う。同時にテトラサイクリン1gまたはセファロスポリン4gを分4注で静注する。この療法で1週間以内にほとんどの症状が消失した場合には、治療法を上述の重症例の場合に準じて経口療法とするが、症状の改善の少ない場合には緊急手術を考慮する。この場合、手術の時期を失すると予後が急激にわるくなることを銘記すべきであろう。

以上の療法を簡単にまとめると Figure 1 のようになるが、最近 SH 剤やサラゾピリンの坐薬も開発¹⁴⁾¹⁵⁾され、特に直腸S状結腸炎に効果的であり、治療基準案の局所投与法として使用されるであろう。

また、その他の薬剤も対症的に適宜使用する。なお、抗コリン剤の大量投与や磷酸コデインの使用は中毒性巨大結腸症 toxic megacolon の誘発にもつながることがあるので、注意を要する。激しい下痢の際にはカリウムの喪失があるのでその補給が必要であり、食物の経口摂取がない患者にはビタミン剤の投与も十分に行う。

なお、一般に便通が治療効果のもっともよい指標となるが、その他赤沈、白血球数、 α_2 -グロブリン、CRP、糞便リゾチーム活性も客観的な効果判定の基準となる。

II. 外科的治療

前述のように内科的治療の目的は完全治癒ではなく緩

Fig. 1 重症度別薬物療法(無効な場合の薬剤の変え方)

解であり、かつそれを長期間持続させることにある。しかし、1974年度以前に発症した1422例の1974年度における転帰をみると20.3%が手術を受けており¹⁶⁾、本症の治療の困難性を示し、一部の症例はどうしても外科的治療を必要としている現況である。それゆえ、本症は若年者に多い大腸の難治性疾患として、内科的治療法の開発とともに手術適応すなわち手術すべき症例の時期の適切な判断および手術術式の開発が望まれる。

1. 外科的治療の適応

外科的療法の絶対的適応は悪性変化、穿孔、大量出血、および内科的治療に反応しない中毒性巨大結腸症であり異論のないところであろう。しかし、本療法の相対的(社会的)適応は“内科的療法の無効の場合”であり、あるいは“慢性に再発をくり返し、社会生活に支障をきたす場合”であり、実際には手術の時期の決定が必ずしも容易でない。

内科的療法のほとんど無効と考えられる瘻孔形成、膿瘍形成、関節炎や結節性紅斑など全身的症状などを合併した重症例では手術が絶対的適応に近い形で適応となるであろう。内科的治療の無効な場合の判定は薬物療法の項で述べたように電撃症であれば1週間、重症であれば約4週間、軽症・中等症の時であれば約10週間のSH剤やサラゾピリンを含めた内科的療法を行っても症状や赤沈、低蛋白血症の改善がみられない症例は外科的療法の相対的適応として考えたい。

適応の決定でもっともしばしば問題となるのは慢性に再燃をくり返している症例であるが、それは社会生活に支障をきたしているという考えの基準が個人によって相当な開きがあるからである。したがって、この決定には医師の考え以上に患者自身の意見が強く反映されて然るべきであろうが、一応再燃が年1回はおこり、そのために毎回入院を必要とするような症例では手術が適応であろう。

また、厚生省潰瘍性大腸炎調査研究班においては手術適応を、手術を行う時期によって緊急手術の適応(大出血、腸管穿孔、中毒性巨大結腸症、激症型)と待期手術の適応(再燃を繰り返す、内科的治療無効、全身の合併症の存在、癌化の疑い、腸管狭窄、瘻孔形成)とに分けて調査検討している¹⁷⁾。その結果やこれまでの欧米の報告¹⁸⁾からも待期手術を行った症例が明らかに治療成績がよく、手術時期を逸することなく待期手術にもっていくことが大切である。

そのほか外科的治療を必要とする場合は全大腸炎型に多い¹⁹⁾。

2. 手術術式

本症は大腸の良性疾患であるので、手術術式として

は、病変の広がり程度より部分結腸または直腸切除術、亜大腸切除術、全大腸切除術と人工肛門造設術または自然肛門温存術式との併用が考えられる。全結腸直腸摘出・回腸瘻造設術は再発、再燃がなく根治的であり、わが国では23.7%の症例に行われている¹⁷⁾。しかし、本症は若年者を侵すことが多いために、本術式は術後の生活面・精神面への影響からして決して望ましいものではない。そこで、自然肛門温存術式、特に全結腸直腸摘出・回腸直腸吻合術が検討され、また、新しい手術術式も試みられ、効果的であったという報告が²⁰⁾²¹⁾ある。さらに、重症例において上行結腸瘻が一期手術として行われ、そのみにても臨床症状の改善がみられるが、二期手術としてその後安全に病変部大腸の摘出を行い自然肛門温存手術を併用すればよいという報告もある²²⁾。

おわりに

潰瘍性大腸炎の治療方針についてその概要を述べた。本症患者の20%前後は結局は手術適応となるが、他は内科的に十分にコントロールされ、社会復帰も可能であり、治療の原則はやはり内科的と考えられる。ただ一般状態のよい病期での外科的治療の成績はきわめて良好であり、内科医はその適応のタイミングを失しないように重症例の治療にあたっては特に注意されたい。いずれにせよ、理想的には内科的に根治できる治療法の開発であり、そのためには病因論の確立が必要であり、今後のこの領域での研究の発展が強く望まれる。

文 献

- 1) 松永藤雄：潰瘍性大腸炎。日内会誌，47：295，1958。
- 2) 渡辺 晃：診断基準分科会報告。潰瘍性大腸炎調査研究班，昭和49年度業績集，1975。
- 3) 川上 澄ほか：潰瘍性大腸炎と心身症。診断と治療，60：217，1972。
- 4) 岡田 正ほか：高カロリー輸液(VII)。外科治療，31：208，1974。
- 5) Bockus, H. L.: Gastroenterology, Vol. II, 3rd Ed., 721, WB Saunders, Philadelphia, 1976。
- 6) Moertel, E. G. & Bagen, J. A.: A critical analysis of the use of salicylazosulfapyridine in chronic ulcerative colitis, Ann. Intern. Med., 51: 876, 1959。
- 7) 黒江清郎ほか：潰瘍性大腸炎。日本臨床，31：3421，1973。
- 8) Jones, A. et al.: Azathioprine in ulcerative colitis, Brit. Med. J., 5806: 163, 1972。
- 9) Mani, V. et al.: Treatment of ulcerative colitis with disodium chromoglycate, Gut, 16: 382, 1975。

- 10) 吉田 豊ほか：潰瘍性大腸炎の薬物療法。内科，39，996，1977.
- 11) 山形 敏一ほか：潰瘍性大腸炎に対する Salazopyrine の治療効果。診断と治療，56：531，1968.
- 12) Pounder, R. E. et al: Red cell abnormalities associated with sulphasalazine maintenance therapy for ulcerative colitis, Gut 16: 181, 1975.
- 13) 井上 幹夫：内科的治療分科会報告。潰瘍性大腸炎調査研究班，昭和50年度業績集，1976.
- 14) 武藤 徹一郎ほか：軽症型潰瘍性大腸炎のステロイド坐薬療法に関する臨床的ならびに基礎的研究。潰瘍性大腸炎調査研究班，昭和50年度業績集，1976.
- 15) 渡辺 晃ほか：5日間強力静注療法およびサラゾピリン坐薬の治療効果。潰瘍性大腸炎調査研究班，昭和50年度業績集，1976.
- 16) 横田 暉ほか：潰瘍性大腸炎の疫学。潰瘍性大腸炎調査研究班，昭和50年度業績集，1976.
- 17) 白鳥 常男ほか：潰瘍性大腸炎手術症例の昭和50年度全国調査について。潰瘍性大腸炎調査研究班，昭和50年度業績集，1976.
- 18) 白鳥 常男ほか：潰瘍性大腸炎。外科治療，33：46，1975.
- 19) 土屋 周二ほか：潰瘍性大腸炎の外科的治療。胃と腸，11：1005，1976.
- 20) 今 充ほか：潰瘍性大腸炎の外科治療。31：937，1977.
- 21) 白鳥 常男ほか：潰瘍性大腸炎に対する新しい手術術式。潰瘍性大腸炎調査研究班，昭和50年度業績集，1976.
- 22) 白鳥 常男ほか：結腸瘻造設術の意義について。潰瘍性大腸炎調査研究班，昭和50年度業績集，1976.

(昭和53年9月30日受領)

Special Articles :

I. Treatment of Ulcerative Colitis

Y. Yoshida

Department of Internal Medicine, Hirosaki University, Aomori

Physicians are reminded the following three facts on treating the patients with ulcerative colitis; 1) The disorder is a chronic inflammation and the affected colon is much irritated. 2) Immunological process is playing a role in the pathogenesis. 3) Approximately 20% of the patients will be ultimately treated surgically.

General measures of treatment are the colonic, physical and emotional rest, maintenance of nutrition and of fluid and electrolytes balance, and other managements for improvement of general status.

As chemotherapeutic measures, in patients with mild or moderate colitis Salazopyrine is the drug of first choice and steroid enema is the second. Oral administration of steroid is given to patient with refractory and severe colitis. In acute fulminant colitis no oral intake is allowed, and all medications and nutritions are given parenterally. If no definite improvement is seen within a week surgical treatment is urgent. Indication of surgical treatment for ulcerative colitis is not definite, but the cases which do not respond to medical treatment for some weeks are generally indicated. Since the prognosis for patients with severe colitis on medical management is not good, earlier surgery has been recommended.

For maintenance of remission, administration of Salazopyrine may be used for more than 6 months.

II. Treatment of Ulcerative Proctitis

M. Inoue, I. Yoshida and S. Nagata

Department of Health Administration, Fukuoka University
School of Medicine, Fukuoka

The incidence of ulcerative proctitis or proctosigmoiditis is 10 to 40% of whole ulcerative colitis patients in USA, British Kingdom and also in Japan. In our series, extent of involvement was limited to rectum or rectosigmoid in 10 out of 43 cases of ulcerative colitis. By the administration of salazopyrin, complete symptomatic relief was obtained in 75%, and endoscopic remission was observed in 69% of the cases. Patients in which the effects of salazopyrine were not complete, responded well to local steroid therapy. Medical management and prognosis of ulcerative proctitis were discussed.