症例報告 I

Recklinghausen 病に併発した大腸好酸球性肉芽腫
(Inflammatory Fibroid Polyp) の1例

弘前大学第1内科

竹 森 弘 光 相 沢 中

三沢市立病院内科

菅 原 耕

三沢市立病院外科

丹 英 太 郎

消化管の好酸球性肉芽腫は稀な疾患であり、本邦報告例の大部分は限局隆起型で好発部位は胃である。われわれは Recklinghausen 病に併発し血便を主訴とした、本邦第2例目の大腸限局隆起型好酸性肉芽腫 Inflammatory Fibroid Polyp を経験したので報告する。

症例は52歳女性。20年前より Recklinghausen 病あり。主訴は血便と全身倦怠感。アレルギー歴や好酸球増多はなく鉄欠乏性貧血あり。諸検査により横行結腸に polyp を指摘され横行結腸部分切除術施行。Polyp は表面にびらん、壊死があり、大きさは $2.4 \times 1.6 \times 1.5$ cm で茎の長さ1.5cm の山田IV型であった。組織学的には粘膜から粘膜下層にかけてびまん性の好酸球浸潤を伴う結合組織の増生、血管周囲の線維の渦状増生があり、Inflammatory Fibroid Polyp の所見と一致した。polyp の基部周囲の大腸粘膜は約5cm にわたって顆粒状変化があり、polyp 部分と同様の組織学的所見が粘膜だけに存在した。Recklinghausen 病とは単なる併発例と考えられた。

緒 言

消化管の好酸球性肉芽腫は稀な疾患であり、本邦報告例の大部分は限局隆起型、いわゆる Helwig¹⁾ らの Inflammatory Fibroid Polyp である。その発症部位では胃症例が多くを占め、本邦の大腸症例は松崎²⁾ らの報告した横行結腸例の1例だけである。

今回われわれは Recklinghausen 病に併発し、polyp からの出血により鉄欠乏性貧血をきたした、大腸好酸球性肉芽腫 Inflammatory Fibroid Polyp を経験したので報告する。

症 例

患者：52歳、女性

家族歴：祖母が Recklinghausen 病のほか特になし。

既往歴：アレルギー疾患など特になし。

現病歴：約20年前より Recklinghausen 病と診断されていた。約1カ月前より血便と全身倦怠感が、さらに腹

部不快感も出現してきたので、昭和52年11月18日三沢市立病院内科を受診した。

現症：身長145cm、体重48kg、血圧130/70mmHg、脈拍70回/分、整。結膜には貧血あるも黄疸なし。全身に結節腫瘍と Cafe au lait spot が散在している (Fig. 1)。その他の理学的所見は特に異常なし。

臨床検査成績 (Table 1)：赤血球数 369 万/mm³、Hb 5.8g/dl、Ht 22%と小球性低色素性貧血があり、血清鉄 $48\mu\text{g/dl}$ 、TIBC $520\mu\text{g/dl}$ で、鉄欠乏性貧血であった。白血球数は正常で、分画では好酸球増多はなかった。糞便検査では潜血強陽性であったが虫体および虫卵はなかった。その他尿検査、肝機能検査等は正常であった。

注腸X線検査所見：横行結腸脾屈曲部側に鳩卵大の山田IV型のポリープがあり、またその周囲約5cm にわたって壁の不整、大腸粘膜の顆粒状変化があった (Fig. 2)。

大腸内視鏡検査所見：注腸X線検査所見に一致して、約2cm の大きさで長い茎を有するポリープがあり、その先端は一部びらん、壊死を伴っていた。ポリープ周

Fig. 1 Picture of patient
Caf'e au lait spots and tumors

Table 1 Laboratory examination data

RBC	$360 \times 10^6 / \text{mm}^3$	T.P.	7.0 g/dl
Hb	5.8 g/dl	A/G	1.33
Ht	22 %	T.Bil.	0.32 mg/dl
WBC	$4500 / \text{mm}^3$	GOT	12 K.U.
neutro.	61 %	GPT	10 K.U.
eosino.	1 %	ZST	5.2 K.U.
lymph.	31 %	ALP	5.6 K.A.U.
mono.	7 %	Chol.	163 mg/dl
Plat.	$17.5 \times 10^6 / \text{mm}^3$	Urea N	12.9 mg/dl
Serum Fe	48 $\mu\text{g/dl}$	Urine	n.p.
TIBC	520 $\mu\text{g/dl}$	Stool	
Na	140 mEq/L	occult blood	(++)
K	3.8 mEq/L	parasites	(-)
Cl	98 mEq/L	ova	(-)

Fig. 2 Barium enema
Polyp and granular change of the mucosa
of the transverse colon

囲の大腸粘膜はX線写真と同様に軽い凹凸のある顆粒状の変化があった。生検組織検査では、ポリープは悪性所見がなく、線維の多い肉芽組織よりなり、小円形細胞、好酸球の浸潤を伴い、炎症性ポリープと診断された。顆粒状粘膜部分もほぼ同様の所見であった。

胃、小腸X線検査では特に異常所見はなかった。

以上より、本症例は横行結腸の炎症性ポリープからの出血により鉄欠乏性貧血を来たしたと考え、横行結腸部分切除術を施行した。

切除標本所見 (Fig. 3) : ポリープの大きさは $2.4 \times 1.6 \times 1.5 \text{ cm}$ で一部壊死、びらんを伴い、その茎の長さは 1.5 cm であった。ポリープの周囲の大腸粘膜は 5 cm にわたって顆粒状であった。

Fig. 3 Surgical specimen

組織学的所見 : ポリープは、粘膜より粘膜下層にかけて膠原線維、線維芽細胞が一様に増生し、びまん性好酸球細胞浸潤があり (Fig. 4), さらに毛細血管が豊富であり、細小動脈の血管炎様所見と血管周囲の線維の渦状増

Fig. 4 Microscopic findings
The diffuse infiltration of eosinophils and
the loosely arranged fibroblasts and fibrils.
(H-E, $\times 100$)

Fig. 5 Microscopic findings
Numerous blood vessels. Arterioles with the thickened wall and narrowed lumen is surrounded by concentrically arranged connective tissue (onion skin pattern). (H-E, $\times 50$)

生があった (Fig. 5)。

顆粒状大腸部分では、粘膜にだけポリープとほぼ同様の組織学的所見があった。

虫体や虫卵は観察されず、悪性像もなかった。

以上より、本症例のポリープは限局隆起型消化管好酸球性肉芽腫、すなわち Helwig¹⁾らのいう Inflammatory Fibroid Polyp であった。

考 察

消化管好酸球性肉芽腫は、Kaijser³⁾により初めて報告されたが、比較的稀な疾患であり、欧米では Salmon⁴⁾らの122例の集計、本邦では橋本⁵⁾らの32例の集計がなされている。

本症は病理組織学的にも、臨床的にも2型に大別される。

1型はびまん浸潤型で、Ureles⁶⁾の Diffuse Eosinophilic Gastroenteritis である。病理学的には、「①胃管壁はびまん性に肥厚し、著明な好酸球浸潤と浮腫を伴う。②線維芽細胞、膠原線維、細血管の増生は少ない。③病変は漿膜側にも及ぶことがあり、多発性の場合もある」などの特徴がある。

臨床的特徴としては、好発年齢は20歳から50歳であり、末梢血では好酸球増多があり、アレルギー疾患の既往があることが多い。

症状としては間歇的な悪心、嘔吐、鼓腸、下痢、心窩部痛、胸やけ、時に下血、吐血がある。そして、これらの症状が再発をくり返すということが大きな特徴である。

治療としては、病変部を外科的に切除しても再発する

ことが多いので、内科的保存療法が主である。外科的切除は閉塞を起こした場合や激症の場合に適応となる。重症例に対しては、ステロイドホルモン剤が有効である⁶⁾⁷⁾。

2型は限局隆起型で、Vanek⁹⁾らにより「Gastric submucosal granuloma with eosinophilic infiltration」として初めて記載され、Helwig¹⁾の Inflammatory Fibroid Polyp, Ureles⁶⁾らの Circumscribed Eosinophilic Infiltrated Granuloma である。病理学的には、「①線維芽細胞および疎に配列した膠原線維の増生。②好酸球を多数含む好中球及びリンパ球浸潤と時にみられるリンパ3胞様構造。③細小動脈、リンパ管の増生拡張。④血管を中心として、線維配列が同心円状の走行 (onion skin pattern) を示す。⑤病変は主として粘膜固有層、粘膜下層を中心とし固有筋層は侵されない。」を特徴としている。

臨床的には、好発年齢は50歳及び60歳台で、末梢血の好酸球増多やアレルギー疾患の既往は通常ないとされている。

症状は、悪心、心窩部不快感、出血及び閉塞症状である。とくに小腸、大腸例では腸閉塞を初発症状とすることが多い。また大腸例では本症例と同様に下血を主訴とすることがある¹⁰⁾。

治療としては再発しないので、内視鏡的ポリペクトミーや外科的切除がおこなわれる。

以上より本症例はアレルギー疾患の既往や末梢血の好酸球増多はなく、有茎性ポリープであり、組織像からも後者に属すると考えられる。すなわち、Helwig¹⁾らの Inflammatory Fibroid Polyp であり、Ureles⁶⁾らの Class II, Group B, T. O'Neil⁷⁾らの Group II に属している。

さらにポリープ部分と同様の組織学的所見が、ポリープ周囲の顆粒状変化が存在する大腸の粘膜だけにみられたが、他の報告ではそのような症例はなく、その成因は不明である。

びまん浸潤型、限局隆起型2型の頻度、発生部位に関して、欧米と本邦では大きな差異がある。

Salmon⁴⁾らの消化管好酸球性肉芽腫122症例136病変の集計 (Table 2) では、限局隆起型32病変に対しびまん浸潤型は104病変とびまん浸潤型が多い。限局隆起型の部位別頻度では、胃17例、小腸5例等である。びまん浸潤型では胃36例、小腸40例、虫垂16例等であり、限局隆起型、びまん浸潤型両型とも胃症例が多い。小腸例ではびまん浸潤型、大腸例では限局隆起型が多い。

本邦では本症の最初の報告は中馬¹¹⁾の胃の限局隆起型である。橋本⁵⁾の32例の胃好酸球性肉芽腫の集計では、

Table 2 Distribution of lesions in gastrointestinal tract

	Polypoid Granulomata	Infiltrative Granulomata
Pharynx	1	—
Stomach		
Body	3	6
Antrum	14	30
Small bowel		
Duodenum	1	5
Jejunum	1	7
Ileum	3	28
Appendix	—	16
Caecum	3	—
Colon	5	1
Rectum	1	—
Gall bladder	—	1
Peritoneum	—	5
Generalized diffuse	—	5
	32	104
Total number of cases	122	
Total number of lesions	136	

by Salmon, P. R. et al. ⁶⁾

潰瘍型とした1例を除いてすべて限局隆起型である。びまん浸潤型の報告としては、大野¹²⁾らの胃症例、飯塚¹³⁾らの胃幽門部から回腸末端部にわたって病変の存在した症例がある。また田中¹⁴⁾らは、胃壁に著明な好酸球浸潤を伴う病変43例を検討し、限局隆起型 (localized polypoid type) 15例、びまん肥厚型 (diffuse thickened type) 6例、寄生虫性肉芽腫 (parasitic granulomatous type) 22例に分類した。諸家の報告から、本邦では限局隆起型が大部分を占めびまん浸潤型は少ないことがわかる。

教室の西村¹⁵⁾らは、胃の内視鏡的ポリペクトミーを施行した75病変の組織学的分類を行い、過形成性ポリープ67例 (89%)、腺腫性ポリープ2例 (3%)、炎症性フィブroidポリープ5例 (7%)、ポリープ癌1例であったと報告し、本症は実際は少なくない病変であると述べている。

本邦では、胃以外の消化管に発生した本症の報告は非常に少ない。著者らの調査範囲では、小腸例は4例でびまん浸潤1例¹³⁾、限局隆起型3例¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾であった。大腸例は松崎ら²⁾の報告が本邦第1例目であり、症例は第2例目である。その部位はいずれも横行結腸で、限局隆起型である。

本症の成因はいまだ不明の点が多く、組織学的類似性より神経¹⁹⁾²⁰⁾、血管²¹⁾由来の腫瘍説や寄生虫原因説²²⁾が提唱されたが、これらの病態、組織像と本症のそれとは

相違点もあるため、1つの独立した疾患と考えられている¹⁾²³⁾²⁴⁾。

びまん浸潤型では、末梢血で好酸球増多があること、アレルギー疾患の既往があること、病変が腸管壁全体に及び、また数ヶ所に存在することがあるなどの点から、全身性アレルギーが関与すると考えられている¹⁾³⁾⁴⁾⁶⁾⁷⁾²³⁾²⁵⁾。

一方、限局隆起型では好酸球増多やアレルギー疾患の既往がないこと、病変は粘膜、粘膜下層が中心であり、多発例はないことなどから、アレルギーよりは局所的炎症反応の結果とみなす人が多い¹⁾⁶⁾¹⁴⁾¹⁵⁾。Moran ら²⁶⁾はウサギの胃壁に種々の異物を注入し、限局隆起型の好酸球肉芽腫の病変を作り上げることに成功したことから、限局隆起型では根本的にアレルギーの関与は必要でないと述べている。

本症例では、Recklinghausen 病に併発しているが、新村は Recklinghausen 病患者の消化器病変について検討を加え、剖検例の11.6%に胃の、16.8%に腸の神経線維腫があり、さらに胃平滑筋腫、胃癌、胃肉腫、腸平滑筋腫等の合併例があると報告しているが、Recklinghausen 病と消化管好酸球性肉芽腫の併発例の記載はない。著者らの調査範囲では両者の併発例の報告はなかった。両者は組織学に類似することがあるが²⁶⁾、本質的に神経線維腫は神経由来の腫瘍であり、消化管好酸球性肉芽腫は炎症性由来であり、本症例は単なる併発例と思われる。

ま と め

血便を主訴として来院し、消化管検査の結果 Recklinghausen 病に併発した本邦第2例目の大腸好酸球性肉芽腫 Inflammatory Fibroid Polyp の症例を経験したので報告するとともに、消化管好酸球性肉芽腫について若干の文献的考察を加えた。

文 献

- 1) Helwig, E. B., et al.: Inflammatory fibroid polyp of the stomach. Surg. Gyne. Obstet., 96: 355-367, 1953.
- 2) 松崎松平, ほか: 大腸に発生した Eosinophilic Granuloma (Inflammatory Fibroid Polyp) の1例. 日消会誌, 76: 126-132, 1979.
- 3) Kaijser, R.: Zur Kenntnis der allergischen Affektionen des Verdauungskanaals von Standpunkt des Chirurgen aus. Arch. klin. Chir., 188: 36-64, 1937.
- 4) Salmon, P. R., et al.: Eosinophilic granuloma of the gastro-intestinal tract. Gut, 8: 8-14, 1967.
- 5) 橋本純一, ほか: 胃好酸球性肉芽腫—自験4症

- 例の検討一。胃と腸, 7: 777-783, 1972.
- 6) Ureles, A. L., et al.: Idiopathic Eosinophilic Infiltration of the Gastrointestinal Tract, Diffuse and Circumscribed. A Proposed Classification and Review of the Literature, with Additional Cases. *Am. J. Med.*, 30: 899-898, 1961.
 - 7) O'Neil, T.: Eosinophilic granuloma of the gastro-intestinal tract. Case report and suggested classification. *Brit. J. Surg.*, 57: 704-708, 1970.
 - 8) 石川浩一, ほか: 特異な形態を呈した胃の炎症性偽腫瘍 (Inflammatory Pseudotumor)—いわゆる胃の好酸球肉芽腫との関連について—。癌の臨床, 18: 773-785, 1972.
 - 9) Vanek, J.: Gastric submucosal granuloma with eosinophilic infiltration. *Am. J. Path.*, 25: 397-411, 1949.
 - 10) McGee, H. J., Jr.: Inflammatory fibroid polyps of the ileum and cecum. *A. M. A. Arch. Path.*, 70: 203-207, 1960.
 - 11) Chuma, E.: A case of gastric granuloma with eosinophilic infiltration. *M. J. Osaka U.*, 2: 71-74, 1951.
 - 12) 大野文俊, ほか: レントゲンの成人型特発性幽門筋肥大症を呈した Diffuse eosinophilic Gastroenteritis の1例。日本臨床, 29: 127-130, 1971.
 - 13) 飯塚益生, ほか: Diffuse Eosinophilic Gastroenteritis の1例。胃と腸, 9: 1271-1276, 1974.
 - 14) 田中貞夫, ほか: 所謂胃好酸球性肉芽腫の臨床的・病理組織学的研究—炎症性線維性ポリープ, 好酸球性胃炎, 寄生性好酸球性肉芽腫について—。鹿児島大学医学雑誌, 27: 351-366, 1975.
 - 15) 西村茂樹, ほか: 内視鏡的に切除した炎症性フィブroid・ポリープ5例。日消会誌, 73: 991, 1976.
 - 16) 中村 達, ほか: 回腸の inflammatory fibroid polyp (いわゆる好酸球肉芽腫の1例)。癌の臨床, 21: 642-645, 1975.
 - 17) 金 仁洙, ほか: 回腸末端に発生した Inflammatory fibroid polyp (Helwig) の1例。胃と腸, 12: 389-392, 1977.
 - 18) 飛鳥田一朗, ほか: 小腸に発生した好酸球性肉芽腫 (Inflammatory fibroid polyp) の1例。最新医学, 33: 800-804, 1978.
 - 19) Shubin, H., et al.: Gastric Neurofibromas Simulating Granulomas. *A. M. A. Arch. Path.*, 60: 286-288, 1955.
 - 20) Goldman, R. L., et al.: Neurogenic nature of the so-called inflammatory fibroid polyps of the stomach. *Cancer*, 20: 134-143, 1967.
 - 21) Cohen, N., et al.: Inflammatory Fibroid Polyp ("Hemangiopericytoma") Of the Stomach. *Am. J. Digest.*, 4: 549-555, 1959.
 - 22) Stemmermann, G. N.: Eosinophilic granuloma of the appendix. A study of its relation to Stroglyoides infestation. *Am. J. Clin. Path.*, 36: 524-531, 1961.
 - 23) Samter, T. G., et al.: Inflammatory fibroid polyps of the gastrointestinal tract. A report of 3 cases, 2 occurring in children. *Am. J. Clin. Path.* 45: 420-436, 1966.
 - 24) Ming, S.: Tumors of the esophagus and stomach. Atlas of tumor pathology, Second series, Fas. 7: 102-109, AFIP, Washington, D. C. 1973.
 - 25) McCune, W. S., et al.: Eosinophilic Gastroduodenitis with Pyloric Obstruction. *Ann. Surg.*, 142: 510-518, 1955.
 - 26) Moran, T. J., et al.: Granuloma of stomach. II. Experimental production by intraluminal injection of foreign material including gastric juice. *Am. J. Clin. Path.*, 24: 422-433, 1954.
 - 27) 新村真人: Recklinghausen 病・自験150例および本邦報告例について (5) —皮膚随伴症候, 内臓の変化—。皮膚臨床, 15: 1041-1049, 1973.
 - 28) 佐野量造: 胃疾患の臨床病理, 291-294, 医学書院, 東京, 1974.

(昭和55年2月4日受領)

clean-contaminated cases 7.5%.

In all cases of wound infection, both anaerobic and aerobic bacteria were revealed. Main aerobic bacteria were Gram-positive rods sensitive to aminoglycosides, and main anaerobic bacteria were resistant to aminoglycosides.

These results suggest the efficacy of the combined administration of aminoglycosides and other drugs effective to anaerobic bacteria.

Case Report

I. An Inflammatory Fibroid Polyp of the Colon Found in Recklinghausen's Disease and Relationship of two Lesions

H. Takemori and T. Aizawa

First Department of Internal Medicine, Hirosaki University School of Medicine, Hirosaki

K. Sugawara

Misawa Municipal Hospital, Internal Medicine

E. Tan

Misawa Municipal Hospital, Surgery

Gastrointestinal inflammatory fibroid polyp has been reported to occur mainly in the stomach but very rarely in the colon. One case in the literature has been reported in Japan of colonic inflammatory fibroid polyp other than our case.

Fifty two-year-old female was admitted to Misawa municipal hospital complaining of bloody stool and easy fatigability. She had no allergic problems but had been suffered from the Recklinghausen's disease for 20 years. She was found to have iron deficiency anemia but eosinophilia was not seen.

Fluoroscopic and endoscopic examination revealed a polyp at the transverse colon. The mucosa around the polyp which is over 5 cm showed abnormal granular appearance.

The resected specimen showed the pedunculated polyp of $2.4 \times 1.6 \times 1.5$ cm with necrotic and erosive surface.

Histologically, the lesion was characterized by vascular and fibroblastic proliferation and diffuse infiltration of eosinophilic leucocytes which extended from the submucosa to the mucosa consistent with inflammatory fibroid polyp. Such findings were also seen at limited area of the surrounding mucosa with the granular appearance which make the pedunculum of the polyp.

Above-mentioned findings suggest strongly that the inflammatory fibroid lesion in this patient occurred without any relationships to the Recklinghausen's disease.