特集 VI

Laying-Open 手術に関する 2, 3 の工夫

倉敷市・チクバ外科・胃腸肛門科病院

竹 馬 浩

痔瘻手術の原則とされている (1) 原発巣の切除と (2) 瘻管処理を lay open 術式でおこなう場合の基本的な手技についてふれ、著者らが工夫しおこなっている術式=原発巣 lay open・瘻管搔爬・遮断・二次口開放・一部閉鎖手術を実例を示して説明した。

さらに、原発巣の局在診断に関する問題点や lay open 術式での原発巣処理上の注意、本法施術後の術後管理上の問題点について述べた。

痔瘻手術に関しては近年種々の工夫や新しい試みがみられるが lay open 術式がその基本的手術手技であると著者は考えている。

1. はじめに

痔瘻手術の根本原則は (1) 原発巣 (一次感染口) の切除と (2) 瘻管処理の 2 つに尽きるが、個々の症例については原発巣の局在診断、症候性の瘻管 (クローン病、悪性腫瘍、異物迷入など) との鑑別一つをとりあげてみても決して簡単とはいえない。まして原発巣をどのように切除するか、瘻管を fistulectomy するのか、fistulotomy するのか、その際どこまでやるのか、括約筋をどう処理するかなどなど術者の選択にまかされるところが大きい。近年肛門機能の破壊を最少限に抑え、創治癒の短縮を計る目的から core out 術式が叫ばれるようになったが、その適応範囲や治癒率からみて著者は lay open 術式の価値が等閑視されてはならないと考える。否むしろ lay open 術式こそ痔瘻手術の基本的手技であると確信している。しかしひと口に lay open といっても、古典的な切開開放から、種々の形成を加味した術式までいろいろあり議論の余地のあるところである。

ここでは著者が日常遭遇し試行錯誤の繰返しの中で掴んだ Lay open 術式の工夫について述べ諸賢のご批判を仰ぎたい。

2. 原発巣の診断と処理

(a) 双合指診の大切なことは論をまたないが、深い瘻管では直腸側から必ずしも硬結として触れ難い場合もあり、外口辺縁を切離して瘻管を外から引っ張り、術中 crypt の動きを内からみて確かめる操作を要する場合もある。

(b) 造影剤による X 線診断や色素注入法も古くからいわれているが、瘻管の走行や、二次巣 (膿瘍腔) の診断には有用でも原発口の診断には向かない場合も多い。

(c) Goodsall の法則も一応の規準にはなるが、例外も多く、時には原発巣が複数のこともあり、決して安易に考えてはならないように思う。

(d) 原発口確認のために瘻管開放を余儀なくされる場合もあるが、複雑痔瘻では瘻管の合流点近くに原発口を発見することが多い。その際、原発口発見にとらわれて早くから括約筋切断をしないで、もしするにしても他に手段はないかよく考えてからにしたい。

(e) 原発巣がどうしてもわからぬ場合は後正中線上にある場合が多いことを念頭におくこと。痔瘻の原因が必ずしも crypt を起源としない場合もあり、たとえば裂肛からの感染、直腸異物迷入からの感染ということも忘れてはならない。むやみに lay open すべきではない。

(f) 肛門周囲膿瘍の段階で原発巣の処理をおこなう場合はしばしば広範な破壊手術に陥り易く、原発巣の局在を誤る危険があるので膿瘍に対しては、まず切開排膿にとどめ、3 週間以上経過後根治的手術に踏み切るようにしたい。

(g) 女性の前壁痔瘻では原発巣がバルトリン腺にあることあり要注意。

(h) 原発巣の切除創はドレナージ創として利用することも多く、なるべく愛護的に扱いたい。

3. 瘻管の処理 (手術手技)

(1) 低位の単純痔瘻に対する術式

(a) Salmon's back cut 術式¹⁾

本法は原発口を含めて瘻管を全摘したのち二次口より外にT字状の皮切を加え、ドレナージ創を大きくともので再発防止には有効であるが、創治癒に日数がかかる欠点は否めない (Fig. 1).

Fig. 1

(b) lay open 術式の基本型ともいえる術式はその後多くの術者により改良が加えられ、浅い括約筋切開は後障害を残さないことがわかり、ドレナージ創は浅い皿形、洋梨形がよいとされている²⁾ (Fig. 2).

著者らも原発口の確実な切除と周辺の感染性肉芽の除去をしたのち本術式を基本型と考えおこなっている。

Fig. 2

(2) 複雑痔瘻に対する術式

ishio-rectal (坐骨直腸隙) に達する痔瘻では瘻管の走行も複雑な場合があり一概に論じえないが、core out 術式では死腔を残す危険があり、原発巣の十分な郭清処理が困難なこともあって著者らは lay open 術式を選ぶことが多い。

本法の欠点は創縁が大きく、括約筋切断を余儀なくされることにあるが、これらに対しては、形成的に種々工夫改良が加えられ肛門管の著しい変形や、肛門機能損傷を回避すべく改良手術ができ上りつつある。ここでは実例を示しながら著者らがおこなっている術式につき述べる。

(a) 原発口・郭清部に sliding skin graft を加えた lay open 術式

Fig. 3 は後壁に原発口をもつ馬蹄型痔瘻で膿瘍切開を繰返し既に肛門の変形がみられ、二次口 (S) が3カ所にみられた症例であるが瘻管を全部開放して掻破したのち、両側の二次口はドレナージ創として lay open し、

Fig. 3

Fig. 4 二次口をドレナージ創とし lay open 一次口へ S.S.G. をおこなったところ

原発口のあった後壁に sliding skin graft を加えて、Fig. 4 のように形成をおこなった。術後2カ月で slide した皮弁は生着し、ドレナージ創にも上皮の再生がみられ Fig. 5 のごとく治癒をみた。この例では二次口が深い瘢痕となっていたため多少の肛門の変形は残ったが肛門機能の上からは全く問題はなかった。痔瘻手術に

Fig. 5 術後2カ月で S.S.G. は生着しドレナージ創も上皮完了

S.S.G. を加えることは炎症が急性期のものではむずかしいが、陳旧化した瘻管がある場合、硬結部をなるべく切除した上で、二次口に向う瘻管を lay open してドレナージ創に利用する術式は肛門機能保持のため試みられてよいものとする。本法では、ドレナージが十分であるか否かが成否の鍵をにぎっているといえよう。

(b) 半閉鎖法³⁾

瘻管内の不良肉芽を搔爬、瘻管壁をできるだけ切除してから両側方の創を縫合した後方のみを開放にしておく、いわゆる半閉鎖法は瘻痕が小さく肛門機能障害も少ない (Fig. 6)。

Fig. 6

本法の欠点は、瘻管の搔破が不十分な場合、せっかく閉鎖した部に膿瘍を再発して初期の目的を達しなかったり、ドレナージ創と交通が残れば瘻孔の再発を生ずる点にあるが治療期間の短縮にはなる。

Fig. 7

(c) 原発巣 lay open・瘻管搔爬・遮断・二次口開放一部閉鎖手術

そこで、術後感染を防ぐ工夫として著者は Fig. 7 のごとく、二次口周辺の不良肉芽を切除した部を開放創とし、原発口切除後のドレナージ創の辺縁を遮断の意味で Dexon 糸を用いて結節縫合をおこなって縫合部位の生着を計り、治療の短縮を期している。

Fig. 8 では、後壁に原発口を持ち、右前方および両側に二次口を持つ痔瘻に対し、原発巣を lay open、全瘻管を搔爬して二次口部分は皮膚欠損のまま開放して、瘻管部分は縫合閉鎖して、原発口ドレナージ創とは遮断して4週間後に Fig. 9 のごとく治療せしめたもの。原発口の部では外括約筋は subcutaneous 及び superficial

Fig. 8 後壁右よりある原発巣をドレナージ創として lay open 右側方の二次口も皮膚欠損のまま open し他は縫合閉鎖

Fig. 9 右側方の縫合部が一部哆開したが術後4週間目にこの程度まで上皮ができた

ext. sphinct. を切離してあるためドレナージ創の上皮完了までには都合2カ月を要した。

Fig. 10 の症例も原発口を中心に大きなドレナージ創を作り lay open し二次口及び瘻管を一次的に縫合閉鎖して、6週間後 Fig. 11 ごとく生着をみたもの。この際瘻管処理は、できる限り全摘出した方がよく皮フの一部が犠牲になってもよい。不足になった皮フ分だけドレナージ創は大きくなる、即ち二次口側（瘻管側）に皮フが slide されたことになるので縫合皮フには緊張が加わらず無理のない術式といえよう。

瘻管が筋間を貫通し深部に及んでいる場合はなるべく括約筋は温存し鋭鉤またはガーゼなどを用いて瘻管内の慢性炎症～壊死組織を搔破したのち瘻管を洗滌して抗生物質を入れスポンゼル又はオキシセルガーゼなどをつめて死腔を閉鎖するようにしているが成績はよい。

Fig. 10 後壁の原発口を大きく open し瘻管は全摘して皮弁を側方に移動し縫合す

Fig. 11 術後6週間目ドレナージ創のみを残し生着

4. 術後管理の問題点

(1) 抗生物質の使用

陳旧化した痔瘻に対する抗生物質の全身投与は殆んど無意味であるが、術後は局部感染の危険は大きく、lay open 術式ではドレナージ創面からの細菌侵入があるため、所属リンパ腺炎を生ずることもあり、数日間は感受性のあるものを考えて十分量投与がのぞましい。また、抗生剤の局所散布も有効と考える。

(2) 術後出血に関する問題点

術中 oozing に対し、著者らは電気メスを用いて術後創面出血の防止につとめているが、手術後7～10日目に

起こる secondary bleeding は、創面を便が通るという点と排便時怒責による局所安静が得がたいという点に加え、lay open 術式ではドレナージ創が大きいう点からして十分注意が必要であり、動脈性出血がみられた場合は直ちに麻酔下に止血操作をする必要がある。頻度は1～2%程度。

(3) 創の汚染とガーゼ交換について

lay open 手術ではドレナージ創にガーゼをつめ込むか否か意見の別れるところであるが、著者らは手術終了時創に入れた抗生物質の粉がすぐ創外に出ない程度にガーゼ挿入をするのみで、翌日排便時とればそれ以後は原則として入れない。創は open として入浴・洗滌するようにつとめている。入浴は、手術翌々日からできるだけ毎日させた方がよい。創の洗浄には著者らが開発した超音波肛門洗浄器⁴⁾、ビデ式の便器などを利用している。一日2～3回程度。

(4) 創縁の治癒遷延の問題点

lay open したドレナージ創が深い場合、創縁が外翻して、疼痛をもたらす、治癒が著しく遷延することがある。手術時、創を皿型にせんがためには創がとかく大きくなりやすいが、創の大きさにこだわってはならない。創を小さくしようとして鋭角な創縁を作ればかえって治癒遷延することになる。術後2週間くらい経過してそのようなことがあれば形成的に創縁の一部を切除すべきである。まだ創縁の止血や深い部分の縫合には Dexon 糸のような異物化しない材料を用いる方がよいと考える。

(5) 肛門管の狭窄と変形の問題

手術終了時ゴム管にガーゼを巻きロール状にして肛門管に入れる術者がよくあるが、患者にとって苦痛があり、これでガスや粘液が抜けると思うのは勝手な想像であろう。狭窄防止には、手術操作で無理のない縫合をすることを第一義とし括約筋切開も最少限にすることが変形治癒の予防につながることは論をまたない。また手術終了時2本の指で肛門管を manipulation しておくことも忘れないようにしたい。毎日排便が営まれればそれが一番よいブジーになっており、疼痛の緩和と術後もあまり痛まない手術をすることが狭窄予防につながるものと思う。

5. まとめ

一部の肛門括約筋や皮フを犠牲にしても、痔瘻を根治させるためにあえて lay open 術式を選んだ方がよい場合がおおい。しかし肛門の変形やその機能を犠牲にしてよいということはない。そこで考えられるのは原発巣の処理をおこなった部をドレナージ創として利用し、種々の皮弁形成を加えた modified lay open 術式である。瘻

管の走行をよく確かめた上で、末端部は切除もしくは搔爬して *primary suture* し、ドレナージ創と完全に遮断することによって治癒日数の短縮と同時に肛門の変形を防ぐ根治性の高い術式について記述した。lay open 術式の成否の鍵は lay open したドレナージ創が外に浅く皿形に拡がり、ドレナージの目的がよく果たしているかどうかにかかっている。さらに手術後の管理面でも注意すべき点が多々あり、これらについても言及した。

文 献

- 1) Goligher, J. C. : Surgery of the anus, rectum and colon, p. 178-198, Ballière, Tindall and Cassel, London, 1980.
- 2) H. E. Lockhart-Mummery and Ian P. Todd : Operative surgery, P. 365-375, Butterworths, London-Boston, 1977.
- 3) 隅越幸男 : 新臨床外科全書, 8. II, P. 219-236, 金原出版, 1979.
- 4) 竹馬 浩 : 痔核. 大腸肛門誌, 29 : 391-394, 1976.

(昭和55年6月27日受領)

presserved mucosa and obtained very interesting results.

The fundamental method of operation was described with showing two simple cases.

6. Some Trials of Operation on Anal Fistula (Modified Lay Open Technics)

H. Chikuba

Anorectal Surg. of Chikuba Hospital, Kurashiki-city

After complete removal of foreign bodies in the anal fistula by curetting of the fistulous cannal, primary focus of the abscess is laid open for drainage wounds. Several technics were presented to slide the skin into the resected anal space, using subcutaneous pedicle graft, rotation pedicle graft, bipedicle grafts or various incisions.

We believe we could shorten the recovering periods in addition to preventing recurrence and other complications.

7. Supralevator Fistulae with Perforation to the Rectum

M. Takano and M. Sumie

Coloproctology Center, Kumamoto Municipal Hospital, Kumamoto, Japan

Y. Matsuda

Coloproctology Center, Hamamatsu Social Insurance Hospital, Hamamatsu, Japan

Supralevator fistulae with perforation to the rectum have deep and complicated fistulous tracts which penetrate all through the sphincter muscles often accompanied by rectal stenosis.

The complexity of the lesion makes the true diagnosis difficult causing the recurrences even after the trials of repeated operations.

The supralevator fistulae are made by the extension of abscess up along the retrorectal space and by the rupture of the retrorectal abscess into the rectum.

Most of the perforations are situated midposteriorly or somewhat posterolaterally. Sometimes, especially in women, the perforations are situated laterally or anterolaterally. The modes of penetration through the rectal wall have some varieties; 1) it directly perforates to the rectum 2) the fistulous tract runs between the intersphincteric space for some distance and then perforates to the rectum 3) it makes a pool between the intersphincteric space and then perforates to the rectum.

The treatments consist firstly of confirmation of the site of perforation to the rectum by opening widely the fistulous tracts. The puborectalis has to be reserved to insure the continence. The perforated site is fully curetted and drained. Temporary covering colostomy is usually required when the perforation is large. When fistula is tried to be cured