症例報告 VI

直腸腔瘻を形成した急性出血性直腸潰瘍の1例

志村胃腸科外科病院

井上達夫 太田代紀子 安康晴博
吉田基己 太田代安律 志村 巖

東京女子医科大学第2外科

亀岡 信 悟

症例は65歳、女性。1989年4月脳動脈瘤破裂に対して他医にてクリッピング手術施行後、5月下旬より水様性下痢が続き、大量下血を生じて、6月10日紹介入院となった。入院時、直腸に多発性の出血性潰瘍を認めたため、IVH および サラゾピリン投与による治療を開始した。約1週間の保存的療法で軽快退院し、その後前医にて V-P shunt 手術施行。8月上旬、肛門および腔より再出血し、当院再入院となった。コロノスコプ所見では、歯状線に一致して直腸腔瘻を認め、その周囲に地図状潰瘍を認めた。全身状態不良のため、S状結腸人工肛門を造設し局所の安静を図ったところ、止血し、潰瘍の縮小を認めた。本症例は、急性出血性直腸潰瘍と診断したが、直腸腔瘻を形成したものは、本邦に報告例がなく、稀な1例と思われたので、若干の文献的考察を加え報告する。

索引用語：急性出血性直腸潰瘍、直腸腔瘻

はじめに

急性出血性直腸潰瘍は、1980年河野¹⁾らの報告に始まり、脳血管障害や重症基礎疾患を有する高齢者に発生し、突然始まる無痛性の新鮮下血を主徴とする疾患である。近年その報告例は増えてきている。本疾患の直腸病変は、比較的浅い病変といわれ、潰瘍の治癒傾向が良いため、内科的保存療で良いといわれている。今回われわれは、2度にわたる脳外科手術の経過中に発症し、直腸腔瘻を形成し、手術を要した1例を経験したので報告する。

症 例

患者：65歳、女性。

主訴：下血。

既往歴：10年前より糖尿病、高血圧。

家族歴：特記すべきことなし

現病歴：1989年4月6日前交通脳動脈瘤破裂、脳室内穿破の診断で他医にてクリッピング手術施行。術後経過良好であったが、5月下旬より水様性下痢が続き、6月7日より突然の大量新鮮下血を生じたため6月10日に紹介入院となった。

初回入院時現症：体格小、栄養状態やや不良、意識レベル3-3-9度分類で2-1、血圧140/80、脈拍90整、貧血、腹部膨満を認めた。

初回入院時検査成績（表1）：TP 5.6g/dl, Ch-EO. 3 4PH, と低栄養状態、血清K2.7mEq/L, 血清Na 153mEq/L と電解質異常、Hb8.2g/dl, Ht 26 と貧血を示した以外にはとくに異常を認めなかった。

大腸内視鏡所見（図1）：S状結腸に偽膜性腸炎様の粘膜と、下部直腸、歯状線近傍前壁に多発性の出血性の直腸半周を占める長径5cmの地図状潰瘍を認めた。露出血管は認めなかった。

生検病理組織像（図2）：炎症性変化のみで、特異的疾患を示唆する所見は得られなかった。

入院後経過：入院時、少量の黒色便を認め、大腸内視鏡によるトロンビン散布を行い、入院後1週間で血便は止まった。中心静脈栄養を入院時から施行し、2,400mlの輸血、抗生剤、サラゾピリンを投与した。また、胃内視鏡を施行したところ、食道胃接合部直下小彎にA₂ステージの胃潰瘍も伴っていたため、H₂ blockerを投与した。その後、徐々に全身状態および意識状態は、改善した。（339度分類1-1）

約3週間の治療により直腸潰瘍は、縮小瘢痕化したため、前医に転院となった。

その後、良好な経過をたどっていたが、7月18日前医にて V-P shunt 手術施行後7月下旬になり、再び肛門より大量新鮮下血を生じ、今回は腔からも出血したため当院再入院となった。

入院時検査成績（表2）は、Hb 5.4g/dl, Ht 15%,

表 1 初回入院時検査成績

WBC	12,100/mm ³	TP	5.6 g/dl
RBC	2.55×10 ⁶ /mm ³	T-Bil	1.0 mg/dl
Hb	8.2 g/dl	GOT	45 KU
Ht	26 %	GPT	61 KU
Plt	26.4×10 ⁴ /mm ³	LDH	421 mU/ml
CRP	3 (+)	γ-GTP	67 mU/ml
ESR 1hr	70 mm	Che	0.3 ΔPH
		T-cho	150 mg/dl

図 1 内視鏡所見
直腸内前壁に地図状潰瘍を認める。

図 2 生検病理組織像
炎症所見を認めるのみであった。(HE×10)

表 2 再入院時検査成績

WBC	5,700/mm ³	TP	6.2 g/dl
RBC	1.49×10 ⁶ /mm ³	T-Bil	0.3 mg/dl
Hb	5.4 g/dl	GOT	24 KU
Ht	15 %	GPT	6 KUH
Plt	29.4×10 ⁴ /mm ³	LDH	256 mU/ml
CRP	3 (+)	γ-GTP	21 mU/ml
ESR 1hr	44 mm	Che	0.6 ΔPH
		T-cho	158 mg/dl

図 3 注腸造影
図の矢印の部位で直腸から腔へのバリウムの流失を認める。

図 4 内視鏡所見
前回と同様の部位に地図状潰瘍を認め、直腸内の腔との瘻孔を図の矢印に認める。

と高度の貧血を認める以外には異常を認めなかった。意識は混濁していた(339度分類2-2)。注腸造影検査を認め、(図4)大腸内視鏡では地図状の潰瘍を認め、歯状線に一致して径約1cmの瘻孔を認めたが、出血は認めなかった。1,200mlの輸血、絶食、中心静脈栄養、サラゾピリン、抗生剤投与等で保存的に経過観察していたが、腔瘻よりの便排出が常時見られる様になり、発熱を繰り返す、白血球増多を認めたため、入院後第16病日、全身麻酔下にS状結腸にdiverting colostomyを造設した。

術後経過：発熱は寛解し、直腸の炎症も鎮静化した。意識レベルも徐々に改善し術後42日目に自立歩行可能に

図 5 内視鏡所見
潰瘍は治癒し、腔との癒孔のみを認める。

なり、退院した。術後5カ日目の大腸内視鏡(図5)では、pseudopolypや、下掘れ潰瘍の治癒した陥凹性変化のみを認めた。直腸腔瘻は残存していたが、出血、発赤は認めず、炎症所見は鎮静化していた。現在脳神経学的障害は残らず、元気に外来通院中である。

考 察

急性出血性直腸潰瘍(acute hemorrhagic rectal ulcer 以下 AHRU)は、1980年河野¹⁾らの8症例の報告に始まり、1984年の広岡²⁾らの10例の検討によりひとつの疾患単位として認められるようになり、近年、疾患としての知名度の上昇とともに報告例は急増してきている。広岡らによると、その特徴は、

- 1) 重篤な基礎疾患、とくに脳血管障害を有する高齢者に多く発症。
- 2) 発症は突然で、無痛性の大量新鮮下血が始まり、適切な止血措置をしなければ再出血する。
- 3) 潰瘍は歯状線に接するかその近傍、下部直腸に局限して発生し、潰瘍の性状は不整型地図状ないし帯状で、多発ないし単発性の横軸に長い。
- 4) 経過は比較的良好で止血さえ成功すれば、再発も少ない。
- 5) 基礎疾患発症より下血までの期間は、10日前後といわれている。

鑑別疾患として腔への穿孔例が多く報告されているクローン病が重要と思われる^{3,4)}。

本症例の場合、脳梗塞手術2カ月後突然直腸より大量出血した症例であること、本年1月の大腸、小腸造影において、クローン病に特徴的所見は見られていないこと、発症の直前の大量下痢中に血液の混入は認められず、下血の既往もないこと、さらに、その経過を考え合わせると、AHRUの範疇に入ると考えられる。

急性出血性直腸潰瘍の原因論としては、1984年安尾⁵⁾の、ストレス潰瘍脱、すなわち血中ノルアドレナリン上昇とドパミン低下との関連があるというCushing潰瘍⁶⁾の報告と同様の機序により直腸潰瘍が発生するという説や、長廻⁷⁾らの、硬い糞便による局所の循環障害が直腸潰瘍の原因とする宿便潰瘍説、虚血性直腸炎説等がある。

本症例の場合、胃に急性出血性潰瘍を伴っており、胃に虚血性変化を示すストレスが発生したと考えられ、ストレス潰瘍説が、一番可能性が高いと思われる。また、便秘はなく、発症前に水様性下痢を示していることから宿便説は否定的である。

その病理学的特徴として病理上 u1-1から u1-2 の浅いものが多いといわれている。事実、われわれが調べた範囲では、報告例のほとんどが、浅い潰瘍で、出血がおさまると直腸粘膜面は、比較的平坦平滑なことが多い。本症例の場合、初回入院時の直腸出血時における潰瘍病変は、内視鏡的には、u1-2程度の浅いものだったが、2回目の入院時には、潰瘍が、腔に穿破していた。このことは、今まで急性出血性直腸潰瘍潰瘍は浅く、癒孔形成はしないとされていたが、数度にわたる手術というストレスが加わると、腔に穿孔するような深い潰瘍形成をすることもあり得ることを示している。

治療に関しては、絶食、輸血、止血剤投与、サラゾピリンの内服によって改善した例も多く見受けられ、止血さえ得られると予後良好といわれる。広岡²⁾らによれば、止血に成行すれば治癒傾向は良好であり、20日以内に癒痕化するとの報告もあるが、再出血も多い。松沢⁸⁾、西田⁹⁾らは、重篤な合併症を考えると、無水エタノール局注が非侵襲的でかつ効果的であり、再出血もないことから、第一選択であると報告している。

本症例の場合、一度は出血が止まり、改善したようにみえたが、内視鏡により、出血部位を確認できず、確実な止血措置がとれなかった。その為、再手術(V-P shunt手術)というストレスにより、同部位が再び潰瘍を形成し、再出血、さらに潰瘍が深くなり、穿通したと思われる。

この疾患の治療は、全身状態、基礎疾患も加味し選択されなければならないが、度重なるストレスが予想される際には、本症例のように潰瘍が深くなり、癒孔を形成することもあるので、このような場合には、外科的処置も考慮されるべきである。

文 献

- 1) 河野祐利, 勝見正治, 浦 伸三ほか: 脳疾患患者にみられた急性出血性直腸潰瘍の2症例. 日本大腸肛門病会誌 33: 222-227, 1981

- 2) 広岡大司, 湯浅 肇, 板倉恵子ほか: 急性出血性直腸潰瘍—臨床像を中心に—. *Gastroenterol Endosc* 26: 1344-1350, 1984
- 3) 斉藤公男, 横山正之, 更科広実ほか: 直腸腫瘍を合併した crohn 病の 1 治験例 *日臨外医学会誌* 49: 822-881, 1988
- 4) Faulconer HT, Mudoon JP: Retrovaginal fistura in patients with colit. *Dis Colon Rectum* 18: 413-415, 1975
- 5) Cushing H: Peptic ulcer and intern brain. *Surg Gynecol Obstet* 55: 1-34, 1932
- 6) 安尾 信: 脳外科に合併する直腸潰瘍の発生機序に関する研究. *聖マリアンナ医大誌* 12: 168, 1984
- 7) 長廻 紘: 大腸疾患の鑑別診断—物理的刺激による—. *医学書院*, 1983, pp 100-101
- 8) 松沢賢治, 山口孝太郎, 上條 登ほか: 急性出血性直腸潰瘍の 3 例. *Endoscopy* 4: 152-157, 1988
- 9) 西田 博, 佐藤達之, 岡野 均ほか: 急性出血性直腸潰瘍の 4 例. *Gastroenterol Endosc* 28: 1629-1633, 1986

A Case Report of Acute Hemorrhagic Rectal Ulcer with Recto-vaginal Fistula

T. Inoue, N. Ootashiro, H. Ankou,
M. Yoshida, A. Ootashiro and I. Shimura
Department of Surgery, Shimura Hospital, Ibaraki
S. Kameoka

Second Department of Surgery, Tokyo Womens Medical College, Tokyo

A Case of Acute Hemorrhagic Rectal Ulcer with Recto-vaginal Fistula.

In this case, the patient was 65 y. o. that had a history of neurosurgical operation twice in another hospital, then appeared to be bleeding from anus and vagina after the operation, and transferred to our hospital.

In colonoscopical findings, the rectovaginal fistula was recognized just at the dental line surround in map-shaped ulcer in the rectum. Then we constructed sigmoid colostomy and the clinical course was getting better day by day.

In this case, we diagnosed the acute hemorrhagic rectal ulcer, though there is no case report of the rectal ulcer forming recto-vaginal fistula in our country and because this is an extraordinary case.

We will report it with some consideration to utilizing the references.

(平成 4 年 1 月 28 日受付)