教育講演 I

大腸癌手術と外科解剖

東京医科歯科大学医学部第2解剖

佐藤達夫

癌手術では、郭清の点でリンパ系、機能温存という点で自律神経、そして位置関係として両系と血管を包含した臓筋筋膜、これら3系についての局所解剖学が重要である。この講演では、実習解剖体の剖出所見の示説を通じていくつかの問題点について言及する。

リンパ系にしる自律神経系にしる、腹部ではそれらを誘導する軸芯となるものは主として血管である。大腸では、おおまかに上腸間膜動脈SMA、下腸間膜動脈IMA、内腸骨動脈IIAの3流域に分けて考えるのが便利である。SMAと腹腔動脈CTの各起始部は近接しており、しかも腎動脈RAのすぐ上方に位置を占めている。CT、SMA、RA各起始部の周囲には、自律神経系（腹腔神経叢・節）とリンパ系が集中し、互いに錯綜している。右半結腸のリンパ系は各結腸動脈に沿って逡巡し、上腸間膜静脈SMV（SMAの右側を伴行）をまたいでSMA周囲に達し、結局、左腎静脈の高さで傍大動脈リンパ節に至る。

左半結腸と直腸から出てIMAに沿うリンパ系が大動脈に達する際、IMAの起始部の上下左右にやや散開する傾向がみられる。一般に、下行結腸からのリンパ系は左および上方へ、直腸からの上行リンパ系は右および右方へ集まる。いずれにせよ、結局、左腎静脈のすぐ下方の大動脈外側および大動脈間リンパ節へと接続するが、直腸からの上方向リンパ系が、大動脈間リンパ節へ連なる傾向が強いことと、IMAの下方を通る際の神経との交錯関係が重要となる。射精に関係する上下腹神経叢は、左右の腰内臓神経がIMAの下方でV字状に合して形成されており、先述のリンパ系と交叉する可能性が高いのである。

直腸の側方向リンパ系の主流はIIAの前方を横切り、閉鎖神経の近くで内外両腸骨動脈の又にあるリンパ節群に達する。途中で交叉する骨盤神経叢の構成と分布、とくに陰茎海綿体神経、子宮枝、膀胱枝との関連、中直腸動脈の出現性等が重要となる。

筋膜については、脈管・神経の誘導索としてとらえ、腹部と骨盤腔とを連続した総合的模型図とその部位的改変について考えることにする。

教育講演 II

大腸癌化学療法の実況

愛知県がんセンター

小川一誠

進行大腸癌に対して15-20%の有効率が得られる薬剤は5-Fluorouracil(5FU)とMitomycin C(MMC)のみであり、よって比較的最近まで、癌化学療法に最も抵抗性の癌と考えられてきた。しかし、近年のBiochemical Modulation(BCM)研究の進歩及び有効な新抗癌剤の開発は、将来への見通しを明るくしている。

1 進行癌に対する化学療法

5FUの200-300mg/m²のContinuous Intravenous Infusion(CVI)は30%以上の有効率を示し、これは5FU静注と比較して高い有効率¹⁾である。5FUのBCMの1つである5FUとLeukovorin(LV)の併用²⁾は多くの5FUとの比較研究でより高い有効率と少数ながら生存期間の有意な延長に結び付いた。5FUとInterferon- α (IFN- α)を併用するBCMは第2相研究³⁾で5FUより高い有効率を示し、5FUとLVとの比較研究でも同等の有効性を示した。現時点では進行大腸癌に対して第一選択はこの3つの方法であり、その中では5FUとLV併用が最も多く用いられている。

新抗癌剤ではCPT-11が第2相研究⁴⁾で36%と5FUより優れる有効率を示し、併用療法での役割が期待されている。

2 術後補助化学療法

5FU単独を用いての過去の術後補助化学療法の成績は、いずれも無治療群に有意に優れることなく終わった。しかし結腸癌に対する5FUとLevamisoleの併用⁴⁾はDukes Cで、無治療群と比較し、7年のDisease Free Survival(DFS)、生存率ともに有意に優れた。よってDukes Cに対する標準的治療となったが、近年の研究では5FU+LVも同様に無治療群より優れたDFS、生存率を示す結果が報告されている。直腸癌に対しては、Methyl CCNU, Oncovin, 5FUを併用するMOFが無治療群及び骨髄への放射線治療群より3年の生存率⁵⁾で有意に優れた。よって現時点ではMOFが第一選択と考えられるが、再確認のための研究が進行中である。本講演では進行癌に対する化学療法及び補助化学療法の成績を総説し、将来への展望を行いたい。

1) Lokich, J.J., et al: J Clin Oncol 7: 425-432, 1989.

2) The Advanced Colorectal Cancer Meta-Analysis Project: J Clin Oncol 10: 896-903, 1992.

3) Wadler, S., et al: J Clin Oncol 9: 1806-1810, 1991.

4) 小川一誠: 癌と化学療法 21(7): 1115-1810, 1991.

5) Fisher, B., et al: JNCI 80: 21-29, 1988.

教育講演 I

会長講演

Surgical anatomy for colorectal cancer

operations.

T. Sato, Second Dept. of Anatomy, Tokyo Medical and Dental University School of Medicine

To achieve both lymph node dissection and function preservation during cancer resection procedures, it is crucial to understand the precise location of critical involved lymphatics as well as their relationships to significant autonomic nerves. Likewise, precise knowledge of the stratification of the visceral fasciae is necessary to facilitate removal of the cancerous structures. In order to comprehend the complete interrelationships of lymphatics, autonomic nerves and visceral fasciae of all three colorectal regions (right hemi-colon, left hemi-colon, rectum), as well as the common convergence to the paraaortic lymphatics, actual dissection photographs are presented.

教育講演 II

Current Status of Chemotherapy on Colorectal Cancer

Makoto Ogawa, Aichi Cancer Center

This presentation reviews current status of chemotherapy for advanced disease and adjuvant chemotherapy.

Advanced Disease : protracted continuous intravenous infusion of low doses (200-300mg/m²/d) of 5-fluorouracil (5FU) has obtained response rates >30% and biochemical modulation using a combination consisting of 5FU plus leukovorin (LV) has shown response rates >40%, in addition, a combination consisting of 5FU plus interferon- α has also obtained response rates >30%.

However most studies employed these regimens have failed to shown significant prolongation of survival time compared to 5FU alone.

Adjuvant Chemotherapy : A combination consisting of 5FU and levamisole has recognized to be a standard adjuvant regimen for Dukes C. Recently prospective randomized trials comparing 5FU plus LV versus control reported significant improvement of disease free survival and overall survival in 5FU plus LV arm.

A combination regimen consisting of Methgl CCNU, oncovin and 5FU(MOF) has escalated 3 year survival rate of rectal cancer compared to control or irradiation. Thus this treatment has considered to be the first chance at present time but confirmatory studies are in progress.

DNA flow cytometry of colorectal carcinoma

H. Suzuki

The Second Department of Surgery Mie University School of Medicine

Nuclear DNA contents of cells can be determined with ease and accuracy by DNA flow cytometry. This method was expected as a measure to differentiate malignant tumors from benign ones, to determine prognosis of patients with malignant tumors, and to give guidelines for treatment of malignant tumors.

We have tried the DNA flow cytometry on colorectal carcinomas and found that (1) DNA aneuploidy was associated with advanced stage of the disease, (2) the incidence of recurrence after apparently curative resection was significantly higher in aneuploid tumors, but (3) there was no correlation between DNA ploidy of tumor cells and survival of the patients.

Clinical significance of DNA cytometry in colorectal carcinoma will be further discussed.