陸 稻 の 品 質 に 関 す る 研 究

第 2 報 糯 玄 米 の 透 明 度 と 発 芽 と の 関 係^{***}

河原栄治・茂木虎雄 (農林省大館農事改良実験所)

緒 言 筆者等¹⁾は曩に糯系統内に透明度の異なる粒が混在する事を報告した。そして発芽の様相は透明度に依つて異なるものと考え、発芽床の温度を変えて発芽の比較を行つた。結果は予想通りであつたので概要を報告する。

材料及び方法 農林省大館農事改良実験所で育成した東北糯 7, 9, 26, 29 及び 5 号の 5 系統を、1949 年同所で慣行栽培し、収めた玄米を 1950 年 4 月系統別に不透明粒と半透明粒とに分け、各々 200 粒宛採り、水洗河砂を入れたペトリ皿に各皿 100 粒宛播種し、同様の砂を約 1 分の厚さにつけ、井戸水を砂面すれすれ迄加えた。ペトリ皿を 15°C 及び 30°C の定温器中に保ち、2 回試験を行つた。安田氏²⁾の方法に従い、発芽歩合は発芽始後 10 日目、発芽勢は同じく 4 日目に打切つて求めた。

結果並に考察 1. 玄米の透明度と発芽歩合：表示したように 15°C 発芽床の発芽歩合は、東北糯 29 号を除き不透明粒では半透明粒よりも高く、30°C の発芽歩合は反対になつてゐるが、東北糯 26 号では不透明粒の方が半透明粒よりも高い。そして 30°C での発芽歩合は 15°C の場合より遙かに高かつた。又半透明粒の混在歩合（以下単に混在歩合と記す）の少い系統程、15°C では東北糯 7 号を除き、不透明粒の発芽歩合が高いが、半透明粒に於ては混在歩合と関係なく、又 30°C では何れの粒に就いても、発芽歩合と混在歩合との間に関係がなかつた。

筆者等¹⁾は不透明粒は半透明粒よりも内容が充実していると考えて居り、それが為 15°C 発芽床の不透明粒の発芽歩合が概して半透明粒よりも高くなつたものと思う。然し 30°C の場合の半透明粒の発芽歩合の高い原因は不明である。原島氏³⁾に依ると 15°C では陸稻の発芽発根は、水稻より早く、30°C では差異が見られなかつたと云い、中村氏³⁾も水稻発芽の品種間差異は低温で認められると云つて居り、輪田氏⁴⁾は水稻の発芽発根は 30°C では良好であるが、品種間差異が明瞭でないと云つてゐる。筆者等の見た一般に混在歩合の少い系統程不透明粒の発芽歩合の高い事の原因は、恐らく混在歩合の少い系統の不透明粒の充実度が高い事に依るものであらうと考える。

2. 玄米の透明度と発芽勢：表にあげたように不透明粒と半透明粒との発芽勢の関係は、発芽歩合の場合と似た傾向を示したが、15°C に於ける東北糯 9 号並に 30°C の場合の東北糯 26 号の発芽勢とは此等と異つた関係にあつた。次に 15°C では不透明粒の発芽勢と混在歩合との間には、東北糯 7 号を除き逆の関係があり、半透明粒では斯様な関係は見られなかつた。然し 30°C では東北糯 5 号を除き不透明粒では正の関係が見られるが半透明粒では全然関係が見られない。なお 30°C 発芽床の発芽歩合は、15°C の場合より大きな値を示した。又発芽勢と混在歩合との関係は、半透明粒では発芽床の温度を変えても影響はなかつたが、不透明粒では 15°C の時は逆の、30°C の時は正の関係が見られた。然しその理由は判らなかつた。

3. 玄米の透明度と平均発芽所要日数：15°C では 3 系統の不透明粒の平均発芽所要日数は、半透明粒のそれより少く、2 系統では反対に多いが、30°C では 3 系統の不透明粒の平均発芽所要日数は、半透明粒のそれよりも多く、1 系統の不透明粒の平均発芽所要日数は、半透明粒のそれより少く、他の 1 系統では透明度と関係がない。そして東北糯 9, 26 及び 29 号の平均発芽所要日数は、何れの粒も発芽床温を変えても変化しなかつた。更に又東北糯 26 号では半透明粒の平均発芽所要日数は、床温を変えても常に不透明粒より大きい値を示している。最後に混在歩合と平均発芽所要日数の間には、全然関係がないようであつた。

引 用 文 献 1. 河原栄治・茂木虎雄：陸稻の品質に関する研究、第 1 報、糯玄米の透明度並に透明度と其の他玄米の諸形質との関係、日作紀、20 巻・1~2号 1951. 2. 安田貞雄 種子生産学：350~353, 1948 東京。3. 大後美保 植物生理気象学：107~108, 1943, 東京。4. 輪田潔 日作紀、第 2・3・4 号：38~39, 1949.

* 昭和 25 年 11 月 4 日 第 89 回講演会に於て発表 同日受理
日本作物学会紀事 第 20 巻 第 3~4 号

** 農林省大館農事改良実験所業績 第 11 号

第1表 陸稲糯玄米の発芽歩合・発芽勢及び平均発芽所要日数

系 統 名	発芽床温	項 目	不透明粒	半透明粒	混在歩合	系 統 名	発芽床温	項 目	不透明粒	半透明粒	混在歩合
東北糯 7 号	15℃	発芽歩合	38.00	19.50	38.12	東北糯 26 号	30℃	発芽歩合	61.00	58.00	23.82
		発芽勢	15.00	6.50				発芽勢	48.50	42.50	
		平均発芽所要日数	5.2	5.4				平均発芽所要日数	3.6	3.9	
	30℃	発芽歩合	75.50	77.00	22.90	東北糯 29 号	15℃	発芽歩合	45.00	45.50	
		発芽勢	69.00	71.50				発芽勢	22.50	21.00	
		平均発芽所要日数	2.7	2.5				平均発芽所要日数	4.9	4.8	
東北糯 9 号	15℃	発芽歩合	12.50	7.50	29.47	東北糯 29 号	30℃	発芽歩合	66.50	78.00	
		発芽勢	2.00	3.00				発芽勢	37.50	61.00	
		平均発芽所要日数	7.1	5.9				平均発芽所要日数	3.9	2.6	
	30℃	発芽歩合	71.50	90.50	20.71	東北糯 5 号	15℃	発芽歩合	65.50	44.50	
		発芽勢	62.00	89.50				発芽勢	49.50	18.00	
		平均発芽所要日数	2.7	1.4				平均発芽所要日数	3.2	5.2	
東北糯 26 号	15℃	発芽歩合	21.50	21.00	23.82	東北糯 5 号	30℃	発芽歩合	79.50	93.00	
		発芽勢	12.00	8.00				発芽勢	65.00	79.00	
		平均発芽所要日数	4.6	5.7				平均発芽所要日数	3.5	3.5	

備考 混在歩合とは1穂当り半透明粒の全粒に対する歩合である。

STUDIES ON THE QUALITY OF UPLAND RICE.

II. On the Germination of Glutinous Hulled Upland Rice Grains of Different Transparency.

E. KAWAHARA and T. MOTOGI (The Odate Agricultural Improvement

Experiment Station, Department of Agriculture and Forestry)

Résumé 1. Five glutinous upland rice line bred at the Odate Agricultural Improvement Experiment Station of Ministry of Agriculture and Forestry were cultivated customarily and rice grains were raised at that station in 1949. Semi-transparent hulled rice grains were sorted from opaque hulled rice grains for each line and then they were sown twice separately in petri dishes containing the washed river fine sand in April 1950 and these petri dishes were layed in a thermostat.

2. Germinating capacity of opaque grains at 15°C was greater than that of semi-transparent grains except one line. But at 30°C such relation was opposite. Germinating capacity at 30°C was far greater than its capacity at 15°C. Moreover, the germinating capacity of opaque grains at 15°C increased with decreasing of the semi-transparent rice grains among total grains for each line except one line. But in other cases, any relation could not be seen between germinating capacity and the mixing percentage of semi-transparent grains in total grains.

3. Germinating speed of opaque rice grains was greater than its speed of semi-transparent grains at 15°C and its speed of semi-transparent grains was greater than that of opaque grains at 30°C. In the next place, reverse relation existed between germinating speed of opaque grains at 15°C and the mixing percentage of semi-transparent grains in total grains except one line and at 30°C positive relation existed between its speed and the mixing percentage except one line. But any relation could not be found between germinating speed of semi-transparent grains and its mixing percentage. Germinating speed at 30°C was greater than its speed at 15°C.

4. 'Keimgeschwindigkeit' of opaque grains of 3 lines at 15°C was smaller than that of semi-transparent grains, but it was greater than that of semi-transparent grains for 2 lines. At 30°C its 'Keimgeschwindigkeit' of 3 lines was greater than that of semi-transparent grains and for one line it was smaller than that of semi-transparent grains and also for one line any relation could not be seen between 'Keimgeschwindigkeit' and transparency. 'Keimgeschwindigkeit' of some lines varied with temperature and for other lines it did not vary. Any relation could not be seen between 'Keimgeschwindigkeit' and mixing percentage of semi-transparent grains in total grains.