水稻生育におよぼす地温の研究

第2報 出穂におよぼす地温、水温の影響*

竹 島 溥 二

(山形大学農学部)

水稻の出穂におよぼす温度の影響は極めて大きく、従来主として積算気温、水温などの面から考えられてきたが、近年松島ら⁴⁾、竹内ら¹⁾は地温の影響も気温と同様に極めて大であることを指摘し、しかも気温と密接な関連性が認められると報告している。筆者もこれらと同じ見解をもつものであるが、しかし出穂ともつとも密接な関係をもつものは生長点の周囲の温度ではないかと考える。生長点は水稻の生育とともにその位置を変えていく性質のものであるから、ある時期には地温、ある時期には水温、またある時期には気温の影響というふうに、生育時期によつて各種の影響をうけるものである。したがつてこの種の研究を行なうに当つては、それぞれを分けて考え、さらに生育段階毎にそれぞれの温度の影響をみていく必要があると考える。しかし、地温、水温を分けて実験を行なうことは技術上極めて困難なことから、本実験では便宜上それらを一緒にして実験を行なつた。

実験材料および方法

実験方法としては30°、25°、20°、15°Cの4段階の大型恒温水槽4基を用い、水稻農林41号を供試し、生育時期別にポットを水槽に投入して温度処理を行なつた。なお、この際の水深はポット地表面からポットの上端まで約3cm、ポット上端より水槽の水面まで約1cmとした。

第1実験 6葉期の苗を5月15日から前記恒温槽において出穂期まで処理した区と、30°Cに10日間処理後15°Cに移した区〔以下(30°→15°C)区の形式にて表わす〕とを作り、地温、水温と出穂との関係を検べた。なお、15°、20°C区はこのままの温度では出穂不可能の理由から7月15日以降は23°Cにして処理した。

第2実験 稲苗が地下部ならびに生長点附近の温度処理によつて栄養生長から生殖生長への転換、すなわち開花誘導されるものとすれば開花誘導に対する生育時期別感受性の差異、温度反応の差異などがみられるのではないかとおもわれる。以上の如き点に注目して3、4、5、6葉期の苗をそれぞれ10日間の地温、水温処理を行なつた。

第3実験 既報²⁾の実験結果から生長調整物質と地温、水温との間には極めて密接な関連性が認められている事実から、本実験においてはそれらの関係をさらに詳しく検べる目的で6、7、8、10、11、12葉期にそれぞれ10日間の地温、水温処理を施した材料につい

て葉鞘の部分のアベナテストを行ない、地温、水温が生長調整物質におよぼす影響について検べた。なお、それらの方法その他については既報²⁾に準じた。

結果ならびに考察

1) **出穂におよぼす地温、水温の影響** 地温、水温が出穂におよぼす影響の極めて大であることは第1図において明らかである。すなわち30°C区は無処理に比べ出穂期が著しく促進され、これに反して15°C区は著しく遅延した。なお、30→15°C区が15°C区に比べ著しく出穂期の促進のみられたことは注目すべき現象と考える。この点に関してはさらに実験を重ねなければ明言できないが、現在のところ筆者はつぎのように考えている。すなわち、30°Cの10日間の温度処理により開花誘導されたのではないかと、そして一旦開花誘導された苗はその後15°Cの如き幼穂發育には不適当な温度の下でも生殖生長への進行を続け、幼穂發育過程のある段階までは進み得るがそれ以後はこの温度の下ではその進行が著しく阻害され一時發育を停止する。しかし温度を23°Cに上昇させることによつてふたたび發育を開始し出穂開花に至つたものとする。八柳ら³⁾も幼穂發育の限界温度は18°C前後であり、幼穂分化期以降を順調に経過せしめるための効率的温度

第1図 6葉期処理の出穂におよぼす影響

* 昭和37年1月23日受理

は少なくとも 20°C 以上であろうといっている。

2) 開花誘導期と処理温度との関係 結果は第2, 3図に示されている通りで, 25° , 30°C という温度がどの時期の処理でも出穂が促進される程度が大きいため, 開花誘導に関係の深い温度であろうといことは明白である。また生育時期的には6葉期が感受性の高い時期であるように推測される。当地方では移植苗として概して5~6葉期の苗を使用すること, 畑苗代による早期栽培稲の出穂期が早植のわりに出穂期の促進がみられないために無効分げつを多発せしめている事実に鑑み, この時期の地温, 水温の昇温は活着を促進し, その結果生育を促進せしめることになる。同時に出穂期の促進, ひいては無効分げつの抑制ともなり, 稲作の安全増収性がますます増大されることになる。したがってこの時期に地温, 水温の上昇をはかることは極めて重要な栽培的意義をもつことになるものと考えられる。

第2図 出穂におよぼす生育時期別処理の影響

つぎに出穂期の促進という問題についてその原因を考える場合つぎの二つの面を考える必要がある。すなわち, (1)主稈葉数の減少による出穂期の促進と, (2)出葉速度の促進による面とである。それらと地温, 水温との関係についてみたのが第3, 4図である。1~2の例外も認められるが, 概して 25°C 区において主稈葉数の減少が著しい場合がみられることからして, この温度段階に開花を誘起する適温が存在するものと推測される。つぎに出葉速度は(第4図) 30°C までは高温ほど促進されることから, 25° , 30°C 区の高温区の出穂促進は主稈葉数の減少と出葉速度の促進の相互作用によるものと考えられる。松島ら⁴⁾は 27°C の地温処理がもつとも出穂を促進したと報告し, また本田ら⁵⁾も昼間 $26^{\circ}\sim 32^{\circ}\text{C}$, 夜間 $19^{\circ}\sim 25^{\circ}\text{C}$ の如き高温の下で, 水稻を発芽, 生育させると分げつ芽における葉の伸長生長が著しく抑圧され, 主稈葉数の分化が先行し, 主稈独走型となるといっている。本研究の結果からも, 27°C 前後の温度が開花誘導, 生育促進両面

第3図 主稈葉数におよぼす生育時期別処理の影響

第4図 出葉日数におよぼす地下部温度処理の影響

からみて, もつとも出穂促進の適温の様に思われる。

3) 生長調整物質におよぼす地温, 水温の影響 結果は第5図において明らかなように, いずれの時期においても 25° , 30°C の高温区ほど生長物質が多量に検出されたが, 25° と 30°C の間では著しい差が認められなかった。

生育時期別にみると, 7葉期ではいずれの処理区においても生長物質がほとんど認められない。8葉期ごろからふたたび認められるようになるが, 10, 11, 12葉期と生育の進むにしたがつて, 25° , 30°C 区では生

長物質の出現が多くなる。これに対して 20° , 15°C 区においてはそれらの出現が減少し、殊に12葉期においては著しかった。この時期は本品種においては減数分裂期に当り、このことについては第1報²⁾でも報告したように、この時期の低温障害の原因に関しては明確にされていないようであるが、筆者はオーキシン活性の低下が呼吸作用の抑制として作用し、ついでこれが物質代謝に悪影響をおよぼし、幼穂形成に支障をきたしたものと推論する。

つぎに7葉期にオーキシン活性の著しい低下が認められた。この低下と幼穂分化との間になんらかの関連

性があるものと予想されるが、本研究の範囲ではなんともいえない。

以上の諸事実から、高温下で出穂期が促進されるのは、高温が生長点において栄養生長より生殖生長への転換の原動力として作用し、同時に出葉速度の促進がそれに伴うことに因るものと思考される。これに対し低温により出穂期の遅延するのは、低温が開花誘導しにくいことと、また誘導された場合においては幼穂發育過程のある段階、たとえば穎花始原体分化期、花粉母細胞減数分裂期などにおいてその進行を著しく阻害することに因るものと考えられる。

第5図 生長調整物質におよぼす地下部温度処理の影響 左より 30° , 25° , 20° , 15°C 区, 中部の横線は対照区の伸長量, IAAは合成 IAA の Rf 値ならびに 2γ の伸長量を示す。

摘 要

本研究は6葉期苗を5月15日から出穂期まで30°, 25°, 20°, 15°Cの恒温水槽で温度処理した。なお30°に10日間処理後15°で処理した変温区〔以下(30°→15°)区の形式にて表わす〕を作り、地温、水温と出穂との関係を検べた。さらに生育時期別に10日間の上記の温度処理を行ない、それらが出穂におよぼす影響ならびに生長調整物質におよぼす影響を検べた。

結果を要約すればつぎの如くである。

1) 6葉期苗の出穂におよぼす30°, 25°, 20°, 15°Cの恒温、ならびに30°→15°Cの変温の地温、水温の影響は極めて大きく、30°C区は無処理区に比べ出穂期が著しく促進され、これに反して15°C区は著しく遅延した。

2) 30°→15°C区が15°C区に比べ著しく出穂期が促進された。

3) 25°および30°Cの10日間地温、水温処理によって開花誘導されるが、その適温は25°~30°Cで、生育

時期別には6葉期頃がもつとも感受性高いようにおもわれた。

4) 葉鞘の生長物質におよぼす地温、水温の影響は大きく、いずれの時期においても25°, 30°Cの高温区ほど生長物質の出現が多い傾向にあつたが、25°と30°Cの間では著しい差が認められなかつた。

5) 生育時期別にみると、7葉期にいずれの処理区においても著しいオーキシン活性の低下が認められた。その後ふたたび活性化し11, 12葉期と進むにしたがつて、25°, 30°C区ではその活性はますます著しくなる傾向にあるに反し、20°, 15°C区ではますます低下する傾向にあつた。

引用文献

- 1) 竹内ほか：日作紀，29(4)(1960)(講演要旨)
- 2) 竹島：ク，29(1)(1960)
- 3) 本田ほか：東北大学農研彙報，12 2(1961)
- 4) 松島ほか：農及園，34(5)(1959)
- 5) 八柳ほか：日作紀，28(2)(1959)

Studies on the Effects of Soil Temperatures on Rice Plant Growth

2. Effects of soil and water temperatures upon heading of rice plants

Hiroji TAKESHIMA

(Faculty of Agriculture, Yamagata University)

Summary

This paper deals with the effects of soil and water temperatures upon the heading time and growth regulating substances in leaf sheath of rice plants. A variety named Norin No. 41 was used. The outline of each experiment and results obtained are as follows.

1) From the 6th leaf stage to the heading time, plants were placed in soil thermostats which were kept constantly at 30°, 25°, 20° and 15°C respectively. In addition to these, a plot was subjected to 30°C for the first ten days and then transferred to 15°C.

Plants headed earlier as the soil temperature was held higher. A plot transferred to 15°C after ten days treatment with 30° showed a rather striking promotion of heading as compared to 15° constant.

2) Plants were treated with different soil and water temperatures for 10 days at the 3rd, 4th, 5th and 6th leaf stages. The heading promotion was most conspicuous in the plot treated with 30°C, at the 6th leaf stage. The rate of leaf emergency was promoted strikingly by the higher temperatures, so that it resulted in the decreased leaf numbers on the main stem.

3) The growth regulating substances occurring in the top of plants treated were assayed by the Avena-test at periods from 6th to 12th leaf stage.

The substances occurred much more in quantity as the test temperature rose. This fact might be somewhat related to the heading promotion in the high temperature plots. Moreover the substances were diminished most remarkably at the 7th leaf stage.