米の粒質に関する研究

第2報 炊飯特性の品種間差異について*

長戸一雄・岸 洋一

(名古屋大学農学部)

米の炊飯特性とくに炊飯による米の膨潤・炊飯液への溶出物の量について Batcher^{1,2)}, Desikatcher^{5,6,7)}, 福場⁹⁾, Halick^{10,11)}, Hogan¹²⁾, Rao²⁰⁾, 谷²⁴⁾, 竹生^{3,4)}, Williams²⁵⁾ ら多くの研究者により、その品種間差異や新米と古米との差異、あるいはそれらと米のアミロース含量・アミロースの鎖長・澱粉の糊化温度などとの関係が報告されているが、なお不明な点が多い。本研究は粒質¹⁸⁾の異なる 58 品種について炊飯による米の吸水膨潤と炊飯液への溶出物量の品種間差異を研究し、それらと登熟期の気温との関係などを検討して、炊飯特性解明の手がかりを得ようとして行われた。

実験材料および方法

材料のうち水稻品種は本学で栽培したものを主とし、他に北陸・愛知・秋田各農業試験場および青森農業試験場藤坂支場より得たものを加え、陸稲品種は東海近畿農業試験場栽培第2部より得たものを用いた。

これらの材料(含水率 14—14.5%)を精米率 90%程度に精白して糠をよく除き、白米約 2 g を正確に秤量して高さ 32mm 直径 35mm の円筒形金網(20 メッシュ)に入れ、補温と糠除去のため恒温器中で所定の温度(60—96°C)に保った温湯で洗った後、所定の温度に保った蒸溜水 30CC 入りの秤量瓶に浸漬し正確に 30 分間保温した。なお浸漬時間 20 分または 40 分でも結果は同じ傾向を示した。

膨潤率の測定: 所定温度に 30 分間浸漬後静かに金網を引きあげ網の表面に附いた水滴を汚紙でふきとり、8 分間放置して冷却後秤量し、膨潤率を(飯の重量)/(米の重量)(Batcher¹⁾の Water-uptake ratio)で表わした。なお、この重量で示した膨潤率は置換法によつて求めた体積の膨潤率=(飯の体積)/(米の体積)と fig. 1 に示した範囲では正比例した。

溶出物量の測定: 上のように金網を除いた秤量瓶内の残存液を 100—105°C で 1 晩乾燥して秤量し、溶出物%=(溶出物乾燥重)×100/(米の乾燥重)として

表わした。また実際に炊飯した場合の溶出物の測定は金網に入れた白米 8 g と蒸溜水 15CC を秤量瓶に入れ、これを東芝電気釜内に固定して 14 分 30 秒間炊飯し(沸騰開始時)直ちに取り出して金網とともに飯粒を除き、残存液の溶出物%を前記同様に測定した。炊飯時間がこれより短いほど溶出物量が少なく、沸騰後はとくに日本型では米の吸水膨張が著しく残存液の量が少なくなるばかりでなく飯粒に附着する量が多くなって測定も困難になるため、炊飯時間を 14 分 30 秒と定めた。おそらくこの溶出物量は炊飯時の溶出物量の最大値に比例するものと推察される。

なお、膨潤率・溶出物%とも通常 3 回測定の平均値を用いた。

実験結果

1) 炊飯による米粒の膨潤について

60° から 96° まで、それぞれの温度に 30 分間浸漬した場合の各品種の膨潤率を求め、そのうちの代表品種について fig. 2 に示した。祝もちは 65° で既に膨潤が始まり、準硬質種 Nato は 75° で膨潤がみられ、硬質種 Century Patna では 80° で始めて膨潤が認められる。概観すると日本型は印度型より、印度型の中では準硬質種¹⁸⁾が硬質種より低温で膨潤が始まり、85—90° で各品種の差が少なくなり 96° になると印度型特に硬質種の膨潤率が大きくなる傾向があ

Fig. 1. Relation between the increase of volume and the increase of weight

* 昭和 41 年 6 月 25 日受理

る。

fig. 2にもみられるように各品種の特徴は 65° から 75° の間で最もとらえやすいので、各品種の 65°—75° の膨潤率と各品種の出穂後 30 日間の平均気温を table. 1 に示し、また登熟気温と膨潤率の関係を明瞭に示めすため 70° における膨潤率と出穂後 30 日間の平均気温の関係を fig. 3 とした。

fig. 3 によると、印度型の硬質種は膨潤率最も小さく登熟気温との関係はみられない。準硬質種には膨潤率の小さいものとやや大きいものがあり、品種による変異が著しく登熟気温との関係は明らかでない。日本型的水稲うるち種では準軟質・軟質・超軟質の間には明らかな差がなく、登熟気温との間に高い負の相関 ($r = -0.956$) がみられ、高温下で登熟するものは低温 (75° 以下) での膨潤率が小さい。この関係は品種の早晚による登熟気温のちがいにおいても、また同一品種の栽培地を異にするための登熟気温のちがい、たとえば愛知と藤坂の藤坂 5 号、新潟と秋田のトワダ、愛知と藤坂のフジミノリに

Fig. 2. The effect of cooking temperature on water-uptake ratio

おいもて認められる。水稻もち種はうるち種よりやや大きい傾向があり気温との関係もみられる。陸稲は各品種の登熟気温が近接していることもあつて気温との関係は認め難い。

米粒の膨潤には澱粉粒の膨潤、澱粉細胞の変化が原因すると考えられるから、低温で膨潤しにくい品種としやすい品種について、それらの変化を photo. 1 お

Table 1. Mean temperature during ripening, water-uptake ratio and total solids content of each variety

Varieties	Source	Grain type	Mean temperature during ripening	Water-uptake ratio Cooking temperature			Total solids content Cooking temperature		
				65°	70°	75°	65°	70°	75°
Century patna	Aichi	Hard	23.1	1.30	1.34	1.37	1.65	1.83	2.52
Blue bonnet	〃	〃	21.7	1.26	1.32	1.62	0.84	1.32	1.73
Dular	〃	Semi-hard	25.7	1.24	1.34	1.39	0.60	1.07	1.81
Konanshen	〃	〃	25.7	1.25	1.28	1.35	1.48	1.83	2.56
Ubaisen	〃	〃	24.4	1.28	1.34	1.43	1.12	1.64	2.22
Magnolia	〃	〃	23.8	1.39	1.72	2.25	2.08	2.53	2.88
Tepa-1	〃	〃	23.7	1.26	1.32	1.48	0.58	0.76	1.38
Zenith	〃	〃	23.2	1.37	1.68	2.36	1.90	2.62	3.36
Nato	U. S. A.	〃	〃	1.32	1.42	1.86	0.93	1.45	2.47
Nôrin-1	Niigata	Semi-soft	25.5	1.36	1.51	2.12	1.86	2.91	4.12
Hônenwase	〃	〃	25.3	1.34	1.48	2.15	1.84	2.86	4.08
Yachikogane	Aichi	〃	24.2	1.41	1.67	2.21	1.86	2.89	4.06
Koshihikari	Niigata	〃	23.9	1.37	1.62	2.25	2.08	3.60	4.53
Yamajiwase	Aichi	〃	23.9	1.35	1.58	2.03	1.94	2.77	3.42
Nôrin-29	〃	〃	23.4	1.45	1.72	2.34	1.97	2.65	3.20
Kusabue	〃	〃	23.4	1.40	1.92	2.36	2.56	3.84	4.07
Akibare	〃	〃	23.2	1.37	1.65	2.26	2.67	3.62	4.62
Nôrin-22	〃	〃	23.2	1.40	1.78	2.40	2.43	3.56	4.22

Varieties	Source	Grain type	Mean temperature during ripening	Water-uptake ratio Cooking temperature			Total solids content Cooking temperature		
				65°	70°	75°	65°	70°	75°
Nihonbare	Aichi	Semi-soft	23.2	1.37	1.86	2.26	2.34	3.40	3.92
Kinmaze	〃	〃	22.8	1.41	1.91	2.47	2.36	3.87	4.20
Aichiasahi	〃	〃	21.8	1.48	2.04	2.44	2.73	3.77	3.48
Mihonishiki	〃	〃	21.1	1.53	2.09	2.38	2.77	3.33	2.95
Hôyoku	〃	〃	21.1	1.56	2.03	2.51	2.88	3.58	3.11
Asahi	〃	〃	20.9	1.58	2.06	2.40	3.02	4.29	3.96
Nôrin-18	〃	〃	20.7	1.58	2.08	2.42	3.28	4.32	4.21
Towada	Niigata	Soft	25.6	1.34	1.47	2.00	2.22	3.09	4.12
Cody	Aichi	〃	25.3	1.36	1.58	2.26	3.05	4.27	3.88
Fujisaka-5	〃	〃	24.9	1.34	1.58	2.17	2.24	3.30	4.18
Hokuriku-52	〃	〃	24.1	1.37	1.66	2.24	2.55	3.56	4.58
Fujiminori	〃	〃	24.0	1.37	1.66	2.26	2.65	3.60	4.19
Aikoku-1	〃	〃	23.9	1.38	1.68	2.26	2.62	3.30	4.07
Towada	Akita	〃	23.7	1.39	1.71	2.37	2.79	3.67	4.17
Hatsunishiki	〃	〃	23.3	1.38	1.75	2.45	2.89	3.98	4.23
Ootori	〃	〃	22.5	1.48	2.01	2.50	3.02	4.02	4.06
Towada	Fujisaka	〃	21.7	1.46	1.88	2.31	2.75	3.53	3.56
Fujisaka-5	〃	〃	21.7	1.48	1.94	2.39	2.68	3.49	3.50
Fujiminori	〃	〃	21.7	1.50	2.00	2.42	3.15	3.80	3.65
Fukei-69	〃	〃	21.6	1.50	1.98	2.45	3.11	3.92	4.06
Mutsukogane	〃	〃	21.5	1.56	1.97	2.39	2.94	3.82	3.27
Pearl	U. S. A	〃		1.40	1.64	2.16	2.11	3.34	4.51
Gohyakumangoku	Aichi	Special-soft	24.6	1.34	1.60	1.88	2.02	2.66	3.75
Shinkô-190	Akita	〃	22.5	1.45	1.92	2.45	3.47	4.57	4.82
Yamadanishiki	Aichi	〃	21.9	1.46	1.93	2.43	3.27	4.07	4.13
Kanto-87	〃	Upland	26.4	1.35	1.48	2.02	1.06	1.80	2.58
Kanto-86	〃	〃	26.2	1.38	1.47	2.34	1.44	2.29	3.12
Kanto-73	〃	〃	25.9	1.35	1.48	1.96	1.35	2.13	2.96
Nôrin-24	〃	〃	25.9	1.39	1.60	2.30	1.52	2.65	3.50
Nôrin-12	〃	〃	25.8	1.38	1.54	1.88	1.27	2.66	3.48
Ishikei-111	〃	〃	25.8	1.36	1.50	2.05	2.05	3.11	4.05
Shinanomochi-3	〃	Glutinous	23.9	1.41	1.78	2.30	2.93	1.84	1.16
Shintsurumochi	〃	〃	23.8	1.42	1.97	2.46	3.90	1.97	1.77
Mangetsumochi	〃	〃	23.7	1.41	1.96	2.42	4.11	1.96	1.98
Suzuharamochi	〃	〃	23.5	1.45	1.83	2.33	4.13	2.16	1.34
Nijimochi	〃	〃	22.8	1.48	1.96	2.40	4.30	2.80	2.05
Iwaimochi	〃	〃	20.9	1.75	2.28	2.65	4.88	2.27	2.11
Asahimochi	〃	〃	20.6	1.61	2.03	2.48	5.50	3.02	2.29
Kantômochi-70	〃	Upland	25.7	1.37	1.50	1.87	2.66	3.77	3.15
Nôrinmochi-26	〃	glutinous	24.9	1.38	1.60	2.08	2.99	3.27	2.41

よびに photo. 2 に比較した。硬質種の Bluebonnet は 70°30 分処理では澱粉細胞にほとんど変化が認められず、80°30 分処理で腹側に明らかに崩壊がみられ背側も僅かに崩壊をはじめる。軟質種の藤坂 5 号では 70°30 分処理で既に腹側に顕著な崩壊がみられ背側にも可成りの崩壊が認められる。80°では背側腹側とも著しく崩壊する。また同じ準軟質種で登熟気温の高いホウネンワセと低い農林 18 号の 70°30 分処理について比較すると、ホウネンワセではほとんど変化がみられないが農林 18 号では腹側に明かに崩壊がみられる。またもち種のシンソルモチは 70°30 分処理で米粒周縁部の細胞が膨張しているのが観察されるが崩壊は起こらず粒は原形を保もつ。このことはもち種の特徴として注目される。

澱粉粒の変化をみると、軟質種のトワダでは処理で米粒外側部では既に細胞膜が崩壊し、澱粉粒は膨潤して大きな塊となっており、内部では細胞膜の崩壊はみられず澱粉も膨潤していない。硬質種 Bluebonnet は 70°では米粒の外側部でも細胞膜の崩壊も澱粉の膨潤もみられず、80°で外側部に細胞膜の崩壊・澱粉の膨潤が認められる。

2) 炊飯液への溶出物量について

60°から 96°までの温度に 30 分間づつ浸漬した場合の炊飯液への溶出物%を測定して、そのうちの代表品種を fig. 4 に示した。なお比較的低温で著しく膨潤する日本型は高温 (85°以上) になると飯粒自体が崩れやすく正確に溶出物を測定し難いため高温の場合は除いた。

水稻もち種の祝もちは 60—65°で著しく多量の溶出物が出るが 70°以上で急減する。陸稻もち種の関東もち 70 号は 70°に山があり、それより高温で減少する。日本型うるち種の農林 18 号・コシヒカリはそれぞれ 70°と 75°に山があり、陸稻うるち種農林 12 号は 85°に山がある。陸稻うるち・もちとも水稻よりやや高温で溶出しやすく、最大の溶出物%も多少小さい傾向がある。印度型

Fig. 3. Relation between mean temperature during ripening and water-uptake ratio

Fig. 4. The effect of cooking temperature on total solids content

Fig. 5. The effect of mean temperature during ripening on total solids content

Photo. 1. Destruction of endosperm cells. X19

S : Swelled granule

U.S : Unswelled granule

Photo. 2. Swelling of starch granule and disruption of cell-membrane. X130

は概して高温ほど溶出物が多い傾向があるが、最高値は日本型より小さい。

fig. 4 から溶出物の出やすさの品種間差異は 65—75° でとらえやすいことが知られるからその値を table. 1 に示した。低温 (65—75°) での溶出物%は印度型は明かに日本型より少ないが特に硬質種は最も少なく (Century Patna は比較的多い) 準硬質種にはやや多いものがある。日本型では軟質種が準軟質種より多い傾向があり、超軟質種には最も多いものがあり。また、日本型の準軟質種および軟質種で登熟気温

が 22° 以下の品種では溶出物%の最高が 70° にみられるものが多く、22° 以上の品種では 75° にみられる傾向があり、登熟気温の低いときは比較的低温で溶出物が出やすいことが推察される。

次に登熟期の気温と溶出物%の関係を検討するため、まづ 65° における溶出物%との関係を Fig. 5 にみると、硬質種では溶出物%は Century Patna のみやや多く、他は少なく気温との関係はみられず、準硬質種と陸稲では品種の特性による差異はみられるが気温との関係は明かでない。水稻もち種は溶出物%著し

く多く気温との関係がうかがえる。日本型の準軟質・軟質・超軟質では明かに気温と負の相関($r=-0.789$)がみられ、そのうちで超軟質に溶出物%の著しく多いものがあり、また軟質種は概して準軟質種より多い傾向がある。次に登熟気温と70°における溶出物%との関係はfig. 6の如く、溶出物%は65°より多くなるが、水稻もち種のみは前に述べたように著しく減少する。準軟質種・軟質種・超軟質種では65°と同じく気温と負の相関($r=-0.659$)がみられるが、65°と異なり軟質種の溶出物%が準軟質種より多い傾向が明かでない。

即ち、軟質種は準軟質種より65°で溶出物が出やすいがやや高温(70°)になると差が少なくなることを示すものである。以上の登熟気温と溶出物%の関係は品種の早晚による気温のちがいについても、同一品種の栽培地による気温のちがいについても同じであることは気温と膨潤の場合と同様である。

fig. 5, 6では印度型の硬質および準硬質種の溶出物%と登熟気温との関係は明らかでないが、前報¹⁹⁾の登熟温度を人為的に23°と30°に規制した実験では、印度型でも23°で登熟したものは30°より明らかに65—70°での膨潤率も溶出物%も高かった。すなわち登熟気温と膨潤率および溶出物%との関係は総べての種類・品種について認められるものとみられる。

実際に米を炊飯した場合に溶出する量を実験方法の項で述べた方法で測定し、その値が上の恒温による実験の何度での溶出物%と最も高い相関を示すかを検討した結果、うるち種についてはfig. 7のように70°における溶出物%と高い正の相関($r=0.878$)がみら

れた。すなわち70°における溶出物の多少はほぼ実際の炊飯時における溶出物の多少を表わすものと考えられる。

3) 新米と古米の炊飯特性の比較

新米と古米を比較するため、64年産米について、65年1月・66年2月に膨潤率と溶出物%を調査した結果をtable. 2に示す。膨潤率については新米が多少大きい傾向

Fig. 6. The effect of mean temperature during ripening on total solids content.

があるが大差はない。溶出物%は印度型・日本型とも処理温度70°Cまでは新米が古米より明らかに多く、処理温度75°では新米と古米の差が少なくなり、日本米の一部には古米の方が多くなるものもみられるが、これは処理温度と各品種の溶出物%との間にみられた現象と同様な関係にあるものと思われる。しかしながら低温(70°以下)では古米は新米より溶出物%が少ないことは明かであるから、上のように70°における溶出物の多少が実際の炊飯時の溶出物の多少を表わすとすれば、古米は新米より実際の炊飯時にも溶出物が少ないとみられる。

Table 2. The effect of storage on water-uptake ratio and total solids content

Varieties (Crop year 1964)	Research year	Water-uptake ratio Cooking temperature			Total solids content Cooking temperature		
		65°	70°	75°	65°	70°	75°
Century Patna	'65	1.30	1.34	1.39	1.02	1.21	1.56
	'66	1.30	1.33	1.40	0.95	1.04	1.55
Zenith	'65	1.39	1.78	2.48	1.08	2.96	4.89
	'66	1.39	1.70	2.40	0.89	2.49	4.42
Akibare	'65	1.39	1.82	2.26	1.81	3.72	4.73
	'66	1.37	1.60	2.20	1.43	3.23	4.71
Kinmaze	'65	1.48	1.91	2.57	2.26	4.00	4.64
	'66	1.47	1.88	2.38	2.08	3.92	4.55
Nôrin-1	'65	1.38	1.73	2.53	1.60	3.50	5.15
	'66	1.40	1.59	2.25	0.88	2.90	4.69
Nôrin-22	'65	1.49	1.84	2.19	2.03	3.83	4.40
	'66	1.40	1.72	2.26	1.40	3.12	5.17
Fujisaka-5	'65	1.44	1.97	2.32	1.83	4.37	4.33
	'66	1.42	1.63	2.13	1.53	3.78	5.76

4) 品種による膨潤率と溶出物%の関係

一般にうるち種については低温で膨潤しやすい品種は低温で溶出物も出やすいことがうかがわれたが、なお品種によつて可成りの差異がみられた。これらの点を明らかにするため、70° 処理における膨潤率と溶出物%の関係をうるち種について図示すると Fig. 8 の如く、一応膨潤率の大きいものは溶出物%も大きい傾向があるが品種または品種群によつて著しい差がある。

印度型は概して膨潤率に比して溶出物%が小さい。そのうち硬質種は膨潤率・溶出物%ともに小さいが Century Patna は溶出物%がやや大きく、準硬質種には tepa-1 のように膨潤率も溶出物%も小さいものと Zenith, Magnolia のように膨潤率・溶出物%とも比較的大きいものがある。(table. 1. 参照)

日本の陸稲のうち準硬質の品種は膨潤率も溶出物%も小さいが、準軟質の石系 111 号や 農林 12 号などは膨潤率・溶出物%ともやや多く水稻に近い。

日本型水稻では準軟質種は軟質種より多少溶出物%が小さい傾向がみられ、そのうちヤチコガネ・ヤマジワセ・農林 29 号・ミホニジキなどは膨潤の割に溶出物の少ない品種であり、農林 18 号・朝日は膨潤率も溶出物%も大きい。軟質種ではトワダ・藤坂 5 号は比較的溶出物の少ない品種でハツニシキは多い品種である。超軟質種は僅かに 3 品種であるが五百万石のように溶出物%の小さいものもあるが、概して溶出物%の大きいものが多いようである。

本実験試料については、このような品種および品種群による特性がみられ、この特性は登熟気温のちがいなどにより変化することが予測されるが、環境条件の余程著しい変化がない限り通常の場合には上の関係が逆転するほどの大きい変化は少なからうと思われる。

考 察

米の煮えやすさや飯の固さに関係すると思われる 65—75° における膨潤率は米澱粉の吸水膨潤・澱粉細胞の崩壊と密接に関係しており、一般に印度型は小さく日本型は大きく、またそれらのなかの品種により、あるいは登熟気温の高低によつて明らかな差異がみられる。

Little¹⁶⁾らは白米粉を 62° の温水に浸漬した場合に澱粉粒は糊化温度の高い長粒種(本研究の硬質種とみられる)ではほとんど変化しないが、糊化温度の低い短粒種(準軟質種または軟質種)では可成り膨潤し、澱粉粒の変化の程度はその品種の澱粉の糊化温度と平

Fig. 7. Retention of total solids content between normal cooking and cooking at 70°C.

Fig. 8. Relation between water-uptake ratio and total solids content at 70°C.

行していることを認め、Halick¹¹⁾, Hogan¹²⁾らも 70—82° の温水処理では糊化温度の低い短粒種や中粒種(準硬質種)が吸水膨潤が大きく、100° 附近の高温処理では糊化温度の高い長粒種がかえつて膨潤が著しいことを報告している。また Hogan¹²⁾, Rao²⁰⁾らは、一般にアミロース含量は長粒種に多く短粒種に少ないが、アミロース含量の多い米は少ない米より 70—80° における吸水は少なく、100° 附近では多いことを報告している。これらの点から考察して、印度型・日本型あるいはそれらのなかの品種によつて米澱粉の性質が異なり、糊化温度に差異を生じ、その結果米粒の吸水膨潤の様相に差を生ずるものと考えられる。特にもち種が低温で吸水膨潤しやすいことはもち澱粉の糊化温度が最も低い^{10, 11, 12)}ことによるものであろう。そして、これら品種の特徴とみられる米澱粉の性質のちがいは澱粉生産の一つの条件である登熟温度の変化によ

つて多少変わるものであると考えられる。

しかしながら, Julian¹³⁾は米の蛋白含量と澱粉の糊化温度とは正の相関があり, 蛋白含量と米の吸水とは負の相関があることを報告し, Little¹⁷⁾は澱粉の膨潤に対し, これを取りまく蛋白質が制約を与えており, 同時に細胞膜も澱粉の膨潤ひいて米粒の膨張を制限すると考えており, 斉藤²¹⁾は品種による細胞膜の強弱のちがいを認めている。従つて米の膨潤率の差異の原因が主として澱粉の性質のちがいにありとしても, なお蛋白や細胞膜の質的および量的な差異も考慮する必要がある。一方印度型の硬質種が高水温においては最も膨潤率が大きいことについては, おそらく, 米粒中心部の澱粉密度が著しく高いことが一つの原因であろうと考えられる。

炊飯中における炊飯液への溶出物は飯が炊きあがつたときには飯粒の表面に附着し, 粒表物質として飯の舌ざわりや粘りなどに関係し, 溶出物の多い場合は飯の舌ざわりが滑らかで粘りがあり外観にうるおいがあり, 溶出物の少ない場合はこれに反すると考えられる。炊飯中の溶出物量は 70°30 分処理の溶出物量とほぼ比例し, 70°30 分処理の溶出物量は印度型は日本型より少なく, そのなかの品種によつても差異があり, また登熟気温の高い場合は低い場合より少なく, 古米は新米より少ない。Hogan¹²⁾によればこの溶出物は澱粉を主として他に糖などを含み, 長粒種に少なく短粒種に多く, Batcher²⁾も同様の傾向を認め, また品種や環境によつて差異を生ずることを報告している。鈴木²²⁾によれば同一品種について栽培時期のおそいものは早いものに比して多く, Desikacher⁶⁾は新米は古米より溶出物が多いことを指摘しており, いづれも本研究の結果と符合する。

溶出物量に差異を生ずる原因について, 福場⁹⁾は印度型と日本型の差に対して日本型は一般にアミロース含量は少ないが, その鎖長が短かいため溶出しやすいとし, Williams²⁵⁾, Julian¹³⁾, 倉沢¹⁵⁾はアミロース含量の少ない米は多い米に比し粘りがあることを報告している。また Desikacher⁶⁾は新米が古米より溶出物量が多いことについて新米のアミロースは古米のアミロースより沃素結合能が低く性状のちがいを認め, 鈴木²¹⁾は栽培時期を異にした場合, 早期・普通期・晩期・それぞれの米澱粉のX線解析図型やアミログラムなどに差異があることを指摘している。以上の諸点から先の膨潤率の場合と同様に澱粉の性質のちがいが主な原因であろうが, どのような差異によるかは不明である。また新米と古米の関係について Desika-

cher⁶⁾, 斉藤²¹⁾が新米は古米より細胞膜が弱く破壊されやすいことを観察しており, このことも原因の一つかも知れない。なお, もち種は低温で著しく溶出物が多く, やや高温で急減し, 日本型のうるち種も同じ傾向があるが, この理由はこれらの品種の澱粉は糊化温度が低く 70—80°では急速に粒表の澱粉が糊化して溶出を抑えるためと考えられ, 特にもち種ではアミロペクチンが熱水に不溶性であることがうるち種より低温で急減する原因であり, また高温では粒全体が糊状になりながら崩れることなく原形が保たれる原因の一つであろうと考えられる。

本研究の膨潤率や溶出物%の品種や登熟気温による差異は Julian¹⁴⁾が米のアルカリ崩壊性と澱粉の糊化温度と相関があることを指摘しているように, 鈴木^{22, 23)}の栽培時期を異にした米のアルカリ崩壊性や江幡⁹⁾の多数品種についての出穂期の気温とアルカリ崩壊性との関係の結果と符合するところが多い。この点は炊飯特性の研究上注目すべき事項と考えられる。

なお本研究で登熟気温の高低により膨潤率・溶出物%に差を生じたが, 登熟気温の高低は当然収穫・乾燥の温度の高低につらなるから籾の乾燥温度が膨潤率・溶出物%に影響しているおそれが考えられる。この点について Hogan¹²⁾は品種 Century Patna 231 で常温と 71°C で乾燥した場合, 71°乾燥が常温乾燥より 80°での吸水や溶出物がやや少なく高温乾燥によつて米の表面に変化を生ずるとしているが, Batcher²⁾は 49・60・71°C で乾燥した場合 99°C における吸水・溶出物量に差がないことを報告しており, 本研究のように温度差がそれほど著しくない場合はほとんど影響がないものとみて支障なからう。

以上のように日本型・印度型を通じ, 品種により炊飯特性の重要な要素である膨潤率と溶出物量が異なり, また登熟気温によつて変異することは, 米質の研究上からも米の利用上からも注目すべきことと考えられる。この事実についての原因の究明は将来の課題であるが, この事実は炊飯特性解明の一つの手がかりになるように思われる。

本研究は文部省科学研究費(総合研究)の助成によつて行われたものである。

引用文献

1. Batcher, O. M., P. H. Deavy. and E. H. Dawson. 1957. Cooking quality of 26 varieties of milled rice. *Cereal Chem.* 34: 277—285.
2. Batcher, O. M., R. R. Little, E. H. Dawson and

- J. T. Hogan. 1958. Cooking quality of white rice milled from rough rice dried at different temperatures. *Cereal Chem.* **35** : 428—434.
3. 竹生新治郎・堀内久弥・谷 達雄 1958. 穀類澱粉の性状に関する研究3. 農化誌 **32** : 268—272.
4. 竹生新治郎・岩崎哲也・谷 達雄 1961. 米の炊飯嗜好性に関する研究1. 食研報告 **15** : 174—175.
5. Desickacher H. S. R. 1956. Changes leading to improved culinary properties of rice on storage. *Cereal Chem.* **33** : 324—328.
6. Desickacher H. S. R., and V. Subrahmanyam 1959. Expansion of new and old rice during cooking. *Cereal Chem.* **36** : 385—391.
7. Desickacher H. S. R. 1960. The relative effects of enzymatic and physical changes during storage on culinary properties of rice. *Cereal Chem.* **37** : 1—8.
8. 江幡守衛 1964. 白米のアルカリ崩壊性について. 作物学会東海支部梗概 **40** : 19—22.
9. 福場博保 1954. 所謂内地米及び外地米の澱粉について. 2. 農化誌 **28** : 41—43.
10. Halick, J. V. and V. J. Kelly. 1959. Gelatinization and pasting characteristics of rice varieties as related to cooking behavior. *Cereal Chem.* **36** : 91—98.
11. Hallick, J. V., H. M. Beachell, J. W. Stansel and H. H. Kramer. 1960. A note on the determination of geratinization temperature of rice varieties. *Cereal Chem.* **37** : 670—672.
12. Hogan, J. T. and R. W. Planck. 1958. Hydration Characteristics of rice as influenced by variety and drying method. *Cereal Chem.* **35** : 469—482.
13. Juliano, B. O., L. V. Onate. and A. M. Mundo. 1965. Relation of starch composition, protein content and geratinization temperature to cooking and eating qualities of milled rice. *Food Technol.* **19** : 1006—1011.
14. Juliano B. O., G. B. Caganpang, L. J. Cruz and R. G. Santiago. 1964. Some physicochemical properties of rice in southeast Asia. *Cereal Chem.* **41** : 275—285.
15. 倉沢文夫・伊賀上郁三・早川利郎・大上 宏 1959. 米でんぶんの生化学的研究. 農化誌 **33** : 225.
16. Little R. R. and G. B. Hilder. 1960. Differential response of rice starch granules to heating in water at 62°C. *Cereal Chem.* **37** : 456—463.
17. Little R. R. and E. H. Dawson. 1960. Histology and histochemistry of raw and cooked rice kernels. *Food Research.* **25** : 611—622.
18. 長戸一雄・河野恭広 1963. 米の粒質に関する研究1. 日作紀 **32** : 181—189.
19. 長戸一雄・江幡守衛・岸 洋一 1966. 登熟期の高温が印度型水稻の米質に及ぼす影響. 日作紀 **35** : 3—4号.
20. Rao, B. S., A. R. V. Murthy and R. S. Subramanya. 1952. The amylose and amylopectin contents of rice and their influence on the cooking quality of the cereal. *Proc. Ind. Acad. Sci.* **36B** : 70—80.
21. 斎藤昭三・古石澄子・馬場 操 1962. 軟質米の貯蔵に関する研究. 新潟食研報告特別号.
22. 鈴木 裕・竹生新治郎・谷 達雄 1959. 早晩期栽培米に関する研究1. 農化誌 **33** : 275—280.
23. 鈴木 裕・森 高明・土井健二・二国二郎 1963. 早晩期栽培米に関する研究2, 3 農化誌 **37**—63 66, 112—115.
24. 谷 達雄・竹生新治郎・堀内久弥 1956, 57, 58. 穀粒澱粉の性状に関する研究. 農化誌 **30** : 179 182, **31** : 397, **32** : 268—272.
25. Williams V. R., et al., 1958. Varietal differences in amylose content of rice starch. *J. Agr. and Food Chem.* **6** : 47—48.

On the Grain Texture of Rice

2. Varietal differences of cooking characteristics of milled white rice.

Kazuo MAGATO and Yoichi KISHI

(Faculty of Agriculture, Nagoya University, Nagoya)

Summary

To examine the varietal difference of swelling behaviour and total solids content in residual cooking liquid, milled white rice samples of 58 varieties were treated with excess water for 30 minutes at temperatures ranging from 60° to 96°C. Swelling behaviour was expressed as the water-uptake ratio (weight of cooked rice)/(weight of raw rice), because the water-uptake ratio was closely related to the swelling in the volume as shown in fig. 1. The total solid content was expressed as percent of raw rice, (dry weight of total solids) $\times 100$ / (dry weight of raw rice).

The results are summarized as follows:

1) In general, Japonica varieties began to swell at the lower temperatures than did Indica varieties, and among Indicas many of the semi-hard varieties (medium-grain), swelled at the lower temperatures than did the hard varieties (long-grain). Therefore, at the lower temperatures than 75°C, Japonicas and many of semi-hard varieties had higher water-uptake ratios than had Indicas and the hard varieties respectively, whereas at the temperature of 96°C, the hard varieties had the higher water-uptake ratios than any of the other varieties tested. (fig. 2) The varietal differences of water-uptake ratio were most distinct in the range from 65° to 75°C.

2) Among Japonicas, the varieties matured under lower temperatures began to swell at the lower cooking temperature than did those matured under higher temperatures. This relation was observed among the different samples of the same varieties matured under different temperatures. (table 1. fig. 3) Therefore, a highly significant negative correlation existed between the water-uptake ratios at cooking temperatures from 65° to 75°C and the mean temperatures during ripening. ($r = -0.956$ at 70°C)

3) Microscopic observations of cooked rice revealed that swelling of rice grains was closely connected with swelling of starch granules and disruption of cells. In Towada and Fujisaka-5, swelling of starch granules and disruption of cells were observed on the outer layers of rice cooked at 70°C and on the fairly inner layers of rice cooked at 80°C. On the other hand, in Blue-bonnet, these changes were not observed when cooked at 70°C, but existed at 80°C. (photo. 1, 2).

4) The swelling of rice grain at the low cooking temperatures (60-75°C) will be attributed to the low geratinization temperature of starch and the fragility of cell membrane, and the swelling at the high temperatures (85-96°C) may be affected by the structure of starch and density of starch in endosperm (hardness distribution in endosperm¹⁸⁾).

The rice which has high water-uptake ratio at low cooking temperature is considered to have a tendency to be cooked more easily and to become tender boiled rice.

5) Figure 4 shows that the maxima of total solids contents were at 65°C in glutinous varieties, 70° or 75°C in Japonicas and 90° or 96°C in Indicas. Then the total solids contents at temperatures from 65° to 75°C were markedly higher in Japonicas than in Indicas and among Indicas some of the semi-hard varieties had fairly high total solids contents. (table 1)

6) Among Japonicas, highly significant negative correlation existed between total solids con-

tents at cooking temperature from 65° to 75°C and mean temperature during ripening ($r = -0.789$ at 65°C). This correlation was not recognized among Indicas in fig. 5 and 6, but according to the previous report¹⁹⁾, when ripening temperatures were artificially controlled to 23° and 30°C, the rice matured at 23°C had higher total solids contents than had those matured at 30°C in all Indicas examined. Accordingly, swelling behaviour and amounts of total solids in residual liquids depend to a great extent on varieties and to some extent on climatic conditions.

7) Variation in total solids contents due to varieties and ripening temperatures are thought to be caused by the gelatinization temperature of starch, fragility of cell membrane and perhaps by characters of starch and other components. Generally, such varieties as glutinous and Japonica thought to have low gelatinization temperatures and fragile membranes have high total solids contents at low cooking temperatures, but when cooking temperatures are higher than 70° or 75°C, total solids contents are markedly diminished on account of dispersing the dispersion of solids by the prompt gelatinization of starch on the surface of rice grain.

Close relationship is recognized between the total solids contents at 70°C and those of normally cooked rice (fig. 7), and high number of the total solids contents is considered to relate to the stickiness and moist appearance of boiled rice.

8) Water-uptake ratios and total solids contents of several varieties produced in the fall 1964 were examined in January 1965 (new rice) and in February 1966 (old rice). From the results of this examination, water-uptake ratios were somewhat higher and total solids contents were apparently higher for new rice than for old rice at low cooking temperatures. Change in characters of starch and cell membrane during storage will be expected. (table 2)