ナタネの物質生産に関する研究*

第1報 生育に伴うナタネ個体群の光合成能ならびに呼吸能の推移

稲 永 忍・玖 村 敦 彦

(東京大学農学部)

緒 言

ナタネは我が国における代表的な冬作物の一種であるが、この作物の物質生産上の特性については未だ不明な点が多い。そこでこの点を明らかにすることを目的として本研究に着手した。

研究の第一段階としては、ナタネ個体群の CO_2 交換ならびに植物体各部の乾物重の時期別調査を行なうこととした。

ナタネに関する既往の報告⁵⁾ から、ナタネは落葉後もかなりの期間物質生産を続けることが推察されるので、稔実期における物質生産への莢群の寄与程度に対し特に着目した。

実験材料および方法

供試品種：ナタネ農林16号（福島県農業試験場1969年度産）、栽培方法：苗床播種は1970年10月1日、定植は11月14日で、東西畦、畦間60cm、株間20cmの圃場栽培。施肥量は10a当り、堆肥1200kg、クミアイ化成(12:18:12)80kgでいずれも基肥として施した。なお、耕起に先立ち石灰10a当り80kgを圃場の全面に散布した。

個体群の CO_2 交換量の測定装置としては筆者の一人³⁾ がかつて大豆個体群の CO_2 交換の測定に用いたものを若干変更して用いた。同化箱の大きさは、底面の長さ1.0m、幅0.6mであり、高さは植物体の高さに応じて変えた。同化箱内の土面はビニールシートを用いて覆い、土壌からの CO_2 が同化箱内に入るのを遮断した。同化箱内の環境条件をできるだけ圃場のそれと同じにするよう努めたが、湿度については十分な制御ができなかつた。

測定は1970年12月上旬から1971年6月中旬まで2週間間隔で計14回実施した。一回の測定は3~4日間昼夜連続して実施した。

開花期以後は、通常の測定終了後、同化箱内の植物

体の全ての葉を切除し、その状態での CO_2 交換量の測定を行ない、葉とそれ以外の部分(莢+茎)の光合成量および呼吸量を分けて算出できるようにした。

CO_2 交換量の測定終了後、同化箱内の植物体を採取し、根・茎・葉・莢(種子を含む)の各部位に分け、それらの乾物重を測定した。表面積は、葉については片面の面積で、莢については全外表面の面積で表示した。

稔実中期(5月24日)において地上部器官の表面積の垂直分布を明らかにするために層別刈り取りを行なうとともに、個体群内部の相対照度の垂直分布を調査した。

CO_2 の測定には赤外線ガス分析器、日射量の測定には農試電試型日射計、温度ならびに湿度の測定にはサーミスターを使用した。

実験結果および考察

調査材料の生育は、3月上旬に霜により葉の周縁部が一部枯死したこと、および4月上旬に強風で植物体がやや傾いたことを除けばおおむね順調であつた。3月初旬から抽だいが始まり、茎の伸長は4月初旬まで続いた。4月初旬より下旬にかけて開花し、6月中旬に成熟した。

生育期間中の気象条件をfig.1に示した。なおこの記録は試験地から約3km隔つたところにある気象庁東京管区气象台発表のものである。図中の平均気温、相対湿度は旬平均値、降水量は10日間の合計である。

以下調査項目別に結果を記述する。

(1) 植物体各部の乾物重

fig.2に示すように植物体全体の乾物重の増加は生

Fig. 1 Climatic conditions during growing season. Vertical bars: Presipitation.

* 昭和48年11月28日受理

第154回講演会(昭和47年10月)において発表

Fig. 2 Change with time in dry weight of each organ

育初期には小さく、抽だい開始頃から稔実盛期にかけて急速であつた。茎の乾物重もほぼ同様な傾向を示し、稔実盛期に最大値に達した。根の乾物重は生育に伴つてゆっくり増加し、稔実盛期以降はほぼ一定の値を保つた。葉の乾物重は抽だい前まではゆっくりとした増加を示すが、抽だい後急速に増加し、開花期の終りに最大値に達し、稔実盛期に入ると落葉のため急速に減少した。莢の乾物重は開花中期頃から急増し始

め、成熟期までほとんど直線的に増加した。以上から明らかなように、ナタネ個体群においては、光合器官である葉の乾物重がかなり減少した後もなお植物体全体の乾物重の急速な増加がつづいた。

(2) 葉面積ならびに莢の表面積

葉面積ならびに莢の表面積の推移を fig. 3 に掲げた。ここに示された葉面積は前述のように葉の片面の面積であり、莢の表面積は莢の外表面の面積である。いずれも単位土地面積当りの面積、すなわち葉面積は LAI で、また莢の表面積は PAI (pod area index, 莢の表面積についての LAI に相当する単位) で表示した。

冬期中においても徐々にではあるが新葉の形成・発育が進んだ。これに対し、冬に入る前に形成された葉は、厳冬期中、おそらく低温のためと思われるが、かなりの部分が枯死した。このような葉の形成と枯死の結果、葉群の構成内容の交替はあつたが、総葉面積は 12 月中旬から 2 月中旬までほとんど一定の値を保つた。しかし、抽だい開始とともに急速な増加に転じ、開花終期頃最大値に達した。

Tabl 1 Capacities of photosynthesis and respiration at each stage of growth and the environmental conditions under which the rates of photosynthesis and respiration were obtained

Date	Photosynthesis					Respiration			
	Max. value of apparent photosynthesis (gCO ₂ /m ² /h)	Solar radiation (ly/min)	Air temperature (°C)	Relative humidity (%)	CO ₂ concentration (ppm)	Respiration (gCO ₂ /m ² /h)	Air temperature (C°)	Relative humidity (%)	CO ₂ concentration (ppm)
DEC. 9	0.11	0.60	12.8	53	—	—	—	—	—
DEC. 21	0.23	0.52	10.3	52	356	—	—	—	—
JAN. 5	0.19	0.58	8.2	76	326	—	—	—	—
JAN. 20	0.33	0.58	11.0	60	347	0.02	8.2	39	354
FEB. 1	0.36	0.80	12.1	55	355	0.02	6.1	53	378
FEB. 18	0.60	0.85	14.7	63	303	0.05	10.2	66	339
MAR. 4	1.22	1.25	12.1	68	317	0.05	2.8	76	348
MAR. 19	1.69	1.01	17.4	60	330	0.08	7.2	78	358
MAR. 29	3.85	1.09	21.9	66	327	0.39	17.3	79	343
APR. 13	4.55	1.15	20.0	40	336	0.49	12.1	74	358
APR. 27	4.98	1.34	23.1	63	313	0.52	12.9	57	349
MAY 10	5.26	1.21	23.4	68	320	0.67	15.5	60	355
MAY 26	2.75	1.18	29.7	64	336	0.60	21.9	61	383
JUNE 9	0.62	0.62	28.1	50	343	0.46	23.2	90	362

Fig. 3 Changes with time in apparent photosynthesis (P), leaf area index (LAI) and pod area index (PAI).

(3) 光合成能

単位時間、単位土地面積当りの光合成量を fig. 3 と table 1 に掲げた。ここに示した光合成の値は各時期の光合成の日変化調査において記録されたみかけの光合成量の最大値である。table 1 に示すように測定時の環境条件は時期によつてかなり異なり、厳密に考えた場合この値の意味するものは単純ではない。しかし、この値はそれぞれの季節における自然環境下での個体群の光合成能力を示す一応の目安と考えることはできよう。このような考えから以下、この値を光合成能と呼ぶこととする。

個体群の光合成能は定植後ゆるやかに増加する。前述のように、冬期かなりの期間葉面積はほぼ一定の値を持続したが、光合成能のほうはこの期間においても上昇を続けた。光合成能は抽だい開始頃から葉面積の急増に伴ない急速に増加し、稔実中期に最大値に達し、その後急速に減少した。

(4) 呼吸能

単位時間、単位土地面積当りの呼吸量を fig 3 および table 1 に掲げた。ここで採用した呼吸量はみかけの光合成が最大値を記録した日の日没後1～2時間後の値である。table 1 に示すように呼吸量の測定条件は測定時期により異なるが、自然環境下での個体群の呼吸の活性を示す一応の目安と考えることができよう。このような考えから以下、この値を呼吸能と呼ぶこととする。

個体群の呼吸能は抽だい前にはごくわずかであり、

抽だい開始頃から増加し始め、開花初期に急増し稔実中期に最大値に達し、その後わずかに減少した。

以上のように、光合成能、呼吸能ともにある時期を過ぎると低下に向う。しかし、生育後期における低下の傾向は光合成のほうがはるかに著しい。そのため光合成能に対する呼吸能の比率は成熟期に近づくにつれ増加した。

(5) 稔実に対する莢群の寄与

table 2 に稔実期における個体の呼吸量 (Rt) に対する莢+茎の呼吸量 (Rps) の割合 (Rps/Rt) を掲げた。また、この表には個体全体の“総光合成”量 (Pt) に対する莢+茎の“総光合成”量 (Pps) の割合 (Pps/Pt) も示してある。“総光合成”量は、光合成能測定時の温度の下での暗呼吸の量を光合成能に加えて算出した。Pps と Pt とはそれぞれの光-光合成曲線を作成したうえ、同じ日射強度下での値を選び、Pps/Pt 比を算出した。ただし、呼吸のみ温度の影響を受け、“総光合成”は温度の影響を受けないものと仮定した。

個体全体の呼吸 (Rt) に対する莢+茎のそれ (Rps) の割合は稔実の進みとともに増大し、稔実中期には約 78% に達した。このうち莢および茎がおのおのどの位の割合を占めるかは不明である。Pps/Pt は稔実初期から急速に増大し、稔実中期には約 76% に達した。この比率は稔実が進むにつれさらに増大する。したがって、稔実期の後半においては、光合成の大部分は莢および茎により遂行されるものと推論される。

北条¹⁾は、ナタネの莢が稔実期において葉に匹敵する光合成活性を持つことを報告している。筆者ら²⁾も、ナタネの莢の光合成を直接測定し、莢がかなりの光合成活性を有することを認めた。本試験においても fig. 4 にみられるように、稔実中期においては、莢が圧倒的に大きい表面積を持ちしかも葉や茎に比べて受光上有利な高いところに位置していることが明らかとなつた。これらの事実から稔実期における光合成の主

Fig. 4 Vertical distributions of relative light intensity and surface area of each organ

Table 2 Changes with time in Pps/Pt and Rps/Rt

Date	Pps/Pt	Rps/Rt
APR. 27	0.49	0.71
MAY 10	0.76	0.78
MAY 26	0.90	0.83
JUNE 9	1.00	1.00

Note: Pt : Photosynthesis of whole plant.
 Pps : Photosynthesis of pods and stems
 Rt : Respiration of whole plant
 Rps : Respiration of pods and stems

要な担い手は莢であろうと考えられる。なお、最近仲林・岩沢⁴⁾はナタネの葉、茎、莢を別々に遮光処理して収量を調査し、莢の遮光による収量低下が最も著しいことから、稔実期における同化生産の大部分は莢の光合成に依存すると推定している。

稔実期において、葉以外の部分、特に穂、果実など収穫対象となる部分やその付属物が光合成面でかなりの貢献をしていることを指摘した例は少なくない。特に、オオムギ^{6),7)}ではこの貢献度が大きいことが知られている。しかし、本研究におけるナタネの莢ほど大きな貢献度を示した例は見当たらない。この点はナタネの顕著な特徴のひとつと考えられる。

摘 要

ナタネ個体群の物質生産上の特性を明らかにするために、生育に伴う植物体各部の乾物重、葉面積、莢の表面積、光合成能ならびに呼吸能を調査した。調査材料としてはナタネ (*Brassica napus* L.) 農林 16 号を慣行法により圃場栽培したものを用いた。

1. 植物体全体の乾物重は生育の初・中期には緩慢に増加するが、抽だい開始とともに急増し始めた。植物体全体の乾物重は、稔実期に入り枯れ上りのため葉面積がかなり小さくなつた後も急速な増加を続けた。

2. 葉面積は抽だい前はごく小さいが、その後急速に増加して開花後 30 日目(4月28日)に最大値(LAI=3.31)に達した。その後葉面積は急速に減少し、かわつて莢の表面積の急増が見られた。

3. 個体群の光合成能は冬期中ゆるやかな増加を続け、抽だい開始とともに急増し始めた。そして開花後 44 日目に最大値 ($5.26 \text{ g CO}_2\text{m}^{-2}\text{h}^{-1}$) を示し、その

後急速に減少した。

4. 個体群の呼吸能は生育の初期にはごくわずかで、あるが、抽だい開始とともに次第に増加し、みかけの光合成能が最大値を示す稔実期に最大値 ($0.67 \text{ g CO}_2\text{m}^{-2}\text{h}^{-1}$) を示した。その後は減少したが、減少の割合はみかけの光合成能のそれに比べて小さく、したがってみかけの光合成能に対する呼吸能の割合は稔実が進むにつれ増大した。

5. 莢群の発達とともに個体群全体の総光合成量に対する莢+茎の総光合成量の割合は増加した。稔実中期においてこの割合は 76% にも達し、さらに稔実の進行に伴い増加した。この時期には、莢群が空間的に高い所に位置し光を受け易いこと、表面積が他の器官に比べて多いこと、かなり高い単位表面積当りの光合成活性を持つこと、などからナタネ個体群では稔実期の物質生産のうゑに莢群が大きな役割を担っていると推論した。

終りに、本研究の実施にあたり御指導をいただいた村田吉男教授、ならびに種々の貴重な御助言をいただいた杉山信太郎博士に感謝の意を表する。

引用文献

1. 北条良夫・加藤真次郎・小林宏信 1972. ナタネの莢の光合成活性と稔実に対する寄与. 日作紀 41: 420—425.
2. 稲永忍・玖村敦彦・村田吉男 1973. ナタネの莢の光合成・呼吸特性について. 日作紀 42 別号 2: 69—70.
3. 玖村敦彦 1968. 大豆の物質生産に関する研究. 第3報 投射光中散光の占める割合と個体群光合成. 日作紀 34: 570—582.
4. 仲林寛明・岩沢正美 1973. ナタネ同化器官の収量に対する貢献度. 日作紀 42 別号 1: 85—86.
5. 志賀敏夫 1967. 東北地方における直播菜種の栽培について. 第1報. 栽植密度について. 福島県農業試験場報告 3: 57—84.
6. THORNE, G.N. 1963. Varietal differences in photosynthesis of ears and leaves of barley. Ann. Bot. 27: 154—174.
7. ———— 1965. Photosynthesis of ears and flag leaves of wheat and barley. Ann. Bot. 29: 317—329.

Studies on Matter Production of Rape Plant (*Brassica napus* L.)

I. Changes with growth in rates of photosynthesis and respiration of rape plant population

Shinobu INANAGA and Atsuhiko KUMURA

(Faculty of Agriculture, The University of Tokyo, Tokyo)

Summary

Capacities of photosynthesis and respiration of rape plant population were investigated at various stages of development.

The rape plants, var. Norin No. 16, were grown under ordinary cultivating condition. CO₂ exchange of the population was observed under field conditions at two weeks intervals during the period from early stage of growth to full maturation. After the beginning of flowering, CO₂ exchange of the defoliated plants was also observed in order to estimate the extent of contribution of pods and stems to total CO₂ exchange in this period. Dry weight of each part of plant and surface area of leaves and pods were also measured at each occasion of measurement of CO₂ exchange.

The results obtained were as follows :

1. Dry weight of whole plant increased very slowly till the beginning of bolting and rapidly thereafter. The rapid increase of dry weight of whole plant was continued also in ripening period in spite of marked defoliation due to senescence.

2. Leaf area (per unit area of land) was small and almost constant during the winter season because the withering due to severe cold offset the leaf formation. Leaf area started to increase gradually after the end of February which is just before the beginning of bolting and then rapidly at the beginning of flowering. Leaf area attained to its maximum value (LAI 3.31) 30 days after the beginning of flowering and decreased thereafter because of withering and defoliation.

Surface area of pods increased markedly after the middle period of flowering.

3. During the winter season apparent photosynthetic rate of the plant population increased gradually whereas leaf area was unchanged. The photosynthetic rate increased rapidly after the end of February and attained to its maximum value (5.26 g CO₂/m²/h) 44 days after the beginning of flowering, and then it decreased.

4. The respiration rate of plant population increased with growth and attained to its maximum value (0.67 g CO₂/m²/h) 44 days after the beginning of flowering, and then it decreased slightly. Depression of respiration in later period of ripening was less than of photosynthesis, consequently respiration/photosynthesis ratio increased as the maturation proceeded.

5. The proportion of gross photosynthesis performed by pods+stems to total gross photosynthesis (gross photosynthesis performed by undefoliated plant population) began to increase at the middle period of flowering and reached a value of 76% at the middle period of ripening. Thereafter, the proportion continued to increase further till the end of ripening.

In ripening period, the pods possess relatively high photosynthetic activity and extensive surface area. Moreover, the pods were located at upper level in space of the population receiving plentiful sunlight. Therefore, most of the photosynthesis of pods+stems might be constituted by that of pods.

From the above-mentioned reasons, it was concluded that pods contributed considerably to matter production in the ripening period.