原 著

口腔内環境と歯周疾患との関連性に関する研究 (II)

とくに混合唾液のProteolytic activityおよび緩衝能について

田 中 正 忠*

3. 混合唾液緩衝能の測定成績

i) 各症別の成績

各症別、蛋白質分解能試験成績別で、それぞれのpH6.8~4.0に移動するに要した0.1 N Lactic acidの消費量をもって成績としたのであるが、その消費量の範囲は、1.7~0.2mlで、これを0.1 ml段階で分布度数を表わしてみると、表9のとおりになる。

これをみてみると、各症ともそれぞれの蛋白質分解能試験成績別に分けると、現わした度数は相当広い範囲に汎っているものや、狭い範囲に止まっているものやいろいろであって、甚だ不規則でまとまりがつかないが、症別のみでまとめてみると、図3のような分布曲線が得られた。

健常者の頂点は0.5mlで緩衝能の弱い側にあり、歯槽膿漏患者の頂点は1.0~0.8mlで健常者より緩衝能の強い側にある。歯肉炎患者は度数は少なくて1.0~0.6mlと幅広くなっている。

これら症別のLactic acid消費量の平均値を求めてみると、表10のごとくになり、健常者の平均値は0.74±0.03mlで、歯槽膿漏患者のそれは0.98±0.03mlであり、その他はこの間にあった。

これらの平均値の有意差検定を行ってみると表11のごとくになり、健常者と歯肉炎患者とでは有意差が認められなかったが、健常者および歯肉炎患者と歯槽膿漏患者とでは強度の有意差が認められた。歯槽膿漏患者の各症別間には有意差が認められなかった。

ii) 蛋白質分解能試験成績別の成績

蛋白質分解能試験の成績別に全被検者の成績をまとめてみると、その度数分布は表12のとおりになる。

なる。分布曲線は図4に示した。

平均値を求めてみると、表13のとおりで、強陰性者の平均値は0.73±0.02で、強陽性者の平均値は0.97±0.02で、健常者に比らべ強陽性者のほうが緩衝能が強く、その他はこの両者の間にあり、表13に示したように陰性者の強弱間に強度の有意差が認められ、また陽性者の強弱間も同様である。

図3 表9の図示

図4 表12の図示

* 大阪歯科大学口腔衛生学教室 (主任 柳生嘉雄教授)

表 9 各症別 Lactic acid の消費量分布度数

n = 623

Ninhydrin test 成績 症 別		0.1 N Lactic acid の 量 (ml)																計
		1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	11.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	
N	(－)	4	4	4	8	4		4		8	8	4	20	24	8	12	8	120
	(±)							4	4	4			4	4				20
	(＋)										4				4			8
	(≡)																	0
	計	4	4	4	8	4		8	4	12	12	4	24	28	12	12	8	148
	%	2.7	2.7	2.7	5.4	2.7		5.4	2.7	8.1	8.1	2.7	16.2	18.7	8.1	8.1	8.4	
G	(－)					4			4		12		4		4		4	28
	(±)							8				4	4		4	4		28
	(＋)								12	4	4		8	4	4	4		40
	(≡)								4	4	4		4	4	4			24
	計					4		8	20	8	20	4	20	8	16	8	4	120
	%					3.3		6.7	16.7	6.7	16.7	3.3	16.7	6.7	12.3	6.7	3.3	
Pi	(－)				3			3	6	3	3	6						24
	(±)				3		3	3		3	3		3		3			21
	(＋)	6		3	3		3	6	3		12		3	3		3		45
	(≡)	3				3	3			3	9	6	3	3				35
	計	9		3	9	3	9	12	9	9	27	12	9	6	3	3		123
	%	7.3		2.4	7.3	2.4	7.3	9.8	7.3	7.3	22.0	9.8	7.3	4.9	2.4	2.4		
Pii	(－)								4		2	2		2	4			16
	(±)			2		4		2	6	4	4	6	2	2	4			36
	(＋)	2						6	4	8	2	6	2					36
	(≡)			2	4	2	6	4	10	14	6	6	10					60
	計	2		4	4	6	2	12	24	26	14	20	14	4	8	2		148
	%	1.4		2.7	2.7	4.1	5.8	8.1	16.2	17.6	9.5	13.5	9.5	2.7	5.4	1.4		
Piii	(－)									16		4			8			12
	(±)										4				4			24
	(＋)																	
	(≡)		4	4			16	16	4	4								48
	(計)		4	4			16	16	4	20	4	4			12			84
	%		4.8	4.8			19.0	19.0	4.8	23.8	4.8	4.8			14.3			
合 計	11	4	11	13	9	33	40	37	55	45	36	23	10	23	5	0	354	

全陰性と全陽性者間にも強度の有意差が認められたが、陰性弱と陽性弱の間には有意差が認められなかった。

4. 実験成績の総括

以上の成績をまとめてみると、混合唾液の蛋白質分解能すなわち Hide powder を用い、Ninhydrin test

による成績は個人差があり、同一症のものでいろいろの成績を現わすが、各症別に 1 つの傾向を示した。

すなわち、健常者の殆んどは陰性であり、強度の歯槽膿漏患者の殆んどは陽性である。要するに歯周疾患のない口腔内環境では、その混合唾液は蛋白質分解能が無いのが通常であって、健常者で

表10 症別0.1N Lactic acid消費量の平均値

症 別	例 数	標本平均値 M ± m
健 常 者	148	0.74 ± 0.03
歯 肉 炎 患 者	120	0.71 ± 0.02
歯 槽 膿 漏 患 者	123	0.96 ± 0.02
軽 度	148	0.90 ± 0.03
中 等 度	84	0.98 ± 0.03
強 度	355	0.94 ± 0.01

表11 0.1N Lactic acid消費量の平均値の比較検定

	例 数	M	t s	有意水準
N	148	0.74		
G	120	0.71	0.083	Pr < 1.96
P				
Pi	120	0.96	6.11***	Pr < 3.29
Pii	148	0.90	3.81***	Pr > 3.29
Piii	84	0.98	5.71***	Pr > 3.29
P				
Pi	120	0.96		
Pii	148	0.90	1.66	Pr < 1.96
Piii	84	0.98	0.55	Pr < 1.96

表12 Ninhydrin testによる蛋白質分解能試験成績別にみた

0.1N Lactic acid消費量の分布度数

n = 623

Ninhydrin test成績 Lactic acid 消費量ml	陰 性				陽 性			
	(-)	(±)	計	%	(+)	(+)	計	%
1.7	4		4	1.3	8	3	11	3.5
1.6	4		4	1.3		4	4	1.3
1.5	4	2	6	2.0	3	6	9	2.8
1.4	11	3	14	4.6	3	4	7	2.2
1.3	4	8	12	3.9		5	5	1.6
1.2		3	3	1.0	9	21	30	9.4
1.1	7	17	24	7.9	12	20	32	10.1
1.0	14	10	24	7.9	19	18	37	11.6
0.9	11	11	22	7.2	28	25	53	16.7
0.8	25	7	32	10.5	26	19	45	14.2
0.7	16	10	26	8.5	6	12	18	5.7
0.6	24	13	37	12.1	13	17	30	9.4
0.5	26	6	32	10.5	7	7	14	4.4
0.4	24	11	35	11.5	12	4	16	5.0
0.3	14	4	18	5.9	7		7	2.2
0.2	12		12	4.0				0
計	200	105	305		153	165	318	

表13 Ninhydrin testによる蛋白質分解能試験成績別にみた
Lactic acid消費量の平均値

Ninhydrin test成績	標 本 平 均 値					有意水準
	例 数	M	±	m	ml	ts
陰 (－)	200	0.73	±	0.02		3.33***
(±)	105	0.85	±	0.03		
性 計	305	0.800	±	0.02		
陽 (+)	153	0.87	±	0.03		2.78**
(+)	165	0.90	±	0.02		
性 計	318	0.90	±	0.02		
陰 性	305	0.8				3.57***
陽 性	318	0.9				
(±)	105	0.85				
(+)	153	0.87				0.476
(+)	165	0.97				3.333

陽性を示すものは将来歯周疾患を発症する可能性があるといえると思う。

歯周疾患のある口腔内環境での混合唾液は陽性反応を示すものが増し、強度の歯周疾患すなわち歯槽膿漏症の強度のものに罹患している場合は殆んどが陽性反応を示す。特例として僅かに陰性のものがあるにすぎない。

健常者とこの強度の歯槽膿漏患者の中間に属する歯周疾患患者すなわち歯肉炎、歯槽膿漏の軽度のおよび中等度のものに罹患している口腔内環境のものは、各様の反応を呈し、健常者に比べ陽性反応のものがはるかに多く、またその症状の進行するにつれ、陽性反応を示すものが増してくる傾向があるが、陰性反応を呈するものとの間に有意差を認められるほどの差は見出し得なかった。

これらのうちこの歯周炎患者を治療、すなわち軽度の場合は歯石除去を行い、強度のものは盲嚢掻把を行ったのであるが、治療経過中の蛋白質分解能の変動を調べてみると、歯肉炎患者の全部は術前強陽性であったものが、術後一過性に陽性度は高まるが漸次その反応は弱まり、1ヶ月後に

は陰性となる。

このケースのものは予後は非常に良好で完全治癒をする。このケースに属するものは尿中ウロビリネン体、蛋白質、糖の反応も陰性で、単なる局所的原因で歯肉炎に罹患したものと思われる。

歯槽膿漏患者の大半は術前強陽性であったものが、術後一過性にその反応が弱くなるが、約10日間もするとまたもとの反応に戻ってくる。これらの尿検では糖や蛋白を証明し、ウロビリネン体も多少認められた。このケースのものは歯槽膿漏の成因は単なる局所的原因のみならず全身的原因にも由来していると思われ、盲嚢掻把により一時的に局所が軽快するので、蛋白質分解能反応が弱まるが、すぐもとの反応を示すようになる。尿中に糖や蛋白質の反応を示すのと一連の因果関係があり、口腔内環境と全身症状との関連性があるように思われる。所謂歯槽膿漏症に罹患し易い口腔内環境のものといえるのではないかと、予後も思わしくないものが多い。

特異な例として術後かえって蛋白質分解能反応が強くなり、そのまま1ヶ月の試験期間持続するものがある。このケースのものも尿中に異常物質

が認められた。

この蛋白質分解能成績と混合唾液の緩衝能とは関連性があり、症状とは関係なく、どの症状のものであっても；陰性反応を示したものより、陽性反応を示したもののほうが、平均では緩衝能が強く、同じ陰性あるいは陽性内でもその反応の強弱によっても差があり、強陰性よりも弱陰性のほうが緩衝能は強く、また弱陽性より強陽性のほうが強力である。ただ弱陽性と弱陰性間には差がなかった。

この成績からみると、混合唾液の緩衝能と、蛋白質分解能との間に判然とした関連が認められるのである。

蛋白質分解能成績と関係なく、単に症状別で混合唾液緩衝能を調らべてみると、その平均値では、健常者とそれに近いものすなわち歯肉炎患者との間には差がなく、歯槽膿漏患者に比らべて弱く、歯槽膿漏患者のほうが強い。歯槽膿漏患者の各症間には差がなかった。

以上の成績からみて歯周炎に罹患している口腔内環境では、混合唾液の蛋白質分解能はその症状が増悪するにつれ陽性者が増してくる。すなわち歯周炎と混合唾液の蛋白質分解能との間には一連の関連性があると思われ、この分解能の成績と混合唾液緩衝能とも関連性がある。すなわち蛋白質分解能の高い唾液は緩衝能は強力である。従って蛋白質分解能の陽性を示すものの多い歯槽膿漏患者はその他のものより混合唾液緩衝能は強力である。

歯周炎治療経過において、蛋白質分解能が陰性に変動するものは、単純性症状で、その治療経過も良好であるが、陽性を続けるものは、局所的だけでなく、他臓器疾患の関連性あるものと思われ、治療経過も思わしくなく、歯槽膿漏に罹患し易い口腔内環境にあるものといえると思われる。

III. 考 按

歯の硬組織疾患の1つである齲蝕症に対しては古くからHadley & Bunting(1933)¹⁴⁾、Hadley(1933)¹⁵⁾らをはじめ Fosdickら(1937)¹⁶⁾、Snyder(1940)¹⁷⁾、Rickles(1952)¹⁸⁾、(1953)¹⁹⁾、Wach(1943)²⁰⁾らがCaries Susceptibility あ

るいは、Caries activity なる語を用いてその試験方法をいろいろと発表して来ている。Appleton(1950)²¹⁾は彼の著書に口腔内疾患とくに齲蝕に関してはその破壊因子と抵抗因子との両因子のつりあいが保っている場合とそうでない場合との両面からみて、病状の進行度が決定されるはずであるから、常に破壊因子が抵抗因子よりその力が大であるときは、急速にしかも重症として進行中の疾患が現われている証拠であることを述べている。前述のCaries activity testなどを考え出した人らも、大方この理論に立脚し、或は破壊因子を、*Lactobacillus acidophilus*だと考えた人は¹⁶⁾その菌数を数えることによって破壊因子大なる条件の1つとみなしており、醸酸が主因と考える人たち¹⁵⁻¹⁹⁾はその酸量や、醸酸能力をしらべることによって破壊因子大とみなしている。このような理論にもとづいて口腔内2大疾患の他の1つである歯槽膿漏症を考えてみると、同じようなことが言えるはずであるし、またその破壊因子を何であるかときめてかかることによって自ら、それを主にした環境検査試験が生れてくるはずである。

残念乍ら今日までに歯周炎に関する限り、この疾病のSusceptibilityやactivityについての考え方をまとめたものは数少く、真下ら(1962)¹²⁾²²⁾、細川(1960)²³⁾をのぞいては他に報告をみない。その反面Schultz-Hautt & Scherp(1955)²⁴⁾やRoth and Meyers(1956)⁸⁾、Roth(1957)⁷⁾およびThonard and Scherp(1957)²⁵⁾らによると、いづれも口腔内に、なかんづく歯肉嚢内から多数の微生物を分離し、とくに歯肉に炎症を伴う場合にはそれからの菌の大部分に蛋白質溶解酵素を産出する能力を有することを報じ、なおそれらの多くは、CollagenやHide powderを溶解することを報告している。

また歯槽膿漏の症状からみて病巣内には数多くの蛋白質溶解菌が棲息していることが想像出来るのである。したがって歯周炎の原因が何であるかはなかなか解決の困難な問題であるが、その病気が進行して行く途上あるいは、もともと局所が何かの影響によって抵抗減弱を来したときに直接破壊的に働く因子であるところの蛋白質溶解酵素が

多いか少いかは何といってもその疾病の活性度と密接な関係があるといわねばならない。だから、それらの菌が混入している人の混合唾液がどのような程度に Hide powder や Collagen に対して破壊的に働いているかをしらべることこそ必要なことであり、また歯周炎などの軟組織疾患の活動性をしらべる理にかなった方法と言はねばならない。

Schultz-Haudt and Scherp (1955)²⁴⁾は歯肉から採取した材料を混合培養しその培養物が、Collagenolytic activity をもっているものは、慢性歯肉炎患者(19例中13例)、臨床的正常な歯肉からは21例中3例しかなかったと報じている。Roth & Meyers (1956)⁸⁾は Hide powder を plate medium に応用して、人の口から、60例中57例に Proteolysis を営む微生物の分離に成功したと報じかつ細菌学的見地からいろいろ詳細な検査をしている。その他の先人の成績をみても大体歯肉炎や歯槽膿漏の歯肉縁からは相当率の Proteolytic organisms を分離している。このような成績からみて真下ら(1962)¹²⁾は最初に Periodontal disease activity test と云う語を提唱するにあたり、その activity の本態に唾液中の Proteolytic activity をもって検討し、ついで細川(1960)²³⁾も Azocoll powder を自製してその分解程度をしらべそれによって、歯周炎を有する人の唾液とそうでない人の唾液との間に相当なひらきをもって分解能力の差を示している。

私はこれらの先人の成績からみて Hide powder を分解する程度をもっと詳細にしかも生化学的な、Analysisを行うために、その分解能を Ninhydrin test によってしらべ、Electrophotometer によってその正確度を期待したのである。細川(1960)²³⁾は唾液採取を起床時直後に行っており、私は実験方法の項で述べたように、昼食前に採取している。細川の成績は Azocoll powder の分解すなわち反応時間が大へん短く、蛋白質分解能が高度で、睡眠中に増殖し充分活力をもった微生物を全部集めて反応をみていることになるから、有用且便利なテスト法として推薦出来るかもしれないが、それだけに他条件に支配される心配がないでもない。例えば実験時期が冬と夏の相違或は食餌の何かの

因子による酵素活性賦作用などを見逃がすわけにはゆかない。そこで私は食餌の制限をもうけ、かつ朝食後すなわち自然に機械的作用と相俟って口腔内微生物数の激減する時期に、更に歯磨剤と歯ブラシを利用して徹底的に口内を清掃させ、それでお且口内の盲嚢や歯間乳頭の深部に残存する所謂口腔内常在微生物の残存したものが再び繁殖し始めて来た頃をねらって唾液採取をしたのである。しかもそれらの弱能力であるはずの微生物を混入した唾液に直接 Hide powder を作用させてから培養することにより、唾液と Hide powder だけを栄養に棲息する微生物がどの程度 Hide powder を分解するかをしらべ得たのである。そしてその Assay からは、極めてわずかな 0.01 ml の反応物を取り出して Ninhydrin でしらべたために相当の正確度が期待出来るものと考えている。

成績の総括的なものを細川の Azocoll test と比較すると、Azocoll test 陰性者が健常者は 75%、歯肉炎患者は 0%、歯槽膿漏患者は 40% となっておるのに反し、私の成績ではむしろ、健常者が極端に多くて 95%、G 群は 47%、P 群は 31% (Pi: 37%, Pii: 35%, Piii: 14%) となっており、反対に陽性者を比較すると Azocoll test では、N 群が 25%、G 群が 60% となるのに反して私の Ninhydrin test による蛋白質分解能試験では N 群はわずか 5%、G 群が約半数をしめ 53%、P 群が最も多く 69% (Pi: 63%, Pii: 65%, Piii: 86%) をしめしている。このように Azocoll test では G 群の方が P 群より陽性者が多いのに反し、Ninhydrin test の方では G 群より P 群の方が高率を示している。これは唾液の採取要領に差があるものと考えられ、前者は起床時直後という人間にとっては一番口腔内細菌数の多い、繁殖度最高の時期の唾液であるから G 群などは特に P 群にくらべて活力の高い微生物が症状に応じて多く存在していることがうなづけるのであるが、後者に於ては歯口の充分な清掃を行った後、口腔内で微生物が Logarismic Phase に入った頃の唾液を採取しており、なお Ninhydrin test に出来るだけ支障を来さないように食餌の制限をもうけた結果、正常な口内条件をもつ人は食後の歯口清掃の影響をう

けて殆ど微生物数も少なく、活性も低調な状態であるように思われる。その反面盲嚢の深い人や進行中の症状の多い人は歯口清掃の実があがらずむしろ局所が刺戟によって滲出物などを多く分泌したため、本来の唾液だけでなしに、浸出物が栄養の一部を司っているようにも思われる。いづれにしても盲検値を差引いた価によって、陰、陽性を判定しているわけであるから、症状の軽重、浸出物の多少などから直接に受ける影響が成績にあらわれているのでAzocoll testより正確で歯周炎活性の探索には、より信頼すべきtestとしてNinhydrin testを提唱することが出来る。

次にこれの臨床的応用の成績であるが、1回で全顎施術及び処置の出来るケースがなかなか見当たらないので症例はわづかであるが大体に於て、術前との成績からみて、3つの型に唾液の蛋白質分解能が分けられるようである。すなわち

- a. 術後急激に上昇曲線すなわち反応が強まり、4～5日で下降するが、徐々にそのまま下降曲線を描いて遂には30日頃になると（一）になってしまうもの
- b. 術後急激に下降し反応が弱まってしまうが、2～3日頃から再び上昇曲線を示して遂には術前と同じ程度の反応能力の線までもどってしまうもの
- c. 術前よりもだんだんと上昇し下降する傾向は一度も示さないで、遂には術前よりも上昇した部位でとどまってしまうもの。

以上の3つの型であるが、a. に属するものは歯肉炎系のものが多く、しかも尿中に何の異常成分も認められず、臨床的健常を示していた人たちの成績に於てみられたが、b. およびc. に属するものは尿中に異常成分が大なり小なり認められたものに多い。このような事から見ると口腔内にひそむ蛋白質分解能を有する微生物の消長も単に局所の手術などによる機械的な方法によって案外簡単に影響をうけてしまうようなものがある反面、なかなか敏感にその影響をうけられないで、切角の手術も効を奏せずもとの状態にもどってしまうものがあることを知らされる。しかも後者のものには尿中に異常物質を多く認められる例からみて、

局所の蛋白質分解能を有する微生物の消長すら全身の諸要因に大きく影響されているものようである。

この成績については他に文献がみあたらないので比較できない。

以上のことからして、混合唾液蛋白質分解能をNinhydrinによってtestすることによって、陽性反応を示した場合は歯周炎疾患に罹患するか或いはその進行性があると見做すことができ、とくに強陽性の場合にはなお増悪症状をとるものと判定できるのではないか。陰性の場合には健常であるか、あるいは歯周炎疾患に罹患していても、その進行性は弱いものと判定することができる。

私はなおこの成績を裏付けるために、混合唾液の緩衝性をしらべたのであるが、唾液の緩衝能についてはCariesとの関連性については先人の業績がある。口腔内混合唾液中には酸産生能とalkali産生能とが常に働き、混合唾液の固有pHは常に動揺しているのであるが、これを緩衝する作用があるとして、Marshall(1915)²⁶⁾は1/200N HClで、稀釈した唾液を滴定し、Rea & Clegg(1948)²⁷⁾やTurner, Scribra & Bell (1954)²⁸⁾などは0.001N HClで、Sullivan & Storvick(1950)²⁹⁾らは0.01N HClで滴定して、標示薬を用いてその成績を判定している。そして緩衝能の大なるものは齶蝕活性は陰性であるといっているのである。またLactic acidを用いて検定したものに、Muracciole (1955)³⁰⁾があり、彼は標示薬を用いたのであるが、Dreizen, Mann, Cline & Spies (1946)¹³⁾らは0.1N Lactic acidを用いて滴定し、その都度pHを測定しつつ、pH4に下降するまでの量を表示する方法を発表している。

私は実験に当りこのDreizenらの方法が最も正確であるので採用した。

これらの人々はそれぞれの方法で実験例について混合唾液の緩衝能を測定し、齶蝕と関係があるとして、齶蝕活性陽性の者は緩衝能が弱いと述べているのである。また寺田(1941)³¹⁾は妊婦の混合唾液について測定し、妊娠期および授乳期は緩衝能は弱いと述べ、柳生(1959)³²⁾はこれを詳細に調べ、妊婦の混合唾液緩衝能は弱くなると

もに妊娠月の差が判然と現われるといい、藤本（1960）^{3）}は歯槽膿漏患者の緩衝能は強いと述べている。

これらの人々は個人差はあるが平均値ではその傾向を表現し得るといい、Reaら（1948）^{27）}も測定値に変動はあるが、個体毎に個有の値を決定することができるとしている。

このように混合唾液の緩衝能の強弱が、齲蝕発生と関係を持ち、藤本（1960）^{3）}の述べているごとく歯槽膿漏患者としからざる者との間にも差異が認められるのである。

Caries activity test にこの Dreizen らの緩衝能測定法が用いられているのであるが、歯槽膿漏の activity については、藤本（1960）^{33）}が述べた以外この緩衝能についてはあまり述べられていない。私はこれを確かめるために実験を行ったのであるが、矢張り歯槽膿漏患者は健常者に比べ混合唾液の緩衝能は強いという成績を得たのである。

そこで先の蛋白質分解能試験の成績との関連性について調べてみたところ、その test 陰性の場合には緩衝能は弱く、陽性の場合には緩衝能は強いことが確かめられた。すなわち蛋白質分解能試験成績との関連性があることがわかった。

すなわち混合唾液の緩衝能の強弱の機転の 1 つに混合唾液の蛋白質分解能の強弱が挙げられるのではないだろうか。

そこで歯槽膿漏症の混合唾液の一般的性状として、健常者に比べ蛋白質分解能および緩衝能が強いということがいえるとともに、この環境を知ることによって、歯周炎の活性度を test することができると思う。

IV. 結 論

1. 人の混合唾液と Hide powder とを混合して培養し、Ninhydrin test を応用して、その蛋白質分解能も知る方法を考案した。
2. 実験に使用した唾液は従来の起床時採取法の原則に従わず、特定の条件を設けて昼食前に採取する方法を考案した。
3. 蛋白質分解能を Ninhydrin によって test する成績の判定基準を明らかにした。

4. 歯周炎患者の唾液と、健常人唾液との間に明らかに、蛋白質分解能の差が認められ、症状に正比例し歯周炎疾患の場合は蛋白質分解能が強いことが判明したので、歯周炎活性度試験の 1 つとして役立つ方法であると信ずる。

5. 臨床的に応用することにより、歯周炎の病巣に施術した歯石除去手術や盲嚢搔把手術の前後に唾液の蛋白質分解能を test すると次の 3 つの型があることがわかった。

- a. 術後やや反応が高まるが、4～5日頃から弱まり、除々に下降曲線を示して30日頃には陰性に移行するもの
- b. 術後から急に減弱し3～4日で再び上昇して結果は30日頃、術前と同じレベルまでもどってしまうもの
- c. 不規則でむしろ術前より上昇してしまうもの

以上の 3 型で a. は尿中に異常成分を認められず、b. および c. は殆ど全例に尿中に異常物質が検出出来た。

6. このことによって、混合唾液蛋白質分解能と他臓器異常との間に関連性があるのではないかと思う。また臨床に应用することによって、術後の経過の予後の判定に役立つのではないかと思う。

7. また混合唾液緩衝能とも関連性を持ち、蛋白質分解能の強い唾液は緩衝能も強く、歯周炎とくに歯槽膿漏患者の緩衝能は強い。

稿を終るに臨み終始御指導を忝うした柳生嘉雄教授と御助力いただいた真下彰助教授に深甚の敬意と謝意を表します。

引 用 文 献

1. Forsher, B. K., Paulsen, A. G., Hess, W. C.: J. Dent. Res., 33, 444, 1954.
2. 大橋良昭: 歯界展望, 12(6), 233, 1955.
3. 藤本治国: 歯科医学, 22(7), 2624, 1959.
4. 川上進也: 日本口腔科学会, 7(4), 532, 1958.
5. 川上進也: 日本口腔科学会, 7(4), 518, 1958.
6. 渡辺義房: 歯科医学, 24(2), 348, 1961.
7. Roth, G. D.: Oral Surg., Oral Med.,

- Oral Path., 10, 1105, 1957.
8. Roth, G.D. and Meyers, H.I.: *ibid.*, 9, 1172, 1956.
 9. Schatz, A, et al: *Proc. Penn. Acad. Seience*, 28, 44, 1954.
 10. 大西正男: 齒科学雑誌, 6, 273, 1949.
 11. Schklair, J.L., et al: *Int, Assoc, De Dent. Res.*, Reprinted Abstract, 116, March, 1956.
 12. 真下 彰, 他: 口腔衛生学会雑誌, 12(3, 4) 158, 1962.
 13. Dreizen, S., Mann, A.W., Cline. J.K., & Spies, T.D.: *J. Dent. Res.*, 25, 213, 1946.
 14. Hadley, F.P. & Bunting, R.W.: *J. Dent Res.*, 13, 198, 1933.
 15. Hadley, F.P.: *J. Dent. Res.*, 13, 415, 1933.
 16. Fosdick, L.S., et al: *J.A.D.A.*, 24, 1275, 1937.
 17. Snyder, M.L.: *J. Dent. Res.*, 19, 349, 1940.
 18. Rickles, N.H.: *J. Dent. Res.*, 31, 467, 1952.
 19. Rickles, N.H.: *J. Dent. Res.*, 32, 3, 1953.
 20. Wach, E.C. et al.: *J.Dent. Res.*, 22, 415, 1943.
 21. Appleton, J.L.T.: *Bacterial Infection in dental Practice*, 462, 1950.
 22. 真下 彰, 他: 口腔衛生学会雑誌, 12(1), 45, 1962.
 23. 細川哲良, : 齒科医学, 23(5), 1446, 1960.
 24. Schultz-Haudt, S.D. & Scherp, H, W.: *Proc. Soc. exp. Biol. Med.*, 89(4), 697, 1955.
 25. Thonard, J.C. & Scherp, H, W.: *Proc. Soc. exp. Biol. Med.*, 96, 165, 1957.
 26. Marchall, J.A.: *Amer. J. Physiol.*, 36, 260, 1915.
 27. Rea, J. & Clegg, C.T.: *J. Dent, Res.*, 28, 589, 1948.
 28. Turner, N., Scribra J.H. & Bell, J.T.: *ibid.*, 33, 56, 1948.
 29. Sullivan, J.H. & Storvick, C.A.: *ibid.* 29. 165, 1950.
 30. Muracciole, J.C.: *ibid.* 29. 387. 1955.
 31. 宇田正一: 口腔病学会雑誌, 15(2), 81, 1941.
 32. 柳生嘉博: 齒科医学, 22(6), 2454, 1959.
 33. 藤本治国: 同 誌, 22(7), 2624, 1959.

STUDIES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ENVIRONMENT IN ORAL CAVITY AND THE PERIODONTAL DISEASES, ESPECIALLY ON THE SALIVARY PROTEOLYTIC ACTIVITY AND THE BUFFER CAPACITY

BY

Masatada TANAKA

Department of Dental Health, Osaka Dental College
(Senior Prof. : Y. Yagiu)

One of the causative agents the periodontal diseases could be induced sometimes by the changes of circumstances in oral cavity, and it might be vice versa, so many investigators have already informed on this sort of study. While biochemical studies relating to this matter are being active in these days, subsequently, it is reported that the pH of saliva or salivary ammonium amount are closely related to the periodontal diseases.

On the dental caries which is another one of the 2 largest diseases in oral cavity, the studies on the dental caries activity have been briskly undertaken together with the investigations for the disintegrative mechanisms and the resistant factors, besides, it could be found few works on the periodontal disease activity.

The author just then interested in this problem on the "Periodontal disease activity", of which term had been proposed by Mashimo et al (1962), and the salivas of periodontal diseases' patients has been examined bacteriologically and biochemically. Consequently, it was observed that the

symptomatic degree of periodontal disease closely related to the activity of proteolytic enzymes come from the oral microorganisms indigenous to saliva, moreover, this fact was verified by means of the statistical observation.

The results could be summed up as follows :

1. The testing procedures for the proteolytic activity of human contaminated saliva was devised due to employing the hide powder for substrate and measuring the results by ninhydrin test. The experimental salivas were collected with particular terms at just before lunch, of which procedures were not followed in the former steps.
2. It could be recognized that there were distinctly discrepancies between the salivas of normal controls and of the periodontal diseases, and that the degree of proteolytic activity was directly proportional to the symptomatic status of periodontal disease.
3. According to the clinical experiments employed this technique, the salivary

proteolytic activities were classified to 3 different types as follows :

- A) After treatment, the activity increased for 4 to 5 days, gradually decreased after that, and it became negative by the 30th day.
- B) After treatment, it rapidly decreased for 3 to 4 days, increased again and was restored up to the former level.
- C) This type showed irregular curve and rather increase after operation.

All cases in A-group checked no abnormal components in the urine, B and C-groups showed various abnormal components in the urine.

4. It was observed the relationship of this

activity with the salivary buffer capacity, namely, the saliva of the high proteolytic activity demonstrated large buffer capacity, generally the pyorrheas' saliva showed the large capacity.

Judging from these results, it could be trusted that examining the proteolytic activity in saliva is useful as one of the periodontal disease activity tests. Furthermore, it might be imagined that this procedure is helpful for learning the progress and prognosis after operation for the periodontal diseases, which related with the systemic conditions, especially, with another organic anomalism.