原 著

障害児の口腔衛生管理

——オペラント条件付け原理を用いた精神遅滞児 のブラッシング指導(1)——

河 田 順 子* 高 松 祥 子*
前 田 佳 子* 武 田 康 男*

概要：精神遅滞児，自閉症児，多動児などの障害児の口腔衛生のために，ブラッシングの自立は，非常に重要である。

本研究の目的は，異常行動を持つ精神遅滞児のブラッシング自立に対する訓練システムの効果を評価することであった。ブラッシングの自立の為に，オペラント条件付け原理を応用したブラッシングプログラムを含む訓練システムを作り，4歳3カ月から8歳9カ月までの精神遅滞児7名を訓練した。

以下の結果を得た。

- (1) 訓練により，3名の対象児は，ブラッシングの自立化を獲得した。
- (2) 全対象児が，ブラッシング自立度を改善させた。
- (3) 訓練前，7名の口腔清掃指数は平均4.1であり，訓練後1.4となった。
- (4) カリオスタットに関しては，訓練前6名が卅であったが，訓練後1名卅，4名十，1名一であった。

我々は，母親を訓練者とし，家庭での訓練を強調する本システムは，精神遅滞児のブラッシング自立化に有効な方法であると考えてる。

緒 言

心身障害児の口腔衛生管理は，歯科医療の中でも重要な領域の一つである。脳性麻痺児などにみられる嚥下・咀嚼運動の障害や異常な全身パターン，自閉症児や精神発達遅滞児などにみられる著明な理解の低さは，口腔清掃状態を悪化させ，う蝕の多発化や歯周疾患の重症化をひき起こしている。近年全身麻酔法，静脈内鎮静法，笑気吸入鎮静法が導入され，これらの歯科疾患に対して充実した治療がなされてきたが，良好な口腔清掃状態を維持するためには，効果的なブラッシングの自立と習慣化が重要であることは，普通児と変わりはない。

ブラッシング自立化のため，我々は障害の性質を，2つのグループに分類している。第1のグループは，対人関係に障害を持つ集団で精神遅滞児，自閉症児，多動児

などを含み，第2のグループは，主に運動機能に障害を持つ集団で脳性麻痺児などを含む。2つのグループに対して，それぞれに適当な指導法を用いて，ブラッシングの自立をはかることが必要である。

現在，精神遅滞児に対するブラッシング自立の有効な手段は開発されていない。わずかに Morris ら(1977)¹⁾，Horner ら(1975)²⁾が，オペラント条件付けの原理を用い，ブラッシング行動の形成を試みているのみで，我が国では全く試みられることがなかった。オペラント条件付けの原理は，Fuller(1949)以来，精神遅滞児(以後MR児と略す)の訓練に多数用いられている³⁾。本原理は、『行動に随伴する刺激によって，その行動の変容が行われる。』ことであり，その中には，陽性強化の原理(行動のあとに，陽性強化刺激を随伴させると，その行動の生起が高まる。)，モデリングの原理(行動を模倣し，

* 北九州市立総合療育センター・歯科

* Division of Pedodontics, Center for Developmental Medicine and Education in Kitakyushu City
昭和56年8月17日受付

新しい行動を学ぶ。), 継続的接近の原理 (目標行動水準間を細かいステップに分けて, ステップごとの強化を通じ, 目標の行動に近づいていくこと。) などが含まれる²⁾。我々は, オペラント条件付け原理が, MR 児に対し, 複雑な一連のブラッシング行動を学習し自立するうえで, 有効な指導法ではないかと考えた。そこでオペラント条件付けの原理に基づいたブラッシングプログラムを中心とする指導のシステム化を試み, 行動異常を伴う MR 児のブラッシング自立化に対する同原理ならびに, システムの有効性を検討したので報告する。

対象と方法

対象児

行動異常を伴う中度から重度の MR 児, 男児 6 名, 女児 1 名合計 7 名を対象とした。対象児の年齢は, 4 歳 3 ヶ月から 8 歳 9 ヶ月まで平均年齢は, 6 歳 8 カ月であった。7 名の暦年齢, I.Q., 精神発達, 行動のプロフィールは, Table 1 に示すとおりであり, 対象児は, 全員, 自立したブラッシングができず, 母親の介助に対しては, 激しい抵抗を示していた。

指導システム

対象児は, Fig. 1 のシステムに従って指導を行った。最初に, Table 2 に示した 3 項目について検査し, 更にブラッシング自立の状態を, 1~V の 5 段階にランク付けし (Table 3), ブラッシング行動の自立度を評価した。以上の 4 項目の資料をもとに, 各対象児に即したプログラムの決定や変更, 強化物の選択などを行った。更に, 母親に対しカウンセリングを行い, 日常生活全般にわたる自立化と子どもへの接し方について指導した。その後, ブラッシング学習プログラムに従い, 主に母親を訓

練者として, 家庭で訓練を行った。我々は, センターで訓練法の指導及び家庭での訓練結果を判定した。

学習プログラム

訓練は, Table 4 のプログラムに従って行った。プレステップは, 以下の 4 項目を目的とする。

- ① 指導担当者 (歯科衛生士) と, 対象児間にラポートを成立させる。
- ② 指導担当者と母親間にラポートを成立させる。
- ③ 母親にオペラント条件付けの実際の手続を理解させる。
- ④ 対象児を訓練場面に慣らす。

プレステップでは, 母子分離, アイ・コンタクト, 身体模倣, ベグボード遊びの中から対象児にあわせて選択した。対象児の母子分離ができていない場合, 我々と子どもとの間には指導を行うための充分な関係が生じない。アイ・コンタクトは, 対象児とのコミュニケーションを得るためのプリミティブな手段として我々が採用しているものである。子どもの名前を呼び, 同時に手で対象児の顔を指導者の方へ向ける。その際なんらかの陽性強化を行っている。身体模倣では, 挙手, 起立など簡単な行動を模倣し行動を学習させ, 集中力がない子どもには, ベグボードを用いて, 注意の集中をはかるように試みている。

ブラッシングステップは, Morris ら¹⁾と Horner ら²⁾のステップを修正し, 8 つのステップに分けた。歯列は 8 分割し, そのためステップ 4 は, 更に 4a~4h に細分化した。学習プログラムを通じて, 言語賞讃, 拍手, 頭なげなどの社会的刺激を陽性強化として用い, 言語指示で行動が生起しない場合は, 身体誘導による促進を行った (Fig. 2)。一方望ましくない行動は, 黙殺, 無視す

Table 1 Profile of the subjects

Case	Sex	C. A.	I. Q.	Motor*	Exploration*	Sociability*	Selfcare*	Language*	Profile
A	♂	4y 3m	51	3y 6m	3y 0m	3y 0m	3y 6m	3y 0m	M R, hyperkinetic,**
B	♂	5y 7m	below 36	6y 0m	3y 0m	3y 0m	3y 0m	5y 0m	M R, hyperkinetic,**
C	♂	6y 7m	below 36	6y 6m	6y 0m	3y 0m	4y 6m	3y 0m	M R,**
D	♀	7y 3m	below 27	5y 7m	4y 9m	2y 8m	3y 4m	2y 6m	M R, echolalia, capricious,**
E	♂	7y 3m	39	3y 6m	3y 0m	3y 9m	4y 0m	5y 0m	M R, hyperkinetic,
F	♂	7y 9m	41	6y 0m	3y 0m	3y 0m	4y 6m	4y 6m	M R, spastic paraplegia, phobia,
G	♂	8y 9m	below 23	5y 4m	3y 8m	2y 3m	7y 9m	0y 9m	M R, excitable, capricious, altered voice,**

* from Tsumori's diagnostic developmental test for infants and children

** a lack of relating to other people

Fig. 1 System for teaching personal tooth-brushing

行動と強化の間に関係が成立したとみなし次のステップに進む。90%に満たなければ、次週も同一のステップを実施させる。家庭での訓練は、1日1回として、通常のブラッシングとは、別に設けた。通常ブラッシングは、母親にパス法を実施させた。

結 果

プレステップ、ブラッシングステップの学習過程を、Fig. 4に示した。ベースラインは、指導前に言語指示のみで生じたブラッシング行動反応を示す。指導の結果、終了児3名(B, F, G児)、継続中1名(C児)、中断3名(A, D, E児)であった。このうち終了児3名の訓練経過について概略する。

<症例 1: B児> Table 1に示すように知的な発達遅れと行動に問題があり、母子分離ができていないケースであった。学習プログラムは、母子分離から始めた。言語賞讃を陽性強化物として用い、プログラムの開

Table 2 Initial assessment

A. Baseline
Oral baseline O H I, caries activity test
Brushing behavioral baseline and degree of independence
B. Mental development and parent-child relationship
Diagnosis of development P B T, D A M figure test
Tsumori's diagnostic developmental questionnaire for infants and children
Diagnosis of relation between parent and child TK-diagnostic questionnaire for parent-child relationship
C. Function of the arms

Table 3 Degree of personal brushing behavior

I. Refuses.
II. Needs help to brush.
III. Brushes alone but ineffectively.
IV. Brushes effectively when directed.
V. Brushes alone and effectively.

ることを原則とした。ブラッシングは、スクラッピング法を用い、ステップ8までは、各ステップが正しく行えた時、即時強化を行い(連続強化スケジュール)、ステップ8到達後は、ブラッシング行動に関してのみ、定率強化スケジュールにかえ、2ステップごとに強化し、更に3ステップごとと間隔を開いて強化した。Fig. 3に示したように、センターで担当者が1ステップを母親に指導し、一週間家庭で母親に実施させる。結果は、センターで判定する。10回の試行で成就率が90%以上であれば、

始から4カ月でステップ8にまで進んでいる。

<症例 2: F児> 社会性を始めとして、すべての項目に発達の遅れがみられ、母親との間にさえ、アイ・コンタクトがとれなかった。強化物は、言語賞讃を用い、ステップ1から始め、ほぼ7カ月でステップ8に達した。

<症例 3: G児> とくに社会性と言語に遅れが著しいMR児である。ブラッシング・ベースラインの評価では、ハブラシを指先でつまんで口へ運ぶことは可能であった。ステップ2から始め、ほぼ5カ月でステップ8に達している。

中断例3名のうち、D児とE児は、病弱のため1週1回の訓練にのれず、訓練が長期化し、これ以上の成果が期待できなかった。A児は、母親が我々が指示する訓練法どおりに、スモール・ステップに従った訓練を行わず中途中断した。

Table 4 Tooth-brushing program

Step	Explanation
pre-step	mother-child separation, eye contact, modeling
1	Stand in front of the mirror.
2	Take brush and turn bristles to one's face.
3	Take brush and turn back to one's face.
4a*	Brush the labial surfaces of upper anterior teeth.
4b	Brush the labial surfaces of lower anterior teeth.
4c	Brush the surfaces of one side of lower posterior teeth.
4d	Brush the surfaces of the other side of lower posterior teeth.
4e	Brush the surfaces of one side of upper posterior teeth.
4f	Brush the surfaces of the other side of upper posterior teeth.
4g	Brush the palatal surfaces of upper anterior teeth.
4h	Brush the lingual surfaces of lower anterior teeth.
5	Put down the toothbrush.
6	Fill the cup with water and rinse one's mouth.
7	Rinse the toothbrush and cup.
8	Put the toothbrush and cup in the proper place.

* 4a-4h: Brushing must be performed ten times at each step.

Fig. 2 Physical guidance

口腔内ベースラインの変化

カリオスタットによるウ蝕活性度テストの結果, 指導前卅の5名は, 指導開始後卅はなくなり, 卅1名, +3名, -1名に変化した(Fig. 5)。

O.H.I. では, D.I. のみ評価を行い, 指導前平均値4.1が, 指導後平均値1.4に改善した。

ブラッシング自立度の変化

指導前自立度Ⅰの5名は, 開始後自立度Ⅱが1名, Ⅲ

Fig. 3 Flow of training

が3名, Vが1名に改善, 又自立度Ⅲの2名は, 自立度Vに改善した(Fig. 6)。

親子関係の検査

親子関係では, とくに母子関係について検討を加えた。Fig. 7は, 対象児7名の田研式親子関係診断テストの平均値をコントロール群として選んだ普通児7名(暦年齢5歳9カ月から8歳5カ月)の平均値と重ね合わせ, 比較したものである。コントロール群は, 対象児と

Fig. 4 Graph of steps performed. (Δ), eye contact; (O), modeling; ($\square$), reply; a is training with regular brush and b is training with electric brush.

ほぼ同年齢層の著明な行動異常を示さない普通幼稚園、普通小学校へ通うものを選んだ。対象児群は、溺愛、盲従、干渉が著明で、服従、過保護傾向を示している。個々のケースをみても、バランスのとれた母子関係を示すものはみられず、子どもへのかかわり方も不一致、矛盾傾向を示している。B児については、指導終了後、再び親子関係テストと津守式発達検査を行った。4カ月の指導

期間に社会性、生活習慣に暦年齢以上の発達がみられ、母子関係にも、積極さがみられるようになった(Fig. 8)。

考 察

オペラント条件付けの原理は、最近歯科学の領域にも紹介され⁴⁾、主に治療場面に適用されている⁵⁾。しかしMR児のブラッシング自立のために用いられた報告

Fig. 5 Change in Debris Index and Caries activity

Fig. 6 Degree of personal brushing

は^{1,2)}、わずかであり、しかも身辺自立に重点がおかれ、歯科学の立場から口腔清掃効果についての検討はなされていなかった。この点に留意して、本研究結果を考察する。

1) B, F, G 児は、ほぼ 5 回のセッション(センター

Fig. 7 Comparison of experimental with normal in mother-child relation test. The distance from the central point expresses the score of each item, the higher the score is, the greater the problem of mother child relationship.

での判定)で 4a のブラッシングレベルに到り、4a 以後、学習プロセスは、急傾斜で上昇しステップ 8 に到達した。一方、A, C, D, E 児は、ほぼ 4a 以前のステップにとどまっている。プレステップで 7 名ともラポートがとれているにもかかわらず半数の対象児が、ブラシを持つまで(1~3)とブラシで磨く(4a~)ステップ間が順調に移行していない。その原因として以下の点が考えられる。

① small-step の原理からみて、プログラムの細分化が適切でない。この点に関しては、同時に強化物についての検討も必要であり、今回の訓練では、主に言語賞讃を用いたが、他の強化因子の採用も含めて今後更に研究を進展させたいと思う。

② 対象児の上肢機能の発達の未熟さ。Kimmelman によれば⁶⁾、小児が効果的なブラッシングを自分で行うためには、少くとも 7, 8 歳に達している必要がある。本研究の対象児は、暦年齢 7 歳以上は、4 名だけで運動発達レベルからみれば全員 7 歳以下であった。一週間 1 回のセンター訓練をスケジュールとしたので、就学前の小児を対象として選ばざるを得ず結果として、訓練の長期化を招いたと考えられる。しかもステップ 4a 以上はステップ 3 までの単純な行動に比べ、ブラシの正しい把握や移動という、より高度な運動機能を必要とする行動である。それ故に運動発達の遅れは、ステップ 4a への移行を困難にすると考えられる。

2) O.H.I., カリオスタット所見は、指導後著しく改善した。これらの変化の理由として以下の 2 点が考えら

Fig. 8 Change in mother-child relation test and Tsumori's diagnostic developmental test.

れる。

① 学習プログラムに従った反復訓練の結果、ブラッシングに対する対象児の拒否反応の減少。

② 母親自身のブラッシングテクニックの上達及び口腔衛生に対する意識の変化。プログラムによる訓練とは別に、生活習慣として、母親がブラッシングを行うことを義務付けた。それ故に②の要因が口腔内評価の変化に反映していることは、当然考えられる。

3) オペラント条件付けによる学習プログラムの効果を最も反映するものは、ブラッシング自立度の変化と考えられる。この評価には、行動の評価に加えて、清掃効果の評価も含めた。本研究では、最終ステップに到達した対象児に限らず、他のすべての子どもも、自立度に改善がみられた。

4) 実際の訓練では、単一のプログラム (Table 4) だけでは、個々の対象児に十分な訓練は行えなかった。サブルーチンプログラムとして、左右弁別と電動ブラシの振動に対するプログラムを別に用いた。左右弁別プログラムは、B, D, G 児に用い、身体模倣と陽性強化により左右を学習させた。対象児Eは、痙性麻痺を有していたので手動ブラシに変え電動ブラシを用いさせた。本児に用いた振動刺激の過敏反応を緩和するプログラムでは、歯牙に遠い部分から順次 (手→口唇→舌→歯牙) ブラシの刺激を加え、最終的に歯牙にあてるように導びいた。

5) ブラッシング指導の始めに、母親に対し、生活習慣全体の改善を強調した。又母親の溺愛、過保護傾向や、矛盾不一致の態度は、プログラム学習を成功させる

上で是非とも指導改善しなければならない点である。我々の指導で、ブラッシング自立が得られたB児の母親が、子どもに対し積極的に関わるようになったのはその例証であると思う。

我々は、今回のシステムと学習プログラム訓練の成果をもとに、更に適切なシステム、訓練法に関し、検討を重ねていく所存である。

総 括

オペラント条件付けの原理にもとづいたブラッシングの学習プログラムを中心とする指導法をシステム化し、その有効性について検討を加えた。対象として、行動異常を伴うMR児7名を指導し、以下の結果を得た。

1) 対象児7名は、中度ないし重度のMR児で、各人異なった行動異常を伴っていた。又母子関係については、服従、過保護の傾向を示していた。

2) 指導の結果、3名は、4カ月から7カ月で、ブラッシングが自立した。同時にカリオスタットによるう蝕活性度テストとO.H.I.も著明に改善し、良好な口腔清掃状態が得られた。

3) 中断例3名、継続中1名を含め、対象児全員、ブラッシング自立度に関し、各々上昇した。

4) 終了児Bは、ブラッシング自立とともに、生活習慣、社会性に関しても良好な変化がみられ、母親は、積極的に子どもに関係するようになった。

5) 本研究の結果より、我々の指導システムは、対人関係障害児のブラッシング自立に対し高い有効性を持つことが示唆された。又指導に際しては、歯科医、歯科衛

生士，臨床心理士，教師などの専門領域間の協力が必要であり，実際の訓練にあたる歯科衛生士は，オペラント条件付けの理論と実技の理解が必須であると考える。

謝 辞

我々に課題を与え，励まして下さいました故川上親仁先生と，御指導および御検閲を賜った総合療育センター所長高松鶴吉先生に感謝致します。また多くの時間をさき御指導下さいました北九州市立教育センター神谷貞夫先生，小池養護学校教頭永野教任先生，総合療育センター臨床心理士山田幸代先生，快く訓練の場を与え御協力下さいました療育通園部の諸先生方に感謝いたします。

文 献

- 1) Morris, R. J.: 子どもの行動変容，ナカニシヤ

出版，京都，1977，135頁。

- 2) Horner, R. D. and Inog Keilitz: Training mentally retarded adolescents to brush their teeth, J. Applied Behavior Analysis, 8 : 301, 1975.
- 3) 東 正: 精神遅滞児の行動変容・オペラントの原理と方法，明治図書，東京，1979，20頁。
- 4) Drash, P. W.: Behavior modification-New tools for use in pediatric dentistry with the handicapped child, Dental clinic of North America, 18 : 619, 1974.
- 5) R. Kohlenberg et al.: Behavior modification and the management of mentally retarded dental patients, J. Dent. Children, 39 : 61, 1972.
- 6) Kimmelman, B. B. and Tassman, G. C.: Research in Designs of children's toothbrushes, J. Dent. Children, 27 : 60, 1960.

Abstract: Oral Hygiene in Handicapped Children: The Use of Operant Conditioning Theory for Selfcare of Tooth-brushing in Mentally Retarded Children (1). Junko KAWATA*, Shoko TAKAMATSU*, Yosiko MAEDA* and Yasuo TAKEDA*. Brushing one's own teeth is very important for oral hygiene in mentally retarded, autistic, hyperkinetic, or otherwise handicapped. The purpose of this study was to evaluate the effect of a training system for personal tooth-brushing in mentally retarded children with abnormal behavior. We devised a training system containing a brushing program to which the operant conditioning theory was applied, and trained 7 mentally retarded subjects ranging from 4 years 3 months to 8 years 9 months old.

The following results were obtained.

- (1) By training, 3 subjects learned to brush their own teeth.
- (2) All subjects improved in the degree of personal tooth-brushing.
- (3) Before training the oral hygiene index of 7 subjects averaged 4.1 and after training 1.4.
- (4) Concerning the caries activity test, before training 6 subjects were 卅, and after training 1 was 卅, 4 were +, and 1 was -.

We think this training system, which put stress on the mother as trainer and on training at home, may be an effective method for mentally retarded children to learn to brush their own teeth.