Pictorial 3 : Distribution and Calibrated Radiocarbon Ages of Coral Boulders Beached on the Southeast Beach of Miyako Island, Okinawa Prefecture

沖縄県宮古島南東の東平安名崎とその周辺には多くの津波石がみられる。そのなかからマイバーバマに打ち上げられた津波石の分布とハマサンゴ化石の較正年代について報告する（本文 1043-1051 ページ参照）。

Photographs show many coral boulders beached on Higashihenna Promontory and surrounding area by huge tsunamis. Their distribution and the calibrated radiocarbon ages of fossil *Porites* sp. collected from Maibahbama, SE Miyako Island are discussed in the text (p. 1043-1051).

図 1 東平安名崎の海成段丘上（標高約 20 m）と東方の礁原に散乱する津波石。

Fig. 1 Huge coral boulders beached on marine terrace (ca. 20 m a.s.l.) of Higashihenna Promontory and its eastward reef flat.

図 2 ^{14}C 年代測定のためマイバーバマから採取したハマサンゴ化石 (*Porites* sp.) の例。較正年代は AD 1771 年 (Omoto, 2011)。

Fig. 2 Example of radiocarbon-dated sample of *Porites* sp. The calibrated ^{14}C age indicated AD 1771.

図 3 マイバーバマ西部の津波石の分布と較正年代。三角は測量基準点を示す。航空写真提供：アジア航測（株）。

Fig. 3 Distribution and calibrated ^{14}C ages (AD) of coral boulders beached on the west of Maibahbama, SE Miyako Island. Triangle indicates bench-mark for survey. An aerial photograph provided by Asia Air Survey Co., Ltd.