飛騨山脈・白馬岳北部地域の地すべり地形発達

佐藤 剛* 荻谷 愛彦*

Geomorphological Development Caused by Landslides in the Northern Area of Mt. Shiroumadake, the Hida Mountains, Japan

Go SATO* and Yoshihiko KARIYA*

Abstract

This paper describes the Holocene development of landslides in the northern area of Mt. Shiroumadake in the Hida Mountains of central Japan. Late Quaternary landforms caused by glaciers or landslides are common in the study area, where previous studies have provided basic information on glacial landforms with only few details on landslides. This study classifies landslide topography into three types: I, II, and III, based on air photo interpretation and field investigation, to reveal morphological characteristics.

Type I comprises up-hill facing scarps or linear depressions without a deforming landslide body. However both type II and type III have a visible landslide body. Only type III features frontal debris accumulation. Type I is distributed almost throughout the study area. Type II and type III are distributed on slopes underlain mainly by serpentinite and stratified rocks comprising of shale, sandstone, felsic tuff, and tuff breccia. Gravitational rock creep and resulting rock deformation seem to be important in the formation of type I and type II. Type I landslide seems to be transformed into type II landslide with rock deformation on the slopes in the order: (1) gravitational creep, (2) deformation with a discontinuous slip surface, and (3) slide with a continuous slip surface. Radiocarbon dating and tephrostratigraphical evidence reveal that landslide activities began in the early Holocene epoch, and have continued until the present.

Key words : landslide, geomorphic development, Holocene epoch, the Hida mountains

キーワード : 地すべり, 地形発達, 完新世, 飛騨山脈

I. はじめに

飛騨山脈北部の白馬岳 (2,932 m) 周辺は, 詳細な氷河地形・地質研究がなされた日本でも数少ない場所の1つである。とくに白馬岳東面の北股入では多数の堆石が発見され, ^{14}C 年代や指標テフラとの層序が明らかにされた (小嵜ほか,

1974; 伊藤・清水, 1987; 荻谷, 2000)。また白馬岳北面を流域に含む大所川上流部 (白高地沢・瀬戸川流域) でも堆石が見つかり, 北股入との対比が試みられた (小嵜・岡沢, 1976, 1977; 五百沢, 1979)。最近ではそれらの ^{14}C 年代や指標テフラとの層序も報告されている (荻谷, 2000)。一方, 本地域では氷河地形・堆積物ばかりでな

* 千葉大学大学院自然科学研究科

* Graduate School of Science and Technology, Chiba University

く、地すべり地形・堆積物が発達するとの指摘もある（石井, 1998; 防災科学技術研究所, 2000; 中野ほか, 2002）。地すべり地形・堆積物の発達には、本地域に地すべりを誘発しやすいとされる苦鉄質岩体や堆積岩類が分布し、日本有数の多雪環境が成立していることが関係していると考えられる。

最新氷期以降、飛騨山脈では完新世初期までに温暖化が進み氷河はほぼ消滅した¹⁾。同時期、中部日本の日本海側では多雪化も生じたと見られる（Sakaguchi, 1978）。しかし最新氷期以降の飛騨山脈の地形形成過程は、まだ十分理解されていない。飛騨山脈の山地地形学を構築するには、氷河地形・堆積物やそれらの周辺に発達する周氷河地形・堆積物ばかりでなく、地すべり地形・堆積物の正確な識別を基礎とする分布・年代の解明、古環境復元が要件にあげられる。

筆者らは、白馬岳北部地域に分布する地すべり地形の空中写真判読と現地調査を行った。その結果をもとに、地すべり地形の形態・分布とそれらから推定される運動様式、地すべり発達過程および地すべりの年代新資料を論述する。

II. 調査地

1) 範囲

飛騨山脈北部の主山稜は、白馬岳北方の三国境で北東・北北西方向に分岐する。前者は小蓮華山や白馬大池を経て、蓮華温泉に至る。後者は雪倉岳や朝日岳を経て、長母山に至る（図1）。

本研究では、この2つの主稜線を主な分水界とする姫川水系白高地沢および瀬戸川のほぼ全流域と、朝日岳の北に位置する黒部川水系恵振谷と南に位置するゼンマイ谷および赤男谷の最上流部を調査対象とした（図1）。朝日岳東面を源流とする白高地沢（流域面積 8.2 km²）は、標高 1,430 m 地点で赤男沢を合わせ、同 1,015 m 地点で瀬戸川と合流する。また三国境北面を源流とする瀬戸川（流域面積 17.1 km²）は白高地沢との合流後、標高 970 m 地点で矢兵衛川を迎え、大所川となる。

2) 地形

調査地では複数の氷河地形・堆積物の存在が指

図1 調査地の位置と周辺の地形。

Su: 白馬岳 (2,932 m), Ko: 小蓮華山 (2,769 m), Ha: 鉢ヶ岳 (2,563 m), Yu: 雪倉岳 (2,611 m), Ak: 赤男山 (2,910 m), As: 朝日岳 (2,418 m), Na: 長母山 (2,267 m), Sh: 白高地沢, Se: 瀬戸川, Ao: 赤男沢, Ya: 弥兵衛川, Od: 大所川, Id: 恵振谷, Zd: ゼンマイ谷, Ad: 赤男谷, Sa: 三国境, So: 白馬大池, Re: 蓮華温泉。等高線の間隔は 100 m。

Fig. 1 Location and topography of the study area. Su: Shiroumadake (2,932 m), Ko: Korengesan (2,769 m), Ha: Hachigadake (2,563 m), Yu: Yukikuradake (2,611 m), Ak: Akaotokoyama (2,910 m), As: Asahidake (2,418 m), Na: Nagatsugayama (2,267 m), Sh: Shirakochisawa R., Se: Setogawa R., Ao: Akaotokosawa R., Ya: Yaheigawa R., Od: Odo-korogawa R., Id: Iburidan R., Zd: Zenmaidan R., Ad: Akaotokodan R., Sa: Sangokuzakai, So: Lake Shirouma-oike, Re: Renge spa. Contour interval is 100 m.

摘されている。小嶮・岡沢（1976）は端堆石位置を古い順に標高約 800 m、約 1,200 m および約 1,500 m とし、3 回の氷河前進を推定した。近ごろ、これら氷河地形・堆積物の ¹⁴C 年代や広域テフラとの層序が報じられ、新たな解釈も示された（石井, 1998; 菊谷, 2000）。

調査地の主稜線付近には周氷河性平滑斜面と

残雪凹地が分布する (Iwata, 1983; 黒田ほか, 2001)。前者は積雪の多い主稜線西側に、後者は積雪の少ない東側に主に発達する。いずれも現成の地形は少なく、大半が晩水期以前 (~11,000 cal yr BP) に形成された後に化石化したと推定されるが、完新世に一部が再生した (黒田ほか, 2001)。

3) 地質

飛騨山脈北部は飛騨外縁帯からなり、地質構造は複雑である。調査地は主に時代未詳の蛇紋岩化した超苦鉄質岩 (以下、蛇紋岩とよぶ)、ペルム系の古生層および第三紀に貫入した珪長岩からなり、一部にデボン紀-石炭紀の変成岩、鮮新世の花崗閃緑岩および中期更新世の安山岩質溶岩が存在する (図 2A: 原山ほか, 1995)。

蛇紋岩は剪断変形を受けてレンズ状に破碎されていることが多く (中野ほか, 2002)、葉片状・粘土状を呈することもある。また角閃岩や古生界の岩塊を含み (中野ほか, 2002)、蛇紋岩メランジュをなす。古生層は珪長質凝灰岩・凝灰角礫岩、頁岩および砂岩頁岩互層からなる白馬岳層 (中野ほか, 2002) を主体とする。珪長岩は蛇紋岩と古生層に貫入している (中野ほか, 2002)。

4) 気候

気候は多雪・多雨に特徴づけられる。雪が吹きだまりやすい主稜線東側の斜面では、積雪深が数 m 以上に達するところもある。また谷底の周囲では、雪崩で集積した雪が初秋まで残ることがある。近接する長野県白馬村と新潟県糸魚川市のアメダス観測資料 (1979-2000 年) から、調査地の年平均気温は 2.4℃、年降水量は約 2,300 mm 以上と推定される²⁾。

III. 方 法

1) 地すべり地形学図の作成

空中写真 (国土地理院撮影、縮尺約 1:15,000, C CB-76) 判読と野外調査資料から地すべり地形学図 (図 2B) を作成した³⁾。

2) 年代資料の収集 (¹⁴C 年代・テフラ)

地すべり地形の露頭や試坑で堆積物を記載し、テフラ試料と ¹⁴C 年代測定試料 (木片) を採取し

た。テフラ試料は屋内で洗浄・乾燥後、顕微鏡観察を行うとともに、試料に含まれる火山ガラス片 35 粒以上の屈折率測定をした⁴⁾。¹⁴C 年代測定は Beta Analytic 社に委託した。同位体分別補正済み ¹⁴C 年代 (¹⁴C yr BP) は IntCal 98 (Stuiver *et al.*, 1998) を組み込んだ OxCal 3.9 (Bronk Ramsey, 2003) により暦年に較正した (cal yr BP; 2σ)。

IV. 結 果

1) 地すべり地形の地形学的特徴と分布

形態的な特徴から、調査地に分布する地すべり地形を 3 つのタイプ (I ~ III) に分類した。

〈タイプ I〉

稜線付近から斜面中腹にかけて等高線とほぼ平行に伸びる線状凹地 (linear depression; 松岡, 1985) や尾根向き低崖 (uphill-facing scarp; Radbruch-Hall, 1978) である。これらの地形自体は、滑落崖および移動体をもつ典型的な地すべり地形ではない。しかし後述するように、線状凹地や尾根向き低崖は、主として重力性岩盤クリープによる山体変形で生じた正断層に由来すると考えられ、先行研究 (Varnes, 1978; Dramis and Sorriso-Valvo, 1994) でもマスマーブメントを表わす地形の一種に分類されている。

タイプ I は長梅山や朝日岳南面、雪倉岳-鉢ヶ岳-三国境を結ぶ主稜線沿いに分布する (図 2B)。例えば、長梅山周辺には主稜線に平行な北東-南西方向の線状凹地と低崖列が発達する。とくに長梅山山頂東側直下の線状凹地は長さが約 670 m、開口部の幅は約 170 m、凹地底と凹地の東側に位置する尾根向き低崖頂部との比高は最大 10 m あり、周囲にも尾根向き低崖が発達する。

赤男山西面の標高 2,140 m 付近にも北西-南東方向に伸びる尾根向き低崖が分布する。この尾根向き低崖の周辺には、空中写真判読では確認可能だが図 2B には表現できない比高 1-2 m 程度の低崖が数列分布している。地点 P1 ではこれらの低崖が分布する斜面の一部が崩壊しており、内部構造を露頭で確認することができる (図 3A)。基盤 (珪長岩) は節理が発達し、断層で切られている。

図 2 地質図 (A) および地すべり地形学図 (B)。

- A) 1. 蛇紋岩, 2. 古生層, 3. 珪長岩, 4. 変成岩, 5. 花崗閃緑岩, 6. 安山岩溶岩, 7. 断層, 8. 調査範囲, 9. 河川, 10. 山頂. (原山ほか, 1995 を改変)
- B) 1. 地すべり地形 (I: タイプ I, II: タイプ II, III: タイプ III, a: 地すべり移動体, b: 滑落崖, c: 尾根向き低崖, d: 幅の狭い線状凹地, e: 幅の広い線状凹地), 2. 調査範囲, 3. 河川, 4. 山頂. 等高線間隔は 50 m.
- Na: 長榎山, As: 朝日岳, Ak: 赤男山, Yu: 雪倉岳, Ha: 鉢ヶ岳, Ko: 小蓮華山, Sh: 白高地沢, Se: 瀬戸川, Zd: ゼンマイ谷, Sa: 三国境.

Fig. 2 Geological map (A) and landslide map (B).

- A) 1. serpentinite, 2. Paleozoic strata, 3. felsite, 4. metamorphic rocks, 5. granodiorite, 6. lava, 7. fault, 8. investigated area, 9. river, 10. summit. (Modified from Harayama *et al.*, 1995).
- B) 1. landslide (I: type I, II: type II, III: type III, a: landslide body, b: main scarp, c: up-hill facing scarp, d: narrow linear depression, e: wide linear depression), 2. investigated area, 3. river, 4. summit. Contour interval is 50 m.
- Na: Nagatsugayama, As: Asahidake, Ak: Akaotokoyama, Yu: Yukikuradake, Ha: Hachigadake, Ko: Korengesan, Sh: Shirakochisawa R., Se: Setogawa R., Zd: Zenmaidan R, Sa: Sangokuzakai.

また、断層を境に谷側の基盤は山側に比べ著しく破碎されている。断層面の走向・傾斜は $N37^{\circ}W$ 47° である。断層面には条線が発達し、断層面沿いには粘土に充填される断層角礫が約 20 cm の厚さで認められる (図 3B)。

〈タイプ II〉

移動体の輪郭が識別できる地すべり地形である。一般に地すべり地形は発生域および移送・堆積域 (大八木, 1992) に分かれるが、タイプ II の移動体の大部分は発生域のもので、移送・堆積域がほとんど識別できない。この点で次述するタイプ III と異なる。移動体と上方の非変動斜面との境界に滑落崖が生じていることはまれである。移動体全体の傾斜もタイプ III より急である。ただし移動体上面に 1 ～ 数列の尾根向き低崖が分布することがあり、そのような部位は傾斜が緩い。移動体上面のこれらの尾根向き低崖には移動体内部に分布が限られる短いものと、等高線方向に伸張して移動体側方の他の移動体上または非変動斜面上の尾根向き低崖によく続くものがある。なお、タイプ II の移動体上の尾根向き低崖はタイプ I と形態が似るが、タイプ II の移動体を形成させた地すべり活動の影響を受けていると考えられることから同タイプの地形構成要素の一部として扱う。

タイプ II は朝日岳南面や長褥山東面、雪倉岳北面に分布する (図 2B)。朝日岳南面に分布する移動体 A0 (長さ 540 m, 幅 270 m) では、移動体上半部に 2 列の尾根向き低崖が発達する。下側のもの (長さ 80 m, 比高約 20 m) はこの移動体内部に分布が限られる。上側のもの (長さ 130 m, 比高約 8 m) は移動体 A0 と上方の非移動斜面の境界付近に位置する。上側の尾根向き低崖は等高線に沿った側方への連続性がよく、移動体の西に存在する移動体 A1 最上部の尾根向き低崖に断続的につながる。移動体 A1 の西側にはさらに移動体 A2 が存在し、移動体 A2 最上部に見られる尾根向き低崖は北西側の非変動斜面上の尾根向き低崖 (タイプ I) に断続的に連続する。同様に、移動体 A0 の東側の移動体上にも断続的に尾根向き低崖が分布する。

図 3 A) タイプ I の内部構造。破線は断層を示す。
B) 断層面。

Fig. 3 A) Internal structure of Type I landslide.
Dashed line shows fault.
B) Fault plane.

〈タイプ III〉

移動体の輪郭が識別でき、かつ移動体が発生域と移送・堆積域に分類できる地すべり地形である。また、移動体内部に二次的な地すべり活動にともない形成された移動体が分布することもある。二次的なものも含め、移動体の傾斜はタイプ II より緩い。移動体の上方には明瞭な遷急線をもつ滑落崖が見られることが多い。

タイプ III は白高地沢右岸のほぼ全域や、ゼンマイ谷上部の赤男山西面、瀬戸川流域下流部で発達がよい (図 2B)。白高地沢下流部右岸には標高 1,700 m 付近に比高約 90 m の馬蹄形の滑落崖を伴う長さ 920 m, 幅 490 m の移動体 B が存在する。移動体中には二次的な地すべりで生じた移動体 b1 および b2 が形成されている。これらの移動体上には推定移動方向に直交する線状凹地も生

じている⁵⁾。図 2B に示していないが、移動体 b2 の下端では白高地沢の側刻・下刻による表層崩壊が現在も生じている。移動体 b2 の二次的活動の主因は白高地沢の侵食によると考えられる。同様の事例は、この地すべり地形の北西隣にも見られ(移動体 C)、白高地沢の側刻により移動体末端の開析が進んでいる。移動体 C の北東側には、白高地沢を挟んで移動体 D が分布するが、移動体 C と D はもともと一連の地すべり移動体であったと考えられる。その理由として、左岸側谷壁斜面には移動体 D の発生源となった地形が見られないこと、また移動体 C と D は岩相が同一な破碎・粘土化した蛇紋岩で構成されていることがあげられる。

2) 地すべり地形の分布と地質

タイプ I は三国境周辺や小蓮華山北面などの珪長岩地域では主稜線付近に分布が限られるのに対し、朝日岳や雪倉岳周辺の蛇紋岩地域および古生層地域では主稜線付近から斜面中腹にかけて分布する(図 2)。またタイプ II と同 III は白高地沢流域やゼンマイ谷上部、瀬戸川下流域などの蛇紋岩地域および古生層地域に多く分布し、珪長岩地域では分布が限定的である。

3) 年代資料

長梅山山頂付近には最新氷期ないし晩氷期に形成されたと考えられる化石周水河性平滑斜面が分布し、これを切って線状凹地が発達する。線状凹地底にある地点 P2 (図 2B) では、凹地を埋積する泥炭と腐植まじりシルトの互層が地表から深度 20 cm まで観察され、深度 18.5 cm 付近には褐色のシルト質粘土がパッチ状に挟在する。この粘土は、ほぼ全量が平板状泡壁型火山ガラス片(屈折率 $n = 1.503\text{--}1.512$) からなる。それらの多くは無色透明だが、淡褐色のものも検出される。こうした特徴や周辺域での産状から、この火山ガラス片は鬼界アカホヤ(K-Ah; 7,300 cal yr BP: 町田・新井, 2003) に同定される。

白高地沢左岸の地点 P3 (図 2B) では、現河床に高さ約 10 m の破碎された閃緑岩が露出し、これを層厚 50 m 以上の砂礫層が覆う(図 4)。閃緑岩は破碎しており、同質の閃緑岩は右岸側の移

図 4 土石流および河成堆積物柱状図。
露頭位置は図 2B に示す。U1～8: 土石流堆積物のユニット。* 石井(1998)および苅谷(2000)のデータを用いた。**Beta-186406。***Beta-182346。較正年代はいずれも 2σ 。

Fig. 4 Columnar section of debris flow and fluvial deposits at Loc. P3.

Location is shown in Fig. 2B. U1-8: debris flow unit. * This age was arranged by Ishii (1998) and Kariya (2000). **Beta-186406. ***Beta-182346. Calibrated ^{14}C years are indicated with a 2σ confidence level

動体 B (b2) の末端部にも露出する。砂礫層は河川堆積物と土石流堆積物との互層で構成される。淘汰がよく層状・覆瓦構造を呈する河川堆積物に対し、土石流堆積物は不淘汰で粘土から長軸の長さが 3 m を越える礫で構成される。本層上部に挟在する泥炭の ^{14}C 年代測定が行われ 3,250-2,490 cal yr BP が得られている(石井, 1998; 苅

谷, 2000)。土石流堆積物のユニット1に覆われる河成堆積物, およびユニット2とその直上の河成堆積物の境界部から新たに得た木片は, それぞれ 5,600–5,000 cal ($4,600 \pm 90$ ^{14}C) yr BP と 3,350–2,940 cal ($2,970 \pm 70$ ^{14}C) yr BP だった。砂礫層は堆石丘状の地形をなすことから氷河堆積物の可能性が指摘されていた(小疇・岡沢, 1976, 1977)が, 完新世の土石流堆積物を主体としていることが明らかになった。

V. 議 論

1) 地すべりの運動形式

現時点では移動体の内部構造に関する情報が乏しく, 地すべりの運動様式や発達過程を確定することはできない。以下では, タイプⅠ～Ⅲの地形や分布の特徴から, これらを予察的に論じる。

タイプⅠの尾根向き低崖が分布する赤男山西面(図2B, 地点P1)では, 前述のように斜面内部に断層が見られる。この断層は断層面が谷側に傾斜していることから, 谷側の基盤が落ちた正断層である。断層と尾根向き低崖列との構造的な関係は判明していない。しかし, 尾根向き低崖は断層の走向とほぼ同方向に伸びていることから, その形成には断層活動が影響したと予想される。

従来から線状凹地や尾根向き低崖は, 大比高の主稜線周辺に発達することが知られており, それらは重力性岩盤クリープに伴う山体変形で生じると考えられてきた(Dikau *et al.*, 1996)。例えば清水ほか(1980)は, 山地の隆起と河川の下刻によって山体が自重で側方へ膨らみ, 山稜部が引張場となって低崖(正断層)が形成されると推定した。清水ほか(1980)は明言していないが, 山体の膨らみは重力性岩盤クリープに因むと考えられる。またChigira(1992)やChigira and Kiho(1994)は, 急斜する面構造をもつ岩盤がトッピングを起こした斜面と, その上方に位置する非変動斜面との境界部が引張場におかれ, 低崖(正断層)が生じると考えた。この場合, トッピングは重力性岩盤クリープによるとされる。

こうしたことから, タイプⅠは重力性岩盤クリープに由来する正断層で形成された可能性が高

い⁶⁾。

タイプⅡの移動体上には2種類の尾根向き低崖が存在する。このうち, 移動体と隣り合う別の移動体や非変動斜面上の尾根向き低崖と断続的に分布するものは, 本来ほぼ同標高に存在した一連の低崖だったと考えられる。典型例が見られる朝日岳南面(図2B)の場合, かつて斜面の広い範囲で重力性岩盤クリープが生じ, 尾根向き低崖(タイプⅠ)が出現したが, 斜面の一部で変動が促され明瞭な移動体(タイプⅡ)が形成されることで一連の低崖は分断されたと推定される。一方, 赤男山北面の移動体Eに分布する尾根向き低崖のように, その分布が移動体上に限られ, 周囲の非変動域に等高線方向へ連続しないものは, 当該移動体の変形だけで生じたと考えられる。

岩盤クリープに伴う岩盤の変形・破壊が進むと, 斜面内部に断層が生じ, さらに斜面横断・縦断方向に連続する剪断面(すべり面)が形成される(千木良, 1995)。この結果, すべり面を境に岩盤が滑動しはじめ, 斜面上には輪郭が識別可能な移動体が生じる。以上がタイプⅠから同Ⅱへの発達過程と推定される。

タイプⅢは滑落崖を伴い, 移動体には移送・堆積域も形成されている。海外では, 岩盤クリープが進行してスライド(slide: Varnes, 1978)や岩屑なだれ(debris avalanche: Varnes, 1978)などの崩壊現象に至ることが知られている(Nemčok, 1972; Radbruch-Hall, 1978; Dramis and Sorriso-Valvo, 1994)。

以上をまとめると調査地の地すべりは, 始めに岩盤クリープに伴うタイプⅠの形成, 次にすべり面の形成に伴うタイプⅡの形成, さらに地すべり活動が進みタイプⅢの形成へと遷移する発達過程があると考えられる。

2) 地すべり地形の分布と地質

タイプⅠは, 珪長岩地域と蛇紋岩地域・古生層地域とでは斜面上の出現位置に違いがある。

本地域の珪長岩は節理の発達がよく, 崩れやすい。また珪長岩が分布する瀬戸川右岸一帯は主稜線と谷底の比高が大きく, 周氷河性平滑斜面の発達がよい主稜線付近を除いて谷壁の傾斜も全般に

急である。これに対し、蛇紋岩や古生層が分布する瀬戸川左岸一帯や白高地沢流域では主稜線と谷底の比高が相対的に小さく、谷壁の傾斜も緩い。珪長岩地域では重力性岩盤クリープが作用して斜面上に正断層が形成される状況となっても、斜面が急なため移動体は速やかに崩壊してしまい、尾根向き低崖や線状凹地（タイプⅠ）が残存しない。逆に化石周氷河斜面の発達の結果、比較的傾斜が緩い珪長岩地域の主稜線付近では崩壊による斜面変動が起こりにくく、タイプⅠの存続が可能である。

タイプⅡおよびⅢは蛇紋岩・古生層地域に集中し、珪長岩地域にはほとんど見られない。上述のように、珪長岩地域ではタイプⅠから同Ⅱに発展する地形・地質的素因に欠けていることがその理由と考えられる。また調査地の蛇紋岩や古生層は構造運動を受け脆弱化しており、蛇紋岩は粘土化していることも多い。蛇紋岩地域では異種岩体との境界部や断層面沿いに地すべりが発生しやすい（横田ほか, 1995, 1998; 矢田部ほか, 1997; 佐々木ほか, 2001）。また、古生層の多くは珪質凝灰岩・凝灰角礫岩と砂岩頁岩互層からなる。凝灰岩は粘土化しすべり面へと転化することや（西山ほか, 2003）、砂岩頁岩互層では層理面を境にすべり面が形成されることが知られている（藤田, 2002）。

調査地の蛇紋岩や古生層分布域にタイプⅡやⅢが広く分布するのは、蛇紋岩や古生層の地質的特性を反映していると考えられる。

3) 地すべり発生時期

地点 P2（図 2B）がある線状凹地は、主稜線周辺の化石周氷河性平滑斜面を切っていることから、形成期が晩氷期以前に遡る可能性は低い⁷⁾。また地点 P2 における埋積土壌と K-Ah の発見は、この線状凹地（タイプⅠ）が 7,300 cal yr BP 以前に生じたことを示す。

地点 P3（図 2B）における露頭観察の結果、全層厚 43 m 以上の砂礫層が 1,750-3,110 年間にわたり白高地沢を埋積したことが明らかとなった。これほどの埋積が生じた過程として、露頭近傍での地すべり活動と、それに続く上流からの土砂供

給が推定される。その理由として、露頭最下部に右岸側の移動体 B 末端に露出する閃緑岩と同質なものが認められることがある。つまり、右岸側で発生した地すべりが 5,600-5,000 cal yr BP 以前に白高地沢を塞ぎ止め堆積場を形成した。それを契機とし、計 8 ユニットの土石流堆積物に代表される上流から供給された多量の堆積物が白高地沢を埋積した。

地すべりによる塞ぎ止めの事例は地点 P3 の上流でも認められる。移動体 C および移動体 D は同一の岩相を有する蛇紋岩で構成されることから、両移動体は右岸側で発生した地すべりの一連の移動体である。つまり、地すべり活動にともない移動体が左岸谷壁斜面基部まで達し、白高地沢を塞ぎ止めた。その後、移動体は白高地沢に開析され、移動体 C と移動体 D に分割された。移動体 D は、地点 P3 の砂礫層からなる地形面を覆うことから、一時的な白高地沢の塞ぎ止めが 3,250-2,490 cal yr BP 以後にもあった。

また、タイプⅡや同Ⅲの移動体上には形態が明瞭な尾根向き低崖や線状凹地が形成され、現在または近過去まで地すべりが進行してきたことを示唆する。

これらの事例は、調査地で完新世を通じて地すべりによる活発な地形変化が生じてきたことを示している。

VI. む す び

調査地やその周辺に最新氷期に氷河が存在していたことは确实（五百沢, 1979）である。しかし、遅くとも完新世前半以降にはタイプⅠから同Ⅲに発展する地すべり地形の発達が進んだ。地すべり活動の誘因として以下のプロセスが想定される。

最新氷期に氷河作用が及んだ斜面の一部では、氷河により斜面に与えていた荷重が退氷後に解放され、地すべり活動が発生したと予想される。退氷に伴う内部応力の変化のために不安定化した氷食谷壁では、尾根部周辺や斜面上に重力性岩盤クリープによる線状凹地や尾根向き低崖が形成される paraglacial rock-slope deformation の事例が多数報告されている（Ballantyne, 2002）。

一方、退氷以外に多雨・多雪化による地下水供給量の増加や、河川の下刻による斜面不安定化（中村・檜垣, 1991）などの発生要因もあげられる。また尾根向き低崖が地震動によって累積的に発達する例も報告されている（八木浩司, 1993）。調査地が日本有数の多雪地域にあり、しかも数千年間隔で活動してきた糸魚川-静岡構造線活断層系神城断層とその北方延長部（奥村ほか, 1998; 中野ほか, 2002）に近接することから、融雪水や地震動が発生要因となっていることも予想される。

飛騨山脈の地形発達を解明するためには、地すべりの発生誘因や構造地質学的な運動様式の解明、そして詳細な編年が今後重要である。

謝 辞

古谷尊彦・宮内崇裕両先生（千葉大学）、石井正樹氏（北陽建設）、目代邦康博士（筑波大学）には貴重な助言をいただいた。また、八木令子博士（千葉県立中央博物館）、吉村章彦氏（元千葉大学大学院生）、加藤暁之氏（千葉大学学生）には分析や現地調査に協力いただいた。さらに、匿名査読者・担当委員には的確なコメントをいただいた。記して感謝します。研究の一部に日本科学協会平成16年度笹川研究助成金（代表者：佐藤 剛）、河川環境管理財団平成14年度研究助成金および平成14年度千葉大学大学院自然科学研究科共同研究助成（代表者：苅谷愛彦）を使用した。

注

- 1) 朝日岳北面では完新世前半に氷河が形成された可能性がある（小崎・岡沢, 1983）。
- 2) 気温減率を $6.5^{\circ}\text{C km}^{-1}$ とし、調査地の平均高度（1,800 m）の年平均気温を2地点の観測値から別々に求め、それらを相加平均した。年降水量も2地点の観測値の相加平均とした。
- 3) 写真判読は佐藤と苅谷が独立に行い、双方の結果を照査した。
- 4) 千葉県立中央博物館所有の京都フィッシュ・トラック RIMS86 を用いて佐藤が測定した。
- 5) タイプⅢの移動体上の線状凹地は、クラックおよび溝状凹地（木全・宮城, 1985; 八木令子, 2003）に対応する地形であり、タイプⅠとは区別した。
- 6) 本稿でタイプⅠとした地形の一部を相馬（1974）と上本（1978）が言及している。ただし彼らは線状凹地が広域的地殻変動に支配されて生じたとし、岩盤クリープに起因する正断層起源である可能性は論じていない。

- 7) 上本（1978）や高山地形研究グループ（1978）も本地域の線状凹地が最新氷期を遡らないとした。根拠として、線状凹地底堆積物が薄いことや、それらが含有する花粉化石組成に現在との間に有意な差がないこと、線状凹地が現成または近過去の周氷河性斜面物質を切ることなどがあげられた。

文 献

- Ballantyne, C.K. (2002): Paraglacial geomorphology. *Quat. Sci. Rev.*, **21**, 1935-2017.
- 防災科学技術研究所 (2000): 地すべり地形分布図 第11集「富山・高山」. 防災科学技術研究所資料, 第200号.
- Bronk Ramsey, C. (2003): OxCAL program v3.9, [http://www.rlaha.ox.ac.uk/oxcal/oxcal.html].
- Chigira, M. (1992): Long-term gravitational deformation of rocks by mass rock creep. *Eng. Geol.*, **32**, 157-184.
- Chigira, M. and Kiho, K. (1994): Deep-seated rock-slide-avalanches preceded by mass rock creep of sedimentary rocks in the Akaishi Mountains, central Japan. *Eng. Geol.*, **38**, 221-230.
- 千木良雅弘 (1995): 風化と崩壊. 近未来社.
- Dikau, R., Brunson, D., Schrott, L. and Ibsen, M. eds. (1996): Landslide recognition: Identification, Movement and Causes. Wiley & Sons.
- Dramis, F. and Sorriso-Valvo, M. (1994): Deep-seated gravitational slope deformations, related landslides and tectonics. *Eng. Geol.*, **38**, 231-243.
- 藤田 崇 (2002): 地すべりと地質学. 藤田 崇編: 地すべりと地質学. 古今書院, 3-21.
- 原山 智・滝沢文教・加藤碩一・駒澤正夫・広島俊男・須藤定久 (1995): 20万分の1地質図幅「富山」. 地質調査所.
- 五百沢智也 (1979): 鳥瞰図譜=日本アルプス. 講談社.
- 石井正樹 (1998): 大所川流域の地すべり地形と発達史. 日本地理学会発表要旨集, **53**, 110-111.
- 伊藤真人・清水文健 (1987): 北アルプス, 白馬岳東方, 松川北段入のモレーンを覆う示標テフラ層の発見とその意義. 地学雑誌, **96**, 112-120.
- Iwata, S. (1983): Physiographic conditions for the rubble slope formation on Mt. Shirouma-dake, the Japan Alps. *Geogr. Rep. Tokyo Metropol. Univ.*, **18**, 1-52.
- 苅谷愛彦 (2000): 白馬岳地域における更新-完新統の年代新資料. 日本地理学会発表要旨集, **58**, 68-69.
- 木全令子・宮城豊彦 (1985): 地すべり地を構成する基本単位地形. 地すべり, **21**(4), 1-9.
- 小崎 尚・岡沢修一 (1976): 白馬岳北方, 大所川流域の氷河堆積物と地形. 日本地理学会予稿集, **10**, 25-26.
- 小崎 尚・岡沢修一 (1977): 白馬・朝日連峰東斜面の氷河地形. 日本地理学会予稿集, **12**, 20-21.
- 小崎 尚・岡沢修一 (1983): 後立山連峰北部, 朝日岳の完新世ブッシュモレーン. 日本第四紀学会講演要旨集, **13**, 110-111.
- 小崎 尚・杉原重夫・清水文健・宇都宮陽二郎・岩田修

- 二・岡沢修一 (1974): 白馬岳の地形学的研究. 駿台史学, **35**, 01-086.
- 高山地形研究グループ (1978): 白馬岳高山帯の地形と植生. 163.
- 黒田真二郎・岩田修二・荻谷愛彦 (2001): 表層堆積物の断面構造から推定した白馬岳高山帯における周氷河砂礫斜面の形態変化. 日本地理学会発表要旨集, **59**, 92.
- 町田 洋・新井房夫 (2003): 新編火山灰アトラス [日本列島とその周辺]. 東京大学出版会.
- 松岡憲知 (1985): 赤石山脈主稜線部における線状凹地の分布と岩石物性. 地理学評論, **58A**, 411-427.
- 中村三郎・檜垣大助 (1991): 地すべり地形の生成と変化. 地すべり学会シンポジウム「地すべり災害斜面のうつりかわりと地下水排除・効果」論文集, 68-76.
- 中野 俊・竹内 誠・吉川敏之・長森英明・荻谷愛彦・奥村晃史・田口雄作 (2002): 白馬岳地域の地質. 地域地質研究報告 (5 万分の 1 地質図幅). 産総研地質調査総合センター, 105.
- Nemčok, A. (1972): Gravitational slope deformation in high mountains. *Proc. 24th Int. Geol. Congr., Sect. 13*, 132-141.
- 西山勝一・松本一一・山田 清 (2003): 佐賀県峰池地すべりのすべり面. 日本地すべり学会誌, **40**(4), 90-91.
- 奥村晃史・井村隆介・今泉俊文・東郷正美・澤 祥・水野清秀・荻谷愛彦・斉藤英二 (1998): 糸魚川-静岡構造線活断層系北部の最近の断層活動. 地震, **50**, 別冊, 35-51.
- 大八木規夫 (1992): 土砂災害. 萩原幸男編: 災害の事典. 朝倉書店, 179-252.
- Radbruch-Hall, D.H. (1978): Gravitational creep of rock masses on slopes. In Voight, B. ed.: *Rockslide and Avalanches, 1*. Elsevier, 607-657.
- Sakaguchi, Y. (1978): Climatic changes in central Japan since 38,400 y BP - viewed from palynological study on Ozegahara deposits. *Bull. Dept. Geogr., Univ. Tokyo*, **10**, 1-10.
- 佐々木慶三・中村真也・周 亜明・宜保清一 (2001): 姫川メランジェの大規模地すべりの発生機構についての検討. 地すべり, **37**(4), 24-32.
- 清水文健・東郷正美・松田時彦 (1980): 日本アルプス・野口五郎岳付近における小崖地形の成因. 地理学評論, **53**, 531-541.
- 相馬秀広 (1974): 白馬岳北部におけるいわゆる“二重山稜”. 日本地理学会予稿集, **6**, 104-105.
- Stuiver, M., Reimer, P.J., Bard, E., Beck, J.W., Burr, G.S., Highen, K.A., Kromer, B., McCormac, G., Van Der Plicht, J. and Spurk, M. (1998): INTCAL98 radiocarbon age calibration, 24,000-0 cal BP. *Radiocarbon*, **40**, 1041-1083.
- 上本進二 (1978): 白馬岳北方鉢岳西斜面の新时期断層地形. 第四紀研究, **17**, 171-175.
- Varnes, D.J. (1978): Slope movement types and processes. In Schuster, R.L. and Krizek, R.J. eds.: *Landslides: Analysis and Control*. Natl. Acad. Sci. Spec. Rep., **176**, 11-33.
- 八木浩司 (1993): 真昼山地・和賀岳付近に認められる小崖地形の発達過程. 季刊地理学, **45**, 83-91.
- 八木令子 (2003): 地すべり移動体の微地形構成とその配列パターン: 地すべり地形の発達過程解析手法としての地形分類の意義. 地形, **24**, 261-294.
- 矢田部龍一・横田公忠・八木則男・野地正保 (1997): 蛇紋岩地すべりの発生機構に対する検討. 地すべり, **34**(1), 24-30.
- 横田公忠・矢田部龍一・八木則男 (1995): 蛇紋岩の風化粘性土の強度特性. 土木学会論文集, **529**, 155-163.
- 横田公忠・矢田部龍一・八木則男 (1998): 蛇紋岩地すべりに対する鉱物学的な一考察. 地すべり, **35**(3), 15-23.

(2004 年 6 月 9 日受付, 2005 年 1 月 21 日受理)