写真 1 マッキンレー山 (6194m) 南の中生代黒色スレート

アラスカ南部の中生代～古第三紀層 Mesozoic～Paleogene Strata in Southern Alaska

アラスカ南縁地域には、中生代から新生代にかけての地層が帯状に分布し、その時代は大陸側から大洋側へ若くなる。このような地層の帯状配列・時代・構成岩種は、両南日本外帯のそれらとよく似ている（本文参照）。スレート劈開のよく発達した地層（写真 1）は、白亜紀後期のコディアーク-ヴァルディツ層に特に顕著で、スレート帯の幅は最大 100km、延長 1000km 以上にも及ぶ。層状チャート（写真 2）と玄武岩を主体とする地層は、キーナイ半島キャシュマク湾南岸にのみ分布する。アラスカ南縁域で、従来、メラングジュとされてきた地層の大半は、海底地すべり等によって形成された典型的なスランブ堆積物（写真 3）である。

（1980年 7 月～8 月 足立 守ほか撮影 photo by M. ADACHI et al.）

地学雑誌 91. 4 (1982)

写真 2 キャッシュマク湾，ユーコン島の三疊紀層状放散虫チャート。人物は米国地質調査所の David L. JONES 博士

写真 3 コディアック島南部の古第三紀ゴーストロックス層にみられるスランブ構造