写真1 細粒部分の盛り上がった条線土

写真2 周氷河性の礫斜面

写真3 平坦地に生じた多角形土

写真4 植生限界以上の周氷河性岩塊斜面

崑崙山脈の構造土と岩塊斜面

Patterned Grounds and Block Slopes in the Kunlun Mountains, China

写真1は中国青海省東崑崙山脈崑崙山口付近で観察した条線土である。幅20cmほどの細粒部分が凍上の作用を受け、粗粒部分に比べて3~4cm盛り上がっている。また盛り上がった細粒部分自体が、ソリフラクションによって丸みを帯びた塊を作りながら移動している。

条線土についてはこれまで、凍結によって割れ目が生じ、そこに凍上で盛り上がった細粒部分から礫が転落して粗粒部分を作ることによってできると考えられてきたが、ここの条線土はこれとは形成のメカニズムが異なるように見える。条線土を観察したところ、基盤の頁岩が破碎をうけて細粒物質を特に多量に生産しているところで、斜面物質は全体として細粒物質に富んでおり、粗粒部分は夏期に時々降る雪の解け水が細粒物質を除去することによって生じらしい。撮影日時、1985年7月12日。海拔5050m。傾斜24°の南向き斜面上で観察。

写真2は崑崙山口付近に一般的な礫斜面。斜面上は偏平な礫で覆われ、不明瞭な条線土が認められる。一方、斜面から除去された細粒物質は平坦地に集積してみごとな多角形土をつくる(写真3)。急傾斜の北側斜面では海拔4700m以上が周氷河性岩塊斜面になっていて(写真4)、植被はほとんどみられなくなる。

(小泉武栄撮影 Photos by T.KOIZUMI)

地学雑誌 98-1 (1989)