臨 牀 叢 談

所謂「ヒステリー」球ト巨大懸壜垂トノ關係

Prof. Dr. W. Okada: Die Beziehung zwischen dem Sogenanten Globus

hysterica und Macro Uvula.

醫學博士 岡 田 和 一 郎

約二十年前醫學博士岸一太氏が「ヒステリー」症ノ原因トシテ舌根扁桃腺肥大ヲ擧ゲ盛シニ「ヒステリー」患婦ノ舌根扁桃腺肥大ノ手術的療法ヲ施サレタコトガアツタ、余ハ當時此報ニ接シタトキ當時ノ臨牀講義ニ於テモ批評シテ「ヒステリー」症ガ舌根扁桃腺肥大ノ爲メニ起因スルト云フコトハ是ヲ信ズルコトヲ得ナイガ舌根扁桃腺肥大ハ往々下咽頭後壁ニ觸接シテ極メテ頑固ナル咽頭異物感ヲ起サシムルコトガアルノデ其經過ガ延長セバ患者ヲシテ甚シク神經質ニ陥ラシメ、又時ニ「ヒステリー」球ノ症狀ヲモ構成スルニ至ラシムルコトアルヲ述ベテ二三ノ舌根扁桃腺肥大ヲ切斷シテ如斯症狀ヲ治愈ニ到ラシメタコトガアツタ、余ハ當時已ニ此「ヒステリー」球即チ常時咽腔下部ニ於テ梅干ノ如キ圓形物ノ存在ヲ訴ヘル症狀ハ舌根扁桃腺肥大ニ來リ得ルコト勿論デアルガ必ズヤ懸壜垂ノ肥大又ハ巨大懸壜垂(Macro Uvula)ニモ來リ得ルモノデアルト考ヘタノデアツタガ當時及ビ其後之ヲ立證的ニ觀察スルノ機會ヲ得ナカツタノヲ大ニ遺憾トシテ居ツタ、然ルニ最近最モ顯著ナル「ヒステリー」球(Globus hysterica)ヲ訴ヘタル一患者ニ就テ巨大懸壜垂ヲ發見シ是ヲ切斷シテ忽然多年ノ苦惱ヲ一掃シ去ルコトヲ得テ茲ニ明カニ前說ヲ立證スルコトヲ得タカラ之ヲ茲ニ報告スルコト、スル。

■ 齡五十七歳、男性、足尾銅山就職者。

既往歴

生來壯健、他ニ重病ニ罹リシコトナシ、約三年前不快ナル咽頭異物感ヲ起シ一旦醫治ヲ仰ギシモ往再經過セシガ昨年十一月頃ニ到リ其症狀一層甚クナリテ頸部甲狀軟骨部ニ於テ細長キ梅干様ノ圓形異物ノ存在セル如キ感覺ガ常在シテ臥テモ起テモ常ニ之レガ頑固ニ患者ヲ襲フテ近時勞働ニモ大ニ支障ヲ來スヨウニナレリ、又最近ニハ「シャツ」ノ「ボタン」ヲ掛ケテモ呼吸ヲ妨ゲル様ニ感ズルノデ「ボタン」ハ常ニ掛ケナイコト、ナシ、液體ヲ嚥下スルト咽喉ニ引掛ルヨウニ感ジ特ニ葡萄酒ヲ飲ムトキニ微痛ヲ感ズルコトモアツテ苦痛ニ堪ヘナイノデ屢々醫

臨牀叢談

岡田||所謂「ヒステリー」球ト巨大懸壜垂トノ關係

第三十三卷

一一八三

(第十二號 一二七)

師ノ診斷ヲ乞ヒシニ何レノ醫師モ咽喉ニ著キ變化ナシト云ハレ或ハ全ク神經性疾患トサレ或ハ寒冷ガ原因ナレバ温暖ニナレバ治スベシト云ハレ更ニ要領ヲ得ナイノデ某精神病科醫ノ紹介ニテ余ノ許ニ來レリ。

現 症

體格良ナルモ營養不良、顔色蒼白、神經質ノ顔貌ヲ呈ス、頸部ニ異常ナク、壓痛部ナシ、鼻腔、口腔ニ異常ナク、懸壜垂ハ長サ約二、五仙迷幅ハ基根ニ於テ〇、六仙迷尖端ハ尖銳ナリ其色ハ尋常ナリ、口蓋扁桃腺ニ異常ナク舌根扁桃腺ハ少ク隆起粗糙ナリ、咽頭後壁、喉頭並ニ食道入口部等ニ異變ナシ、仍テ余ハ此巨大懸壜垂ガ患者ノ訴フル「ヒステリー」球ノ原因ナルベシト即斷シテ其手術的療法ノ必要ナルヲ説キ直ニ根岸養生院ニ於テ手術スルコト、ナセリ。

手術並ニ經過

手術ハ極メテ簡單デアリマス、併シ余ハ通常二〇%「コカイン」液ヲ塗附シ懸壜垂ノ基根部ニ長キ二本ノ縫合絲ヲ縫合針ニテ水平一列ニ通シテ其絲端ヲ持ツテ懸壜垂ヲ前方ニ牽引固定シテ過刺懸壜垂即チ約一、五仙迷ヲ剪刀ニテ切斷シ次デ先ニ通シ置キタル二個ノ縫合絲ヲ結ンデ術ヲ終リタルニ、術後直ニ多年ノ苦痛特ニ「ヒステリー」球全然消散シ次日僅カニ重曹水ノ含嗽ヲ命ジテ其經過ヲ見タルニ諸症全ク治癒シ一週ニシテ創面モ亦癒合シタルニ由リ歸郷ヲ許シタリ。

結 論

(一)巨大懸壜垂ガ時ニ種々異リタル症候ヲ起スコトアルハ古來周知ノ事實デアル、余自ラモ本症ト類似ノ頑固ナル咽頭異物感ノ爲メニ又頑固ナル就寢時ニ發作セル乾咳ノ爲メニ又タ常習的ニ頻數ノ「ガーガー」ナル去痰行爲ヲナス爲メニ是ヲ除ク目的ニ現存シタル巨大懸壜垂ヲ手術的ニ縮小シテ此等ノ諸症候ヲ容易ニ除去シ得タコトガアル、去レバ所謂「ヒステリー」球ナル者ハ純然タル自覺的症候デアルト決定セバ兎ニ角モデアアルガ差シ當リ余ノ考察ニ依レバ其大多數ハ他覺的症候デアルト見テ差支ナイヨウデアアルカラ顯著ナル「ヒステリー」球ヲ訴ヘル者ニ遭遇セバ必ズ先ヅ懸壜垂及舌根扁桃腺ノ大小形狀ヲ觀察シテ若シ此等ノ部分ニ著キ肥大ヲ認定シタトキハ直ニ之ヲ手術的ニ切斷スルヲ以テ最モ必要デアルト確信スル。

(二)巨大懸壜垂ノ診斷ハ甚ダ容易デアルヨウデアツテ其實甚ダ困難ナモノデアアル、吾人ノ咽頭検査ノ條ニハ軟口蓋ハ懸壜垂ト共ニ多クハ變縮シテ上方ニ緊張牽引サル、ノデ多少ノ過刺懸壜垂ガ現存スルモ之ヲ輕々シク看過スルヲ常トスル、巨大懸壜垂特ニ其舌根又ハ會厭軟骨ニ觸接シテ所謂「ヒステリー」球ナル症狀ヲ起シタル場合ノ病源ヲ診斷セント欲スルトキニハ、常ニ患者ニ平然タル鼻呼吸ヲ營マシメツ、軟口蓋ニ變縮緊張ヲ來サシメザル狀態ニ於テ検査ヲ遂ゲザル可ラザルモノトス。(終リ)