海猿内淋巴囊ノ解剖學的研究 (其ノ一)

海猿ノ内淋巴囊血管ノ研究 竝ニ犬、猫、家兎及ビ「ラッテ」ノ内淋巴囊血管ノ研究

S. Goto: Die Anatomie des Sacculus endolymphaticus des Meerschweinchens. (Erste Mitteilung.)

über Untersuchungen der Blutgefäße im Sacculus endolymphaticus des Meerschweinchens und Vergleich derselben

mit denen des Hundes, Kaninchens, der Katze und der Ratte.

大阪醫科大學耳鼻咽喉科教室 (主任辰巳教授)

醫學士 後 藤 松 一

緒 言

我ガ耳科學ノ進歩ハ前世期末ヨリ今世期ニ亙ル内耳ニ關スル幾多ノ研究業績ニ待ツ事多大ニシテ、最近十數年間ハ洋ノ東西ヲ問ハズ、内耳ノ解剖學ニ、生理學ニ、將タ病理學上ニ實驗的研究ノ黃金時代ヲ現出シ、現今ニ於テハ殆ント研究シ盡サレ遺殘セル研究餘地無キノ觀ヲ呈セリ。然レ共尙ホ之等ヲ仔細ニ觀察スル時ハ、之等ノ研究ハ主トシテ蝸牛殼、前庭並ニ三半規管等ニ限局シテ微ニ入り細ニ亙リ探究セラレツ、アルモノニシテ、膜樣迷路ノ一部ヲ構成セル内淋巴囊ニ至リテハ、研鑽ノ充足セザル所アルヲ認識セザルヲ得ズ。元來此ノ内淋巴囊タルヤ、其ノ解剖的位置ガ骨性迷路ノ外ニアリテ骨頭蓋ニ接シ且ツ其ノ組織成分ハ甚ダ菲薄纖小ナルガ爲メニ、多クハ内耳研究ニ際シ此ノ内淋巴囊ニ特別ナル注意ヲ拂フニ非ザレバ、是レヲ看過シ等閑ニ附セラル、コト多ク、從テ内淋巴囊ニ關スル研究ハ他ノ膜樣迷路ノ研鑽セラレタルニ比シテ甚シク遲滯シ、其ノ知見モ極メテ幼稚ニシテ未ダ全ク暗冥裡ニ潛在セル未解決ノ疑問タル點多ク存在セルヲ認ム。即チ内淋巴囊ノ解剖學の形態並ニ造構ニ就テ又ハ其ノ生理學的機能ニ就テ、未ダ充分明瞭ナル域ニ到達セリト云フ事ヲ得ズ。

殊ニ茲ニ報告セントスル内淋巴囊血管ニ關シテハ余ノ最モ興味ヲ感ジタルモノニシテ、初メ余ハ海猿ノ鐙骨動脈ノ研究ヲ爲サント欲シ、其ノ研究材料トシテ聽器血管ノ動脈管ノミニ色素ヲ有シ靜脈内ニハ全ク色素ノ進入セザル材料ヲ作製スル事ニ腐心シ、遂ニ此ノ目的ヲ達シ、此ノ標本ニ依リテ鐙骨動脈ヲ研究スル傍ラ内耳動脈ノ分布狀態ヲ檢索セリ。是レヲ精檢スルニ前庭導水管ニハ色素ノ注入セラレザル血管ノミヲ見ルモ、内淋巴囊ニハ色素ノ注入セラレタル血管ノ多數ニ存在セルヲ認メタリ。此ノ事實ハ余ノ大ニ奇異トシ且ツ興味ヲ感ゼシ所ナリ。如何トナレバ内淋巴囊ハ膜樣迷路組織ノ一部分ナル故ニ、是レニ分布セラル、血管ハ恐ラク他ノ膜樣迷路ト同一ナル血管幹即チ内耳動脈ノ

支配下ニアルモノト想像シ居タリシニ、實際ニ於テハ想像ト全ク異ナル關係ヲ呈セリ。茲ニ於テ余ハ内耳血管ニ關スル文獻ヲ涉獵セルニ、蝸牛殼、前庭並ニ三半規管ニ分布セラル、血管ニ關シテハ偶ナク詳細ニ檢索セラレテ、更ニ研究ノ餘地ナキモノ、如キモ、前庭導水管ニ分布セル血管ノ研究ニ就テハ稀ニ其ノ記載ヲ見ルコトアルノミニシテ、内淋巴囊血管ニ至リテハ余ノ寡聞未ダ其ノ記載ナキヲ知ルニ至リテハ更ニ吃驚セザルヲ得ズ。是レ余ガ非オラ願ミズ内淋巴囊血管ノ研究ヲ志シタル所以ニシテ、余ガ初メテ此ノ研究ヲ企圖劃策シテヨリ爰ニ年アリ、幸ニシテ其ノ目的ノ一端ヲ達シ稍々興味アル從來未知ノ新知見ヲ擧ゲ得タルヲ以テ、爰ニ其ノ成績ヲ發表シテ大方諸彦ノ批判ヲ仰ガントス。

文 献

哺乳動物ノ膜様迷路血管ニ關シテハ從來之ヲ研究セル學者アレドモ、充分精細ナル研究ヲ盡シタルモノト思惟スル能ハズ。

一九〇二年 Siebenmann 氏ガ人間ノ迷路血管ノ分布狀態ヲ研究シ、可成リ完全ノ域ニ達シタル感アレドモ、内淋巴嚢ニ於ケル血管ニ至リテハ記載スル所ナシ。

一九〇三年 Shambaugh 氏ハ Schwein ノ内耳血管ヲ研究シ、一九一〇年同氏ハ復 Schaf 及ビ Kalb ノ内耳血管ヲ研究セリ。而シテ彼ハ是等三種ノ動物ノ内耳血管ヲ比較研究シテ次ノ結論ヲ下セリ。

Eine kleine Arterie, ein Zweig der hinteren Vorhörsarterie, verlässt den Vorhof am Aquaeductus vestibuli entlang.

Bei allen drei Species dränirt das venöse Blut aus dem Vorhof und den halbzirkelförmigen Kanälen in die Vena canaliculi cochleare, jedoch mit der einen Ausnahme, dass beim Kalb die Vene aus dem crus commune das Labyrinth oft am Aquaeductus Vestibuli entlang verlässt.

一九〇八年淺井氏ハ Siebenmann 氏ノ下ニテ Hund 及ビ Ratte ノ膜様迷路ノ血管ニ就テ研究セラレタルモ、内淋巴嚢ニ就テ何等記載スル所ナク、只前庭導水管靜脈ノ前庭導水管ニ沿フテ走レルヲ記セルノミナリ。

大正十一年鍋谷氏ハ house dog ノ膜様迷路ノ血管ニ就テ詳細ナル研究ヲ遂ゲ、淺井氏ノ其ト異ナル新知見ヲ擧ゲタルモ、内淋巴嚢ニ就テ記載ナク、只内淋巴管ニ沿フテ前庭導水管靜脈ノ走レルヲ記載セルノミナリ。

大正十二年同氏ハ更ニ哺乳動物(Guinea-pig, rabbit, cat, dog, rat, monkey)及ビ人間ノ内耳血管ニ就テ比較解剖學的ニ研究ヲナシ、現今ニ於テハ其ノ最モ精細ヲ極メタルモノナレドモ、同氏モ亦内淋巴嚢ノ血管ニ就テハ毫モ記載スル所ナク、人間及ビ或ル種ノ動物ニ於テハ

種に於て既に述べてある通り、右の二問題に關するは同氏の原文に於て記さる。

Guinea pig: The ductus endolymphaticus. I could not discover any such dense capillary network on the ductus endolymphaticus of the human ears of Siebenmann and of mine, but only a fine vein which emerges from some capillary on the surface of the dorsal vestibule. It may be traced to v. aquaeductus vestibuli, but occasionally I found a complete trunk of v. aquaeductus vestibuli which collects the venous blood of part of the vestibule. (P. 27).

Rabbit: The capillary vessels on the membranous wall of the canaliculi cochleae and its aquaeductus vestibuli do not seem to be supplied in any way by the labyrinthine artery, but they are definitely related to the venous system, for on the wall of the canaliculi cochleae connections have been observed with v. cochleae accessoria and on the aquaeductus vestibuli with v. cochleo-vestibularis. (P. 45).

Cat: V. aquaeductus vestibuli is absent.

all the venous blood of the cat's labyrinth is collected in to but one trunk, i. e., v. canaliculi cochleae, and I managed to discern, after much labor, a few capillary connections with the so-called v. auditoria interna. (P. 54).

Dog: The venous trunks of the blood-vascularization of the membranous labyrinth are two, as follows; a. v. canaliculi cochleae. b. v. aquaeductus vestibuli: It is not so large as Asai makes it in his description, it collects only v. cruris communis and some tributaries on the dorsal surface of the vestibule. (P. 65).

Rat: Venous system of the rat has two trunks, one of them is v. canaliculi cochleae which collects all the venous tributaries in the cochleae and about a half of the vestibule, the other is v. aquaeductus vestibuli which receives the tributaries of the other half of the vestibule, crus commune and semicircular canals. (P. 68).

Monkey: The labyrinth of the monkey has two venous trunks as in the human ear, i. e., v. canaliculi cochleae and v. aquaeductus vestibuli. (P. 81).

Man (Japanese):

R. vestibularis;

A section of the posterior edge of the utricle

I found, more over, some inconstant branches on the wall of the ductus endolymphaticus and on the peristomal wall of the saccle. (P. 89).

V. vestibuli posterior.

In the course of this trunk, it collects many kinds of twigs, i. e., a part of the radiating branches which are left from the other vein in the proximal end of the lamina spiralis, namely, Vv. radiatae lamina spiralis tertiae, and some inconstant twig of the saccle, some powerful twigs of the utricle of the ventral and dorsal surface, and some other twigs which are in the capillaries of the wall of the aquaeductus vestibuli. (P. 103).

The ductus endolymphaticus and the ductus perilymphaticus: On the membranous wall of the endolymphaticus (the aquaeductus vestibuli) I find many venous capillaries just like a tube of the venous capillary network, while on the wall of the ductus perilymphaticus (the canaliculi cochleae) I find scarcely any capillary. (P. 116).

以上諸氏ノ文獻ヲ總括スレバ次ノ如シ。

豚、羊、及ビ仔牛等ノ内耳ニ於テハ、内耳動脈ノ第二枝ナル後前庭動脈ヨリ分岐セル一小動脈ハ、前庭ヲ過ギテ前庭導水管ニ沿フテ走ル。

人間ノ内耳ニ於テハ、内耳動脈ノ前庭枝ヨリ不定ニ分岐スル一小動脈ガ、内淋巴管ノ周壁及ビ正圓囊ノ骨膜ニ走ル。

人間ノ内耳ニ於テハ、前庭導水管ノ周壁ニ毛細血管網アリテ後前庭靜脈ニ集マル。

猫、豚、及ビ仔牛等ノ内耳ニ於テハ、前庭導水管靜脈ヲ缺クモ、羊ニ於テハ屢々之ヲ存有シ、「ラッテ」海嶽、家兎、犬、猿及ビ人間等ニ於

テハ常ニ之ヲ存有シ、内淋巴管ニ沿フテ走ル。

研 究 方 法

余ノ研究方法ヲ記載スルニ先チ、今日マデニ行ハレタル先進諸家ノ膜様迷路血管ノ研究方法ノ大要ヲ左ニ簡單ニ記載セン。

夫レ血管ノ研究タルヤ、必ズ血管内ニ色素ノ注入ヲ要ス可キモノニシテ、此ノ色素ハ酸ニ依リテ褪色セズ、且ツ血管外ニ浸潤セザル微細ノ色素乳劑ニシテ、而モ毛細血管ヲ通過シ得ルヲ要ス。此ノ目的ノ爲メニ、多クハ「ベルリーナーブラウ」水溶液ノ如キモノヲ使用シテ血管内ニ注入シ次デ、

(一)材料ヨリ顯微鏡の連續切片ヲ製作シ、Reconstructionsmethodeニ依リ Plattenmodelleヲ作ル方法ニシテ、此ノ方法ハ材料大ニシテ且ツ微細複雑ナル血管ヲ有スル内耳全體ノ血管研究ニ應用スルニハ多少不適當ナル所アリ。

(二)材料ヲ厚キ平板ニ切り、之ヲ透視液ニ投入シテ、顯微鏡或ハ双眼顯大鏡ニテ檢スル方法ナリ。

(三)内耳周圍ノ餘分ノ組織ヲ切除シ、之ヲ透視液ニ投入シテ檢鏡スル方法ナルモ、是レハ尙ホ膜樣迷路ノ周圍ノ血管ノ爲メニ妨害セラレテ、目的ノ膜樣迷路ノ血管ヲ明瞭ニ透視スルコト困難ナリ。此ノ障礙ヲ除去スル爲メ、色素ヲ注入セル材料ヲ脫灰セズシテ、先ヅ「チエロイデ」封埋法ヲ施シ然ル後脫灰スル時ハ、骨性迷路殼ハ容易ニ膜樣迷路ノ鑄型標本(Corrosierte Cellodinauguss)ヨリ剝離スルコトヲ得。此ノ鑄型標本ヲ透視液ニ投入シテ其ノ血管ヲ檢鏡スル方法アルモ、余ノ研究目的ニハ適セズ。

次ギニ余ノ研究方法ヲ記センニ、實驗動物トシテハ膜樣迷路血管ノ研究ニ最モ適當セル海猿ヲ先ヅ探定シ、次ニ他ノ哺乳動物ニ及ビタリ。何レモ皆強壯ニシテブライヤー氏耳翼反應ノ鋭敏ニシテ且ツ全身毫モ異狀ナキ動物ノミヲ使用セリ。而シテ本實驗ニ供シタル海猿ノ數ハ百頭餘ノ多キニ及ベリ。

次ニ血管内ニ注入スル色素トシテハ、余ハ「ベルリーナーブラウ」墨汁、烏賊ノ墨「カルミン」並ニ赤色硫化汞(朱)等ヲ使用シタルモ、多クハ好シデ「ベルリーナーブラウ」及ビ朱ヲ使用セリ。而シテ「ベルリーナーブラウ」ハ三乃至五%ノ水溶液トナシ、數回充分脫脂綿ニテ濾過シタル後檢鏡シテ、大ナル色素顆粒ノ存在ナキヲ要ス、如何トナレバ此ノ大ナル色素顆粒ガ毛細管ヲ通過シ得ザル時ハ其ノ成績ニ大ナル影響ヲ及ボスヲ以テナリ。朱ハ又其ノ目的ハ前者ト稍々趣ヲ異ニス。先ヅ卵黃ヲ「ガーゼ」ニテ濾過シタルモノヲ使用シテ、卵黃一個ニ朱一〇・〇ノ比ノ乳劑ヲ作り、是ヲ試驗動物ノ動脈ヘ單獨ニ、或ハ「ベルリーナーブラウ」ヲ注入シタル後ニ之ヲ注入スル時ハ、毛細管ヲ通過シテ殆ント靜脈ニ移行スル事ナキ故ニ、透視標本及ビ「レントゲン」寫真ニヨリテ其ノ動脈ノ連絡ヲ知ルニ便利ナリシナリ。「ベルリーナーブラウ」ハ使用前ニ更メテ濾過シ、朱ノ乳劑ハ使用直前ニテ調製スルヲ可トス。

血管内色素注入方法ハ聽器生體洗滌固定法ノ時ノ如ク、先ヅ千瓦ヲ容レル一個ノ「イルリガートル」ト硝子製ノ細キ「カニユーレ」トヲ、長サ約一・五米ノ護謨管ヲ以テ連絡シ、生理的食鹽水ヲ充分ニ濾過シ約四十度ニ加温シテ此ノ中ニ滿シ、「クレンメ」ヲ以テ之ヲ挟ミ置キタルモノヲ豫メ用意ス。

試驗動物ニ「クロロフォルム」麻醉ヲ施シ、直チニ胸腔ヲ開放シテ心臟ヲ露出シ、尖刀ヲ以テ左心室ニ小ナル穴ヲ穿チ、豫メ準備セル上記ノ「カニユーレ」ヲ此ノ穿刺孔ヨリ挿入シテ上行大動脈ニ達セシム。之ト同時ニ右心房ヲ切開シ、護謨管ノ「クレンメ」ヲ開ク時ハ食鹽水

ハ動脈ヨリ靜脈ニ移行シ、右心房ノ切開口ヨリ流出ス。此ノ際下行大動脈ヲ結紮スル時ハ食鹽水及ビ色素ノ節約ヲナスコトヲ得。此ノ流出食鹽水ガ血液ヲ混ゼザルニ至ラバ色素ヲ入レタル二〇・〇瓦ノ硝子製罐腸器ニ護膜管ヲ以テ連結セル硝子製ノ「カニユーレ」ヲ、血液洗滌ニ用キタル「カニユーレ」ト交換シ、大動脈ト共ニ之ヲ結紮シ、徐々ニ壓力ヲ加ヘテ色素ヲ注入ス。此ノ操作ヲ繁雜ト思フ時ハ、之ガ爲メニ殊ニ製作セラレタル大ナル注射器ヲ以テ一回ニ色素ヲ注入スルカ或ハ「イルリガートル」ヲ用フルモ可ナリ。注入セル色素ニヨリテ皮膚、結膜及ビ口腔殊ニ舌粘膜ガ一樣ニ青色ヲ呈スルニ至ル時ハ色素ノ充分注入セラレタル徴候ニシテ、此ノ際先ヅ頸靜脈ヲ結紮シ、次デ少シク壓力ヲ加ヘテ、心臟ノ上部ニ於テ上行大動脈及ビ下行大動脈ヲ結紮ス。結紮部ヨリ下端ヲ切斷シ、外聽道ヨリ中耳腔ニ一〇％「フォルマリン」水ヲ注入シ、又顱頂骨ニ皮膚ト共ニ穴ヲ穿チ、左記ノ混合液ニ一週間投入シテ固定脫灰ス。

「フォルマリン」二〇・〇 水 六〇・〇 硝酸 二〇・〇

次デ一日間水洗シタル後チ、頸部切斷、下顎關節ノ離斷、兩側中耳腔ヲ開放シ、頭蓋ヲ正中線ニテ縱斷シ、腦及ビ不必要ノ組織ヲ除去シ、再ビ一日間前記ノ混合液ニ漬浸シテ脫灰ス。次ニ水洗一日間、漸濃ノ「アルコホル」ニテ脫水スルコト五日間トス。

鑄型標本ヲ製作スルニハ、色素ヲ注入セル材料ヲ一〇％「フォルマリン」水ニテ七日間固定シ、水洗後脫灰セズニ漸濃ノ「アルコホル」ニテ脫水スルコト各三日間、無水「アルコホル」及ビ無水「アルコホル」「エーテル」等分液ニ各二日間、稀薄、中等及ビ濃厚ナル三種ノ「チエロイデン」ニ各七日間浸漬シ、後チ極メテ徐々ニ蒸發硬化セシメテ封埋ヲ終了シ、七〇％「アルコホル」中ニ投入スルコト三日間、次ニ

七〇％「アルコホル」 八〇・〇 硝酸 二〇・〇

ノ混合液ニテ脫灰スルコト二週間、次ギニ七〇％「アルコホル」ニ漬浸シテ酸ヲ除去シ、骨迷路ヲ膜様迷路ヨリ注意シテ剝離シ、無水「アルコホル」ニテ脫水ス。

斯クシテ製作シタル内耳及ビ膜様迷路ノ鑄型標本ヲ透視液ニ投入シテ、双眼廓大鏡或ハ弱度ノ顯微鏡ニテ檢鏡セリ。

透視液ニハ「ペンツォール」「クレオソート」「サフロール」「イゾサフロール」「キシロール」或ハ是等二三種ノ混合液及ビ冬綠油(Wintergrünol)「サリチール酸メチールエステル」等アレドモ、余ハ主トシテ冬綠油ヲ使用セリ。

膜様迷路ノ鑄型標本ニ依ル時ハ、三半規管前庭及ビ蝸牛殼等ノ膜様迷路ノ相互ノ關係ヲ檢査スルニハ甚ダ適當ナルモ、膜様迷路ヨリ骨迷路ヲ剝離スル際ニ、内淋巴管ハ細長ナル故ニ中途ニ於テ切斷セラレ易ク、内淋巴囊ト共ニ前庭ヨリ連絡ヲ離斷セラル、爲メ、余ノ研究目的ニハ不適當ナリシナリ。是レ即チ從來ノ血管研究家ノ内淋巴囊及ビ内淋巴管血管ノ研究セラレザリシ原因ノ其ノ一ナルベシ。

又前記ノ如ク聽器ニ「チロイデン」ヲ封埋ヲ施サズシテ透視液ニ投入シテ検査スル時ハ、内淋巴囊以外ノ膜樣迷路ノ血管ノ徑路ヲ知ルコトヲ得ルモ、血管内ヘ色素ノ充分注入セラレタル場合ハ、S字狀囊ニモ亦色素ヲ以テ充滿セラルハ、故ニ、其ノ内側壁内ニ存在スル内淋巴囊ノ大部分ニ於ケル血管ハS字狀囊ノ色素ニ隠匿セラレテ毫モ之ヲ識別スルコトヲ得ズ。是レ即チ先進諸家ニ依リテ内淋巴囊血管ノ研究セラレザリシ原因ノ其ノ二ナルベシ。

茲ニ於テ余ハ苦心慘憺遂ニ一方法ヲ案出スルニ至レリ。即チ材料ノ脫灰、水洗後ニ於テS字狀囊ノ外側ニ於ケル顙骨及ビ囊ノ外側壁ヲ除去シ、細キ毛筆ヲ以テ囊内ニ沈着セル色素ヲ洗ヒ去ル時ハ、内淋巴囊ノ血管ハ劃然トシテ明瞭ニ現ハレ、從テ周圍トノ關係ヲ明細ニ知ルコトヲ得タリ。

一部ノ材料ハ前記ノ如ク脫灰透明ニセル標本ニ於テ、双眼廓大鏡ヲ以テ内淋巴囊及ビ内淋巴管ノ圖ヲ畫キ置キ、此ノ標本ヲ再ビ無水「アルコホル」ニ入レ戻シ、普通聽器ノ「チェロイデン」ヲ封埋法ニ從ヒ、三〇乃至六〇〇「ミクロン」ノ種々ナル厚サノ連續切片ヲ製作シタリ。其ノ中ノ薄キ切片ハ輕ク「ヘマトキシリン・エオデン」ノ復染色ヲ施シ、載物硝子ノ上ニ「バルザム」ニテ封ジ、厚キモノハ染色セズニ小ナル「シヤール」ニ入レタル冬綠油ニ浸漬シテ之ヲ檢鏡シ、豫メ畫キ置キタル圖ト比較シテ其ノ正確ヲ期セリ。

尙ホ朱ノ乳劑ヲ注入シタル材料ハ脫灰、水洗後ニ正中線ニ於テ頭部ヲ縱斷シテ腦ヲ除去シ、豫メ「レントゲン」寫眞ヲ撮影シ置キ、是ト標本ヲ肉眼或ハ廓大鏡ニテ Präparieren シタルモノトノ血管ノ徑路ヲ比較検査シ、尙ホ微細ナル血管ハ標本ヲ小ナラシメ、透視液ニ浸漬シテ檢鏡セリ。

海猴ノ内耳血管（第一圖及ビ第二圖參照）

海猴ノ所謂内耳血管ニ就テハ既ニ鍋谷氏ガ詳細ナル研究報告ヲナシ、余ノ研究セル所ト略一致セル故ニ、本問題即チ内淋巴囊ノ血管ト關係淺キ個所ハ簡單ナル記載ニ止メ、關係深ク且ツ諸家ノ記載ト相異セル點ハ之レヲ詳記セン。

I 迷路動脈 (A. labyrinthica Fig. 1. al) ハ基礎動脈 (A. basilaris Fig. 1. ab) ヲリ分岐スル前下小腦動脈 (A. cerebelli inferior anterior Fig. 1. acia) ノ枝ニシテ、内聽道口ノ後方ヨリ前上方ニ廻リ聽神經ト共ニ内聽道ニ入り、其ノ經過中ニ次ギノ三動脈ニ分岐ス。

A. 前庭動脈 (A. vestibuli anterior Fig. 1. ava) 内聽道口外ニ於テ第一枝トシテ分岐シ、聽神經ノ前枝ニ沿フテ走り前庭ノ前方ニ至ル。本動脈ハ其ノ經過中ニ於テ内聽道ニ多クノ小枝ヲ分岐シ、遂ニ正圓囊ノ一部、橢圓囊及ビ橢圓囊聽斑、外半規管膜樣壺腹及ビ其ノ聽梯並ニ上半規管壺腹等ニ分布ス。

B. 後前庭動脈 (*A. vestibuli posterior* Fig. 1. avp) 前庭動脈ヲ分岐セル後ノ總蝸牛殼動脈 (*A. cochleae communis*) ハ内聽道内ヘ進入シ本動脈ヲ第二枝トシテ分岐ス。

本動脈ハ余ノ研究ニ對シテ極メテ密接ナル關係ヲ有スル爲メ左ニ項ヲ改メテ之ヲ詳記セン。

C. 固有蝸牛殼動脈 (*A. cochleae propria* Fig. 1. acp) 第三枝トシテ分岐セラレタル本動脈ハ其ノ名稱ノ示ス如ク蝸牛殼ニ分岐ス。後前庭動脈ハ蝸牛殼基礎廻轉ノ下部、蝸牛殼神經ノ外側ニ於テ總蝸牛殼動脈ヨリ分岐スルヤ、正圓囊ノ後下方ニ於テ正圓囊總班ニ、

a. 正圓囊動脈 (*A. saccularis* Fig. 2. as) ヲ分岐ス。又蝸牛殼螺旋神經及ビ骨軸底部ニ小枝ヲ送り、後前庭動脈ヲ横切リテ正圓囊ノ後上方ニ於テ前庭盲囊ニ至ル細キ、

b. 前庭盲囊枝 (*R. caecum vestibuli* Fig. 2. acv) ト總脚、外側單脚及ビ後壺腹半規管等ニ分布スル動脈トニ分岐ス。前記ノ前庭盲囊枝ハ基礎廻轉ニ於テ固有蝸牛殼動脈ノ第一枝ト吻合ス。後ノ太キ動脈枝ハ後前庭動脈ノ延長ニシテ前庭ノ内側直下ニ於テ更ニ、

c. 總脚枝 (*R. cruris communis* Fig. 2. rec)

d. 外側單脚枝 (*R. cruris simplex lateralis*)

e. 後壺腹半規管枝 (*A. ampullo-semicircularis posterior*)

ノ三枝ニ分岐ス。

總脚枝ハ前庭ノ内側壁ヲ通りテ内淋巴管下端ニ至リ更ニ二枝ニ分岐ス。其ノ一枝ハ内淋巴管ノ外側ヲ通りテ總脚ノ後方ヲ走リテ、後半規管ニ至ル。他ノ一枝ハ内淋巴管ト總脚トノ間ヲ前方ヘ横切リ前後ニ於テ、内淋巴管ニ小枝即チ内淋巴管動脈 (*A. ductus endolymphatici* Fig. 1. 2. ade) ヲ送り、總脚ノ前下端ニ於テ急ニ略々直角ニ上方ニ曲リ、其ノ前側ニ沿ヒテ上リテ前半規管ニ至ル。此ノ二ツノ動脈ハ總脚及ビ半規管ニ於テ毛細血管ニ分レ、其ノ終末ハ各反對ノ單脚ノ動脈及ビ靜脈ト吻合ス。

前記ノ内淋巴管動脈ハ海狸ニ於テハ先人ノ未ダ記載セザル動脈ニシテ、吾人ガ初メテ命名シタルモノナリ。本動脈ハ其ノ分岐スルヤ、一乃至二回ノ蛇行廻轉ヲナシ内淋巴管ニ沿フテ上行シ、二乃至三ノ毛細血管ニ分レ、其ノ上端ニ於テ後述ノ前庭導水管靜脈ニ合スルヲ見ルヲ以テ、本動脈ハ單ニ内淋巴管ノミヲ營養スルモノナラント信ズ。又此ノ内淋巴管動脈ハ余ノ研究材料中色素ノ充分注入セラレタル七個ノ標本ニ於テ何レモ常ニ認メラレシ動脈ニシテ、鍋谷氏ノ人間ニ於テハ不定ニ前庭枝ヨリ分岐シテ内淋巴管ノ周壁ニ分布スル動脈ヲ認メタルモ、狼、犬、猫、家兎、海狸及ビ「ラッテ」等ニ於テハ該動脈ニ關スル記載ヲ認メ得ザリキ。又 Chamberland 氏ガ豚、羊及ビ仔牛等ニ於テ後前

庭動脈ヨリ分岐シテ、前庭導水管ニ沿フテ走ル動脈ヲ認メタルモノニ一致スルモノナルモ、同氏ハ此ノ血管ノ分布狀態及ビ之ト内淋巴囊トノ關係ニ就テ記載スル處ナシ。次ギニ余ノ研究ノ主眼ナル海猿ノ内淋巴囊血管ニ就テ詳記セン。

海猿ノ内淋巴囊ノ血管ノ所見

内淋巴囊動脈（第一圖—第四圖参照）

内淋巴囊血管ノ研究ニハ先ヅ内淋巴囊ノ解剖的位置ヲ正確ニ知ラザル可カラズ。故ニ先ヅ讀者ノ理解ニ便セン爲メニ内淋巴囊ノ解剖ヲ略記セン。

即チ内淋巴囊ハ半規管總脚ノ前及ビ後半規管ノ二脚ニ分岐スル場所ニ接近シテ其ノ後上方ニ位シ、其ノ上方ノ大半ハ此處ニ存在スル太キS字狀竇ノ内側壁（腦ニ面セル壁）内ニ抱容セラレ、下端ハ前庭導水管外孔内ニ入ル。其ノ形ハ長橢圓形ニシテ其ノ表裏兩面及ビ周縁ニ多數ノ突起ヲ有スル木葉狀ヲ呈シ、上下ニ長ク（約二耗）前後ニ狭ク（約一耗）又内外ニ扁平ナリ。其ノ上端ハ盲端ヲ以テ終リ、下端ハ内外ニ扁平ニシテ喇叭狀ヲ呈セル前庭導水管ノ外孔ニ嵌入シ、次第ニ細クナリテ内淋巴管ニ連絡スル膜樣囊ナリ。内淋巴管ハ半規管總脚ノ後方ニ接近シテ之ニ平行ニ走り、内孔ヲ以テ前庭ニ開口セル前庭導水管ノ中ヲ走ル。尙ホ内淋巴囊ハ肉眼のニハ周圍ノS字狀竇壁ニ比シテ稍々灰白色ヲ呈シ、透視標本ニ於テハ其ノ上皮細胞及ビ囊内ノ淋巴液中ニ浮游スル或ル種ノ細胞中ニ含有スル褐色ノ色素ヲ認ムルコトニ依リテ其ノ位置ヲ知ルコトヲ得。

余ノ標本ニ於テハ海猿ノ内淋巴囊ハ前下小腦動脈ヨリ分岐スル所謂迷路動脈ノ一小分岐枝ナル内淋巴管動脈ヨリ分枝セラル、モノニ非ラズシテ、之ト全然異ナル動脈幹ヨリノ分岐枝ニヨリテ分布セラル、ヲ確認セリ。文獻上海猿ニ於テハ該動脈幹及ビ其ノ分岐枝ニ關スル記載ヲ求ムルコト能ハザル故ニ其ノ名稱ヲ知ルコトヲ得ザルモ、犬ニ於ケル後頭動脈（*A. occipitalis*）ニ全ク一致スルモノナル故ニ、之ニ從テ其ノ名稱ヲ附ス（後述ノ猫、家兎及ビ「ラッテ」等ニ於テモ之ト同様）。

此ノ後頭動脈（Fig. 1. ao. Fig. 3. o）ハ海猿ニ於テハ喉頭上部ニ於テ總頸動脈ヨリ分岐スル血管ニシテ外側ニ横ニ走り、先ヅ咽頭後壁附近ノ筋肉ニ小枝ヲ送り、次ニ頸靜脈孔ノ所ニテ三枝ニ分岐シ、他ノ一枝ハ頸靜脈ノ壁ニ沿フテ上リ、周圍ニ數條ノ小枝ヲ分岐シテ頭蓋腔ニ入り數條ノ血管ニ分岐シ、主トシテ後頭蓋窩ノ硬腦膜ヲ榮養スル後硬腦膜動脈（*A. meningea postica* Fig. 1. 2. 4. amep. Fig. 3. h）ニシテ一部ハ中硬腦膜動脈（Fig. 3. e）ト吻合ス。（Fig. 3. i）其ノ中ノ一小枝ハ内淋巴囊ノ後方ニ於テ不定ニ分岐シ、該囊ノ後方ニ分布スル内淋巴囊動脈（*A. sacus endolymphatici* Fig. 2. ase. I）トナル。又S字狀竇（ss）ノ後縁ヨリ上縁ニ沿フテ走ル硬腦膜動脈枝ヨリシテ、

内淋巴囊ノ上方ニ於テ之ニ二三本ノ一定セル内淋巴囊動脈 (Fig. 2 a. a. II.) ヲ分布ス。是等ノ内淋巴囊動脈ハ單ニ内淋巴囊ノミニ分布スルモノニ非ラズシテ、各其ノ一部ハ近隣ノ硬腦膜ニモ分布ス。

圖 一 第

(Fig. 1.)

圖略ノ脈動頭後。脈動路迷。脈動腦小下前。脈動底基ノ海海
(ル見リヨ方上耳右)

ab	基底動脈
ac	小腦動脈
acc	總頸動脈
acila	前下小腦動脈
acp	固有蝸牛殼動脈
ade	内淋巴管動脈
al	迷路動脈
amep	後硬腦膜動脈
ami	内聽道口
ao	後頭動脈
ase	内淋巴囊動脈
av	椎骨動脈
ava	前前庭動脈
avp	後前庭動脈
dal	外半規管
dap	後半規管
dss	上半規管
se	内淋巴囊

此ノ内淋巴囊動脈ハ蛇行シツ、S字狀變ノ内側壁ヲ横切り、内淋巴囊ノ附近ニテ多數ノ毛細血管ニ分レ、其ノ上端ヲ包圍スルニ及ビ次第ニ其ノ太サヲ増シ、其ノ長軸ニ稍々平行ナル網狀ノ毛細管即チ靜脈叢ヲ形成シテ内淋巴囊ヲ圍繞シ、其ノ下端ノ内淋巴管ニ移行スル部ニ於テ

ハ次第二相集リテ數條ノ太キ靜脈即チ内淋巴囊靜脈トナル（第四圖参照）。

II 膜様迷路靜脈ヲ大別シテ二條トナス。（第二圖、第四圖参照）

A. 蝸牛殼小管靜脈（*V. canaliculi cochleae* Fig. 2. voc）前庭、蝸牛殼及ビ三半規管等ノ大部分ノ靜脈血ヲ集ムル大ナル靜脈ナリ。

B. 前庭導水管靜脈（*V. aquaeductus vestibuli* Fig. 2. vav）前者ノ殘リ即チ前庭ノ一部分ノ靜脈血ヲ集ムル細キ靜脈ナリ。

本靜脈ハ稀ニ總脚靜脈（*V. cruris communis* Fig. 2. voc）ヲ合シテ比較的太キ靜脈ナルコトアリテ内淋巴管ニ沿フテ走ル。

以上ハ内淋巴管ノ下半ニ於テ然ルモノニシテ、鍋谷氏モ等シク認メタル事實ナリ。然レ共其ノ上半部ニ於テハ尙ホ内淋巴管ノ靜脈ヲ集メ、其ノ上端内淋巴囊ニ移行スル部ニ於テハ、内淋巴囊ノ靜脈血ヲ集メテ下行シ來ル數條ノ太キ余ノ初メテ命名セル内淋巴囊靜脈（*V. sacculus endolymphatici* Fig. 2. vse）ヲ合シツ、後方ニ曲リ、又近隣ノ硬腦膜及ビ屢々岩様骨ノ一部ノ靜脈ヲモ併合シテS字狀竇ニ連絡スルヲ常トス。然レ共又稀ニ内淋巴囊ノ靜脈ノ一部ハ前庭導水管靜脈ニ合セズシテ、單獨ニ内淋巴囊ノ上方ニ於テS字狀竇ニ合スルコトアリ。以上述ブル所ノ内淋巴囊ノ血管系統ニ關スル事實ハ未ダ嘗テ先進諸家ノ記載ヲ見ザル新知見ナリ。

總括

(一) 海狼ニ於テハ後前庭動脈ヨリ分枝スル内淋巴管動脈（余ノ命名）アリテ内淋巴管ニ分布ス。

(二) 海狼ニ於テハ内淋巴囊ハ前下小腦動脈ヨリ分岐スル所謂迷路動脈ト全然關係ヲ有セザル後頭動脈ノ一枝ナル後硬腦膜動脈ヨリ分岐スル内淋巴囊動脈（余ノ命名）ヨリ分布セラル。

(三) 海狼ニ於テハ内淋巴囊靜脈（余ノ命名）ハ其ノ靜脈血ヲ集メ、内淋巴管ノ靜脈ト共ニ前庭導水管靜脈ニ合シテS字狀竇ニ連絡ス。

犬、猫、家兎及ビ「ラッテ」ノ内淋巴囊血管ノ研究

余ハ前記ノ如ク海狼ノ内淋巴囊血管ノ研究ニ就テハ、多年多大ノ苦心ト熟練トノ結果、本研究ニ對シ確固タル自信ヲ有スルニ至レルヲ以テ、引續キ他ノ哺乳動物即チ犬、猫、家兎及ビ「ラッテ」等ノ内淋巴囊血管ノ研究ニ從事シ、（人間ニ就テハ目下研究中）今ヤ其ノ完成ヲ見ルニ至レルヲ以テ、茲ニ逐次各動物ノ内淋巴囊及ビ内淋巴管ノ所見ヲ附記セントス。

各種動物ノ内淋巴囊血管ヲ研究スル場合ニハ又所謂迷路血管ノ一般ヲ知ル必要アリ、且ツ色素注入標本ハ迷路血管ヲ明示スル故ニ、是等ノ動物ニ就テモ亦共ニ其ノ迷路血管ノ研究ヲナセリ。然レ共此處ニ於テハ唯問題ナル内淋巴囊血管及ビ該血管ト迷路血管トノ關係ヲ記載スルニ止メ、所謂迷路血管ノ一般ニ就テハ之レヲ省略ス。

其(一) 犬ノ内淋巴囊血管 (第五圖參照)

A. 内淋巴囊動脈 (nac) ハ海嶽ニ於ケルト同様ニ後頭動脈ノ一枝ナル後硬腦膜動脈 (anep) ヨリ分岐ス。此ノ後硬腦膜動脈ハ内淋巴囊ノ後上方ニ接近シ、顙額骨乳嘴部及ビ後頭骨トノ間ニ存在スル間隙ヨリ頭蓋腔内へ入り、主トシテ後頭蓋窩ノ硬腦膜ニ分布スル動脈ナリ。其ヨリ一乃至二本ノ内淋巴囊動脈ガS字狀竇 (s) ノ上方ヨリ其ノ内側壁ニ沿フテ下行シテ、内淋巴囊ノ上端或ハ其ノ前後ノ側方ヨリ次第ニ分岐シテ毛細血管トナリ内淋巴囊ヲ網狀ニ圍繞シ、一部ハ途中ニ於テ周圍ノ硬腦膜ニモ分布スルヲ認ム。内淋巴囊ノ下端ガ内淋巴管ニ移行スル部ニ於テハ内淋巴管ノ毛細管ト連絡ス。

B. 内淋巴囊靜脈 (vnc) ハ其ノ内外兩側壁靜脈血ヲ集メタル太キ靜脈トナリ、内淋巴囊ノ後方ニ於テ前庭導水管靜脈 (vtp) 及ビ硬腦膜ノ靜脈 (mc) ト合シテS字狀竇ニ連絡スルヲ確認セリ。

(I) 犬ノ内淋巴管血管

内淋巴管動脈 (adp) ハ後前庭動脈 (app) ヨリ分岐スルヲ認ム。其ノ分岐スル場所ニ二ヶ所アリ。

其ノ一ハ海嶽ニ於ケル如ク總脚枝ガ後半規管及ビ上半規管ニ至ル終末動脈ニ分岐スル以前ニ於テ、細キ一本ノ内淋巴管動脈ヲ分岐シ、數條ノ毛細血管ノ網狀ヲナシテ内淋巴管ニ沿フテ上リ、其ノ上端ニ於テ内淋巴囊ノ毛細血管ト連絡シ、或ハ内淋巴管ノ下端ニ於テ一部ハ前庭導水管靜脈ニ連絡スルモノモアリ。

其ノ二ハ正圓囊動脈ガ後前庭動脈ヨリ分岐シテ直後ニ、細キ動脈ガ内淋巴管ノ方ニ向ツテ走り、前者ト同様ナル徑路ヲ取ルモノヲ認メタリ。

(II) 總括

(一) 犬ノ内淋巴囊ハ後頭動脈ノ一枝ナル後硬腦膜動脈ヨリ分岐スル内淋巴囊動脈ヨリ分布セラル。

(二) 犬ノ内淋巴囊靜脈ハ内淋巴囊及ビ内淋巴管ノ靜脈血ヲ集メ前庭導水管靜脈ト合シテS字狀竇ニ連絡ス。

(三) 内淋巴管ハ後前庭動脈ヨリ分布スル内淋巴管動脈ニ依リ榮養セラレ、其ノ靜脈血ノ大部分ハ内淋巴囊靜脈ニ、其ノ小部分ハ前庭導水管靜脈ニ注グラ認ム。

其(二) (I) 猫ノ内淋巴囊血管 (第六圖參照)

A. 内淋巴囊動脈 (ase. I. II) ハ又後頭動脈ノ一枝ナル後硬腦膜動脈 (anep) ヨリ分岐ス。此ノ後硬腦膜動脈ハ後頭骨ノ大後

頭孔ノ左右兩緣ニ接近シテ存在スル小孔ヨリ頭蓋腔内へ進入シテS字狀竇 (ss) ニ沿フテ走り、主トシテ後頭蓋窩ノ硬腦膜ニ分布スル動脈ナリ。内淋巴囊動脈ノ内淋巴囊ニ至ル部位ハ海狸ニ於ケル如ク二ヶ所アリ。

其ノ一 (case I) ハ内淋巴囊ノ後方ヨリS字狀竇ノ内側壁或ハ外側壁ヲ横斷スル動脈ヨリ分岐スルモノニシテ内淋巴囊ノ下半分ニ分布ス。其ノ二 (case II) ハ内淋巴囊ノ上方ヨリS字狀竇ノ内側壁ニ沿フテ下行スル動脈ヨリ來ルモノニシテ、内淋巴囊ノ上端ニ於テ次第ニ分岐シ、主トシテ該囊ノ上半部ニ分布シ、前者ト同ジク毛細血管網ヲナシテ之ヲ圍繞シ、一部ハ又周圍ノ硬腦膜ニ分布ス。

B. 内淋巴囊靜脈 (veg) ハ其ノ毛細血管ヲ該囊ノ内外側壁ノ中央部ニ於テ網狀ヲナシツ、二條ノ靜脈ニ集メ、遂ニ合シテ其ノ前方ヲ走ル太キ硬腦膜ノ靜脈ト合シテ上方ノS字狀竇ニ連絡スルモノナリ。

(I) 猫ノ内淋巴管血管

内淋巴管動脈 (veg) ハ又後前庭動脈ヨリ分岐スルヲ認ム。其ノ分岐スル場所ハ總脚枝ガ後半規管及ビ上半規管ニ至ル終末動脈ニ分岐スル前ニ於テ、細キ一本ノ動脈トシテ分岐シ、數條ノ毛細血管ノ網狀ヲナシテ内淋巴囊ノ毛細血管ト連絡シ、或ハ又内淋巴管ノ下端ニ於テ一部ハ R. anterior lateralis (ral) ニ合ス。此ノ總脚枝ハ鍋谷氏ノ記載ノ如ク前庭ノ外側壁ヲ通過スルコトアレドモ亦、後前庭動脈ヨリ正圓囊動脈ノ分岐後ニ分岐シ、前庭ノ内側壁ヲ通ルコトアリ。

(II) 總括

(一) 猫ノ内淋巴囊ハ後頭動脈ノ一枝ナル後硬腦膜動脈ヨリ分岐スル内淋巴囊動脈ヨリ分布セラル。

(二) 猫ノ内淋巴靜脈ハ内淋巴囊及ビ内淋巴管ノ靜脈血ヲ集メ、硬腦膜靜脈ト合シテS字狀竇ニ連絡ス。

(三) 猫ノ内淋巴管ハ後前庭動脈ヨリ分岐スル内淋巴管動脈ヨリ分布セラレ、其ノ靜脈血ノ大部分ハ内淋巴囊靜脈ニ、其ノ小部分ハ總前庭靜脈ニ連絡ス。

其三 (I) 家兎ノ内淋巴管 (第七圖参照)

A. 内淋巴囊動脈 (veg) ハ總頭動脈ヨリ屢々内頸動脈ト共同ニ分岐スル後頭動脈ノ一枝ナル後硬腦膜動脈 (amep) ヨリ分岐ス。此ノ後硬腦膜動脈ハ内淋巴囊ノ上方ニ於テ顙額骨乳嘴部及ビ後頭骨間ニ存在スル一小孔ヨリ頭蓋腔内へ進入シ、主トシテ後頭蓋窩ノ硬腦膜ニ分布スル動脈ナリ。其ノ一枝ガS字狀竇 (ss) ノ上方ヨリ其ノ内側ニ沿フテ下行シ、内淋巴囊ノ上端ニ於テ次第ニ分岐シテ毛細血管

網ヲ形成シテ該囊ヲ圍繞ス。

B. 内淋巴囊靜脈 (venous) ハ此ノ毛細管網ヲ集メテ内淋巴囊ノ後下方ニ至リ前庭導水管靜脈 (vein) 及ビ硬腦膜ノ靜脈 (vein) ト合シテ後方ノS字狀竇ニ合ス。内淋巴囊ノ下端ノ靜脈ハ又内淋巴管ニ沿フテ走ル前庭導水管靜脈ニ吻合スルヲ常トス。

(I) 家兎ノ内淋巴管血管

内淋巴管動脈ハ後前庭動脈ヨリ稀ニ分岐スルヲ認ム。其ノ分岐スル部位ハ總脚枝ガ後半規管及ビ上半規管ニ至ル終末動脈ニ分岐スル直前ナリ。而シテ此ノ動脈ハ内淋巴管下端ニ於テ數條ノ毛細血管ヲ作り、遂ニ前庭導水管靜脈ニ移行シ、内淋巴管ノ上端ニ於テハ毛細管ヲ認ムルコト能ハザリキ。

(II) 總括

(一) 家兎ノ内淋巴囊ハ後頭動脈ノ一枝ナル後硬腦膜動脈ヨリ分岐スル内淋巴囊動脈ヨリ分布セラル。

(二) 家兎ノ内淋巴囊靜脈ハ内淋巴囊及ビ内淋巴管ノ靜脈血ヲ集メ、硬腦膜靜脈及ビ前庭導水管靜脈ト合シテS字狀竇ニ至ル。

(三) 家兎ノ内淋巴管下部ニ於テハ稀ニ後前庭動脈ヨリ分岐スル細キ内淋巴管動脈アリ。其ノ靜脈ハ前庭導水管靜脈ニ合ス。

其四 (I) 「ラッテ」ノ内淋巴管血管 (第八圖及ビ第九圖参照)

A. 内淋巴囊動脈 (artery) ハ後頭動脈ノ一枝ナル後硬腦膜動脈 (artery) ヨリ分岐ス。此ノ後硬腦膜動脈ハ後頭骨ノ大後頭孔ノ

左右兩緣ニ接近シテ存在スル小孔ヨリ頭蓋腔内へ入り、主トシテ後頭蓋窩ノ硬腦膜ニ分布スル動脈ナリ。内淋巴囊ノ上方ノS字狀竇ノ上緣ヲ走ル後硬腦膜動脈ヨリ分岐スル一枝ガ、S字狀竇ノ内側壁ニ沿フテ下行ス。是レ即チ内淋巴囊動脈ニシテ、内淋巴囊ノ上部ニ於テ次第ニ分岐シ、遂ニ毛細管ヲ形成シ内淋巴囊ヲ圍繞ス。

B. 内淋巴囊靜脈ハ之等ノ毛細血管網ヲ集メ、硬腦膜靜脈ト共ニ前庭導水管靜脈ニ連絡ス。

(I) 「ラッテ」ノ内淋巴管血管

本動物ニ於テハ内淋巴管ノ血管ハ之ヲ認ムルコト能ハズ、只前庭導水管靜脈ノ之ニ沿フテ走ルモノヲ認ムルノミナリ。

(II) 總括

(一) 「ラッテ」ノ内淋巴囊ハ後頭動脈ノ一枝ナル後硬腦膜動脈ヨリ分岐スル内淋巴囊動脈ヨリ分布セラル。

(一)「ラッテ」ノ内淋巴囊靜脈ハ其ノ靜脈血ヲ集メテ稍々太キ靜脈トナリ、硬腦膜靜脈ト共ニ前庭導水管靜脈ニ合シ、其ノ後方ニ存在スルS字狀竇ニ連絡ス。

(二)「ラッテ」ノ内淋巴管ニハ之ニ沿フテ走ル前庭導水管靜脈以外ニハ血管ヲ認ムルコト能ハズ。

以上各種動物ニ於ケル内淋巴囊動脈及ビ靜脈並ニ内淋巴管動脈等ハ内外ノ文献上ニ未ダ記載ナキ前人未知ノ血管ニシテ、之レヲ記載スルハ余ヲ以テ嚆矢トス。今余ガ此ノ研究ヲ完成シ、血管解剖學上ニ一新知見ヲ加ヘ得タル事ハ、更ニ深甚ノ興味ヲ覺ユルモノナリ。

結 論

附、海猿、犬、猫、家兎並ニ「ラッテ」等ノ各種動物ノ内淋巴囊及ビ内淋巴管血管ノ比較解剖

(一)海猿、犬、猫、家兎並ニ「ラッテ」等各種動物ノ内淋巴囊ハ總テ後頭動脈ノ一枝ナル後硬腦膜動脈ヨリ分岐セル内淋巴囊動脈ヨリ分布セラル。而シテ内淋巴囊ハ本動脈ノ末梢分岐ニヨリテ形成セラレタル毛細血管網ヲ以テ圍繞セラル。

(二)海猿、犬、猫、家兎並ニ「ラッテ」等ニ於ケル内淋巴囊毛細血管網ハ遂ニ内淋巴靜脈囊ニ移行ス。

(三)海猿、犬、家兎及ビ「ラッテ」等ノ内淋巴囊靜脈ハ硬腦膜ノ靜脈及ビ前庭導水管靜脈ト合シテS字狀竇ニ連絡ス。

(四)猫ニ於テハ前庭導水管靜脈ヲ排除シ、内淋巴囊靜脈ハ硬腦膜ノ靜脈ト合シテS字狀竇ニ連絡ス。

(五)海猿、犬及ビ猫等ニ於テハ内淋巴管ハ後前庭動脈ヨリ分岐セル内淋巴管動脈ヨリ分布セラル。海猿ニ於テハ内淋巴管動脈ノ末梢分枝ハ前庭導水管靜脈ニ合シ、犬、猫ニ於テハ其ノ末梢分枝ノ一二ハ内淋巴囊ノ毛細血管ト吻合スルモノアリ。家兎ニ於テハ稀レニ内淋巴管動脈ヲ認ムルコトアルモ、「ラッテ」ニ於テハ是ヲ認ムルコト能ハズ。

拙筆スルニ際シ御指導並ニ御校閲ヲ賜リシ恩師長已教授ニ對シ謹ンテ謝意ヲ表シ、尙恩師加藤前教授ノ御指導ト仰鞭撻ニ對シ深謝ノ意ヲ表ス。又解剖學教室高木教授ノ御援助ニ對シ謹ンテ謝意ヲ表ス。

Literatur.

1. Auel, K. Die Blutgefäße in häutigen Labyrinth des Hundes. Anat. Hefte, Abt. I, Bd. 35, H. 109 (1908). 2. Auel, K. Die Blutgefäße des häutigen Labyrinthes der Ratte, Anat. Hefte, Abt. I, Bd. 36, H. 110 (1908). 3. Boettcher, A. Rückblicke auf die neueren Untersuchungen über den Bau der Schnecke, im Anschluss an einige Beobachtungen. Archiv für Ohrenheilkunde Bd. 24 (1887). 4. Eilenberger und Braun. Systematische und topographische Anatomie des Hundes 1891. 5. Gerhardt, Das Kinnchen 1909. 6. Hyrtl, Vergleichend.

anatomische Untersuchungen über das inner Gehörorgan des Menschen und der Säugetiere; Führl. Fol. Bd. 8, P. 139 (1845). 7. Hertwig, o. Handbuch, der vergleichenden u. experimentellen Entwicklungslehre der Wirbeltiere, 2. teil 2, P. 89 (1906). 8. Nabeya, D. A special Study in the Blood-Vessels on the VIII Nerve—Stem of the Canis Familiaris and a contribution to the vascularization of the Membranous Labyrinth. Kyoto Oto-Rhino-Laryngol. Clinic, Bd. 14. (1921). 9. Nabeya, D. A study in the comparative Anatomy of the Blood-Vascular System of the Internal Ear in Mammalia and in Homo (Japanese). Kyoto Oto-Rhino u. Laryngol. Clinic, Bd. 16. (1923). 10. Retzius, Das Gehörorgan der Wirbeltiere, Bd. 2, 1894. 11. Schwabe, Lehrbuch der Anatomie der Sinnesorgane, (1857). 12. Shambaugh, G. E. The distribution of bloodvessels in the labyrinth of the ear of sus scrofa domestica. The Decennial Publication of the University of Chicago, (1903). 13. Shambaugh, G. E. Die Verteilung der Blutgefäße im Ohrlabyrinth des Schafes und des Kalbes. Zeitschr. f. Ohrenheilkunde, XLVIII, 1904. 14. Shambaugh, G. E. Verbindungen Zwischen den Blutgefäßen in den membranösen Labyrinth u. dem Endostium und den Gefäßen in der knöchernen Labyrinthkapsel; Zeitschr. f. Ohrenheilkunde, Bd. L. H. 4. 15. Spalteholz, Durchsichtigmachen von menschlichen und tierischen Präparaten, Leipzig. (1914).

附圖說明

第三圖 海鏡ノ膜様迷路血管ノ略圖(右耳内方ヨリ見ル)濃キ血管ハ其ノ淺キヲ表シ、淡キハ其ノ深キヲ表ス。

acp	固有蝸牛殼動脈	acv	前庭盲囊枝	ade	内淋巴管動脈	ama	前壺腹
aml	外壺腹	amp	後壺腹	anep	後硬腦膜動脈	ase-I.	内淋巴囊動脈
ase-II.	内淋巴囊動脈	an	精圓囊動脈	ava	前前庭動脈	avp	後前庭動脈
asl	外半規管	dsp	後半規管	das	上半規管	nep	後壺腹神經
ne	蝸牛殼神經	ns	正圓囊神經	nv	前庭神經	rec	總脚枝
rm	硬腦膜ニ至ル動脈枝	s	蝸牛殼	sas	正圓囊(圖中个標ナキASノ誤)		
sc	内淋巴囊	ss	S字狀竇	u	精圓囊	vav	前庭導水管靜脈
vcc	蝸牛殼小管靜脈	vse	内淋巴囊靜脈				

第四圖 海鏡ノ動脈ニ朱ノ乳劑ヲ注入シテ「レントゲン」寫真ヲ撮影シ、必要ナル血管ヲ特ニ濃厚ニ表シタルモノナリ。(頭及頸部)

a	總頸動脈	b	上甲狀腺動脈	c	後頭動脈	d	顏顳動脈
e	舌動脈	f	外頸動脈	g	中硬腦膜動脈	h	後硬腦膜動脈

第五圖 中硬腦動脈ト後硬腦動脈トノ吻合

ad	海鏡内淋巴囊血管ノ圖	anep	後硬腦膜動脈	aseo	内淋巴囊動脈	de	内淋巴管
	硬腦膜動脈ト吻合スル血管						

Fig.2.

Fig.3.

Fig.5.

Fig.6.

Fig.7.

Fig.8.

Fig.9.

第五圖 犬ノ内淋巴囊血管圖ニシテ内淋巴囊ノ外側壁ノ血管ハ略ス。内淋巴囊、内淋巴管及ビ總脚ノ血管ハ眞實ヲ畫キタルモ、他ノ部分ノ血管ハ重ナル血管ノミヲ畫キテ混雜ヲ防ギタリ。(以下同様)

asc	内淋巴囊	vav	前庭導水管靜脈	vsc	内淋巴囊靜脈
ade	内淋巴管動脈	dmp	後壺腹	as	正圓囊動脈
avp	後前庭動脈	dsi	下半規管	dsi	外半規管
de	内淋巴管	fcc	總脚枝	s	正圓囊
ss	S字狀囊	u	橢圓囊	vav	前庭導水管靜脈
vd	硬腦膜ノ靜脈	vsc	内淋巴囊靜脈		

第六圖 猫ノ内淋巴囊血管圖

ade	内淋巴管動脈	amp	後壺腹	anmp	後硬腦膜動脈	as	正圓囊動脈
asc. I.	内淋巴囊動脈	asc. II.	同上	avp	後前庭動脈	dsi	下半規管
dsi	外半規管	dss	上半規管	de	内淋巴管	rai	R. anterior laealis
rcps	R. cruris communis posterior et simplex	s	正圓囊	se	内淋巴囊	ss	S字狀囊
u	橢圓囊	vd	硬腦膜靜脈	vsc	内淋巴囊靜脈	vvc	總前庭靜脈

第七圖 家兎ノ内淋巴囊血管圖

avc	前庭盲囊枝	anmp	後壺腹	anmp	後硬腦膜動脈	as	正圓囊動脈
avc	内淋巴囊動脈	avp	後前庭動脈	dsi	下半規管	dsi	外半規管
dsi	上半規管	de	内淋巴管	fcc	總脚枝	s	正圓囊
sc	内淋巴囊	ss	S字狀囊	u	橢圓囊	vav	前庭導水管靜脈
vd	硬腦膜靜脈	vsc	内淋巴囊靜脈				

第八圖 「ラッテ」ノ内淋巴囊血管圖

avc	前庭盲囊枝	anmp	後壺腹	anmp	後硬腦膜動脈	as	正圓囊動脈
avc	内淋巴囊動脈	avp	後前庭動脈	dsi	下半規管	dsi	外半規管
dsi	上半規管	de	内淋巴管	fcc	總脚枝	s	正圓囊
sc	内淋巴囊	ss	S字狀囊	u	橢圓囊	vav	前庭導水管靜脈
vd	硬腦膜靜脈	vsc	内淋巴囊靜脈				

第九圖 「ラッテ」ノ動脈ニ朱ノ乳劑ヲ注入シ「レントゲン」寫眞ヲ撮影シ必要ナル血管ヲ特ニ濃厚ニ表シタルモノナリ。(頭及頭部)

a	總頸動脈	b	外頸動脈	c	Aノ延長	d	内頸動脈
e	鍍骨動脈	f	後頭動脈				