大日本耳鼻咽喉科會會報

第三十八卷 第一號

昭和七年五月

原 著

アロツポ氏ノ所謂増殖性膿皮症ニ就イテ

Über einen Fall von Pyodermie végétante (Hallopeau). von Dr. Y. Koyama.

東北帝國大學醫學部耳鼻咽喉科教室 (主任和田教授)

醫學士 小山 芳 輝

目 次

- 一、緒 言
- 二、實驗例ノ病歴並ニ現症
- 三、臨牀的検査並ニ經過
- 四、細菌學的研究
- 五、組織學的研究
- 六、總括及ビ考按
- 七、結 論
- 主要文獻

一、緒 言

最近余ハ口腔粘膜及ビ舌粘膜ニ於テ、糜爛並ニ高度ノ増殖ヲ示セル一患者ヲ診スル機會アリ、最初ハ之ヲ以テ肺炎双球菌性疾患ナルベシト思惟セシガ、其後全身各部ヲ詳細ニ検査スルニ及ビ、更ニ肛門周圍ト會陰部トニ特殊ノ増殖性皮膚炎ノ症候ヲ有スルヲ發見シ、而シテ其最モアロツポ氏「増殖性膿皮症」ニ近キモノナルヲ知レリ。其組織像モ亦該症ノモノト一致ス。仍ツテ考フルニ口腔内部ノ疾患モ亦肺炎球菌性ノモノニ非ズシテ且氏疾患ノ部分現象ナリシヤ明ナリ。粘膜増殖ノ殊ニ顯著ナル點ハ此診斷ノ下ニ容易ニ之ヲ解明シ得ベシ。

抑モ且氏疾患ハ比較的稀有ニシテ、其典型的ナルモノ、報告ハ未ダ二十ニ滿タズ。其歴史ヲ按ズルニ一八八九年佛ノ Hallopeau 氏ハ「*unum*」氏疾患ニ酷似シ、然モ臨牀上、組織學上特異ノ性質ヲ示ス症例ヲ報告シ、之ニ「異心的ニ進行スル病竈ヲ有スル慢性増殖性化膿性皮膚炎」(*Dermatite pustuleuse chronique et végétante en foyers à progression excentrique*)ノ名ヲ與ヘ、後一八九八年ニ及ビ類

原 著 小山||アロツポ氏ノ所謂増殖性膿皮症ニ就イテ

第三十八卷 一九九 (第二號 一)

似例五例ヲ集メテ、是等ヲ増殖性膿皮症 (Pyodermitis végétante) ト呼稱セルモ、同年更ニ増殖性天疱瘡ト増殖性膿皮症トノ中間型ト見ラルベキ症例ニ遭遇スルニ及ビ、以前ノ見解ヲ改メ、増殖性膿皮症モN氏ノ増殖性天疱瘡ノ表現ヲ異ニセルモノニ過ギズト考フルニ至レリ。同氏ハ又増殖性天疱瘡ニN氏疾患ノ名目ヲ與フルノ適當ナルヲ提議セリ。翻ツテ思フニ兩者ノ本態ノ解決セラレザル限り、是等ハ果シテ各獨立ノ疾患トシテ認ムベキヤ否ヤノ決定的解決ハ未ダ與ヘ難シト雖モ、臨牀上及ビ組織學上ヨリ見ルニ兩典型ニ於テハ、相當ノ差異存シ、且ツH氏型ハ稀有ニシテ Jamieson, Hartzell 及ビ瀬川氏等ハ兩者ヲ夫々別個ノモノトシテ認ムベキヲ主張セリ。

余ノ觀察セル一例ハ其經過相當ニ久シキニ亘リタルニモ拘ラズ、皮膚症狀ハ比較的輕微ニシテ、口腔内ノ現象ハ特ニ著明ナリキ。H氏疾患モN氏疾患モ孰レモ粘膜、就中口腔粘膜ヲ侵シ、其發病ノ初期ニ於テハ、發疹ハ往々專ラ此部ニ限局スル事アリ。然ルニ從來耳鼻咽喉科醫家ノ注意ヲ惹ク事少キニ似、口腔粘膜ニ於ケル症狀、病理學的變化ノ記述セラル、モノ少キヲ見、余ハ特ニ此點ヲ注意シテ觀察セリ。上述ノ如クH氏疾患ノ症例ハ甚少ク、其各例ハ一々詳細ニ報告シテカズ、イ、ス、チ、クノ資ニ供スルノ要アリ。余ノ此報告モ亦徒爾ナラザルヲ信ズ。

二、實驗例ノ病歴並ニ現症

患者ハ七十歳ノ女性。牧師トシテ久シク宗教生活ヲ續ケ來レリ。

家族歴。父系祖父母、母系祖父孰モ既ニ死ス。死因詳ニシ難シ。母系祖母ハ七十二歳ノ時急性中耳炎症ガ原因トナリテ死亡ス。父ハ約五十歳ノ時腦出血ニテ死シ、母ハ約五十六歳ノ頃「腸チフス」ニテ死セリ。母ニハ流産、早産等ナカリキト云フ。兄弟ハ五人ニテ本患者次女ナリ。兄ハ二十四歳ノ時肺結核ニテ死亡。姉ハ六十三歳ノ時卒中ニテ鬼籍ニ入レリ。弟ハ二十一歳ノ時不明ノ疾患ニテ死ス。妹ハ二十一歳時産後死亡セリト。夫ハ牧師ニテ患者二十四歳ノ時結婚シタルガ其齡二十六歳ニテ痔瘻ヨリ肺結核ヲ併發シテ死セリ。尙ホ其夫ニ花柳病的疾患ハナカリシト。患者ハ其後獨身ニテ今日ニ及ブ。二人ノ女子有リ、長ハ四十四歳ニテ健康、次ハ四十歳ニテ壯健、其他ニハ流産、早産ハ無カリシト。

其他親戚關係ニ於テハ結核並ニ卒中ニテ死亡セルモノアルモ、本疾患ニ類似ノ疾患又ハ癩、癰、腦疾患等ニテ他界セルモノ無シト。

既往症。出産ハ異常ナク、乳兒期ハ母乳ニヨリ哺育セラレタリ。麻疹ハ既ニ經過シ、種痘ハ今迄四回一般ニ反應少ク陰性ニ終ル事多カリト。酒、煙草ヲロニセズ。花柳病並ニ肺結核病歴無シ。幼少時ヨリ約十歳ニ至ル迄ノ間ハ虛弱ニシテ屢々痙攣ヲ起ス事アリシモ、爾來強健トナレリ。二十七歳ノ時出産後痔核(?)ヲ煩ヒ、少量ノ出血ト疼痛トヲ感ゼシモ膿様ノ排出無ク、醫師ノ治療ヲ受ケズシテ約二週間後ニハ輕快セリ。然レドモ其後毎冬季ニ於テ、二三回同様ノ苦痛ヲ經驗セリ。當時痔核ハ豌豆大ニテ排便ノ際ニバミ腫脹シ、平時ハ全ク觸知セ

ラレズ。其後自然ニ全治スルニ至レリ。又約十年前ノ八月齲齒ヲ患ヒ、以來發熱ナクシテ、上、下口唇、舌及ビ齒齦ノ疼痛並ニ腫脹ヲ來シ
間モ無ク白色ノ偽膜及ビ淺キ潰瘍ヲ形成シ、口内熱感、嚥下困難、及ビ流涎ヲ訴ヘ、當科ニ入院シ、約四回ノ注射（藥名不明）ヲ受ケシニ
其後高熱、呼吸困難、心悸亢進シ、黃疸トナリ、入院後、一ヶ月半ニシテ内科ニ轉ゼシ事アリ。當時入院後屢々嘔吐ヲ催シ、且ツ食欲皆無
ニテ、日々衰弱ノ度加ハレリ。斯クテ約一ヶ月ノ入院中幾度カノ注射ヲ受ケ、其後黃色ノ排尿ヲ見タリト。然モ皮膚ノ黃色ハ輕快セズ、半
治ニシテ退院セリ。當時衰弱極度ニシテ他人ノ扶助ニヨリテ漸ク歸宅スルヲ得タリ。其後三ヶ月間臥床自宅治療セルニ發病後約半年ニシテ
口中疾患並ニ黃疸ハ快癒セリ。尙ホ二年前ノ春、肋間神經痛ヲ、昨年春、肺炎ニ續キテ右側急性中耳炎ヲ病ミシモ孰レモ經過良好ニシテ程
ナク治癒セリト。

擬テ現症ノ沿革ヲ尋タルニ昨午十二月初旬風邪ニ罹リ、咽喉腫脹發赤シ、爾來發熱感無クシテ、舌咽頭次デ口唇ノ刺痛性疼痛ヲ來シ、漸次
同部粘膜ノ腫脹ヲ來ス。齒科醫ニヨリ左上大白齒二本ト左下大白齒一本トヲ拔去セラレシモ輕快ノ徵更ニナク反之益々増惡セリ。次デ口唇、
口狹及ビ舌粘膜ニ白色ノ偽膜ヲ生ジ、患者ハ同部粘膜ノ著明ナル腫脹肥厚ト、口唇腫脹翻轉トニヨリ、咀嚼、嚥下及ビ發聲ノ困難、口内灼
熱感、食欲缺損及ビ味覺脫失等ヲ訴ヘタリ。尙ホ本年一月ニ入り、一度全治セル「痔核様腫脹」、肛門周圍並ニ會陰部ニ排便時ノ如何ニ拘
ラズ、腫脹ハ依然トシテ存在スルノミナラズ、周圍ニ蔓延増進シ、且ツ發疹様ノ物ヲ生ジ疼痛アリ。以上ハ入院當時患者ノ口述スル所ナリ
トス。

現症。體格中等、榮養不良、骨骼及ビ筋肉ノ發育中等度ナルモ皮下脂肪層薄弱、皮膚ハ蠟黃色、光澤ニ乏シク、顏部ニ黃褐色ノ肝斑散在シ、
腋下、胸部、首、背部ニ灰黃褐色ノ粟粒大乃至麻實大ノ老人性尋常性疣贅及ビ針尖大ヨリ針頭大ノ灰色乃至黃褐色ノ斑點アリ。而シテ手甲、
足趾、腋下部ニ黑色表皮腫ヲ思ハシムルガ如キ變化ハ認メラレズ。爪甲モ尋常、睫毛ハ稍々稀疏ナルモ何等病徵ナシ。頭髮ハ既ニ大部分白
ク、頭部皮膚ニハ異常無シ。只所々ニ黃褐色ノ母斑ヲ見ル。頸部ニ豌豆大迄ノ少數ノ淋巴腺肥大ヲ觸知スルモ、肘腋ハ兩側共觸知セズ。下
顎及ビ舌部ノ振顫著明ナリ。肺部。左側前上部及ビ鎖骨上窩部稍々濁音、聽診ニヨリ呼氣輕度延長、呼吸數、十六、主トシテ胸式呼吸ヲナ
ス。心臟。心尖部ハ第五肋間部ニテ左側乳線ヨリ二橫指外部ニ在リ。濁音ノ上部境界ハ第四肋間腔、右側境界ハ中線部ニ在リ。心音ニハ變
化ナク、雜音無シ。第二肺動脈音高調ス。第二大動脈音モ亦稍々高調セリ。腹部所見。腹壁軟、膨隆ヲ認メズ。壓痛部ナク、腫脹等ヲ觸知
セズ。肝、脾、腎臟ヲ觸レズ。腹壁反射普通。脈搏。一分間八十前後ノ數ヲ示ス。規則正シク、緊張良、血管幅員中等度、血管壁輕度硬化
ス。體溫。平溫。便通一日乃至二日ニ一回、糞便ニ異常ヲ認メズ。膝蓋、及ビアヒレス腱反射正常、知覺異常、又ハ運動障害ヲ證明シ得

ズ。眼部。外部の變化ナシ。視力兩側共ニ〇・一、兩側瞳孔同大、圓形、光線反射銳敏。眼瞼結膜兩側共充血シ、乳瞼狀肥厚著明ナリ。眼底ニハ變化ナシ。水晶体、角膜共ニ尋常。因ニ眼科的診斷ハ兩側慢性結膜炎ナリ。耳部。右側鼓膜輕度内陷、前下部ニ小豆大ノ癰痕性穿孔アリ。鼓膜殘部ハ稍々濁濁肥厚ス。左側著變ナシ。c及b⁴右側輕度短縮、ウエーベル氏法陽性、リンネ氏法右側陰性、左側陽性。鼻部。兩側前庭部ハ黃褐色ノ結痂ヲ以テ覆ハレ、殆ンド閉塞セラル。兩側鼻腔ニハ膿汁多量ニ存ス。特ニ左右兩側、中、下甲介ハ肥厚シ、粘膜炎亦發赤セリ。就中右側中甲介ノ肥大最モ著明ナリ。中鼻道ハ兩側共ニ青綠色ノ濃厚ナル粘液性膿汁ヲ見ル。鼻咽腔部ニハ膿汁ヲ見ル。口部。口唇、口狹、及ビ舌粘膜ハ孰レモ著明ニ肥厚腫脹シ、無數ノ淺深皸裂アリ。舌、唇、口狹、軟口蓋更ニ咽頭後壁ニハ粟粒大乃至豌豆大ノ灰白色ヲ呈スル苔狀斑點多數ニ存在ス。且ツ其表面ハ周圍ヨリ相當度ニ隆起ス。此偽膜ヲ剝離スレバ糜爛面ヲ現ハシ容易ニ出血ス。其中ニハ小膿疱ノ存スル事モアリ。斯ル斑點ハ齒齦ニモ多數ニ見ラレタリ。齒齦ハ發赤腫脹シ、指壓ニヨリ血膿樣物質ノ出ヅルヲ見ル。且ツ諸所ニ暗紅色ノ糜爛面ト出血セル部分トヲ見ル。齒ト齒齦移行部附近ハ灰白色ノ偽膜ヲ以テ覆ハル。特ニ舌部粘膜ハ肥厚シ前記灰白色斑點ノ他、栓子樣小膿疱多數ニ存在シ、指壓ニヨリ容易ニ搾出スル事ヲ得、其形栓子ノ如シ。且ツ縱横ニ錯走スル淺深種々ノ溝渠ニヨリ舌ハ極メテ不規則ナル肥厚ヲ示シ、暗赤色ニシテ浮腫狀ヲ呈ス。更ニ詳細ニ其經過ヲ觀察スルニ最初ハ多クハ赤キ小斑點ニシテ後小膿瘍トナリ、破レテ淺キ潰瘍ヲ形成スルト共ニ其上ハ灰白黃色ノ偽膜ヲ以ツテ覆ハレ、潰瘍ノ底部及ビ周圍ヨリ増殖性肉芽組織生ジ偽膜ハ周圍ヨリ隆起スルナリ。此偽膜ハ容易ニ剝離スル事ヲ得ズ。剝離後ハ容易ニ出血スルヲ常トス。偽膜其モノハ著シキ弾力性ヲ有セズ。斯ル變化ノ他最初ヨリ小膿疱ハ殆ンド一ツノ栓子樣狀態ヲ呈シ、外觀上膿疱ノ存在セザルカノ如ク見ユル粘膜中ニ深ク潛存シ壓搾ニヨリ、又ハ「ピンセット」ニヨリテ栓子樣物質トシテ取り出ス事ヲ得ル。斯ル變化ハ最多ク之ヲ舌部ニ見ル。扱テ其後ニハ深キ穿孔ヲ殘シ、間モナク苔狀偽膜ニテ被ハレ、周圍ノ是等ト溝渠ニ沿ヒテ絲狀纖維性偽膜樣物質ニテオ互ニ連絡シ又癒合シ、舌ハ恰モ「ナマコ」ノ腹部ノ如キ觀ヲ呈ス。又ハ癒合ノ結果、或ハ最初ヨリ淺キ潰瘍ヲ作り來ルカノ如キ場合モアリ、孰レニシテモ其主徴ハ一ツノ潰瘍トシテ其表面偽膜ニテ蔽ハレ、底部及ビ其周圍ヨリ増殖性肉芽組織ノ隆起シ來ルモノナリ。會厭軟骨ハ肥厚シ、膿樣物質ノ附着スルヲ見ルモ聲帶ニハ異常ヲ認メズ。患者ハ高度ナル舌部、頰部及ビ口唇粘膜ノ腫脹ノ爲、舌及ビ咀嚼發聲運動障害セラル、他、少シノ運動及ビ下顎振顫ニヨリ、上記糜爛及ビ偽膜剝離ニヨリ、容易ニ出血スルヲ見ル。尙下唇部ニ小サキ黑點ノ他、上舌繫帶部ニ一、三ノ小疣狀物アリ。色素沈着異常ヲ認メズ。輕度口臭ヲ有シ、著シキ流涎アリ。

外陰部及ビ會陰部所見。外陰部ニ於テ膿疱性發疹ヲ認ム。特ニ右側大陰唇粘膜ニ著明ニシテ、色素沈着強度ニシテ黑色ニ染マリ、且ツ通常

大サノ約二倍ニ肥厚ス。腔狹クシテ平滑、内生殖器ハ全ク萎縮シ、腔壁又萎縮シ、平滑ナリ。腔内ニハ著明ノ色素沈着ヲ證明セズ。子宮腔部ハ腔纖維性癒着ニヨリ觸知スル事ヲ得ズ。因ニ婦人科の診斷ハ膿疱性色素沈着性外陰部肥大症ニテ腔内ニ向ツテノ進行ハ確定シ難シ。又詳細ナル検査ヲ爲スニ非ズンバ癒着存スト云ヒ難シ。

三、臨牀的検査並ニ經過

(a) 血液検査。ワッセルマン氏反應、陰性。「ヘンツヒール」反應、陰性。血液沈降速度(ウェスターグレン氏法)

一時間目、2.0 mm H₂O² 二時間目、46.0 mm H₂O² 中等價、12.5 mm H₂O²

血液凝固(フロディール、ラッセル、ボックス氏血液凝固計)

凝固時間。七分七秒。凝集力、可成良好。

血色素測定。(ザーリー氏法) 八〇%

血色素指數 〇・八五

赤血球透過抵抗力測定。最小抵抗 〇・四四%。最大抵抗 〇・三二%。

	20/1 (検査日)	1/III	30/III
赤血球總數	四七〇萬	四六五萬	四七五萬
白血球總數	七八〇〇	七四〇〇	七三〇〇
中性多核白血球	五二・三%	四九・〇%	四八・二%
淋巴球	二三・五%	二四・〇%	二七・八%
エオジン嗜好細胞	一一・七%	一九・〇%	一七・〇%
大單核及移行型	一一・五%	七・〇%	六・五%
鹽基性顆粒細胞	〇・八%	〇・五%	〇・五%
血中「コレステリン」定量 (桂氏法)	三八九・三 mg/dl		
血清脂肪酸定量 (同)	一〇一・七 mg/dl		

原著

小山リプロツボ氏ノ所謂増殖性膿皮症ニ就イテ

血清總脂肪酸定量 (同) 五・一・二 mg/dl

血糖量 (ハトゲドロン、ジェンセン氏法) 食前 〇・〇七五 mg/dl 食後三十分 〇・〇八八 mg/dl

(b) 尿検査。淡黄褐色、比重一・〇一四、弱濁濁ヲ呈スル時アルモ、一般ニ透明、弱「アルカリ」性反應ヲ示ス。

蛋白定性試験ハ「ズルフォサルチル酸」試験及ビ「ヘルレル氏輪環試験」共ニ陰性、但シ入院當初ハ「ズルフォサルチル酸」試験ニテ弱陽性ナリキ。葡萄糖試験ハ「ニールンデル氏法」ト「ロムメル氏法」共ニ陰性。エールリッヒ氏「デアゾ」反應、ワイス氏反應共ニ陰性。グメリン氏膽汁色素試験「ウロビリゲン」。「ウロクロモゲン」反應ハ孰レモ陰性。オーベルマイエル氏「インヂカン」試験ハ陽性、檢鏡的ニハ少量ノ白血球及ビ其破壊産物ト少量ノ表皮トラ認ムルノミ。

(c) 唾液検査。極メテ濃厚粘稠ナル粘液ニシテ酸性。

(d) 胃液検査。(5/III) 黄白色濃厚粘稠ナル粘液。潜出血(「グアヤク、テルペンチン油」ヲ證ス。乳酸(Uffelmann'sche Probe)陽性。「ペプシン」及ビ「ペプシノゲン」陰性。游離鹽酸ハ無酸性、總酸度十度。

(e) 糞便検査。下痢ノ際ニハ其質著シク粘液性ニシテ且ツ暗褐色ヲ呈ス。潜出血。弱陽性、又ハ陰性。寄生蟲及ビ寄生蟲卵ハ證明セズ。

(f) 胃ノ運動検査。(エワールド氏「ザロール」法)(5/III) 一時間四十分頃ヨリ陽性トナリ。三十時間後ニテモ尙ホ陽性。

(g) 胃部X線影像所見ハ所謂「スキレース」ナリキ。

(h) 肝臟機能検査。ロツボ氏「メチレンブラウ」法(28/III) 午前八時ニ授與ス。午前八時ヨリ午後八時迄ノ間ノ尿ヲ三回ニ分チテ検査セルニ正午ヨリ午後四時ニ至ル尿ハ氷醋酸1.0 cc. 加ヘル事ニヨリ草綠色トナル。グイダール氏蛋白固定作用試験。(28/III) 検査前白血球總數七二〇〇、血壓135 mm Hg。一定量ノ牛乳授與後十五分後ニハ白血球四二〇〇、血壓142 mm Hg。三十分後、白血球數四一〇〇、血壓140 mm Hg。一時間後白血球四八〇〇、血壓143 mm Hg。九十分後ニハ白血球五八〇〇、血壓165 mm Hg。二時間目ニハ白血球七二〇〇、血壓130 mm Hg。三時間後ニハ血壓160 mm Hg。白血球七〇〇〇ヲ示シ、著明ナル白血球増加ヲ來サザリキ。

(i) 植物神經系統機能試験。(28/I—31/I) I「アトロピン」反應。一・〇%「鹽酸アトロピン」0.75 cc. ヲ皮下注射セルニ、注射前血壓130 mm Hg。脈搏八八ナリシガ注射後三〇分—四〇分ニ於テ血壓最高ヲ示シ、136—138 mm Hg。トナル。其後漸次下降シ、六〇分後ニハ132 mm Hg。トナル。脈搏モ五〇分—六〇分ニ於テ其數最多ク九五—九六ヲ示シ、一二〇分後ニハ九〇ヲ呈セリ。口渴ハ五〇分—六〇分ニテ相當度ノ口渴ヲ訴ヘ漸次減少シ一二〇分後ニハ全ク平生ニ復セリ。此ノ他何等特記スベキ症狀ヲ呈セズ。

(ii)「ピロカルピン」反應。一・〇%「鹽酸ピロカルピン」0.75 cc. 皮下注射セリ。注射前血壓 130 mm Hg. 脈搏八八、唾液少量ノ程度ナリシニ注射後五分、一〇分ト漸次増加シ、唾液ハ二〇分—六〇分後最著明ナル分泌ヲ示シ、患者ハ不絶流涎ノ爲「シャーレ」ヲロヨリ放ス事ヲ得ザリシ程ナリキ。此流涎ハ永ク相當度ニ繼續シ、一八〇分後ニモ尙ホ平生ヨリ幾分多量ノ程度ナリキ。血壓ハ一時降下シ、135 mm Hg.ヲ呈シ一二〇分ノ觀察中 135—138 mm Hg.ノ程度ニテ變化著シカラズ。脈搏ハ増加ノ傾向ヲ示シ、三〇分—四〇分後ニハ九三—九四ヲ示セリ。發汗ハ三〇分後ヨリ自覺スル程度ニ現ハレ來リ、四〇分—五〇分後最著明ニシテ、顔面等流汗アリ。之ハ約六〇分—七〇分後マデ繼續セリ。流涎、鼻汁モ流汗ト殆ンド同ジ經過ヲトレリ。

(iii)「アドレナリン」反應。(一十倍溶液)「鹽化アドレナリン」0.75 cc. 皮下注射。注射前脈搏八九、血壓 135 mm Hg.ナリシガ注射後血壓漸次上昇ヲ呈シ、三〇分—七〇分後ニハ最高 139—142 mm Hg.ヲ呈シ、脈搏モ九三—九五ヲ算セリ。動悸ハ三〇分—五〇分後マデ輕度ニ認メラレタリ。

(iv)「ピットリソリン」反應。0.75 cc. 上膊皮下注射。血壓 130 mm Hg. 脈搏八一ナリシガ注射後血壓漸次上昇シ二〇分—四〇分最高ニテ 135—141 mm Hg.ヲ呈セリ。脈搏モ八四—八六ヲ呈ス。此他著變ヲ認メズ。

以上ヲ通覽スルニ本患者ハ「ワゴトニー」ヲ有スルヲ想ハシム。尙ホ患者ノ血壓ハ常人ヨリ稍々高シ。其年齡ハ實ニ七十歳ニシテ、且ツ曾テ高血壓 20) mm Hg.前後ニ悩マサレシ事アリ。然モ其後何等血壓下降ノ特殊治療ヲ施サザルニ拘ラズ昨今ノ如ク 130 mm Hg.内外ヲ示ス事ハ寧ロ不可思議トスベク、現在ハ血壓降下ノ狀態ニ在ルモノト見テ不可無キガ如シ。是等ノ事實ト本患者ノ發疹消失後、強度ノ色素沈着ヲ殘シテ治癒スル等ノ點ト併セ考フルニ、所謂アデソン氏疾患ノ體質ト相類似スルコト多キヲ感ゼズンバ非ズ。

(j)糖忍耐力試験(28) 葡萄糖一〇〇・〇 g.ヲ早朝空腹時ニ與フ。一時間毎ニ採尿檢糖ス。一、三時間目頃ニハ〇・一 g.、三時間目ニハ〇・一五 g.ニテニールランデル氏法弱黒褐色ヲ呈シ來リ、五時間後ニハ全ク常態ニ復歸ス。

(k)「アドレナリン」(鹽化「アドレナリン」十倍溶液)(27/III) 1.0 cc.ヲ皮下注射シ、一時間後ノ尿ヲ檢糖セリ。三時間目頃ヨリニールランデル氏法ニテ弱黒褐色ヲ呈シ〇・一五 g.、四時間目ニハ〇・一 g.、五時間ニハ平常ニ復歸ス。

余ハ此他食塩性食事、過脂肪性、過蛋白質性食事ヲ數日間宛繼續シテ與ヘシモ、發疹ニ著明ノ變化ヲ來サザリキ。

(一)其他ノ檢査(22/III) フン・ネル氏 (Aschner) 眼球壓迫試験。眼球壓迫中一分間ニ約四乃至六脈搏減少ヲ證明セリ。

チエルマーク氏 (Tschermak) 迷走神經壓迫試験。約一分間三乃至四ノ脈搏減少ヲ認メタリ。呼吸性不整脈著明ナラズ。時ニ一分間二乃至

四ノ減少ヲ見タリ。

レービ氏反應 (Loewi) 千倍鹽化「アドレナリン」溶液二、三滴ヲ點眼シ、瞳孔縮少度ヲ檢セルニ肉眼的ニハ著明ナラズ。「デルモグラヒスミス」モ亦著明ナラズ。

平流電氣ニヨル人工的蕁麻疹反應。正常ト著シキ差異ヲ認メズ。尙ホ「ツベルクリン」反應 陰性。

經過。一九三一年一月十六日。當科入院。肺炎双球菌侵襲ノ疑ノ下ニ、一同僚ヨリ肺炎双球菌血清一〇・〇 ccm. ト「ペリベロール」二・〇 ccm. トノ皮下注射ヲ受ケタリ。熱三六・七度、脈搏八五。

一月十九日。口腔粘膜及舌部ヨリ、組織片ヲ切除ス。余ハ前記療法ヲ廢シ、ブレーグル氏溶液ニテ含嗽ヲ命ジ、五千倍「リバノール」溶液ニテ口中洗滌ヲ試ムルト共ニ口中人工太陽燈照射ヲ試ミタリ。

一月廿一日。組織片切除ノ創面ハ灰白黃色ノ偽膜ニテ蔽ハレ、周圍ヨリノ組織増殖著明ニシテ間モナク偽膜ハ白黃色ノ線トナリ、組織缺損部ハ忽チ恢復スルヲ見タリ。

二月一日。口腔ノ病症ハ經過一體ニ良好ニシテ、潰瘍狀糜爛面、偽膜ハ著シク減少ス。但シ口腔諸粘膜増殖ハ尙ホ明ナリ。食慾モ恢復シ、昨今漸ク粥ヲ攝取スルニ至ル。便通一日一回、熱一般ニ三十七度以下。

二月五日。患者ハ肛門周圍ノ痔核樣腫物が十年前ニ患ヒシモノト異リ、日増ニ腫脹スルト訴フルニヨリ、當學皮膚外來ヲ訪レシメタルニアロツボ氏疾患カ、又ハノイマン氏疾患ナラントノ診斷ニ接シ、茲ニ圖ラズモ口内所見ガ増殖性傾向アリ、且ツノイマン氏疾患ノ場合トモ異ル點ト相一致スルニ興味ヲ懷キ、是ガ診斷ヲ確定スル爲ニ諸種實驗ヲ試ミント企テタリ。當時ハ主トシテ重曹水含嗽竝ニ吸入ヲ試ミキタリ。内服藥トシテハ健胃藥ノ外ニ「ヒニン」砒素劑、鐵劑ヲ投與シ、座藥トシテハ主トシテ「イヒチオールコデイン」ヲ用タリ。此他硼酸亞鉛華軟膏、沃度丁幾ノ局所塗布ヲ施行セリ。

二月六日。肛門周圍ニX線照射ヲナス。舌粘膜ハイヨイヨ輕快シ、只口腔粘膜ノ所々ニ小偽膜ヲ以テ被ハレタル發疹アルニ過ギズ。

二月九日。熱三七・六度。全身症狀著變ナシ。

二月十日—十一日。無熱。便通ナシ。

二月十三日。發熱三七・四度。十四日、三七・二度。十六日、平熱。便通一日二三回、稍々下痢ニ傾ク、洗腸一回施行。

二月十九日。右側口腔粘膜著明ニ腫脹肥厚ス。咀嚼障害ヲ訴フルニヨリ一部粘膜切除ス。

二月二十日。組織缺損部ハ殆ンド認ムルコトヲ得ザル程度ニ迄周圍ヨリ肥厚増殖シ、僅ニ偽膜ニテ蔽ハレタル陷没セル一線ヲ認ムルノミ。
二月二十一日。口腔粘膜ノ病變稍々惡化ノ傾向ヲ示ス。動物試驗ヲ施行ス。「ネオネオアルセミン」〇・三gヲ注射ス。自家接種ヲ行フ。
三月二日。「ネオネオアルセミン」〇・四五g注射。昨今口腔粘膜ノ病狀輕快シ、肛門部皮膚疹モ又良好トナレリ。輕度ノ下痢アリ。

三月三日―五日。生來寧ロ便秘ニ傾キ殆ンド下痢トイフコトヲ知ラザリシニ、昨今ハ朝夕猛烈ナル下痢ニ悩ミ、一日數行。又輕度腹痛アリ
食慾ハ全ク缺損シ、強ヒテ少量ノ粥ヲ攝取スルニ過ギズ。胃上窩、左側季肋部ニ壓痛アリ。「タンナルビン」、「タンニスムート」ノ連日投與
モ全ク無效ナリキ。此日再ビ動物實驗ヲ施行ス。

三月八日。下痢症狀輕快ト共ニ食慾頓ニ進ミ來ル。

三月九日。「ネオネオアルセミン」〇・六g注射。

三月十日。内科的診察ニ於テ胃癌ノ診斷ヲ下サレタリ。

三月十一日。糞便中潛出血竝ニ寄生蟲卵ヲ檢査セルニ陰性。

三月十六日及ビ二十一日。「ネオネオアルセミン」各〇・六g注射。便通一、二回又ハ便秘。熱三七・二又ハ三度。全身狀態良好トナル。

四月五日。體溫三七度以下。便通一日一回。口部諸症狀治癒ス。只右側口角部ニ小發疹ヲ形成シ來リ、偽膜ニテ蔽ハル。銀水ノ腐蝕ヲ施ス
モ效果ナシ。偽膜下糜爛面ニハ肉芽ノ増殖ト小膿疱ノ潛在ヲ認ム。人工太陽燈照射。稀鹽酸百「パーセント」投與。

四月十八日。口角部稍々増殖停止ノ形ナリ。口腔諸粘膜舌部ハ只無數ノ溝渠ニテ分タレタルニ止リ全治ス。會陰部皮膚疹モ又輕快シ「コンデ
ローム」様腫脹物ハ小豆大ニ萎縮ス。大陰唇ニ於テハ小膿瘍及ビ強度ノ色素沈着ヲ認ム。會陰部ニテ發疹ノ治癒セル部ニハ又強度色素沈着
ヲ認ム。サレド治癒部ノ組織切除後ハ再發竝組織増殖ノ傾向ヲ示ス。全身狀態頗良好。

四月二十四日。退院セリ。

八月五日（一九三一年）一時快癒退院セル後各地ノ溫泉等ニテ靜養シ、經過モ頗良好ナリシモ、七月半ニ至リ再ビ急速ニ惡化シ來リ、發疹
ハ口腔内ニ生ズルト同時ニ、上下口唇ヲ襲ヒ漸次進行ヲ續ケ、口唇ノ周圍一乃至二cmノ距離マデモ特異ノ發疹ヲ生ジタリ。口腔内ニ於テ
ハ所々ニ偽膜ヲ形成セルノミニテ以前ノ如キ著明ナル組織増殖ヲ示サズ。然レドモ口唇及ビ其周圍ニ於テハ厚キ黃褐色乃至汚穢色ノ結痂ヲ
有シ所々ニ糜爛面ト小膿瘍トヲ見ルモ、水泡並ニ其破壊セル痕跡スラ見出スコトヲ得ザリキ。發疹ト健康部トノ境界ハ極メテ明瞭ニシテハ
周圍ヨリ著明ナル隆起ヲ呈ス。

右口角部ニ近キ下口唇ニ豌豆大ノ増殖セル肉芽腫ヲ認ム。鼻腔内ハ以前ヨリモ遙ニ甚シク、厚キ結痂ニテ閉塞セラル。發疹ガ口唇ニ生ズルト殆ンド時ヲ同クシテ、會陰部ニモ同様ノ發疹多數ニ發生セルモ、只口唇ト異リ黑色ノ色素沈着ヲ來セリ。發疹ハ大、小陰唇ハ勿論、大陰唇ノ周圍、陰股、鼠蹊部ノ下部、陰阜ノ一部、肛門ノ周圍ニ所々發生シ來レリ。而シテ是等ノ發疹ハ僅半月位ニテ現在ノ狀態ニナレリト云フ。食慾良好ニシテ全身各部ニ異常ナシ。

八月二十日。「サルワルサン」〇・三gノ皮下注射ヲナス。近來便通不規則ニシテ下痢ノ氣味アリ。

九月一日。口腔内所見極テ良好トナル。口唇部ノ發疹進行ノ徵ナシ。「サルワルサン」〇・四五g注射ス。

九月四日。人工太陽燈照射。口腔内疼痛ヲ訴フ。軟口蓋及ビ硬口蓋ニ小キ發疹多數アリ。體温三十七度。便通一日一回通常、會陰部附近ノ發疹又進行ノ徵ナシ。

九月十五日、病勢惡化ノ徵ナク、口唇、會陰部モ輕快シ食事ノ際ニモ疼痛ナク、口唇ノ腫脹モ又減退。

以上ノ所見ヨリ本診斷ノ誤リナキコトヲ認メラル。局所ノ症狀ハ局所治療ト共ニ漸次輕快シ、増惡の進行ヲ停止スル點モ、且氏病ノ場合ト一致ス。而シテ「サルワルサン」ノ無効ナルハ本症ト微毒ト全ク關係ナキコトヲ證スルモノナリ。

四、細菌學的研究 (1914. 21. 1. 3. 5. 等時々検査ス)

余ハ先ヅ自家接種試驗ヲ試ミンガ爲メ、患者ノ口腔粘膜ニ存在スル偽膜約〇・〇五g位採リ、生理的食鹽水五ccmヲ加ヘテ、「エムルデオン」ヲツクリ、其〇・三ccmヲ上膊皮下ニ注射シ、又ハ上膊皮内ニ擦込ミ、又ハ偽膜直下ノ分泌液ヲ、或ハ會陰部ヨリ得タル刺戟血漿ヲ、或ハ小膿瘍中ノ膿汁等ヲ擦込ミ、其經過ヲ觀察セルニ、何レモ著明ナル陽性ノ結果ヲ得ズ。只輕度ノ發赤ヲ示シタルノミニテ、二日後一ハ治癒セリ。

又前記口腔粘膜ニ發生セル、偽膜下並ニ其周圍ノ組織片小豆大ヲ切除シテ磨碎シ、生理的食鹽水五・〇ccmヲ以テ浮游液トナシ、「ガーゼ」ニテ濾過シタル後〇・五ccmヲ患者ノ上膊部皮下ニ注射セルモ其結果ハ陰性ニ了レリ。

口部諸粘膜ニ發生セル偽膜ヨリ、又ハ其直下ノ粘膜上ヨリ普通寒天、血清寒天、又ハ「ブイヨン」ニ培養シタルニ肺炎双球菌ハ最多數ヲ占メ、次デグラム陽性双球菌、假性「デフテリア」桿菌、グラム陰性桿菌ヲ證明セリ。是等各菌種純培養ヲナシ、其約一白金耳ヲ前記同様皮下ニ接種セルニ、何レモ陰性ナリキ。會陰部周圍ノ膿瘍、又ハ「刺戟血漿」中ヨリハグラム陰性桿菌(大腸菌様)グラム陽性双球菌及多數ノ白色葡萄狀球菌ヲ培養スルコトヲ得タリ。是等各菌種ノ純培養ヲナシハ皮下又ハ皮内注射ヲナセルニ同様陰性ノ結果ヲ得タリ。口腔粘膜ニ

發生セル小膿瘍中ヨリ純粹膿汁ヲ採取スルコト不可能ニシテ、確實ナル結果ヲ得ルコトヲ得ザリシモ、大體ニ於テ細菌ノ證明ハ陰性ナリキ。
サレド二、三グラム陽性ノ球菌ヲ得タリ。

余ハ次ニ動物實驗ヲ試ミントシ、前記ト同様ニ先ヅ口腔粘膜ニ發生セル偽膜「エムルジオン」一・〇ccヲ腹腔中ニ注射シ、他ハ肺炎双球菌、白色葡萄狀球菌、グラム陰性桿菌、及ビグラム陽性双球菌ノ各菌種百倍稀釋液一・〇ccヲ各天竺鼠ノ腹腔中ニ注射セルニ、偽膜「エムルジオン」ヲ注射セルモノハ二日後ニハ死亡シ、他ハ生残り只肺炎双球菌ヲ注射セルモノハ一週間後ニ死亡セリ。

偽膜「エムルジオン」注射ニヨリ死亡セル天竺鼠ハ著明ナル急性腹膜炎ノ像ヲ呈シ腹腔内ニハ膿汁樣浸出液多量ニシテ、肝臓、胃、腹膜、腸間膜ノ所々ニハ患者口腔ニ見ルト全ク同様ノ偽膜形成セラレ、大腸及ビ小腸ハ著シク充血膨脹シ、肺部ニハ出血斑ヲ認ム。此偽膜ヲ採リ血清寒天ニ培養シタルニグラム陰性大腸菌樣ノ桿菌ヲ得タリ(因ニ松井博士ノ診斷ニヨル)。更ニ此百倍稀釋液ヲ作り天竺鼠ノ腹腔中ニ注射セルニ同様二日後ニ死亡シ前記ト略同様ノ急性腹膜炎ヲオコシキタリ。

而シテ又同様ノ方法ニヨリ得タル患者偽膜膿汁ノ「エムルジオン」ヲ「マウス」腹腔中ニ〇・五cc注射セルニ、多クハ大シタ異狀ナカリシモ、一週間後死亡セルモノニテ輕度腹膜炎ノ狀ヲ呈シ、少量ノ膿汁ヲ認メタルヲ以テ之ヲ檢セルニグラム陽性球菌ヲ得タルモノアリ。又自家接種試驗ニ關シ、第二回入院ノ際、口唇部ヨリ取りタル膿汁ヲ口唇周圍ニ接種セルニ翌日小膿疱ヲ形成セリ。其膿汁中ヨリグラム陽性球菌ヲ證明セリ。

五、組織學的研究

(一) 會陰部肛門周圍組織標本所見

〔弱廓大〕 毛ハ脫落シテ見ルコトヲ得ズ。角質層ハ部分的ノ肥厚ヲ示シ、切片ノ種類ニヨリ相當度肥厚ヲ見ル。マルビギー氏層ハ著明ニ肥厚シ、粘膜網ハ著シク肥厚延長ヲ呈シ、深ク真皮中ニ突入セリ。マルビギー氏層内、特ニ棘狀細胞層内、或ハ其基底部ニ近ク大小種々ノ空洞形成ヲ見ル。此空洞ノ一部ハ毛囊ニ一致セルト考ヘラル、モノアリ。此中特ニ角質層ニ近キ顆粒層中、又ハ稍々深ク有棘細胞間中ニアル圓形、類圓形ノ空洞ノアルモノニ於テハ、其内容ハ角質樣物質ヲ以テ環狀ニ充填サレ、其周圍ハ原形質「エオジン」ニテ赤染シ、扁平核ヲ有セル扁平細胞ニヨリ圍繞セラレ、其外部ニ顆粒細胞層アリ。空洞ニ近キモノハ壓迫セラレ、稍々扁平トナル、大ナルモノニアリテハ其空洞ノ内部ノ周壁ニ近キ部分ハ前記同様ノ赤染セル角質樣物質ヲ見ルトハ云ヘ、其内方ニアタリテハ稍々青染セル同様無核ノ剝離片ガ環狀ノ排列ヲ示ス。此空洞ノ周圍ハ扁平ナル顆粒細胞及ビマルビギー氏細胞ヲ以テ取圍マレ、其外部ハ乳頭體中ノ結締組織ニテ取卷カル。空洞ノ

ノ空洞見ラレズト雖モ、扁平核細胞ニヨリ、取巻カレタル數個ノ空洞アリ。空洞ノ壁及ビ中心ハ「エオジン」ニヨリ淡紅色ニ染色セルヲ見ル。又粘膜層中特ニ粘膜網ニハ大ナル空洞ヲ形成シ、多數ノ「エオジン」嗜好細胞、「クロマチン」ニ富ム淋巴球、圓形細胞、多核白血球、及ビ原形質不明ノ核、「エオジン」ニ淡紅色ニ染色セル物質ニテ充サレ、周圍ニハ扁平ナル赤キ原形質ヲ有スル——二層ノ細胞ニヨリ取巻カル。此空洞ノ周圍又ハ種子層、或ハ真皮乳頭層ニハ、明カニ「エオジン」嗜好細胞、「プラスマ」細胞、淋巴球、及ビ圓形細胞ノ浸潤著明ニシテ、真皮下部ニハ結締組織増殖ト明カナル浮腫ヲ見、淋巴及ビ血管管腔ハ著シキ膨脹ヲ示ス。前記空洞ノ粘膜上皮ノ上層ヲ破リ外ニ出デシ像ヲモ見タリ。彈力纖維ニハ變化ヲ認メズ。稍々増殖ノ箇所モアリ。乳頭體ノ上端マデモ侵入セルヲ見タリ。

口腔粘膜所見 口腔粘膜ニ於テモ又舌粘膜ト同様ニ、粘膜層ノ著明ナル肥厚ヲ見ル。而シテ海綿樣狀ヲ呈ス。乳頭體モ延長肥厚ス。

有棘細胞ニハ往々空胞形成有リ、核ノ周圍透明ニ見ユ。核ハ著シク擴大セルモノ、或ハ「クロマチン」ニ富ミ、種々ノ形ヲ示ス。基底圓柱狀細胞ハ一般ニ規則正シク配列ス。所々ニ不規則ニナレル所アリ。又粘膜網中ニハ前記同様ノ空洞形成セラレ、中ニ多數ノ「エオジン」嗜好細胞及ビ白血球、淋巴球、原形質ナキ核、「ビクノーティン」ニナレル核、表皮ノ剝離セルモノ等ヲ見ル。此空洞ノ周圍ニ於テハ扁平細胞層ニヨリ取巻カレ周圍ニ「エオジン」嗜好細胞等ノ浸潤ヲ見ル。乳頭體直下及ビ血管壁周圍ニハ細胞浸潤著明ナルモ、真皮中ニ於テハ、著シカラズ。血管周圍ニ圓形細胞ノ彌蔓性浸潤有ルモ、一般ニ輕度ナリ。唯浮腫ハ相當ニ高度ニシテ、淋巴管腔及ビ血管共ニ著明ナル擴張ヲ示ス。

ワンギーソン氏染色ヲ施スニ、結締組織ノ増殖ヲ證ス。勿論前記空洞中ニハ結締組織細胞ノ侵入ヲ見ズ。

彈力纖維ハワイガルト氏法ニヨリ検査セルモ、著明ノ變化ナク、乳頭體ニ於テモ存在シ、乳頭體下部、血管周圍等ニハ著明ニ存在シ、稍々輕度増殖セルヲ見タリ。

六、總括及ビ考按

鑑別診斷

微毒。 是ハ最初ニ考ヘラル、事ニテ、一見「扁平コンデローム」樣腫脹ヲ見ル時、微毒ト誤診セラル、虞アリ。然レドモ其病歴、血液検査ノ結果、並ニ最確實ナルハ局所ヨリノ「スピロヘータ、パリーダ」ノ證明ナリ。本例ニ於テハ再三検査セシモ常ニ陰性ナリキ。濕疣ハ微毒第二期ニ多ク來リ、同時ニ口腔諸粘膜ノ病變ヲモ來ス。サレドツノ所見ハ自ラ特異ニシテ區別必ズシモ困難ナラズ。「サルワルサン」ハ初期ニハ有效ナルガ如ク見エタルモ、第二回目ノ入院時ニハ全ク效果ヲ認メザリキ。本注射藥ハ時トシテノイマン氏疾患ニモ、或程度マデ有效

ナル事アリ。本症ニ於テモ同様ナルベシト推セラル。又組織標本中ニ「プラスマ」細胞ノ集團ヲ認ムルモ、必ズシモ常ニ見ル特殊現象ニアラズ。是等ノ諸點ヨリシテ微毒ハ全ク除外シウルモノナリ。

匍行疹狀膿疱疹。群集セル膿瘍ヲ作ルト雖モ、是ハ高熱ヲ以テ來リ、一般全身症狀重態ニシテ多クハ短キ經過ノ後死ノ轉歸ヲ取ル。一般ニ妊娠ニ來ルコト多シ。

匍行疹樣天疱瘡。(Dermatitis herpetiformis, Dhiring) レーデルマンハデューリング氏疾患トアロツボ氏疾患ト同一視セントスルモ、一般ニハ認メラレズ、又兩者典型間ニテハ相當ノ差異アリ。是ハ經過頗ル慢性、癢痒劇甚ニシテ發疹ハ多形、匍行疹狀、環狀、配列ヲトル。豫後不良トハ限ラズ組織學上ノ所見ニハアロツボ氏疾患ニ類似スル事無シトセズ。

ブロック等ハ或時期ニ於テハ増殖性天疱瘡ノ像ヲ呈シ來ルト云ヘリ。サレド本患者ニ於テハ著明ナル紅斑、大水疱、原發皮疹ノ多型ト、組織増殖ノ強度ナル點ニ於テデューリング氏疾患トハ考ヘラレズ、尤モ時トシテデューリング氏疾患、ノイマン氏疾患及ピアロツボ氏疾患ノ間ニハ尙ホ嚴然タル區別ヲ樹ツル事能ハザル場合モアレドモ、本症ノ場合ニハ此鑑別ノ事ハ殆ンドソノ要ヲ見ザルナリ。

肺炎双球菌性口腔及ビ咽喉疾患。(Pneumokokkeninvasion) 口腔ノ所見ニ於テ、其組織増殖ヲ除ケバ、之ニ類似スル所多シ、且ツ偽膜及ビ偽膜下ヨリハ、多數肺炎双球菌ヲ證明シ得タルニ於テオヤ。然レドモ本菌ノ他ノ口腔内疾患ニ於テモ、多數ニ見出サレ得ル事アルハ周知ノ事ニシテ、ソノ事ノミヲ以テ診斷ノ基礎トスルコト能ハズ。又本症例ハ小林正平博士ニヨル肺炎双球菌性口腔及ビ咽喉疾患ノ何レノ分類ニモ適應スルモノナリ、又臨牀的所見、著明ナル組織増殖、及ビ血液所見等ヨリスルモ鑑別容易ナリトス。

此他、強テ鑑別ヲ要スルト思惟スルモノヲ列記スレバ下ノ如シ。粘液性天疱瘡 (Pemphigus mucosae)。落葉狀天疱瘡 (Pemphigus foliaceus)。黑色表皮腫 (Acanthosis nigricans)。尋常性天疱瘡 (Pemphigus vulgaris) 等ナルモ其鑑別困難ナラズ。今ハ一々之ヲ記サズ。

本疾患トノイマン氏疾患トノ關係。

本疾患ハ一八八九年アロツボ氏 (Hallopeaus) ニヨリ初メテ獨立疾患トシテ主張セラレ、初メ Sernatite pustuleuse chronique et végétante en foyers à progression excentrique) 後一八九八年 Pyodermitis végétante (増殖性膿皮症) ト改稱セラレタルモノニシテ、所謂ノイマン氏疾患即チ増殖性天疱瘡 (Pemphigus vegetans) ト別種ノモノナリヤ、否ヤニ就キテハ古來幾多ノ學者ニヨリ論ぜラレ、又研究ハ續ケラレタリ。然ルニアロツボ氏自身モ一八九八年小膿疱ト水疱トヲ併發セル症例ニ遭遇スルニ及ビ、自己ノ主張ヲ徹シ、結局増殖性膿皮症ハ増殖性天疱瘡 (H氏ハノイマン氏疾患ト云フ) ノ一變型ニ過ギズト解釋スルニ至リシトハ雖モ Jamieson, Hartzell, Pusey, Fis-

「H」及ビ瀬川氏等ノ症例報告ト其研究ノ結果、H氏疾患ハ稀有ナリトハ云ヘ、兩者ノ典型的ノモノヲ比較研究スルニ於テハ、相當ノ差異ヲ認メ得ラル、ニ至レリ、余モ又兩者典型ニ於テハ差異ヲ認ムルモノニシテ、其豫後又相違シ、一般ニH氏疾患ハ良好ニシテ、治療效果奏效スルモ、N疾患ノ豫後不良ナル點等ヨリ考慮シ、ノイマン氏疾患、デューリシグ氏疾患、H氏疾患、或ハ其移行型又ハ類似疾患ニ於テ其本態、其原因ガ解決セラレザル限り、前記諸氏ト共ニ兩者ヲ別症ト看做サント欲スルモノナリ。兩者ノ區別診斷法トシテ Jamieson ノ示セル論點ヲ左ニ記述セン。

増殖性天疱瘡。

一、常ニ口部ニ始マリ後他部ニ蔓延ス。

二、原發疹ハ水疱ニシテ増殖性肉芽形成ハ唯特殊ノ部位ニノミ散見ス。

三、多クノ場合水疱中ニハ「エオジン嗜好細胞」ヲ見ズ。

四、多クノ場合全身皮膚ニ亘リテ色素沈着ヲ見ルモ、是ハ服藥セル砒素劑ノ爲ナルベシ。

五、多クノ場合最初ヨリ全身症狀著シク、殆ンド凡テ死ヲ轉歸ヲ取ル。

六、局所療法ハ唯皮疹ノミヲ多少輕快スルニ過ギズ。

七、(本疾患ハ神經中樞ノ細胞退行性變化ト關係アルガ如シ。)

増殖性膿皮症。

一、他部ノ發疹ト同時ニ口部ニモ之ヲ見ル。

二、原發皮疹ハ小膿瘍ナリ、而シテ是等皮疹ハ後常ニ増殖性傾向ヲ示ス。

三、皮疹消失後ハ必ズ高度ノ色素沈着ヲ殘ス。是ハ砒素劑投與トハ無關係ナリ。

四、表皮ニ存スル小囊ノ内容ハ主トシテ「エオジン嗜好細胞」ヲ含ムモノナリ。

五、皮疹症狀數ヶ月ニ亘ルト雖モ全身健康ノ侵サル、事ハ輕微ナリ。

六、局所療法ハ皮疹ノ治癒ト共ニ、全疾患ノ治癒ヲ來ス。

七、(本疾患ハ何等カ未知ノ微體ニヨリテ起ルガ如シ云々)

又組織學上ヨリ見ルモノイマン氏疾患ニハ、特有ナル水泡形成等ニヨリ、眞皮上層ノ退行性變性ノ強度ヲ認メ、且ツ其表皮上層ニ亘ル所變

化アルニ反シ、且氏型ニテハ毛囊管腔又ハ表皮細胞中ニ小膿瘍又ハ小膿疱形成、表皮浮腫、乳頭浮腫、細胞表皮内浸潤、「アカントーデス」等ヲ其著明ナル組織學的所見トスル事ハ先人ノ記載ト一致スル所ナリ。

此如ク比較研究ノ結果本疾患ニ最酷似スルモノハ所謂且氏疾患ニシテ、余モ亦且氏疾患ノ獨立ヲ認ムルト同時ニ、本疾患ヲ且氏疾患ト診斷スル所以ナリ。本疾患ノ本態ニ關シテハ未ダ諸說紛々トシテ其確定ヲ得ザレドモ、且氏ノ最初ノ見解タル特異素質ノ人ニ來ルモノナルコトハ、一般ニ認メラル、所ニシテ、余ノ例ニ於テハ瀬川氏ノ例ト同ジク發疹ノ治癒後強度色素沈着アリ、植物神經系統機能検査ニ於テハ「ワゴトニー」ノ狀態ヲ示セリ。其他血中「コレステリン」及ビ脂肪酸等ノ著明ナル増加等ト併セ考へ、本症ニ全身の變狀ノ先驅スルモノナルコト推知セラレ、ナリ。

又本疾患ハ細菌傳染ニヨルモノナルトシ、之ガ研究發表セラレタルモノ少カラズ。然カモ未ダ其一致點ヲ見出シ難シ。Hallopeau 及ビ瀬川氏等ハグラム陰性ノ大腸菌樣桿菌ヲ證明セリ。此ガ余ノ口腔膿汁ヨリ得タルモノト、果シテ同種ノモノナリヤ否ヤ不明ナリ。只余ノ例ニ於テハ主トシテ膿汁ヲ天竺鼠腹腔中ニ注射セル時、見出シタルモノニシテ、培養基上ニテハ寧ログラム陽性ノ双球菌ヲ多數ニ認メタリ。又小膿瘍中ヨリハグラム陽性球菌ヲ得タリ。

文献ニ見ルニ或ハグラム陽性球菌ヲ或ハ双球菌ヲ、又ハ陰性桿菌ヲ證明セル等其一致點ヲ見出シ難シ。

本例ニ於テ三月三日前後ノ劇烈ナル粘液便ノアリタル事、然カモ其際收斂劑ガ何等效ヲ奏セズ。食思ノ缺損アリシ等ヨリ推察スルニ、恐ラク消化管系ニ且氏樣病變ヲ來シ、胃腸粘膜ヲ冒シ痛樣症狀ヲ呈セシモノナラント思惟ス。

次ニ性的關係ヲ見ルニ、男女間ニ於テハ大差ナキモ前記三類似疾患ノ統計(向井氏)ハ男百四十一例ニ對シ、女百五十九例ニシテ女子ニ於テ少シク多シ。由來N氏疾患等ハ妊娠、月經、出産等ニ關連シテ發生スル事アリトセラレ、Chaillet, Bernhard ノ如キハ月經閉止ガ症狀上ニ重要ナル意味ヲ持チ來セルト云ヒ、Bergsht 及ビ Solhedeet ハ出産後發病セリト云ヘリ。今本患者ニツキテ考察スルニ、患者ハ出産後痔核樣腫脹ヲ得、又月經閉止後即チ今ヨリ十年前、此度ト同様ノ口内疾患ニ悩メリト。果シテ是等ガ今度ト同様ノ疾症ナリシヤ、否ヤハ不明ナルモ、亦考慮ニ値スル一事項ナリトス。

既ニ述ベタル如ク、本症ハ一定ノ素質アル人ガ細菌ノ傳染ニヨリテ、二次的ニ發疹ヲ生ズルモノナリトノ一部論者ノ說ハ余モ亦肯定スル所ニシテ、即チアデソン氏病患者ニ似タル植物神經系統ノ狀態、血中「コレステリン」ノ著明ナル増加ハ體質ノ變化ヲ來ス一ツノ表現タラズンバアラズ。又皮疹ノ蔓延狀態ヲ見ルニ初診部位ヨリ漸次周圍ニ向ツテ進行スル點及ビ自ラ好發部位ノ存スル點ヨリシテハ細菌ノ感染ニヨ

ルト考フルヲ至當トスベク、從ツテ自家接種ノ可能ナルモ又明ナリ。余ハ最初自家接種ニ於テ、陽性ノ結果ヲ得ザリシモ、第二回入院ノ際口唇ノ周圍ニ於テ口唇ヨリ得タル膿汁ノ接種ニヨリ小膿疱ノ作ルコトヲ得タリ。要スルニ余モ亦先人ノ假定ヲ肯定スルニ過ギザルヲ遺憾トスルモ、人ノ斯如キ症例ニ遭遇スル時ノ比較ノ爲ニハ好材料ヲ提供スルモノタルヲ疑ハズ。

七、結 論

(一)七十歳ノ女性。(牧師)約十年前ニ現症ト類似ノ口内炎ヲ患ヒ、更ニ約一年前ヨリ舌、口腔、口角、咽喉粘膜ニ水泡ノ形成ナクシテ、小膿疱偽膜糜爛面ヲ伴フ著明ナル組織増殖ヲ來セリ。流涎及嚥下ノ困難アリ。治療後ハ癰痕ヲ遺スコトナシ。鼻腔内粘膜並ニ鼻入口部ハ結痂ニテ閉塞セラル。

(二)本年一月頃ヨリ陰股部、會陰部、大小陰唇、肛門周圍ニ集團性ノ小膿瘍ヲ形成シ、結痂、糜爛ヲ呈シ、増殖性肉芽組織ヲ作り、治療後黑色ノ沈着ヲ殘ス。又其外觀往々扁平「コンデローム」ニ類ス。

(三)是等症狀ハ一時治療シタル後三ヶ月ヲ經テ再び起リ、先ヅ口角ヨリ、上下口唇及ビ其周圍ニ亘リ、特異ノ發疹ヲ生ジ、同時ニ陰股部、鼠蹊部ノ一部、陰阜ニ同様ノ發疹ト黑色ノ色素沈着トヲ來セリ。此等ノ發疹ハ局所的治療等ニヨリ、病勢頓坐シ、其進行ヲ中止シ、一時輕快セシメ得タルモ、極メテ慢性ナリ。全身症狀比較的良好ニシテ豫後又一般ニ惡シカラズ。

(四)血液像ニ於テ「エオジン」嗜好細胞カナリノ高度ニ増加シ、又血中「ヒヨレステリン」量ノ著明ナル増加ヲ認ム。胃液中游離鹽酸無ク又「ワゴトニー」有リ、又皮膚色素増殖ヲ見、アディソン氏病ニ似タル體質ヲ想ハシムルモノアリ。

(五)皮膚組織ニ於テハ、表皮棘狀細胞層ニ海綿様浮腫ヲ見ルベク、又多數ノ「ミクロアブセス」アリ。「エオジン」嗜好細胞ノ集團ニヨリテ充サル。弾力性纖維ハ稍々増殖ノ傾アリ。口腔、舌、口唇粘膜ニ於ケル組織モ略々皮膚ト同様ノ變化ヲ示ス。

(六)細菌學上肺炎球菌ノ外屢々グラム陽性双球菌ヲ得。又動物試驗ニヨリテ屢々グラム陰性ノ大腸菌様桿菌及ビグラム陽性球菌ヲ證ス。自家接種試驗ニテハ著明ナル陽性成績ヲ得ザリシモ口唇部ニ於テ一回陽性ノ結果ヲ得タリ。

(七)其臨牀上及ビ組織學上ノ見地ヨリ本症例ヲアロップボ氏ノ所謂増殖性膿皮症ト診斷スルハ當ヲ得タルモノナリ。本疾患ハノイマン氏疾患デューリング氏疾患トノ間ニ幾多ノ移行型アリト雖モ、其典型的ノモノニテハ其症狀頗ル特異ニテ以テ一獨立症ト看做スコトヲ得。

(八)余モ亦本症ニ於ケル全身性素質ト皮膚素因トノ存在ヲ認ムル者ナリ。但シ其本態ノ何者ナルカノ問題ニ至ツテハ其解決ハ向後ニ之ヲ明セザルベカラズ。

擲筆ニ臨ミ、本研究ニ對シ、指導ト校閲トラ賜ハリシ恩師和田教授、多大ノ助言ヲ忝ウシタル皮膚科太田教授、並ニ細菌學的研究ニ援助ヲ惠マレタル松井博士ニ對シ、衷心ヨリ深甚ノ謝意ヲ表ス。

出 版 文 献

- 1) Gauscher u. Malloizel: Ann. de dermat. et de syph. (1906, p. 953).
- 2) Hallopeau, zitternach Segawa: Congr. intern. dermat. u. syph. Paris. (1830).
- 3) Hallopeau, zitternach Segawa: Bull. d. Soc. franc. d. dermat. et de syph. I, bid. (1891, p. 219).
- 4) Hallopeau, zitternach Segawa: Bull. d. Soc. franc. d. dermat. et de syph. II, bid. (1892, p. 8).
- 5) Hallopeau et de Dermant: Ann. de dermat. et syph. (1895, p. 16).
- 6) Hallopeau: Arch. f. Dermat. u. Syph. XLIII, (1898, s. 289).
- 7) Hallopeau: Arch. f. Dermat. u. Syph. XLV, (1898, s. 23).
- 8) Hallopeau: Ann. de dermat. et de syph. (1898, p. 269).
- 9) Hallopeau: Ann. de dermat. et de syph. I, bid. (1961, p. 105).
- 10) Garisch: Die Hautkrankheiten. (1900).
- 11) Gamieson u. Welsch: Brit. journ. of dermat. (1902, p. 287).
- 12) Gamieson: Brit. journ. of dermat. I, bid. (1922, p. 407).
- 13) Neumann: Arch. f. Dermat. u. Syph. (1886, s. 157).
- 14) Trautmann (G): Die Krankheiten der Mundhöhle u. der oberen Luftwege bei Dermatosen (1911).
- 15) 井尻辰之助: 皮膚科及泌尿科. 17巻, 7號, (1917).
- 16) 橋本隆雄: 皮膚科及泌尿科. 20巻, 12號, (1920).
- 17) 邊山部三: 東北醫學會雜誌. 1巻, 1號, (1916).
- 18) 土肥慶藏: 皮膚科學上中下巻. 12版, (1926).
- 19) 向井利一: 皮膚科紀要. 14巻, 5號, (1920).
- 20) 深井東夫: 皮膚科及泌尿科. 21巻, 5號, (1921).
- 21) 旭富吉: 皮膚科及泌尿科. 10巻, 8號, (1910).
- 22) 櫻井孝之進及志賀律: 皮膚科及泌尿科. 9巻, 4號, (1909).
- 23) 瀬川直: 皮膚科及泌尿科. 30巻, 2號, (1930).

附 圖 說 明

- 第一圖 會陰部ニ發生セル扁平「コンナローム」様腫瘍ノ組織標本。擴大五十一倍。
- 第二圖 口腔粘膜組織標本、擴大五十一倍。
- 第三圖 口唇並ニ其周圍ニ増殖セル像。(一九三一年八月五日撮影)
- 第四圖 舌部ノ病變。(一九三一年一月十六日撮影)
- 第五圖 會陰部ノ病變。(一九三一年八月五日撮影)

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

- 3). Freie Salzsäure und Pepsin im Magensaft fehlen gänzlich.
- 4). Gesamter Cholesteringehalt im Blutserum beträgt 378,5 mg/dl.
- 5). Harnsäuregehalt im Harn beträgt 0,45gr.
- 6). Hypofunktion der Nebenniere ist festzustellen durch verschiedene Untersuchungsergebnisse wie bei Acanthosis nigricans.

Histologischer Befund:

Histologisch verhält sich die Mund- und Zungenschleimhaut fast analog der Schamgegend, ausser der Pigmentation. Die Mucosa zeigt deutliches Oedem, Hypertrophie des Leistennetzes, mehrere kleine runde oder ovale Höhlen in den Epidermisschichten, mässige Infiltration der eosinophilen Zellen, Vermehrung der elastischen Fasern besonders an der unteren Partie der Papille, nur an der Schleimhaut der Schamgegend deutliche Pigmentation.

Bakteriologische Untersuchung:

Ueber Impfen des Eiters oder der Emulsion des pathologischen Gewebes immer negativ. Doch sind sowohl an den erodierten Partien und im Reizserum, wie im Schnitte Bakterien stets nachweisbar. Pneumokokken sind in überraschend grosser Zahl zu finden, sonst Gram-positive Diplokokken, Pseudodiphtheriebazillen, Staphylococcus albus und Bacillus der Koligruppe; die letzteren Verhalten sich mässig hochvirulent gegen Meerschweinchen und Maus.

Die Krank wurde mit Rivanolspülungen, künstlichem Sonnenlicht- und Röntgenbestrahlung, Jod und Arsen behandelt und im April als geheilt entlassen.

Aus den obigen Ergebnissen kann man diese Krankheit als die so seltene Pyodermitis végétante (Hallopeau) diagnostizieren, obwohl sie in einigen Punkten dem Pemphigus vegetans (Neumann) sehr ähnlich ist. Die Trennung diesser beiden Krankheiten wird in Berücksichtigung der klinischen Befunde (kondylomatöse Wucherung, starke Pigmentation, Pustelbildung etc.) ferner des Verlaufes und des histologischen Befundes kaum Schwierigkeiten begegnen.

(Autoreferat.)

KURZE AUSZUEGE

Ueber einen Fall von Pyodermite végétante (Hallopeau).

Von

Dr. Yoshiteru Koyama.

(Aus der oto-rhino-laryng. Klinik der kaiserl. Tohoku Universität
zu Sendai. Direktor: Prof. Dr. T. Wada).

Eine 70 jährige Frau, Pfarrerin, die angeblich vor 10 Jahren an Stomatitis gelitten hatte, klagte seit einem Monate vor der Spitalaufnahme am 16/1/1931, ueber Brennen und Schmerzen im Munde, Schlingbeschwerden, Sprachstörung und Salivation, sowie Effloreszenzen an der Schleimhaut der Wangen der Lippen und der Zunge. Die Effloreszenzen, bestanden aus miliar- bis azukigrossen Pusteln, platzen nach wenigen Tagen und lassen erhabene grauweissliche Beläge oder pfropfartige Massen übrig, welche mittelst Pinzette etc. leicht abgehoben werden koennen. So entstehen hier am Boden leicht blutende himbeerartig wuchernde erosierte Stellen oder Geschwüre. In der Umgebung derselben zeigt sich deutlich Schleimhautwucherung, so dass die mannigfaltig gestalteten tief oder seicht gefurchteten Falten an der Schleimhaut der Wangen und der Zunge zu sehen sind. Diese Erosionen oder Geschwüre heilen ohne Pigmentation und Narbenbildung.

Im Januar dieses Jahres bemerkte sie Anschwellungen in der Aftergegend, welche allmählich zur Entwicklung von an Kondylom erinnernden zumeist mit rundlichen Epithelialverlusten oder miliar- bis azukigrossen Pusteln versehenen Wucherungen führten. An den Schamlippen und der Dammgegend befinden sich einzelne oder gruppierte mit schmutzig bräunlichen Krusten bedeckte Pusteln, Erosionen oder Geschwüre, durch deren Konfluenz papillomatös wuchernde Herde entstehen. In letzteren sieht man hier und da auch kleine Pusteln, während an anderen Stellen die Ausschläge unter starker schwärzlicher Pigmentierung fast vollständig heilen.

Die klinische Untersuchung ergibt folgendes:

- i). Die Blut-W-R, Benzochol-Reaktion und tuberkulöse Reaktion sind negativ.
- 2). Im Blutbilde findet sich eine Eosinophilie (19%).