家兔膝狀神經節細胞ノ生後ノ發育ニ就テ

Y. Kojima: Über die postnatale Entwicklung der Ganglienzellen
des Ganglion geniculi von Kaninchen.

東北帝國大學醫學部耳鼻咽喉科教室 (主任 和田教授)

小島祐三

内容目次

第一章 緒言	第一項 測定方法
第二章 實驗材料及ビ標本作製法	第二項 最大膝狀神經節細胞ノ大サ
第一項 材料	第三項 最大膝狀神經節細胞ノ大サノ性ニヨル比較
第二項 固定液及ビ固定法	第四項 最大膝狀神經節細胞ノ大サノ左右側ノ比較
第三項 後固法、「ツエロイナン」包埋及ビ染色法	第五項 同一年齡ヲ有スル體重ノ大小ニヨル家兔ノ最大膝狀神經節細胞及ビ其ノ接間ノ大サノ比較
第三章 測定成績	第六項 最大膝狀神經節細胞ニ於ケル核ト原形質トノ關係
	第七項 膝狀神經節細胞生後ノ形態學的觀察
	第四章 結論
	引用文獻

第一章 緒言

西曆千九百二十三年恩師和田教授ハ白鼠ニ就キ其蝸牛殻ノ生後ノ發育狀態ヲ究メラレシガ、更ニ千九百二十九年ニ至リ大橋氏ヲ指導セラレテ家兔蝸牛殻ニ就キ同様ノ研究ヲ完成セシメラレタリ。是ニ依リテ蝸牛殻螺旋神經節及ビ前庭神經節ノ生後ノ發育ニ於ケル解剖並ビニ生理ハ全ク餘蘊ナク闡明セラレタリト雖モ、未ダ膝狀神經節ニ關シテハ之ガ研究ノ歩ヲ進メラレザリキ。此處ニ於テ著者ハ命ヲ享ケ家兔ニ就キノ膝狀神經節細胞ノ生後ノ發育ヲ辿ランコトヲ企テタリ。

膝狀神經節ニ關シテハ既ニレチウス(Retzius)、レンホゼツク(Lenhossék)、或ハ十倉氏、遠藤氏等ノ業績アルモ、他ノ腦神經節例(バガッヤル(Gasser))氏半月狀神經節、迷走神經節等ノ如ク其詳細ノ究メラレシモノ尠ク、特ニソノ發育學的攻究ニ至リテハ全ク看過セラレタルヤノ觀ナキニアラズ、著者ノ敢テ本報告ヲナス所以又此處ニアリトス。

第二章 實驗材料及ビ標本作製法

第一項 材料

原著 小島ニ家兔膝狀神經節細胞ノ生後ノ發育ニ就テ

實驗動物トシテ使用セル家兔ハ凡テ當教室飼育出生ノモノニテ、四肢軀幹ノ運動敏活正調ニシテ、發育良好、鼓膜正常ニテ前庭器及ビ聽器ニ異常ナキ全ク健全ナルモノヲ採レリ。

斯ノ如ク選擇セル家兔ヲ出生第一日ヨリ五百四十五日ニ至ル迄之ヲ年齡ニヨリ十九組ニ分チ、後述ノ固定法、包埋法、染色法ヲ施シ鏡下ニ於テ各組四個ノ優良膝狀神經節ヲ選ビ是ヲ測定材料トセリ。

第二項 固定液及ビ固定法

固定液トシテハ吉井||ジ―ベンマン氏液ヲ用ヒ、固定法トシテハ生體固定法ヲ選ビタリ。特ニ吉井||ジ―ベンマン氏液及ビ生體固定法ヲ選ビタル理由ハ、一ハ千九百二十年大日本耳鼻咽喉科會總會ニ於ケル田所||渡邊、八木澤、下平||萬城目、久保||平川、中道等數氏ノ推獎ニ基キシモノニテ、他ハ斷頭固定法ニ於ケル固定液浸入ノ不平等及ビ其爲メ起リ易キ死後變化等ヲ考慮セルタメナリ。而シテ斯ル固定法ハ膝狀神經節細胞ノミヲ目的トスル時ニハ特ニ必要トセザルベケンモ、著者ノ使用セシ材料ハ同時ニ別途ノ目的ヲ有スルモノナルタメ、斯ク入念ナル方法ヲ採レルモノナリ。

第三項 後固法、「ツェロイデン」包埋及ビ染色法

固定液或ハ後固定液ハ使用ニ際シテ其都度之ヲ新調シ、二週間毎日之ヲ交換シ室温中ニ保存セリ。而シテ後固定完了セバ標本ヲ水洗スルコトナク直チニ左記ノ如ク後硬化液ニ投入ス。

五〇%「アルコホル」 一日

九六%「アルコホル」 一日

五〇%「アルコホル」 一日

次ニ左ノ脫灰液ニ移シ毎日新調ノモノト交換セリ。

五%硝酸水(純硝酸) 四九纏

一〇%「フォルマリン」 四九纏

冰醋酸 二纏

室温ニテ脫灰終ル迄三日乃至二十日ヲ要シタリ。此日數ノ長短ハ主トシテ季節及ビ動物ノ大小ニ關シテ多少ノ差アリタルニヨルモノナルモ成ルベク其日數ヲ同一ニスルト共ニ生後一日ノモノト雖モ同様脫灰液ニ投入セリ。蓋シ聽器ニ對スル脫灰液ノ影響ヲ成ルベク同一ナラシメ

曳イテ之ニヨル成績ノ差異ヲ防ガンガ爲メナリ。

次ニ二日間流水ニテ洗滌シ左ノ如ク脫水セリ。

五〇%「アルコホル」 一日

七〇%「アルコホル」 一日

八六%「アルコホル」 一日

九六%「アルコホル」 二日

無水「アルコホル、エーテル」 二日

脫水セル標本ハ次ノ順序ニ依リ「チェロイデン」包埋ヲ行ヘリ。

水様「ツェロイデン」 二週間

「グリセリン」様「ツェロイデン」 一〇日間

濃厚「ツェロイデン」 一〇日間

最後ニ「ツェロイデン」蟻ノ栓ニ紙片ヲ挟ミ小間隙ヲ作り「ツェロイデン」ヲ極メテ徐々ニ乾燥硬化セシメ、周圍ノ不要部ヲ除キ適當ノ「ツェロイデン・ブロック」トナシ、八〇%ノ「アルコホル」中ニ蓄フ。隨時ニ木片ニ附着セシメ再ビ八〇%「アルコホル」中ニ一日以上入レ置キ十五「ミクロン」ノ厚サニ連續切片ヲ製作セリ。而シテ全切片ヲ四部ニ分チ第一部ハ「ヘマトキシリン」||「エオジン」重複染色、第二部ヲハイデンハイン鐵「ヘマトキシリン」、ヴァンギーソン重複染色ヲ行ヒ、第三部第四部ハ必要ニ應ジ他ノ染色法ニ使用セリ。

第三章 測定成績

第一項 測定方法

神經節細胞ノ測定ニハ各區劃ガ四・二八「ミクロン」ニ相當スル對眼「ミクロメーター」ヲ裝置セルツァイス顯微鏡ヲ使用シタリ。而シテ一神經節ヨリ四ツノ優良ナル切片ヲ撰ビ各切片ニ就イテ各十個ノ最大ナル節細胞ヲ測定シ、雌雄兩側合セテ四個ノ神經節ヨリ百六十個ノ節細胞ヲ選擇測定シテ其價ヲ平均シ之ヲ各年齡組ノ大サトセリ。

胞體及ビ核ノ測定ニ際シテハ互ニ直角ニ交叉スル二個ノ最大ナル直徑ヲ下ノ如ク測レリ。即チ胞體ノ場合ニハ長徑ハ細胞ノ長軸ヲ通過スル直徑ニシテ、短徑ハ長徑ト直角ニ交リ核ノ中央ヲ通過スル線ヲ選定ス。核ノ場合ニ於テモ同様ニシテ長徑ハ其長軸ヲ通過スル線ニシテ、短

第一表 膝狀神經節細胞ノ研究ニ使用セル家兔ノ番號・體重・身長・性及ビ側ヲ年齡順ニ排列セル表

番號	年齡 (日數)	體 (瓦) 重	身長 (厘米)	性	側
二二	一	五〇	六	♂	左、右
二六	一	三四	八	♀	左
二五	一	三七	七	♀	右
一	三	六四	一〇	♂	左、右
二八	三	六五	九	♀	左
二九	三	六〇	九	♀	右
五	五	六六	一一	♂	左、右
六	五	六四	一一	♀	左、右
三五	六	一〇七	一一	♂	左、右
三六	六	九五	一一	♀	左
三七	六	八五	一一	♀	右
三〇	八	一三〇	一二	♂	左、右
三一	八	一五〇	一三	♀	左、右
七	一〇	一四五	一四	♂	左、右
八	一〇	一四〇	一三	♀	右
五〇	一〇	一五〇	一四	♀	左
五二	一二	一七五	一四	♀	左、右
五三	一二	一四〇	一三	♂	左、右

番號	年齡 (日數)	體 (瓦) 重	身長 (厘米)	性	側
一七	一五	一四八	一四	♂	左、右
一八	一五	一五七	一四	♀	左
三九	一五	一八〇	一四	♀	右
三三	一八	二二〇	一六	♂	左、右
三四	一八	二七九	一七	♀	左
三二	一八	二三〇	一七	♀	右
一二	二一	二五四	一七	♂	左、右
一一	二一	二五〇	一七	♀	左、右
一五	二五	二三二	一七	♂	左、右
一四	二五	二二五	一七	♀	左
一六	二五	二三〇	一七	♀	右
四〇	三〇	五五六	二三	♀	左、右
九	三〇	二三五	一七	♂	左
一〇	三〇	二二五	一七	♂	右
二四	五〇	五四〇	二四	♂	左、右
四八	五〇	六四〇	二八	♀	左、右
五七	一〇〇	一二七〇	三九	♂	左、右
五八	一〇〇	一二四〇	三九	♀	左

四一	一〇〇	九二五	三〇	♀	右
二〇	一五〇	一、五〇〇	三五	♀	左
六九	一五〇	一、五〇〇	三五	♀	右
五一	一五〇	一、四五四	三〇	♀	左右
二一	二〇〇	二、一〇〇	三七	♀	左右
五五	二〇〇	二、二五〇	四〇	♀	左右
六八	二五〇	二、一〇〇	三九	♀	左右
六〇	二五〇	一、九八五	三八	♀	左右
五九	三六五	二、四七〇	四〇	♀	左右
六五	三六五	二、六五〇	四〇	♀	左右
五六	五四五	二、七二五	四二	♀	左右
六六	五四五	二、八〇〇	四一	♀	左右

第二表 膝狀神經節細胞ニ於ケル細胞體及ビ核ノ直徑

年齢 (日數)	體重 (瓦)	身長 (厘米)	直 徑			
			細胞		核	
			長 徑	短 徑	長 徑	短 徑
一	四〇	七	二五・四九	二一・五〇	一二・五五	一〇・七六
三	六三	九	二七・二四	二二・五九	一二・六三	一〇・八四
五	六五	一一	三〇・三二	二四・六七	一三・一九	一一・九〇
六	九六	一一	三二・〇三	二五・六〇	一三・六九	一二・一七

原著 小島 家兔膝狀神經節細胞ノ生後ノ發育ニ就テ

第三十八卷 四九七 (第五號 三七)

徑ハ長徑ニ直角ニ交叉シ核ノ中央ヲ通過スル線ヲ採用ス。
表中計算直徑トアルハ各例共長徑ト短徑トノ乘積ノ平方根ヲ計算ニヨリテ得タル數ナリ。
斯クシテ選出使用セル動物ノ番號、年齢、體重、性及ビ側ハ第一表ニ示ス如シ。
第二項 最大膝狀神經節細胞ノ大サ
第二表ハ最大膝狀神經節細胞ノ胞體及ビ核ノ長短兩徑及ビ其計算直徑ヲ年齢順ニ排列記載シ、表下ニ五組ノ比率ヲ附加セルモノナリ。
之ニヨリテ觀ルニ胞體ハ第一日ヨリ第十日頃迄ハ比較的急速ニ、以後ハ漸次徐々ニ第五十日迄増大シテ極大ニ達シ、以後僅カニ減少シテ多少ノ消長ヲ伴フモ殆ンド一定線上ニ經過シ増大ノ傾向ヲ示サザルモノ、如シ。核ニ於テハ第一日ヨリ第二十五日頃迄徐々ニ増大シテ増大ニ達シ、以後僅カニ減少スルモ殆ンド胞體同様一定線上ニ經過シ些モ増大ノ傾向ヲ示サズ。此間ノ消息ハ表下ノ比率ニ就イテ見ルモ明ナリ。即チ第一日ヨリ第十日ニ至ル比率ハ胞體ニ於テ一：一

比	年齡 (日數)	體重 (五)	身長 (厘米)	直 徑				(ミクロン)			
				長 徑	短 徑	計算直徑	體 體	長 徑	短 徑	計算直徑	徑
一一〇日	八	一四〇	一三	三三・七九	二六・〇三	二九・七	二九・七	一四・五三	一二・六九	一三・六	一三・六
一一〇日	一〇	一四五	一四	三四・〇二	二六・七四	三〇・二	三〇・二	一四・八一	一二・八九	一三・八	一三・八
一二日	一二	一五八	一四	三四・五〇	二七・四三	三〇・八	三〇・八	一四・七〇	一二・八一	一三・七	一三・七
一五日	一五	一六二	一四	三五・二七	二七・八一	三一・三	三一・三	一五・〇九	一二・九六	一四・〇	一四・〇
一八日	一八	二四三	一七	三五・七八	二八・一三	三一・七	三一・七	一五・一三	一三・三六	一四・二	一四・二
二一日	二一	二五二	一七	三六・三八	二九・二〇	三二・六	三二・六	一五・三〇	一三・九五	一四・六	一四・六
二五日	二五	二二九	一七	三七・三七	三〇・一七	三三・六	三三・六	一五・八四	一四・三二	一五・一	一五・一
三〇日	三〇	三二九	一九	三七・九三	三〇・四二	三四・〇	三四・〇	一五・八六	一四・二五	一五・一	一五・一
五〇日	五〇	五九〇	二六	三八・五五	三〇・八四	三四・五	三四・五	一五・六二	一四・三六	一五・〇	一五・〇
一〇〇日	一〇〇	一一四五	三六	三八・三五	二九・八〇	三三・八	三三・八	一五・六七	一三・八八	一四・七	一四・七
一五〇日	一五〇	一四八五	三三	三七・八七	二九・七一	三三・五	三三・五	一五・六一	一三・八一	一四・六	一四・六
二〇〇日	二〇〇	二一七五	三九	三七・六三	二九・四五	三三・三	三三・三	一五・六九	一三・八〇	一四・七	一四・七
二五〇日	二五〇	二〇四三	三九	三七・五〇	二九・七六	三三・四	三三・四	一五・五九	一三・九一	一四・七	一四・七
三六五	三六五	二五六〇	四〇	三七・三九	二九・一三	三三・〇	三三・〇	一五・五一	一三・六一	一四・五	一四・五
五四五	五四五	二七六三	四二	三七・四一	二八・九〇	三二・九	三二・九	一五・二八	一三・九〇	一四・六	一四・六
一一〇日	一一〇日	一一〇日				一一・一・三				一一・一・二	
一一〇日	一一〇日	一一〇日				一一・一・五				一一・一・三	
一一〇日	一一〇日	一一〇日				一一・一・四				一一・一・三	

男性ノ大ナリシ場合……………八……………六
女性ノ大ナリシ場合……………一〇……………一〇
同一ナリシ場合……………一……………三

ナリ。又總平均價ニ於テ男性ハ胞體三一・一「ミクロン」、核二三・九「ミクロン」ニテ女性ハ之ニ對シテ各三一・三及ビ一四・一「ミクロン」ナリ。即チ女性ハ胞體及ビ核ニ於テ僅カニ男性ヨリ大ナリ。

第四項 最大膝狀神經節細胞ノ大サノ左右側ノ比較

本比較ニハ同一年齡家兔ノ各側神經節ヨリ得タル測定價ヲ平均シテ之ノ長短同徑ヨリ計算直徑ヲ求メテ記載セリ。

第四表 同一家兔ノ膝狀神經節細胞ノ大サノ側ニヨル比較

年 齡 (日數)	體 重 (瓦)	計 算 直 徑 (ミクロン)			
		左 側		右 側	
		細胞體	核	細胞體	核
一	五〇	二三・二	一一・九	二三・六	一一・五
三	六四	二四・五	一一・七	二五・一	一一・八
五	六六	二七・三	一二・七	二七・四	一二・四
六	一〇七	二七・九	一二・八	二九・三	一三・〇
八	一三〇	二九・四	一三・七	二九・九	一三・五
一〇	一四五	二九・六	一三・八	三〇・七	一三・八
一二	一四〇	三〇・三	一三・四	三一・三	一四・〇
一五	一四八	三一・七	一四・〇	三一・〇	一四・二
一八	二二〇	三一・九	一四・一	三一・九	一四・一
二一	二五四	三一・九	一四・五	三三・三	一四・六

年 齡 (日數)	體 重 (瓦)	計 算 直 徑 (ミクロン)			
		左 側		右 側	
		細胞體	核	細胞體	核
二五	二三二	三三・四	一五・一	三三・八	一五・四
三〇	五五六	三四・三	一四・九	三三・六	一五・二
五〇	五四〇	三三・七	一四・七	三四・四	一五・三
一〇〇	一二七〇	三三・三	一四・七	三四・三	一四・八
一五〇	一四五四	三四・六	一四・六	三二・六	一四・七
二〇〇	二一〇〇	三三・五	一五・二	三三・一	一四・五
二五〇	二一〇〇	三三・四	一四・八	三三・四	一四・六
三六五	二四七〇	三二・八	一四・五	三三・五	一四・六
五四五	二七二五	三三・三	一四・四	三二・四	一四・八
平 均		三一・一	一四・〇	三一・三	一四・〇

第三表ハ之ノ價ヲ年齡順ニ排列セルモノニテ其比較成績ハ表下ニ示ス如シ。即チ十九組ニ於テ男性ノ大ナリシ場合胞體ニ於テ八回、核ニ於テ六回、同一大サナリシ場合前者ニ於テ一回、後者ニ於テ三回

左側ノ大ナリシ場合	五	五	一二	一二
右側ノ大ナリシ場合	二	二	二	二
同一大サナリシ場合	二	二	二	二

第四表ハ之ノ價ヲ年齡順ニ排列セルモノニテ其比較成績ハ表下ニ表ス如シ。即チ十九組ニ於テ右側ノ大ナリシ場合胞體ニ於テ十二回、核ニ於テ同ジク十二回、同一大サナリシ場合前者ニ於テ二回、後者ニ於テモ同ジク二回ナリ。又總平均價ニ於テ左側ハ胞體三一・一「ミクロン」、核一四・〇「ミクロン」ニテ右側ハ之ニ對シ各々三一・三及ビ一四・〇「ミクロン」ナリ。即チ右側ハ胞體ニ於テノミ僅カニ左側ヨリ大ナレド核ニ於テハ側ニ於ケル差異ハ殆ンド之ヲ認ムルヲ得ザリキ。

第五項 同一年齡ヲ有スル體重ノ大小ニヨル家兎ノ最大膝狀神經節細胞及其核間ノ大サノ比較

上述ニ明ナル如ク同一年齡ヲ有スル家兎ノ各組ニ於テ屢々其體重ニ比較的著明ナル差異ヲ示スヲ見タル著者ハ、今此體重ノ差異ガ幾何程度迄胞體及ビ核ノ發育ト關係アルカラ檢セント試ミタリ。

第五表 同一年齡ヲ有スル體重ノ大小ニヨル家兎ノ最大膝狀神經節細胞及ビ其核ノ直徑比較

年齡 (日數)	體 重 (瓦)		計 算 直 徑 —— (ミクロン)			
	大	小	大	小	大	小
一	五〇	三五	二三・二	二三・九	一一・五	一一・八
三	六五	六〇	二四・九	二五・八	一一・七	一一・八
五	六六	六四	二八・二	二六・五	一二・八	一二・七
六	一〇七	九〇	二九・二	二八・〇	一三・〇	一二・九
八	一五〇	一三〇	三〇・三	二九・〇	一三・四	一三・七
一〇	一四五	一四〇	二九・七	二九・八	一三・八	一三・九
一二	一七五	一四〇	三〇・九	三〇・六	一三・六	一三・八
一五	一八〇	一四八	三一・四	三〇・九	一四・二	一四・〇

年齡 (日數)	體 重 (瓦)		計 算 直 徑 —— (ミクロン)			
	大	小	大	小	大	小
一八	二五〇	二二〇	三二・〇	三一・九	一四・七	一四・一
二一	二五四	二五〇	三二・七	三二・五	一四・〇	一四・二
二五	二三二	二二五	三三・七	三二・〇	一四・三	一五・二
三〇	五五六	二三五	三四・七	三三・六	一五・一	一四・九
五〇	六四〇	五四〇	三五・〇	三三・一	一五・六	一四・九
一〇〇	一二七〇	九二五	三三・八	三五・五	一四・五	一四・六
一五〇	一五〇〇	一四五四	三五・三	三一・九	一四・五	一四・九
二〇〇	二二五〇	二一〇〇	三四・三	三二・三	一四・五	一四・六

年 齡 (日數)	體 重 (瓦)		計 算 直 徑 (ミクロン)	
	大	小	大	小
二五〇	二一〇〇	一九八五	三三・四	三三・三
三六五	二六五〇	二四七〇	三二・九	三三・三
五四五	二八〇〇	二七二五	三二・八	三三・〇
平均	八一三	七三三	三一・五	三〇・九
差(大)	八〇		〇・六	
各組大	一三・六		七・二	
ナリシ	一		一	
同一ナ	一		一	
合	一		一	

ノニ他ナラザルベシ。

此結果ハ入戸野氏ノ白鼠ガッセリー氏神經節細胞ニ於ケル如ク大ナル體重ヲ有スルモノニ大ナル胞體及ビ核ヲ有ステフ現象ニ近似ノ成績ヲ示スト雖モ、大橋氏ノ前庭神經節細胞測定ノ成績トハ殆ンド反對の傾向ヲ認ムルモノニシテ、胞體及ビ核ノ大キサハ體重ノミト殊ニ密接ナル關係ヲ有スルモノニ非ラザルベケンモ體重モ亦必ズヤソノ一因子ヲ演ズベキコトヲ立證スルモノニアラザルナキカ、大方諸賢ノ御批判ヲ仰ガントスル所ナリ。

第六項 最大膝狀神經節細胞ニ於ケル核ト原形質トノ關係

第六表 最大膝狀神經節細胞ニ於ケル核ト原形質トノ比率

年 齡 (日數)	體 重 (瓦)	身 長 (ミ)	細 胞 體		核		細胞原形質 ノ容積 立方ミクロン	核對原形質容積 ノ比率
			計算直徑 ミクロン	容 積 立方ミクロン	計算直徑 ミクロン	容 積 立方ミクロン		

第五表ハ之ノ目的ニテ同一年齡ヲ有スル體重ノ大小ニヨル家兔ノ最大膝狀神經節細胞體及ビ其核ノ計算直徑ヲ比較セルモノニシテ、表ヲ通覽スルニ體重ノ總平均價ニ於テ兩者ハ八〇瓦ノ差異ヲ示シ大ナル體重ヲ有スル家兔ノ胞體ノ直徑ハ概シテ小ナル體重ヲ有スル夫等ニ比較シ稍々大ナルヲ認メタリ。然レドモ核ノ直徑ヲ比較スル時ニハ此程度ノ體重ノ差異ハソノ大キサニ殆ンド影響スル所ナク、兩者ノ總平均ハ殆ンド相等シキ數字ヲ示セリ。

而シテ大ナル家兔ガ大ナル胞體ヲ有スル例數ハ十九組中十三例即チ六八%ナルニ反シ、大ナル家兔ガ大ナル核ヲ有スル例數ハ僅カニ七例三六%ニ過ギズ。是ニ依ツテ之ヲ觀レバ大ナル體重ヲ有スル家兔ハ概シテ大ナル胞體ヲ有スル傾向ヲ示セドモ、同一年齡ノモノニアリテハ核ノ大キサハ殆ンド體重ノ影響ヲ受ケザルベキコトヲ示スモ

一	四〇	七	二三・四	六七・七	一一・六	八二・一	五八・九六	一	七・一八
三	六三	九	二四・八	八〇・一九	一一・七	八三・八	七一・八一	一	八・五七
五	六五	一一	二七・三	一〇七・一一	一二・六	一〇九・四	九六・一七	一	八・八〇
六	九六	一一	二八・六	一二二・九二	一二・九	一一二・七	一一一・六五	一	九・九一
八	一四〇	一三	二九・七	一三六・五七	一三・六	一三一・〇	一二三・四七	一	九・四三
一〇	一四五	一四	三〇・二	一四三・六二	一三・八	一三八・一	一二九・八一	一	九・四〇
一二	一五八	一四	三〇・八	一五二・四三	一三・七	一三五・三	一三八・九〇	一	一〇・二七
一五	一六二	一四	三一・三	一六〇・七九	一四・〇	一四三・一	一四六・四八	一	一〇・二四
一八	二四三	一七	三一・七	一六七・二五	一四・二	一五〇・五	一五二・二〇	一	一〇・一一
二一	二五二	一七	三二・六	一八一・二四	一四・六	一六三・〇	一六四・九四	一	一〇・一二
二五	二二九	一七	三三・六	一九八・二七	一五・一	一七八・八	一八〇・三九	一	一〇・〇九
三〇	三三九	一九	三四・〇	二〇五・二五	一五・一	一七八・〇	一八七・四五	一	一〇・五三
五〇	五九〇	二六	三四・五	二一四・六一	一五・〇	一七六・〇	一九七・〇一	一	一一・一九
一〇〇	一一四五	三六	三三・八	二〇二・二九	一四・七	一六八・〇	一八五・四九	一	一一・〇四
一五〇	一四八五	三三	三三・五	一九七・五八	一四・六	一六五・一	一八一・〇七	一	一一・九六
二〇〇	二一七五	三九	三三・三	一九三・一九	一四・七	一六六・八	一七六・五一	一	一〇・五八
二五〇	二〇四三	三九	三三・四	一九五・一五	一四・七	一六七・一	一七八・四四	一	一〇・六八
三六五	二五六〇	四〇	三三・〇	一八八・二五	一四・五	一六〇・五	一七二・二〇	一	一〇・七三
五四五	二七六三	四二	三二・九	一八六・一三	一四・六	一六二・〇	一六九・九三	一	一〇・四九

第六表ハ最大膝狀神經節細胞ノ核ト細胞原形質トノ間ニ於ケル大サノ關係ヲ知ル爲メニ其胞體及ビ核ノ計算直徑並ニ其容積、細胞原形質容積等ヲ計算シテ年齡順ニ記載セルモノナリ。

其核ト原形質トノ比率ハ表ノ示ス如ク第一日ニ於テハ一：七・一八ナレド其後第十二日迄ハ急速ニ且ツ規則正シク増大シ以後ハ多少ノ動搖ヲ伴フモ良ク第五十日迄増大シテ極大ニ達シ一：一一・一九ノ比率ヲ示シ以後僅カニ減少シテ略同一比率ニ止マルヲ見ル。即チ發育ノ初期

殊ニ開眼前後ニ於テハ胞體ノ増大率ハ核ノ夫レニ比シ遙ニ大ニテ、兩者ノ關係ハ第三十日ニ至リテ殆ンド平均ノ比率ニ達ス。第五十日以後五百四十五日ニ至ル間ハ其比率ニ於テ全ク増大ノ傾向ヲ示サズ極メテ僅カニ減少ノ傾向ヲ呈スルモノナリ。

第七項 膝狀神經節細胞生後ノ形態學的觀察

膝狀神經節細胞ノ胞體ハ出生時尙ホ小ニシテ圓形又ハ多少多角形ヲ呈シ原形質ハ少ナク且ツ均等性ニシテニッスル氏小體ハ殆ンド見ラレズ。核ハ圓形又ハ橢圓形ニシテ比較的大ナレドモ胞體

トノ比率ハ螺旋神經節細胞ノ夫レヨリ遙ニ小ニシテ前庭神經節細胞ノ夫レニ近似ノ値ヲ示ス。

核小體ハ比較的明瞭ニシテ多クハ核ノ中央ニアレド時ニ邊在スルモノアリ。「クロマチン」粒並ニ「ケルンファーデン」ノ出現ハ尙ホ明カナラズ。然レドモ細胞生後ノ發育ハ可成リ急速ニシテ第三日ニ於テ明ニニッスル氏小體認識セラレ核内ニ於テモ「クロマチン」粒ノ稍々良好ナル分化及ビ「ケルンファーデン」ノ出現ヲ示ス。而シテ此如ク佳良ナル分化ヲ示セルニッスル氏顆粒ハ此年齡ニ於テ中等大及ビ小ナル形態ヲ有スル細胞ニ於テモ亦發見セラル。勿論是等ノモノハ後期ニ於ケルヨリモ其數量著シク少ク又其形態モ小ナリ。

胞體ハ第五十日ニ於テ極大ニ達シニッスル氏小體ハ其數量ニ於テモ亦大サニ於テモ著シク増加ス。核ハ既ニ第二十五日ニ於テ其極大ニ達シ成熟狀態ヲ示シ以後増大ノ傾向ヲ示サズ。

兩者ノ發育増大率ハ胞體ニ於テ著シク大ニシテ核ニ於テハ小ナリ。兩者ノ極大期ニ於ケル組織學的構造ハ全ク成熟ノ夫レヲ示シ以後兩者ハ其形ニ於テ極メテ僅カニ減少シテ殆ンド一定線上ニ經過シニッスル氏小體及ビ「クロマチン」粒ノ僅カナル増加並ニ濃染ヲ見ル外、注目ニ値スベキ形態學的變化ヲ認メズ。只成熟期後ノ節細胞ノミノ周圍ニハ極メテ狹小ニシテ透明ナル十倉氏ノ所謂不染色帶ノ認めラル、モノ少ナカラズ。

挿圖一、出生第一日、第五十日及ビ第三百六十五日ノ家兔膝狀神經節細胞ノ半截面ヲ千倍ニ擴大セルモノニテ其ノ形ノ増減及ビ形態學的變化ヲ示ス

細胞ノ包膜ハ好ク發育シ橢圓形又ハ紡錘形ノ濃染スル核ヲ有ス。套皮細胞ノ發育亦良好ニシテ成熟期後ノモノニ於テハ細胞冠ヲ形成スルモノアルモ小ナル神經細胞ニ於テハ其數少ナク僅ニ一二ノ套皮細胞ヲ見ルニ過ギザルモノアリ。

節細胞ノ中最モ多ク見ラル、ハ擬ニ極性絲毬型ナルモ極メテ稀ニ多極性細胞ノ存在ヲ認ムルコトアリ。嘗テ十倉氏ニヨリ牛膝狀神經節細胞ニツキ此多極性細胞ノ種々ナル形態ニ關シテ其研究ヲ發表セラレシガ、著者ハ家兎ニ於テモ其種々型ノ大部分ハ肯定サルベキモノナルコトヲ信ズルナリ。

挿圖第一ハ家兎出生第一日、第五十日及ビ第三百六十五日ノ膝狀神經節細胞中、其大ナルモノ、半截面ヲ千倍ニ擴大シテ畫ケルモノナリ。

第四章 結 論

一、膝狀神經節細胞ハ多クハ擬ニ極性絲毬型ノ細胞ナルモ、稀ニ兩極性或ハ多極性ニシテ、形ハ圓形又ハ多少多角形ヲ呈ス。出生時胞體及ビ核ハ共ニ不熟狀態ニアルモ生後急速ナル發育變化ヲナシ、第三日ニ於テニッスル氏小體發見セラレ其分化ハ年齡ト共ニ佳良ニ赴クモノナリ。

二、最大膝狀神經節細胞ノ大サハ出生第一日ニ於テ胞體ハ二五・四九×二一・五〇 μ ニテ、核ハ一二・五五×一〇・七〇 μ ナリ。而シテ胞體ハ第五十日ニシテ極大ニ達シ三八・五五×三〇・八四 μ ヲ數ヘ、核ハ第二十五日ニ於テ其最大値一五・八四×一四・三二 μ ヲ示ス。而シテ節細胞ノ大サハ生後十五日頃迄ハ比較的急速ニ、以後ハ徐々ニ増大シテ上記ノ極大期ニ達ス。其後ハ僅ニ減少シテ殆ンド同一價ニ止リ増大ノ傾向ヲ示サズ。

斯クテ第五百四十五日ニ於テハ胞體ハ三七・四一×二八・九〇 μ 、核ハ一五・二八×一三・九〇 μ ヲ示ス。

三、核ハ出生時比較的大ナレドモ其増大率及ビ減少率共ニ胞體ノ夫レヨリ幾分小ナリ。

四、性及ビ側ニヨル比較ニ關シテハ、胞體及ビ核ノ大サニ著明ナル差異ヲ認メザルモ、雌及ビ右側ハ雄及ビ左側ニ比シ僅ニ大ナル傾向ヲ示ス。

五、同一年齡ニ於テ體重ノ大小ニヨリテ受クル胞體及ビ核ノ大サノ影響ハ極メテ僅微ニテ、大ナル體重ヲ有スル家兎ハ小ナル體重ヲ有スル夫レニ比シ、僅カニ大ナル胞體及ビ核ヲ有スル傾向ヲ認ム。

六、膝狀神經節細胞ノ核及ビ原形質ノ比率ハ出生時已ニ大ニシテ、胞體ノ極大期ニ至ル迄急速ニ且ツ比較的規則正シク増加スルモ、以後ハ増大ノ傾向ヲ示サズ極メテ僅ニ減少シテ不變ニ止マルヲ見ル。

- 1) **Alagna, G.**, 1909 Beitrag zur normalen und pathologischen Histologie der Ganglien des Akustikus. Ztschr. f. Ohrenh., Bd. 59. 2)
- Alexander, G.**, 1899 Zur Anatomie des Ganglion vestibulare der Säugetiere. Sitz-Ber. Akad. Wiss. math. nat. Cl., Wien, Bd. 108, Abt.
3. 3) **Barth**, 1889 Beitrag zur Anatomie der Schnecke. Anat. Anz. Bd. 4. 4) **Donaldson, H. H.** und **Nagasaka, G.**, 1918 On the increase in the diameters of nerve cell bodies and of the fibers arising from them, during the later phase of growth (Albino rat) Jour. Comp. Neur., Vol. 29. 5) **Gottstein, J.**, 1872 Über den feinen Bau und die Entwicklung der Gelbschnecke der Säugetiere und des Menschen. Arch. f. mikr. anat., Bd. 8. 6) **Jagito, K.**, 1914 Einige Experimente an dem Nervus petrosus superficialis major zur Bestimmung des Ursprungsgebietes des Nerven. Folia Nervi Biologica. Bd. 8. 7) **Kishii, J.**, 1902 Über den Verlauf und die periphere Endigung des Nervus cochleae. Arch. f. Anat., Bd. 59. 8) **Krause, F.**, 1906 Entwicklungsgeschichte des Gehörorgans. Handb. d. Entwicklungslehre der Wirbeltiere, Bd. 2, Teil 2, Jena. 9) **Leubhossek**, 1894 Das Ganglion geniculi nervi facialis und seine Verbindung. Beiträge zur Histologie des Nervensystems und des Sinnesorgane. 10) **Leubhossek**, 1907 Zur Kenntnis der Spinalganglienzellen. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 69. 11) **Nager, F. R.** und **Yoshii, U.**, 1910 Zur Kenntnis der cadaverösen Veränderungen des inneren Ohres. Ztschr. f. Ohrenh., Bd. 60. 12) **Nitono, K.**, 1920 On the growth of the neurons composing the Gasserian Ganglion of the albino rat, between birth and maturity. Jour. Comp. Neur., Vol. 32. 13) **Penzo**, 1893 Über das Ganglion geniculi und die mit denselben zusammenhängenden Nerven. Anat. Anz. Bd. 8. 14) **Reizius, G.**, 1880 Untersuchungen über die Nervenzellen der cerebrospinalen Ganglien und die übrigen peripheren Kopfganglien. Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abt. 15) **Reizius, G.**, 1881 Zur Entwicklung der Zellen des Ganglion spirale acustici und zur Endigungsweise des Gehörnerven bei den Säugetiere. Biolog. Untersuchungen Teil 6. 16) **Schwalbe, G.**, 1881 Anatomie des Menschen. II. Neurologie.
- 17) **Sugita, N.**, 1918 Comparative studies on the growth of the cerebral cortex. VI. On the increase in size and on the developmental changes of some nerve cells in the cerebral cortex of the albino rat during the growth of the brain. Jour. Comp. Neur., Vol. 29. 18)
- Tadokoro, K.** und **Watanabe, T.**, 1920 Experimentelle Untersuchungen über die vitale Fixation der cochlea. Ztschr. f. Oto-Rhino-und Laryngologie. (Japan) Bd. 27, H. 1/2. 19) **Takeda, T.**, 1924 Beiträge zur histologischen Kenntnis des Nervus trigeminus. Folia Anat. Jap. Bd. 2. 20) **Tokura, R.**, 1925 Untersuchung über den histologischen Bau des Ganglion geniculi und des Ganglion vestibulare. Ztschr. f. Oto-Rhino-und Laryngologie. (Japan) Bd. 31. 21) **Wada, T.**, 1923 Anatomical and physiological studies on the growth of the inner ear of the albino rat. The American anatomical Memoirs, No. 10. 22) **大橋誠**, 1929 家兔蝸牛殼生後ノ發育ニ就テノ解剖學的並ニ生理學的研究.

5). Das Körpergewicht bei demselben Alter ist von geringem Einfluss auf die Grösse des Zelleibs und des Kerns und ein körperschweres Tier hat ganz leicht einen grösseren Zelleib und Kern als ein körperleichteres.

6). Das Nukleus-Plasma-Verhältnis der Ganglienzellen ist bei der Geburt schon ziemlich gross, und nimmt schnell und regelmässig bis zur Zeit zu, in der der Zelleib die Maximalgrösse erreicht, nimmt dann in geringem Masse ab, um danach unverändert zu bleiben.

(Autoreferat.)

Ueber die sog. künstlichen Tanzmäuse.

Von

Dr. T. Kubo.

I. Experimentelle Untersuchungen über die Labyrinthfunktionen der sog. künstlichen Tanzmäuse.

Die verschiedenen Eigentümlichkeiten an der angeborenen Tanzmaus wurden schon vielfach untersucht, während die der sog. künstlichen Tanzmaus noch wenig untersucht wurden.

Im Jahre 1925 gelang es mir bei Mäusen durch Fütterung mit einem Gemisch von 3-Acet-amino-4-oxy-phenylarsinsäure und ungereinigtem Reis (im Verhältniss von 0.5 zu 100.0) die sog. künstlichen Tanzmäuse zu erzeugen, die sich wie die angeborenen Tanzmaus drehen.

Ich beschäftigte mich mit diesen Versuchstieren, um genauere Kenntnisse zu bekommen.

Die Ergebnisse sind folgend:

1. Alle normalen Mäuse, die mit dem oben beschriebenen Gemisch gefüttert werden, zeigen nach ungefähr 3 bis $3\frac{1}{2}$ Tagen deutlich ein eigentümliches Zittern des Kopfes und eigenartige Drehbewegungen.
2. Diese vergifteten Tieren halten und drehen sich im Kreise wie die angeborene Tanzmaus.
3. Das Hörvermögen erscheint etwas vermindert zu sein, aber es ist nicht aufgehoben.

Über die postnatale Entwicklung der Ganglienzellen des Ganglion geniculi von Kaninchen.

Von

Dr. Y. Kojima.

(Aus der oto rhino-laryngologischen Klinik der Kaiserlichen Universität
zu Sendai. Direktor: Prof. Dr. T. Wada).

Histo-anatomische Studien über das Ganglion geniculi, wenn auch darüber schon von Retzius, Lenhossék, Tokura und Endo etc. viel gearbeitet wurden, sind bis heute noch sehr dürftig, besonders über die postnatale Entwicklung desselben, wie über die anderer Hirnganglien. Verfasser untersuchte die Frage, wie und auf welche Weise die Grössenverhältnisse und die morphologischen Veränderungen der Ganglienzellen des Ganglion geniculi beim Kaninchen während seiner Entwicklung von der Geburt an bis zu 545. Lebenstage sind. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind folgende:

1). Das Ganglion geniculi besteht hauptsächlich aus den pseudounipolaren Ganglienzellen. Ausserdem werden auch noch bipolare sowie multipolare Zellen in ihm nachgewiesen. Die Zellen sind meistens rundlich oder polygonal geformt. Obwohl sie am Zelleib und am Kern gerade nach der Geburt ganz unreif sind, zeigen sie auffallend schnelle postnatale Entwicklung, so z.B. sind die Nisslschen Körperchen schon am dritten Tage nach der Geburt im Zelleib nachweisbar, und differenzieren sich mit der Zeit immer besser.

2). Der Durchmesser der Ganglienzellen beträgt am ersten Tage $23,4\mu$ für den Zelleib und $11,6\mu$ für den Kern und am 545. Tage $32,9\mu$ resp. $14,6\mu$. Am 50. Tage erreichen die Zellen die Maximalgrösse mit $34,5\mu$ am Zelleib, während der Kern am 25. Tage mit $15,1\mu$ am grössten ist. Danach nehmen sie an Grösse in ganz geringem Grade ab, bis sie dann in unverändertem Zustand bleiben. Aus obigen Befunden geht hervor, dass Kaninchen mit gut entwickelten Zellen im Ganglion geniculi zur Welt kommen.

3). Der Kern ist schon bei der Geburt relativ gross entwickelt, das Zu- und Abnahmeverhältnis desselben ist etwas kleiner als das der Zellen.

4). In Bezug auf das Geschlecht und die Seite finden wir keine besondere Differenz im Durchmesser des Zelleibes und des Kerns, wenn auch beim weiblichen Tier und an der linken Seite der Durchmesser leicht grösser ist als beim männlichen Tier und an der rechten Seite.