耳性化膿性腦膜炎聽器病理補遺

(兩側聽器脂肪ノ比較檢索)

Akira Osawa: Beiträge zur pathologischen Anatomie im Gehörorgan der Orogenen Meningitis.
(Über die Untersuchung der Fette beider menschlichen Gehörorgan.)

泉橋病院病理部 (主任 福士博士)

大 澤 朗

目 次

一. 緒 言	五. 結 論
二. 研究 方法	主 要 文 獻
三. 實 驗 例	附圖並ニ解説
四. 總括及ビ考案	

緒 言

耳性化膿性腦膜炎ニ於ケル聽器病理ニ關スル先輩諸氏ノ業績ハ極メテ多ク、其數枚舉ニ遑アラズ。即チ組織學的研究ニ於テハ殆ンド餘蘊無キノ感アリ。

然レ共、其顯微化學的研究ニ於テハ、文獻ヲ涉獵スルモ余ノ寡聞ニシテ未ダ業績ノ存スルアルヲ知ラズ。

余ハ曩ニ胎兒ヨリ老年ニ至ル人體聽器 120 例ヲ胎年齡順ニ檢索シ、之レニ出現スル脂肪質ニ就キテ詳細ニ發表セリ。(大日本耳鼻咽喉科會々報、第40卷、7、8號)。

而シテ既刊ノ研究發表ニ於テハ鼓膜、其他ニ損傷ナク、又臨牀的ニ耳疾患ノ無キモノヲ選ビ、胎年齡の並ニ各種疾患ニ依ル脂肪質ノ消長ヲ明ニセリ。今、茲ニ、耳性化膿性腦膜炎ニ據リテ死亡セシ人屍體聽器ノ脂肪質ヲ檢索セントスルハ、1 ツハ本病ニ於ケル聽器病理ノ補遺トシテ

意義異ナリタル興味アリ。1 ツハ曩ニ余ノ行ヘル『人體聽器脂肪ノ系統的研究』ニ於ケル當然ノ歸結タルベシ。幸ニ余ハ耳性化膿性腦膜炎ニテ死亡セシ人屍體 6 例ヨリ健、患兩側顳顚骨 12 個ヲ得タルヲ以テ、之レヲ氷結切片ニ作製シ是レニ由リテ病理組織學の變化ヲ追求シ、併ヒテ之レニ出現或ハ増加スル脂肪質ヲ比較檢索セントスルモノナリ。

研 究 方 法

採取セン材料ハ當泉橋病院耳鼻喉科ニ入院治療中、化膿性腦膜炎ヲ併發シテ死亡セシモノ 6 例ノ兩側顳顚骨 12 個ナリ。顳顚骨ノ鋸斷、固定、脱灰等ヲ型ノ如ク行ヒ、之レヲ「ゲラチン」包埋トシ、約 20 μ ノ比較的連續セル氷結切片ヲ得、之レヲ「ズダンⅢ」、「ヘマトキシリン」重複染色法ニ依リテ一般的組織檢査ト共ニ、之レニ沈着

スル脂肪質ヲ尋ネ、「ニールブラウ」,「ノイトラ
ルロート」染色,並ニチアチオ氏法,スミス・
ダイートリッヒ氏法,フイッセル氏法ヲ行ヒ
且ツ暗室ニ孤光燈ヲ用ヒテ其屈光性ヲ仔細ニ檢
シ,川村氏ノ脂肪物質群屬反應表ニ依リテ之レ
ヲ分類セリ。尙ホ第二次的「オスミーム酸」染色
法ヲ合併セ行ヘリ。

研究方法ニ於ケル詳細ハ囊ノ『人體聽器脂肪ノ
系統的研究』ニ記載セシヲ以テ茲ニ省略セリ。
實驗例ハ年少ノモノヨリ年長ノモノニ至ルノ順
次ニテ之レヲ記載ス。

實 驗 例

第1例 齋〇二〇,男,10歳,無職。

初 診 昭和6年4月10日。

既往症 今日ニ至ル迄概シテ健康ニシテ,著患ヲ知
ラズ。約1ヶ月前ヨリ右側耳ニ疼痛起リ,間モナク
耳漏アリ。約1週間前ヨリ再ビ激シキ耳痛及ビ頭痛
ヲ訴ヘ,惡寒ト共ニ日々ノ發熱 39°C ニ上昇セリト。
現 症 患側ニ於ケル外聽道上壁ハ瀰蔓性ニ腫脹,
發赤シ,鼓膜ノ中央ニ卵圓形ノ穿孔アリ。耳後部ニ
輕度ノ腫脹及ビ發赤アリ。胸鎖乳嚢筋ノ沿ヒテ索狀
硬結ヲ觸レ,耳後部ト共ニ壓痛アリ。

臨牀診斷 急性中耳炎並ニ乳嚢突起炎。

經 過 即日入院セシメ,乳嚢竇鑿開ヲ行フ。竇内
ニ粘稠ナル膿汁ノ滲溜アリ。竇周圍ニ於ケル多數ノ
蜂窠ハ肉芽ヲ以テ滿サル。鼓室内ヨリ又膿汁ノ排泄
アリ。廣ク蜂窠ヲ鑿開搔爬シ術ヲ終ル。

術後モ猶ホ體温ノ弛張アリ。間モ無ク急性肺炎ヲ併
發シ發熱 40°C ヲ稽留ス。同月15日嘔吐アリ。項強直
出現ス。次第ニ腦膜炎ノ諸症狀著明トナリ。同月25
日遂ニ鬼籍ニ入ル。

解剖診斷 化膿性腦膜炎,兩側肺炎,兩心室擴張,
傳染脾,腎臟瀰潤,腫脹並ニ鬱血,腸間膜淋巴腺腫
脹,扁桃腺肥大。

第1例健側聽器所見。

鼓 膜 一般ニ菲薄ニシテ組織的ニ著變ナシ。皮膚
層角化質ノ剝離片,「ズダンⅢ」ニ暗赤色ニ着染シ,

皮膚層内ニハ中等度ニ微細顆粒狀脂肪ノ沈着アリ。
固有層ハ「ズダンⅢ」ニ極メテ幽ニ淡黃赤色ニ着染
シ,粘膜炎内ニハ纖維間ニ極メテ僅少ノ微細脂肪顆
粒ノ沈着ヲ見ル。

鼓室粘膜炎並ニ鼓室腔 粘膜炎ニ肥厚ナシ。平坦ニ扁平
上皮ヲ蒙リ,下綫ハ纖維性ナリ。血管一般ニ怒張シ
且ツ血球充盈ス。上皮緣ニハ極メテ薄ク無造構ノ液
狀物附着シ,「ズダン」ニ淡赤色ニ着染ス。粘膜炎下
内ニ僅微ノ脂肪顆粒アリテ,疎散在性ニ存ス。又稀
ニ血管内血清ノ脂肪染色ニ應ズルモノアリ。鼓室腔
ハ一般ニ清澄ナレ共,粘膜炎緣ノ脂肪反應ヲ呈スル
液狀物ニ混ジ,僅ノ赤色,鈍重屈折性小滴狀脂肪又
ハ核並ニ細胞膜不明ノ脂肪顆粒細胞在リ。

中耳骨壁 僅カノ起伏アレ共,一般ニ骨緣平坦,且
ツ骨質緻密ナリ。骨細胞ノ赤色脂肪顆粒ヲ有スルモ
ノ疎ニ散在ス。

聽小骨 骨質緻密ニシテ著變ナシ。各關節部ニ廣ク
軟骨組織アリテ,細胞ハ圓形ニ膨大シ暈狀ニ脂肪沈
着スルモノ,並ニ細胞内ニハ選擇的ニ脂肪細滴ヲ抱
クアリ。

各聽小骨ハ殆ンド平等ニ骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ有スル
モノ疎ニ散在シ,其散在密度,中耳骨壁ノモノニ大
差ナシ。

聽小筋 鼓膜張筋ハ筋纖維ニ輕度ノ萎縮アリ。尙ホ
橫紋明ナリ。筋間並ニ筋膜ニハ稍ク多數ノ脂肪細胞
アリ。馬鐙骨筋モ亦略ク前者ニ同ジ。錐狀隆起附着
部腔内ニ,2,3ノ脂肪細胞存ス。

歐氏管 周圍粘膜炎短圓柱狀上皮細胞ノ整然タル並
列ヲ見ル。下織内ニハ稀ニ脂肪反應ヲ呈スル血清,
血管内ヲ滿ス。他ニ脂肪樣物質ナシ。管腔内清澄ナ
リ。

耳喇叭含氣蜂窠ハ細胞髓ヲ成シ,脂肪細胞散在ス。
乳嚢竇並ニ蜂窠 乳嚢部骨質發育良ク一般ニ緻密ナ
リ。蜂窠廣ク存シ,竇遠隔ノモノハ細胞髓ヲ滿シ,
又多數ノ脂肪細胞ヲ混ズ。竇粘膜炎並ニ其近隣ノ蜂窠
粘膜炎ニ著變ナク,廣キ含氣腔ヲ抱キ,含氣腔内ニハ
鼓室腔ニ認メタルガ如キ脂肪反應ヲ呈スル液狀物並
ニ黃赤色大小滴狀脂肪ノ僅少ヲ見ル。竇壁並ニ蜂窠
隔壁ニ於ケルハーベルス氏血管内血清ノ往々脂肪反
應ヲ呈スルモノヲ見ル他ハ骨基質,骨細胞等ノ脂肪
染色ニ應ズルモノナシ。

顏面神經管内並ニ膝狀神經節 骨管ニ缺損ナシ。管

内結締織ハ纖維性ニシテ粗ニ連ル。血管擴張シ多ク空虛ナリ。僅ニ1、2ノモノ脂肪反應ヲ呈スル血清ヲ藏スルモノアリ。顔面神經纖維ハ中等度ニ脂肪染色ニ應ジ。概シテ細キ絲瓜、胡瓜、自然薯狀ヲ呈シ。中等量ノ粗大「ミエリン」顆粒ヲ附着ス。

膝狀神經節細胞ハ原形質「ズダン」ニ暗褐色ニ着染シ。輪廓明ナル蝙蝠狀又ハ不定塊狀、金平糖狀等ヲ呈シ。核ハ殆ンド不明ナルカ。點狀ニ濃縮ス。細胞邊緣ニハ僅ノ「ミエリン」顆粒ノ飛散アリ。

前庭窓窩並ニ馬鐙骨板附近 附近粘膜ニ著變ナク。窓窩極メテ清澄ナリ。輪狀靱帶ハ狹隘ニシテ、纖維間ニ存スル極メテ僅ノ長卵圓形細胞内ニ微細脂肪顆粒ノ沈着アリ。關節軟骨トノ接合部ニハ又極メテ僅ノ微細赤色脂肪顆粒ノ沈着アリ。關節軟骨モ亦細胞内ニ脂肪顆粒ヲ有シ。基質「ズダン」ニ線狀ニ淡黄赤染ス。

馬鐙骨板ハ内半面ニ廣ク軟骨組織ヲ留メ。基質、石灰沈着良ク。細胞内ニハ選擇的ニ脂肪顆粒ヲ有ス。蝸牛殼窓窩並ニ第2鼓膜 附近粘膜ニ著變ナシ。同窓窩内ニハ脂肪反應ヲ呈スル液狀物ニ混ジ、大小滴狀脂肪稍ク多數集團ス。第2鼓膜ハ組織的ニ著變ナク、「ズダン」ニ一帯ニ極メテ淡ク無造構亦染シ。纖維間ニ微細脂肪顆粒ノ沈着アリ。第2鼓膜内面タル蝸牛殼第1迴轉外淋巴腔ハ清澄ナリ。

蝸牛迷路。蝸牛骨壁 骨質緻密ニシテ内骨膜性化骨層及ビ軟骨内化骨層間結合線密着シ。斷續的且ツ狹隘ナル纖維髓ヲ挟ミ、稍ク多クノ脂肪細胞ヲ容ル。骨質内ニハ骨細胞並ニ骨球ノ赤色脂肪顆粒ヲ有スルモノ各所ニ散在シ。特ニ軟骨内化骨層ヲ最トス。蝸牛殼内骨膜 纖維性且ツ一般ニ菲薄ニシテ脂肪質ナシ。

蝸牛殼外淋巴腔 清澄ナリ。

前庭膜 暗褐色ニ潤濁シ細胞ノ形態認メ得ラレズ。

屑零樣赤色脂肪顆粒ノ附着アリ。

蝸牛殼管 管内一般ニ清澄ナリ。

骨性螺旋板並ニ螺旋神經 螺旋骨板ハ「ヘマトキシリン」ニ淡染シ。結締織内ニ數多ノ色素細胞ヲ認ムル他ニ特種ノモノヲ見ズ。螺旋神經纖維ハ赤褐色ニ好染シ。多ク纖維癒合シ附近ニ中等量ノ微細「ミエリン」顆粒ヲ飛散ス。

コルチ器 前庭屑僅カニ形骸ヲ留メ。諸細胞ハ崩壞果實シ。暗赤褐色ニ着染ス。前庭屑上皮細胞ノ形態

殆ンド明ナラズ。管内ニ僅ノ脂肪顆粒ノ沈着アリ。

基礎膜ハ無造構ヲ呈シ。脂肪沈着ナシ。

クラウザウス。外溝上細胞。螺旋隆起。脈絡帶等一樣ニ崩壞融合シ暗赤褐色ニ着染ス。細胞ノ形態全ク不明ナリ。クラウザウス細胞。外溝上細胞邊ト覺シキ組織崩壞物中ニ僅カノ赤色脂肪顆粒ヲ認ムル共。其所屬細胞判明セズ。

螺旋靱帶 靱帶萎縮シ。尙ホ纖維ハ粗網格狀ニ連ル。脂肪質ヲ認メズ。

骨軸 骨軸骨質ハ「ヘマトキシリン」ニ淡青染シ骨細胞ノ微ニ赤色脂肪顆粒ヲ有スルモノ散在ス。色素細胞ハ中等度ニ存シ。骨軸縱管内ニハ數個ノ脂肪顆粒細胞アリ。蝸牛殼神經纖維ハ着染良ク。不定型ノ大小連珠ヲ呈シ極メテ多數ノ「ミエリン」顆粒ヲ飛散ス。

螺旋神經節細胞 圓形。卵圓形ヲ呈シ。原形質ハ高度ノ圓形收縮ヲ來シ。暗灰褐色顆粒狀ヲ呈ス。核全ク不明ナリ。附近ニ「ミエリン」顆粒ノ飛散多シ。

前庭迷路。前庭骨壁 骨質緻密ニシテ蝸牛骨壁ニ準ズ。骨細胞ノ脂肪沈着スルモノ。内骨膜性化骨層ニ多ク密集シ。遠心性ニ疎トナル。輪狀靱帶ニ近ク小ナル軟骨殘留アリ。軟骨細胞ハ圓形ニ膨大シ箇々ニ暈狀又ハ核邊緣ニ顆粒狀脂肪沈着アリ。

前庭内骨膜 一般ニ菲薄ニシテ骨壁ニ密着ス。馬鐙骨板内面ト被覆スルモノハ、一帯ニ暗赤色無造構ニ脂肪沈着シ。他部一般的ノモノハ極メテ僅微ノ赤色脂肪顆粒ノ纖維間ニ存スルモノヲ見ルモノアリ。

外淋巴腔及ビ周圍結締織 外淋巴腔内圍幾ハ殆ンド崩壞シ。融合或ハ飛散ス。外淋巴腔内ニハ之等屑零樣物質ト共ニ。僅ノ脂肪細滴ノ浮漂アリ。

膜樣前庭壁 硝子樣膜ノミヲ留メ他ハ崩壞融合シ。組織崩壞物中僅ノ屑零樣脂肪滴ヲ混ズ。

前庭内淋巴腔 一般ニ清澄ナリ。

聽斑 聽石膜ヲ認メ得ズ。神經上皮ハ一帯ニ融合シ暗赤褐色ニ着染シ。基礎膜ハ殆ド無色硝子樣ヲ呈シ狹隘ナル1線ヲ劃ス。基質結締織内ニハ2、3ノ崩壞ニ依ル空洞アリ。基質内ヲ走行スル神經纖維ハ赤褐色。自然薯、胡瓜、王瓜狀ヲ呈シ。附近基質内ニ多數ノ「ミエリン」顆粒飛散ス。

三半規管 總テノ組織的並ニ脂肪所見ハ前庭迷路ニ準ズ。

聽櫛 「クプラ」ノ存在ヲ見ズ。他ノ所見總テ聽斑

ニ類ス。

前庭導水管並内淋巴囊 上皮細胞ノ形態判然セズ。一様ニ脂肪反應ニ應ジ淡赤褐色ヲ呈ス。他ニ脂肪沈着ヲ見ズ。管、囊内ニ僅ノ出血アリ。間織内ニハ結締細胞ノ微細脂肪顆粒ヲ有スルモノ並ニ纖維間ニ形態崩レタル脂肪顆粒細胞僅ニ存ス。

内聽道 間織内血管ノ怒張アリ。纖維間ニ往々微細脂肪顆粒ノ沈着アリ。内聽道内ニ膿球飛散シ。僅ノモノ赤色脂肪顆粒ヲ有ス。神經纖維ハ總テ着染ヨク胡瓜、王瓜、或ハ自然薯狀ヲ呈シ。一般ニ細ク、多數ノ粗大「ミエリン」顆粒ノ飛散スルアリ。

前庭神經節細胞 圓形、梨子狀、或ハ卵圓形ヲ呈シ原形質ハ、中等度ノ圓形收縮ヲ來シ暗紫顆粒狀ヲナス。核、中心核共ニ認メ得ラレルモ、輪廓臃ニ萎縮ス。總テノ原形質内ニハ赤褐色ニ着染シ。半月狀ニ偏在スル僅少宛ノ脂肪顆粒ヲ見ル。

第1例患側聽器所見。

鼓膜 鼓膜ハ一帯ニ肥厚シ穿孔緣ハ棍棒狀ニ腫大ス。皮膚層ニ著變ナク、脂肪顆粒ノ沈着モ亦殆ンド健側ニ同ジ。固有層ハ所々斷續シ、増殖セル結締織之レヲ遮ギリ、同層ニ於ケル無造構脂肪沈着ハ其染度殆ンド健側ニ同ジ。粘層ノ肥厚、増殖アリテ極メテ鬆粗ナリ。充盈血管多ク管内ニ脂肪反應ヲ呈セル血清ヲ容ルルモノアリ。結締織細胞ノ脂肪沈着、並ニ脂肪顆粒細胞散在ス。

鼓室粘膜炎並ニ鼓室腔 腔内ニハ索狀、橋梁狀、乳嘴狀等ヲ呈シ、鬆粗結締織ノ増殖アリテ所々ニ不定型ノ空洞ヲ構成シ、充盈血管ニ富ム。一定セル上皮細胞ヲ見ズ。膿球果積シテ上皮ヲ被覆ス。膿球内ニハ選擇的ニ赤色脂肪顆粒ノ沈着アリ。結締織内ニモ染色不良ノ圓形細胞極メテ多ク、脂肪顆粒細胞並ニ結締織原細胞ノ脂肪沈着アリ。往々又血管内ニ脂肪反應ヲ呈スル血清ヲ容ル。鼓室内ニハ、脂肪反應ヲ呈スル膿液、纖維素ノ滲出アリ。膿球多數之ニ混ズ。又多數ノモノノ脂肪顆粒ヲ攝ル。

中耳骨壁 所見總テ健側ノモノニ同ジ。

聽小骨 槌骨、砧骨ヲ缺除ス。馬鐙骨ハ周緣並ニ兩脚間、鬆粗結締織ニヨリ埋メラル。骨質所見殆ンド健側ノモノニ異ナルナシ。

聽小筋 鼓膜張筋ハ纖維ハ健側ノモノニ比シ輕度ノ凋凋アリ。筋間、筋膜ニ存スル脂肪細胞ノ數量ニ大差ナシ。馬鐙骨筋々纖維又同ジ。周圍結締織ニ脂肪

質ナシ。

歐氏管 周圍粘膜炎ノ肥厚アリ。上皮細胞ノ排列極メテ亂レ管内ニハ多數ノ膿球集積ス。脂肪所見ハ總テ鼓室粘膜炎並ニ鼓室腔ニ一致ス。

耳喇叭含氣蜂窠内所見 健側ノモノニ同ジ。

乳嘴實並ニ蜂窠 蜂窠ハ美麗ニ鑿除セラレ、骨壁ニハ厚キ肉芽之レヲ覆フ。肉芽組織ハ極メテ鬆粗ナル結締組織ニシテ、所々ニ小空洞ヲ構成シ、充盈血管、大小ノ圓形細胞ニ富ム。特ニ上緣ニハ、圓形細胞ノ赤色脂肪顆粒ヲ有スルモノ一帯ニ密集シ、又所々ニ形態大ナル紡錘狀細胞ノ脂肪沈着アリ。骨緣ニハ多數ノ造骨細胞並列シ、往々赤色脂肪顆粒ヲ沈着スルモノアリ。骨質ハ邊緣ヨリ「ズダンⅢ」ニ淡黃赤色無造構ニ着染スル所多シ。骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ有スルモノハ極メテ稀ニ存スルヲ見ルノミ。

顔面神經管内並ニ膝狀神經節 骨管ニ缺損ナシ。結締織内血管極メテ怒張シ、且ツ白血球並ニ脂肪反應ヲ呈スル血清充盈ス。

顔面神經纖維 着染良ク、長短ヲ異ニスル自然薯、胡瓜、或ハ王瓜狀ヲ呈シ、多數ノ粗大「ミエリン」顆粒ヲ飛散ス。「ミエリン」顆粒ノ數量ハ健側ノ夫レニ比シ、特ニ多キヲ認メズ。

膝狀神經節細胞 原形質ノ暗褐色、蝙蝠狀又ハ金平糖狀ヲ呈スルモノ多ク、核、中心核ハ幽カニ認メ得ラレ萎縮シテ光輝ヲ發ス。細胞周緣ニ於ケル「ミエリン」顆粒ノ數量、又健側ニ大差ナシ。

前庭窓窩並ニ馬鐙骨板附近 窓窩並ニ馬鐙骨板附近一帯ハ、鬆粗結締織ヲ以テ埋メラル。其組織的並ニ脂肪所見ハ鼓室内一般的ノ粘膜炎或ハ實附近ニ於ケル夫レニ一致ス。

輪狀韌帶、關節軟骨、馬鐙骨板等ニ於ケル組織的並ニ脂肪所見モ亦健側ノ夫レニ大差ナシ。

蝸牛殼窓窩並ニ第2鼓膜 窓窩粘膜炎ハ健側ニ比シ僅ニ肥厚ス。誰、窓窩中央ニ數個ノ小橋梁ヲ以テ連ル島嶼狀鬆粗結締織ノ増殖アリ。僅ノ脂肪細胞並ニ脂肪顆粒細胞及ビ脂肪顆粒ノ沈着セル結締織細胞アリ。狹隘ナル小窩内ニハ赤色脂肪顆粒ヲ沈着セル膿球飛散ス。

第2鼓膜 外面ニ浮腫狀ヲ呈セル圓形細胞ノ顆粒狀ヲ呈スル薄キ肉芽、之レヲ覆ヒ、數個ノ脂肪顆粒細胞、其中ニ存ス。第2鼓膜固有層ニ著變ナク、纖維間ニ於ケル脂肪顆粒並ニ無造構脂肪沈着モ亦健側ニ

類似ス。第2鼓膜内面ナル外淋巴腔ハ清澄ナリ。
蝸牛迷路。蝸牛骨壁 總テノ組織的並ニ脂肪所見。
 健側ニ異ナル所ナシ。蝸牛殻内骨膜。外淋巴腔。前庭膜。蝸牛殼管。骨性螺旋板並ニ螺旋神經等ノ所見モ亦。健側ノモノニ同ジ。

コルチ器 前庭唇ニ空胞形成アリテ水腫狀ヲ呈ス。微細脂肪顆粒ノ沈着ハ。其量並ニ性状ニ於テ健側ニ異ナル所ナシ。内溝上細胞融合シ。僅ノ脂肪細滴ノ存スルヲ認ム。コルチ氏膜ハ極メテ扁平ニ萎縮シ。硝子様ヲ呈ス。其他。内有毛細胞ヨリヘンセン氏細胞ニ至ル迄。總テ崩壞果積シ赤褐色ニ着染シ。多數ノ脂肪様並ニ「ミエリン」像顆粒ヲ混ズレ共。其屬籍ヲ明言シ得ズ。基礎膜。クラウザウス細胞。外溝上細胞。螺旋隆起。脈絡帶等ニ於ケル所見モ亦。健側ニ同ジ。

螺旋靱帶 靱帶ニ於ケル結締組織僅ニ崩レ。粗網狀ヲ呈シ。空洞ヲ構成スル所アリ。染色不良ニシテ萎縮セル圓形細胞之レニ懸連シ。粗大脂肪顆粒僅ニ飛散ス。骨軸 組織的構造ハ健側ノモノニ同ジ。骨細胞ノ脂肪沈着。管腔内ニ數個ノ脂肪顆粒細胞ノ存在並ニ螺旋神經纖維ノ「ミエリン」像。同「ミエリン」顆粒。色素細胞等ノ數量。螺旋神經節細胞ノ形態及ビ脂肪所見等モ亦健側ニ一致ス。

前庭迷路。前庭骨壁 骨壁骨質緻密ニシテ蝸牛骨壁ニ準ジ。且ツ組織的ニ健側前庭骨壁ニ類ス。前庭窩附近ニ於テ輪狀靱帶ニ近ク健側ニ認メタルト殆ンド同一部位ニ軟骨殘留アリ。脂肪所見モ亦。總テ健側ノモノニ同ジ。

前庭内骨膜 外淋巴腔並ニ内圍織。膜像前庭壁及ビ内淋巴腔等ノ組織的並ニ脂肪所見ハ又健側ニ同ジ。聽斑。聽鞘。半規管所見モ亦。健側ニ大差ナシ。前庭導水管並ニ内淋巴囊 管。囊内清澄ナリ。上皮一帯ニ濁濁ス。圍織内ニ粗大脂肪顆粒僅ニ散在ス。内聽道 内聽道内並ニ圍織所見ハ殆ンド健側ニ異ナラズ。神經纖維ノ「ミエリン」像。並ニ染色又等シク中等量ノ「ミエリン」顆粒ヲ飛散ス。

前庭神經節細胞 モ亦健側ニ同ジ。細胞内ニ於ケル脂肪顆粒ノ性状並ニ沈着量モ亦健。患側ニ依ル差異ヲ認メズ。

傳染徑路。本例ニ於ケル化膿性腦膜炎ノ傳染徑路ヲ尋ヌルニ。聽器ノ組織的檢索ニ於テハ的確ナル徑路ヲ發見シ得ズ。然レ共既往症或ハ經過ヨリ之レヲ觀

レバ血行ヲ介シテノ頭蓋腔内傳染ト推定シ得ラルルモノアリ。不幸ニシテ血液内細菌ノ培養試験等ノ結果ヲ聞キ得ザリシヲ遺憾トス。

第2例 三〇吉〇。男。14歳。勞働者。

初診 昭和6年5月4日。

既往症 4年前ヨリ右側耳漏アリ。1週間前ヨリ耳痛著シク且ツ耳漏多量トナレリ。5日前ニ耳後部ノ腫脹發赤ヲ來ス。

現症 右(患)側鼓膜ハ輕度ニ發赤シ且ツ腫脹ス。鼓膜中央ニ大ナル穿孔アリテ肉芽發生アリ。耳殼附着部ヨリ乳嚢部ニ懸ケ瀰蔓性腫脹アリテ耳殼離開ス。右側顔面神經麻痺アリ。左(健)側鼓膜ニ輕度ノ陷凹アル他。著變ナシ。

臨牀診斷 右側慢性中耳炎。並ニ急性乳嚢突起炎。經過 即日入院セシメ鑿開手術ヲ行フ。骨面ニ瘻孔アリ。竇並ニ蜂窠ハ粘附ナル膿汁並ニ肉芽ニテ充サレ。蜂窠隔壁ノ融合アリ。手術後一時輕快ヲ見タルモ數日後ニ嘔吐。意識濁濁ヲ來シ。項強直。膝蓋腱反射ノ亢進ヲ來シ腦膜炎ノ諸症狀發來ス。同月16日遂ニ鬼籍ニ入ル。

解剖診斷 右側顳額葉部ノ膿瘍。兩側纖維性肋膜炎。胸腺肥大。肺水腫。肝。脾。腎臟濁濁及ビ鬱血。加答兒性腎臟炎。

第2例健側聽器所見。

鼓膜 輕度ノ肥厚アリ。皮膚層ハ「ヘマトキシリン」ニ淡染セル顆粒狀ヲ呈シ。細胞形態不明ニシテ。僅ノ赤色脂肪顆粒ノ沈着アリ。固有層ハ槌骨臂並ニ柄兩側ノ一部ノミ淡ク無造構ノ脂肪沈着アリ。粘膜層ニ輕度ノ肥厚アリテ萎縮セル骰子形上皮細胞其内面ヲ覆ヒ。下織内ニハ小塊狀ヲ呈シテ散在スル赤色脂肪顆粒僅ニ存在ス。鼓膜内血管ハ擴張シ脂肪反應ヲ呈スル血清ヲ滿ス。

鼓室粘膜並ニ鼓室腔 粘膜ハ下織。纖維性ニシテ單層小骰子形上皮細胞平坦ニ並列シ之レヲ被覆ス。組織的ニ著變ナク。纖維間ニ極メテ稀ニ脂肪細滴ヲ認メ。總テノ血管内血清ハ脂肪染色ニ應ズ。鼓室腔ハ一般ニ清澄ナレ共。深キ壁龕等ニハ融合セル脂肪質アリ。

中耳骨壁 骨緣一般ニ平坦ニシテ骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ有スルモノ稍ク多數存ス。

聽小骨 組織的ニ著變ナシ。骨質緻密ニシテ各關節部ニノミ狹隘ナル軟骨組織アリ。軟骨細胞内ニハ選

擇的ニ、骨細胞ハ多數ノモノニ脂肪沈着アリ。

聽小筋 鼓膜張筋ニ著變ナク、筋間、筋膜ニハ極メテ多數ノ脂肪細胞集合ス。馬鐙骨筋々纖維ニ僅ノ潤濁アリ。又多數ノ筋纖維内ニハ選擇的ニ微細赤色脂肪顆粒ノ沈着アリ。周圍結締織内ニハ脂肪質ナシ。**歐氏管** 歐氏管粘膜ニモ亦著變ナシ。脂肪質殆ンド無ク、唯血管内ニ脂肪染色ニ應ズル血清ヲ見ルノミ。

耳喇叭含氣蜂窠 骨髄細胞ヲ滿シ、脂肪細胞多數之ニ混ジ、極メテ美麗ナリ。

乳嚢竇並ニ蜂窠 竇廣潤ニシテ粘膜菲薄、纖維性ナリ。蜂窠ハ極メテ廣ク存シ、迷路骨壁ヲ上下方ニ繞リテ前方、耳喇叭含氣蜂窠ニ連續シ總テ清澄ナル含氣腔ヲ有ス。竇並ニ蜂窠粘膜ハ殆ンド鼓室粘膜ニ類似ス。唯ダ僅ニ下織内ニ赤色粗大脂肪顆粒ノ増加アルヲ見ルノミ。血管内血清ノ脂肪反應ヲ呈スルモノ存スルモ亦同ジ。竇並ニ蜂窠隔壁骨質内ニハ極メテ僅少ノ脂肪顆粒ヲ有スル骨細胞稀ニ存ス。

顏面神經管內並ニ膝狀神經節 神經骨管ニ缺損ナシ。管内結締織ハ細纖維性ニシテ脂肪質ナシ。唯並走セル血管ハ擴張シ脂肪反應ヲ呈スル血清ヲ入ル。顏面神經纖維ハ着染良ク、球狀、王瓜、胡瓜狀ヲ呈シ、中等量ノ「ミエリン」顆粒ノ飛散アリ。

膝狀神經節細胞 多ク圓形ニシテ、原形質ハ中等度ノ周圍隙ヲ有スル星芒狀、金平糖狀ニ收縮シ、「ヘマトキシリン」ニ淡染シ、核素融解スルモノ並ニ原形質「ズダン」ニ反應シ暗赤褐色ニ着染シ、核高度ノ濃縮ヲ來セルモノト等分ニ存シ、2、3ノ細胞内ニ赤褐色微細脂肪顆粒ノ沈着アリ。

前庭窓窩及ビ馬鐙骨板附近 附近粘膜ハ極メテ菲薄ニシテ一般の鼓室粘膜ニ類ス。

輪狀靱帶ハ極メテ細纖維、斜走シ軟骨縁ノモノ纖維狀ヲ呈シテ齒カニ無造構脂肪沈着アリ。**關節軟骨**モ亦靱帶縁ノモノヨリ、顯著ニ脂肪沈着アリ。

馬鐙骨板ハ内面ニ廣ク軟骨組織ヲ留メ軟骨細胞内ニハ殆ンド個々ニ核邊緣ニ微量ノ脂肪顆粒沈着ス。骨細胞モ亦脂肪沈着アリ。

蝸牛殼窓窩並ニ第2鼓膜 窓窩周圍粘膜ニ肥厚ナシ。僅ノ狹長ナル索狀物アリ。

組織的並ニ脂肪所見ハ一般的ノモノニ類ス。小窩内ニハ、赤色小脂肪滴、僅ニ散亂ス。第2鼓膜ハ纖維組織縱走シ、一帯ニ淡ク無造構脂肪沈着アリ。纖維

間ニモ亦、僅ノ微細脂肪顆粒ノ沈着ヲ見ル。**蝸牛殼外淋巴腔内**ニハ第2鼓膜ニ附着シ、暗紫褐色雲霧物ノ附着アリ。

蝸牛迷路 蝸牛骨壁 骨質緻密ニシテ各骨層ノ結合線相交ハリ劃然タル境界ヲ見ル能ハザル所アリ。軟骨内化骨層ニハ球間腔多シ。頭蓋腔側並ニ内聽道入口部周壁ヲ除キテハ、骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ有スルモノ各所ニ散在シ、骨管内ニモ亦連鎖狀ニ沈着ス。骨球ハ原形質ノ暈狀ニ或ハ又顆粒狀脂肪ノ核邊緣ニ顯著ニ沈着スルヲ見ル。

蝸牛殼内骨膜 菲薄ニシテ著變ナシ。極メテ稀ニ結締織細胞ノ脂肪沈着ヲ見ルノミ。

外淋巴腔 周圍組織ニ密着シ幕狀ニ之レヲ繞ル淋巴液僅ニ存シ、「ズダンⅢ」ニ暗黃褐色ニ着染ス。他ニ著變ナシ。

前庭膜 顆粒狀ニ潤濁弛緩シ、對岸組織上ニ密着シ組織的構造全ク不明ナリ。特ニ脂肪樣物質ナシ。

蝸牛殼管 各迴轉ノモノ總テ前庭膜ノ弛緩ニヨリテ腔隙ナシ。

骨性螺旋板及ビ螺旋神經 螺旋板内ニハ多數ノ色素細胞アリ。結締織ハ極メテ潤濁ス。附近ニ脂肪質ヲ認メズ。螺旋神經纖維ハ着染ヨク、不規則ナル絞斷ヲ生ジ粗滴狀ヨリ、細カキ胡瓜又ハ自然蓇狀ヲ呈シ中等量ノ「ミエリン」顆粒ヲ飛散ス。

コルチ器 總テ極度ニ崩壞シ、融合萎縮シ暗黃褐色ニ着染ス。

基礎膜 螺旋靱帶部ニ於ケルモノノミ硝子樣ヲ呈シ「ズダン」ニ淡赤染シ他部ノモノハ一般ニ不明ナリ。

クラウヂウス細胞、**外溝上細胞**等ハ融合萎縮シ、赤色脂肪小滴ノ混入ヲ見ル所アレ共、其屬籍直載シ難ク、螺旋隆起ハ緩キ小起伏ヲ呈スレドモ、脈絡帶ト共ニ細胞ノ融合ヲ來シ載積シ、一帯ニ暗黃褐色ヲ呈ス。

螺旋靱帶 結締織萎縮シ粗網狀ヲ呈ス。網格内ニハ2、3ノ硝子樣ヲ呈セル「プラスマ」細胞アリ。極メテ僅微ノ脂肪顆粒之レニ沈着ス。

骨軸 骨質ノ發育、石灰沈着良シ。骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ攝ルモノ多シ。骨軸管内血管ハ總テ高度ノ擴張ヲ來シ、赤血球ノ充盈アリ。骨軸基底ニ近キ縱管内ニ出血アリ。又血管内血清、脂肪染色ニ應ズ。又所々ニ硝子樣「プラスマ」細胞多ク散在シ、僅ニ脂肪顆粒ヲ攝ルモノアリ。色素細胞又多數散在ス。

蝸牛殼神經纖維 着染良ク、一般ニ細ク、多数ノ絞挫ヲ生ジ。胡瓜、自然薯狀又ハ球狀ニ切レ、多量ノ「ミエリン」顆粒ヲ飛散ス。螺旋神經節細胞ハ不正圓形、梨子狀ヲ呈シ、原形質ハ高度ノ圓形收縮ヲ來シ、暗黃色微顆粒狀ヲ呈シ核、中心核ヲ見ズ。約 $\frac{1}{3}$ ニ於ケル細胞原形質中ニ無染色標本ニ於テモ認メ得ラレ「ズダン」ニ黃褐色ニ着染スル粗大脂肪顆粒ノ沈着ヲ認ム。細胞周縁ニモ亦、僅ノ「ミエリン」細滴ノ飛散アリ。

前庭迷路。前庭骨壁 骨質緻密ナリ。組織の所見ハ蝸牛骨壁ニ類シ。骨細胞ノ脂肪沈着セルモノハ一般的ニ存スレ共、内骨膜性化骨層内縁ニ密集シ、遠心性ニ疎トナル。

前庭内骨膜 組織的ニ著變ナシ。馬鐙骨板内面ヲ被覆セルモノ、並ニ前方ハ正圓囊聽斑附近ニ懸ケ。後側ハ後半規管蓋部ニ懸ケ。中等度ノ無造構脂肪沈着アリ。

外淋巴腔並ニ内圍綫 周圍結締織ハ殆ンド崩壊消失シ。僅ニ浮腫狀ヲ呈セル僅少ヲ留ム。前庭内骨膜又ハ膜様前庭壁ニ附着シ硝子樣ヲ呈セル「プラスマ」細胞多シ。極メテ僅微ノ赤色脂肪顆粒ヲ有スルモノアリ。

膜様前庭壁 壁ノ組織的構造崩レ硝子樣基礎膜ヲ挟ミテ上皮及ヒ結締織層ハ顆粒狀ヲ呈シテ密着シ暗赤褐色ニ着染ス。硝子樣膜モ亦「ズダン」ニ據リ淡キ暗赤色無造構ニ着染セラル。壁内面ニ附着シ内淋巴腔内ニハ淡黃褐色ニ着染スル淋巴液、内面一帯ヲ圍繞ス。

聽斑 聽石膜存セズ。神經上皮ハ崩壊シ暗赤褐色ニ着染シ融合載積ス。淡赤色ニ着染セル硝子樣基礎膜ヲ齒カニ認メ、基質結締織ハ浮腫狀ヲ呈シ、稍々多数ノ硝子樣「プラスマ」細胞アリ。稀ニ僅ノ脂肪顆粒ヲ有スルモノアリ。神經纖維ハ色褪セタル細キ自然薯又ハ韭狀ヲ呈シ「ミリン」顆粒多量飛散ス。

三半規管 總テノ所見、前庭迷路ニ同ジ。

聽櫛 「クプラ」ハ極メテ縮小シ、宛然熱氣ニ蠟ノ溶解セントスルガ如キ狀ヲ呈シ基底ナル骰子狀細胞上皮上面ニ垂下シ「ズダン」ニ暗赤色無造構ヲ呈ス。爾餘ノ諸所見ハ總テ聽斑ニ類ス。

前庭導水管並ニ内淋巴囊 周圍結締織網格内ニ硝子樣「プラスマ」球ヲ見ルモノアリ。圍綫ハ一般ニ纖維性ニシテ遠キ骨緣ハ淡黃赤色無造構ニ脂肪沈着ヲ見

ル所アリ。又僅ノ粗大脂肪顆粒ノ散在性沈着並ニ稀ニ「プラスマ」球ノ之ヲ攝レルモノ存ス。上皮ハ細胞融合、且ツ洞洞シ往々赤色脂肪顆粒僅ニ沈着ス。管並ニ囊内ニハ蝸牛、前庭迷路内外淋巴腔等ニ認メタルガ如キ脂肪反應ヲ呈スル淋巴液ノ滯留ヲ見ル。

内聽道 内聽道周圍結締織ハ纖維性ニシテ部分的肥厚アリ。血管ハ總テ炎症充血ヲ伴フ。結締織細胞ノ脂肪沈着、並ニ其纖維間ニ著明ノ赤色粗大脂肪顆粒ノ介在ヲ見ル。内聽道内ニハ各神經幹ヲ埋メテ無數ノ膿球之ヲ満ス。膿球ハ暗褐色汚穢顆粒狀ヲ呈セル大小ノ圓形細胞ニシテ、多数集積シ且ツ多クノ纖維組織狀ヲ呈セル纖維素、網狀ニ其間ヲ縫フ。膿球中ニハ粗顆粒狀ノ赤色脂肪ヲ沈着スルモノ多シ。尙ホ内聽道底部ニ位シ其周圍結締織ニ包マレタル1、2ノ濃粉樣小體ノ存在ヲ見ル。該小體ハ「ヘマトキシリン」ニ環狀ニ濃染シ直徑約40 μ 内外ヲ算スル梨子狀ヲ呈シ、脂肪沈着ナシ。神經纖維ハ着染良ク、聽神經並ニ前庭神經纖維共ニ起伏多キ自然薯、胡瓜、又ハ韭狀ヲ呈シ中等量ノ粗大「ミエリン」顆粒ヲ產出ス。特ニ空泡等ヲ有スルモノヲ見ズ。

前庭神經節細胞 卵圓形ニシテ原形質ハ中等度ノ圓形收縮ヲ來シ、淡青色微顆粒狀ヲ呈ス。核、中心核ハ尙ホ明ニ認メ得ラル、モ、極メテ縮小シ、核素融解シ光輝ヲ發ス。殆ンド總テノ細胞原形質内ニハ顯著ニ赤褐色脂肪顆粒ノ沈着アリ。細胞周縁ニモ亦、往々小脂肪顆粒細胞ヲ認ム。

第2例患側聽器所見。

鼓膜 固有層萎縮シ、皮膚層ニ粘膜炎ノ肥厚アリ。皮膚層ハ下縁ノモノ、細胞極メテ大ニシテ核明ニ存シ細胞ノ形態明カナリ。細胞原形質内ニハ核邊緣ニ顯著ノ黃赤色脂肪顆粒ノ沈着アリ。固有層ハ健側ノモノニ比シ極メテ狹隘ニシテ紆曲ス。其ノ脂肪染色ニ依ル染度ニ大差ナシ。粘膜炎ハ最も厚ク棍棒狀ヲ呈スル穿孔端外縁ヨリ内面一帯ヲ覆ヒ血管ニ富ミ且ツ充盈ス。粘膜上皮細胞判然セズ。結締織内ニハ多数ノ粗大脂肪顆粒、散在性ニ沈着シ、組織球性脂肪顆粒細胞、紡錘狀細胞ノ脂肪沈着等極メテ顯著ナリ。

鼓室粘膜並ニ鼓室腔 鼓室粘膜ハ高度ニ肥厚シ大小不規則ナル空洞並ニ充盈血管ニ富メル鬆粗結締織ニシテ一定セル上皮細胞ヲ見ズ。結締織細胞ノ脂肪沈

着並ニ脂肪顆粒細胞極メテ多ク。又往々血管内血清ノ脂肪反應ヲ呈スルヲ見ル。鼓室腔極メテ狹隘ニシテ滲出物ノ脂肪染色ニ應ズルモノ有ル他ニ。顆粒狀。小滴狀ヲ呈スル脂肪質中等度ニ飛散ス。

中耳骨壁 殆ンド總テノ所見ハ健側耳ノモノニ大差ナシ。

聽小骨 三聽小骨ニ缺損ナシ。骨質總テ緻密ニシテ。各關節部軟骨ハ細胞内ニ脂肪顆粒ヲ有スルモノ多ク。骨細胞モ亦。多ク之ヲ沈着ス。周圍粘膜ハ肥厚シ脂肪所見ハ鼓室粘膜ニ類ス。他ハ健側耳聽小骨ニ異ナル所ナシ。

聽小筋 鼓膜張筋筋纖維ハ微顆粒狀ニ潤濁シ。連珠狀或ハ瘤狀腫脹ヲ來セルモノ多シ。筋纖維ノ脂肪沈着ヲ見ズ。筋間。筋膜ノ脂肪細胞又多ク且ツ健側耳ノ夫レニ匹敵ス。馬鐙骨筋々纖維ニ著變ナク。又周圍結締織内ニ數個ノ脂肪細胞散在スル他。特記スベキモノナシ。

歐氏管 周圍粘膜ニ中等度ノ肥厚アリ。上皮細胞排列亂レ赤色粗大脂肪顆粒ノ沈着アリ。下織内ニモ亦多數ノ脂肪質アリテ鼓室粘膜ニ類ス。歐氏管内所見又鼓室腔ニ同ジ。

耳喇叭含氣蜂窠 極メテ廣範ニ存シ一帯ニ亘リテ炎症ノ波及アリ。鼓室並ニ歐氏管粘膜ニ認メタル同様ナル鬆粗結締織。蜂窠内ヲ埋メ小圓形細胞。「プラスマ」細胞極メテ多ク血管ノ炎性充血アリ。極メテ多クノ赤色脂肪顆粒細胞。並ニ紡錘狀細胞ノ脂肪顆粒ヲ含ムモノアリ。健側ニ於テ多數存セシ脂肪細胞ハ寧ろ極減シ且ツ萎縮セリ。

乳嘴實並ニ蜂窠 肉芽ハ浮腫狀ニ腫脹セル極メテ厚キ鬆粗結締織ニシテ充盈血管ニ富ミ。又圓形細胞ノ浸潤アリ。上縁ヨリ極メテ顯著ニ多クノ脂肪顆粒細胞並ニ脂肪沈着セル紡錘狀。星芒狀細胞アリ。又血管内血清ノ脂肪染色ニ應ズルモノ多シ。手術ニ依リテ鑿開。撫爬セラレタル骨緣ハ小丘隆狀又ハ珊瑚狀起伏ヲ成シテ著明ノ骨添加ヲ營ミ。其邊緣一帯ニハ密ニ造骨細胞ノ密集アリ。之等新生骨質ハ其邊緣。「ブダン」ニ淡黃赤色無造構ニ着染シ。造骨細胞内ニハ。又赤色脂肪顆粒ヲ沈着スルモノ多シ。殘存セル蜂窠ハ尙ホ健側ト同ジク廣範ニ亘リテ多數存スル共總テノモノ鬆粗結締織ヲ以テ滿サレ。赤色脂肪顆粒細胞並ニ星芒。紡錘狀細胞ノ脂肪沈着アルモノ極メテ多數存ス。肉芽面ニハ屑零樣顆粒狀物。硝子樣

圓形細胞並ニ多數ノ脂肪顆粒細胞。脂肪反應ヲ呈スル漿液性滲出物等存ス。竇壁並ニ蜂窠隔壁ニハ骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ有スルモノ極メテ稀ニ存ス。(附圖第2圖)。

顏面神經管内並ニ膝狀神經節 鼓室中央ニ於ケル顏面神經骨管ニ一部缺損アリ。厚キ結締織之レヲ補填ス。骨管内結締織ハ血管ノ擴張。充盈ヲ認ムル他ニ著變並ニ脂肪質ナシ。

顏面神經纖維ハ健側ニ比シ着染度ニ差異ナク。僅ニ彼ニ比シ膨隆セル胡瓜。甜瓜。球狀等ヲ呈シ特ニ著變ヲ認ムル能ハズ。

「ミエリン」顆粒ノ產出多寡モ亦。健側耳ニ於ケル夫レニ比シ庭徑ナシ。

膝狀神經節細胞 ニ於テハ原形質ニ中等度ノ萎縮アリテ。蝙蝠狀或ハ金平糖狀ヲ呈シ。「ブダン」ニ反應シ暗赤褐色微顆粒狀ヲ呈スルモノ多シ。核多ク濃縮シテ不明ナリ。約 $\frac{2}{3}$ ニ於ケル細胞數ノ原形質内ニハ赤褐色顆粒ノ沈着ヲ認ム。

前庭窓窩並ニ馬鐙骨板附近 窓窩並ニ馬鐙骨板附近粘膜ハ鼓室内一般的ノモノニ比シ稍薄ク。尙ホ乳頭狀小起伏ヲ呈シ。多量ノ脂肪質ヲ認メラル。輪狀靱帶内ニハ結締織纖維間ニ多數ノ赤色脂肪顆粒沈着ス。關節軟骨トノ接合部一帯ハ淡黃赤色ニ着染シ其染度。健側ニ同ジ。關節軟骨並ニ馬鐙骨板ニ於ケル所見。健側ノ夫等ニ同ジ。

蝸牛殼窓窩並ニ第2鼓膜 窓窩附近粘膜ニ結締織ノ増殖アリテ中等量ノ脂肪質之レニ沈着ス。窓窩狹小ニシテ漿液樣物質並ニ膿球ニ混ジ赤色脂肪顆粒細胞。脂肪小滴集積ス。第2鼓膜ハ一帯ニ淡黃色無造構脂肪沈着ヲ呈シ其着染度ハ健側ニ同ジ。唯健側ニ比シ其纖維間ニ赤色粗大脂肪顆粒ノ沈着多キヲ異ニスルノミ。蝸牛殼外淋巴腔内ニハ第2鼓膜ニ接シ暗紫褐色。雲霧物ノ附着スルアルモ。亦健側ニ同ジ。蝸牛迷路。蝸牛骨壁 骨質緻密ニシテ各骨層錯綜シ僅ニ尖端迴轉附近ニ於ケル内骨膜性化骨層並ニ軟骨内化骨層間結合線ノミ狹小ナル纖維髓ヲ挟ミテ境界ヲナス。所々ニ散存スル小纖維髓内ニハ。3個宛ノ脂肪細胞ヲ容ル。骨細胞。球間腔内骨球等ノ脂肪沈着。血管内血清ノ脂肪反應等ハ健側ニ何等異ナルナシ。

蝸牛殼内骨膜。同外淋巴腔。前庭膜。蝸牛殼蓋。骨性螺旋板及ヒ螺旋神經等ノ組織の並ニ脂肪所見ハ健

側耳ノモノニ同ジ。

コルチ器 總テ融合萎縮シ全ク原形ヲ留メズ。一様ニ暗褐色ニ着染ス。融合セル前庭唇、内溝上細胞、其他ヘンゼン氏細胞ノ所屬地ト覺シキ邊リニ赤色粗大脂肪顆粒ヲ混ズ。尙ホクラウチウス、外溝上細胞、脈絡帶附近、崩壊組織塊貨物中ニモ之レヲ見ルモノアレ共、全ク其屬籍ヲ言明シ得ズ。

基礎膜ノ所見モ健側耳ニ於ケルモノニ類ス。

螺旋綫帶 螺旋綫帶ハ浮腫狀ヲ呈シ、「プラスマ」細胞極メテ多ク。且ツ健側ノモノニ比シテ其脂肪顆粒ヲ有スルモノ僅ニ多シ。

骨軸 骨軸部骨質ハ發育並ニ石灰沈着良ク骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ沈着スルモノ又多シ。骨管腔内色素細胞ノ數量ハ健側ト大差ナシ。骨軸縱管内、特ニ骨軸基底ニ近ク多數ノ「プラスマ」細胞アリ。且ツ脂肪沈着スルモノ又極メテ多シ。血管ハ寧ロ健側耳ノモノニ比シテ其充盈僅少ナリ。血管内ニ脂肪反應ヲ呈スル血清ヲ容ル、モノアルハ健側ニ同ジ。

蝸牛殼神經纖維 稍々着染良シカラズ。甜瓜、王瓜狀、或ハ胡瓜狀ヲ呈シ、「ミエリン」顆粒ノ產出多寡ハ健側ノ夫レニ比シ大差ナシ。

螺旋神經節細胞 原形質、高度ノ圓形收縮ヲ來シ暗黃褐色顆粒狀ヲ呈シ、核多ク不明ナリ。約 $\frac{1}{3}$ ニ於ケル細胞、原形質内ニ2、3個宛存スル赤褐色粗大脂肪顆粒ヲ見ル。

前庭迷路。前庭骨壁 骨質緻密ニシテ組織的並ニ脂肪所見全ク健側耳ノモノニ類ス。

前庭内骨膜、**外淋巴腔**並ニ圓綫、**膜様前庭壁**、**内淋巴腔**等ノ所見モ亦健側ノモノニ略々一致ヲ見ル。唯内淋巴腔内ニハ硝子樣「プラスマ」球ノ浮游僅ニ多ク、且ツ微細微量ノ脂肪沈着ヲ見ル。

聽斑 正圓囊聽斑基質結締織内ニ「プラスマ」球多ク、且ツ赤色脂肪顆粒ヲ沈着スルモノ多キト。同所基質上緣ニ同様粗大脂肪顆粒集積スルヲ見ル他ハ健側耳ニ於ケル聽斑所見ト大差ナシ。

三半規管 患側前庭迷路各部ニ類ス。

聽櫛 「クプラ」ハ極メテ萎縮シ無造構淡紫赤色ヲ呈シテ遺殘ス。神經上皮ハ顆粒狀ニ融合シ、之レニ「ズダン」ニ赤染スル顆粒狀脂肪樣物質ヲ混ジ基礎膜ハ僅ニ形骸ヲ留メ淡赤染ス。基質結締織内ニハ健側ノモノニ比シテ多數ノ「プラスマ」細胞散在シ、脂肪顆粒細胞又多シ。他ハ總テ患側聽斑ニ同ジ。

前庭導水管並ニ内淋巴囊 上皮細胞ハ腫脹濁シ。「ズダン」ニ暗赤色ニ着染シ微細赤色脂肪顆粒ヲ沈着スルモノ僅ニ存ス。周圍結締織内ニハ纖維間ニ又僅ノ赤色粗大脂肪顆粒ヲ見ル。管、囊内ニモ亦僅少ノ脂肪細滴ノ浮游並ニ脂肪反應ヲ呈スル淋巴液潑溜ス。

内聽道 内聽道周圍結締織ニ僅ノ肥厚並ニ血管ノ怒張アリ圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙ル。極メテ多數ノ結締織細胞ノ脂肪沈着、脂肪顆粒細胞、或ハ一定ノ形態ヲ具有セズ。且ツ塊狀ヲ呈スル脂肪顆粒アリ。内聽道内ハ膿球並ニ脂肪顆粒細胞集積シテ之レヲ滿タス。内聽道底部、特ニ顏面神經管裂孔邊リニ周圍結締織ニ接シ數個ノ澱粉樣小體ヲ見ル。健側ノモノト大キサニ大差ナク、僅ニ數量ノ増加有リヤチ思ハシム。

1. 2ノモノハ中心ナル核子ノ「ズダン」ニ赤色ニ着染スルモノアリ。

内聽道内神經幹ハ總テ着染良好ニシテ、**聽神經纖維**ハ胡瓜、甜瓜狀ヲ呈スルモノ多ク、**前庭神經纖維**ハ自然薯狀又ハ莖狀ヲ呈スルモノ多シ。「ミエリン」顆粒極メテ多數產出シ、其多寡ニ神經纖維ニ依ル差異並ニ健、患側ニヨル大差ヲ認メズ。

前庭神經節細胞 原形質、中等度ノ周圍間隙ヲ有スル圓形收縮ヲナシ、淡青微顆粒狀ヲ呈シ、輪廓、尙ホ明ナレドモ核素融解セル核ヲ有ス。總テノ細胞原形質内ニハ顯著ナル赤褐色脂肪顆粒有リ。其健、患側ニ依ル脂肪顆粒ノ數量ニ相違ヲ認ムル能ハズ。

傳染徑路。本例ニ於ケル化膿性腦膜炎ニ至ル徑路ヲ觀ルニ蜂窠ハ極メテ廣範ニ存シ、總テ炎症ノ波及ヲ蒙レルヲ以テ、之レ等蜂窠ヲ介シテ接觸傳染ナルベシ。

第3例 渡○榮○、男、14年、無職。

初診 昭和6年7月9日。

既往症 2歳ニシテ麻疹ヲ經過シ、滿1歳頃ニ左側耳漏アリシモ自然ニ治癒ス。

3週間前ヨリ右側ノ耳漏アリ。頭痛激シク、2、3日前ヨリ數回ノ嘔吐アリ。體溫日々 37° — 39° Cヲ弛張セリト。

現症 左側鼓膜尋常。左側鼓膜ニ前上方ヨリ後下方ニ亘ル大ナル卵圓形ノ穿孔存シ肉芽突出ス。乳嚢部ニ腫脹發赤アリ。且ツ壓痛アリ。舌ハ乾燥シ舌苔ナシ。項強直アリテ瞳孔兩側不同。**ケルニッヒ氏症**

狀アリ。

臨牀診斷 右側急性中耳炎、急性乳嚙突起炎並ニ化膿性腦膜炎。

經過 即日入院セシメ腰椎穿刺ヲ行フ。液壓270 mm水柱ヲ算シ、液ハ高度ニ濁濁ス。ノンネアペルト・パンデイ氏反應陽性ナリ。同日手術ヲ行ヒ竇開放ヲ行フ。

乳嚙蜂窠ハ融合シテ大ナル空洞ヲ作り濃厚ナル膿汁ヲ充ス。S字狀竇並ニ硬腦膜ヲ露出ス。硬腦膜ハ暗紫色ヲ呈ス。手術施行ヨリ2日後鬼籍ニスル。

解剖診斷 右側顳額葉膿瘍並ニ急性化膿性腦膜炎。肺ノ高度ノ水腫並ニ中等度ノ鬱血。心筋瀾濁。肝臓瀾濁腫脹。脂肪變性。腎鬱血並ニ瀾濁。傳染脾。迴腸粘膜炎ノ小點狀出血。

第3例健側聽器所見。

鼓膜 菲薄ニシテ組織的ニ著變ナシ。皮膚層瀾濁シ、極メテ僅微ノ赤色脂肪細滴沈着シ外縁ニハ纖維狀ヲ呈シテ載積シ且ツ強ク脂肪染色ニ應ズル角化質多量ニ剝離ス。固有層ハ一帯ニ淡ク黃赤色無造構ニ着染シ美麗ナリ。粘膜炎ニ著變。脂肪質ナシ。唯、皮下並ニ粘膜炎内血管ハ總テ擴張シ、高度ニ脂肪染色ニ應ズル血清ヲ容ル。

鼓室粘膜炎並ニ鼓室腔 鼓室粘膜炎一般ニ菲薄ニシテ單層扁平上皮平坦ニ並列シ、下織ハ纖維性ニシテ強靱ナリ。血管一様ニ充盈シ、總テニ非ザレ共、血管内ニハ脂肪反應ヲ呈セル血清ヲ容ルモノ多シ。又下織内ニ往々脂肪細胞ヲ認ムル他ニ脂肪質ナシ。鼓室腔一般ニ清澄ナレ共、壁竈、陷凹等ニハ微顆粒狀ヲ呈セル雲霧物ニ混ジ僅ノ脂肪滴密集ス。

中耳骨壁 骨緣平坦ニシテ骨板層ニ沿ヒテ「ヘマトキシリン」ニ好染シ、骨細胞ノ脂肪沈着ヲ來セルモノ約半数ニ於テ之ヲ認ム。

聽小骨 槌骨脚、柄周緣、各關節部ニ稍ク廣キ軟骨組織アリ。他ハ一般ニ骨質緻密ニシテ槌骨小頭、砧骨體中心ニ小纖維體アリテ數個宛ノ脂肪細胞ヲ容ル。骨細胞内ニハ又脂肪顆粒ノ沈着ヲ見ルモノ密ニ存シ、軟骨細胞モ亦選擇的ニ之ヲ認ム。

聽小筋 鼓膜張筋々纖維ニ輕度ノ瀾濁アリ。極メテ稀ニ微細脂肪顆粒ノ沈着ヲ認ムルモノアリ。筋間、筋膜ニハ中等量ノ脂肪細胞集積ス。馬鐙骨筋モ亦、筋纖維僅ニ瀾濁アリテ選擇的ニ微細脂肪顆粒ノ沈着ヲ認メ、筋膜ニ2、3ノ脂肪細胞存ス。

歐氏管 粘膜炎著變ナシ。總テノ所見、鼓室粘膜炎同ジ。管腔廣潤ニシテ雲霧物並ニ僅ノ重屈折性滴狀脂肪散亂ス。耳喇叭含氣蜂窠ハ骨髓細胞並ニ多量ノ脂肪細胞ヲ滿タス。

乳嚙竇並ニ蜂窠 蜂窠ハ極メテ廣範ニ亙リテ存シ、發育良ク總テ廣キ含氣腔ヲ有ス。竇、蜂窠粘膜炎ニ薄ニシテ纖維性ナリ。附近ニ存スル多クノ血管ハ脂肪反應ヲ呈スル血清ヲ容レ、粘膜炎下織内ニ往々2、3個宛集合スル脂肪細胞ヲ見ル。竇、蜂窠含氣腔内ニハ粘膜炎附着シ僅ノ雲霧物、脂肪反應ヲ呈スル液狀物並ニ小滴狀脂肪存ス。竇壁並ニ蜂窠隔壁骨質内ニハ骨細胞ノ脂肪質ヲ有スルモノ殆ンド見ル能ハズ。

顏面神經管内並ニ膝狀神經節 顏面神經骨管ニ缺損ナシ。管内結締組織ハ強靱ナル纖維性ニシテ血管拡張ス。血管内ニハ脂肪反應ヲ呈スル血清ヲ容レ、結締組織中ニハ數個ノ脂肪細胞アリ。神經纖維ハ着染良ク自然著又ハ胡瓜狀ヲ呈シ、中等量ノ「ミエリン」顆粒ノ附着並ニ飛散アリ。

膝狀神經節細胞 圓形ニシテ原形質ハ中等度ノ環狀間隙ヲ有スル淡青顆粒狀ヲ成スモノ多ク、核、中心核明ニ之ヲ認メ得ラル。約 $\frac{1}{3}$ ニ於ケル細胞、原形質内ニハ微細脂肪顆粒ノ沈着アリ。

前庭窓窩並ニ馬鐙骨板附近 附近粘膜炎著變並ニ脂肪質ナシ。窓窩又清澄ナリ。輪狀靱帶ハ「ヘマトキシリン」ニ好染シ斜走細纖維狀ヲナシ、纖維ニ沿ヒテ僅ノ赤色脂肪顆粒ノ沈着アリ。關節軟骨ハ細胞ノ大キサ略ク一定シ排列亂レ、基質「ヘマトキシリン」ニ強染ス。其靱帶邊緣ノモノニ顯著ニ、之ヲ遠ザカルニ從ヒテ散在性ニ、細胞核邊緣ニ赤色脂肪顆粒ノ沈着アリ。

馬鐙骨板ハ内半面ニ軟骨組織ヲ留メ骨質トノ接觸部一帯ノ軟骨細胞内ニハ特ニ顯著ニ脂肪沈着アリ。又骨細胞ノ脂肪沈着ハ中耳骨壁ニ於ケルモノニ準ジテ等分ニ存在ス。

蝸牛殼窓窩並ニ第2鼓膜 窓窩附近粘膜炎菲薄ニシテ、所見一般的鼓室粘膜炎ニ類ス。窓窩内ニハ僅ノ雲霧狀物並ニ融合セル滴狀脂肪ヲ見ル。第2鼓膜ハ組織的ニ著變ナク、一帯ニ「ズダン」ニ淡赤染ス。

蝸牛殼外淋巴腔内ニハ第2鼓膜ニ接シ暗紫赤色雲霧狀物ノ附着アリ。

蝸牛迷路、蝸牛骨壁 骨質緻密ナリ。軟骨内化骨層

中ニハ骨球夥シク累積シ顯著ニ球間腔ヲ排置ス。各骨層間結合線、尙ホ割然トシ、内骨膜性化骨ハ其内縁ヨリ、小髓腔ハ其周縁ヨリ又各結合線ニ沿ヒテ石灰沈着ス。骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ有スルモノハ、頭蓋腔側ヲナス外骨膜性化骨層ヲ除キ一般的密ニ存シ。特ニ軟骨内化骨層ニ於ケル骨球内核邊縁ニ顯著トス。其他ハーベルス氏血管内血清ノ脂肪染色ニ應ジ。且ツ赤色脂肪顆粒ヲ藏スルモノアリ。僅ニ存スル小髓腔内ニモ脂肪細胞ノ充盈アリ。

蝸牛殻内骨膜 極メテ菲薄ニシテ著變ナク、又脂肪質ヲ見ズ。

外淋巴腔 基礎第1迴轉鼓室道内ニハ少量ノ纖維素並ニ雲霧狀物アリ。骨軸縁ニ浮遊セル僅ノ硝子樣圓形細胞アリ。殆ソド個々ニ微細赤色脂肪顆粒ヲ沈着ス。

前庭膜 良ク緊張シ、淡青硝子樣ヲ呈ス。脂肪質認め難シ。

蝸牛殼管 僅カノ硝子樣圓形細胞ノ浮漂アル他ニ著變及ビ脂肪質ナシ。

骨性螺旋板並ニ螺旋神經 螺旋骨板ハ石灰沈着良ク神經纖維ハ小玉瓜狀又ハ融合シ、極微細ノ「ミエリン」顆粒、中等量飛散ス。

コルチ器 前庭骨原形ヲ保持シ、上皮細胞モ亦輪廓明ナリ。層上縁或ハ細胞ノ周縁ニハ微細赤色脂肪顆粒ノ僅少沈着スルヲ認ム。コルチ氏器ハ總テ「ヘマトキシリン」ニ淡青染色、纖維組織狀ヲ呈ス。脂肪質ヲ認めズ。内溝上細胞ハ融合萎縮シテ存シ、僅ノ脂肪細滴ノ沈着ヲ認ム。内螺旋溝内ニ數個ノ硝子小球浮漂シ内有毛細胞崩壞飛散シ、内外柱狀細胞、尙ホ交叉シテ存ス。外有毛細胞ハ外輪ノミヲ留メ、ダイテルス氏細胞ト共ニ下方ヨリ崩壞ス。其附近ニ微細屑零樣脂肪顆粒ヲ認ムレ共、屬籍明カナラズ。ヘンセン氏細胞極メテ萎縮シテ存シ、細胞上縁ニ僅微ノ脂肪細滴ヲ認ム。

基礎膜 基礎膜ニ著變ナク螺旋靱帶ニ於ケルモノニ僅ノ脂肪顆粒沈着アリ。

クラウヂウス細胞、外溝上細胞ハ僅ニ細胞癒合シ、細胞内ニ2、3脂肪細滴ヲ有スルモノアリ。螺旋隆起ニ脂肪質ナク、脈絡帶ハ血管ノミヲ留メ、多ク硝子球ノ累積ト化ス。同所血管ハ極メテ擴張シ、顯著ニ脂肪染色ニ應ズル血清ヲ容レ、崩壞セル脈絡帶内ニハ僅ノ粗大脂肪顆粒ヲ混ズ。

螺旋靱帶 結締組織浮腫狀ヲ呈シ粗網狀ニ連ル。第1迴轉ニ於ケル靱帶内ニ顯著ナル出血アリ。基礎膜下層ニ僅ノ赤色脂肪顆粒ノ沈着アリ。且ツ極メテ僅ノ結締細胞ニ脂肪顆粒ノ沈着アリ。

骨軸 骨質ノ發育並ニ石灰沈着良シ。骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ有スルモノハ其密度稍大ニシテ此處彼處ニ散在ス。骨軸縱管内血管怒張シ、且ツ圓形細胞ノ浸潤アリ。骨軸基底ニ近ク最も顯著トナル。赤色脂肪顆粒細胞多數存シ、又中等度ニ色素細胞有リ。蝸牛殼神經纖維 着染良シカラズ。絲瓜、莖狀、玉瓜狀等ヲ呈シ、中等量ノ「ミエリン」顆粒ノ飛散ヲ見ル。第2、第3迴轉基部ニ於ケル螺旋神經節内ニ出血アリ。細胞ハ圓形、梨子狀ヲ呈シ原形質ハ高度ノ圓形收縮ヲナシ、暗紫褐色顆粒狀ヲ呈シ核極メテ濃縮シテ認メラル。稀ニ原形質内ニ赤褐色脂肪顆粒ノ沈着アリ。

前庭迷路。前庭骨壁 組織的所見ハ略ク蝸牛骨壁ニ類ス。脂肪質ハ骨細胞ノ之レヲ攝ルモノ、内骨膜性化骨層ヲ中心性ニ多トス。又正圓隱窩前側隅ヨリ中耳骨壁ヲ斜ニ走ル Mayer ノ所謂迷路骨壁自然骨折 Spontan Fractur der Labyrinth-kapsel アリ。帶狀ヲナシテ斜走スル假骨層ニシテ、中心ハ結締組織、之レヲ挟ミテ其兩側ニ軟骨組織アリ。軟骨組織内ニ多數ノ骨球混入シ基質「ヘマトキシリン」ニ強染色。而シテ上述諸組織像内ニハ顯著ナル脂肪沈着アリ。尙ホ前庭囊後壁ニ位シ、顔面神經管内方ニ周圍骨質トハ割然ト區別シ得ラル、耳硬化病竈ヲ見ル。病竈内骨質ハ極メテ緻密ニシテ骨球果然ト之レヲ圍繞ス。而シテ該病竈ニ於ケル骨細胞並ニ軟骨細胞、骨球内ニハ極メテ顯著ナル脂肪沈着アリ。骨細胞ニ於ケルモノハ脂肪質融合シテ骨腔ヲ滿タシ、他部骨細胞内脂肪質ノ單屈光性ナルニ反シ、該部ニ於ケルモノハミ明ナル重屈光性ヲ呈シ、加温ニ依リテ消失セザルモノ並ニ消失スルモノアリ。「ズダン」ニ黃赤色、「ニールブラウ」ニ淡青色、「ノイトラルロート」ニ淡赤色、「オスミーム酸」ニモ淡灰色ニ還元セラレ、フイッシレル氏法ヲ除クスミス・チアチオ氏法ニ陽性ヲ呈シ、一般的骨細胞内ニ沈着スル中性脂肪ヲ主トスルモノニ反シ、「コレステリン・エステル」並ニ「リポイド」ヲ含有スルモノナルヲ知ル。

前庭内骨膜 浮腫狀ヲ呈シ血管ノ擴張、充盈ヲ見ルモノ多シ。馬鐙骨板内面並ニ壺腹部ニ互リ一様ニ

「ズダン」ニ赤染ス。

前庭外淋巴腔並ニ内閣縫 外淋巴腔内周圍結締織。
尙ホ所々ニ保存セラレ。浮腫狀ニ腫脹セル星芒狀網
格ヲナシテ完全ナリ。網格ヲ縫ヘル血管ハ總テ怒張
ス。所々ニ脂肪顆粒細胞並ニ星芒狀結締織細胞ノ脂
肪沈着等僅ニ之レヲ見ル。

膜様前庭壁 上皮層僅ニ潤濁アレ共。細胞ノ輪廓。
尙ホ明ナリ。細胞内ニ微細微量ノ赤色脂肪顆粒ノ沈
着ヲ見ル。硝子樣基礎膜並ニ結締織層ニ著變及ビ脂
肪質ナシ。

前庭内淋巴腔 一般ニ清澄ナリ。

聽斑 聽石膜ハ神經上皮上緣トノ間ニ僅ノ間隙ヲ
挟ミテ浮漾シ。僅ニ亂レタル魚鱗狀ノ纖細構造ヲ留
ム。脂肪質ナシ。神經上皮ハ聽石膜トノ間隙ニ多數
ノ硝子小球ヲ飛バシ細胞相互ニ融合載積シ。「ミエリ
ン」樣顆粒僅ニ之レニ混ズ。基礎膜ハ幽カニ隱見シ。
基質結締織ハ所々ニ小空洞ヲ作りテ浮腫狀ヲ呈ス。
基質内神經纖維ハ莖狀又ハ枯木樹枝狀ヲ呈シ。中等
量ノ「ミエリン」顆粒ヲ飛散ス。

三半規管 總テノ所見ハ前庭迷路ニ一致ス。

聽櫛 「クブラ」ハ臆ナル雲架狀ヲ呈シ。「ヘマトキ
シリン」ニ淡青染ス。他ハ總テノ所見。聽斑ニ類ス。

前庭導水管並ニ内淋巴囊 内淋巴囊内ニ顯著ナル出
血アリ。脂肪反應ヲ呈セル液狀物ト共ニ之レヲ滿タ
ス。上皮細胞ハ潤濁萎縮シ微細脂肪顆粒ヲ有スルモ
ノアリ。周圍結締織ハ浮腫狀ニ腫脹シ。蜘蛛膜下腔
ヨリ次第ニ圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リ所々ニ出血アリ。
多數ノ脂肪顆粒ヲ有スル「プラスマ」細胞並ニ結締織
細胞ノ脂肪沈着アリ。

内聽道 周圍結締織ハ僅ニ肥厚シ浮腫狀ヲ呈ス。多
クノ血管アリテ擴張シ所々ニ出血アリ。結締織纖維
間ニハ極メテ多數ノ「プラスマ」細胞存シ。殆ンド個
個ニ脂肪顆粒ヲ有ス。又往々星芒狀細胞ノ脂肪沈着
スルモノアリ。血管内ニハ又脂肪染色ニ應ズル血清
ヲ容レ。僅ノ脂肪顆粒細胞モ亦此中ニ見ルモノアリ。
内聽道内ニハ多クノ膿球並ニ針狀或ハ疎網格狀
ヲ呈スル纖維素ヲ滿タシ。各神經纖維間ニモ亦其浸
潤ヲ蒙ル。膿球中ニハ極メテ多クノ脂肪顆粒細胞ヲ
混ズ。又内聽道底部ニハ最大ナルモノ約 50μ ヲ算ス
ル圓形或ハ瘤狀ヲ呈スル澱粉樣小體數個存シ總テ増
殖セル鬆粗結締織ニ據リテ圍繞セラレ。脂肪沈着ナ
シ。

神經纖維 聽並ニ前庭共ニ其着染度並ニ其「ミエリ
ン」像。稍ク類似シ。後者ハ僅ニ長ク。莖狀又ハ自
然落狀ヲ呈シ。共ニ中等量ノ粗大「ミエリン」顆粒ヲ
飛バス。

前庭神經節細胞 中等度ノ周圍間隙ヲ有シテ原形質
ハ圓形收縮ヲ呈シ暗青顆粒狀ヲナス。總テノ原形質
内ニハ脂肪顆粒ノ沈着アリ。核。中心核ハ臆ナレ共
認メ得ラル。モノ多シ。細胞周緣ニモ亦多數ノ不定
型ナル脂肪顆粒細胞存ス。

第3例患側聽器所見。

鼓膜 鼓膜ハ中央ニ大ナル穿孔ヲ挟ミテ穿孔緣ニ
次第ニ太ク短突起狀ニ突出シー見棍棒狀ヲ呈シ。棍
棒先端ニ極メテ纖弱ナル膠樣結締織性肉芽ヲ包ム。
皮膚層ハ肥厚シ外面チー様ニ被覆シ穿孔端ヨリ内面
ニ翻轉シ内面ヲ被蓋スル粘膜炎層上皮ニ移行ス。皮膚
層内ニハ顯著ニ赤色脂肪顆粒ノ沈着アリ。健側ノモ
ノニ比シ遙カニ多量トス。尙ホ該層外緣ニハ之レ等
角化質ノ脂肪染色ニ應ジ纖維狀ヲ呈シテ載積スルモ
ノ多量ニ附着ス。皮下ニ於ケル結締織並ニ粘膜炎下
ニ高度ニ増殖ヲ來シ。極メテ鬆粗ニシテ血管多ク且
ツ血球並ニ脂肪反應ヲ呈セル血清ノ充盈アリ。所々
ニ小圓形細胞顯著ニ浸潤ス。一般ニ「プラスマ」細胞
並ニ同大ノ赤色脂肪顆粒細胞夥シク。其他。結締織
性紡錘狀細胞ノ脂肪沈着アリ。

固有層ハ所々斷續スルモ。尙ホ明ニ内外2層ヲ區別
シ得ラレ弛緩。萎縮且ツ紆曲ス。其脂肪染色ニ於ケ
ル反應程度ハ健側耳ニ於ケルモノニ比シ大差ナシ。
粘膜炎層上皮細胞ハ不揃ナル短圓柱狀ヲ呈シ。細胞中
腹或ハ下端ニ粗大赤色脂肪顆粒ノ沈着ヲ見ルモノ多
シ。

鼓室粘膜炎並ニ鼓室腔 鼓室粘膜炎ハ一帯ニ浮腫狀ニ腫
脹セル鬆粗結締織ノ増殖アリテ鼓室腔又極メテ狹隘
ナリ。特ニ鼓室天蓋ニ於テハ増殖セル結締織ニヨリ
テ槌骨小頭。砧骨體部全ク其中ニ埋没セラル。之等
ノ粘膜炎表面。乳嘴狀或ハ乳頭狀起伏ヲ呈シ或ハ索
狀。橋梁狀連結アリテ血管ニ富ミ總テ血球或ハ脂肪
反應ヲ呈スル血清ヲ滿タシ或ハ赤色脂肪顆粒ヲ顯著
ニ藏スルモノアリ。尙ホ粘膜炎内ニハ大小圓形細胞ニ
富ミ。赤色脂肪顆粒細胞多ク。又粗大脂肪顆粒ノ散
在性沈着夥シ。

上皮細胞ハ多ク之レヲ缺除スル所アレドモ所ニ依リ
テ不揃ナル長圓柱狀細胞ヲ認メ赤色脂肪顆粒ノ沈着

アリ。

鼓室腔内ニハ膿球、暗赤褐色ヲ呈スル滲出液、纖維素等集積ス。膿球ハ總テ輪廓臃ナル顆粒狀ヲ呈シ、個々ニ微細赤色脂肪顆粒之レニ沈着ス。

中耳骨壁 總テノ所見ハ健側耳ノ夫ニ略々一致ス。聽小骨 各3聽小骨尙ホ存ス。唯各骨ハ増殖セル粘膜ニ據リ深ク埋メラル。聽小骨々質ニ於ケル組織像並ニ脂肪沈着ハ總テ健側ノモノニ異ナシ。

聽小筋 鼓膜張筋ハ筋纖維一般ニ不揃ニテ潤濁シ、宛然紙裂綫狀捻轉ヲ見ルモノ多シ。筋間ナ縫フ血管ハ總テ擴張充盈シ筋間並ニ筋膜ニ存スル脂肪細胞ノ數量ハ健側ニ比シ僅ニ減少ス。

馬鐙骨筋モ亦、筋纖維ニ輕度ノ潤濁アリ。稀ニ微細脂肪顆粒ノ沈着アリ。脂肪細胞ヲ見ズ。

歐氏管 周圍粘膜モ亦、鼓室粘膜ニ準ジ鬆粗結締織ノ増殖アリ。唯、滑ナル起伏ヲ呈シテ圓柱狀上皮之レヲ被覆ス。所見ハ總テ鼓室粘膜ニ一致シ、上皮細胞ノ脂肪沈着、粘膜下織内ニ於ケル多數ノ脂肪顆粒細胞、顆粒狀脂肪、脂肪反應ヲ呈スル血管内血清等顯著ニ認メラル。管腔ハ極メテ狹隘ニシテ多數ノ膿球、滲出液之レヲ滿タシ其脂肪所見又鼓室内ノモノニ同ジ。

耳喇叭含氣蜂窠 所見ハ健側ニ於ケルモノニ同ジ。乳嘴竇並ニ蜂窠 蜂窠ハ廣範ニ存シ尙ホ殘存セルモノアリテ多クハ鬆粗結締織之レヲ埋ム。手術竇骨壁ヲ被覆スル薄キ肉芽並ニ各蜂窠ヲ埋ム鬆粗結締織内ニハ血管多ク且ツ血球充盈シ又血清ノ脂肪反應ヲ呈スルモノ極メテ多シ。稀ニ存スル狹キ蜂窠含氣腔並ニ手術竇内ニハ脂肪顆粒ヲ含ム多數ノ膿球並ニ脂肪染色ニ應ズル漿液性滲出物ヲ含ム。手術ニ據ル蜚爬骨縁ニハ未ダ造骨細胞ヲ見ズ。骨壁ニ於ケル骨細胞ノ脂肪沈着等ハ其量並ニ散在程度等總テ健側ノモノニ同ジ。(附圖第8、並ニ第9圖)。

顏面神經管内並ニ膝狀神經節 鼓室下窩ニ近ク顏面神經骨管ニ一部小缺損アリ。強靱ナル結締織之レヲ補填ス。管内ニ於ケル總テノ所見ハ健側ニ全ク同ジ。顏面神經モ亦其染度、纖維ノ「ミエリン」像、「ミエリン」顆粒ノ產出多寡等健側ニ異ナル所ナク。膝狀神經節細胞ニ於テモ其組織の所見並ニ細胞原形質内ニ存スル赤褐色脂肪顆粒ノ數量等略々健側ノモノニ一致ス。

前庭窓窩並ニ馬鐙骨板附近 卵圓窓窩並ニ附近一帯

モ亦増殖セル粘膜ヲ以テ埋メラレ其脂肪所見ハ一般の鼓室粘膜ニ類ス。輪狀韌帶ハ「ヘマトキシリン」ニ染ラズ。幽カニ細纖維斜走シ、外層ハ纖維ノ走行亂レ次第ニ窓窩内増殖結締織ニ移行シ其境界割然セズ。韌帶結締織纖維並ニ纖維間ニハ粗大脂肪顆粒ノ沈着多ク、健側ノ夫レニ比シ遙カニ多量ナリ。關節軟骨及ビ馬鐙骨板ニ於ケル組織の並ニ脂肪所見ハ健側ノモノニ同ジ。

蝸牛殼窓窩並ニ第2鼓膜 正圓窓窩モ亦鬆粗結締織ノ増殖ニ依リテ埋メラレ僅ニ不規則狹隘ナル腔隙ヲ有スルノミ。之等増殖セル結締織所見ハ總テ前述鼓室粘膜ニ等シ。狹隘ナル腔隙内ニハ又脂肪反應ヲ呈シテ暗赤染スル滲出液並ニ脂肪顆粒ノ沈着セル膿球蓄積ス。

第2鼓膜ハ組織的ニ著變ナク一帯ニ無造構淡赤染ス。其脂肪染色ニ依ル染度ハ健側ノモノニ略々同ジ。唯僅ニ纖維間ニ微細脂肪顆粒ノ沈着アルヲ異ニスルノミ。第2鼓膜ニ接シ蝸牛殼外淋巴腔内ニハ濃紫赤色無造構ノ淋巴液一面ニ附着ス。

蝸牛迷路。蝸牛骨壁 骨質一般的ニ緻密ナリ。所々ニ小纖維髓アリテ之レニ藏スル脂肪細胞ノ數量ハ健側ニ比シテ多少減少アルヲ認ムル他ハ健側ニ於ケル骨壁組織像並ニ脂肪所見ニ大差ナシ。唯、卵圓窓前内方中耳骨壁内縁ニ當リ、稍々大ナル圓形ノ軟骨殘留ヲ認メ、「ヘマトキシリン」ニ不染ノ軟骨基質廣ク存シ、細胞ハ大小不同ノ圓形、卵圓形ハ紡錘狀ヲ呈シ不規則ニ排置シ、其周縁ハ「ヘマトキシリン」ニ強染スル骨球果然トシテ之レヲ圍繞ス。軟骨細胞内ニハ空胞ヲ有スルモノアリ。空胞形成ナキモノハ總テ多少宛、核邊緣ニ赤色脂肪顆粒ノ沈着アリ。或ハ膨大セル原形質ノ暈狀脂肪沈着ヲ認ムルモノアリ。之等軟骨組織ヲ圍繞スル所謂球間腔ニハ脂肪顆粒ヲ有スル骨球極メテ多シ。

蝸牛殼内骨膜 組織内血管多ク怒張シ第1迴轉ニ於ケルモノニ出血ヲ認ムルモノアリ。他ニ著變及ビ脂肪質ナシ。

蝸牛殼外淋巴腔 一般ニ清澄ナリ。唯、基礎第1迴轉ニ於ケルモノニ僅少ノ赤血球、「プラスマ」細胞並ニ數個ノ脂肪顆粒細胞ヲ認メ、内骨膜縁ニ幕狀ニ附着シテ之レヲ繞リ暗赤色無造構ニ着染スル淋巴液ノ滲溜アリ。

前庭膜 暗紫色顆粒狀ニ腫脹潤濁シ、且ツ低下シ。

各廻轉ノモノ總テ蝸牛殼管對岸組織上ヲ匍匐ス。其邊緣ニ微細赤色脂肪顆粒ヲ認ムレ共、附近ニ存スル屑零物ノ附着ナルベシ。

骨性螺旋板並ニ螺旋神經 所見總テ健側ノモノニ同ジ。
コルチ器 コルチ器諸細胞ハ前庭層、コルチ氏膜ヲ除キ健側ノモノニ比スレバ其崩壞僅ニ著明ナリ。之等諸細胞内ニ於ケル脂肪所見モ亦、殆ンド健側ノモノニ匹敵ス。

基礎膜 前庭層基部並ニ螺旋靱帶基部ニ於ケルモノハ細纖維狀ヲ呈シ、極微細脂肪顆粒ノ纖維間ニ沈着スルヲ認ム。クラウチウス細胞、外溝上細胞ハ融合シ螺旋隆起内ノ血管怒張ス。脈絡帶ハ崩壞シ硝子球ノ飛散或ハ果核シ一様ニ暗赤褐色ニ着染ス。血管内血清ハ一様ニ顯著ナル脂肪反應ヲ呈ス。脈絡帶崩壞組織中ニ赤色脂肪顆粒ヲ認ムルモノアレ共、的確ニ該組織内ノモノナリト言明シ得ズ。

螺旋靱帶 上方ニ至ルニ從ヒ扁平ニ萎縮シ組織内ニ小空洞ヲ構成ス。基礎膜下ノモノニ顯著ナル赤色脂肪顆粒ノ沈着ヲ見ルモノアリ。

骨軸 骨軸ニ於ケル種々ナル所見ハ健側ニ異ナル所ナシ。

前庭迷路。前庭骨壁 組織的ニ骨質緻密ニシテ健側ノモノニ認メタルガ如キ組織的變化ヲ見ズ。他ノ總テノ所見ハ略ク健側ノモノニ類シ脂肪所見ニ於テ僅ニ小纖維腔内ニ存スル脂肪細胞僅ニ減少ス。

前庭内骨膜 組織的ニ著變ナシ。馬燈骨板並ニ壺腹内面ヲ被覆スルモノハ脂肪染色ニ應ジ「ズダン」ニ無造構赤染スルハ又健側ノモノニ同ジ。

外淋巴腔並ニ内閣織、膜樣前庭壁、内淋巴腔等ノ所見モ亦健側ノモノニ略ク一致ヲ見ル。

聽斑 聽石膜ヲ認メズ。神經上皮ハ崩壞シ、堤防狀ニ融合載荷シ暗赤褐色ニ着染ス。基礎膜ハ狹長ナル淡青硝子樣ヲ呈シ、基質結締織ハ一帯ニ浮腫狀ヲ成シ、血管怒張ス。神經纖維ハ多ク融合シ稀ニ樹枝狀ニ分歧シ中等度ノ「ミエリン」顆粒、基質内ニ飛散ス。其數量ハ健側ニ比シ僅ニ多數ナリトス。

聽鞘 「クブラ」ハ萎縮シ、尙ホ輪郭明カナル山高帽狀ヲ呈シ暗褐色無造構ヲ呈ス。爾餘ノ所見ハ聽斑ニ同ジ。

前庭導水管並ニ内淋巴囊 周圍結締織ニ著變ナク僅ニ纖維間ニ脂肪顆粒介在シ、又血管内血清ノ脂肪反

應ヲ呈スルモノアルノミ。上皮細胞ハ一般ニ萎縮潤濁シ僅ノ赤色脂肪顆粒ノ沈着ヲ認ムルモノアリ。囊並ニ管内ニハ僅ノ硝子球並ニ小滴狀脂肪浮漂ス。

内聽道 内聽道ニ於ケル諸所見ハ健側耳ノモノニ略ク一致ス。澱粉樣小體等モ數個其存在ヲ認メ、其脂肪沈着ヲ認メザルコトモ亦同ジ。

神經纖維着染度モ亦、略ク健側ノモノニ等シク、其「ミエリン」像ハ莖狀或ハ自然薯狀ヲ呈シ、中等量ノ粗大「ミエリン」顆粒ノ產出アリ。

前庭神經節細胞ノ組織的並ニ脂肪所見モ亦健側ニ異ナルヲ見ズ。

傳染徑路 本例ニ於ケル化膿性腦膜炎ニ至ル徑路ハ、硬腦膜ノ露出並ニ該部組織ノ壞疽アリシヨリ見テ該部ヨリノ接觸傳染ナルヲ推惟シ得ベシ。

第4例 波○伊○郎、13年、男。

自動車運轉助手。

初診 昭和6年5月5日。

既往症 幼少ノ折ニ麻疹ヲ經過シ、消化器病ヲ患ヒシ事アリ。他ニ著患ヲ知ラズ。4週間前、左側耳痛及ビ頭痛ヲ訴フ。次日自然ニ耳漏アリ。其後モ引キ續キ頭痛、耳痛並ニ眩暈ヲ訴ヘ高熱持續セリト。

現症 左側外聽道壁ハ腫脹發赤シテ外聽道ハ極メテ狹隘トナリ、鼓膜ニモ亦高度ノ腫脹發赤アリテ外方ニ膨隆ス。鼓膜中央ニ粟粒大ノ穿孔アリテ粘稠ナル膿汁搏動性ニ排泄ス。

同側耳後部ハ一帯ニ浮腫狀ニ腫脹シ、耳殼離開シ。乳嘴部並ニ胸鎖乳嚨筋ニ沿ヒテ顯著ナル壓痛並ニ中等度ノ牙關緊急アリ。右側耳ニ異狀ナシ。

臨床診斷 急性穿孔性中耳炎並ニ血栓性靜脈炎ヲ合併セル急性乳嘴突起炎。

經過 即日入院セシメ鑿開手術ヲ行フ。骨面ニ瘻孔アリ。乳嘴竇及ビ蜂窠ハ融合シテ一帯ニ粘稠ナル膿汁ヲ充ス。橫竇ニ血栓形成アリ。手術ノ翌日嘔吐項部強直、意識潤濁ヲ來シ、次第ニ諸種ノ腦膜炎ノ症狀激甚トナリ、5月12日遂ニ鬼籍ニ入ル。

解剖診斷 左側顳額葉部膿瘍並ニ化膿性腦膜炎。肺水腫。纖維素性肋膜炎。心内膜炎。傳染性腎臟潤濁並ニ鬱血。

第4例健側聽器所見。

鼓膜 組織的ニ著變ヲ見ズ。皮膚層ハ「ヘマトキシリン」ニ濃染シ纖維狀ヲ呈シ殆ンド脂肪沈着ナシ。

固有層ハ「ズダン」ニ中等度ノ黄赤色ニ着染シ粘膜炎層内ニ僅少ノ粗大脂肪顆粒ノ沈着アリ。

鼓室粘膜炎ニ鼓室腔 鼓室粘膜炎一般ニ菲薄ニシテ小股子形細胞平坦ニ之ヲ被覆シ。下縁ハ纖維性ニシテ組織的ニ又著變ナシ。上皮縁ニハ赤色脂肪顆粒ノ附着(沈着?)アリ。下縁内ニ粗大脂肪顆粒僅ニ存シ。往々血管内ニハ脂肪反應ヲ呈セル血清ヲ容ル。

鼓室腔 一般ニ清澄ナリ。

中耳骨壁 骨壁一般ニ平坦ナリ。骨細胞ノ赤色脂肪顆粒ヲ有スルモノ稍々密ニ存ス。

聽小骨 骨質緻密ナリ。骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ沈着スルモノハ一般的ニ密ニ存スル共、槌、砧骨ニ於テハ周縁性ニ多トシ馬鐙骨ハ一般的ニ存シ。其散在密度ハ中耳骨壁ニ略々一致ス。各聽小骨間結締組織ハ強靱ナル纖維狀ニシテ其骨縁ノミ、部分的ニ「ズダン」ニ黄赤色ニ着染スル所アリ。

聽小筋 鼓膜張筋並ニ馬鐙骨筋纖維ニ中等度ノ潤濁アリ。鼓膜張筋筋間並ニ筋膜内ニ中等量ノ脂肪細胞存在スル他ニ脂肪質ナシ。

歐氏管 著變ナシ。唯、僅ノ雲絮狀物、屑零脂肪顆粒ノ管腔内ニ存スル他ハ鼓室腔並ニ同所粘膜炎所見ト大差ナシ。

耳喇叭含氣蜂窠 ハ廣ク存シ。骨髓細胞並ニ脂肪細胞等分ニ之ヲ埋ム。

乳嘴竇並ニ蜂窠 蜂窠ハ前庭蝸牛迷路上縁ヲ繞リテ廣ク存シ。殆ンド總テハ廣キ含氣腔ヲ有ス。唯、乳嘴部周縁ニ存スルモノ、僅少ハ骨髓細胞ト等分ニ混ズル脂肪髓ナナス。含氣腔ヲ有スル多數ノ蜂窠並ニ竇粘膜炎ハ菲薄ニシテ多數ノ充盈血管ヲ有シ。殆ンド脂肪質ヲ見ズ。竇壁並ニ蜂窠隔壁ニ於ケル骨細胞ハ稀ニ脂肪顆粒ヲ有シテ散在ス。

顔面神經管内並ニ膝狀神經節 鼓室壁ニ於ケル神經骨管ニ缺損ナシ。管内結締組織ハ稍々鬆粗ニシテ僅少ノ紡錘狀或ハ星芒狀細胞ノ脂肪沈着アリ。血管多ク且ツ空虚ナリ。尙ホ結締組織内ニ數個宛密集スル大小ノ脂肪細胞多シ。

顔面神經纖維 幅不同ノ韭狀、自然著狀又ハ胡瓜狀ヲ呈シ、中等量ノ「ミエリン」顆粒ノ附着、飛散アリ。

膝狀神經節細胞 原形質ニ2種ノ形態並ニ着染ヲ見ル。即チ1ツハ中等度ノ環狀間隙ヲ有シ淡紫黃色。

腦ナル微顆粒狀ヲ呈シ。核稍々濃縮シテ認メ得ラルモノ。他ノ1ツハ核並ニ中心核全ク不鮮明ニシテ

原形質ハ高度ノ蠟蠟狀或ハ塊狀ニ收縮シ濃キ暗褐色ヲ呈スルモノト殆ンド等分ニ存シ。精檢スルニ殆ンド箇々ノ原形質内ニ偏在シテ存スル赤褐色脂肪顆粒ノ沈着アリ。

前庭窓窩並ニ馬鐙骨板附近 窓窩清澄ニシテ附近粘膜炎ニ著變並ニ脂肪質ナシ。輪狀靱帶ハ硝子様無造構ニ近ク。僅ニ結締組織細胞ノ微カニ脂肪顆粒ヲ有スルモノアリ。關節軟骨縁ノモノ纖維狀ヲ呈シテ「ズダン」ニ中等度ニ黄赤染ス。

關節軟骨ハ廣ク存シ。總テ球狀ニ膨大シ。核邊緣ニ顆粒狀ノモノ又ハ原形質ハ暈狀ニ或ハ基質ハ無造構ニ脂肪沈着シ特ニ靱帶縁ノモノニ顯著トス。

馬鐙骨板ハ内側過半。軟骨組織トシテ留マリ、軟骨並ニ骨細胞ハ共ニ脂肪顆粒ヲ有スルモノ密ニ存ス。

蝸牛殼窓窩並ニ第2鼓膜 窓窩附近粘膜炎モ亦菲薄ニシテ著變ナク脂肪質ニ乏シ。窓窩又清澄ナリ。第2鼓膜ハ外面ニ薄キ粘膜炎層ヲ覆ヒ脂肪染色ニ應ズル血清ヲ容レタル細キ血管並走ス。其固有層ハ纖維狀ヲナシ内縁ヨリ著明ニ「ズダン」ニ赤色無造構ニ着染ス。第2鼓膜ニ接シ蝸牛殼外淋巴腔内ニハ僅ノ汚穢褐色雲絮物附着ス。

蝸牛迷路。蝸牛骨壁 骨質極メテ緻密ナリ。僅ニ骨板層間ニ小脂肪髓ノ介在アリ。骨質ハ各骨層間結合線又ハ髓腔周縁ヨリ無造構ニ「ズダン」色調ヲ僅ニ攝リ。骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ沈着スルモノハ、遠隔ナル頭蓋腔側外骨膜性化骨層ヲ除キテ一般ニ密ニ存ス。蝸牛殼内骨膜 菲薄。纖維性ニシテ浮腫狀ヲ呈ス。稀ニマナッセ氏ノ所謂水腫狀造構ヲ呈スル所アリ。脂肪顆粒僅ニ認メ得ラル。

外淋巴腔 清澄ナリ。

前庭膜 顆粒狀ニ潤濁シ全ク組織的の原形ヲ留メズ。且ツ多ク弛緩低下シ蝸牛殼管ヲ據ム。

骨性螺旋板並ニ螺旋神經 螺旋骨板ハ「ヘマトキシリン」ニ好染シ附近内骨膜結締組織ハ「ズダン」色調ヲ攝リテ淡赤染ス。神經纖維ハ束狀ニ融合シ附近ニ僅少ノ「ミエリン」顆粒ヲ附着ス。

コルチ器 前庭唇萎縮シ。上皮細胞内ニハ核邊緣ニ微細脂肪顆粒ノ沈着多シ。コルチ氏膜ハ線狀ニ萎縮シ無染色硝子様ヲ呈ス。内溝上細胞癒合シ顆粒狀ニ潤濁シ粗大脂肪顆粒ヲ混ズ。爾餘ノ諸細胞ハ融合萎縮シ。濃赤褐色ニ着染ス。

基礎膜 基礎膜ハ前庭唇並ニ内溝上細胞下ニ僅ニ稍

子膜ヲ認ム。他部ハ總テ崩壊組織ニ隱閉セラレ「ズダン」ニ淡赤色ニ着染ス。クラウダウム細胞。外溝上細胞等處テ融合シ螺旋隆起ハ扁平トナリ。脈絡帶又組織崩壊シ果實ス。以上諸組織ハ一様ニ赤褐色ニ着染シ數個ノ粗大赤色脂肪顆粒ヲ混ズルモノアレ共、所屬細胞明ナラズ。

螺旋紋帶 第1廻轉ニ僅ニ扁平ニ萎縮セルモノヲ留メ。他ハ總テ崩壊シ腔隙ヲ挟ム。僅ノ脂肪顆粒ノ散在性存在アリ。

骨軸 骨質ノ發育良ク石灰沈着中等度ナリ。星芒狀ヲナス骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ沈着スルモノ多ク虎斑狀ヲ呈ス。總テノ骨軸縱管内血管ノ怒張アリ。極メテ多數ノ色素細胞密集セルヲ見ル。他ニ脂肪質ヲ見ズ。

蝸牛殼神經纖維 膨隆セル胡瓜。甜瓜狀ヲ呈シ又多ク癒合シ。中等量ノ「ミエリン」顆粒飛散ス。

螺旋神經節細胞 原形質。高度ノ收縮ヲ來シ「ズダン」ニ反應スル暗黄赤色微顆粒狀ヲ呈シ。核。中心核等全ク不明ナリ。稀ニ濃赤褐色粗大脂肪顆粒ノ偏在スルヲ見ルモ神經纖維「ミエリン」顆粒ナリヤ否ヤヲ區別シ得ルハ困難ナリ。

前庭迷路。前庭骨壁 骨質極メテ緻密ニシテ殆ンド髓腔ナシ。骨細胞ノ脂肪沈着セルモノ各所ニ存シ。殊ニ内骨膜性化骨層ヲ中心性ニ極メテ多トス。

前庭内骨膜 馬鐙骨板内面ヲ被覆スル内骨膜並ニ正圓。橢圓隱窩後壁及ヒ壺腹壁ノモノハ「ズダン」ニ赤色無造構ニ着染シ。又粗大脂肪顆粒ノ沈着ヲ見ル所アリ。

外淋巴腔並ニ周圍結締組織 周圍結締組織ハ浮腫狀ヲ呈シ潤濁シテ僅ニ遺殘ス。屑零條粗大顆粒狀脂肪。腔内ニ浮漂シ且ツ圍繞邊緣ニ附着ス。

膜様前庭壁 僅ニ無染色ノ狹隘ナル硝子様膜ヲ留メ他ハ顆粒狀ニ崩壊。潤濁シ僅ノ屑零條脂肪顆粒ヲ之レニ混ズ。

内淋巴腔 清淨ナリ。

聽斑 聽石膜ヲ認メ得ズ。神經上皮ハ崩壊シ「ズダン」ニ濃赤褐色ニ着染シテ基礎膜ヲ隱閉シテ累積ス。基質結締組織ハ萎縮シ。基質内神經纖維ハ癰癰セル自然著又ハ垂狀ヲ呈シ多數ノ「ミエリン」顆粒飛散ス。

三半規管 總テ前庭迷路各部ノ所見ニ類ス。

聽櫛 「クプラ」ハ萎縮シテ尙ホ存シ。齒カニ縱纖

維構造ヲ留メ「ズダン」ニ反應スル帶紅褐色ヲ呈ス。爾餘ノ所見ハ凡テ聽斑ニ一致ス。

前庭導水管並ニ内淋巴囊 周圍結締組織ニ於ケル血管總テ充盈ス。僅ニ結締組織細胞ノ脂肪顆粒ノ沈着並ニ所々。纖維間ニ粗大脂肪顆粒ノ介在アリ。上皮細胞ハ一様ニ潤濁シ往々僅ノ脂肪顆粒ヲ沈着スルモノアリ。管並ニ囊内ニ脂肪染色ニ應ジ。「ズダン」ニ淡赤色無造構ニ着染スル淋巴液並ニ粗大脂肪顆粒ヲ見ル。

內聽道 內聽道周圍結締組織ハ強靱ナル纖維性ニシテ組織的ニ著變ナシ。唯、內聽道内並ニ圍繞上面ニ僅ノ膿球ノ附着ヲ見ル。圍繞ハ骨軸底ニ近ク部分的ニ赤色無造構。加フルニ極微細顆粒狀脂肪沈着ヲ認メ。血管内血清ノ脂肪反應ヲ呈スルアリ。內聽道内ニ存スル僅少ノ膿球ニハ僅カノ脂肪顆粒ヲ有スルモノアリ。內聽道底部ニ位シ結締組織内ニ。2、3ノ澱粉様小體アリ。中心部ハ「ズダン」ニ暗赤色ニ着染ス。神經纖維ハ共ニ直ナル自然著。胡瓜狀ヲ呈シ中等量ノ粗大「ミエリン」顆粒ノ附着。飛散アリ。

前庭神經節細胞 中等度ノ原形質收縮ヲ來シ。淡青顆粒狀ヲ呈シ。核。中心核僅ニ萎縮シテ明ニ存ス。總テノ細胞ニハ原形質内ニ濃赤褐色ヲ呈スル脂肪顆粒ノ顯著ナル存在アリ。

第4例側聽器所見。

鼓膜 中央ニ大ナル穿孔ヲ有シ。兩側穿孔端ハ平滑ナル舌狀ニ突出ス。

固有層ヲ除キ皮膚並ニ粘膜層ノ肥厚アリ。血管極メテ多ク。圓形細胞ノ浸潤アリ。皮膚層上縁ハ「ズダン」ニ無造構ニ赤染シ下層ニ於ケル細胞内ニハ赤色脂肪顆粒ヲ沈着スルモノ多シ。増殖セル鬆粗結締組織内ニハ稍々不定型ノ組織球性脂肪顆粒細胞並ニ脂肪沈着セル紡錘狀細胞多數存フ。固有層ハ健側ニ比シ遙カニ萎縮スレ共。其「ズダン」ニ依ル染色度ニ大差ナシ。

鼓室粘膜並ニ鼓室腔 鼓室粘膜ハ大小ノ乳頭狀起伏顯著ニシテ。分葉狀ヲ呈シ。浮腫狀ヲ呈スル膠樣性粘膜ノ増殖アリテ鼓室腔ヲ埋メ餘多ナル充盈血管並ニ圓形細胞ノ浸潤極メテ顯著ナリ。所ニ依リテ不定型ナル圓柱狀上皮ヲ覆ヒ細胞内ニ空胞ヲ有スルモノ多シ。稀ニ上皮細胞ノ粗大赤色脂肪顆粒ヲ沈着スルモノアレ共。個々ノ細胞ニ之レヲ認メズ。下縁内ニハ粗大脂肪顆粒。脂肪顆粒細胞。脂肪沈着セル紡錘

狀細胞等所々ニ散在ス。血管内ニ滲溜スル血清又脂肪染色ニ應ズ。狹隘ナル鼓室腔ハ膿球、纖維素網、浸出液等ヲ以テ滿タサレ、之等膿球ノ脂肪顆粒ヲ有スルモノ、粗大脂肪顆粒等、又散亂ス。

中耳骨壁 骨縁一般ニ平坦ナリ。骨細胞ノ脂肪沈着ヲ認ムルモノハ其散在密度、健側ノモノニ同ジ。

聽小骨 各聽小骨總テ存シ、深ク肉芽内ニ埋没セラレ。骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ有スルモノハ其散在密度健側ノモノニ同ジ。關節間結締織ハ圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リ、鬆組トナリ、不定型ナル脂肪顆粒細胞、脂肪顆粒ノ沈着セル紡錘狀結締織細胞等多ク、又骨縁結締織ハ「ズダン」ニ黃赤色ニ着染シ其染度ハ健側耳ニ於ケル同所ノモノニ略々一致ス。

聽小筋 鼓膜張筋ハ選擇的ニ多數ノ筋纖維ニ於テ瘤狀、連珠狀腫脹及ビ潤濁ヲ見ル。他ニ同筋纖維ニ著變並ニ脂肪質ナク筋間、筋膜ノ脂肪細胞ノ數量ハ健側ノ夫ニ大差ナシ。

馬鐙骨筋ハ筋纖維ニ著變ナク、筋膜内ニ數個ノ脂肪細胞存ス。

歐氏管 歐氏管内モ亦、鬆組結締織ノ増殖アリテ管腔狹隘ヲ來ス。上皮細胞ハ一定セズ。顯著ナル起伏多シ。管腔内ニハ膿球、組織片屑等ヲ滿ス。之等ノ脂肪所見ハ鼓室内ノ夫レニ一致ス。

耳喇叭含氣蜂窠 骨髓細胞ヲ滿タシテ廣ク存シ、中等量ノ脂肪細胞存シ、所見、健側ニ略々同ジ。

乳嘴竇並ニ蜂窠 蜂窠ハ殆ンド餘ス所ナク鑿開セラレ僅ニ數個遺殘スルノミ。鑿開面ニハ極メテ薄キ新生肉芽組織ヲ部分的ニ被覆スルノミ。骨壁尙ホ鋸齒狀ヲ呈シ、稀ニ扁平ナル造骨細胞ノ密着ヲ見ル所アリ。遺殘セラレタル蜂窠粘膜モ亦増殖ヲ來シ、充盈血管多ク脂肪顆粒細胞等アリ。且ツ其含氣腔内ニハ多クノ纖維素網ヲ滿タシ、網格内ニハ多數ノ脂肪顆粒細胞ノ懸連アリ。骨壁内ニ存スル骨細胞ノ脂肪沈着ハ殆ンド健側ニ比シテ異ナル所ナシ。

顔面神經管内並ニ膝狀神經節 鼓室腔内ニ於ケル神經骨管ニ一部缺損アリ。管内血管ハ總テ擴張シ赤血球ノ充盈アリ。他ニ附近ニハ著變並ニ脂肪質ヲ見ズ。顔面神經纖維ハ起伏多キ自然薯又ハ胡瓜狀ヲ呈シ多數ノ「ミエリン」顆粒ノ附着飛散アリ。

膝狀神經節細胞 原形質ニ2種ノ異リタル形態及ビ其脂肪反應ヲ見ルハ健側ニ於ケルモノニ同ジク、又脂肪顆粒ノ沈着モ殆ンド同ジ。

前庭窓窩並ニ馬鐙骨板附近 窓窩附近一帶ハ鬆組結締織ヲ以テ滿タサレ、其脂肪所見ハ一般の鼓室粘膜炎ニ於ケルニ等シ。輪狀靱帶ハ斜纖維狀ヲ呈シ、纖維間並ニ結締織纖維ノ脂肪顆粒ノ沈着ヲ見ルハ健側ニ比シテ稍々多量ナリ。他ハ關節軟骨縁ノ無造構、加之、微顆粒狀脂肪沈着等ハ健側ニ異ルナシ。關節軟骨、馬鐙骨板ノ所見ハ健側ニ同ジ。

蝸牛殼窓窩並ニ第2鼓膜 窓窩附近粘膜モ亦増殖ヲ來シ、窓窩狹隘ニシテ漿液樣物質、膿球ヲ充ス。膿球中ニハ脂肪顆粒細胞トシテノ存在又極メテ多シ。第2鼓膜ハ一帶ニ「ズダン」ニ赤染ス。其程度、全ク健側ニ同ジ。唯、其外面ニハ粗顆粒狀ヲナシテ之レヲ被覆スル肉芽ノ増殖アリテ粗大赤色脂肪顆粒顯著ニ沈着スルト、固有層内ニモ同側輪狀靱帶ニ認メタルト同様ノ赤色脂肪顆粒ノ沈着スルヲ異ニス。

第2鼓膜ニ接シ蝸牛殼外淋巴腔内ニハ又僅ノ汚穢雲霧物附着ス。

蝸牛迷路。蝸牛骨壁 骨質緻密ナリ。組織的並ニ其脂肪所見ハ總テ健側ニ略々一致ス。

蝸牛殼内骨膜、外淋巴腔、前庭膜、蝸牛殼管、骨性螺旋板並ニ螺旋神經、コルチ器、基礎膜、クラウザウ細胞ヨリ脈絡帶一帶、螺旋靱帶等ノ組織的並ニ脂肪所見モ亦健側ニ於ケル夫等ノモノニ等シ。

骨軸 骨質ノ發育、石灰沈着良シ。骨細胞ノ脂肪沈着スルモノ多キハ健側ノモノニ同ジ。管腔内血管多ク且ツ怒張充盈シ、又骨軸内ニ存スル色素細胞ノ數量ハ健側ノモノニ大差ナシ。唯稀ニ微ニ赤色脂肪顆粒ヲ沈着スル「プラスマ」細胞ノ存在アリ。

蝸牛殼神經纖維 螺旋神經節細胞ノ所見ハ殆ンド健側ニ異ナラズ。

前庭迷路。前庭骨壁、前庭内骨膜、同外淋巴腔並ニ周圍結締織、膜様前庭壁、内淋巴腔等ノ所見モ亦健側ノモノニ略々一致ヲ見ル。

聽斑 基質結締織内血管ノ怒張アリ。健側ニ比シ僅ニ「プラスマ」細胞ノ多キカノ觀ヲ認ムル他ハ總テ健側ノモノニ異ナラズ。

三半規管 患側前庭迷路ニ準ジ、且ツ又健側半規管所見ニ大差ナシ。

聽嚮 「クブラ」ヲ認メズ。他ハ聽斑ニ準ズ。

前庭導水管並ニ内淋巴囊 前庭導水管周圍内ニ色素細胞多シ。他ハ總テ健側ノモノニ類似ス。

内聽道 内聽道周圍結締織ハ纖維性ニシテ小部分的

ニ圓形細胞ノ浸潤アリ。血管怒張充盈ス。

又部分的ニ主ニ骨髄ノモノ無造構。加之。微細顆粒狀脂肪沈着アリ。纖維間ニハ又脂肪顆粒ノ沈着ヲ見ル。

内聽道ハ底部一帯。纖維素。網狀ニ連結シ少量ノ膿球ヲ見ル。粗大脂肪顆粒。脂肪顆粒細胞。中等度ニ散在ス。尙ホ底部ニハ數個ノ凝粉樣小體アリ。核子ハ「ズダン」ニ暗赤色無造構ニ着染ス。小體ノ數量モ健側ノモノニ比シテ大差ナシ。

神經纖維ハ着染良ク。聽並ニ前庭神經纖維共ニ自然著。胡瓜或ハ甜瓜狀ヲ呈シ一般ニ羸瘦シ。健側ニ比シ。「ミエリン」顆粒ノ產出數量ニ大差ナシ。

前庭神經節 ニ於テハ細胞間ニ小圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リ。被膜邊緣ニ僅少ノ粗大脂肪顆粒ヲ見ル。其他神經節細胞ノ組織的變化並ニ脂肪所見ハ健側ノ夫レニ異ナル所ナク。原形質内ニ存スル脂肪顆粒ノ數量ニモ亦差異アリトモ思ハレズ。

傳染徑路。本例ニ於ケル傳染徑路ハS字竇ニ於ケル血栓形成ニ依ル接觸傳染ナルベシ。

第5例 齊○ミ○。女。23年。勞働者。

初診 昭和6年6月21日。

既往症 8歳ニシテ麻疹及ビ肺炎ニ罹患セリ。他ニ現症以外ニ今日迄著患ナシ。5日前ヨリ左側ノ耳痛次イデ耳漏アリ。激シキ偏頭痛ヲ訴フ。

現症 左患側外聽道壁ニ腫脹アリ。鼓膜ハ顯著ニ腫脹發赤シ。鼓膜前上方ヨリ後下方ニ長卵圓形。顆粒大ノ穿孔アリテ搏動性ニ粘稠ナル膿汁ヲ排泄ス。右側耳健常ナリ。其他鼻腔ヲ檢スルニ左側中。下甲介ノ肥厚及ビ上顎竇著膿症アリ。

臨牀診斷 左側急性穿孔性中耳炎。

經過 即日入院セシメ22日鼓膜切開施行ス。一時多少ノ輕快ヲ見タルモ發熱頭痛ノ消退ヲ見ズ。依ツテ5月6日乳嚢竇鑿開手術ヲ施行ス。骨面ニ瘻孔ヲ見ズ。橫竇判然セズ。5月7日朝。嘔吐3回。意識瀾濁。項強直アリテ腦膜炎ノ症狀現ハル。腰椎穿刺ヲナシテ壓力ヲ見ルニ350mm水柱ヲ算シ。腦脊髓液瀾濁ス。ノンネアペルト氏反應並ニパンディ氏反應陽性ナリ。毎日「ヘサチラミン」ノ靜脈注射。腰椎穿刺ニ依リ腦脊髓液ノ除去等ヲ行フ。7月16日遂ニ鬼籍ニ入ル。約2晝夜ノ後解剖ニ附ス。

解剖診斷 化膿性腦膜炎。心臟弛緩。兩肺鬱血及ビ水腫。兩側漿液性肋膜炎。肉豆蔻肝。傳染脾。加答

兒性膀胱炎。

第3例健側聽器所見。

鼓膜 肥厚ナシ。皮膚層ハ「ヘマトキシリン」ニ濃染シ顆粒狀ヲ呈ス。外面ニ脂肪反應ニ應ズル黃赤色纖維狀角化質ノ剝離片載積ス。固有層ハ内外層共ニ一層ニ「スゲン」ニ黃赤色無造構ニ着染シ。纖維間ニ僅少ノ赤色脂肪顆粒ノ介在アリ。粘膜炎層内血管ノ擴張。充盈アリ。他ニ脂肪質ヲ見ズ。

鼓室粘膜並ニ鼓室腔 鼓室粘膜ハ整頓セル扁平上皮ヲ覆ヒテ下織。纖維性ナリ。血管ノ充盈ヲ認ムルノミニテ組織的ニ著變ナシ。上皮緣ニ附着シ僅ノ粗大脂肪顆粒ヲ認ムル他ニ脂肪質ナシ。鼓室腔又極メテ清澄ナリ。

中耳骨壁 多少ノ起伏アレ共骨面平滑ナリ。骨細胞ノ約半數ノモノハ脂肪顆粒之レニ沈着ス。

聽小骨 各聽小骨總テ骨質緻密ナリ。各關節部ニ狹長ナル軟骨組織在リ。細胞ハ殆ンド個々ニ赤色脂肪顆粒ヲ有ス。槌骨。砧骨内ニハ血管周緣ニ狹隘ナル纖維髓アリテ小脂肪細胞ヲ藏ス。骨質ハ齒カニ周緣ヨリ「ズダン」ニ無造構淡赤染シ骨細胞ノ脂肪沈着スルモノハ。馬鐙骨ニ於テ一般的密ニ存シ。槌。砧骨ニ於テハ周緣性ニ密ナリ。

聽小筋 鼓膜張筋ハ筋間結締組織ニ於ケル血管ノ充盈アリ。時ニ溢血ヲ見ル。附近ニ極メテ多數ノ脂肪細胞有リ。筋纖維ニ腫脹瀾濁アリ。馬鐙骨筋々纖維ニ著變ナク。同筋附着部腔内ニ數個ノ脂肪細胞ヲ見ル。歐氏管 組織的ニ著變ナシ。粘膜下織内ニ僅ノ脂肪細胞ヲ認ムル他ニ脂肪質ヲ見ズ。耳喇叭含氣蜂巢ハ美麗ナル脂肪髓ヲナス。

乳嚢竇並ニ蜂巢 蜂巢ハ廣キニ亘リテ存シ發育良シ。總テ廣キ含氣腔ヲ有ス。

竇並ニ蜂巢粘膜ハ扁平上皮ヲ覆ヒテ一般ニ菲薄ナリ。血管怒張ス。粘膜内ニハ殆ド脂肪質ナシ。唯。上皮緣ニ附着シ蜂巢内ニ粗大脂肪顆粒僅ニ存ス。竇壁並ニ蜂巢隔壁骨質ハ緻密ニシテ。骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ沈着スルモノノ稀ニ之レヲ認ム。

顔面神經管内並ニ膝狀神經節 鼓室腔中央ニ於ケル神經骨管ニ一部缺損アリ。骨管内ニ於ケル血管ハ總テ擴張。充盈ス。

神經纖維ハ顯著ニ膨隆。絞攣ヲ生ジ或ハ長短ヲ異ニスル胡瓜狀ヲ呈シ時ニ空胞ヲ抱クモノアリ。多量ノ「ミエリン」顆粒ノ飛散アリ。

膝狀神經節細胞 原形質ニ2種ノ形態並ニ之レニ伴フ脂肪反應ヲ見ル。1ツハ淡キ暗紫色顆粒狀ヲ成シ。周縁ニ暈ケタル中等度ノ環狀間隙ヲ挟ムモノ。他ノ1ツハ「ズダン」ニ濃赤褐色ニ反應シ不定塊狀ヲナスモノトナリ。前者ニ於テハ核尙ホ存シ明ナリ。後者ニ於テハ殆ンド之レヲ認メザルカ。極メテ濃縮シテ存ス。尙ホ原形質内ニハ細胞數ノ約 $\frac{1}{3}$ ニ於テ密集散在スル濃赤褐色微細脂肪顆粒ノ沈着アリ。

前庭竇窩並ニ馬鐙骨板附近 附近一帯ハ組織的ニ著變ナシ。竇窩内又清潔ナリ。輪狀靱帶ハ「ヘマトキシリン」ニ不染ノ硝子様ヲ呈シ幽カニ斜走細纖維並ニ纖維間ニ小紡錘狀細胞ノ陰像ヲ認メ。之等細胞ノ赤色脂肪顆粒ヲ沈着スルモノ僅ニ存シ。靱帶ノ關節軟骨緣一帯ハ中等度ニ「ズダン」ニ黃赤色ニ着染ス。關節軟骨ハ細胞。圓形ニ膨大シ核邊緣ニ顆粒狀脂肪ヲ沈着スルモノ多ク。或ハ原形質ノ筆狀脂肪沈着ヲモ見ル。

馬鐙骨板ハ内面一帯ニ尙ホ廣キ軟骨組織ヲ留メ軟骨細胞並ニ骨細胞ノ脂肪沈着ヲ見ルモノ多數存ス。

蝸牛殼竇窩並ニ第2鼓膜 竇窩附近粘膜炎モ亦血管ノ怒張及ビ皮下出血アリ。脂肪質ヲ見ズ。竇窩内ニハ僅ノ硝子球並ニ赤色粗大脂肪顆粒アリテ粘膜炎上皮縁ニ附着ス。

第2鼓膜ハ一様ニ「ズダン」ニ赤色ニ着染シ。結締組織纖維間ニモ亦僅ノ微細脂肪顆粒ヲ見ル。

蝸牛迷路。蝸牛骨壁 骨質緻密ナリ。僅ニ軟骨内化骨層ニ僅ノ小髓腔在リテ脂肪細胞ヲ充ス。内骨膜性化骨層並ニ軟骨内化骨層基質ハ「ズダン」色調ヲ攝リテ赤染ス。同層骨細胞ハ殆ンド個々ニ脂肪顆粒ノ沈着アリテ外骨膜性化骨層ニ至リテ次第ニ散在密度疎トナル。

蝸牛殼内骨膜 極メテ菲薄ニシテ骨面ニ密着ス。所ニ依リテハ浮腫狀ヲ呈シ。「ズダン」ニ淡赤色無造構ニ着染スル所アリ。

外淋巴腔 外淋巴腔周壁ニ附着シ幕狀ニ之レヲ繞リテ「ズダン」ニ暗褐色無造構ニ濃染スル淋巴液ノ滲溜アリ。

前庭膜 各廻轉ニ於ケルモノ。總テ暗褐色ニ潤濁シ對側。脈絡帶上ヲ匍匐シ。蝸牛殼管ノ領域ヲ占ム。

蝸牛殼管 前庭膜ノ低下ニ依リテ殆ンド管腔ナシ。骨性螺旋板並ニ螺旋神經 螺旋骨板ハ石灰沈着良シ之レヲ被覆スル内骨膜ハ「ズダン」ニ淡赤染シ僅少ノ

脂肪細滴其纖維間ニ介在ス。

螺旋神經纖維 ハ一束ニ融合シ。一定ノ「ミエリン」像ヲ認メ得ズ。神經束兩側ニ粗大「ミエリン」顆粒飛散セリ。

コルチ器 前庭唇ハ萎縮。潤濁シ僅ニ排列亂レ縮小セル核ヲ配ス。唇上縁或ハ核邊緣ニ僅ノ脂肪顆粒ノ沈着アリ。コルチ氏膜ハ扁平ニ萎縮シ。紆曲シ不染硝子様ヲ呈ス。爾餘ノ諸細胞ハ總テ崩壞シ低下セル前庭膜間ニ内螺旋溝ノ小隙ヲ挟ム。他ニ間隙ナク。前庭膜下ニ壓縮セラレタル細胞屑零並ニ「ズダン」ニ濃赤染スル顆粒狀物ノ存在ヲ見ル。

基礎膜 前庭唇基部並ニ脈絡帶下ノモノハ纖維狀ヲ呈シ極メテ僅少ノ脂肪顆粒ヲ認メ。他部ノモノハ硝子様ヲ呈シ。「ズダン」色調ヲ攝リテ淡赤染ス。

クラウチウス細胞。外溝上細胞。螺旋隆起並ニ脈絡帶等一帯ハ總テ崩壞シ低下セル前庭膜下ニ暗赤褐色粗大顆粒狀物ノ累積ト化ス。

螺旋靱帶 萎縮シ。結締織ハ浮腫狀ヲ呈セル疎網狀ヲ呈ス。之等結締組織纖維内外ニ赤色脂肪顆粒僅ニ散在シテ存ス。

骨軸 骨質ノ發育極メテ良ク。中等度ノ石灰沈着アリ。骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ沈着スルモノ極メテ多ク骨軸中央ヲ最トシ周縁性ニ稍々疎トナル。骨軸基底ヨリ顯著ニ。骨管腔内ニ於ケル血管ノ炎性充血或ハ顯著ナル出血アリ。大小圓形細胞ノ浸潤並ニ纖維素ヲ見ル。種々ナル形態ヲ呈スル色素細胞ハ極メテ僅少ニシテ僅ニ第2及ビ先端迴轉骨軸周縁ニ存スルヲ見ルノミ。脂肪質ハ多量ニ存シ圓形細胞ノ浸潤ヲ目撃スル所ハ粗大脂肪顆粒。稍々不定型トナレル大小脂肪顆粒細胞。或ハ浮腫狀ヲ呈セル紡錘狀細胞ノ脂肪沈着等ヲ見ル。

蝸牛殼神經纖維ハ羸瘦セル長短自然彎狀又ハ胡爪狀ヲ呈シ。多クハ融合シ。多數ノ「ミエリン」顆粒ノ飛散アリ。

螺旋神經節細胞 高度ノ原形質收縮ヲ來シ。核不明ナリ。原形質ハ「ズダン」ニ反應スル黃赤色微顆粒狀ヲ呈シ細胞被膜邊緣又ハ細胞内ニモ粗大脂肪顆粒アリ。

前庭迷路。前庭骨壁 骨質緻密ニシテ組織的ニ著變ナシ。骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ沈着スルモノハ内骨膜性化骨層ヨリ順次。外骨膜性化骨層ニ疎トナリ。骨基質ノ脂肪染色ニ應ズルハ内骨膜性並ニ軟骨内化骨

層ナリトス。

前庭内骨膜 纖維性、菲薄ニシテ骨壁ニ密着シ、馬鞍骨板内面、壺腹内面等ヲ被覆スルモノハ、赤色無造構或ハ宛然、骨壁ヨリ叢生スルガ如キ觀ヲ呈スル纖維内ニ稍々顯著ニ粗大濃黄赤色脂肪顆粒ヲ沈着スル所アリ。

外淋巴腔並ニ周圍結締織 尙ホ所々ニ網狀連結ヲナセル浮腫狀結締織アリテ、網格ニ沿フ血管ノ充盈アリ。網格内ニハ又極メテ多數ノ脂肪顆粒細胞、粗大顆粒狀脂肪等存シ、網格ヲナス星芒狀細胞モ亦脂肪顆粒ヲ沈着スルモノ多シ。

膜様前庭壁 無染色ノ基礎膜ヲ挟ミテ顆粒狀ニ潤濁セル上皮並ニ結締織層内ニハ屑零疎赤色脂肪顆粒ノ混入アリ。

内淋巴腔 膜様前庭壁ニ附着シテ僅ノ硝子球並ニ融合セル脂肪顆粒等ヲ見ル。

聽斑 聽石膜ヲ認メ得ズ。神經上皮上縁ニ赤血球ノ塊狀ニ集積スルモノアリ。神經上皮ハ崩壞シ基礎膜ヲ隱閉ス。基質結締織ハ浮腫狀ヲ呈シ、圓形細胞ノ浸潤アリ。極メテ多數ノ脂肪顆粒細胞、顆粒狀脂肪等散亂ス。

基質内ヲ走行スル神經纖維ハ羸瘦セル自然落或ハ莖狀ヲ呈シ、又ハ枯木樹枝狀ニ連リ、或ハ融合シ、極メテ多量ノ「ミエリン」顆粒ヲ産出飛散ス。

内聽道底部ヨリ聽斑基質ニ至ル神經纖維ノ走行ニ沿ヒテ圓形細胞ノ浸潤アリ。且ツ塊狀、顆粒狀ヲ呈スル脂肪質並ニ「ミエリン」顆粒等顯著ニ存ス。

三半規管 前庭迷路各部所見ニ同ジ。

聽櫛 「クブラ」ハ不定型ニ縮小シ「ズダン」ニ多ク反應スル暗紫赤色無造構ヲ呈ス。爾餘ハ聽斑ニ比シ基質内ニ圓形細胞ノ浸潤並ニ脂肪質僅少ナルヲ異ニスルノミニテ、他ハ彼ニ一致ス。

前庭導水管並ニ内淋巴囊 上皮細胞ハ腫脹潤濁シ粗大脂肪顆粒ノ僅少沈着アリ。導水管並ニ内淋巴囊内ニハ稍々著明ノ出血アリ。數個ノ脂肪顆粒細胞モ亦浮漂ス。圍繞ハ纖維性ニシテ血管ノ怒張、充盈アリ。結締織ハ部分的ニ主ニ骨條ノモノニ無造構、加フルニ微細顆粒狀脂肪沈着アリ。其他、圍繞纖維間ニハ僅ノ粗大脂肪顆粒ノ介在アリ。

内聽道 内聽道周圍結締織ハ肥厚アリ。充盈セル血管ノ増生、圓形細胞ノ浸潤アリ。大ナル紡錘狀細胞ノ脂肪顆粒ノ沈着並ニ纖維間ニ脂肪顆粒細胞ノ介在等

極メテ顯著ニ之ヲ見ル。

内聽道内ハ膿球、纖維素網ヲ以テ滿タサレ、膿球中ニハ大ナル脂肪顆粒細胞極メテ多數之レニ混ズ。内聽道底部ニハ鬆粗結締織ニ包マレ直徑50 μ 内外ヲ算スル數個ノ澱粉樣小體アリ。中心又ハ周緣性ニ「ズダン」ニ濃赤染ス。

神經纖維間ニモ亦膿球、脂肪顆粒細胞ノ存在ヲ見ル。聽並ニ前庭神經纖維、共ニ略々同様ノ「ミエリン」像ヲ呈シ羸瘦セル胡瓜、絲瓜、王瓜、又ハ莖狀等ノ種種ナル形態ヲナシ多數ノ粗大「ミエリン」顆粒ヲ飛散ス。

前庭神經節 モ亦圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リ、節細胞間ニ往々脂肪顆粒細胞ノ介在アリ。節細胞原形質ハ暗紫黄色不透明ナル中等度ノ圓形收縮ヲ來シ、核、中心核萎縮ス。總テノ細胞原形質内ニハ濃赤褐色粗大脂肪顆粒ノ沈着アリ。

第5例患側聽器所見。

鼓膜 皮膚並ニ粘膜炎層ニ高度ノ増殖アリテ鼓膜一帯ニ肥厚シ、顯著ニ小圓形細胞ノ浸潤ヲ見ル。穿孔縁ニハ膠樣結締織ヨリ成ル「ボリープ」アリ。燐寸棒狀ニ尖嘴膨大シ、赤血球充盈セル血管網、顯著ニ存ス。

皮膚層ハ外面一帯ヲ被覆シ穿孔縁ヨリ内側ニ翻轉シ粘膜炎層上皮ニ移行シ、顯著ニ脂肪顆粒ノ沈着アリ。健側ニ於ケル該層ニ比シ遙カニ多量ナリ。固有層ハ所々斷續シ且ツ萎縮、紆曲シ、黄赤色無造構脂肪沈着アリ。粘膜炎層内結締織ハ鬆粗ニシテ多クノ脂肪顆粒細胞、脂肪顆粒ノ沈着セル結締織細胞存シ、穿孔縁ニ存スル「ボリープ」内ニハ又夥シキ脂肪顆粒細胞アリ。(附圖第7圖)。

鼓室粘膜炎並ニ鼓室腔 鼓室粘膜炎ハ極度ノ増殖ヲナシ、鼓室腔ノ大半ヲ埋ム。増殖セル粘膜炎ハ多ク浮腫狀ヲ呈シ、極メテ鬆粗ニシテ膠樣結締織ニ富ム。多クノ充盈血管アリ。又所々ニ出血ヲ見ル。組織球性細胞ニ富ミ、所々ニ不定型ノ小腔隙ヲ有シ部分的ニ顯著ナル圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙ル。之等結締織ニハ一定セル上皮細胞ヲ認メズ。

脂肪質ハ極メテ多量ニシテ膠樣結締織内ニハ明ニ認メ得ラル、脂肪顆粒細胞、星芒狀、紡錘狀細胞ノ脂肪沈着アリ。總テニ非ザレ共、血管内血清ノ脂肪反應ヲ呈スルモノアリ。狹隘ナル鼓室腔並ニ結締織内ニ存スル腔隙ハ膿球、漿液性滲出物等ヲ以テ滿サレ

多数ノ脂肪顆粒細胞。顆粒狀脂肪ヲ混ジ滲出物ハ總テ「ズダンⅢ」ニ淡キ暗赤色ニ着染ス。

中耳骨壁 骨質緻密ナレ共、骨面ニ起伏多ク、結締織性骨髓ヲ滿タセル深キ裂隙ヲ以テ、迷路骨壁内ニ侵入スル所アリ。骨細胞ノ脂肪沈着スルモノ、散在密度等ハ健側ノモノニ大差ナシ。

聽小骨 槌骨ニ於ケル小頭部並ニ臍部ヲ除キ總テ増殖セル結締織中ニ埋没セラレ、又肥厚セル浮腫狀粘膜炎ニ圍繞セラル。槌骨柄並ニ臍部ハ其ノ横断面ニ於テ穿孔ニ依ル兩側鼓膜間ノ中央ニ出現シ遊離セラレタルガ爲メニ蝸局セル鼓膜固有層並ニ皮膚層ハ厚ク之レヲ被覆シ固有層ハ無造構ニ、皮膚層ハ顆粒狀ニ稍々著明ノ脂肪沈着アリ。(附圖第7圖)。

各關節間結締織モ亦圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙ル。骨質緻密ニシテ骨細胞ノ脂肪沈着、關節部軟骨ノ脂肪沈着等健側ニ類似シ、關節間結締織骨附着部ノ脂肪沈着ハ又健側ニ同ジ。唯圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リタル結締織ノ顆粒狀、塊狀脂肪沈着或ハ脂肪顆粒細胞ノ出現等ハ健側ノモノニ比シ遙々多量ナリ。

聽小筋 鼓膜張筋、馬鐙骨筋共ニ纖維ノ萎縮、潤濁アリ。特ニ前者ヲ顯著トス。筋纖維ノ脂肪沈着等ヲ見ズ。

鼓膜張筋々間ニハ多量ノ脂肪細胞アリ。健側ノモノニ比シ其量ニ大差ナシ。

歐氏管 結締織ノ増殖アリテ周圍粘膜炎ニ高度ノ肥厚ヲ來ス。上皮細胞又一定セズ。下絨内ニ多数ノ小腔隙ヲ有ス。脂肪所見ハ鼓室粘膜炎並ニ鼓室腔ニ類シ極メテ顯著ニ存ス。

耳喇叭含氣蜂窠 所見ハ殆ンド健側ニ等シク脂肪髓ヲナス。唯、歐氏管ニ近キ同蜂窠ハ輕度ノ漿液纖維素性炎症ヲ蒙ルモノアリテ脂肪顆粒細胞、脂肪顆粒ヲ有スル星芒、紡錘狀細胞等ヲ見ル。

乳嘴竇並ニ蜂窠 蜂窠ハ殆ンド餘ス所ナク半規管骨壁間近ニ至ル迄美麗ニ鑿開セラレ、搔爬骨壁ハ平坦ニシテ骨緣ハ往々狹キ帶狀ヲナシテ「ズダン」ニ無造構赤染ス。骨面ハ一帶ニ薄キ新生肉芽ヲ覆フ。肉芽ハ充盈血管ニ富メル鬆粗結締織ニシテ往々出血アリ。部分的ニ小圓形細胞ノ浸潤ヲ認メ、組織球性細胞ニ富ム。脂肪質又極メテ多ク、多数ノ脂肪顆粒細胞、塊狀、粗大顆粒狀脂肪並ニ星芒狀、紡錘狀細胞ノ脂肪沈着ヲ認メ、上層ニ近ク特ニ脂肪沈着顯著ナリトス。

顏面神經管内並ニ膝狀神經節 神經骨管ニ缺損ナシ。顏面神經管裂孔ヨリ膝部ニ至ル周圍結締織ハ圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リ、附近ノ血管ハ強度ニ擴張充盈シ又出血アリ。脂肪顆粒細胞ヲ見ル。神經纖維並ニ「ミエリシ」顆粒ノ數量ハ略々健側ノモノニ大差ナク、纖維腫大シ、且ツ蠶食狀ヲ呈スルモノ多シ。膝狀神經節内ニモ節細胞間ニ出血アリ。細胞ハ健側ニ比シ、原形質「ズダン」ニ反應シ、暗褐色塊狀ヲ呈スルモノ極メテ多シ。細胞内ニ沈着スル赤褐色脂肪顆粒ノ數量ハ健側ノモノニ大差ナシ。

前庭窓窩並ニ馬鐙骨板附近 前庭窓窩ハ増殖結締織之レヲ埋ム。馬鐙骨板ハ脫臼シ、既ニ輪狀靱帶ハ破壊セラレ、窓窩内ヨリノ肉芽代リテ之レヲ埋メ、尙ホ前庭迷路内ニ炎症ノ波及ヲ見ル(附圖第1圖)。

之等肉芽内ニハ脂肪質極メテ多ク、其組織的並ニ脂肪所見ハ増殖セル鼓室内結締織ニ類似ス。

關節軟骨ハ尙ホ僅ニ保存セラル、モ細胞萎縮ス。其脂肪沈着ハ健側ニ比シ差異アルヲ認メ難シ。馬鐙骨板ニ於ケル骨、軟骨細胞等ノ脂肪沈着モ亦、健側ニ於ケル夫レニ大差ナシ。

蝸牛殼窓窩並ニ第2鼓膜 蝸牛殼窓窩モ亦、増殖セル鬆粗結締織之レヲ滿タシ全ク腔隙ナシ。第2鼓膜モ既ニ破壊セラレ圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リ尙ホ蝸牛迷路内ニモ炎症ノ波及アリ。第2鼓膜ハ極メテ鬆粗ナル結締織ト化シ、増殖セル窓窩内結締織ト移行部ヲ確メ得ズ。一樣ニ充盈血管ニ富ミ、脂肪質極メテ多ク脂肪沈着セル結締織細胞、脂肪顆粒細胞、塊狀粗顆粒狀脂肪等顯著ニ存シ、又一面ニ微細赤色脂肪顆粒ノ沈着アリ。

蝸牛殼外淋巴腔内ニハ第2鼓膜ニ果積スル多数ノ膿球並ニ粗大脂肪顆粒アリ。

蝸牛迷路。蝸牛骨壁 骨質緻密ナリ。唯、健側ニ比シ僅ニ庭徑アルハ軟骨内化骨層並ニ外骨膜性化骨層内ニ小皸裂ノ存在アリテ纖維素並ニ脂肪染色ニ應ズル漿液樣滲出物ノ滯溜ヲ認ムルモノ在リ。他ハ組織的及ヒ脂肪所見殆ンド健側ニ類ス。

蝸牛膜樣迷路 蝸牛迷路ハ各廻轉ノモノ總テ炎症ノ波及ヲ蒙リ、内外淋巴腔、即チ鼓室道、蝸牛殼管並ニ前庭道ノ下半ニ及ビテ漿液纖維素性迷路炎アリ。諸組織並ニ諸器官即チ蝸牛殼内骨膜、前庭膜、螺旋神經、コルチ器、基礎膜、クラウチウス細胞ヨリ脈絡帶ニ至ル諸細胞、螺旋靱帶等ハ總テ破壊セラレ炎

性産物タル鬆紐結締織ノ爲ニ深く埋没セラレ。全ク原形ヲ留ムルモノナシ。

唯僅ニ「ヘマトキシリン」ニ濃染セル2雙ノ骨性螺旋板ノ存在ニ依リ鼓室道並ニ前庭道ヲ區別シ得ルノミ。鬆紐結締織ノ増殖ハ第1廻轉終止部並ニ第2廻轉起始部最モ顯著ナリ。

之等肉芽組織ニ於ケル脂肪質ハ極メテ多量ニシテ脂肪顆粒細胞ノ形態ヲ失ヒテ塊狀ニ密集スル赤色脂肪顆粒。結締織原細胞ノ脂肪沈着。粗大脂肪顆粒等夥シク。鼓室粘膜。馬鐙骨板脱臼部。蝸牛殻窓窩或ハ乳嘴部手術竈等ニ認メシ病的粘膜或ハ肉芽所見ニ大差ナシ。(附圖第10圖並ニ第11圖)。

骨軸 骨軸骨質ノ石灰沈着良シカラズ。骨細胞萎縮シ。或ハ唯星芒狀ノ骨小體ヲ見ル。骨細胞ノ脂肪沈着ハ多數存スレ共沈着量並ニ沈着細胞ノ密度ハ健側ニ比シテ稍々小ナリ。骨管腔。即チ螺旋狀管並ニ骨軸縱管ハ總テ圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リ纖維素網並ニ脂肪反應ヲ呈スル滲出液ニヨリテ充滿セラレ。骨軸部固有ノ色素細胞ノ存在ハ極メテ僅少ニシテ數フルニ足ラザルヲ奇異トス。

之等管腔ヲ滿タス纖維素内ニハ粗大脂肪顆粒。赤色脂肪顆粒ヲ有スル大小圓形細胞等多數散在ス。

蝸牛殻神經纖維 内聽道底部ノモノヨリ骨軸底附近ノモノ。尙ホ骨軸中央ヲ走行スルモノハ總テ壊死ニ陥リ全ク「ズダン」其他ノ脂肪染色ニ應ズルモノ無ク僅ニ其走行ニ從ヒテ纖維狀又ハ絲瓜。王瓜狀ノ陰像ヲ認メ。尙ホ殘存セル「ミエリン」顆粒。僅ニ散在附着ス。

螺旋神經節 第1廻轉基部ニ辛ジテ1ツノ存在アルヲ見ル。炎症ノ波及ヲ蒙リ細胞間ニ圓形細胞ノ浸潤アリ。原形質ノ萎縮。或ハ雲絮狀散伏。核ノ點狀萎縮又ハ消失等略々健側ニ類ス。細胞周縁ニ存スル「ミエリン」顆粒ハ健側ニ比シテ遙カニ僅少ナルヲ以テ2,3ノ節細胞原形質内ニ沈着セル赤褐色脂肪顆粒ハ反ツテ明ニ細胞内ノ存在ヲ知ル。

前庭迷路。前庭骨壁 骨質緻密ニシテ所見殆ンド健側ニ類似ス。只迷路囊所々ニ僅ノ小瘰裂アリテ纖維性骨髓ヲ滿タシ。炎症ノ波及ヲ思ハシムル圓形細胞ノ浸潤アリ。紡錘狀細胞ノ脂肪顆粒ノ沈着。脂肪顆粒細胞ノ存在等ヲ見ル。

前庭膜迷路 前述セル馬鐙骨板脱臼部(輪狀靱帶)ヨリ侵入セリト思ハル。炎症ハ前庭迷路内一帯ニ波

及シ。膜襌部各所ニ圓形細胞ノ浸潤アリ。特ニ正圓囊前側壁。馬鐙骨板内面ニハ「ズダン」ニ濃赤褐色不透明ニ着染スル膿球多量ニ堆積ス。

前庭内骨膜ハ微細顆粒狀ニ潤濁シ。又微細赤色脂肪顆粒一面ニ沈着ス。膜襌前庭壁既ニ破壞セラレ内外淋巴腔ノ區別ナシ。正圓囊聽斑ハ全ク炎症性破壞ヲ來シ既ニ痕跡ナク骨部ヲ基底トシ多量ノ脂肪顆粒ヲ含ム膿球ノ載積ト化シ。橢圓囊聽斑モ亦。唯存在ヲ知ルノミニテ顯著ナル圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リ。全ク組織的構造ヲ留メズ。神經纖維又其存在ヲ認メ得ズ。

三半規管 半規管骨壁モ亦。骨質緻密ニシテ骨基質並ニ骨細胞ノ脂肪沈着ハ中心性ニ多トシ。之等ノ所見ハ健側半規管骨壁並ニ患側前庭迷路骨壁ニ大差ナシ。

唯。異ナルハ蝸牛並ニ前庭骨壁ニモ僅カニ之レヲ認メ既述セルモノナレ共。不規則ニ散在スル多數ノ瘰裂アリテ Wittmaack ノ所謂病的含氣蜂窠 Pathologische Pneumatisation ヲ構成ス。特ニ半規管ニ近ク。多數存シ僅ニ半規管内骨膜ヲ距テテ膜襌迷路ト界スルモノアリ(附圖第3圖)。

之等瘰裂ノ内容ハ多ク幼弱ナル纖維髓ニシテ。膨大セル結締織原細胞。圓形細胞血管等ニヨリ滿サレ脂肪顆粒細胞。粗大脂肪顆粒等散在シ。骨縁ハ尋常ノ髓腔又ハ乳嘴蜂窠等ニ比スレバ極メテ起伏多ク平滑ナラズ。骨縁ハ同幅一樣ニ「ズダン」ニ無造襌赤染シ。往々脂肪顆粒ノ沈着セル造骨細胞多數並列ス。即チ組織像ハ胎兒。幼少兒聽器ニ認メラルル原始髓腔 Primordiale Knochen-raum. ニ彷彿タリ。

尙ホ之等瘰裂内ニ炎症ノ波及ヲ思ハシムルモノアリテ。多數ノ圓形細胞ト共ニ纖維素並ニ脂肪染色ニ應ズル膿液ノ滲溜ヲ見ルモノアリ。

膜襌半規管ハ前庭膜迷路ニ比シテ炎症性破壞僅ニ少ナク一帯ニ赤色脂肪顆粒ノ沈着セル膜襌半規管壁ヲ留ム。他ハ總テ前庭迷路ノ夫レニ一致ス。

聽 櫛 「クプラ」ノ存在ナク。神經上皮基質等總テ炎症性破壞ヲ蒙リ。神經纖維又認メ得ズ。周縁ハ脂肪顆粒ノ沈着セル多數ノ膿球ニ圍繞セラレ基質内モ亦。濃赤色粗大脂肪顆粒ニ依リテ埋メラル。

前庭導水管並ニ内淋巴囊 管。囊内ニ出血アリ。上皮細胞ハ癒合シ潤濁シ。赤色脂肪顆粒ノ沈着アリ。周圍結締織内ニハ又小圓形細胞ノ浸潤アリ。僅ノ赤

色脂肪顆粒細胞アリ。又結締組織細胞ハ顯著ニ脂肪顆粒ノ沈着アリ。管、囊内ニ赤色脂肪細滴並ニ脂肪反應ヲ呈スル淋巴液ノ滯留アリ。

内聽道 組織ハ圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リ極メテ鬆組ニシテ肥厚ス。結締組織細胞ノ脂肪沈着、脂肪顆粒細胞等多シ。

内聽道内ハ膿球及ビ鬆組結締組織、或ハ纖維素、網狀ニ連リテ之レヲ滿タシ神經纖維間ニモ圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙ル。脂肪顆粒細胞或ハ結締組織細胞ノ顯著ナル脂肪沈着アリ。

神經 ハ聽及ビ前庭神經共ニ判然タル分界線ヲ劃シテ壞疽ニ陥ル所多シ。疽死シタル神經纖維ハ全ク脂肪染色ニ應ゼズ。唯「ヘマトキシリン」ニ淡染セル細纖維ヲ見ルノミ。尙ホ脂肪染色ニ應ズルモノハ纖維間隙極メテ疎トナリ。膨隆、絞攣共ニ顯著ニシテ周縁全ク平坦ナラズ。羸瘦セル長短自然薯狀、胡瓜狀等ヲ呈シ。所々ニ不規則ナル瘤狀膨隆ヲ附着シ往々小腔胞アリ。又周縁、蠶食狀ヲ呈スルモノアリ(附圖第4圖)。

「ミエリン」顆粒ノ産出ハ健側ニ比シ特ニ多キヲ認メズ。健側内聽道底部ニ認メ得タル澱粉様小體ハ發見スルヲ得ズ。

前庭神經節細胞 組織的並ニ脂肪所見ハ健側ノ夫レニ大差ナシ。唯、節細胞間ニ脂肪顆粒細胞ヲ見ル。

傳染徑路。本例ニ於ケル傳染徑路ハ馬銼骨板輪狀韌帶ヲ破壞セル炎症ノ迷路内ニ波及シ内聽道ヲ通りテノ頭蓋腔内合併症ナルベシト推知スベキモノナランモ、迷路骨壁、到ル所ニ Wittmaack ノ所謂、病的含氣蜂窠在リテ炎症ノ波及ヲ肯定シ得ルヲ以テ、或ハ迷路炎ヲ經過セルモノト、之等含氣蜂窠ヲ中介セルモノト2者ヲ考ヘ得ルモノナリ。

第6例 布○谷○次、36年、男、職工。

初診 昭和7年5月1日。

既往症 概シテ健康ナリシト。本年3月7日、左側耳痛ヲ訴ヘ、次日耳漏アリ。4月6日耳後部ノ腫脹ヲ來セリ。

現症 左患側鼓膜ハ高度ノ發赤、膨隆アリ。鼓膜緊張部ニ穿孔アリテ濃キ膿汁ヲ排泄ス。耳後部尙ホ且ツ上前方ナル顳額部並ニ顳骨突起部一帯ニ亘ル浮腫狀腫脹アリ。耳後部ニ波動ヲ感ジ、乳嘴部尖端ニ著明ナル壓痛ヲ訴フ。右側耳ニ異常ナシ。

咽頭ニ多少ノ發赤アリ。

臨牀診斷 左側急性穿孔性中耳炎並ニ急性乳嘴突起炎。

経過 即日入院セシメ、乳嘴窩鑿開ヲ行フ。皮膚切開ヲ行フニ骨膜下膿瘍ヲ形成シ、骨面ニ瘻孔ヲ見ル。竇内ニ粘稠ナル膿汁ヲ充シ、周圍ノ蜂窠内ニモ肉芽膿汁ヲ見ル。廣ク鑿開、搔爬ヲ行フ。S字竇ニ血栓ナシ。

5月8日。頭痛ヲ訴フ。項強直發來ス。

5月9日。腦脊髄液濁濁シ、其液壓300mm水柱ヲ算ス。ノンネアヘルト並ニバンディ氏反應陽性ナリ。依ツテ其後毎日「ヘサチラミン」靜脈注射、腰椎穿刺ニ依ル脊髄液ノ除去ヲ行フ。

5月17日遂ニ鬼籍ニ入ル。

解剖診斷 化膿性腦膜炎。纖維素性肋膜炎。肺鬱血並ニ水腫。肺、腎臓濁濁腫脹。傳染脾。加答兒性膀胱炎。

第6例健側聽器所見。

鼓膜 各層ニ肥厚ナク鼓膜菲薄ニシテ組織的ニ著變ヲ認メズ。皮膚層ハ潤濁シ微細脂肪顆粒ノ沈着アリ。角化質ノ剝離片ハ纖維狀ヲナシテ「ズダン」ニ黃赤色ニ着染シ其ノ外縁ニ載積ス。固有層ハ臍輪ヲ除キテ内外層共ニ中等度ノ無造構脂肪沈着アリ。粘膜層内ニハ殆ンド脂肪質ヲ見ズ。

鼓室粘膜炎並ニ鼓室腔 鼓室粘膜炎、一般ニ菲薄ニシテ單層扁平上皮ヲ被リ平坦ニシテ下織、纖維性ナリ。上皮縁ニハ僅ニ附着スル粗大脂肪顆粒ヲ認メ、骨壁ニ接シ僅ニ部分的ノ無造構脂肪沈着ヲ見ル他、粘膜炎内ニハ特ニ著明ノ脂肪質ナシ。鼓室腔又清澄ナリ。

中耳骨壁 骨縁平滑ニシ骨質緻密ナリ。約半數ノ骨細胞ニ於テ脂肪顆粒ノ沈着ヲ見ル。

聽小骨 槌骨臍部周縁ニ廣ク、各關節部ニ狹長ナル軟骨組織ヲ留メ、稍々顯著ニ、細胞核邊緣ニ顆粒狀又ハ原形質ノ暈狀、基質ノ無造構脂肪沈着アリ。骨質ハ緻密ニシテ槌、砧骨中央ニ小ナル脂肪體アリ。骨細胞ノ脂肪沈着スルモノハ其半數ヲ占ム。

關節間結締組織ニ著變並ニ脂肪質ナシ。

聽小筋 鼓膜張筋並ニ馬銼骨筋々纖維ニ輕度ノ潤濁アリ。前者筋間及ビ筋膜内ニ極メテ多數ノ脂肪細胞集合ス。後者筋纖維ハ1、2ノモノ微細赤色脂肪顆粒ノ沈着ヲ見ルモノアリ。筋膜其他ニ脂肪質無シ。歐氏管 組織的ノ著變ヲ見ズ。管腔内ニ暗紫褐色ニ

着染スル漿液様物質並ニ僅少ノ脂肪細胞ヲ認ムル他ハ鼓室粘膜及ヒ鼓室腔所見ニ一致ス。

耳喇叭含氣蜂窠 數箇ノモノ含氣腔ヲ有シ。他ハ完全ナル脂肪體ヲナス。

乳嘴實並ニ蜂窠 實粘膜ハ極メテ菲薄ニシテ遠隔ナル蜂窠粘膜ニ中等度ノ肥厚アリ。一般ニ下絨。纖維性ニシテ單層扁平上皮ヲ覆ヒ總テ廣キ含氣腔ヲ抱ク。粘膜内ニハ僅少ノ赤色脂肪顆粒。纖維間ニ沈着スル他。脂肪質ニ乏シ。蜂窠含氣腔内ニハ。僅ニ脂肪反應ヲ呈スル漿液並ニ僅微ノ赤色脂肪細胞。粘膜縁ニ附着スルヲ除キテハ極メテ清澄ナリ。

實骨壁並ニ蜂窠隔壁ハ骨質緻密ニシテ稀ニ脂肪顆粒ノ沈着セル骨細胞ヲ見ル。

顔面神經管内並ニ膝狀神經節 神經骨管ニ缺損ナシ。管内血管擴張シ。結締織ハ纖維性ニシテ數箇ノ脂肪細胞ヲ見ル。

神經纖維ハ着染良ク胡瓜。自然薯狀ヲ呈シ。稀ニ空胞ヲ見ル。中等量ノ「ミエリン」顆粒ノ飛散アリ。膝狀神經節細胞ハ原形質及ヒ核ニ2種ノ變化アリテ等分ニ存ス。即チ1ツハ原形質幽カニ「ヘマトキシリン」ニ淡染シ周圍隙間ニ雲絮狀ニ暈ケ。核萎縮シテ尙ホ存スルモノ。1ツハ不定塊狀又ハ蝸蠖狀ノ高度ノ收縮ヲ來シ。核ハ原形質ト共ニ濃赤褐色ニ着染スルモノトアリ。細胞數ノ約 $\frac{1}{3}$ ニ於ケルモノ。原形質内ニ脂肪顆粒ノ沈着アリ。

前庭窓窩並ニ馬鐙骨板附近 附近一帯ハ組織的ニ著變並ニ脂肪質ナシ。輪狀靱帶ハ關節軟骨縁一帯並ニ内外層稍々顯著ニ黃赤色無造構。加フルニ微細顆粒狀脂肪沈着アリ。關節軟骨並ニ馬鐙骨板内面ノ廣キ軟骨組織内ニハ細胞ノ粗大脂肪顆粒ヲ沈着スルモノ顯著ニ存ス。

蝸牛殼窓窩並ニ第2鼓膜 窓窩内ニ僅ノ結締織ノ増殖アリテ數箇ノ脂肪細胞其中ニ見ラル。第2鼓膜ニ著變ナク「ズダン」色調ヲ攝リテ一帯ニ淡赤染ス。第2鼓膜内面ニ附着シ。蝸牛殼外淋巴腔内ニ僅ノ出血アリ。

蝸牛迷路 蝸牛骨壁 骨質一般ニ極メテ緻密ナリ。軟骨内化骨層並ニ内骨膜性化骨層ノ正シキ骨板層ヲ構成スル骨質ハ「ズダン」ニ淡赤色ニ着染シ。骨細胞並ニ骨球ノ脂肪顆粒ヲ有スルモノ又之レニ準ジテ遠心性ニ疎トナリ。頭蓋腔側ニ於ケル外骨膜性化骨層ニハ。殆ンド之レヲ見ズ。尙ホ軟骨内化骨層中

ニハ數箇ノ狹小ナル脂肪體在リ。

蝸牛殼内骨膜 纖維性ニシテ菲薄ナリ。脂肪質ナシ。外淋巴腔 蝸牛殼基礎廻轉ニ於テハ前述セル如ク第2鼓膜内面ニ於ケル出血部位ニ近ク數箇ノ脂肪顆粒細胞浮漂スルヲ見ル。

前庭膜 腫脹。潤潤シ蝸牛殼管對側組織上ニ低下。密接シ。僅ニ微細赤色脂肪顆粒ノ沈着(附着?)アレ共。其屬籍ハ直載シ難シ。

骨性螺旋板並ニ螺旋神經 骨性螺旋板ニ著變及ヒ脂肪質ナシ。螺旋神經纖維ハ1束ニ融合シ。束縁ニ僅少ノ微細「ミエリン」顆粒附着ス。

コルチ器 前庭唇ハ萎縮潤潤シ細胞ノ形態ヲ見ズ。僅少ノ赤色微細脂肪顆粒。散在性沈着アリ。コルチ氏膜ハ扁平。硝子様ヲ呈シ着染セズ。爾餘ノ諸細胞ハ細胞總テ崩壞萎縮シ。暗赤褐色顆粒狀ヲ呈ス。

基礎膜 基礎膜ハ狹キ硝子様ノ1線ヲ劃シ「ヘマトキシリン」ニ幽カニ淡染シ。クラウゼウス。外溝上細胞。脈絡帶等ハ一様ニ顆粒狀ニ崩壞シ。暗褐色ニ着染ス。之等ノ崩壞組織中ニ僅ノ赤色粗大脂肪顆粒ヲ混ズ。

螺旋靱帶 扁平ニ萎縮シ。結締織纖維ハ絲絮狀ヲ呈ス。殆ンド脂肪質ナシ。

骨軸 骨質ノ發育良ク。中等度ノ石灰沈着アリ。骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ沈着スルモノ多ク其散在密度大ナリ。管腔内血管ハ多ク充血シ。又多量ノ脂肪反應ニ應ズル血清ヲ容ル。其他。管腔内ニハ中等量ノ色素細胞アリ。内聽道内ヨリ圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リ。核認メ得ラザル淋巴球大ノ脂肪顆粒細胞極メテ多ク散亂ス。

蝸牛殼神經纖維ハ着染良キ長短自然薯。胡瓜狀ヲ呈シ多量ノ「ミエリン」顆粒ノ飛散ヲ見ル。

螺旋神經節内ニモ亦。細胞間ニ圓形細胞浸潤アリ。稀ニ脂肪顆粒細胞モ認メ得ラル。節細胞原形質ハ「ズダン」ニ淡黃赤色ニ反應スル高度ノ圓形收縮ヲ來シ。核ハ極メテ縮小シテ光輝ヲ發ス。稀ニ其細胞原形質内ニ赤褐色脂肪様顆粒ヲ認ムルモノアレドモ。被膜邊緣ニモ亦「ミエリン」様顆粒ノ散亂アルヲ以テ一概ニ細胞内脂肪顆粒タルヲ斷ジ難シ。

前庭迷路。前庭骨壁 骨質緻密ニシテ組織的ニ著變ヲ見ズ。骨質ハ内骨膜性化骨層。軟骨内化骨層。共ニ骨基質「ズダン」色調ヲ攝リテ淡赤染シ。骨細胞ノ脂肪顆粒ヲ沈着スルモノモ中心性ニ密ニ存ス。

前庭内骨膜 纖維性ニシテ菲薄ナリ。馬鐙骨板内面ノモノハ最も顯著。正圓、橢圓陰窩後壁ヲ被覆スルモノヨリ、壺腹部、半規管ニ懸ケ中等度ノ脂肪沈着アリテ無造構ニ赤染シ、且ツ微細黃赤色脂肪顆粒之レニ添加ス。

外淋巴腔並ニ周圍結締織 内圍幾ハ殆ンド崩壊消失シ空虛ナリ。僅ニ腫脹潤濁セル、粗網格浮漂シ、僅ノ屑零微細赤色脂肪顆粒ヲ附着ス。

膜様前庭壁 殆ンド染色セザル硝子様膜ヲ挟ミテ顆粒狀ニ潤濁セル上皮並ニ結締織層アリ。兩側ニ僅ノ赤色微細脂肪顆粒ノ混入アリ。

前庭内淋巴腔 一般ニ清澄ニシテ脂肪質ヲ見ズ。

聽斑 聽石膜ヲ認メズ。神經上皮ハ崩壊シ、暗紫褐色ノ硝子球多數塊狀ニ累積シ、此中ニ中等量ノ粗大赤色脂肪顆粒ヲ混ズ。基礎膜認メラレズ。基質結締織ハ萎縮シ1、2ノ小脂肪顆粒細胞アリ。神經纖維ハ色褪セ憔悴セル莖狀ヲ呈シ、多量ノ「ミエリン」顆粒ノ飛散アリ。

三半規管 組織的並ニ脂肪所見ハ略々前庭迷路各部ニ類似ス。

聽櫛 「クブラ」縮小シテ尙ホ存シ周縁ニ顆粒狀物ヲ附着シテ「ブダン」ニ暗赤褐色無造構ニ着染ス。

神經上皮ハ崩壊シ粗大脂肪顆粒ヲ混ジテ載積ス。爾餘ノ諸所見ハ聽斑ニ略々一致ス。

前庭導水管並ニ内淋巴囊 導水管並ニ囊圍幾ハ纖維狀ヲナシ、上皮ニ近キ網格内ニ顯著ナル出血アリ。結締織ハ極稀ニ小部分ノ赤色無造構、加フルニ微細顆粒狀脂肪沈着ヲ見ル所アリ。出血竈ニ脂肪顆粒細胞數個、赤血球ニ混ジテ存在ス。

上皮細胞ハ潤濁シ、僅微ノ赤色脂肪顆粒之レニ沈着ス。管囊内ニハ硝子小球並ニ同様脂肪顆粒細胞僅ニ浮漂ス(附圖第6圖)。

内聽道 周圍結締織ハ部分的ニ小圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リ僅カノ肥厚アリ。且ツ部分的ニ主ニ骨緣ノモノニ無造構、加之、微細顆粒狀脂肪沈着ヲ見ル所多シ。圓形細胞ノ浸潤ヲ見ル附近ハ結締織鬆粗トナリ小脂肪顆粒細胞、粗大脂肪顆粒多シ。内聽道内ニハ一面ニ纖維素網ヲ繞ラシ膿球ヲ充ス。

膿球ハ淋巴球大ノ小硝子樣ヲ呈シ、個々ニ赤色脂肪顆粒ノ僅少宛之レニ沈着ス。尙ホ内聽道底部ニ2、

3ノ核子ノ脂肪染色ニ應ズル濃粉樣小體アルヲ見ル。

神經纖維ハ着染ヨク聽並ニ前庭神經共ニ長短自然著又ハ胡瓜狀ヲ呈シ、中等量ノ「ミエリン」顆粒ノ附着或ハ飛散アリ。

前庭神經節細胞 原形質ハ中等度ノ卵圓形收縮ヲ來シ、周圍間隙大ニ「ブダン」ニ淡黃赤色ニ反應スル顆粒狀ヲナシ、核僅ニ萎縮ス。總テノ原形質内ニハ偏在シテ存スル濃赤褐色脂肪顆粒ノ沈着アリ。

第6例患側聽器所見。

鼓膜 臍部ノ現ハル、鼓室中央ニ於ケル鼓膜前半ハ、後壁粘膜ニ密ニ癒着シ、穿孔鼓膜兩端ハ共ニ肥厚ス。

皮膚層ハ厚ク不透明ニ潤濁シ、且ツ顯著ナル微細脂肪顆粒ノ沈着アリ。

又角化質剝離片ハ厚ク外面ニ載積シ顯著ニ無造構並ニ顆粒狀脂肪沈着アリ。

固有層ハ萎縮シ其「ブダン」ニ反應スル程度ハ健側ノ夫レニ異ナラズ。

粘膜層ハ最も顯著ニ結締織ノ増殖ヲ來シ多量ノ粗大赤色脂肪顆粒之レニ沈着ス。

鼓室粘膜並ニ鼓室腔 鼓室腔内ニハ高度ノ結締織ノ増殖アリテ殆ンド固有ノ空隙ヲ見ズ。増殖セル結締織内ニハ多數ノ膿腔ヲ有シ、充盈血管ニ富ム。結締織ハ鬆粗ニシテ紡錘狀細胞ノ極メテ顯著ナル赤色脂肪顆粒ノ沈着アリ。

或ハ大キサ不同ノ脂肪細胞ノ密集アリ。又部分的ニ圓形細胞ノ浸潤アリテ、脂肪顆粒細胞モ多數存ス。上皮細胞ハ一定セズ。不規則ナル圓柱狀ナル所、又ハ骰子形ナル所アリテ、單層或ハ重層シ、細胞癒合シ輪廓不明瞭ナリ。僅カノ脂肪顆粒之レニ沈着ス。狹隘ナル鼓室腔並ニ結締織内膿腔中ニハ脂肪染色ニ反應スル膿液、膿球、脂肪顆粒細胞或ハ融合セル重屈折性脂肪等多量ニ存ス。

骨緣ノ粘膜下織ニ於ケル部分的脂肪沈着ハ性狀幾ハ健側ノモノニ等シ(附圖第5圖)。

中耳骨壁 總テ健側ニ異ナルナシ。

聽小骨 砧骨ヲ發見シ得ズ。附近一帯ハ増殖セル結締織ニヨリ充盈セラル。槌骨並ニ馬鐙骨々部ニ於ケル組織的並ニ脂肪所見ハ健側ノ夫レニ大差ナシ。

聽小筋 鼓膜張筋及ヒ馬鐙骨筋纖維ニ萎縮並ニ潤濁アリ。

鼓膜張筋々間及ヒ筋膜内ニハ多量、馬鐙骨筋々間ニ2、3個ノ脂肪細胞存シ、一般ニ其數量ハ健側ニ等

シ。

筋纖維ノ脂肪沈着ヲ見ズ。

歐氏管 歐氏管粘膜炎モ亦中等度ノ肥厚アリ。腔胞ヲ挾ミテ不規則ニ癒合セル圓柱狀上皮ヲ被リ起伏多シ。

上皮細胞ノ僅少ニ粗大脂肪顆粒ヲ沈着スルモノアリ。其他、粘膜下織。管腔内所見ハ鼓室粘膜並ニ鼓室腔等ニ比シ。脂肪質僅ニ減少アレ共、所見略々夫レニ一致ス。

耳喇叭含氣蜂窠 ニ於ケル所見。又健側ノ夫レニ準ズ。

乳嘴竇並ニ蜂窠 鑿開セラレタル骨壁ハ鋸齒狀ヲ呈シ。大ナル造骨細胞並列シ骨面ニ厚キ肉芽ヲ蔽フ。肉芽内ニハ多數ノ赤色脂肪顆粒細胞。脂肪沈着セル紡錘狀細胞等アリ。造骨細胞モ亦、赤色脂肪顆粒ヲ沈着スルモノアリ。鑿開骨縁ハ「ズダン」ニ帶狀ノ黃赤色ニ着染シ。附近ニ認メラル、脂肪沈着セル骨細胞ノ散在密度ハ健側ニ等シ。新生肉芽面ニハ脂肪顆粒ヲ含ム膿球多量ニ果積ス。蜂窠ハ遺殘スルモノ少ナク搔爬セラレ。僅ニ數個ヲ留メ鬆粗結締織ヲ滿タシ脂肪所見ハ手術竇肉芽ニ類シ脂肪質極メテ多トス。額面神經内並ニ膝狀神經節 神經骨管ニ缺損ナシ。管内結締織ハ纖維性ニシテ多數ノ充盈血管ヲ抱キ。又2、3ノ脂肪細胞ヲ認ム。

他ニ著變。脂肪質ナシ。

神經纖維 着染良ク。肥瘦ヲ異ニスル自然薯又ハ胡瓜狀ヲ呈ス。「ミエリン」顆粒ノ多寡。健側ノモノニ比シテ大差ナシ。

膝狀神經節 細胞間ニ存スル結締織核僅カニ増加アリ。

他ハ總テ健側ニ異ナラズ。

前庭窓窩並ニ馬鐙骨板附近 窓窩並ニ馬鐙骨兩脚間ハ一帯ニ増殖セル結締織之レヲ埋メテ多量ノ脂肪質之レニ沈着ス。

輪狀韌帶ハ外層ハ増殖セル結締織ニ次ニ移行シ。其境界劃然セズ。其脂肪沈着ハ健側ニ大差ナク唯僅ニ斜走細纖維間ニ僅ノ脂肪顆粒ノ沈着アルヲ異ニス。關節軟骨。馬鐙骨板ニ著變ナク。軟骨細胞。骨細胞ノ脂肪沈着等ハ健側ノモノニ比シテ差異ナシ。

蝸牛殼窓窩並ニ第2鼓膜 窓窩内ハ結締織増殖シ之レヲ埋メ。第2鼓膜トノ間ニ狹隘ナル間隙ヲ挾ム。

増殖セル結締織内ニハ多量ノ脂肪沈着アリ。

間隙内ニハ。脂肪反應ヲ呈スル滲出物並ニ脂肪顆粒細胞アリ。

第2鼓膜ニ著變ナク。其脂肪染色ニ依ル染度モ亦健側ニ大差ナシ。

蝸牛迷路。蝸牛骨壁 骨質極メテ緻密ナリ。其組織的並ニ脂肪所見ハ健側ノモノニ大差ナシ。

蝸牛殼内骨膜 一般ニ纖維性。菲薄ナリ。所ニヨリテ顆粒狀ニ潤滑シ暗赤褐色ヲ呈スル所アリ。

外淋巴腔 蝸牛殼内骨膜ニ近ク數個ノ核並ニ細胞膜不明ノ脂肪顆粒細胞ノ浮游アリ。又内骨膜ニ密着シ薄キ幕狀ニ繞リテ「ズダン」ニ濃赤褐色ニ着染スル淋巴液瀦溜ス。

前庭膜 骨性螺旋板並ニ螺旋神經等ノ所見ハ健側ニ同ジ。

コルチ器 コルチ器諸細胞ハ總テ高度ノ崩壞ヲ來シ且ツ萎縮シ所見全ク健側ニ一致ス。脂肪質ノ存否。多寡判ジ難シ。

基礎膜 クラウチウス細胞。外溝上細胞。脈絡帶。螺旋韌帶等ノ組織的並ニ脂肪所見ハ略々健側ニ類似ス。

骨軸 骨質ノ發育極メテ良ク。中等度ノ石灰沈着アリ。

星芒狀ヲ呈スル骨細胞ノ脂肪沈着ハ一般ニ量僅少ナレ共極メテ密ニ存ス。骨軸縱管内ニハ顯著ナル出血アリ。又多數ノ圓形細胞ノ浸潤。並ニ骨軸基底ニ近キ管腔内ニハ。結締織ノ増殖アリ。

褐色々素細胞ハ多數散在ス。小脂肪顆粒細胞。脂肪細胞ノ散在或ハ脂肪沈着セル紡錘狀細胞等顯著ニ存シ。數量ハ健側ノモノニ比シ僅ニ増加アリ。色素細胞ノ數量ハ健側ノモノニ大差ナシ。蝸牛殼神經ハ着染良ク。羸瘦セル自然薯狀又ハ蕈狀ヲ呈シ。又融合スルモノ多ク。多量ノ「ミエリン」顆粒ヲ飛散ス。

螺旋神經節 モ亦。僅ニ圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リ。細胞間ニ僅ニ脂肪顆粒細胞ヲ認メタル他ハ總テ健側ニ類似ス。

前庭迷路。前庭骨壁 骨質緻密ナリ。唯。頭蓋腔側壁並ニ上半規管脚トノ間ニ數個ノ罅裂アリテ。總テ纖維髓ヲ構成シ。殆ンド總テニ於テ小圓形細胞ノ浸潤アリ。膿液ト思ハル、漿液樣滲出物ノ瀦溜ヲ見ルモノアリテ。「ズダン」ニ暗赤色ニ着染シ。赤色脂肪顆粒細胞。脂肪顆粒ノ沈着セル紡錘狀細胞等ヲ見ル。前庭内骨膜 殆ンド健側ノモノニ等シ。馬鐙骨板内

面。正圓。橢圓隆高後壁。各壺腹内ヲ内覆スルモノニ稍々著明ノ脂肪沈着アリ。

前庭外淋巴腔並ニ周圍結締織 内圍纖殆ンド崩壞。消失シ。腔内ニ僅ニ雲絮狀物ノ浮漂アリ。健側ニ比シ僅ニ多量ノ屑零樣粗大脂肪顆粒存ス。

膜様前庭壁。内淋巴腔等ノ所見ハ健側ノモノニ同ジ。

聽斑 聽石膜ヲ認メズ。基質結締織ニ出血アリ。他ハ組織の所見並ニ脂肪所見。健側ノモノト異ナルナシ。

三半規管 健側三半規管所見ニ同ジ。

聽梯 略々健側ニ同ジ。

前庭導水管並ニ内淋巴囊 内淋巴囊圍織ニ圓形細胞ノ浸潤アリ。結締織鬆粗ニシテ。赤色脂肪顆粒多數纖維間ニ介在ス。

導水管圍織内ニハ出血ヲ認メ。又脂肪顆粒細胞ノ存在アレ共。囊周壁ノモノニ比シ僅クナリ。

上皮細胞ハ萎縮。潤濁シ。並列亂レ。殆ンド個々ニ僅ク宛ノ脂肪顆粒沈着ス。管。囊内ニハ汚穢雲絮狀物。顆粒狀脂肪等ヲ滿タシ。數個ノ脂肪顆粒細胞アリテ。脂肪質健側ニ比シテ僅ニ多量ナリ。

内聽道 内聽道周圍結締織。内聽道。各神經纖維並ニ前庭神經節細胞等ノ所見ハ略々健側ニ於ケルモノニ一致ス。

唯ダ内聽道底部ニ位シ纖維素網ニ懸連シ。2。3ノ大ナル澱粉陳小體アルヲ異ニス。該小體ハ「ヘマトキシリン」ニ環狀ニ濃染シ。中心ノミ「ズダン」ニ濃赤染ス。

傳染徑路。本例ニ於ケル化膿性腦膜炎ニ至ル傳染徑路ヲ尋メルニ。的確ニ傳染部位ヲ指示シ得ザレドモ迷路骨壁ニハ炎症ノ波及ヲ肯定シ得ラル、皸裂數個存スルヲ以テ。之等ノ皸裂ヲ通過セル炎症ノ接觸傳染ナルベシト推知ス。

總括並ニ考案

以上實驗各例ニ於ケル健患兩側聽器ノ各所組織像ノ差異ト併セテ炎症ニ依リ出現或ハ増量ヲ認メタル脂肪質ヲ舉ゲ。又先人諸賢ノ記載ヲ文献ニ徴シテ考案セントス。猶ホ且ツ脂肪質ノ分類ヲモ附記セリ。蓋シ脂肪質分類ハ川村氏ノ脂

肪物質群屬反應表ニ據レルモノナレドモ。余ノ囊ニ行ヘル『人體聽器脂肪ノ系統的研究』ニ於テ。之レト同所ニ同一沈着像ヲ呈シ。彼我同一脂肪質ニ屬スルモノハ徒ラニ重複スル憂アルヲ以テ。各種染色ヲ省略シ唯單ニ反應ノ結果ノミヲ記セルモノアリ。

鼓膜 中耳炎ヲ有スル鼓膜ハ既ニ實驗各例ニ記載セルガ如ク炎症罹患後ノ日數或ハ鼓室内炎症機轉ノ程度ニ比例シテ其肥厚ヲ來ス。即チ主ニ皮膚層ノ肥厚。皮下並ニ粘膜層内ニ於ケル鬆粗結締織ノ増殖ナリ。固有層ハ増殖セル結締織ニ據リ壓迫セラレ。或ハ遮斷セラレテ寧ロ萎縮シ。管ニ踏闕セル殘骸ヲ留ムルモノアリ。鼓膜各層ニ於ケル脂肪沈着ヲ見ルニ健側ニ比シテ遙カニ其沈着量ノ増加アリ。其脂肪沈着ノ増量ヲ認ムル所ハ固有層ヲ除ク他ノ2層。即チ皮膚層並ニ粘膜層ナリトス。而シテ皮膚層ニ於ケルモノハ。健側耳ノ該層ニ出現スルモノト等シク微細顆粒狀或ハ無造構ニ沈着シ。川村氏ノ脂肪分類ニ從ヒテ其反應ヲ檢スルニ囊ノ余ノ研究ニ於ケル該層脂肪質ニ等シク「グリセリン・エステル」。加之。「リポイド」ナリトス。又皮膚層外面ニ附着スル同層角化質ノ剝離片(町曄)モ脂肪染色ニ應ジ。皮膚層ノ肥厚並ニ其脂肪沈着量ニ平行シ。患側ニ於テハ一般ニ多量ニ產出セリ。斯カル剝離片ニ於ケル脂肪反應ヲ見ルニ「ズダンⅢ」ニ赤褐色。「ニールブラウ」ニ淡青色。「ノイトラルロート」ニ淡赤色。「オスミーム酸」ニ灰黑色。チアチオ氏法ニ橙黃色。スミス氏法ニ深青色。フィッシレル氏法ニ暗紫色ヲ呈シ。屈光性ハ重單共ニ存シ。健患側ニ依リテ反應樣式ニ差異ナシ。鼓膜固有層ニ於ケル脂肪質ハ主ニ無造構沈着ニシテ。健患兩側ノモノ共ニ「ズダ

Ⅲ」＝黄赤色。「ニールプラウ」＝淡青色。「ノイトラロート」＝多ク陰性。「オスミーム酸」＝ハ殆ンド還元セラレズ。チアチオ氏法＝幽カ＝陽性＝シテ。スミス並＝フイッシレル氏法＝陰性ナリ。即チ「グリセリン。エステル」加之。「リポイド」ノ反應ヲ呈シ。健患側ノモノ平行シテ。年齢ノ増加＝準ジテ脂肪染色＝依ル染度ヲ増ス。而シテ鼓膜固有層＝於ケル斯カル無造構脂肪沈着ハ囊＝行ヘル余ノ系統的研究＝於テ。早キハ既ニ生後2年5箇月ノモノニ之レヲ認め。3年7箇月以上ノモノニ於テハ。多少ツノ差異コソアレ。殆ンド常在性ニ之レヲ證明シ。20歳前後＝シテ一般的＝及ビ。且ツ沈着稍々著明トナリ。漸次年齢長ズルト共ニ沈着量ノ増加スルヲ認め。疾病ノ種類等＝依リテハ何等ノ特異ナル消長ヲ認め得ザリシヲ以テ。該層＝於ケル無造構脂肪沈着ハ單ナル生理的出現ニシテ年齢ノ長ズルニ從ツテ一般的體內脂肪量ノ増加スルガ如ク。同様ニ出現スル脂肪沈着ナルベシト結論シタリ。茲ニ再ビ本實驗ヲ行ヒテ附近ニ炎症在ルニ係ハラズ。鼓膜固有層内脂肪沈着ハ染度ノ不變ナルヲ見テ余ガ前述ノ意見ノ愈々確實ナルベキヲ信ズルニ至レリ。

粘膜層＝於ケル脂肪量ハ患側ノモノ遙ニ増加セリ。主ニ増殖セル幼稚結締組織細胞或ハ組織球性細胞ノ類＝於テ之レヲ攝ルモノニシテ。紡錘狀＝脂肪顆粒ノ集積ヲ認め。或ハ脂肪顆粒細胞トシテ。或ハ又單ナル顆粒狀脂肪ノ塊狀集積トシテ存ス。而シテ其性状並ニ沈着量ノ多少ハ鼓室粘膜＝全ク平行一致スルヲ以テ次ニ譲ル。

鼓室粘膜並ニ鼓室腔 患側＝於ケル鼓室粘膜ハ。其肥厚並ニ鬆粗結締組織ノ増殖ヲ見ル。即チ粘膜ハ大小種々ナル粘膜「ポリープ」ヲ構成シ。

厚キ乳頭狀ヲ呈シ。分葉狀ヲナシ。或ハ又索狀橋梁狀ノ鬆粗結締組織ノ増殖アリ。從ツテ鼓室腔ハ次第ニ狹隘トナレリ。

肥厚セル粘膜。増殖セル結締組織内ニハ往々大小不規則ナル空隙即チ膿腔ヲ有シ。之等ノ腔隙並ニ極メテ縮小セラレテ固有ノ形態ヲ認め得ザル鼓室腔内ニハ。膿球。膿液。纖維素等ノ炎症性産物ノ瀦溜有リ。又部分的ニ顯著ナル小圓形細胞ノ浸潤アリ。組織球性細胞ノ遊出スルモノ多ク。充盈血管ノ増生アリテ樹枝狀ヲ呈セリ。

上皮ハ肥厚セル粘膜＝於イテハ圓柱狀上皮細胞ノ排列ヲ見ル所アリ。又骰子形細胞ヲ見ル所アリテ一定セズ。鼓室内ニハ不規則ニ増殖セル結締組織アルモ殆ンド上皮ヲ見ズ。上皮細胞ハ又多ク不揃ニシテ往々空隙ヲ有スルモノアリ。健患兩側ニ於ケル鼓室腔内並ニ鼓室粘膜＝於ケル脂肪質ヲ比較スルニ。患側ノモノニハ遙ニ沈着量ノ増加ヲ來ス。即チ健側ノモノニ於テモ年齢ニ依リ多少ノ差異アレドモ。稀ニ粘膜上皮細胞＝脂肪顆粒ノ沈着。下織内ニハ又僅少ノ脂肪顆粒ヲ認ムルガ如ク一般的ニ僅少ナルニ反シ。患側粘膜＝於テハ遊走細胞ノ之ヲ攝レルモノト覺シク夥シキ脂肪顆粒細胞アリ。紡錘狀稀ニ星芒狀ヲ呈スル幼稚結締組織細胞ノ脂肪沈着アリ。上皮細胞内ニテモ往々顯著ナル脂肪沈着ヲ見ル。唯上皮細胞ノ脂肪沈着ハ余ガ囊ノ系統的研究ニ於テ胎兒並ニ幼兒鼓室粘膜＝於テ認メタルガ如キ上皮細胞ノ上縁。或ハ核邊緣ニ稍々正シキ規則的沈着ヲ證明セシモノニ比スレバ。其沈着像ハ一般ニ不規則ナリ。

鼓室腔内ニ増殖セル結締組織内ニハ結締組織細胞。或ハ組織球性細胞等＝於ケル脂肪顆粒ノ他ニ。稍々陳舊組織内ニハ大小種々ナル脂肪細胞ノ存

在アリ。

狹隘且ツ不定型トナレル鼓室腔或ハ肥厚。増殖セル鼓室粘膜。又ハ結締織内ニ生ゼル腔隙ニ滯溜スル膿液モ極メテ屢々脂肪染色ニ應染シ。膿球ニモ亦脂肪顆粒ノ沈着アリ。又融合セル重屈折性脂肪ノ顯著ナル集積アリ(附圖第5圖)。

病的ニ出現セル之等脂肪質ノ分類ヲ行ヘバ、増殖セル結締織内ニ存スル脂肪細胞並ニ膿腔。鼓室腔内ニ滯溜スル膿液。又ハ融合シテ集積シ重屈折性ヲ有スル脂肪質。或ハ又血管内血液ノ脂肪染色ニ應ズルモノ等ヲ除キテハ、殆ンド各例ノモノ同一脂肪反應ヲ呈シ。「ズダンⅢ」ニ赤色。「ノイトラルロート」ニ陰性。「ニールブラウ」ニ淡青色。「オスミーム酸」ニハ灰黒色或ハ全ク還元セラレザルモノアリ。チアチオ氏法ニテハ往往陽性ニ出現スルモノアレドモ、スミス、フィッシュレル氏法ニハ全ク陰性ニシテ、殆ンド總テハ單屈折性ナリ。即チ主ニ「グリセリン。エステル」ニシテ極ク僅少ノ「リポイド」ヲ混ズルモノハ如シ。

結締織内ニ往々認メラル、脂肪細胞並ニ鼓室腔或ハ粘膜。増殖結締織内ニ於ケル膿腔等ニ融合シテ存スル脂肪質ハ「ズダン」ニ黄赤色。「ノイトラルロート」ニ陰性。稀ニ陽性。「ニールブラウ」ニ淡赤乃至淡青色。「オスミーム酸」ニ淡黒灰色。チアチオ氏法ニハ往往陽性ニシテ。他ノスミス、チアチオ氏法ニテハ全ク陰性ニ終ハル。即チ「コレステリン。エステル」。加之。「リポイド」ニシテ。一般骨髓又ハ脂肪組織内ノ夫レト同様ナリ。

血管内血液ノ脂肪反應ヲ呈スルモノ並ニ鼓室。或ハ結締織内膿腔等ニ滯溜スル膿液ハ「ズダンⅢ」ニ淡黄赤色。乃至淡赤色。「ノイトラルロー

ト」ニ陰性。「ニールブラウ」ニ淡青。「オスミーム酸」ニハ殆ンド還元セラレズ。チアチオ氏法並ニスミス氏法ニ陽性ニシテ。フィッシュレル氏法ニ陰性ニ終リ。單屈折性ナリ。即チ「リポイド」ノ反應ヲ呈ス。又第6例ニ於ケル鼓室粘膜下組織ノ骨縁ヨリ始マル無造構脂肪沈着ハ炎症ノ波及スルニ依リ組織ノ破壊ナキ限りハ健患兩側殆ンド同程度ニ出現シ。「グリセリン・エステル」。加之「リポイド」ノ反應ヲ呈シ。余ノ曩ノ研究ニ於テ約30歳頃ノモノヨリ年齢ト共ニ生理的ニ現ハレル脂肪沈着ノ1ニ該當スルモノナリ。今試ミニ鼓膜各層。鼓室粘膜並ニ鼓室腔ニ於ケル脂肪量ヲ評價シ。之レヲ健。患側ニ依リテ區別シ。尙ホ且ツ中耳炎ヲ起シテヨリノ日數。乳嚢竇鑿開手術ヨリノ時日。腦膜炎ヲ惹起シテヨリ死亡ニ至ル迄ノ日數ヲ表記スレバ次表ノ如シ。

第1表 鼓膜。鼓室粘膜。鼓室腔脂肪量評價

年 齡	性	死亡迄ノ日 時			鼓膜		鼓室粘膜		鼓室腔
		中 耳 炎 後	手 術 後	腦 着 膜 起 炎 後	皮 膚 層	固 有 層	粘 膜 層	上 下 皮 織	
第1例	10歳男	約1ヶ月	15日	10日	健側	+	+	+	+
					患側	+	+	+	+
第2例	14歳男	約4ヶ月	13日	7日	健側	+	+	+	+
					患側	+	+	+	+
第3例	14歳男	約20日	2日	4日	健側	+	+	+	+
					患側	+	+	+	+
第4例	18歳男	約1ヶ月	4日	3日	健側	+	+	+	+
					患側	+	+	+	+
第5例	23歳女	約1ヶ月	11日	10日	健側	+	+	+	+
					患側	+	+	+	+
第6例	36歳男	約70日	17日	10日	健側	+	+	+	+
					患側	+	+	+	+

即チ鼓膜。鼓室粘膜並ニ鼓室腔ニ於ケル脂肪量

ハ患側ノモノ遙ニ其増加ヲ示シ。鼓膜ニ於テハ皮膚層並ニ粘膜層内ノモノ著シク増加シ。固有層ノモノハ殆ンド健患側ニ依リ差異ナキハ既ニ鼓膜ノ部ニテ記載セル處ナリ。鼓室粘膜ニ於ケル脂肪質並ニ鼓室内ニ於ケル脂肪量ハ平行ヲ示シ。且ツ一般ニ年齢ニ依リテノ増加ヲ認メ得ベシ。

中耳炎惹起後ノ日數ヨリ之レヲ觀レバ第2例ハ最も陳舊性ノモノニシテ約4年前ヨリ慢性中耳炎ヲ患ヒ居ルモノナリ。而シテ第3例ハ此(第2例)ト同一年齡ノモノニシテ約20日前ヨリ中耳炎ニ罹患セルモノナリ。中耳炎罹患後ノ年月ニ極メテ大ナル差異アルニ不拘。出現スル其脂肪質ノ數量ニ於テ大差ナキハ極メテ面白キ對照例ニシテ。病的ニ出現スル脂肪質モ亦。年齢ト共ニ上昇スルモノナルヲ認ム。

中耳骨壁 中耳骨壁ノ組織的變化並ニ其脂肪所見ニ於テ健患兩側ニ依リテノ差異ヲ見ズ。唯第5例患側ノモノハ健側ノ夫レニ比較シ骨壁ニ凸凹多ク。往々骨罅裂多キ組織像ノ差異ヲ認メタルノミ。骨細胞。骨基質ノ脂肪沈着。脂肪沈着セル骨細胞ノ散在密度等ニ又差異アルコトナシ。

即チ附近ニ炎症ヲ有スル中耳骨壁モ一般ニ年齢ノ長ズルト共ニ脂肪沈着骨細胞ノ散在密度ヲ増シ。且ツ。余ノ曩ニ行ヘル實驗ニ比較シテ特ニ差異有リトモ思ハレズ。

聽小骨 健患側ニ依リ聽小骨ヲ比較スルニ。特ニ差異アルヲ認メタルモノナシ。即チ骨質ハ年齢ト共ニ次第ニ緻密トナリ。之レニ出現スル骨細胞ノ脂肪沈着ハ年齢ニ平行シテ其散在密度ヲ高メ。且ツ一般ニ健側ニ於ケル中耳骨壁ノ脂肪沈着骨細胞分布密度ニ匹敵ス。聽小骨周圍或

ハ關節部ニ存スル軟骨ニ於ケル軟骨細胞ノ脂肪沈着モ亦健。患側ニ依リ差異ナシ。

唯異ナルハ第4。第5例患側ノ聽小骨間結締組織ニ炎症ノ波及スルアリテ。小圓形細胞ノ浸潤ト共ニ組織鬆祖トナリ。粗大脂肪顆粒ノ沈着ヲ認メタルモノアリ。

乳嘴竇並ニ蜂窠 余ノ實驗各例ハ總テ一側ノ乳嘴竇ノ鑿開手術ヲ行ヒタルモノニシテ。該部ノ骨質或ハ固有ノ竇。又ハ蜂窠ヲ缺如シタルヲ以テ。乳嘴突起部全般ニ亘リテノ比較ヲ行ヒ得ザルモノナリ。唯手術ニ依リテ尙ホ遺殘セル蜂窠粘膜並ニ其附近ニ於ケル骨質ノ組織像並ニ脂肪所見ノ相違。手術竈肉芽並ニ附近骨部ニ於ケル組織的所見ニ合セ之ニ出現スル脂肪沈着ヲ記シ。健側ノモノニ比較シ脂肪沈着ノ狀況如何ヲ述べ得ルニ過ギズ。

健側竇粘膜ハ一般ニ菲薄ニシテ扁平又ハ骰子形上皮細胞ノ平坦ナル並列アリ。粘膜下結締組織モ亦。纖維性ナルニ反シ。患側粘膜或ハ肉芽ニ於テハ總テ浮腫狀ヲ呈シ。炎症ノ程度或ハ術後ノ時日ノ長短ニ比例スル厚キ肉芽ヲ蒙ル。肉芽表面ニハ之レヲ被覆スル上皮ヲ見ル能ハズ。肉芽組織ハ紆曲充盈血管。並ニ大小ノ圓形細胞ニ富ミ。形態大キク屢々空胞ヲ有スル狀鍾狀結締組織細胞。或ハ星芒狀細胞ヨリ成ル。

斯ル肉芽組織内ニハ一般ニ極メテ脂肪質多ク。肉芽ヲ構成スル上述諸種細胞ノ脂肪沈着ヲ見ル。即チ大小ノ脂肪顆粒細胞。紡錘狀或ハ稀ニ星芒狀細胞ノ脂肪沈着或ハ又全ク細胞ノ形態ヲ具有セザル塊狀。或ハ粗大顆粒狀等ヲナシテ顯著ニ存ス。

蜂窠粘膜ニ於テモ健側ノモノハ極メテ菲薄ニシテ。脂肪質又極メテ僅少ナリ。稀ニ僅微ノ脂肪

顆粒。或ハ脂肪細胞等ヲ認ムルニ過ギザルニ反シ。患側ノモノハ總テ肥厚シ。多クノ場合増殖セル結締織ニ依リテ滿タサレ全ク含氣腔ヲ有セズ。且ツ脂肪質又顯著ニ出現シ。脂肪顆粒細胞。脂肪沈着セル紡錘狀細胞等ヲ見。健側ニ於テ稀ニ認メラル、脂肪細胞ハ炎症ノ存スル所ニ於テハ殆ンド之レヲ見ズ。

手術竈肉芽面又ハ肉芽内並ニ患側蜂窠。結締織内ニ存スル腔隙中ニハ常ニ多少宛ノ炎症性產物タル膿球。滲出液又ハ纖維素等ヲ認メ。膿球ハ殆ンド總テノ場合。核。細胞膜等不明ノ脂肪顆粒細胞トシテ存シ。滲出液ハ多ク脂肪反應ヲ呈ス。之等病的ニ出現セル脂肪質ノ分類ハ既ニ鼓室粘膜並ニ鼓室腔ニ於テ述ベシ如ク全ク同所ノモノニ一致スルヲ以テ茲ニ省略ス。

患側ニ於テ鑿開セラレタル骨面ハ多少ナガラ凸凹アリテ一般ニ鋸齒狀ノ起伏ヲ呈シ。骨添加旺盛ナル所ハ宛然珊瑚狀ニ分歧シテ新生骨質ノ突出スルアリ。且ツ術後極メテ短時日ノモノヲ除キテハ夫等ノ骨縁ニハ圓形或ハ橢圓形ヲ呈スル造骨細胞ノ密着スルアリテ。明ニ造骨機轉ノ道程ヲ示ス組織像ナリ。而シテ之レニ伴フ特異ノ脂肪沈着ハ以上ノ如キ骨縁ニ密着シテ存スル造骨細胞ノ脂肪顆粒沈着ノミナラズ。骨添加旺盛ナル骨質ニシテ其邊緣一帯ノ脂肪染色ヲ示シ且ツ無造構ニ着染スルモノナリトス。

斯ル造骨機轉ニ伴フ特異ノ組織像並ニ其脂肪沈着ハ。余ノ囊ノ研究ニ於テモ胎兒聽器骨質ニ屢ニ認メタル所ニシテ。胎生後半期ニ於ケル造骨作用ノ特ニ盛ナル所ニ著明ナル出現ヲ見ルナリ。

而シテ本實驗ニ現ハレタル以上ノ脂肪質ノ分類ヲ行フニ。造骨細胞ノ脂肪沈着ハ一般ニ存スル

骨細胞内脂肪顆粒ニ一致スル性狀アリテ。即チ「グリセリン。エステル」ニ「リポイド」ノ混ジタルモノニシテ。骨縁一帯ニ於ケル骨基質ノ脂肪沈着ハ「リポイド」ノ反應ヲ呈スルモノナリトス。

尙ホ一般的ニハ窺ヒ得ザレドモ。遺殘サレタル骨部ニ於ケル骨細胞ノ脂肪沈着ハ健側ノ略々同所ノモノト對照シ。沈着脂肪量並ニ脂肪沈着骨細胞ノ分布密度ニ何等相違ヲ認メズ。且ツ余ガ囊ノ系統的研究ニ徴シテ該所ニ於ケル脂肪沈着骨細胞ノ出現時期ニ遲速アリトモ思ハレ難シ。即チ一括スレバ。患側乳嚢部手術竈肉芽。或ハ蜂窠粘膜ニハ顯著ナル脂肪沈着アリ。鑿開骨壁ニハ骨添加ニ伴フ特異ノ脂肪沈着ヲ證明セリ。而シテ該所ニ於ケル病的粘膜或ハ肉芽組織ニ於テモ。鼓膜或ハ鼓室粘膜ニ於ケルト等シク多少ノ個人的差異ハ存スルモ。之レニ沈着スル脂肪質モ亦年齢ニ依ル量ノ上昇ヲ目撃ス。

聽小筋 實驗各例ニ於ケル鼓膜張筋並ニ馬鐙骨筋ノ筋纖維ニ腫脹。溷濁或ハ萎縮ヲ來セルモノ多シ。患側ノ鼓膜張筋ニ於テ特ニ顯著ナルモノヲ見ル。

兩筋ノ筋纖維ニ於テ脂肪顆粒ノ沈着ヲ見タルモノヲ舉グレバ。第2例健側ニ於ケル馬鐙骨筋。第3例健側ニ於ケル鼓膜張筋並ニ馬鐙骨筋及ビ同例患側ニ於ケル馬鐙骨筋。第6例健側ニ於ケル馬鐙骨筋等ナリ。

而シテ溷濁。腫脹。或ハ萎縮ヲ伴ヘル筋纖維ト其脂肪沈着トハ多ク一致セズ。

患側ニ於ケル鼓膜張筋ニ顯著ナル腫脹溷濁或ハ萎縮ヲ各例ニ認ムルコトヨリ考フレバ。附近ニ於ケル炎症ノ存否ト聽小筋筋纖維ノ脂肪沈着トノ關係ハ。其溷濁腫脹其他ノ組織的變化ニ比シ

意義寧ろ僅少ナルヲ知レリ。

余ハ囊ノ研究ニ於テ胎兒ヨリ生後各年齢ノモノニスル脂肪沈着ヲ目撃シ。唯單ナル一時的。且ツ部分的生理機能ノ衰慫ガ原因タルベク。且ツ暫時ニシテ健常ナル筋纖維ニ復歸スベキ性狀ノモノナラント推論シタルトコロナレド。本實驗ノ成績ヨリ見テモ亦特ニ炎症ニ依ルノ病的意義ヲ附スルコトヲ得ザルナリ。

而シテスル脂肪顆粒ハ「ズダンⅢ」ニ濃赤色。「ノイトラロート」ニ陰性。「ニールブラウ」ニ青色。「オスミーム酸」ニ淡灰黑色。スミス並ニチアチオ氏法ニ陰陽性。フィッシレル氏法ニハ多ク陰性ニシテ單屈折性ナリ。即チ殆ンド總テハ「グリセリン・エステル」ニシテ僅微ノ「リポイド」ヲ混ジ居ルモノナリ。言フマデモ無ク余ノ囊ノ研究ニ於ケル同様ナル脂肪沈着ニ性狀ノ一致スルヲ見ルナリ。

尙ホ筋間或ハ筋膜ニ存スル脂肪細胞ノ數量ハ該部ニ炎症ノ波及スル無キ限り健。患側ニ依ル數量的差異ヲ見ル能ハザリキ。

又性狀ハ「コレステリン・エステル」加之「リポイド」ノ性狀ヲ保有シ。囊ノ研究ニ於ケルモノト同一ナリ。

耳喇叭骨部ニ於ケル骨細胞ノ脂肪沈着。同蜂巢内ニ存スル脂肪細胞ノ數量等モ亦該所ニ於ケル炎症性浸潤無キ限り健。患側ニ依リテ特ニ差異アルヲ認メズ。唯年齢ト共ニ増加アリ。

僅ニ。第2例患側。耳喇叭含氣蜂巢ハ炎症ノ波及ヲ蒙リテ。髓腔内ニ脂肪反應ヲ呈スル炎症性滲出物ノ渫溜。纖維素。圓形細胞等多ク存シ。且ツ夥シキ之等細胞ノ脂肪顆粒ノ沈着ヲ見ル。斯ルモノニ於テハ。寧ろ。脂肪細胞ノ極減或ハ消失アリ。

前庭窓窩附近 囊ノ研究ニ於テ20歳前後ヨリ30歳頃ニ至ルマテ選擇ニ。30歳頃ヨリ常在性ニ沈着スル輪狀靱帶邊緣又ハ靱帶内外層ニ現ハル。無造構。加フルニ微細顆粒狀脂肪沈着ハ本實驗ニ於テモ健。患側同程度ニ現ハレ。其脂肪性狀モ亦兩側ノモノ共ニ「グリセリン。エステル」ニ僅少ノ「リポイド」ヲ混ジタルモノニシテ囊ノ研究ニ於テ記述セシ該部ニ出現ノモノニ一致スルヲ見ル。唯。第5例患側ノ如キ既ニ馬鐙骨板ニ病的脱臼ヲ認メ。輪狀靱帶ハ全ク被壞セラレ肉芽ヲ以テ補填セラル。ガ如キ組織的著變アルモノニ於テハスル脂肪沈着ヲ認メズ。

又健側ニ於ケル輪狀靱帶結締組織ハ細纖維性ニシテ走行整然タルニ反シ。患側ノモノハ一般ニ稍稍鬆粗ニシテ僅ニ浮腫狀ヲ呈シ。纖維間ニ小卵圓形又ハ紡錘狀細胞ノ介在スルヲ見ルモノ多シ。且ツ之等細胞内或ハ纖維間ニハ健側ノモノニ較ベ多量ノ粗大脂肪顆粒ノ沈着スルヲ見ル。其脂肪性狀ハ「ズダン」ニ赤色。「ニールブラウ」ニ淡青乃至淡赤。「ノイトラロート」ニ多ク陰性。重屈折性ナク。「オスミーム酸」ニ還元セラレズ。スミス。チアチオ。フィッシレル氏法ニ對シテ陰性ニシテ。即チ「グリセリン・エステル」ナルヲ知ル。

余ノ囊ノ研究ニ於テ此種ノ脂肪質ハ主ニ胎兒。幼少時ニ於ケル輪狀靱帶ニ之レヲ認メ。成人ト共ニ強靱ナル結締組織或ハ彈力纖維ノ置換シ。コレニ依リテ消失スルモノナルヲ報告シ。是レ1ツノ退行性萎縮ニ伴フトコロノ代謝產物ト看做スベキモノト推測セル所ナリ。本實驗ニ於テ患側ニ多量ノ同様脂肪沈着スルハ是レ病的ニ昂進セル代謝現象ニ依リ出現或ハ増量セシモノト觀ルベシ。

馬鐙骨板關節軟骨＝見ル軟骨細胞内＝沈着スル粗大脂肪顆粒。軟骨細胞原形質ノ暈狀或ハ軟骨基質ノ無造構脂肪沈着。特ニ輪狀靱帶接合縁ノモノニ著シク出現スル等々ノ諸所見ハ健。患側ニ依リテノ差異ヲ證明シ得ズ。又年齡的ニ増加スルヲ認ムルノミナラズ囊ノ研究ニ比較スルモ大差ナキヲ知ル。

蝸牛窓窓窩附近 第2鼓膜＝組織の著變ヲ認メタルハ第5例患側＝於ケルモノニシテ圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リ。第2鼓膜固有層ハ極メテ鬆粗ナル結締織ト化シ顯著ナル脂肪沈着アリ。他ノ5例＝於テハ患側窓窩内＝炎症ノ存在アレドモ。健側ノモノト組織像＝於テ大差ナシ。余ノ囊ノ研究＝於テ20歳以後ノモノヨリ常在性ニ現ハレ。年齡ト共ニ沈着量ヲ増シ。病的意義ヲ認メ得ザリシ第2鼓膜固有層ノ無造構。之レニ加フルニ微細顆粒狀脂肪ノ沈着スルハ。本實驗＝於テモ上述第5例ヲ除キテハ健患兩側ニ同様ニ出現シ。脂肪性状＝於テ差異ナク。鼓膜固有層＝於ケル脂肪沈着ト等シク。主ニ「グリセリン・エステル」並ニ「リポイド」ノ反應ヲ呈セリ。

唯。實驗第2。第3。第4例ノ年齡20歳以前ノモノニ出現シ。僅ニ早期ヒルカノ傾向アレドモ囊ノ研究＝於テモ早キハ生後2年ノモノニ出現シ。後。選擇的ニ往々之レヲ見タルモノアリ。且ツ健。患側同時ニ且ツ同程度ノ沈着ヲ認メ得ラルハヲ以テ。一概ニ炎症ニ依リテノ沈着量ノ増加トモ看做シ得ザルベシ。

僅ニ健。患側ヲ比較シテ脂肪沈着＝於ケル相違ヲ見タルハ第2鼓膜固有層纖維間ニ沈着スル脂肪顆粒ノ患側ノモノニ特ニ多量ニ出現スルコトナリ。此種ノ脂肪沈着ハ先ニ輪狀靱帶ニ於テモ

之レヲ認メ記載シタル所ニシテ。又囊ノ系統的研究＝於テハ幼少兒ノ第2鼓膜＝主ニ之レヲ認メ。青少年ノ組織益々緻密トナルニ從ヒテ消失セル脂肪顆粒＝類似シタルヲ以テ。幼若細胞ノ代謝産物ト見ルベキモノナラント云ヘルトコロナリトス。

患側＝於ケル第2鼓膜＝此種ノ脂肪顆粒ノ増加ヲ認メタルハ又病的ニ昂進セシ代謝現象ノ結果トモ看做シ得ベシ。脂肪性状ハ主ニ「グリセリン・エステル」ナリトス。

迷路骨壁 迷路囊ヲナス蝸牛。前庭並ニ各半規管骨壁＝於イテ其健。患側ヲ比較シテ。特ニ脂肪所見＝差異アリト認ムベキモノナシ。唯。組織内ニ特異ノ所見ヲ認メタルハ1個。即チ第5例＝於ケル患側聽器ニシテ。迷路骨壁各所＝不規則ニ散在スル多數ノ罅裂アリ。深在性ノモノハ蝸牛殼或ハ半規管等ノ内骨膜ニ接シテ存シ。此モノハ Wittmaack ガ竇顆骨＝於ケル蜂巢トシテ中耳内炎症ノ波及スルニ重大ナル關係アルヲ力説シ。之レニ病的含氣蜂巢 Pathologische Pneumatisation ナル名稱ヲ與ヘタルモノナリトス。

之等病的含氣蜂巢ノ内容ハ幼弱ナル纖維髓ニシテ。肥胖セル結締織原細胞。圓形細胞。血管ニ富ミ。罅裂骨縁ハ鋸齒狀ノ起伏多ク全ク平滑ナラズ。脂肪質ハ骨髓内ニ脂肪顆粒細胞。結締織原細胞ノ脂肪顆粒ノ沈着等ヲ見ル。又骨縁一帯ハ同幅ナル無造構脂肪沈着ヲ呈シ。往々骨縁ニ密着シテ脂肪顆粒ヲ有スル造骨細胞多數並列シ。正常ノ胎兒。幼少兒ノ迷路骨壁＝認メ得ラルハ。原始髓腔 Primordiale Knochenraum ＝於ケル組織像並ニ其脂肪所見＝該當スベシ。即チ斯ル迷路囊＝於ケル病的含氣蜂巢ノ存在ハ骨壁ノ

部分的發育不全ト看做スヲ得ン。

其他、囊＝モ屢々之レヲ認メタルモノナレドモ本實驗例中＝モ之レヲ發見セルモノ＝軟骨殘留。耳硬化病竈並＝Mayerノ所謂迷路骨壁自然骨折トモ看做スベキモノアリ。

軟骨殘留(第1例健、患側、第3例患側)＝於テハ「ヘマトキシリン」＝不染ノ軟骨基質ヲ廣ク有シ。軟骨細胞ハ圓形、卵圓形ヲ呈シテ疎＝存シ。同軟骨組織周縁一帯＝ハ、之レヲ繞リテ骨球多數集合シテ高度ノ石灰沈着アリ。而シテ軟骨細胞内＝ハ各例ノモノ總テ赤色乃至黃赤色脂肪顆粒ノ沈着スルアリ。又軟骨細胞膨大シ。細胞原形質ノ暈狀、或ハ軟骨基質ノ無造構脂肪沈着ヲ伴ヒ居ルモノアリ。周縁＝存スル骨球内＝ハ核邊緣＝又著明ノ脂肪顆粒ノ沈着スルアリ。

耳硬化病竈(第3例患側)＝於イテハ中央＝纖維髓ヲ擁シテ其周圍＝ハ軟骨性化骨トモ見ルベキ緻密骨質アリテ紆曲セル細纖維性ノ骨板層ヲ構成セリ。該緻密骨質ノ周縁＝ハ之レヲ圍繞シテ「ヘマトキシリン」＝強染スル大小不同ノ骨球累々トシテ存在ス。而シテ脂肪質ハ内部ナル緻密質、骨細胞ノ脂肪沈着、周縁骨球ノ核邊緣＝顯著ナル脂肪沈着、骨球原形質或ハ稀＝其間質ノ暈狀又ハ無造構脂肪ノ沈着スルヲ見ル。

Mayerノ所謂、迷路骨壁自然骨折(第3例患側)ナルモノハ前庭壁＝認メラレ帶狀＝狹長ナル結締組織ヲ挾ミテ骨球、軟骨組織ノ錯綜スルアリテ組織學的＝假骨 Callus＝類似シ。脂肪質ハ結締組織ノ無造構或ハ顆粒狀脂肪沈着、附近＝於ケル骨、軟骨細胞並＝骨球ノ脂肪沈着顯著ナリ。概シテ斯卡ル骨變化ヲ伴フ所＝於テハ正常ナル他部骨組織＝比シテ脂肪質極メテ多量＝沈着スレ共。余ノ囊ノ研究＝現ハレタル同種病竈＝於

ケル脂肪質並＝沈着量＝比較シ特＝差異アリトモ思ハレズ。

又一般＝迷路骨壁骨細胞ノ脂肪顆粒ノ沈着ハ各例ヲ通ジ健患兩側＝於テ同程度＝認メラレ。特＝沈着量並＝沈着骨細胞ノ散在密度ノ差異アリトモ思ハレズ。且ツ脂肪沈着セル骨細胞ノ存在ハ一般的＝蝸牛骨壁＝於テハ軟骨内化骨層＝最も多ク現ハレ内骨膜性化骨層之レ＝次ギ。外骨膜性化骨層＝漸次疎トナル。前庭並＝各半規管骨壁＝於テハ内骨膜性化骨層ヲ最トシ。次第＝遠心性＝疎ナル分布ノ程度ヲ呈ス。斯ル所見ハ既＝囊＝行ヘル系統的研究＝於テ詳細ニ記載セル所＝シテ、又中耳炎或ハ化膿性腦膜炎等ノ如ク附近＝炎症ノ存在スル＝於テモ不變ナルヲ知レリ。迷路骨壁或ハ又他部骨細胞内＝沈着スル脂肪質ハ主＝「グリセリン・エステル」＝シテ、多量＝沈着スルモノハ「コレステリン・エステル」ヲ主ナルモノトシ。且ツ常＝多少トモ「リポイド」ヲ混ジ居ルモノナリ。

又骨基質ノ無造構脂肪沈着モ青壯年者(第5、6例)ノモノニ之レヲ認メ、其出現ハ多ク骨細胞ノ脂肪沈着ヲ認メタル部位＝於ケル骨基質＝一致シ。又緻密ナル骨質＝於テ之レヲ認メ、健患側＝依ル染度＝差異アルヲ見ズ。

蝸牛膜樣迷路 蝸牛殼内骨膜、同外淋巴腔、前庭膜、蝸牛殼管、骨性螺旋板、コルチ器、基礎膜、クラウデウス細胞、螺旋隆起、脈絡帶並＝螺旋韌帶等ノ脂肪質檢索ノ結果ヲ表示スレバ、第2表ノ如シ。表中＝士トアルハ組織ノ崩潰或ハ顯著ナル溷濁ヲ伴ヒ居ルモノニシテ確實＝該組織細胞ノ脂肪沈着ナリト明言シ得ザルモノナリ。

第 2 表 蝸牛膜様迷路脂肪量評價

	年 齡	性	死 亡 迄 ノ 時 日				蝸 牛 骨 膜	外 淋 巴 腔	前 庭 膜	蝸 牛 殼 管	コ ル チ 器	基 礎 膜	ク ラ ウ ウ 細 胞	螺 旋 隆 起	脈 絡 帶	螺 旋 靱 帶
			中 耳 炎 後	手 術 後	腦 膜 炎 惹 起 後											
第 1 例	10 歳	男	約 1 ヶ月	15 日	10 日	健側	—	—	±	—	±	—	±	±	±	—
						患側	—	—	±	—	±	—	±	±	±	+
第 2 例	14 歳	男	約 4 ヶ年	13 日	7 日	健側	+	±	±	±	±	+	±	±	±	+
						患側	+	±	±	±	±	+	±	±	±	++
第 3 例	14 歳	男	約 20 日	2 日	4 日	健側	—	+	—	—	+	+	+	—	+	+
						患側	—	+	±	±	+	+	—	—	±	+
第 4 例	18 歳	男	約 1 ヶ月	4 日	3 日	健側	+	—	—	±	±±	±	±	±	±	+
						患側	+	—	—	±	±±	±	±	±	±	+
第 5 例	23 歳	女	約 1 ヶ月	11 日	10 日	健側	+	++	±	±	±±	+	±	±	±±	+
						患側	纖維索性迷路炎アリ鼓室道、蝸牛殻管ヲ埋メ前庭道ノ下半ニ及ビテ肉芽之レヲ滿タシ。顯著ナル脂肪沈着アリ。									
第 6 例	36 歳	男	約 70 日	17 日	10 日	健側	—	++	±	±	±±	—	±	±	±±	—
						患側	±	++	±	±	±±	—	±	±	±±	—

即チ各例＝於ケル健。患側ヲ比較スルニ特ニ沈着部位並ニ量ノ差異アルヲ認ムル能ハズ。只第 5 例＝於ケル患側。蝸牛迷路ハ極メテ顯著ナル化膿性迷路炎ヲ合併シ。各廻轉鼓室道並ニ蝸牛殻管内ニハ炎症ニ依リテ生ジタル鬆組結締織ノ増殖アリテ。蝸牛殻管並ニ鼓室道ヲ埋メ。尙ホ前庭道下過半ニ及ブガ如キモノニ於テハ其結締織内ニ極メテ顯著ナル脂肪沈着アリ。即チ水腫狀ヲ呈シ肥胖セル結締織原細胞。組織球性細胞等ノ脂肪顆粒ノ沈着。或ハ粗大脂肪顆粒ノ集合アリ。其沈着ノ状態並ニ之レニ沈着スル脂肪ノ性状ハ鑿開手術後ノ骨面ヲ被フ肉芽ニ彷彿シ。同所或ハ鼓室其他ノ粘膜＝於ケル脂肪質ニ等シク「グリセリン、エステル」ヲ主トシ復タ「リポイド」ヲ混ゼリ。

蝸牛殻内骨膜ノ脂肪沈着ハ結締織纖維或ハ纖維

間ニ極メテ少量ノ赤色脂肪顆粒ヲ認メ。健。患側ニ依リテ特ニ差異アルヲ見ズ。

又第 5 例健側ノモノニ於テハ水腫狀ニ腫脹且ツ濁濁ヲ來シ淡ク無造構ニ脂肪反應ヲ呈スルヲ認メタリ。鼓室道。前庭道並ニ蝸牛殻管内ニハ往往硝子様小球ト共ニ脂肪顆粒ヲ有スル同様の圓形細胞。脂肪顆粒等ノ浮漂スルヲ見ル。多ク骨軸内或ハ内淋巴囊。前庭導水管等ヨリ遊走スルモノ、如ク。夫等ノ箇所ニ於ケル脂肪顆粒細胞ノ性状並ニ數量ニ正比例ス。

又往々之等管腔内ニハ淋巴液ト覺シキ液狀物ノ脂肪反應ヲ呈シテ「ズダン」ニ濃赤褐色ニ着染シ幕狀ニ周壁ヲ繞リ存スルヲ見ルモノアリ（第 2 例。兩側。第 3 例。患側。第 5 例。健側。第 6 例。患側）。

斯ル淋巴液ノ脂肪反應ハ囊ノ研究ニ於テモ各期

ノモノニ之レヲ認メ、血管内血清ノ脂肪反應ト全ク同様ニシテ「リポイド」ニ類シ。囊ニハ Hypercholestrinämie ノ一部現象ト看做スベキモノナルベシト結論セル所ナリ。

前庭膜 前庭膜ハ總テ死後ノ崩潰ニ依リ顆粒狀ヲ呈シ、往々微細脂肪顆粒ノ沈着ヲ見ルモノアレドモ、顯著ナル腫脹、濁濁ヲ伴ヒ居ルヲ以テ確實ニ該膜ノ脂肪沈着ナリト判定シ得ラル、モノモ殆ンドナシ。

コルチ器 螺旋橈前庭唇ニ於ケル脂肪質ハ多ク上皮細胞ノ上縁又ハ細胞核邊緣ニ微細脂肪顆粒ノ沈着ヲ認メタリ。此脂肪沈着モ個人的ニ多少ノ差異アレ共、健、患側ニ依リ沈着量ノ差異ナク、脂肪質ノ性狀ニ於テモ、余ノ囊ノ研究ニテ同所ニ認メタルモノニ屬スベク、「グリセリン・エステル」並ニ「リポイド」ノ反應ヲ呈セリ。

一般ニコルチ器ハ採取セル標本總テ相當ノ長キ時間ヲ經過セルモノ、ミニテ惜ムラクハ完全ナル細胞形態ヲ具備セルモノナシ。殆ンド總テハ組織崩潰シ、屑零様顆粒ノ塊狀或ハ丘陵狀ニ基礎膜上ニ載積シ、「ズダン・ヘマトキシリン」染色ニ依リ汚穢暗赤褐色ニ着染ス。之等屑零様顆粒狀物中ニ混ジ、赤色脂肪顆粒ヲ認ムルモノ又多ケレ共、神經「ミエリン」顆粒トノ區別モ亦困難ニシテ、且ツイヅレノ細胞ノ脂肪沈着ナリヤヲ的確ニ斷定シ得ラル、モノ僅少ナリ。唯僅ニ第3例ノモノハ兩側聽器コルチ器ニ於テ僅ニ萎縮セル形該ヲ留メ、内溝上細胞並ニ、**ダイテルス氏細胞**、外有毛細胞附近ニ脂肪顆粒ノ沈着ヲ見タリ。而シテ該脂肪顆粒ノ性狀モ亦「グリセリン・エステル」、加之、「リポイド」ノ反應ヲ呈シ、全ク囊ノ研究ニ於ケルモノニ一致シ、健、患側ニ依リテ性狀並ニ沈着量ノ差異ヲ見ザリキ。

基礎膜 基礎膜ニ於ケル脂肪質ハ前庭唇基部並ニ螺旋靱帶ニ於ケル螺旋隆起、脈絡帶基部ノ纖維狀ヲ呈スル所ニ微細脂肪顆粒トシテ現ハル、モノ多シ。該脂肪質モ健、患側ニ依リ沈着量ノ差異ナク、脂肪性狀トシテハ主ニ「グリセリン・エステル」ナリ。

他ハ硝子様ノモノニシテ基礎膜一帯ニ亘リ「ズダン」ニ淡赤色或ハ淡黃色ニ着染セリ。

脂肪分類ニ從ヘバ「リポイド」ニ屬シ、多ク健、

患側ニ同時ニ現ハル。斯ルモノハ囊ノ研究ニ於テハ死後ノ變性ニ算入セルモノナリトス。

クラウヂウス細胞、螺旋隆起、外溝上細胞、脈絡帶等ニ於テハコルチ器ト共ニ之等諸組織ノ死後崩潰着シク、殆ンド總テハ顆粒狀ニ崩潰載積シ、細胞ノ形態ヲ留ムルモノナシ。之等ノ載積物ハ「ズダン、ヘマトキシリン」染色ニ依リコルチ器ト同様ニ暗赤褐色ニ着染シ、脂肪質ノ有無ヲ檢スルニ困難ヲ感ズルモノナリ。只死後比較的短時間ナリシ第3例ニ於ケル健側クラウヂウス細胞及ビ脈絡帶ニ確實ニ其脂肪沈着ヲ認メ得タリ。性狀ハ同一標本ニ於テコルチ器内ニ認メタルモノニ同ジ。

螺旋靱帶 螺旋靱帶ハ比較的保存セラル、モノ多キヲ以テ其脂肪質ノ有無ハ他ノ膜様迷路内諸組織中稍々明ナリ。唯、靱帶結締組織纖維ノ濁濁或ハ腫張ヲ伴ヒ居ルヲ以テ確實ニ結締組織細胞又ハ間質ニ存スル組織球性細胞等ノ脂肪沈着ナリト斷言シ得ラル、モノ多カラズ。而シテ患側ノモノハ健側ノモノニ比シ僅ニ多量認メラル、モノアレドモ概シテ沈着量ニ大差ナシ。之等脂肪性狀ヲ見ルニ、「ズダンⅢ」ニ赤色、「ニールブラウ」ニ淡青色、「ノイトラロート」ニ多ク陰性、「オスミーム酸」ニハ殆ンド還元セラレズ。**シミ**

ス並ニチアチオ氏法ニ僅ニ陽性ニシテ、フィッシュレル法ニハ陰性ナリ。即チ主ニ「グリセリン・エステル」ヲ主成分トシ之レニ僅ニ「リポイド」ヲ混ジ居ルモノニシテ、又健。患側イヅレモ脂肪性状相等シ。

骨軸部 骨軸部ニ於テハ第4例健側ノモノヲ除キテハ各側ニ於ケルモノ總テ圓形細胞ノ浸潤。又ハ針狀或ハ粗網狀ノ纖維素ノ存在シテ、確實ニ炎症ノ波及セルヲ肯定シ得ベシ。即チ化膿性腦膜炎ノ内聽道ヨリ骨軸ニ於ケル骨軸縱管或ハ同螺旋狀管ヲ通過シテ迷路内ニ炎症ノ波及セントスル状態ヲ示スモノナリ。(唯、第5例患側ノモノハ馬鐙骨板ニ病的脱臼アリテ顯著ナル化膿性迷路炎アリ。正圓囊聽斑ハ全ク炎症破壊ヲ蒙リ。其内聽道ニ至ル徑路ニ沿ヒ前庭神經ハ炎症ニ依ル壞死ヲ來シ。骨軸ニ於テモ炎症破壊ヲ來シ。骨質ハ全ク壞疽ヲ起セリ。故ニ本例ニ於ケル化膿性腦膜炎並ニ迷路炎ノ成立機轉ハ馬鐙骨板輪狀靱帶ヲ破壊セル炎症ノ迷路内化膿ヲ來シ。骨軸或ハ聽斑ニ於ケル神經徑路ニ沿ヒテ頭蓋腔内炎症ヲ惹起セルモノト看做スヲ至當トスベシ)。即チ一旦耳性化膿性腦膜炎ヲ惹起セルモノガ、又逆ニ内聽道底ヨリ骨軸管腔ノ鬆粗ナル組織間ヲ通りテ將ニ迷路内化膿ヲ起サントスルノ像ナリ。斯クノ如ク頭蓋内炎症ノ再ビ迷路炎ヲ惹起スルコトニ關シテハ、既ニ多數ノ文献アリ。其感染徑路ニ就テ Heller, Lucae, Steinbrügge, Goerke, 細谷, 土岐, Alt, 中村登, Nager, 大谷氏等ハ内聽道ヲ經タルヲ認メ。又 Goerke, 松森氏ハ蝸牛殼導水管ヲ徑路トセルモノヲ認メタリ。

其他 Goerke ハ上述2徑路ノ他ニ前庭導水管ヲ擧ゲ、Borsch ハ内聽道及ビ兩導水管ノ他ニ鉛直

半規管ノ癭孔ヲ擧ゲタリ。

即チ主ナル感染徑路ハ内聽道ヲ第1トシ。蝸牛殼導水管ヲ第2トシ。次イデ前庭導水管ヲ屈指スベシ。余ハ本實驗ニ於テ其感染徑路ヲ尋ヌルニアラザレ共。唯、其徑路ヲ記シ文献ノ一端ニ資スルノミ。即チ余ノ實驗ニ於テ現ハレタル腦膜炎性迷路炎ノ徑路ハ殆ンド總テ内聽道ニシテ。尙ホ1、2ノモノ内淋巴囊ニ圓形細胞ノ浸潤ヲ認メタルモノアレドモ。内淋巴囊並ニ前庭導水管ノ部ニテ記載スベシ。斯クノ如ク骨軸内ニ炎症ヲ認メタルモノニ於テハ又該部ニ脂肪質ノ出現多ク。管腔内ニ脂肪顆粒細胞。結締組織細胞ノ脂肪顆粒ノ沈着。脂肪沈着セル星芒狀細胞。或ハ又粗大脂肪顆粒トシテ散在シ。膿液ト思ハル、漿液性滲出物ノ脂肪染色ニ反應スルモノ等ヲ見ル。

之等ノ諸細胞内ニ沈着スル脂肪顆粒。或ハ散在スル顆粒狀脂肪ハ「ズダンⅢ」ニ赤色。「ニールブラウ」ニ淡青色。「ノイトラルロート」ニ殆ンド陰性。單屈折性ニシテ。「オスミーム酸」ニハ鹵カニ淡黑灰色。チアチオ氏法ニ陽性。スミス並ニフィッシュレル氏法ニハ殆ンド陰性ナリ。即チ「グリセリン・エステル」加之「リポイド」ナリトス。漿液性滲出物ノ脂肪反應ハ既ニ鼓室。其他ニ於テ述べタルモノニ等シク。主ニ「リポイド」ノ反應様式ニ準ズ。而シテ骨軸ニ出現スル之等ノ脂肪質モ炎症ノ程度ニ多少ノ影響アリ。中耳炎罹患後ノ日數或ハ手術後ノ日數ニハ全ク關係ナク。主ニ年齡ノ増加スルニ從ヒテ多少ヅノ増量スルヲ見ルモノナリ。

骨軸部骨質ニ於テハ各例ノモノ其兩側ニ於テ骨細胞ノ脂肪沈着アルヲ認メタリ。囊ノ余ノ系統的研究ニ於テ常在性ニ該部骨細胞ノ脂肪沈着ヲ

認めタルハ30歳以後ノモノニ比較シ遙ニ早期ニ出現シ。且ツ一般的ニ沈着量多シ。

聽器内各所ニ現ハル、血管内血清ノ顯著ナル脂肪反應ヲ見。一見著明ノLipämieノ状態ニアルコトヨリ斷ジテ。體內脂肪量ノ上昇或ハ内聽道内或ハ骨軸管腔内炎症の刺激等モ其原因ト看做シ得ベキモ。未ダ他部ノ一般の骨質ニハ何等特異ナル脂肪所見ヲ認め得ザル點等ヲ考慮スレバ。局所的ノ循環障礙其他ノ原因ニ依リ壞死セントスル骨細胞ニ出現スル脂肪沈着ナラントモ思ハル。特ニ斯ク推測セシメル所以ノモノハ、第5例患側ノ如ク完全ニ骨軸部ノ病的破壊ヲ來シ骨質ハ殆ンド壞疽ニ陥リシモノニ於テ。之レニ比較シ炎症機轉僅ニ輕度ナル健側骨軸部ノモノヨリ脂肪沈着セル骨細胞遙ニ僅少ナルヲ認め。又第4例健側ノモノハ未ダ殆ンド炎症ノ存在ナ

キ骨軸部ニ於テ著明ノ骨細胞ノ脂肪沈着ヲ認めタリ。之等ノ諸點ヨリ案ズレバ前述ノ如ク將ニ壞死セントスル骨細胞ニミ出現スル脂肪沈着ナルベシト推測スルノ餘儀ナカルベシ。若シ第5例ノモノ今暫ク生存シタランニハ其患側ニ於ケル骨軸部骨質ニ於テハ全ク脂肪質ヲ見ザリシヤモ計リ知ルベカラズ。

而シテ骨軸部骨細胞内ニ病的ニ出現セリト思ハル、之等ノ脂肪質ノ性状モ。一般の骨細胞内ニ沈着スル脂肪質ト何等異ナル所ナシ。

前庭。半規管膜様迷路 實驗各例健側患側ニ於ケル前庭内骨膜。前庭外淋巴腔。膜様前庭壁。前庭内淋巴腔。聽斑並ニ聽櫛。内淋巴囊並ニ前庭導水管等ニ於ケル脂肪質ヲ評價シ。之レヲ一括スレバ第3表ニ示スガ如シ。勿論組織ノ崩壞或ハ高度ノ溷濁ニ伴ヒ。確實ニ該組織。該細胞

第 3 表 前庭膜様迷路脂肪量評價

年 齡	性	死 亡 迄 ノ 時 日				内 骨 膜	外 淋 巴 腔	膜半 規 前 庭 壁	内 淋 巴 腔	聽 斑 並 ニ 聽 櫛					前 庭 導 水 管 並 ニ 内 淋 巴 囊			
		中 耳 炎	罹 患 後	手 術 ヨ リ						腦 膜 炎	惹 起 後	聽 石 ブ ラ	神 上 經 皮	基 礎 膜	基 質	エ リ シ ス 部 位	上 皮	圍 繞 線
第1 例	10 歳	男	約1ヶ月	15 日	10 日	健側 患側	+	+	±	-	-	±	-	-	卅	±	+	-
第2 例	14 歳	男	約4ヶ月	13 日	7 日	健側 患側	++	+	±	+	+	±	±	+	卅	+	+	+
第3 例	14 歳	男	約20日	2 日	4 日	健側 患側	++	+	+	-	-	±	-	-	++	+	++	++
第4 例	18 歳	男	約1ヶ月	4 日	3 日	健側 患側	++	+	±	-	+	±	-	±	卅	+	++	++
第5 例	23 歳	女	約1ヶ月	11 日	10 日	健側 患側	卅	卅	±±	+	+	±	-	卅	卅	+	++	+
第6 例	36 歳	男	約70日	17 日	10 日	健側 患側	卅	+	±	-	+	±	-	+	卅	+	+	+

内脂肪沈着ナリト斷言シ得ザルモノアリ。斯ルモノハ總テ土トセリ。

即チ前庭、半規管内骨膜＝於テハ、第1例＝於テ僅＝其結締組織維間＝脂肪顆粒ノ沈着スルヲ認メ、第2例以後ノ各例、健患兩側＝於テハ同程度ノ染度ヲ呈スル結締組織ノ無造構、加フルニ顆粒狀脂肪ノ沈着スルアリ。斯ル無造構、加之、顆粒狀脂肪沈着ノ出現ハ、囊ノ研究＝依レバ既＝10歳前後ニシテ馬鐙骨板内面ヲ被覆スルモノヨリ始マリ、年齢ノ増加ト共＝正圓、橢圓嚢窩後壁或ハ各壺腹壁、次第＝半規管内ノ被覆層＝及ブモノニシテ、1ツノ年齢＝依ル生理的脂肪沈着ナルヲ記載セリ。本實驗＝於テモ斯ル脂肪沈着ハ健、患側＝依ル數量ノ相違ナク、其脂肪性狀＝於テモ囊ノ研究＝於ケル「グリセリン、エステル」、或ハ「コレステリン、エステル」ヲ主成分トシ、僅少ノ「リポイド」ヲ混ゼルモノニ一致セリ。唯、第1例＝於ケル健患兩側ノモノニ認メタリシ結締組織維間＝粗大脂肪顆粒ノ沈着ヲ認メタルモノハ、余ノ囊ノ研究＝依レバ多ク胎兒、幼少時ノ幼弱内骨膜結締組織＝著明＝現ハル、モノニシテ、組織球性細胞、稀＝結締細胞ノ之レヲ攝ルモノナリ。斯カル脂肪沈着ハ顯著ナル迷路炎ヲ合併シ居ル第5例患側ニテ、僅＝遺殘セラレタル該組織＝高度ノ増加ヲ認メタリ。而シテ之等脂肪顆粒ノ性狀ハ「グリセリン、エステル」ヲ主トシ、僅少ノ「リポイト」之レ＝混ゼリ。外淋巴腔並＝腔内周圍結締組織、外淋巴腔周圍結締組織ハ殆ンド組織的＝完全ナルモノヲ見ルコトナク、多クハ絲架狀又ハ屑零狀ト化シ、稀＝僅＝聽斑或ハ聽櫛附近＝殘存スル粗網格狀圍織ヲ見ルノミ。然カモ多クハ結締細胞ノ腫脹、瀰濁ヲ伴ヒ細胞ノ原形ヲ認メ得ルモノ僅少ナリ。脂

肪質ハ往々之等結締細胞ノ脂肪沈着、並＝硝子樣＝腫脹瀰濁セル圓形細胞ノ脂肪顆粒ヲ沈着セルモノヲ認ムレドモ、多クハ之等細胞ノ崩壞＝依レル屑零ト覺シキ粗大脂肪顆粒ノ浮漂スルヲ見ル。之等脂肪質ノ性狀ヲ見ル＝「ズダンⅢ」＝赤色乃至黃赤色、「ニールブラウ」＝淡青色、「ノイトラルロート」＝多ク陰性、且ツ單屈折性ニシテ、「オスミーム酸」＝淡灰色、スミス、チャチオ氏法＝稀＝陽性ニシテ、フイーシレル氏法＝陰性ナリトス。

即チ、主トシテ「グリセリン・エステル」ニシテ、之レ＝「リポイド」ヲ混ジ居ルモノナルヲ知ル。而シテ健、患側＝依ル性狀ノ差異ヲ認メ得ザレドモ、迷路内炎症ノ波及シタリト思ハル、モノ＝於テ増加著シ。

膜樣前庭半規管壁、該膜モ殆ンド完全ナルモノヲ見ル能ハズ。上皮或ハ結締組織層ノ崩壞ヲ伴フモノ多ク、「ヘマトキシリン」＝淡青染スル硝子樣膜ヲ挾ミテ顆粒狀ヲ呈シ、「ズダン」＝着染シ暗褐色ヲ呈ス。僅＝組織構造ヲ留メ、稍＝確實＝上皮細胞ノ脂肪顆粒ノ沈着ヲ認メ得タルハ、唯第3例＝於ケル健、患側ノモノナリトス。前庭半規管内淋巴腔、腔内＝ハ往々狹義ノ「リポイド」樣反應ヲ呈スル淋巴液ノ瀦溜スルヲ見ル。此モノ＝關シテハ既＝蝸牛膜樣迷路＝於テモ記載セルトコロナルヲ以テ茲＝省略ス。又脂肪顆粒ノ沈着セル硝子樣圓形細胞、或ハ又脂肪細胞ノ浮漂スルヲ見レドモ、外淋巴腔＝比シ遙＝僅少ナリ。

聽斑・聽櫛、聽斑＝於テハ聽石膜ノ存在ヲ認メ得タルモノ僅＝1、2例ノミ。然カモ其脂肪沈着ヲ認メタルモノナシ。聽櫛＝於テハ「クブラ」ノ存在ヲ認メタルモノ多數存シ、多クハ高度＝

縮小シ、或ハ低下シ。脂肪染色＝依リ「リポイド」様反應ヲ呈スルモノ多シ。斯カル「リポイド」様反應ヲ呈スル「クブラ」＝關シテハ、囊ノ研究＝於テ胎兒並＝各種年齡ノモノ＝之レヲ認メ、死後ノ變性、即チ「ミエリノーゼ」＝算入セルモノナリ。「ミエリノーゼ」ヲ呈スル「クブラ」ハ健。患側＝依リ特種ノ關係有ルコトナシ。神經上皮モ亦、多ク組織ノ崩壞＝伴ヒ堤防狀＝載積シ「ズダンⅢ」＝暗赤褐色＝着染シ。常＝赤色粗大脂肪顆粒ヲ混ズレ共。所屬細胞ノ何レナリヤ、或ハ又各種脂肪染色＝依リ分類ノ結果ハ一様＝「リポイド」ノ反應ヲ呈スルヲ以テ。或ハ神經「ミエリン」顆粒＝非ザルヤ之レヲ判別スル＝困難ナリ。從ツテ其數量＝關シテモ明記シ得ズ。基礎膜＝於テハ唯ダ第2例健。患側ノモノ＝同程度ノ淡キ狹義ノ「リポイド」反應ヲ呈スルモノアリ。該標本ハ死後既＝40時間ヲ經過セルモノニシテ、實驗各例中最モ死後時間ノ長キモノナリ。其他、基礎膜ニハ特種ナル脂肪沈着ヲ見ズ。

基質結締織内ノ脂肪質ハ組織球性脂肪顆粒細胞並＝結締織細胞ノ脂肪沈着等ヲ主トス。往々之等細胞崩壞セシ結果＝依リ粗大脂肪顆粒飛散シ神經纖維ノ「ミエリン」顆粒ト混在セリ。一般ニ基質内＝炎症ノ波及セルモノ＝顯著＝現ハレ。第5例患側ノ如キハ基質内一帯、脂肪顆粒ノ沈着スル膿球ヲ以テ埋メラル、モノナリ。之等ノ脂肪質ノ性状ハ前庭、各半規管外淋巴腔＝於テ記載セルモノ＝等シ。

聽斑、聽櫛、基質内神經纖維ノ産出スル「ミエリン」顆粒ノ多寡ハ殆ンド炎症ノ存否＝關セズ。死後時間ノ長短＝正比例スルガ如シ。

前庭導水管並ニ内淋巴囊 管並＝囊上皮細胞

ハ多ク浮腫狀＝腫脹シ、且ツ濁濁シ「ズダンⅢ」＝淡ク暗黄赤色。乃至暗赤褐色＝着染スルモノ多シ。而シテ脂肪分類＝從ヘバ囊ノ研究發表＝モ之レヲ記載セルガ如ク、狹義ノ「リポイド」反應ヲ呈スルモノニシテ、年齡或ハ健。患側＝依リ特異ノ差異ナク、主トシテ死後時間ノ長短＝左右セラル。

他＝上皮細胞＝於ケル脂肪顆粒ノ沈着ヲ見ル。一般＝ハ少量ナレ共、殆ンド各例＝於テ之レヲ認メ、周圍結締織等＝炎症ノ波及スルヲ認メタルモノハ僅＝増加セリ。

周圍結締織＝於ケル脂肪質ハ壯年頃ヨリ遠隔ナル骨縁ノ強靱ナル結締織ヨリ端ヲ發スル無造構並＝顆粒狀脂肪ノ沈着セリ。健。患側＝依リ相違ナキモ年齡ト共＝範圍並＝沈着量ノ増加ヲ見ル傾向ヲ有スルハ、既＝囊ノ研究＝於テ知レル所ナリ。

圍織内＝ハ他＝脂肪顆粒細胞並＝脂肪沈着セル結締織細胞アリ。多クハ沈着スル細胞ノ形態崩レ。粗大脂肪顆粒トシテ纖維間＝介在セリ。斯カル脂肪質ハ蜘蛛膜下腔ヨリ圓形細胞ノ浸潤ヲ蒙リタル第3例健側、第5例患側、第6例患側＝於テ著明＝増加シタリ。

以上記載セルガ如キ前庭導水管或ハ内淋巴囊上皮細胞内脂肪顆粒、圍織内脂肪顆粒細胞、其他ノ脂肪顆粒、或ハ又壯年者ノモノ＝遠隔ナル骨縁等＝現ハル、脂肪沈着ハ、囊ノ研究＝發表セルモノト殆ンド同一ノ脂肪反應ヲ呈シ。「ズダンⅢ」＝赤色乃至黄赤色。「ニールブラウ」＝青色。「ノイトラロート」＝多ク陰性。稀＝幽カ＝淡赤染シ、多ク單屈折性。「オスミーム酸」ニハ稀＝淡黒灰色＝還元セラレ。チアチオ氏法ニハ陽性ニシテ、スミス、フィッセル氏法ニハ陰

性ナリ。即チ「グリセリン・エステル」加之「リポイド」ナリトス。炎症ノ存在スルニ依リ脂肪性狀ニ何等ノ變化ヲ認メズ。

管、囊内ニハ上皮或ハ周圍結締織ノ脂肪量ニ一致シテ脂肪顆粒細胞、滴狀脂肪等ノ浮漂スルアリ。又往々蝸牛殻外淋巴腔或ハ前庭、半規管内淋巴腔ニ認メタルガ如キ脂肪染色ニ應ズル淋巴液渾濁セリ。之レ又健、患側ニ依ル量並ニ性狀ノ相違スルコト無シ。

内聽道 實驗各例ニ於ケル兩側内聽道内ニハ總テ膿汁ノ渾濁スルアリ。周圍結締織モ亦、多少ナガラ炎症ノ波及シテ、炎症性浸潤アリ。大小圓形細胞ノ出現、血管ノ炎症充血アリテ、結締織ハ又部分的ノ肥厚ヲ來セリ。

之等浸潤ヲ蒙リタル結締織内ニハ又顯著ナル脂肪沈着アリ。即チ脂肪顆粒細胞或ハ結締織細胞ノ脂肪沈着等ヲ見ル。而シテ炎症性増加ヲ認メタル之等脂肪質ハ炎症機轉ノ程度ニモ左右セラハ、モ、主トシテ年齡ノ増加スルニ依リテ多少トモ増量スルヲ見ル。而シテ之等ノ脂肪質ノ性狀ヲ見ルニ「グリセリン・エステル」ヲ主トシ、僅少ノ「リポイド」之レニ混ズルモノナリ。

又同組織ニハ實驗第6例(36年)ニ於テ骨縁ヨリ始マル無造構脂肪ノ沈着スルヲ見タリ。主トシテ「グリセリン・エステル」ニシテ炎症性浸潤ヲ蒙ラザル所ニ於テハ兩側トモ同程度トス。斯カル脂肪沈着ハ、囊ノ研究ニ依レバ生理的ノモノニシテ30歳頃ヨリ鼓室粘膜下織、内淋巴囊圍織等ニ現ハレタル脂肪沈着ト等シク、年齡ト共ニ沈着量並ニ範圍ノ擴大ヲ來スモノナリ。本實驗ニ於テモ特ニ炎症性病の意義ヲ認メ得ザルモノナリトス。

又囊ノ研究ニ於テモ記載セシ主ニ内聽道底部ニ

於ケル澱粉様小體ハ、本實驗ニ於テモ第2例以後ノ各例、兩側或ハ何レカノ一側ニ於テ之レヲ認メタリ。即チ、

第2例(14歳、男)ニ於ケル兩側内聽道

第3例(14歳、男)ニ於ケル兩側内聽道

第4例(18歳、男)ニ於ケル兩側内聽道

第5例(23歳、女)ニ於ケル健側内聽道

第6例(36歳、男)ニ於ケル兩側内聽道

ニ於テ1標本ニ2、3個乃至數個宛存在スルヲ見ル。

而シテ第2例患側ノモノ、第4例兩側ノモノ、第5例健側ノモノ、第6例兩側ノモノハ中心性ニ核子ノミ、無造構或ハ環狀線ニ沿ヒテ暈狀ニ、或ハ又周縁性ニ顆粒狀ノ脂肪沈着アリ。其脂肪反應ヲ見ルニ「ズダンⅢ」ニ黃赤色乃至鮮紅色、「ニールブラウ」ニ青色、「ノイトラルロート」ニ淡赤色、重屈折性ナク、「オスミーム酸」ニ灰黑色ニ遷元セラレ、スミス、チアチオ氏法ニハ陽性、フィッシュレル氏法ニハ殆ンド陰性ナリ。其性狀ハ之レヲ囊ノ實驗ニ於ケルモノト比較スルニ相一致ス。即チ澱粉様小體ニ沈着スル脂肪質ノ性狀ハ炎症ニ依リテ變ズルトコロナシ。唯注目スベキハ囊ノ實驗成績ニ於テハ年齡20歳頃ノモノヨリ初メテ常在性ニ存在セシニ拘ハラズ。本實驗ニ於テハ既ニ14歳ノモノヨリ殆ンド各例ニ之レヲ認メ、又囊ノ實驗ニ於テ該小體ノ脂肪沈着ヲ認メタルハ30歳以上ノモノナリシモ、本實驗ニ於テハ既ニ14歳(第2例)以後ノモノニ於テ其脂肪沈着ヲ多數認メ得タリ。而シテ囊ノ研究ニ於テハ其發生原因ニ關シテ探究シタルモ何等把握スルモノナカリキ。唯ダ諸氏ノ文献ニ現ハレタル諸說ヲ掲ゲタルニ過ギズ。本實驗ニ於テモ發生原因ニ就テハ的確ナルモノ

ヲ發見シ得ザリキ。然レドモ本實驗ニ於テスクモ早期ヨリ該小體ノ存在及ビ其脂肪沈着ヲ見ルハ蓋シ附近ニ炎症ノ存在シテ該小體ノ發生並ニ脂肪沈着ニ對シ促進的刺戟ヲ與フルモノナラザルヤヲ指摘シ得ベシ。

內聽道内ニ滯溜スル膿汁ハ既ニ患側鼓室腔内ニ之レヲ認メタルモノニ等シク。多クハ大小無數ノ膿球。膿液。纖維素等ヲ混ジ。膿球中ニハ又脂肪顆粒ノ沈着スルモノ多數存シ。稀ニ膿液ハ狹義ノ「リポイド」ノ反應ヲ呈ス。而シテ鼓室腔其他ニ於ケル化膿性病竈ニ於テモ記載シタル所ナレドモ。之等膿球中ニ沈着スル脂肪モ年齢ト共ニ多少宛。量ノ増加アリ。曩ノ系統的研究ニ於ケル實驗例中ニモ急性化膿性腦膜炎3例。結核性腦膜炎8例アリ。急性化膿性腦膜炎ニ於テハ「プラスマ」細胞。單核巨大細胞等ノ膿球顯著ニ脂肪顆粒ノ沈着スルヲ認メ。結核性腦膜炎ノモノニ於テハ只ダ2例ノミ極メテ僅少ノ脂肪顆粒ヲ有スル膿球ヲ認メシメ。他ノ6例ニ於テハ全ク膿球中ニ脂肪質ノ痕跡ダニ之レヲ見ザリキ。

本實驗ニ於テモ各例ノモノ總テ膿球内ニ脂肪顆粒ノ沈着アリ。

急性化膿性炎症ニ於ケル膿汁内ニハスクモ多量ノ脂肪質出現スルニ反シ。結核性ノモノニハ殆ンド脂肪質ヲ見ル能ハザルハ一考慮ヲ要スベシ。

內聽道内ニ於ケル膿球ニ沈着スル脂肪顆粒モ先ニ鼓室其他ニ出現セシ脂肪質モ性状ニ於テ全ク相一致ス。

顔面、聽及ビ前庭神經 各例、兩例ニ於ケル顔面、聽並ニ前庭神經ノ脂肪染色劑ニ對スル染度並ニ「ミエリン」像ヲ精檢スルニ、同一人健、患側

ニ於ケル各神經纖維ノ同一場所ニ於テハ特異ナル形態の差異ヲ認メズ。臨床上、顔面神經麻痺ヲ合併セル第2例患側ニ於テモ何等「ミエリン」像ノ著變ヲ見ル能ハザリキ。僅ニ1、2例ニ於ケル顔面神經(第5例健側、第6例健側)並ニ前庭神經(第5例患側)ニ空胞形成アリシト。炎症性浸潤ヲ蒙リタル顔面神經纖維(第5例患側)ノ邊緣平滑ナラズ蠶食セラレタルガ如キ狀況ヲ呈セルモノヲ見タルノミ。

又之等3神經ノ產出セン「ミエリン」顆粒ヲ試ミニ表示スレバ第4表ニ示ス如シ。但シ都合ニ依リ死後時間ヲ明記シ得ザルハ遺憾ナリ。死後時間ノ最モ短キハ第3例ニシテ、次ニ短キハ第2例及ビ第5例トシ殆ンド相等シク。次ハ第4例及ビ第6例ニシテ、又死後時間相等シ。第2例ハ最モ長ク約2晝夜ヲ經過セルモノナリ。

第5例患側ニ於テハ既ニ實驗記事ニ詳述セルガ如ク顯著ナル化膿性迷路炎ヲ合併シ。螺旋神經ハ全ク破壊セラレテ痕跡モナク。骨軸内蝸牛殼神經ハ壞死シテ脂肪染色ヲ示サズ。僅ニ其走行ニ從ヒテ纖維狀。又ハ絲瓜。王瓜狀ノ陰像及ビ僅ニ遺殘セラレタル「ミエリン」顆粒ヲ認メ。聽斑。聽櫛。基質内ニ於ケルモノモ全ク破壊セラレ。饒多ナル脂肪顆粒代リテ之レヲ埋メ。神經纖維殆ンド存在セズ。內聽道内ニ於ケル聽並ニ前庭神經ニハ明瞭ナル分界線ヲ劃シテ廣範ナル神經破壞アリ。壞死セル神經纖維ハ蝸牛殼神經纖維ト同様ニ全ク脂肪染色ヲ示サズ。壞疽部中央ニハ殆ンド「ミエリン」顆粒ヲ見ズ。分界線附近ノ將ニ壞死セントスル神經纖維ハ纖維間隙極メテ疎トナリ。該部ノ神經纖維自己ハ着染不良ニシテ。癰疽セル自然薯又ハ胡瓜狀ヲ呈シ。周緣極メテ平滑ナラズ。又所々ニ不規則ナル瘤狀

第 4 表 各神經纖維「ミエリン」顆粒並ニ各神經節細胞内脂肪顆粒評價

	年 齡	性	死 亡 迄 ノ 時 日				「ミエリン」顆粒評價							神經節細胞 内脂肪顆粒 評價		
			中 隔 耳 患 炎 後	手 術 ヨリ	腦 惹 膜 起 炎 後		額 面 神 經	聽 神 經 旋	神 經 牛 殼	内 道 聽 内	内 道 聽 内	聽 基 質 内	膝 狀	螺 旋	前 庭	
第 1 例	10歳	男	約1ヶ月	15日	10日	健側	++	++	++	++	++	++	-	-	+	
						患側	++	++	++	++	++	++	-	-	+	
第 2 例	14歳	男	約4ヶ月	13日	7日	健側	++	++	++	++	++	++	++	+	++	
						患側	++	++	++	++	++	++	++	+	++	
第 3 例	14歳	男	約20日	2日	4日	健側	++	++	++	++	++	++	+	+	++	
						患側	++	++	++	++	++	++	+	+	++	
第 4 例	18歳	男	約1ヶ月	4日	3日	健側	++	+	++	++	++	++	++	±	++	
						患側	++	+	++	++	++	++	++	±	++	
第 5 例	23歳	女	約1ヶ月	11日	10日	健側	++	++	++	++	++	++	++	±	++	
						患側	++		+	++	++		++	+	++	
第 6 例	36歳	男	約70日	17日	10日	健側	++	+	++	++	++	++	++	±	++	
						患側	++	+	++	++	++	++	++	±	++	

膨隆ヲ生ジ、稀ニ小空胞ヲ抱キ周縁置セラレタルガ如キ狀ヲ呈スルモノアリ。斯ル場所ニ於ケル「ミエリン」顆粒モ亦、同一標本、同一神經ニ於ケル健康部位並ニ健側神經纖維邊縁ノモノニ其數量略々一致スルヲ見ル(附圖第4圖)。

即チ「ミエリン」顆粒產出ノ多寡ハ、健患兩側ニ於テ大差ナク、神經壞疽部ヲ除キ炎症ノ存在ノ爲メニ又著變ナク、主トシテ死後時間ノ長短ノミ關係アルガ如シ。

又同一神經ニ於テモ部分的關係ニ依リ「ミエリン」顆粒ノ多寡有ルハ囊ノ發表ニモ記載セルトコロナルガ、一般ニ内部ナルモノホド増加セリ。即チ聽神經ニ於テハ、内聽道内ヲ走行スルモノニ比シ、骨軸内ヲ走行スル蝸牛殼神經ニ稍々多ク、内聽道内ニ於ケル前庭神經ヨリモ聽

斑、聽椅基質内ノモノ少シク増加セリ。唯ダ第4表中螺旋神經ニ僅少ナルハ、同神經纖維ヲ精檢スルニ殆ンド個々ニ細球狀ノ「ミエリン」顆粒ト化シ、相融合シ、束狀ヲナシテ骨性螺旋板内ヲ走行スルヲ以テ、表中ニ表ハレタルモノハ核神經束邊縁ニ飛散或ハ附着スルモノ、ミヲ記載セル爲ナラン。

膝狀、螺旋、前庭神經節 各節細胞原形質ハ死後時間ノ長短ニ一致シ、程度ヲ異ニスル狹義ノ「リポイド」様反應ヲ呈スルモノアルハ、既ニ囊ノ研究ニ於テ發表セリ。本研究ニ於テハ炎症ノ爲メノ影響ナキヲ知レリ。尙ホ膝狀神經節ニ於テハ、囊ニ余ノ研究ニ於テモ記載セルガ如ク原形質ニ2種ノ異リタル收縮並ニ之レニ伴フ脂肪反應ヲ呈スルヲ見タリ。即チ1ツハ前述セル

ガ如ク他ノ螺旋。前庭神經節ニモ略々同様ノ變化ヲ認ムルモノナレ共。死後時間ノ長短ニ比例スル原形質ノ組織像ト共ニ「ヘマトキシリン」ニ着染スル微細顆粒狀ヨリ。漸次「ズダン」ニ反應スル淡赤色無造構ヲ呈シ來ルモノ。即チ單ナル死後變化ニ伴フ脂肪反應ト。他ノ1ツハ他ノ2神經節ニハ殆ンド認メ得ザリシモノトニシテ。死後時間ニ關係ナク原形質ハ輪廓ノ明カナル不定塊狀或ハ扁圓狀收縮ヲナシ。多ク「ズダンⅢ」ニ濃赤褐色ニ着染セリ。

後者ニ於ケル斯カル變化ハ囊ノ研究ニ於テモ記載シ。死戰時樣變化ニ算入セルモノナリ。以上2種ノ脂肪反應ハ共ニ狹義ノ「リポイド」ノ夫レニ類シ。後者ニ於テハ顯著ニ現ハルモノナリ。

斯カル2種ノ細胞ノ存在スルハ健患兩側ノモノヲ比較スルモ略々同數ナルヲ見ル。而シテ第1第5。第6例ノ如キ極メテ多數ニ存スルモノハ腦膜炎惹起シテヨリ死ニ到ル迄ノ日數ノ比較的ニ長キヲ示スハ。蓋シ興味深キ現象ナリトスベシ。

膝狀。螺旋及ビ前庭神經節細胞内ニハ又健。患側ノ別ナク。「ズダンⅢ」ニ濃赤褐色ニ着染スル脂肪顆粒ノ沈着アリ(第4表参照)。其性狀ハ囊ノ研究ニ於テ發表セルガ如ク「リポイド」ニ褐色素ヲ含有セルモノニシテ。炎症ニ依リテノ性狀ノ變化ナク。又沈着スル數量ニ於テ差異ナシ。

總ジテ健患兩側聽器ノ脂肪量ヲ比較スルニ。患側聽器ニ於テハ著シク脂肪量ノ増加スルアリ。

脂肪質ノ出現或ハ増加ヲ認ムル所ハ殆ンド炎症ノ存スル所ニ限ラレ。炎症ノ存在スル所ニ於テハ必ズ脂肪沈着アリ。故ニ顯微化學的ニ脂肪質ノ出現スルヲ尋ネ。以テ急性炎症ノ存否ヲ知ル

ヲ得ベシ。而シテ之等脂肪質ノ出現ハ中耳。内耳ノイヅレモ結締組織ニ最モ多シ。其他既述セルガ如ク骨部ニ於ケルモノハ極メテ僅少ニシテ專ラ術後ニ於ケル骨縁ノ骨添加旺盛ナル所並ニ將ニ壞死セントスルモノニ於テ之レヲ見ルニ過ギザリキ。

炎症ノ存スル部位ニ脂肪質ノ多キハ如何ニ關シテハ Dietrich ハ炎症ノ病的ニ昂進セル吸收機轉ナリト云ヒ。Anitschkoff ハ炎症性病竈ノ周圍ニ生ズル「キサントーム」細胞ノ顯著ナル脂肪沈着アルヲ見テ。脂肪含有細胞ノ化膿性破壊物ノ吸收ニヨルモノナルベシト言ヘルカルメン氏ノ所説ニ反對シ。殆ンド認ムベキ局所ノ細胞破壊ナキ時モ現ハルハ。ガ故ニ純粹ノ脂肪浸潤ノ狀態ナリト云ヒ。尙キ種々ノ疾病(糖尿病。慢性黃疸。其他)ニテ。斯ル「キサントーム」樣細胞ノ増加ヲ來ス場合モ一方ニハ勿論各種臟器ニ於ケル「コレステリン・エステル」含有量ノ増加ヲ要件トスベキモ。他方。其局所ニ於ケル刺激作用モ亦重要條件ヲ爲スベシト云ヒ。而カモ動物ニ於テ斯カル細胞ノ發生程度ハ第1ニ局所刺激ノ強サ。第2ニ動物臟器ノ「コレステリン・エステル」飽和度ト直接關係アルモノナルベク。故ニ假性「キサントーム」細胞ノ生成ハ或程度迄其處ニ存在シタル。或ハ又炎症性刺激ノ爲メニ新生セル喰作用ノ増殖ニ歸セザルベカラズト結論セリ。

余ノ實驗ニ現ハレタル患側聽器ニ於ケル脂肪沈着諸細胞モ亦。骨質並ニ鼓膜皮膚層ヲ除キ各組織内ノモノ殆ンド總テハ炎症ニ依リテ増加セル組織球性細胞。或ハ紡錘狀又ハ星芒狀細胞ノ之レヲ攝ルモノニシテ。喰作用ノ行ハレタルハ勿論首肯シ得ベシ。且ツ病的沈着ヲ認メ得ラルハ

脂肪質モ、多少トモ年齢ニ比例シテ増量ヲ認メ得ラルハヲ以テ、一般的體內脂肪量ノ上昇ニ依リ、或ハ又種々ノ炎症性刺激等ノ諸條件ニヨリ沈着量ノ増加ヲ來スモノト看做スヲ妥當トスベシ。

炎症ニ依リ病的出現或ハ増加ヲ來セル脂肪質モ「グリセリン・エステル」或ハ稀ニ「コレステリン・エステル」ヲ主成分トシ、之レニ多少ヅ、
「リポイド」ヲ混ジタルモノナリ。

尙ホ迷路内外淋巴腔内ニハ前ニモ之レヲ記載セルガ如ク、Hypercholestrinämie ノ一部現象トモ看做スベキ「リポイド」ノ反應ヲ呈スル淋巴液ノ滯溜スルモノ多ク、又聽器内各種組織イヅレモ、或ハ又健、患側イヅレモ、各例ノモノ總テ血管内血液ノ脂肪染色ヲ呈スルヲ見ル。斯カル脂肪染色ニ着染スル血液ハ、分類法ニ從ヘバ又「リポイド」ノ反應ヲ呈シ、患側聽器ニ於テ炎症ノ存スル場所ニ於テハ血管ノ新生ヲ來ス關係上特ニ多數認メラル。即チ Lipämie ノ状態ニ在ルコト明ナリ。而シテ健患兩側聽器内ニ同時ニ斯カル脂肪血液ヲ見ルハ全身的ニ血液内脂肪量増加ノ一部分症ト見ルヲ得シ。

近時三宅氏ハ耳鼻咽喉科領域ノ諸種ノ疾患ニ於ケル血中「ヒョレステリン」ヲ測定シ、急性中耳炎及ビ乳嘴突起炎ニ於テハ「ヒョレステリン」價ノ上昇ヲ證明セリ。

即チ輕度或ハ中等度ノ急性中耳炎ニ於テハ血中「ヒョレステリン」價ニ殆ンド變化ナク、乳嘴部ノ病變顯著ナルモノホド血中「ヒョレステリン」量モ亦著明ニ上昇スルヲ見ル。特ニ中耳眞珠腫ニ於テハ其輕度ノモノヲ除キテハ、他ノ疾患ノ何レヨリモ高度ニ血中「ヒョレステリン」ノ上昇ヲ認メタリト。之レニヨリテ病竈ニ於ケル組織

破壊ト、血中「ヒョレステリン」トノ間ニ密接ナル關係ノ存在ヲ説キ、尙ホ術後局所ノ表皮形成ト共ニ正常値ニ近ヅクト云ヒ、之レ恐ラクハ病竈中ニ多量ニ含有セラルハ「ヒョレステリン」ガ血中ニ吸収蓄積サレ、以テ Hypercholesterinämie ヲ起サスモノナルベシト主張セリ。

三宅氏ハ斯クノ如ク生物化學的立場ヨリ中耳炎、乳嘴突起炎ノ場合ニハ血中「ヒョレステリン」量ノ増加、即チ Hypercholesterinämie ヲ證明セリ。余モ亦本實驗ニ於テ顯微化學的ニ各例ノモノ總テ Lipämie ノ状態ニ在ルヲ確ム。余ハ各例ニ於ケル全身諸臟器ノ脂肪質ヲ檢索セシニハアラズ。唯臨牀的並ニ解剖的診斷ニ於テ他ニ特種ノ血中脂肪量ノ増加ヲ起スベキ原因的疾患ナク、患側聽器ニ於テハ顯著ノ脂肪沈着ノ増加アルヲ見テ該所ニ於ケル脂肪質吸收ノ過程トシテ Lipämie ヲ招來スルモノナルベシト推測スルモノナレドモ、脂肪血液ノ發生原因ニ關シテハ尙ホ一定セル學說ナキ限り、急性中耳炎或ハ化膿性腦膜炎ニ於ケル種々ナル刺激、又ハ他ノ原因ニ依リ他種臟器ノ脂肪消耗ノ過程トシテ Lipämie ヲ證明セシモノカ知ルベカラズ。其因果的關係ニ至リテハ今日未ダ推測シ得ザル所ナリ。然レ共立場ヲ異ニセル研究方法ニヨリ現ハレタル結果ガ殆ンド相一致セルヲ見タルヨリシテ、余モ亦三宅氏ノ所說ニ譏意ヲ表シ、尙ホ今後ノ研究ニ依リ、血液内脂肪量ノ測定、或ハ耳漏内脂肪質檢索等ニ依リテ完結スレバ、種種耳疾患ニ於ケル診斷並ニ治療上尠ナカラザル進歩アルベキヲ豫想スルモノナリ。

結 論

耳性化膿性腦膜炎＝於ケル人屍體兩側聽器脂肪ノ比較檢索ヲ行ヘル結果ハ次ノ如シ。

1. 患側聽器＝於テハ遙カ＝脂肪沈着多シ。然カモ殆ンド炎症部位＝限ラル。斯ク病的＝出現或ハ増加ヲ認メラル、脂肪質＝モ、多少ナガラ年齢の増加アルヲ目撃ス。而シテ之レ＝出現スル脂肪ハ主ニ「グリセリン・エステル」、或ハ「コレステリン・エステル」ニシテ、「リポイド」モ僅少ヅ、之レニ混ゼリ。

2. 囊ノ研究＝於テ鼓膜固有層、第2鼓膜＝、20歳頃ヨリ常在性＝出現シ、年齢ト共ニ増量スルヲ認メン脂肪沈着ハ、該層ノ炎症性破壊ヲ蒙ラザル限り、兩側共ニ相等シ。

3. 各聽小筋々纖維ノ微細顆粒狀脂肪沈着ハ

鼓室内炎症ノ存否ト關係スルコト殆ンドナシ。

4. 聽器骨部＝於テハ、同壤痘部ノ骨細胞並ニ造骨機轉極メテ旺盛ナル手術部骨基質＝脂肪ノ沈着スルヲ認メタリ。

5. 膜様迷路＝於テハ、迷路炎ノ存セザル限り脂肪量＝大差無シ。

6. 内聽道内＝存スル澱粉様小體ノ構成並ニ其脂肪沈着ハ、頭蓋腔内炎症ノ存在ニ依リ促進セラル、ガ如シ。

7. 神經「ミエリン」顆粒ノ數量ハ、附近炎症ノ存否＝關係無シ。

8. 膝狀、螺旋並ニ前庭神經節細胞内＝出現スル所謂、含脂肪消耗性色素顆粒ノ數量ハ炎症＝關セズ。

9. 耳性化膿性腦膜炎屍體＝於ケル血液ハ總テ著明ノ Lipämie ノ状態ニ在リ。

擱筆スル＝際シ、貴重ナル材料並ニ種々ナル御便宜ヲ與ヘラレシ當院耳鼻科主任田所喜久馬先生並ニ御校閲ヲ賜リタル恩師細谷雄太先生ニ對シ、衷心ヨリ感謝ノ意ヲ表ス

文 献

- 1) Anitschkoff; Münchener Med. W. Nr. 46, 1913. 2) Borsch; Der Aqueductus vestibularis als Infektionsweg. Zeitschrift. f. O. etc. Bd. 50, S. 337, 1905. 3) Denker u. Albrecht; Lehrbuch der Krankheiten des O. u. I. 11 Aufl. 1925. 4) Dietrich; Zeitschrift. f. H. N. O. Bd. IV, 1922. 5) F. Alt; Die Taubheit in Folge von Meningitis cerebrospinalis epidemica. Zentralbl. f. O. Bd. 6, S. 466, 1908. 6) F. R. Nager; Zur Kenntnis der Influenzatabeheit. Zeitschr. f. O. Bd. 70, S. 102, 1914. 7) Görke; Labyrinthveränderungen bei Genickstarre. Zbl. f. O. Bd. 4, S. 504, 1906. 8) Görke; Die entzündlichen Erkrankungen des Labyrinths. Arch. f. O. Bd. 70, S. 102, 1914. 9) Heller; Zur anatomischen

- Begründung der Gehörstörung bei Meningitis cerebrospinalis. Arch. f. O. Bd. 4, S. 55, 1869. 10) Henke u. Lubarch; Handbuch der speciellen pathologischen Anatomie u. Histologie. Bd. 12, Gehörorgan, 1926. 11) H. Steinbrügge; Ein Fall von Zerstörung u. teilweiser Verknöcherung beider Labyrinth, muthmasslich in Folge einer Meningitis. Zeitschr. f. O. Bd. 22, S. 192, 1892. 12) Lucne; Eitrige Entzündung des inneren Ohres bei Meningitis cerebrospinalis. Arch. f. O. 1870. 13) Schmorl; Die pathologisch-histologischen Untersuchungsmethode. 14) Wittmaack; Über die normale und pathologische Pneumatisation des Schläfenbeins. Gustav. Fischer, Jena. 1918. 15) Y. Hosoya; Zur

experimentellen Labyrinthitis. 東京, 大學紀要, 1916. 16) **二本杉欣一**; 耳性頭蓋内合併症ノ剖検 2例. 耳鼻, 第7巻, 第10號. 17) **西村伊勢松**; 耳性腦膿瘍ノ病理ニ關スル實驗的研究. 第1回並ニ第2回報告. 大日耳鼻, 第40巻, 第6號. 18) **鳥居憲二**; 再發竇球腫化膿性内耳炎. 耳鼻, 第7巻, 第8號. 19) **土岐**; 流行性腦脊髓膜炎ニ於ケル聽器ノ病理耳鼻臨牀, 第1巻. 20) **大谷信雄**; 耳性化膿性腦膜炎ノ聽器病理ニ就テ. 大日耳鼻, 第35巻, 第4號. 21) **大澤朗**; 人體聽器脂肪ノ系統的研究. 附. 氷結切片ニ依ル膝狀. 螺旋並ニ前庭神經節細胞測定, 大日耳鼻, 第40巻, 第7, 8號. 22) **大澤朗**; 無頭兒聽器ノ1例. 大日耳鼻, 第39巻, 第7號. 23) **渡邊淡水**; 聽器脂肪ノ研究. 大日耳鼻, 第28巻, 第5號. 24) **川村麟也**; 人體. 動物體内ニ於ケル脂肪類ノ鑑別ニ就テ. 日病理會誌, 第1巻. 25) **川村麟也**; 重屈折性物質「コレステリン・エステル」ニ就テ. 日病理會誌, 第1巻. 26) **川村麟也**; 人體及ビ動物

體内ニ於ケル脂肪問題ニ就テ形態學的並顯微化學的研究成績. 日新醫學. 第7號, 第1巻, 大正6年9月. 27) **中村登**; 耳性腦脊髓膜炎患者ニ於ケル兩側聽器ノ病理組織學的檢索. 耳鼻臨牀, 第8巻, 大正元年. 28) **中道吉亮**; 人體聽器ニ出現スル脂肪質ニ就テ. 京都醫誌, 第19巻, 第9號, 大正11年. 29) **松森明**; 耳性化膿性軟腦膜炎患者ニ於ケル岩様骨ノ組成並ニ病變ニ就テ. 大日耳鼻, 第37巻, 第11號. 30) **松森明**; 耳性化膿性軟腦膜炎患者ニ於ケル迷路病變ニ就テ. 大日耳鼻, 第38巻, 第6號. 31) **金野巖**; 耳性腦膿瘍ノ1例. 耳鼻, 第7巻, 第3號. 32) **金野巖**; 實驗的化膿性腦膜炎ノ病理組織學的研究. 大日耳鼻, 第38巻, 第2號. 33) **三宅等**; 耳鼻咽喉科領域ノ疾患ニ於ケル血中「ヒヨロステリン」ノ消長. 大日耳鼻, 第40巻, 第5號. 34) **篠田萬壽太**; 耳性化膿性腦膜炎ト思惟サレル1例ニ就テ. 大日耳鼻, 第39巻, 第12號. 35) **下田伯一**; 顙顱骨ノ組織解剖學的研究. 大日耳鼻, 第38巻, 第2號.

附圖解説

第1圖 患側聽器馬鐙骨板ノ脱臼(實驗第5例). 40×。

馬鐙骨板ハ炎症性脱臼ヲ來シ. 輪狀靱帶ハ全ク破壊セラレ. 卵圓窩内ハ増殖セル肉芽ノレヲ滿タス. 之等肉芽ニハ極メテ多量ノ脂肪沈着アリ。

第2圖 患側耳. 乳嘴突起手術部骨壁並ニ肉芽。(實驗第2例). 400×。

肉芽ハ浮腫狀ニ腫脹シ. 充盈血管ニ富ミ圓形細胞ノ浸潤アリ. 上層ヨリ極メテ顯著ニ脂肪顆粒細胞脂肪沈着セル紡錘狀細胞. 星芒狀細胞或ハ粗大脂肪顆粒等存シ. 又血管内血清ノ脂肪反應ヲ呈スルモノアリ。

鑿開骨壁ハ小丘陵狀. 又ハ珊瑚狀起伏ヲ呈シ. 其邊緣一帶ニハ造骨細胞美麗ニ並列シ. 旺盛ナル骨添加ノ道程ヲ示セリ. 而シテ新生骨質ハ邊緣一帶脂肪染色ニ無造構ニ應染シ. 造骨細胞モ亦脂肪顆粒ヲ有ス。

肉芽面ニハ多量ノ屑零樣顆粒狀物. 硝子樣圓形細胞. 並ニ脂肪顆粒細胞. 脂肪反應ヲ呈セル漿液樣滲出物等載積ス。

第3圖 患側聽器半規管壁ニ於ケル皸裂(實驗第5例). 40×。

本例ニ於ケル患側迷路骨壁ニハ多數ノ皸裂在リテ謂所 Wittmaack ノ病的含氣蜂窠ヲナシ. 且ツ炎症ノ波及ヲ蒙ルモノ多シ. 半規管骨壁ニ於テモ圖ノ如ク僅ニ内骨膜ヲ距テ. 膜様迷路ト界スルモノアリ. 之等病的含氣蜂窠ハ幼弱ナル纖維壁ニシテ. 皸裂骨緣ハ鋸齒狀ノ起伏多ク全ク平滑ナラズ. 脂肪質ハ骨髓内ニ僅ノ脂肪顆粒細胞. 肥胖セル結締組織原細胞ノ脂肪沈着等ニシテ. 骨緣一帶ハ同幅ナル無造構脂肪沈着ヲ呈シ. 往々骨緣ニ密着シテ脂肪顆粒ヲ有スル造骨細胞並列ス. 即チ正常ノ胎兒. 幼少兒ノ迷路骨壁ニヨク認メ得ラル. 原始髓腔ニ於ケル組織像並ニ脂肪所見ニ該當スベシ. 炎症ノ波及ヲ蒙リタルモノニ於テハ以上ノ脂肪沈着ノ他ニ脂肪顆粒細胞ノ増加. 或ハ脂肪染色ニ應染スル膿液ノ滲溜ヲ目撃ス。

第4圖 將ニ壞死セントスル神經纖維(實驗第5例. 患側耳. 聽神經並ニ前庭神經). 400×。

聽神經並ニ前庭神經ニ於テハ判然タル分界線ヲ劃シテ廣範ナル神經壞疽ヲ見ル. 壞死セル神經纖維ハ全ク脂肪染色ニ應ゼズ. 且ツ壞疽部ニ於テハ殆ンド「ミエリン」顆粒ノ存在ナシ。

將ニ壞死セントスル神經纖維ハ纖維間隙極メテ疎

大澤論文附圖

耳性化膿性腦膜炎聽器病理補遺 (兩側聽器脂肪ノ比較檢索)

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Akira Osawa: Beiträge zur pathologischen Anatomie im Gehörorgan der Otogenen Meningitis.
(Über die Untersuchung der Fette beider menschlichen Gehörorgan.)

大澤論文附圖

耳性化膿性腦膜炎聽器病理補遺 (兩側聽器脂肪ノ比較檢索)

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 10.

Fig. 9.

Fig. 11.

Akira Osawa: Beiträge zur pathologischen Anatomie im Gehörorgan der Otogenen Meningitis.
(Über die Untersuchung der Fette beider menschlichen Gehörorgan.)

トナリ。膨隆。較推共ニ顯著ニシテ、宛然癰瘻セル長短自然嚢狀。又ハ胡瓜狀ヲ呈シ。所々ニ不規則ナル瘤狀膨隆ヲ有シ。往々小空胞ヲ抱キ。又ハ周縁平滑ナラザル蠶食狀ヲ呈スルモノ等アリ。而シテ該所ニ於ケル「ミエリン」顆粒ノ數量ハ健側耳ニ於ケル同一神經、或ハ又患側ノ同神經健康部位ニ比較シ大差ナキヲ見ル。

第5圖 患側耳鼓室内結締織ノ増殖(實驗第6例)。15×。

前下方ニ弛緩セル鼓膜並ニ槌骨柄ヲ見ル。鼓室内ニハ高度ノ結締織ノ増殖アリテ殆ンド固有ノ腔隙ナク。結締織内ニハ所々ニ不規則ナル空洞アリテ。多數ノ膿球。脂肪顆粒細胞。融合セル脂肪質。並ニ脂肪染色ニ應ズル膿液等此中ニ集積ス。結締織ハ鬆粗ニシテ充盈血管ニ富ミ。圓形細胞ノ浸潤アリ。多數ノ脂肪顆粒細胞。脂肪沈着セル紡錘狀細胞或ハ脂肪細胞等ヲ目撃ス。

第6圖 内淋巴囊ニ於ケル出血及ビ脂肪顆粒細胞。(實驗第6例 健側聽器)。40×。

健。患側ヲ問ハズ。往々内淋巴囊ニ出血或ハ蜘蛛膜下腔ヨリ圓形細胞ノ浸潤アリ。斯ル所ニ於テハ多數ノ脂肪顆粒細胞アリ。囊上皮細胞モ亦脂肪顆粒ノ沈着アリ。囊内ニハ脂肪顆粒細胞ノ浮游多シ。

第7圖 患側耳鼓膜並ニ鼓室腔(第5例)。「ズダン」Ⅲ。「ヘマトキシリン」染色。30×。

鼓膜ハ高度ノ肥厚ヲ來シ。顯著ナル小圓形細胞ノ浸潤アリ。穿孔端ニハ膠樣結締織ヨリ成レル「ポリープ」ヲ包ミテ棍棒狀ニ膨大シ。充盈血管網顯著ニ存ス。皮膚層ハ肥厚シ外面一帯ヲ被覆シ穿孔緣ヨリ内側ニ襞轉シ粘膜層上皮ニ移行シ。顯著ナル脂肪顆粒ノ沈着アリ。健側耳鼓膜ノ同層ノモノニ比シ遙ニ多量ナリトス。固有層ハ萎縮シ。所々斷續シ。踏踰セル殘骸ヲ留メ無造構脂肪沈着アリ。脂肪染色ニ依ル染度ハ健側ノ夫レニ比シテ大差ナシ。粘膜層ハ増殖シ。極メテ鬆粗ニシテ多クノ脂肪顆粒細胞。脂肪沈着セル紡錘狀細胞存シ。血管

内血清ノ脂肪反應ヲ呈スルモノ多シ。

穿孔中央ニ槌骨莖アリテ。外面ヨリ皮膚層並ニ蝸局セル鼓膜固有層之ヲ圍繞シ。共ニ脂肪沈着アリ。鼓室粘膜ハ又高度ノ増殖ヲナシ。鼓室腔ノ大半ヲ埋メ。上皮細胞ノ脂肪沈着。脂肪顆粒細胞等ヲ認ム。

鼓室腔内ニハ針狀ヲ呈スル纖維素。脂肪顆粒ヲ有スル數多ノ膿球。脂肪染色ニ應ズル膿液等ノ滯溜ヲ見ル。

第8圖 患側乳嘴突起鑿開部。(實驗第3例)。15×。

第9圖 第8圖ノ一部弱擴大。「ズダンⅢ」「ヘマトキシリン」染色。40×。

蜂窠ハ極メテ廣範ニ亘リテ存シ。猶ホ殘存セルモノアリテ多ク鬆粗結締織之ヲ埋ム。

鑿開骨壁ヲ被覆スル薄キ肉芽並ニ蜂窠内鬆粗結締織ニハ血管多ク。炎性充血ヲ伴ヒ。又顯著ニ脂肪染色ニ應ズル血清ヲ充スモノアリ。

稀ニ存スル蜂窠含氣腔。或ハ手術縫内ニハ脂肪顆粒ヲ含ム多數ノ膿球。脂肪染色ニ着染スル漿液性滲出物ノ著痕アリ。

第10圖 患側聽器ニ於ケル漿液纖維素性迷路炎。(實驗第5例)。15×。

第11圖 第10圖ノ一部弱擴大。「ズダンⅢ」「ヘマトキシリン」染色。80×。

蝸牛迷路ハ各迴轉ノモノ總テ炎症ノ波及ヲ蒙リ。内外淋巴腔。即チ鼓室道。蝸牛殼皆並ニ前庭道ノ下半ニ及ビテ漿液纖維素性迷路炎アリ。前庭膜。螺旋神經。コルチ器。クラウザウス細胞ヨリ脈絡帶ニ至ル諸細胞。或ハ螺旋靱帶等ハ全ク此中ニ埋没シ。原形ヲ認メ得ズ。唯「ヘマトキシリン」ニ濃染セル2雙ノ骨性螺旋板ノ存在ニ據リテ僅ニ鼓室道。並ニ前庭道ヲ區別シ得ルノミ。

之等ノ肉芽組織ニ於ケル脂肪質ハ極メテ多量ニシテ。脂肪顆粒細胞。粗大脂肪顆粒ノ小塊狀集積。紡錘狀細胞ノ脂肪沈着等トス。