乳嘴蜂窠ノ遺傳的關係ニ就テノ研究

第一編 乳嘴蜂窠遺傳ト双生兒

Morio Okasaki: Über die Bedeutung der Erbfaktoren bei der Pneumatosa der Warzenfortsätze. (Erste Mitteilung: Zwillingforschung)

岡山醫科大學耳鼻咽喉科教室 (主任 田中教授)

講師 醫 學 士 岡 崎 衛 生

本論文ノ大要ハ第 38 回⁽⁵⁸⁾及ビ第 39 回⁽⁵⁹⁾大日本耳鼻咽喉科會總會ニ於テ
演述シタルモノナルガ。其後更ニ材料ヲ加ヘ研究ヲ進メタルモノナリ。

目 次

緒言並ニ文献	第三節 材 料
第一章 研究方法並ニ材料	第二章 調査成績
第一節 人類遺傳學研究方法	第三章 總括並ニ考案
第二節 乳嘴蜂窠ノ「レ」撮影法 及ビ含氣型分類	第四章 結 論 文献、附圖、説明

緒 言 並 ニ 文 献

乳嘴蜂窠ノ構造ハ個人ニヨリ年齢ニ應ジ千姿
萬態ニシテ。其良好ナル發達ト完全ナル缺如ト
ノ兩極端間ニハアラユル移行型ヲ包含ス。近時
Wittmaack⁽¹⁰⁸⁾ ハ乳嘴蜂窠型ノ種々相ハ中耳被
覆粘膜ノ性狀ト極メテ緊密ナル相互關係ヲ有ス
ルモノナル事ヲ闡明シ。之ヲ中耳體質ト命名シ
テ中耳炎ノ經過及ビ轉歸ニ對シ最モ重大ナル影
響ヲ及ボスモノナリト提唱シ。識者ノ注意ヲ新
ニセリ。即チ總ベテ重症ノ中耳炎ハ所謂病的蜂
窠從ツテ多少ニ拘ラズ肥厚セル中耳粘膜ヲ有ス
ル顚顚骨ニ發生ス。此內著シキ粘膜肥厚ヲ伴フ
高度ノ含氣障礙ハ。從來考ヘラレシガ如ク慢性
炎症ニヨル骨象牙質化ノ二次的產物ニハ非ズシ

テ。實ニ慢性耳炎ノ素地トナルモノナリ。又急
性耳炎ハ輕度乃至中等度ノ含氣障礙換言セバ發
育ハ概ネ可良ナルモ細胞間壁厚ク排列不規則ナ
ルヲ特異トスル蜂窠及ビ夫レニ相當スル性狀ノ
粘膜ニ好發ス。而シテ此際病的蜂窠ニ於テハ局
所解剖的關係不良ニシテ且ツ粘膜ノ抵抗減弱セ
ルノミナラズ腦膜ニ直接連絡スル胎生期血管系
ノ殘存スルコトアル爲メ一度耳炎ニ侵サルハ
ヤ。例ヘ適時適切ナル療法ヲ講ズルト雖モ。或
ハ經過遷延シテ荏苒治癒セズ。或ハ急激ナル經
過ノ下ニ乳嘴突起炎ニ移行シ。將又。恐ル可キ
頭蓋內合併症ヲ惹起スルノ避ケ得ザル運命ニ在
ルコトアリ。之ニ反シ健全ナル中耳粘膜ニ被覆

サル、所謂正常蜂窠ニ於テハ例ヘ罹患スルトモ順調ニ治癒スルヲ常トストイフ。但シ遺憾ナラ正常蜂窠ヲ有スル個人ハ比較的僅少ナリ。氏ノ所論ハ此點ニ關スル限リハ Albrecht(1925)⁽⁹²⁾, Steurer (1925, 1926)^(87,88), Beck, J. (1926)⁽¹⁵⁾, Hanse(1930)⁽²⁹⁾, 義江(1932)⁽¹¹⁶⁾, 山下(1932)⁽¹¹⁴⁾ Altmann u. Vermes(1933)⁽¹⁰⁾ 等其他多數ノ學者ニヨリ立證補遺サレ今ヤノ定説タラントスノミナラズ Lange, W.(1933)⁽⁴³⁾, Rollin(1933)⁽⁶⁵⁾等ニ從ヘバ。彼ノ「ムコーズ」耳炎ニ於テスラ其豫後ヲ支配スル最終因子ハ實ニ乳嘴蜂窠構造ノ個人的差異ニ存スルトイフ。以テ乳嘴蜂窠ノ耳炎ニ對スル意義ノ如何ニ重要ナルカラ親フニ足ラン。而シテ吾人ハ一方ニ於テ軌近ノ進歩セル「レントゲン」裝置ト適切ナル撮影方法ノ選擇ノ下ニ生體乳嘴蜂窠ヲ明瞭且ツ精密ニ描寫シ得ルガ故ニ逆ニ乳嘴蜂窠ノ狀態ヨリ所謂中耳體質ヲ判定シ。以テ中耳炎ノ經過及ビ豫後ヲ推測シ更ニ治療方針ヲ決定スル等。臨牀上ニ資シ得ル所尠カラズ。然ルニ此蜂窠系種々相ノ發生本體ハ未ダ明カナラズシテ。遺傳的要約ニ重キヲ置ク説ト專ラ外因ニ因リ支配サルハトノ見解相對立シ現在モ尙ホ論争ノ渦中ニ在リ。從ツテ之ガ孰レノ要約ニヨリ規定サルハモノナルカラ解決スルコトハ。耳科學ニ於テ最モ興味アル問題ノ一ナリト云フ可シ。

今從來ニ於ケル乳嘴蜂窠ニ關スル業績中。主トシテ蜂窠系ニ於ケル個人的差異ニ注目シ。或ハ更ニ其發生本態ニ論及セル研究ヲ回顧センニ次ノ如シ。

乳嘴蜂窠研究ノ沿革ハ。遠ク 16 世紀ノ中葉ニ溯リ恐ラク Vesalius⁽¹⁰²⁾ ヲ以テ嚆矢トス。サレド其後久シキニ亙リ研究ハ補聴或ハ急激ナル氣

壓ノ變化ニ對スル防禦裝置等主トシテ其生理的方面ニ限局サレシ爲メ。其解剖的構造ニ就テノ知見ハ殆ンド何等補遺サルハ所無ク徒ラニ先人既踏ノ跡ヲ辿リシカノ如キ觀ヲ呈セリ。蓋シ耳科學ノ基礎未ダ緒ニ就カズ。從ツテ乳嘴蜂窠ノ臨牀的意義ニ全然無知ナリシコトニ想到セバ。之ガ單ニ系統解剖學ノ一小部門トシテ等閑視サレ來リシ事モ敢テ怪シムニ足ラザラン。斯クシテ耳科學獨立スルニ及ビ。必然ノ要求ヨリ乳嘴蜂窠ニ關スル研究ハ俄カニ旺盛トナリ。就中耳外科ニ必要ナル局所解剖ニ就テノ知見ハ著シク精密ヲ加フルニ至レリ。サレド蜂窠系種々相ノ本態ニ關シテハ當時ニ於ケル斯界ノ權威 Schwarze u. Eysel(1873)⁽⁷²⁾, Wildermuth(1877)⁽¹⁰⁶⁾, Zuckerkandl(1879)⁽¹¹⁷⁾, Bezold(1882)⁽¹⁷⁾等スラ殆ンド注意スル所無ク唯漫然個人的差異若シ強ヒテ註譯ヲ加フルナラバ遺傳性ノモノナリト解シテ満足シ居タリシコトハ之等諸家ノ斷片的記載ニ徴スルモ疑フノ餘地ナシ。但シ板障性乃至緻密骨性ノ非含氣蜂窠ハ。本來ハ含氣性ナル蜂窠ガ慢性耳炎ニヨリ二次的變化ヲ來タセルモノト一般ニ信ゼラレタリ。此中ニ在ツテ唯 1 人 Mourét(1913)⁽⁶⁶⁾ ハ。純肉眼解剖學的檢索ニ基キ蜂窠系ノ變異ハ全ク素因分配ノ個人的相違ニ存スルト解シ。積極的ニ遺傳説ヲ主張シ。尙ホ初メテ含氣障ハ炎症性骨象牙質化ノ續發症ニ非ズト述べ。從來ノ定説ヲ敢然反駁セリ。氏ノ研究ハ其方法ニ於テ幾多ノ難色アリトハイヘ。着想頗ル卓拔ナルト共ニ。乳嘴蜂窠問題ノ紛糾セザル以前ニ於テ行ハレシコトハ大イニ注目ニ價ス。

然ルニ 1918 年 Wittmaack⁽¹⁰⁸⁾ ガ從來主トシテ慣用サレ來タリシ所謂肉眼的解剖ニ代フルニ組

組織的研究ニヨリ浩瀚ナル業績ヲ公ニスルニ及ビ。幾多ノ新生面濶然トシテ拓ケ。且ツ期セズシテ乳嘴蜂窠發生本態ニ關スル再検討ノ動機ヲ與ヘ。遂ニ所謂乳嘴蜂窠問題ヲシテ今日ノ隆盛ヲ見ルニ至ランメタリ。氏ノ所説ニハ尙ホ少カラザル疑義ヲ存スルト雖モ。正ニ劃期の業績ト稱スルニ價ス可ク。其後乳嘴蜂窠ヲ論ズル者一トシテ本業績ヲ引用セザル無キハ。以テ其一班ヲ窺フニ足ラン。今其大要ヲ抄記センニ。次ノ如シ。

Wittmaackノ研究ハ之ヲ（1）顚顚骨ノ正常含氣。（2）顚顚骨ノ病的含氣。（3）病的蜂窠ノ中耳炎ニ對スル關係ニ大別シ得。

（1）顚顚骨ノ正常含氣

顚顚骨ノ含氣機轉ハ第5—第6胎生月ニ開始サル。即チ此時期ニ達スルヤ。歐氏管粘膜ハ鼓室ニ侵入シ來タリ。内部ヲ充填スル胎生膠樣組織ヲ漸次壓迫乃至排除シ。其表面ヲ被覆シテ1ノ空洞ヲ形成スルニ至ル。今ヤ本來ノ胎生組織ハ上皮下結締組織ト稱セラル。同様ナル機轉ハ次デ上鼓室及ビ乳嘴竇ノ順序ニ進行ス。但シ。乳嘴竇ニ於テノミハ更ニ喰骨細胞及ビ Hwship 氏「ラクーネ」ノ出現並ニ之ニ伴フ上皮下結締組織ノ侵入ニヨリ隣接骨蠶食サレ内腔ハ遠心性ニ著シク擴大ス。以上ノ中耳3主要腔ハ1歳ノ終—2歳ノ始迄ニ完成サレルモノニシテ。第1發育期ト稱セラル。之ニ續キ大略5歳ニ至ル迄ノ間ヲ第2發育期ト呼ビ竇ニ蜂窠系ノ完成サルハ時期ナリ。乳嘴竇壁ニ於ケル骨吸收ハ此時期ニ於テモ尙ホ持續セラルハガ。該機轉ハ第1發育期ト異リ均等ニ行ハレザル爲メ。竇壁面ハ著シク凹凸不平ナル。換言セバ壁面ノ至ル所ニ骨突起ヲ殘シ。夫レ等ノ間ニ生ズル陷凹部ノミガ

上皮下結締組織ヲ充スニ至ル。斯クシテ此上皮下結締組織退化後。隣接粘膜ヨリ上皮沈降シ來タリテ之ヲ被覆シ。同時ニ骨突起ハ次第ニ竇内ニ向ツテ成長シ。1歳ノ終リニ於テ著シク廣漠タリシ乳嘴竇ヲ狹隘ナラシメツ。遂ニ其遊離端ハ唯乳嘴竇ニ通ズル1小孔ヲ殘シテ互ニ癒合シ1ノ空洞ヲ形成ス。之即チ乳嘴蜂窠ニシテ母細胞ト稱セラル。此新生蜂窠ノ内部ニ於テハ更ニ同様ナル機轉ガ反覆サルハ結果漸次微細網狀構造ヲ來タスニ至ル（求心性含氣）。尙ホ一方末梢部殊ニ乳嘴突起尖端ニ向ツテハ。全ク第1發育期ト軌ヲ一ニシテ含氣進行ス（遠心性含氣）。斯クシテ含氣完了セル場合ニ於テハ。乳嘴蜂窠ハ全乳嘴突起腔ヲ充シ。乳嘴竇ヲ中心トシテ放射狀ニ規則正シク排列シ。之ヲ遠ザカルニ從ツテ大サヲ増シ。各個ノ蜂窠ハ菲薄ナル隔壁ヲ以テ境サルハ像ヲ呈ス。而シテ當初ノ高層粘膜ハ菲纖ナル層トナリ蜂窠ノ内面ヲ被覆ス。斯ク含氣機轉ハ大體5歳ヲ以テ完了スルモ間質性並ニ末梢性ノ發育ハ終生停止スル所無シ。サレド此時期ニ於ケル含氣機轉ハ頗ル緩徐且ツ極メテ輕微ナルニヨリ乳嘴蜂窠系ノ全貌ハ何等根本的ノ變化ヲ受ケズ。之ヲ要スルニ。完成サレタル正常蜂窠系ニ於テハ個人的差異殆ント無ク。唯僅カニ末梢部ノ形態ニヨリ識別サルハ場合モアルノミ。

（2）顚顚骨ノ病的含氣

以上ノ説キ來タツタ所ニヨツテ明カナル如ク。含氣機轉ハ殆ンド専ラ中耳被覆組織即チ中耳粘膜ノ機能ニ基キ。骨組織ハ唯從屬的意義ヲ存スルニ過ギズ。從ツテ中耳粘膜ガ蜂窠發育期就中其初期ニ於テ障礙サルハ時ハ必然的ニ含氣機轉モ抑制サル。而シテ其最大原因トナルモノハ乳兒時代ニ於ケル中耳炎ナリ。Wittmaack

ハ所謂乳兒耳炎ヲ Goerke(1905)⁽²⁶⁾ 及ビ Riettschel(1909)⁽⁶²⁾ = 倣ヒ、潜在性中耳加答兒、急性滲出性耳炎及ビ兩者ノ混合型ニ區別セリ。潜在性中耳「カタル」トハ Aschoff(1897)⁽¹²⁾ ノ提唱セル羊水、胎便、脂衣、或ハ吐物等ノ經歐氏管迷入ニヨツテ起ル非菌性異物耳炎ノ謂ニシテ、臨牀症狀ヲ全く缺如シ剖檢ニヨリ初メテ認識サレ、然カモ乳幼兒ノ大多數ニ潜在スルト稱セラル。本症ハ組織ノ増殖及ビ器質化ヲ特異トシテ中耳粘膜ノ肥厚ヲ招來ス。第2ノ滲出性耳炎トハ中耳化膿症ト同一義ニシテ、其特性トシテ中耳粘膜ノ纖維性萎縮ヲ貽ス。但シ純纖維性變化ハ甚ダ稀ニシテ、通常第3ノ混合型即チ潜在性中耳加答兒ノ基底ニ化膿菌ガ二次的ニ感染スル形式ヲトリ、中耳粘膜ハ部位ニヨリ或ハ肥厚シ或ハ萎縮ス。之等耳炎ノ種類、強度及ビ發現時期ナル3條件ニ應ジテ、正規ノ含氣機轉ハ種々ナル程度ニ障碍サレ、茲ニ千姿萬態ナル蜂窠像ヲ招來スルニ至ル。即チ例ヘバ障碍高度ナル場合ニ於テハ蜂窠形成ヲ全く缺如スルモ、之ガ萎縮性粘膜ノ續發症ナル時ハ、骨髓腔中ニ侵入スキ上皮下結締織ヲ缺如スルガ故ニ、非含氣部ハ本來ノ板障性骨ノ儘殘リ、肥厚粘膜ノ場合ニハ、侵入シタル上皮下結締織ノ退行遷延スル爲メ二次的化骨ニヨリ緻密骨性ノ像ヲ呈ス。又炎症發現ノ時期ニ應ジ例ヘバ1歳ノ終ニ於テハ、異常ニ大ナル乳嘴竇ヲ殘ス。尙ホ又、障碍輕度ナル時ハ、發育範圍ハ正常ニ近キカ或ハ正常以上ノ場合モアレド、隔壁厚ク排列不規則トナルヲ常トス。斯クシテ千姿萬態ナル蜂窠像ヲ招來スルニ至ルモノナルガ、氏ノ統計ニ從ヘバ大多數即チ約90%ハ斯カル變化ヲ蒙ムルトイフ。

(3) 病的含氣蜂窠ノ中耳炎ニ對スル關係

大略冒頭ニ述ベタルガ如シ。依ツテ茲ニハ省略ス。

即チ Wittmaack = 從ヘバ、正常含氣ニ於テハ個人的差異ハ殆ンド無ク、蜂窠系ノ種々相ハ全ク蜂窠發育期殊ニ其初期ニ作用セン中耳炎ノ所產物ニシテ、然カモコハ大多數ノ辿ル可キ運命ナリトスルニ在リ。要スルニ蜂窠系發生狀態ニ關スル外因說トモ稱シ得可シ。

Wittmaack ノ業績ヲ契機トシテ蜂窠系ノ個人的差異乃至其發生本態ハ大イニ注目サル、所トナリタリ。即チ Shea(1924, 1927)^(73, 74), Carmody(1925)⁽¹⁹⁾, Van Gilse(1926)⁽⁶⁴⁾ 等ハ夫々臨牀的「レ」の一組織解剖學的檢査ニヨリ Wittmaackノ所說ヲ副鼻腔ニ移シテ立證シ、Brock(1926)⁽¹⁸⁾ハ「鼓膜像ト乳嘴蜂窠トノ關係ニ就テ」ナル研究中ニ本問題ニ論及シ、出生後ノ第1呼吸ニヨリ中耳腔ニ侵入スル空氣ガ含氣現象開始ノ原動力トナル事ヲ前提トシテ、又 Beck, J. (1927)⁽¹⁶⁾ハ乳嘴突起含氣ト副鼻腔含氣トノ間ニハ一定ノ相互關係アル事ヲ認メテ、略シ Wittmaackノ外因說ヲ支持シ、其他 v. Eiken (1928)⁽²²⁾, Goerke(1928)⁽²⁷⁾, Mygind(1928)⁽⁶⁷⁾ 等モ之ヲ原則的ニ承認セリ。然ルニ一面 Wittmaack 氏說ニ反對セル學者モ甚ダ多シ。即チ Voss(1926)⁽⁶⁸⁾ハ90%ニ於テ見ラル、潜伏性乳兒中耳「カタル」ニ比シ比較的稀ナル成人含氣抑制頻度トノ間ノ不均衡ヲ指摘シ、Marx(1930)⁽⁴⁸⁾ハ乳幼兒耳炎ヲ再檢討ニ附シ、潜伏性中耳「カタル」トイヒ急性滲出性耳炎トイフモ各獨立ノ疾患ニ非ズシテ單ニ同一疾患ノ時期的差異ニ過ギズトノ見解ニ達シ、從ツテ之等兩種耳炎ヨリ夫々規則正シク中耳粘膜ノ肥厚乃至萎縮ヲ貽ストスル外

因説ヲ反駁シ。Krainz(1925)⁽³⁸⁾, Lange, W. (1928)⁽⁴²⁾, Meyer, M.(1928)⁽⁶¹⁾等ハ後年ノ急性乳嘴突起炎＝際シテモ亦中耳粘膜ノ肥厚ヲ招來シ得ル事ヲ明カニシ。嘗ニ乳兒耳炎ノミガ後年ノ耳病理＝決定的意義無シト述ベタリ。之等組織學の追試＝對シ一方ニ於テ Knick u. Witte (1923)⁽³⁶⁾ハ。Wittmaackノ組織學的検査ヨリ歸納サレシ耳炎ハ。全ク臨牀の證明ヲ缺點ニ於テ不備アルヲ觀取シ。1歳以內＝急性中耳炎即チ Wittmaackノ第2型耳炎ヲ經過セル事確實ナリシ25例ノ患者ヲ年餘ノ後「レ」學的ニ検査シ。罹患側ノ高度ノ含氣障碍ヲ殘スモノハ僅カ8例＝過ギザリシ事ヨリ。含氣抑制ノ原因ハ獨リ乳幼兒耳炎＝歸サル可キモノ＝非ズト提唱シ。Grahe(1928)⁽²⁸⁾モ亦氏ガ胸鎖乳頭筋ノ含氣機轉＝及ボス影響ヲ追究セントスル斜頸患者中3例ハ乳幼兒時代＝中耳炎ヲ經過セルモノナリシガ。孰レモ左右乳嘴蜂窠像ニ殆ンド何等ノ差異モ無カリシ事ヲ特ニ強調シテ。Wittmaackニ反對セリ。尙ホ Knick u. Witteト略々同様ノ研究ヲ行ヒタル Eisinger(1928)⁽²³⁾, Kriegsmann(1931)⁽³⁹⁾, Loebell(1931)⁽⁴⁶⁾等ハ單ニ事實ヲ提供スルニ止ムルト述べ努メテ論争ノ渦中ニ投ズルコトヲ避ケ居ルガ如キモ。其成績ハ明カニ外因説ト兩立シ得ザルモノナリ。

斯ク專ラ乳兒耳炎ヲ以テ乳嘴蜂窠系ノ種々相發生ヲ説明スル能ハザルニ及ビ。期セズシテ遺傳説ノ再登場ヲ見ルニ至レリ。即チ Wagener (1921)⁽¹⁰⁸⁾ハ晒製頭蓋＝就テノ「レ」學的研究ヨリ。頭蓋骨輕クシテ軟カナル程蜂窠＝富ミ頭蓋骨重クシテ硬キ程蜂窠＝乏シトノ法則ヲ導キ。Wittmaackガ骨構造ハ含氣機轉＝對シ唯從屬の意義ヲ有スルニ過ギズトセルヲ駁スルト

共ニ更ニ進ンデ骨構造ノ個人的素質コソ含氣ノ質及ビ量ヲ決定スル根本因子ナラント推測セリ。Kretschmann(1921)⁽³⁷⁾ノ歐洲大戰中ニ得タル臨牀經驗＝ヨレバ。露國人ノ乳嘴突起ハ獨逸人ヨリモ小ニシテ概ニ含氣蜂窠ヲ缺キ海綿様構造ヲ呈シ且ツ頭蓋内合併症ヲ來タスコト頗ル多シトイフ。Turner u. Porter(1922)⁽⁹⁶⁾ハ種種ナル人種ヨリ由來セル1000個ノ晒製頭蓋ヲ調査シタル結果。含氣蜂窠ハ短徑頭顱＝最モ多ク。長徑頭顱＝最モ少ク。此逆ハ非含氣蜂窠＝適合シ。中徑頭顱ハ其中間ニ位スルコトヲ明カニシ。一般ニ蜂窠ノ發育ハ人種純粹ナル程良好ナリト結論セリ。其他 Weidenreich(1922)⁽¹⁰⁴⁾, Talpis Uebermann(1928)⁽⁹⁰⁾, Theissing(1930)⁽⁹⁵⁾等モ乳嘴突起ノ含氣狀態ヲ個人乃至種族特性ト目シ遺傳説ニ贊セリ。然リ而シテ遺傳説ヲシテ著シク生彩ヲ放ツニ至ラシメタルモノハ Albrecht(1925)⁽¹⁾及ビ其一統ノ業績ナリ。即チ從來ノ遺傳説ハ概ネ消極的證明ヲ根據トセルニ止マリシ爲メ揣摩憶測ノ域ヲ脱セザル點モ少カラザリシガ。Albrechtハ双生兒研究ニヨリ直接遺傳原基ノ解明ヲ試ミ。乳嘴蜂窠ハ主トシテ遺傳因子＝因リ支配サル、トノ積極的證明ヲ與ヘタリ。氏ノ着想ハ門下 Schwarz(1929)⁽⁶⁹⁾ニヨリテ祖述サレ。尙ホ Leicher(1928)⁽⁴⁴⁾ニヨリ追試立證サレ。爾來遺傳説ハ漸ク有力ナラントスルノ趨勢ニ向ヘリ。斯ク囂々タル輿論ニ抗シ兼ネシモノカ。近時 Wittmaack⁽¹⁰⁹⁾自身モ所説ノ一部ヲ改變シ遺傳説ヲ參酌スルノ餘儀ナキニ至リタリト雖モ。依然自己ノ牙城ヲ堅守シテ譲ラズ。其後モ主トシテ Albrecht (1931, 1932, 1933)^(6, 7, 8)ト熾烈ナル論争 (1930, 1932, 1933)^(110, 112, 113)ヲ續ケ互ニ相對峙ス。

翻ツテ本邦ノ文献ヲ見ルニ。唯田中教授(1926)⁽⁹¹⁾ハ前記諸家ト全然無關係ニ。耳炎ノ家族病理ニ對シ乳嘴蜂窠構造ノ個人的差異ガ重要ナル意義ヲ有スル事ニ就キ獨自ノ見解ヲ懷カル、ヲ知ルノミ。尙ホ下田(1932)⁽⁹²⁾ハ顙顙骨含氣蜂窠ノ組織學的研究中ニ從來ノ文献及ビ自己ノ成績ヨリ本問題ニ論及シ、「余ノ材料ハ操作前ニ必ず耳鏡ヲ用ヒテ検査シ鼓膜穿孔ハ勿論其他鼓膜ノ溷濁、萎縮及ビ瘢痕等ノ病的變化アルモノハ嚴ニ除外シ本研究ニ供セザリシヲ以テ。含氣蜂窠ノ缺如シ居ルコト及ビ其不完全ナル發育ハ中耳腔及ビ之ニ連續スル含氣蜂窠ノ被覆組織體質ノ差異ニ據リ、發育勢力ノ廢除シ、或ハ虛弱ニナルコトニ依リテ起ルモノニシテ。此被覆組織體質ハ蜂窠形式ニ緊要ナル役割ヲ司ルモノナルヲ思考セントス」ト述べ遺傳説ニ贊シタルモ。余ノ卑見ヲ以テスレバ。氏ノ材料ハ例ヘ急性中耳炎ノ殘胎症アルモノハ悉ク除外シ得タリトスルモ。乳嘴蜂窠問題ニ於テ根本的ニ重要ナル潜伏性中耳加答兒ノ影響ヲ批判スル事無クシテ斯カル結論ヲ下スハ。結果ニ於テ或ハ同一ナリトモ。餘リ大膽ニ過グルト云ハザルヲ得ズ。

由是觀之。乳嘴蜂窠系種々相ノ發生本態ヲ繞リテハ外因説ト遺傳説トアリテ今日尙ホ論議ノ跡ヲ斷タズ。近時遺傳説ヲ唱道スル學者ハ漸ク多キヲ加フルニ至リタリト雖モ。直接遺傳關係ヲ立證セントスル研究ハ Albrecht, Leicher 及ビ Schwarz ノ3者ニヨリ行ハレシニ止マリ極メテ寥々タルノミナラズ。此3者間ニ於テスラ意見ノ統一ヲ缺キ又其觀察ノ如キモ Schwarz ノモノヲ除キテハ不十分ナル點少シトセズ。而シテ人種ヲ異ニシ風土ヲ異ニスル本邦人ニ就テハ斯方面ノ研究ハ皆無ナル現狀ニ在リ。一方乳

嘴蜂窠ノ臨牀的意義ハ既ニ冒頭ニ述ベタルガ如ク甚ダ重大ナリ。果シテ Wittmaack 氏說正シクバ。吾人専門醫家ハ Amberg(1922)⁽⁹³⁾ノ提言ニ從ヒ。兒科醫及ビ産科醫ト協力シ就中潜伏耳炎ヲ豫防シテ所謂病的蜂窠ノ發生ヲ防ギ。以テ端倪スベカラザル後年ノ耳炎ト闘フヲ合理的トス可ク。若シ又。Albrecht ノ見解正鵠ニ當レリトセバ。體質學的乃至優生學的見地ヨリ之ニ對抗スルヲ適切トセン。吾人ハ二途孰レヲ選バンカ岐路ニ立チテ去就ニ迷フヤ久シ。茲ニ於テ余ハ本問題ノ耳科臨牀ニ齋ラス使命頗ル重大ナルヲ察スルト共ニ。之ガ決定的解決ノ極メテ緊急事タルヲ痛感ス。

之。余ガ田中教授御指導ノ下ニ本研究ヲ志シタル所以ナリ。

第一章

研究方法並ニ研究材料

第一節 人類遺傳學研究方法

動植物界ニ於テ極メテ規則正シク行ハル、遺傳ノ法則ハ人類ニ於テモ亦適合ス可シトハ想像ニ難カラザル所ナルモ。事實ハ之ニ反シ人類遺傳ニ關スル知見ハ未ダ憶説ノ域ヲ脱セザル憾多シ。從來醫學者モ生物學者モ斯方面ノ研究ニ献身の努力ヲ傾倒シ來タレルニモ拘ラズ尙ホ且ツ人類遺傳ノ蘊奧ヲ究メ得ザルノ現狀ニアリ。蓋シ人類ニ於テハ彼ノ動植物界ニ於ケルガ如ク實驗的研究ヲ行ヒ得ズ。從ツテ或ル形質保持者ヲ任意ニ交配セシメ。更ニ同一兩親ヨリ生ゼル世代間ニ結婚ヲ續行スル等ハ。人道上嚴トシテ許サレザル所ナルガ故ニ。吾人ハ唯無選擇ニ行ハレタル交配ノ結果ヲ蒐集觀察スルヨリ外無ク。加フルニ人類ノ一生ハ甚ダ長ク然カモ其長キ

世代間ニ生ズル子女ノ數ハ之ニ反シテ甚ダ少キ爲メ、成型型ヲ分析シ形質分離ノ歸趨ヲ明カニスルコト極メテ困難ナレバナリ。從ツテ人類遺傳學ノ研究ハ専ラ統計學の方法ニヨルノ外無キ有様ナリ。

(A) 個人統計の乃至歸納の方法

(Individualstatische od.

Induktive Methode.)

(1) 家系の検査。メンデル則ノ「互ニ對フナス形質保持者ノ交配ニヨリテ生ズル後續世代ニ就キ其形質分離ノ狀態ヲ追跡スル」トイフ原理ヲ應用シ。一家系内ニ於ケル一定形質ヲ個人的ニ統計シテ遺傳ノ型式ヲ歸納スル方法ニシテ、専ラ家系圖ニヨルモノナリ。

(2) 双生兒研究。双生兒ヲ介シテ人類遺傳ノ神秘ヲ窺ハントスル方法ハ Galton ノ創意ニ基キ、本來家系ノ研究ノ一部門トシテ擡頭セルモノナルガ、其後比較發生學ノ進歩ト高等數學ノ補足ニヨリ之ガ享有スル遺傳物質ニ關シ精密ナル知識ヲ齎ラスニ及ビ、獨自ノ境地ヲ開拓シ、今ヤ人類遺傳學研究ニ於テ最モ樞要ナル地歩ヲ確保スルニ至レリ。即チ一卵性双生兒ハ受精セル1個ノ卵細胞ノ2等分ニヨリテ生ジ從ツテ其遺傳物質ハ等質等量ナリトノ見地ニ立脚シ、一卵兒ニ現ハル、總テノ相似ハ遺傳性ナリトシ、之ニ反シ差異ヲ示ス總テノ形質ハ外的因子ノ影響ト解スルニアリ。而シテ此成績ハ Siemens^(77, 78)ノ發案ニナル二卵性双生兒(同一經期ニ屬スル2個ノ卵ガ殆ンド時ヲ同ジクシテ各獨立ニ受精シ生ジタルモノ 從ツテ略ニ等シキ環境裡ニ在ルモ遺傳物質ノ分配ハ平等ナラズ)ヲ對照トシテ批判セバ一層確實性ヲ増スモノナリ。以上ノ原則ヲ敷衍スル時次ノ如キ事項ヲ決定シ得。

1. 一般ニ稀ナル形質ガ一卵性双生兒ノ兩兒ニ於テ一致スル時ハ恐ラク之ヲ遺傳性ナリト決定シ得。

2. 例ヘ稀ナラザル形質トイヘドモ多數ノ材料ニ就テ調査シ且ツ二卵性双生兒ヲ對照検査スル時ハ遺傳性ヲ決定シ得。即チ一形質ノ相似シ或ハ相俱ニ發現スル頻度ハ、一卵兒ニ於ケルヨリモ二卵兒ニ於テ 又二卵兒ニ於ケルヨリモ單胎同胞ニ於テ減ズ。即チ一般ニ親緣關係稀薄トナルニ從ツテ低下スル關係成立ス。

3. 或形質ガ双生兒兩兒間ニ於テ各々異ルハ外的因子ノ影響ニヨルモノニシテ、從ツテ外因ノ程度ヲ推測シ得。

(B) 集團統計の乃至演繹の方法

(Massenstatische od.

Deduktive Methode.)

既述ノ如ク人類ニ於テハ1世代ニ生ズル子女ノ數ハ甚ダ少數ナルガ故ニ、或形質ニ就キ多數家系ノ多數個體ヲ統計の綜括調査スルモノニシテメンデル則ノ所謂「各世代ニ現ハレタル一定形質ヲ示ス個體ノ數ヲ統計スル」コトニ該當シ、専ラ生物測定學の方法ニ據ルモノナリ。叙上ノ研究方法ハ其目的ニヨリ大イニ價值ヲ異ニス。茲ニ問題トナレル乳嘴蜂窠ハ Wittmaackニ從ヘバ殆ンド悉ク中耳炎ナル外的影響ヲ蒙リタルモノナルガ故ニ、之ガ遺傳關係ヲ論ズルニ當ツテハ常ニ外因ヲ顧慮セザルベカラズ。サレバ一般ニ慣用サル、多數ノ家系ヲ蒐集シ多數ノ無關係ナル個體ヲ無條件ニ一括シテ其間ニ於ケル現象型の比率ヲ測定スル方法ハ此際不適當ナリ。ノミナラズ乳嘴蜂窠ノ如キ特殊方法ヲ以テセザレバ窺フ能ハズ且ツ記錄ニ殘シ得ザル解剖的變異ニ就キ遠ク既往ニ溯リ數十世代ニ亘ル

ガ如キ家系圖ヲ求ムルコトノ不可能ナルハ言ヲ俟タズ。況ンヤ本研究ニ於テ乳嘴蜂窠描出ニ供セシ「レントゲン」ガ耳科學ニ應用セラレテヨリ僅々30年ヲ出デザルニ於テヲヤ。尙ホ此際批判ヲ要スルハ Meyer, M.⁽⁶³⁾ 及ビ Schwarz^(70, 71)ノ研究ナリ。即チ之等ハ近時相前後シテ人胎兒ニ於ケル中耳胎生組織ヲ組織學的ニ検査シ遺傳說ニ一ノ確證ヲ與ヘタリト述ベシモ。氏等ノ研究ガ胎生時ニ於テハ外的影響ハ悉ク除外サレシモノトノ前提ニ出發セシハ早計ナリ。即チ胎兒ト雖モ羊水ナル一ノ環境裡ニ在ツテ常ニ其影響ヲ蒙ムリ。殊ニ材料トサレタル胎兒ノ大多數ハ不正規分娩ニ由來スルモノナルガ故ニ胎兒自身ハ固ヨリ既ニ子宮及ビ其内容モ多大ノ變化ヲ受ケ居ル可キハ察スルニ難カラズ。ノミナラズカカル所見ハ標本作製上ノ不備又ハ死後變化ニヨリテモ生ズルトテ Wittmaack⁽¹¹²⁾ヨリ痛烈ニ反駁サレ。徒ラニ攻撃ノ糧ヲ與ヘタルニモ似タル結果ヲ招ケリ。要スルニ。遺傳學說ヨリ見レバ。胎兒中耳ト雖モ等シク現象型タルニ變リ無ク。勿論遺傳ト外因トハ嚴格ニ區別サル、ヲ要シ從ツテ氏等ノ着想ハ本研究ニ適切ナリト云フヲ得ズ。然ルニ双生兒ニ於テハ。既述ノ如ク。分配セラレタル遺傳物質ヲ豫知シ。一方外因ノ程度ヲモ推測シ得ルヲ以テ。叙上ノ缺陷ヲ補フト共ニ必要ナル條件ヲ充スモノナリ。且又。一般ニ解剖的變異ノ遺傳研究ニ於テハ彼ノ聾啞。短指症等ノ如ク特殊形質ノ存否ヲ追究スルニ非ズシテ。其目的トスル所ハ一形質ニ關スル相似ノ程度ヲ調査スルニ在ルガ故ニ。此點ニ於テモ亦双生兒研究ハ極メテ適切ナリ。依ツテ余ハ先ヅ双生兒ニ就テ遺傳ノ有無ヲ確定シ。次デ家系の並ニ集團統計的検査ニヨリテ之ヲ

補遺スルノ方針ヲ採ルコトセリ。

第二節 「レントゲン」寫眞撮影法

及ビ含氣型分類

生體乳嘴蜂窠ヲ觀察スルニハ。手術的鑿開ト「レントゲン」透視トノ2途アルモ。前者ハ偶偶乳嘴突起炎ニ際シ施行シ得ルモノニシテ素ヨリ之ヲ何人ニモ適用シ得ルモノニ非ズ。從ツテ余ノ研究ハ専ラ「レ」ヲ介シテ行ハレタリ。然リ而シテ顚顚骨乳嘴部ノ「レ」撮影法中解剖的關係ヲ最モヨク明示スルハ Schueller(1905)⁽⁶⁸⁾, Lange, S. (1907)⁽⁴¹⁾, Sonnenkalb(1913)⁽⁶⁶⁾等ノ顚顚骨側面觀ヲ與フル撮影法ナリ。之等ノ撮影法ハ其考案者ニ從ヘバ各々幾多ノ長所ヲ有スルガ如キモ。原則的ニハ大同小異ノモノト見テ差支ヘ無カル可ク。余ハ方法ノ比較的簡便ナル點ニ於テ Schuellerノ方法ヲ應用セリ。即チ。

體位。横臥位又ハ腹臥位トス。

頭位。豫メ耳翼ヲ前方ニ翻轉シ絆創膏ヲ以テ耳前部ニ固定シタル後。撮影側耳ヲ下ニシ。頭部ノ正中矢狀面ヲ乾板ニ平行ナラシメ。且ツ獨乙水平面ヲ夫レニ垂直ナラシム。此位置ニ於テ頭部ヲ兩端ニ砂囊ヲ附セル布片ヲ以テ固定ス。斯クシテ中心光線ヲ耳垂直面ニ一致シ。獨乙水平面ニ對シ顚頂側ヘ25—30°開角セシムル様ニ投射スル時ハ非撮影側ノ乳嘴蜂窠ヲ完全ニ除外シ得ルナリ。

管球。無瓦斯管球。之ニ直徑8cm。長サ40cmノ鉛製圓筒ヲ附ス。圓筒ノ上部ニハ厚サ0.5mmノ「アルミニウム」遮光板ヲ裝置ス。

ブッキー氏「ブレンデ」使用セズ。

焦點乾板距離。60cm。

露出。60kv. 20m.A. ニテ約2秒トス。

「フィルム」。イーストマン社製ニシテ、二重増感紙使用。

一般ニ「レ」像ハ Steurer⁽⁸⁷⁾ ノ云フ如ク實際ノ解剖像トヨク一致スルモノナルモ、觀察セントスル部分ノ多クハ頭蓋骨中深ク埋沒セラレ、又深部蜂窠ハ互ニ重疊スル等ノ特殊解剖的關係ト甚シキ個人的差異ニヨリ像ノ明瞭ヲ缺グコトモ稀ナラズシテ 其正確ナル判讀ハ常ニ必ズシモ容易ナラズ。之ガ爲ニハ細心ノ注意ト練達セル熟練ヲ要スルコト勿論ナリ。余ハカクシテ得タル「レ」寫眞ヲ次ニ述ブル蜂窠系構成態ノミナラズ、乳嘴竇周圍蜂窠、顴骨弓根部蜂窠、後面神經管蜂窠等ノ個々ノ蜂窠群、含氣度、其他S字竇、及ビ乳嘴骨導血管ノ大小形狀等ニ就キ詳細且ツ精密ニ觀察シ、尙ホ疑ハシキ場合ニハ再撮影ヲ行ヒ又ハ他ノ撮影ヲ行ヒ又ハ他ノ撮影方法ヲ併用シテ診斷ノ確實ヲ期セリ。

次ニ含氣型ノ分類ハ、先進諸家ノ成績ト對照批判シ、或ハ臨牀上一定ノ概念ヲ得ル上ニ於テ重要ナル役割ヲナスハ勿論、本研究ノ如キ系統的觀察ニ際シテハ必要缺ベカラザルモノナリ。然ルニ從來ニ於ケル分類ハ多岐多様ニシテ一定セズ、人ヲシテ據ル所ニ迷ハシムルノ觀アリ。コハ「レ」的、組織的、解剖的乃至臨牀的等學者ニヨリ其檢查方法ヲ異ニスルガ爲ト云ハンヨリモ、主トシテ顴骨ノ含氣狀態ハ、既述ノ如ク、種々様々ナル爲メ一定ノ範疇ヲ以テ律スルコトノ極メテ困難ナルコト及ビ含氣本態ニ關シ今尙ホ多大ノ疑點ヲ存スルニ因ルモノナラン。茲ニ於テ余ハ聊カ從來ノ分類ヲ批判シ適切ナリト信ズル分類ヲ行ハントス。

乳嘴突起ノ含氣狀態ヲ表現スルニ含氣性、含氣板障混性、板障性乃至緻密骨質性ノ3型ヲ以テ

スルコトハ、Zuckerlandl⁽¹¹⁸⁾, Politzer⁽⁸⁰⁾ノ古キヨリ現在ニ至ル迄慣用サル、所ナルモ、本分類法ハ單ニ蜂窠ノ發育度ノミヲ目標トシテ分類セルモノニシテ 餘リニ蓋然的ニ過ギ、餘リニ非科學的ナリト云フ可シ。近時長足ノ進歩ヲ遂ゲ著シク精緻トナレル含氣學說ニ立脚セル分類ハ宜シク蜂窠系ヲ構成スル各要素即チ構成態(Strukturzustände)ニ細心ノ注意ヲ拂ヒタルモノナラザル可カラズ。此處ニ構成態トイフハ、蜂窠ノ發育度、各個蜂窠ノ形態、排列、隔壁、含氣ノ終止狀態、非含氣部ニ於ケル骨構造ノ6要素ヨリ成リ、山下⁽¹¹⁵⁾ノイフ構成態ニ發育度ノ加ハリシモノニシテ 略シ Wittmaackノ構成像(Strukturbilde)ニ匹敵スル意味ヲ有ス。擬這般ノ關係ニ留意セル從來ノ分類中其重ナルモノヲ擧ゲ檢討セン。

Wittmaack ノ含氣型分類

(I) 正常含氣(Normale Pneumatisation)。蜂窠ハ全乳嘴突起腔ヲ充シ、蜂窠ノ大サ中等大ニシテ、乳嘴竇ヲ中心トシ放射狀ニ規則正シク排列シ、邊緣ニ行クニ從ツテ漸次其大サヲ増ス。周圍骨質トノ境界明瞭ナリ。細胞間壁ハ菲纖ニシテ、細胞内腔ハ含氣度良好ナリ。

(II) 病的含氣(Pathologische Pneumatisation)。正常粘膜ノ病的變性產物ニシテ 其質及ビ量ニ應ジ種々ナル含氣狀態ヲ來タス。

(A) 肥厚粘膜ニ於ケル完全含氣抑制(Vollständige Pneumatisationshemmung bei hyperplastischer Schleimhaut)。鼓室、上鼓室及ビ乳嘴竇存スルノミニシテ蜂窠ハ全ク缺如ス。乳嘴竇ハ概ネ小、非含氣部ハ緻密骨性ナリ。

(B) 肥厚粘膜ニ於ケル部分的含氣障礙

(Teilweise Pneumatisationsstörung bei hyperplastischer Schleimhaut)。障碍ノ程度ニ應ジ種々ナル像ヲ呈スルモ、一般ニ小蜂窠性或ハ大小ノ蜂窠混在シ排列著シク不規則トナリ、周圍トノ境界明瞭ヲ缺ク。尙ホ含氣度低ク、非含氣部ハ緻密骨性ナル等ヲ特性トス。蜂窠ノ發育範圍ハ概シテ小ナルガ、障碍輕微ナル場合ニ於テハ略々正常發育範圍ニ一致シ又屢々夫レ以上ナルコトアリ。

(C) 纖維性粘膜炎ニ於ケル完全含氣抑制 (Vollständige Pneumatisationshemmung bei fibroser Schleimhaut)。中耳ノ3主要腔ヲ存スルノミ。乳嘴竇ノ大サハ種々ナリ、非含氣部ノ骨ハ板障性ナリ。

(D) 纖維性粘膜炎ニ於ケル部分的含氣障碍 (Teilweise Pneumatisationsstörung bei fibroser Schleimhaut)。蜂窠小ニシテ隔壁厚キコトモアレド、多クハ正常含氣ニシテ唯發育範圍ノミ狹キヲ特長トス。從ツテ含氣度比較的高シ、非含氣部骨ハ勿論板障性ニシテ含氣部トノ境界尖鋭ナリ。

(E) 肥厚性纖維性粘膜炎ニ於ケル含氣障碍 (Pneumatisationsstörung bei hyperplastisch-fibroser Schleimhaut)。主トシテ肥厚性粘膜炎ノ構成像現ハレ、纖維性粘膜炎ノ特性ハ潜ミ唯發育範圍ノ狹小ヲ來タスニ影響スルノミ。

本分類ハ Wittmaack ガ蜂窠粘膜炎ノ組織學的所見ヲ基礎トシ獨自ノ見解ヨリ行ヒタルモノニシテ、蜂窠系構成態ニ關スル知識ヲ豊富ニスルト共ニ分類ヲ著シク科學的ナラシメタルモノナルガ、既述ノ如ク氏ノ含氣說ニハ根本的ニ承認スル能ハザル點アルヲ以テ直チニ踏用シ得ザル

ハ言フ俟タズ。從ツテ Runge⁽⁶⁶⁾ (8型)、Hesse⁽³²⁾ (5型)等ノ分類ハ、兩者共ニ Wittmaack ノ門下ニシテ唯方法ヲ變ヘ「レ」學的ニ師家ノ見解ヲ祖述セル事ニ想到セバ、其可否ハ自カラ明カナル可ク、尙ホ Sonnenkalb⁽⁶⁵⁾ (4型)、Beck, J.⁽¹⁶⁾ (5型)等ノ分類モ Wittmaack 氏說ニ殆ンド無批判的追從ヲナセルモノニシテ、殊ニ前者ノ如キハ之ヲ簡略化サントシテ生ジタル種種ナル不合理ヲ覆ハンガ爲メ牽強附會ノ跡歴然タルモノアリ。亦用フルニ足ラズ。

從來ニ於ケル分類中最モ進歩シ且ツ妥當ナリト考ヘラルハ、Schwarz⁽⁶⁰⁾、義江⁽¹¹⁶⁾、及ビ山下⁽¹¹⁵⁾ノ分類ナリ。此内義江、Schwarz ハ「レ」學的ニ、山下ハ純解剖學的ニ分類セシモノナリ。今之等諸家ノ分類ヲ摘録セバ次ノ如シ。

Schwarz ノ含氣型分類

- 第1型。異常ニ發育セル蜂窠ヲ有スルモノ。
- 第2型。理想的範圍ノ蜂窠ヲ有スルモノ。蜂窠ハ乳嘴突起ノ固有投影範圍ヲ充スモノニシテ所謂正常範圍ニ一致ス。
- 第3型。蜂窠ノ發育中等度ナルモノ。
- 第4型。蜂窠ノ發育僅少ナルモノ。
- 第5型。蜂窠ノ發育ヲ全ク缺如スルモノ。

而シテ第1型ヨリ第4型迄ニ於テハ排列狀態、蜂窠ノ大サ、間壁ノ厚薄ヲ區別シ、第5型ニ於テハ非含氣部ニ關シ板障性及ビ緻密骨性ノ別ヲ設ク、斯クシテ生ズル種々ナル組合セヲ記號ヲ以テ表現セリ。

義江ノ含氣型分類

- 第1型。蜂窠正常ナル乳嘴突起。Wittmaack ノ正常含氣ト全ク同一ノ像ヲ呈ス。但シ發育範圍ハ夫レ以上ニ及ブモノヲモ含ム。
- 第2型。小細胞性乳嘴突起。範圍ハ正常ナルモ、

小細胞性ニシテ間壁稍々肥厚ス。其排列ハ蜂窠全般一様ニシテ不規則ナラズ。

第3型。蜂窠範圍狭小ナルモ細胞排列規則的ナルモノ。

第4型。蜂窠範圍正常又ハ正常以上ナルモ細胞排列不規則ナルモノ

第5型。蜂窠範圍狭小ニシテ正常域ニ達セズ細胞排列不規則ナルモノ。細胞間壁肥厚ス。

第6型。高度ノ蜂窠障礙ヲ有スル乳嘴突起。乳嘴範圍＝2、3ノ細胞群影ヲ見ルモノモ之ニ屬ス。非含氣部骨ハ緻密性ナル場合ト板障性ナル場合アリ。

本分類ニ於テハ發育度ニ關シ4種類ヲ區別ス。即チ第1型及ビ第4型ハ正常又ハ正常以上ノ發育範圍ヲ有シ。第2型ハ正常ニシテ。第3型及ビ第5型ハ範圍正常域ニ達セズ。第6型ハ殆ンド全ク發育ヲ缺クモノナリ。

山下ノ含氣型分類

第1型。蜂窠發育度ノ正常以上ニ佳良ナルモノ。

第2型。蜂窠發育度略々正常ニシテ正規ナル或ハ比較的正規ナル構成態ヲ示スモノ

第3型。蜂窠發育度略々正常ナルモノ不正ナル或ハ稍々不正ナル構成態ヲ示スモノ。

第4型。蜂窠發育度稍々小ニシテ正規ナル或ハ稍々不正ナル構成態ヲ示スモノ

第5型。蜂窠發育度稍々小ニシテ不正ナル或ハ稍々不正ナル構成態ヲ示スモノ

第6型。蜂窠發育度甚ダ小ナルモノ

即チ發育度ニ關シ4階梯ヲ設ケ。其内第1階梯ノ第1型。第2階梯ノ第2型及ビ第3型ハSchwarz, 義江等ノモノト同意義ヲ有シ。第3段階(第3型及ビ第4型)ト第4段階(第5型)

トハ乳嘴竇トS字竇トノ略々中間迄達スル蜂窠ヲ夫々最大或ハ最小限度トシテ區別セリ。但シ正規トハ中細胞性ニシテ。排列。方向共ニ規則正シク 間壁菲薄ナルモノヲ 不正規トハ小細胞性ニシテ。排列。方向共ニ不規則。間壁厚キモノヲイフ。

以上ノ分類ニ於テ特ニ注意ス可キハ。所謂正常含氣ト目ス可キ發育範圍(蜂窠ガ全乳嘴突起腔ヲ充スモノ)ヲ示スモノニ於テモ排列不規則ナル場合アリ。之ニ反シ病的含氣ナル範疇ニ屬セシメラレタルモノ、中ニモ山下ノ所謂正規ノ構成態アルヲ認メシコトナリ。即チ之等諸家ハ忠實ニ自家所見ヲ基礎トシ。更ニWittmaack氏說ヲ十分批判シタル上ニ於テ初メテ參酌シ分類ヲ行ヒタルモノナルガ。之ヲ余ノ研究上ニ應用スルニハ尙ホ幾分不備ノ點アルヲ知レリ。依テ余ハ以上諸氏ノ分類ノ長短ヲ考ヘ之ヲ參酌シテ次ノ如ク分類セリ。

第I型。蜂窠ノ發育度正常以上ニ良好ナルモノ

第II型。蜂窠ノ發育度正常ナルモノ。

第III型。蜂窠ノ發育度中等度ナルモノ

第IV型。蜂窠ノ發育僅少乃至缺如スルモノ

以上4型ノ發育度ハ次ノ如ク規定ス。即チ第1型ハ蜂窠ガ乳嘴突起ノ固有投影範圍ヲ充スニ止マラズ。前方ハ顴骨根部ニ及ビ。上方ハ顳顬骨鱗屑部ニ深く侵入シ。後方ハ屢々乳嘴後頭縫際ニ迄達スル程ノ發育頗ル佳良ナル一群ナリ。第2型ハ蜂窠ガ略々乳嘴突起ノ固有投影範圍ヲ充スモノニシテ。發育度ノミハWittmaackノ正常發育範圍ニ一致スルモ。爾餘ノ構成態ニ關シテハ正常ナルモノト然ラザルモノトヲ含ムコト勿論ナリ。第3型ハ蜂窠ノ發育稍々不良ニシ

テ S 字竇像ノ略々中央迄達スル程度ノモノヲ總稱シ。其最低限界ニ於テハ蜂窠ハ岩様骨ノ固有投影範圍内ニ局限サル。最後ノ第 4 型ハ蜂窠全ク缺如スルカ又ハ僅カニ乳嘴竇周圍ニノミ發育ヲ見ルモノナリ。而シテ第 1 型ヨリ第 3 型迄ニ於テハ排列狀態ニ關シ。(1)規則的。(2)不規則的。蜂窠ノ大サニ就キ(a)大細胞性。(b)中細胞性。(c)小細胞性。間壁ノ狀態ニヨリ(α)菲纖。(β)中等度厚。(γ)厚ノ區別ヲナシ。第 3 型及ビ第 4 型ニ於テハ非含氣部ノ狀態ニ應ジ(dp)板障性。(K)緻密骨性トヲ分ツ。但シ第 1 型ハ前述セル如ク概ネ正規構成態ヲ呈スルモノナリ。尙ホ必要ニ應ジ總テノ含氣型ニ於テ S 字竇ノ膨隆度ヲ(hg)高度。(mg)中等度。(gg)輕度ノ 3 階梯ニ分チテ觀察セリ。

而シテ余ノ分類法ニヨリ含氣狀態ヲ簡略ニ表ハスニハ。例ヘバ蜂窠ノ發育著シク良好ニシテ中細胞性。排列規則正シク。間壁菲纖ナル時ニハ。I. 1. b. α. ナル記號ヲ以テシ。又蜂窠ノ發育殆ンド缺如シ。非含氣部ハ板障性骨ニシテ S 字竇ノ膨隆著明ナル時ハ。IV. dp. hg. ト記スルガ如クニシテ 以下之ニ準ズルモノトス。

第三節 材 料

本研究ニ供シタル材料ハ。同性双生兒 41 組 82 人ニシテ。岡山縣及其隣接諸縣就中岡山市及其近郊居住者過半數ヲ占ム。年齡ハ乳嘴蜂窠系完成時期ヲ目標トシテ最低限度ヲ 5 歳トセリ。材料ノ蒐集ハ昭和 7 年 10 月以來開始セシモノナルガ種々困難ナル事情ニ逢シ豫想外ニ進捗ヲ見ザリキ。即チ本研究ニ於テハ單ニ文書ニヨル照會或ハ其家庭ニ赴キテノ調査ノミニテ足ラズ 常ニ被檢者ヲ一定個所ニ招致シテ「レ」的。生物測定學的乃至臨牀的ニ詳細ナル檢索ヲ

施スノ必要ニ迫ラレ。勢ヒ材料ヲ廣範圍ニ亙テ求ムルコトハ經濟上堪ヘ得ル所ニ非ズ。又該當者中ニ於テモ或ハ研究ニ理解ヲ缺キ再三ノ懇請モ空シク或ハ不當ノ金員ヲ要求シ遂ニ斷念スルノ止ム無キ場合モ少ナカラズ。殊ニ双生兒ハ比較的稀ナル對象ナル上ニ特異形質保持者ナリトノ偏見ヲ懷ク者意外ニ多ク。其他年齡ヲ制限シ。同性ナルコトヲ限定シタル等ノ爲メ層蒐集ヲ困難ナラシメタリ。

Leicher⁽⁴⁴⁾ ヲシテ Zu Vererbungsstudien beim Menschen braucht man zeit u. Geld. ト歎ゼシメタルモ眞ニ宣ナリ。斯ク諸種ノ事情ノ爲メ双生兒ハ其數ニ於テ著シク制限セラレシモ亦止ムヲ得ザル所ナラン。

因ニ。双生兒ノ住居氏名調査ニ關シテハ市町村並ニ小中等學校當局ノ御援助ニ負フ所頗ル多シ。又本研究ノ趣旨ヲ諒トサレ。身ヲ以テ貴重ナル材料ヲ提供サレタル各位ニ對シテハ。謝スルニ言葉無キ次第ナリ。茲ニ併セ記シテ感謝ノ微意ヲ表ス。

第 二 章

調 査 成 績

双生兒ヲ介シテ乳嘴蜂窠構造ノ遺傳關係ヲ解明セントスルノ研究ハ。僅カニ Albrecht⁽¹⁾, Leicher⁽⁴⁴⁾, Schwarz⁽⁶⁹⁾ ノ 3 者ニヨリ試ミラレシニ過ギズ。其中 Schwarz ノ稍々系統的ナル研究以外ハ觀察甚ダ不十分ナルノミナラズ 3 者間ニ於テスラ意見ノ統一ヲ缺ク。茲ニ於テ余ハ双生兒研究ヲ追加シ。其遺ヲ補ハントス。調査成績ヲ述ブルニ先立チ。夫レト不可分ノ關係ニアル卵性診斷ノ概要ヲ述ベン。

第 1 章ニ於テ述ベシガ如ク双生兒ニハ 1 卵性ト

2 卵性トノ別アリテ、各々人類遺傳學研究上獨自ノ意義ヲ有ス。從來ヨリ之ガ鑑別ニハ主トシテ卵膜診斷法用ヒラル。即チ卵腔單一ナル時ハ常ニ1 卵性ナルガ2 個ナル場合中隔ガ唯2 葉ノ羊膜ヨリ成レバ1 卵性ニシテ、左右2 葉ノ羊膜ノ中央ニ絨毛膜ヲ存スレバ2 卵性ナリ。然ルニ本法ニ於テハ中隔ノ毀損或ハ剝離困難等ノ爲メ確診ヲ下シ得ザル場合アルノミナラズ單一絨毛膜兒ニシテ2 卵性ナルコトアリ。之ニ反シ複絨毛膜兒中ニモ1 卵性ノモノアルガ故ニ理論的ニモ缺陷アリ。近時 Siemens^(78, 79) ガ人類學的皮膚科學的見地ヨリ案出セル所謂相似診斷法 (Ähnlichkeitsdiagnose) ハ V. Verschuer^(99, 101), Decking⁽²¹⁾, Curtius⁽²⁰⁾, 駒井及ビ福岡⁽³⁴⁾ 等其他多數學者ノ追試ヲ經テ、卵膜診斷法ヨリ遙カニ確實ナリトイフ。其原理トスル所ハ既ニ遺傳性確認サレ且ツ多性遺傳性 (Polyid) ナルガ如キ形質ヲ可及の多數選擇シ、之等ニ就キ双生兒兩兒間ノ相似度ヲ調査シ、卵性ヲ決定セントスルモノナリ。兎モ角余ノ材料ノ如キ年長兒ニ於テハ、出産當時ノ所見ヲ醫師、助産婦乃至家族等ニ就テ求ムルモ、或ハ記錄散逸シ或ハ記憶不明瞭トナリ、其詳細ニ接スルコトハ甚ダ困難ナリ。依テ余ハ Siemens ノ診斷法ニ準ジ、尙ホ耳鼻咽喉科的見地ヨリ次ノ如キ 11 ノ相似形質ヲ撰定シ卵性ヲ診斷セリ。

- (1) 毛髮ノ色澤形狀
- (2) 眼ノ色
- (3) 皮膚ノ色
- (4) 鬚毛並ニ頭髮ノ生ヘ際
- (5) 口蓋ノ形狀
- (6) 齒列及ビ齒牙ノ大小
- (7) 舌ニ於ケル裂溝

- (8) 會厭軟骨ノ形狀
- (9) 顔 貌
- (10) 血液型
- (11) 耳翼及ビ外鼻ノ解剖的變異
(生物測定學ニヨル)。

而シテ以上ノ相似形質ニ就キ双生兒ヲ検査スルニ當リテハ被檢者ニ就テ何等豫備智識ヲ持ツコト無ク、又、他兒ノ記錄ヲ参照セザルハ勿論。出來得ル限りハ長キ間隔ヲ置テ兩兒ヲ別々ニ検査シ、可及的主觀ノ介入スルヲ避ケタリ。尙ホ耳翼及ビ外鼻ノ變異ハ絶對値ヲ用ヒズ次ノ如キ各種指數ヲ以テ表現セリ。

(A) 耳 翼。

- (1) 骨相學的耳指數 (Physiognomische Ohrindex)

$$= \frac{\text{最大耳幅}}{\text{最大耳長}} \times 100 = \text{Physiog I}$$

- (2) 耳底長指數 (Ohrbasis-Ohrlaengen-Index)

$$= \frac{\text{耳底}}{\text{最大耳長}} \times 100 = \text{BLI}$$

- (3) 耳朶指數 (Ohrlaepchen-Index)

$$= \frac{\text{耳朶ノ長さ}}{\text{最大耳長}} \times 100 = \text{Laepchen I}$$

但シ圖ニ示ス如ク耳底 (ab) ハ耳翼ノ上下附着點間ノ直線距離。最大耳長 (cd) ハ耳翼ノ最上端ト耳朶ノ最下端間ノ直線距離。最大耳幅 (ef) ハ後部耳輪ノ最後端ト耳底トノ間ノ最短距離。耳朶ノ長さ (dg) ハ珠間截痕

ノ最底點ト耳朵ノ最下端間ノ距離ナリ。

(B) 外 鼻。

- (1) 鼻高幅指數 (Höhenbreitenindex d. Nase)

$$= \frac{\text{鼻幅}}{\text{鼻高}} \times 100 = \text{HB I}$$

- (2) 鼻幅深指數 (Breitentiefenindex d. Nase)

$$= \frac{\text{鼻深}}{\text{鼻幅}} \times 100 = \text{BT I}$$

但シ鼻幅ハ兩側鼻翼間ノ最大幅徑。鼻高ハ「ナ
ジオン」ヨリ鼻頭ニ至ル直線距離。鼻深ハ鼻翼
ノ頬皮膚ニ附着スル最深部ヨリ鼻頭ニ至ル距離
ナリ

而シテ計算ハ次ノ公式ニヨル。

$$I = \frac{a}{b} \times 100 \text{ 但シ } I \text{ ハ指數。 } a \text{ ハ小ナル數値。 } b$$

ハ大ナル數値ヲ表ハス。

$$E(I) = \text{指數ノ觀察誤差} = \pm 100 \sqrt{\frac{\alpha^2 b^2 + \beta^2 a^2}{b^2}}$$

但シハ數値 a, β ハ數値 b ノ觀察誤差ナリ。

2個人ノ指數ヲ比較スルニ際シ。

$I_1 - I_2 < 2 |E(I_1 - I_2)|$ ナル時ハ兩指數ノ値ハ差
異無ク

$I_1 - I_2 > 2 |E(I_1 - I_2)|$ ナル時ニノミ兩指數ハ相
違スルモノト判定ス。

但シ $E(I_1 - I_2)$ = 兩指數ノ差ノ誤差

$$= \pm \sqrt{[E(I_1)]^2 + [E(I_2)]^2} \text{ 但シ } |E(I_1 - I_2)|$$

ハ正負ニ關係無ク絶對値ヲ示ス。

今代表的ナルモノ 3例ヲ舉ゲ診斷ノ實際ヲ示ス
ン。

第 1 例 (一卵兒乳嘴蜂窠「プロトコール」ノ第 7 例ニ該當ス。)

姓 名		右 喜 夫		左 喜 夫	
性及ビ年齢		♂ 11 歳		♂ 11 歳	
相 形	1	直毛ニシテ漆黒。密生ス		全ク一致ス	
	2	相 似		相 似	
	3	相 似		相 似	
	4	相 似		相 似	
	5	穹窿高度彎入		穹窿高度	
	6	齒牙中等大。齒列整。齧齒無シ		相 似	
	7	縦列溝正中位ニアリテ中等度深。 横裂溝ハ痕跡的		相 似	
	8	扁平左右對稱		相 似	
	9	相 似		相 似	
	10	0 型		0 型	
質	11			$I_1 - I_2$	$2 E(I_1 - I_2) $
				$I_1 E(I_1)$ $I_2 E(I_2)$	
		Physiog I		61 ± 0.9 61 ± 1.0	0 2.5
		B L I		80 ± 1.1 82 ± 1.8	2 4.1
		Laepchen I		43 ± 1.3 43 ± 1.1	2 3.2
		H B I		68 ± 1.7 65 ± 1.6	3 4.7
		B T I		78 ± 3.1 85 ± 3.1	7 8.8

第 2 例 （一卵兒乳嘴蜂窠「プロトコール」ノ第 24 例ニ該當ス）

姓 名		靜 子		芳 子	
性及ビ年齢		♀ 22 歳		♀ 22 歳	
相 似 形	1	黒色ニシテ柔軟。稍々疎		相 似	
	2	相 似		相 似	
	3	蒼 白		蒼 白	
	4	相 似		相 似	
	5	穹窿中等度彎入		稍々高度	
	6	齒牙不。排列整。左側下顎第 2 臼齒ハ齶齒		排列稍々不正。第 1 及ビ第 2 臼齒共ニ齶齒	
	7	裂溝不明瞭		相 似	
	8	彎曲高度		相 似	
	9	相 似		相 似	
	10	A 型		A 型	
質	11		$I_1 E(I_1)$ $I_2 E(I_2)$	$I_1 - I_2$	$2 E(I_1 - I_2) $
		Physiog I	62 ± 1.3 64 ± 1.2	2	3.5
		B L I	83 ± 1.7 80 ± 1.6	3	4.6
		Laepchen I	43 ± 1.7 37 ± 1.0	6	5.4
		H B I	63 ± 1.7 62 ± 1.7	1	4.7
		B T I	81 ± 3.4 91 ± 3.4	10	9.5

即チ第 1 例ニ於テハ相似形質ハ悉ク酷似シ。第 2 例ニ於テハ第 6 相似形質及ビ第 11 相似形質中耳朶指數並ニ鼻幅深指數ノ差ガ誤差範圍外ニアリテ 3 形質相違シ。第 3 例ニ於テハ全相似形質ノ約 $\frac{1}{3}$ ガ類似セシニ過ギズ。而シテ全診斷成績ハ明確ニ 2 群ニ區別サレ兩群間ノ移行型ト目スベキモノハ 1 例モ無シ。即チ第 1 群ニ於テハ相似形質ハ第 1 例ノ如ク悉ク一致スルモノ大多數ヲ占メ若シ然ラザル場合ニ於テモ第 2 例ノ如ク相違ヲ示スハ精々 3 形質ニ過ギズ。之ニ反シ第 2 群ニ於テハ全然相似セザルカ例ヘ相似スルモノ一般ニ其頻度低クシテ全數ノ $\frac{1}{3}$ ヲ超ヘルコト無ク。且ツ相似散發性ニシテ一貫セル形

式ヲ缺キ全ク「モザイク」狀ヲナスコト第 3 例ニ見ルガ如シ。然モ Siemens ノ確認セン如ク第 1 群ニ於テハ毛髮ノ色澤形狀。眼ノ色。皮膚ノ色及ビ毳毛並ニ頭髮ノ生ヘ際ノ第 1 ヨリ第 4 ニ至ル 4 形質ハ常ニ完全ニ一致シ 第 2 群ニ於テハ常ニ著シク相違セリ。之等ノ所見ヨリ容易ニ第 1 群ハ 1 卵性ト決定シ。第 2 群ハ 2 卵性ト診斷シ得タリ。即チ一卵兒ハ 25 組ニシテ二卵兒ハ 16 組ナリ。

因ニ乳嘴蜂窠ト直接關係ヲ有スル鼓膜及ビ聽能ニ就テハ特ニ精密ニ検査センガ。一卵兒中唯 1 組ニ於テ異常（其詳細ハ後述ス）アリシノミニシテ他ハ悉ク正常ナリキ。

第 3 例 (二卵兒乳嘴蜂窠「プロトコール」ノ第 14 例ニ該當ス)

姓 名	芳 江	玉 江			
性 及 ビ 年 齡	♀ 15 歳	♀ 15 歳			
相 似 形	1	直毛ニシテ漆黒	直毛ナルモ褐色ノ色調著明		
	2	黒 白 色	黒ノ色調強シ		
	3	黄 白 色	蒼 白		
	4	非 相 似	非 相 似		
	5	穹窿輕度彎入	相 似		
	6	齒牙中等大。排列著シク不正	齒牙中等大ナルモ排列稍々整		
	7	縦裂溝左側ニ偏ス	相 似		
	8	彎曲高度ニシテ狭小	扁平ニシテ廣シ		
	9	非 相 似	非 相 似		
	10	0 型	0 型		
質	11	$\begin{matrix} I_1 & E(I_1) \\ I_2 & E(I_2) \end{matrix}$	$I_1 - I_2$	$2 E(I_1 - I_2) $	
		Physiog I	$\begin{matrix} 62 \pm 1.9 \\ 55 \pm 1.7 \end{matrix}$	7	5.0
		B L I	$\begin{matrix} 86 \pm 1.8 \\ 77 \pm 1.5 \end{matrix}$	9	6.6
		Laepchen I	$\begin{matrix} 44 \pm 1.8 \\ 42 \pm 1.8 \end{matrix}$	2	3.8
		H B I	$\begin{matrix} 68 \pm 1.8 \\ 62 \pm 1.6 \end{matrix}$	6	4.8
		B T I	$\begin{matrix} 70 \pm 3.2 \\ 73 \pm 3.2 \end{matrix}$	3	9

扱テ 斯クシテ診断シタル一卵兒 25 組ニ於ケル 100 乳嘴突起及ビ二卵兒 16 組ニ於ケル 64 乳嘴突起ノ「レ」所見ハ次ノ如シ。

(A) 一卵兒 (Ez) ニ於ケル乳嘴蜂窠ノ「レ」所見。

第一例 ♀♀ 5 歳。

第 1 兒。右側。蜂窠ハ乳嘴竇ノ周圍ニ僅カニ發育スルノミ。其間壁ハ肥厚ス。S 字竇ハ強ク前方ニ膨隆ス。非含氣部ハ緻密骨性ナリ。左側。乳嘴骨導血管稍々大ナルヲ異ニス。

第 2 兒。右側。第 1 兒ノ右側ニ全ク一致ス。左側。第 1 兒ノ左側ニ全ク一致ス。

第二例 ♀♀ 8 歳。

第 1 兒。乳嘴竇周圍ニ數個ノ微細網狀ノ蜂窠ヲ認メルノミニシテ。他ノ部ハ一様ニ板障性骨ヨリ成ル。乳嘴竇ハ透明度強ク廣汎ナルガ如シ。S 字竇ノ影像ハ濃キ 1 線トナリテ後上方ヨリ前方ニ走ル。

第 2 兒。右側ハ第 1 兒ニ一致ス。左側。右側ト異リ乳嘴竇ヲ圍繞スル蜂窠ハ可成り發達シテ部ハ S 字竇ノ前縁ニ達ス。小細胞性ニシテ間壁ハ肥厚ス。S 字竇ハ前方ニ偏移ス。

第三例 ♀♀ 8 歳。

第 1 兒。兩側共蜂窠ノ發育著シク不良ニシテ。唯乳嘴竇ヲ中心トシテ稍々廣ク小ナル蜂窠不規則ニ散在ス。非含氣部ハ緻密骨性ニシテ含

氣部へ彌蔓性ニ移行ス。岩様骨投影像ノ形狀及ビ強く膨出セルS字竇像等左右全ク一致ス。唯乳嘴骨導血管稍々右側ニ於テ大ナルノミ。

第2兒。兩側共全ク第1兒ニ一致ス。

第四例 ♀♀ 9歳。

第1兒。兩側共蜂窠ハ乳嘴突起ノ固有投影範圍ヲ僅カニ越ヘ。小細胞性ニシテ間壁中等度厚ナルモ規則正シキ排列ヲナス。S字竇ノ影像稍不明瞭ナリ。

第2兒。左右共發育正常域ニ達セズ。小細胞性ニシテ間壁厚ク。排列稍々統一ヲ缺ク。S字竇ハ中等度ニ前方へ偏移ス。

第五例 ♀♀ 10歳。

第1兒。兩側共蜂窠ハ乳嘴突起ノ固有投影範圍ヲ可成り越ヘ。發育佳良ナリ。中細胞性。間壁中等度厚。規則正シキ排列ス。S字竇ノ像ハ辛ウジテ認メ得ルノミ。

第2兒。蜂窠系ハ左右共全ク第1兒ニ一致ス。

第六例 ♀♀ 10歳。

第1兒。兩側共蜂窠ノ發育佳良ニシテ全ク乳嘴突起ノ固有投影範圍ヲ充ス。中細胞性ニシテ間壁菲薄。規則正シキ排列ス。S字竇ノ像ハ上膝部ニ於テ僅カニ現ハルノミ。

第2兒。兩側共第1兒ニ甚ダ酷似ス。但シS字竇ノ像稍々明瞭ニ現ハル。

第七例 ♂♂ 11歳。

第1兒。左右共ニ範圍正常ナルモ。一般ニ大蜂窠性ニシテ。間壁菲薄。排列統一ヲ缺ク。S字狀溝ノ影像ハ全ク不明ナリ。

第2兒。兩側共第1兒ニ極メテ類似ス。但シ排列ハ前者ヨリモ稍々不規則ナリ。

第八例 ♂♂ 12歳。

第1兒。兩側共乳嘴突起ハ板障性骨ヨリ成ルモ。乳嘴竇周圍蜂窠ノ發育ハ稍々佳良ナリ。一樣ニ小細胞性。間壁厚シ。S字竇ノ前縁線ハ明瞭ニ描出サル。

第2兒。左右共ニ發育ハ正常域ニ達セズシテ。尖端ニハ板障性ノ非含氣部ヲ存ス。大細胞性ニシテ。隔壁厚ク。排列不規則ナリ。S字竇ノ影像明瞭ナリ。

第九例 ♂♂ 12歳。

第1兒。乳嘴突起ハ一樣ニ緻密性骨ヨリ成ル。乳嘴竇周圍蜂窠ハ小細胞性ニシテ隔壁甚ダ厚キモ比較的廣範圍ニ發育ス。乳嘴竇ハ大ナラザルガ如シ。S字竇像明瞭。

第2兒。左右ノ乳嘴突起構造ハ全ク第1兒ニ一致ス。

第十例 ♀♀ 12歳。

第1兒。左側蜂窠ハ錐體ノ投影範圍ヲ僅カニ越ユ。小蜂窠性ニシテ。間壁中等度厚。排列規則的ナリ。尖端ハ含氣セズシテ板障性ナリ。S字竇像明瞭ニ現ハレ。前方ニ偏移ス。左側。發育範圍甚ダ廣汎。殊ニ鱗屑部ニ於ケル含氣著シ。蜂窠ハ細網狀ニシテ。間壁肥厚スルモ排列秩序正シ。S字竇ノ影像不明。

第2兒。右側。第1兒ノ左側ニ一致ス。左側。發育度稍々劣ルモ。構成態ハ右側及ビ第1兒ノ左側ニ酷似ス。但シS字竇ノ影像ハ略々明瞭。

第十一例 ♂♂ 13歳。

第1兒。兩側共ニ蜂窠ノ範圍極メテ廣汎。前方顴骨弓根部ハ完全ニ含氣シ。上方ハ鱗屑部ニ深く侵入シ。後方ハ後頭乳嘴縫際ニ達ス。中細胞性ニシテ排列規則的。間壁菲薄ナリ。S字竇前縁ノ像ハ上膝部ニ於テ僅カニ現ハルノミ。

第2兒。兩側共ニ第1兒ニ酷似ス。

第十二例 ♂♂ 13 歳。

第1兒。蜂窠ノ範圍極メテ廣汎。顴骨根部。鱗屑部。隅角部等ニモ發達著シク。殊ニ後方ハ乳嘴後頭縫際ニ迄達ス。大細胞性ニシテ。間壁極メテ菲纖。爲ニ骨性迷路ハ外聽道ノ後上方ニ「コントラスト」強キ一塊ノ影像トシテ浮ビ出ヅ。蜂窠ハ遠心性ニ漸次増大シ規則正シキ排列ヲナス。S字竇像ハ全ク認メ得ズ。

第2兒。蜂窠系。乳嘴突起ノ輪廓共ニ第1兒ニ酷似ス。

第十三例 ♂♂ 14 歳。

第1兒。右側。乳嘴突起ハ兩側共ニ全ク蜂窠ヲ缺キ。一樣ニ板障性骨ヨリ成ル。乳嘴竇ノ部分透明トナリ乳嘴竇廣キガ如シ。S字竇ハ強ク膨出ス。

第2兒。蜂窠ハ略ニ岩様骨ノ固有投影範圍ヲ充ス。小蜂窠性ニシテ排列不規則。間壁厚シ。S字竇前縁ノ像鮮明ナリ。

第十四例 ♀♀ 14 歳。

第1兒。兩側共ニ蜂窠ノ發育甚ダ良好ニシテ管ニ乳嘴突起腔ヲ充スノミナラズ前方ハ顴骨弓根部ニ及ビ。上方ハ鱗屑部ニ深く侵入シ。又隅角部及ビ後S字竇部ニ於テモ蜂窠ノ發育著シ。中細胞性ニシテ。間壁中等度厚。邊縁ニ行クニ從ツテ次第ニ大サヲ増シ。規則正シキ排列ス。S字竇前縁ノ像ハ殆ンド認メ得ズ。

第2兒。蜂窠ノ構造ハ兩側共殆ンド全ク第1兒ニ一致シ。唯S字竇ノ像稍ニ明瞭ナルヲ異ニスルノミ。

第十五例 ♀♀ 14 歳。

第1兒。右側。蜂窠ハ錐體ノ固有投影範圍ヲ充シ。尙ホ鱗屑部及ビ顴骨弓根部ニモ及ブ。尙ホ特異ナルハ尖端ニ於テ1個ノ著シク大ナル蜂

窠ヲ存スルコトナリ。一般ニ小細胞性ニシテ。間壁中等度厚。稍ニ不規則ナル排列ヲナス。S字竇ハ強ク前方ニ轉移ス。左側。範圍正常。一樣ニ小細胞性ニシテ。唯邊縁蜂窠ノミ急激ニ増大ス。間壁中等度厚。排列稍ニ不規則ナリ。S字竇ノ影像ヲ認メ得ズ。

第2兒。右側。第1兒ノ右側ニ極メテ酷似シ殊ニ終末蜂窠ノ形狀ニ於テ然リ。左側。第1兒ノ左側ニ甚ダ類似ス。

第十六例 ♀♀ 15 歳。

第1兒。兩側共全ク所謂正常蜂窠ノ像ヲ呈ス。即チ全乳嘴突起腔ハ完全ニ含氣サレ。中細胞性ニシテ間壁菲薄。極メテ規則正シキ排列ス。S字竇ノ前縁線ハ不明瞭ナリ。

第2兒。兩側共ニ第1兒ニ酷似ス。唯終末蜂窠稍ニ大ナリ。

第十七例 ♂♂ 10 歳。

第1兒。兩側共發育度正常。中細胞性ニシテ間壁菲薄。排列正規ナリ。S字竇ノ影像ハ僅カニ認メ得。

第2兒。右側ハ第1兒ニ酷似ス。左側乳嘴突起ノ大半ハ緻密骨ヨリ成リ。蜂窠ハ主トシテ乳嘴竇ヲ中心トシテ發達シ。1群ノ蜂窠ハS字竇ノ前縁及ビ下方ハ乳嘴截根附近迄達ス。小細胞性ニシテ。間壁肥厚ス。S字竇ハ濃キ弧線ヲ投射ス。

第十八例 ♀♀ 15 歳。

第1兒。乳嘴突起ハ兩側共緻密骨性ニシテ。乳嘴竇ノ周圍ニ小細胞性ニシテ隔壁厚キ蜂窠不規則ニ排列ス。S字竇前縁ノ像略ニ明瞭ナリ。

第2兒。兩側共發育範圍正常域ニ達セズ。小細胞性ニシテ排列稍ニ不規則。間壁ハ肥厚。S字竇前縁ノ像ハ第1兒ニ比シ稍ニ不明瞭ナリ。

第十九例 ♀♀ 15歳。

第1兒。右側。發育度略々正常。小細胞性ニシテ。間壁肥厚スルモ。秩序正シキ排列ヲナス。S字竇ノ影像ハ稍々明瞭ヲ缺ク。左側。發育正常域ニ達セズ。尖端部ハ含氣セズシテ緻密骨性ナリ。爾餘ノ構成態ハ右側ニ一致ス。

第2兒。右側。稍々中細胞性ナル點第1兒ノ右側ト異ナルノミ。左側。第1兒ノ左側ニ極メテ類似ス。

第二十例 ♀♀ 16歳。

第1兒。兩側共蜂窠ハ乳嘴突起腔ヲ全ク充スニ至ラズ。S字竇ノ後方ニ緻密骨性ノ非含氣部ヲ殘ス。中細胞性。間壁中等度厚。大體規則正シク排列ス。邊緣蜂窠ノ2,3ハ囊狀ニ膨脹ス。S字竇前縁ノ像明瞭ナリ。

第2兒。蜂窠ノ發育範圍ハ第1兒ニ比シテ稍劣リ略々錐體ノ投影範圍内ニ局限サレ又排列不規則ナルモ他ノ構成態ハ一致ス。S字竇ノ膨隆中等度。

第二十一例 ♀♀ 16歳。

第1兒。兩側共蜂窠ノ發育甚ダ良好ニシテ。乳嘴突起ノ固有投影範圍ヲ越へ。鱗屑部。隅角部。後S字竇部ニ及ブ。蜂窠ハ中細胞性ニシテ間壁菲纖。規則正シク排列ス。但シ邊緣ノ蜂窠ハ稍々急激ニ其大サヲ増ス。S字竇ハ中等度ニ膨隆ス。

第2兒。兩側共第1兒ニ甚ダ酷似ス。唯左側ニ於テ鱗屑部蜂窠ノ發育優ル。

第二十二例 ♀♀ 17歳。

第1兒。蜂窠ハ左右共乳嘴突起ノ固有投影範圍ヲ完全ニ充シ。尙ホ僅カニ夫レヲ超過ス。中細胞性ニシテ間壁中等度厚。排列規則正シキモ。後縁ヲ劃スル1群ノ蜂窠ハ囊狀ニ著シク膨

隆ス。S字竇ハ稍々前方ニ偏移ス。

第2兒。兩側蜂窠系ハ第1兒ニ極メテ酷似ス。唯左側ニ於テハS字竇ノ前縁線ハ下膝部ニ於テ稍々不明瞭ナリ。

第二十三例 ♀♀ 12歳。

第1兒。右側。蜂窠ハ略々岩様骨ノ固有投影範圍ヲ充シ。尙ホ顴骨弓根部ニモ及ビ。隅角部ニモ發達ス。小細胞性ニシテ間壁中等度厚ナルモ。排列略々規則的ナリ。非含氣部ハ板障性ニシテ含氣部トノ間ニ尖銳ナル境界ヲ劃ス。S字竇ノ膨隆中等度。左側。乳嘴突起ハ一様ニ板障性骨ヨリ成リ。廣キ乳嘴竇ノ周圍ニ比較的大ナル蜂窠數個ヲ見ル。S字竇像ハ極メテ明瞭ニシテ膨隆モ亦著シ。

第2兒。右側。第1兒ノ左側ニ全ク一致ス。左側。第1兒ノ右側ニ全ク一致ス。

第二十四例 ♀♀ 22歳。

第1兒。兩側蜂窠ノ發育度正常ナルモ。顴骨弓根部及ビ鱗屑部ニモ1群ノ蜂窠ヲ認ム。一般ニ小細胞性ニシテ邊緣ニ至ルモ大サ餘リ増加セズ。間壁中等度厚。排列稍々不規則ナリ。S字竇像ハ全ク認メ得ズ。

第2兒。左右共第1兒ニ全ク一致ス。

第二十五例 ♀♀ 23歳。

第1兒。蜂窠ハ略々錐體投影範圍内ニ局限サル。小蜂窠性ニシテ間壁部厚シ。排列統一ヲ缺ク。非含氣部ハ緻密骨性ナリ。S字竇ハ可成強ク前方ニ迫ル。乳嘴骨導血管ハ左側ニ於テ強大ナリ。

第2兒。蜂窠系。乳嘴突起就中錐體ノ輪廓等第1兒ニ極メテ類似ス。但シ乳嘴骨導血管ハ左側ニ於テ強大ナリ。

(B) 二卵兒(ZZ)ニ於ケル乳嘴蜂窠ノ「レ」所

見。

第一例 ♀♀ 7歳。

第1兒。兩側共蜂窠ノ發育ハ略ニ正常範圍ニ匹敵スルモ、小細胞性ニシテ、間壁厚ク、排列不規則ナリ。S字竇ノ前縁線ハ下膝部ニ於テ離斷サル。

第2兒。右側。發育度ハ正常ナルモ、第1兒ト異リ大細胞性ニシテ、間壁菲薄、排列又規則的ナリ。S字竇ノ影像ハ不明瞭ナリ。左側乳嘴突起ハ一様ニ板障性骨ヨリ成リ、乳嘴竇周圍ニ數個ノ顆粒細胞ヲ認メ得ルノミ。S字竇ノ影像ハ極メテ明瞭ナリ。

第二例 ♀♀ 8歳。

第1兒。兩側共蜂窠ハ錐體投射範圍ヲ僅カニ超過ス。中細胞性ニシテ間壁中等度厚、排列規則的ナリ。尖端ハ含氣セズシテ緻密骨性ナリ。S字竇影像ノ濃度中等度。

第2兒。左右共ニ蜂窠ノ範圍ハ第1兒ヨリ稍稍廣シ。小細胞性ニシテ、間壁肥厚シ、排列統一ヲ缺グ。S字竇ノ後半部及ビ尖端ニ非含氣部ヲ殘シ、S字竇ノ影像ハ第1兒ニ比シ濃度ヲ減ズ。

第三例 ♀♀ 9歳。

第1兒。右側。範圍正常、中細胞性ニシテ隔壁中等度厚、規則正シク排列ス。S字竇ノ前縁線ハ上膝部ニ於テ認メラル、ノミ。

左側。小細胞性ニシテ排列不規則ナル點右側ト相違ス。

第2兒。蜂窠ハ乳嘴突起腔ヲ充スニ至ラズ。尖端部ニ緻密骨性ノ非含氣部ヲ殘ス。小細胞性ニシテ、間壁肥厚シ、排列統一ヲ缺グ。S字竇ノ前縁ハ濃キ1線トナリテ後上方ヨリ前下方ニ走ル。左側。乳嘴竇周圍蜂窠ハ可成リ發育セル

モ大部分ハ含氣セズシテ緻密骨性ナリ。S字竇ノ影像甚ダ明瞭。

第四例 ♀♀ 9歳。

第1兒。兩側共發育正常域ニ及バザルコト可成リ遠シ。小細胞性ニシテ間壁厚ク、排列不規則ナリ。S字竇ハ強ク前方ニ膨出ス。

第2兒。發育度及ビ排列ニ於テノミ第1兒ニ類似ス。

第五例 ♀♀ 10歳。

第1兒。兩側共發育範圍狹小ニシテ一様ニ間壁厚キ細網狀構造ヲ呈ス。S字竇像明瞭ナリ。

第2兒。兩側共乳嘴突起ハ大部分板障骨ヨリ成リ乳嘴竇周圍ニ1群ノ顆粒狀蜂窠ヲ見ル。乳嘴竇部ハ透明度強ク、腔廣キヲ思ハシム。S字竇前縁ノ像ハ甚ダ明瞭ナリ。

第六例 ♀♀ 10歳。

第1兒。兩側共蜂窠ハ乳嘴突起ノ固有投影範圍ヲ充シ、小細胞性ニシテ間壁厚ク、不規則ニ排列ス。S字竇ノ像ハ稍、明瞭ヲ缺グ。

第2兒。兩側共第1兒ニ甚ダ酷似ス。

第七例 ♀♀ 10歳。

第1兒。左右共蜂窠ハ乳嘴竇周圍ニ僅カニ發育スルノミニシテ、大部分緻密骨ヨリ成ル。S字竇溝ハ濃キ陰影ヲ投ジテ強ク前方ニ迫レリ。

第2兒。兩側共第1兒ニ酷似スルモ、錐體上縁ノ彎曲強ク且ツ範圍モ稍ニ廣シ。

第八例 ♀♀ 11歳。

第1兒。兩側共蜂窠ノ發育甚ダ良好ニシテ顴骨弓根部、鱗屑部ニ迄含氣及ブ、中細胞性ニシテ、間壁菲薄、規則正シク排列ヲナス。S字竇ノ影像ハ不明瞭ナリ。

第2兒。兩側共蜂窠系構成態ハ第1兒ト一致スルモ、發育度ハ正常域ニ稍ニ及バズ。S字竇

ノ前縁線ハ右側ニ於テ略々明カナリ。

第九例 ♀♀ 13歳。

第1兒。發育範圍正常。中細胞性ニシテ間壁中等度厚。秩序正シク排列ス。S字竇像ハ下膝部ニ於テ消失ス。

第2兒。左右共範圍ハ略々第1兒ニ類似スルモ、間壁肥厚セル小蜂窠不規則ニ排列ス。S字竇ノ像ハ比較の明瞭ナリ。

第十例 ♀♀ 13歳。

第1兒。兩側共蜂窠ノ發育稍々不良ニシテ、尖端ニハ非含氣部ヲ殘ス。小細胞性ニシテ 隔壁稍々肥厚スルモ、秩序アル排列ヲナス。S字竇ノ影像明瞭ナリ。

第2兒。發育度ハ第1兒ニ一致スルモ、構成態ヲ異ニス。即チ蜂窠中等大ニシテ、隔壁モ中等度厚、秩序アル排列ヲナス。S字竇ノ影像甚ダ明瞭ナリ。

第十一例 ♀♀ 13歳。

第1兒。兩側共發育範圍極メテ廣汎。中細胞性ニシテ、間壁菲纖。規則正シキ排列ヲナス。S字竇ノ影像ハ殆ンド認めル能ハズ。

第2兒。左右共間壁中等度厚ナル外第1兒ニ酷似ス。

第十二例 ♀♀ 14歳。

第1兒。兩側共蜂窠ノ發育甚ダ良好ニシテ乳嘴突起ノ固有投影範圍ノミナラズ顴骨弓根部、鱗肩部、隅角部等ニ迄含氣進行ス。中細胞性ニシテ 隔壁稍々肥厚スルモ、全く規則正シキ排列ヲナス。S字竇前縁ノ像ハ上膝部ニ於テ僅カニ現ハル、ノミ。

第2兒。發育範圍稍々劣ル。殊ニ顴骨弓根部、鱗肩部ニ於ケル含氣ニ於テ然リ、大細胞性ニシテ、間壁菲薄、規則正シキ排列ヲナス。S字竇

像ハ略々明瞭ナリ。

第十三例 ♀♀ 15歳。

第1兒。兩側共蜂窠ハ全乳嘴突起腔ヲ充シ、尙ホ少シク夫レヲ超過シ、間壁中等度厚ナル中細胞性蜂窠規則正シク排列ス。S字竇ノ前縁ハ可成リ濃キ影像ヲ投射ス。

第2兒。左右共發育度並ニ間壁ノ状態ニ於テハ第1兒ニ類似スルモ、蜂窠ハ小細胞性ニシテ、排列不規則ナリ。又S字竇ハ第1兒ニ比シ、稍稍影像濃度ヲ減ズ。

第十四例 ♀♀ 15歳。

第1兒。蜂窠ノ發育ハ兩側共極メテ佳良。殊ニ後方ハ乳嘴後頭縫際ニ迄迫ラントス。中細胞性ニシテ 間壁中等度厚、排列正規的ナリ。S字竇ノ影像ハ上膝部ニ於テ隱見スルノミ。

第2兒。右側。排列及ビ細胞ノ大サハ第1兒ニ類スルモ、發育度稍々劣リ。間壁菲纖ナリ。尙ホS字竇ノ影像略々明瞭。

左側。範圍正常。中細胞性ニシテ 間壁中等度厚、排列統一ヲ缺グ。S字竇ノ膨隆尋常。

第十五例 ♀♀ 16歳。

第1兒。右側。蜂窠ノ發育度略々正常。中細胞性ニシテ、間壁中等度厚ナルモ蜂窠規則正シク排列ス。但シ乳嘴突起尖端ニハ1個ノ大ナル終末蜂窠ヲ見ル。S字竇ノ影像ハ略々明瞭ナリ。左側。乳嘴突起ハ概ネ緻密骨ヨリ成リ、唯乳嘴竇ハ微細網狀蜂窠ヲ以テ圍繞サル。S字竇ノ膨隆著明ナリ。

第2兒。兩側共第1兒ノ左側ト等シク非含氣性ナルモ、乳嘴突起及ビ錐體ノ投影範圍ハ第1兒ニ比シ狹小ナリ。S字竇ノ膨隆度稍々劣ル。

第十六例 ♀♀ 18歳。

第1兒。兩側共蜂窠ハ錐體ノ投影範圍ヲ可成

リ超過ス。間壁肥厚セル小細胞性蜂窠不規則ニ排列ス。尖端及びS字竇後半ハ含氣セズシテ緻密骨性ナリ。S字竇ノ前縁線ハ濃キ孤線ヲ畫ク。

第2兒。右側。排列並ニ間壁ノ狀態等ハ第1兒ト略ニ一致スルモ、發育度稍々優リ、蜂窠ハ概ネ中細胞性ナリ。左側。發育度正常。中細胞性ニシテ、間壁中等度厚。排列規則的ナリ。S字竇ノ影像ハ略々明瞭。

第二節 總括並ニ考案

既ニ第1章ニ述ベシガ如ク、乳嘴蜂窠ノ遺傳關係解明ニ當リテハ特殊性質ノ存否ヲ追究スルニ非ズシテ、専ラ双生兒各組間ニ於ケル相似乃

至非相似ノ程度ヲ知ラントスルモノナリ。余ハ此目的ノ下ニ前記ノ一卵兒 25 組ニ於ケル 100 側乳嘴蜂窠及ビ二卵兒 16 組ニ於ケル 64 側乳嘴蜂窠ノ「レ」所見ヲ數項ニ分チテ觀察シ Albrecht, Leicher, Schwarz ノ成績ト對照批判スルト共ニ Wittmaack 一派ノ外因說ヲ再檢討セントス。

(1) 一卵兒及ビ二卵兒ニ於ケル概括的相似度ノ比較。

先ヅ通覽ニ便ナラシメンガ爲メ、第1章ニ詳述セン「レ」所見ヲ余ノ表現法ヲ以テ示セバ第1表及ビ第2表ノ如シ。

第 1 表

番 號	乳 嘴 蜂 窠 像			
	右 側		左 側	
EZ 1 5 Lj.	IV	K (hg)	IV	K (hg)
	IV	K (hg)	IV	K (hg)
EZ 2 8 Lj.	IV	dp (hg)	IV	dp (hg)
	IV	dp (hg)	IV	cydp (hg)
EZ 3 8 Lj.	IV	2 cβK (hg)	IV	2 cβK (hg)
	IV	2 cβK (hg)	IV	2 cβK (hg)
EZ 4 9 Lj.	II	1 cβ (gg)	II	1 cβ (gg)
	II	2 cy (mg)	II	2 cy (mg)
EZ 5 10 Lj.	I	1 bβ (gg)	I	1 bβ (gg)
	I	1 bβ (gg)	I	1 bβ (gg)
EZ 6 10 Lj.	II	1 bα (gg)	II	1 bα (gg)
	II	1 bα (gg)	II	1 bα (gg)
EZ 7 11 Lj.	II	2 aα (gg)	II	2 aα (gg)
	II	2 aα (gg)	II	2 aα (gg)
EZ 8 12 Lj.	IV	cydp (hg)	IV	cydp (hg)
	III	2 bydp (hg)	III	2 bydp (mg)
EZ 9 12 Lj.	IV	cγK (hg)	IV	cγK (hg)
	IV	cγK (hg)	IV	cγK (hg)
EZ 10 12 Lj.	III	1 cβ dp (mg)	I	1 cγ (gg)
	I	1 cγ (gg)	II	1 cγ (gg)
EZ 11 13 Lj.	I	1 bα (gg)	I	1 bα (gg)
	I	1 bα (gg)	I	1 bα (gg)
EZ 12 13 Lj.	I	1 aα (gg)	I	1 aα (gg)
	I	1 aα (gg)	I	1 aα (gg)
EZ 13 14 Lj.	IV	K (hg)	IV	K (hg)
	III	2 cγ (hg)	III	2 cγ (mg)
EZ 14 14 Lj.	I	1 bβ (gg)	I	1 bβ (gg)
	I	1 bβ (gg)	I	1 bβ (gg)
EZ 15 14 Lj.	III—II	2 cβ (gg)	II	2 cβ (gg)
	III—II	2 cβ (gg)	II	2 cβ (gg)
EZ 16 15 Lj.	II	1 bα (gg)	II	1 bα (gg)
	II	1 bα (gg)	II	1 bα (gg)
EZ 17 15 Lj.	II	1 bα (gg)	II	1 bα (gg)
	II	1 bα (gg)	V—III	K (hg)
EZ 18 15 Lj.	III	2 cγK (gg)	III	2 cγK (gg)
	IV	2 cγK (mg)	IV	2 cγK (gg)

EZ	19	II	1 cγ	(gg)	III	1 cγ+K	(mg)
	15 Lj.	II	1 bγ	(gg)	II	1 cγ	(gg)
EZ	20	III	1 bβK	(mg)	III	1 bβK	(mg)
	16 Lj.	III—IV	2 bβK	(mg)	III—IV	2 bβK	(mg)
EZ	21	I	1 bα	(mg)	I	1 bα	(mg)
	16 Lj.	I	1 bα	(mg)	I	1 bα	(mg)
EZ	22	II	1 bβ	(mg)	II	1 bβ	(mg)
	17 Lj.	II	1 bβ	(mg)	II	1 bβ	(mg)
EZ	23	III	1 cβ	(mg)	IV	dp	(hg)
	18 Lj.	IV	dp	(hg)	III	1 cβ dp	(mg)
EZ	24	II	2 cβ	(mg)	II	2 cβ	(mg)
	22 Lj.	II	2 cβ	(mg)	II	2 cβ	(mg)
EZ	25	III	2 cβK	(hg)	III	2 cβK	(hg)
	23 Lj.	III	2 cβK	(hg)	III	2 cβK	(hg)

註 括弧内ハ S 字竇ノ膨隆度ヲ示スモノニシテ、其詳細ハ後述ス。

第 2 表

番 號	乳 嘴 蜂 窠 像			
	右 側		左 側	
ZZ 1	II	2 cγ (gg)	II	2 cγ (gg)
7 Lj.	II	1 aα (gg)	IV	dp (hg)
ZZ 2	III	1 bβK (mg)	III	1 bβK (mg)
8 Lj.	III	2 cγK (gg)	II	2 cγ (gg)
ZZ 3	II	1 bβ (gg)	II	2 cβ (gg)
9 Lj.	III	2 cγK (hg)	IV	K (hg)
ZZ 4	III	2 cγ (hg)	III	2 cγ (hg)
9 Lj.	III—II	2 bβ (hg)	III—II	2 bβ (hg)
ZZ 5	III	cγdp (mg)	III	cγdp (mg)
10 Lj.	IV	dp (hg)	IV	dp (hg)
ZZ 6	II	2 cγ (gg)	II	2 cγ (gg)
10 Lj.	II	2 cγ (gg)	II	2 cγ (gg)
ZZ 7	IV	K (hg)	IV	K (hg)
10 Lj.	IV	K (hg)	IV	K (hg)
ZZ 8	I	1 bα (gg)	I	1 bα (gg)
11 Lj.	II	1 bα (mg)	II	1 bα (gg)
ZZ 9	II	1 bβ (gg)	II	1 bα (gg)
12 Lj.	II	2 cγ (mg)	II	2 cγ (gg)
ZZ 10	III	2 cγ (mg)	III	2 cγ (mg)
13 Lj.	III	1 bβ (hg)	III	1 bβ (hg)
ZZ 11	I	1 bα (gg)	I	1 bα (gg)
14 Lj.	I	1 bβ (gg)	I	1 bβ (gg)
ZZ 12	I	1 bβ (gg)	II	1 bβ (gg)
15 Lj.	I—II	1 aα (gg)	I—II	1 aα (gg)
ZZ 13	II	1 bβ (mg)	II	1 bβ (mg)
15 Lj.	II	2 cβ (mg)	II	2 cβ (mg)
ZZ 14	I	1 bβ (gg)	I	1 bβ (gg)
15 Lj.	I	1 bα (gg)	II	2 bβ (gg)
ZZ 15	II	1 bβ (gg)	IV	cγK (hg)
16 Lj.	IV	cγK (mg)	IV	cγK (mg)
ZZ 16	III	2 cγK (hg)	III	2 cγK (hg)
18 Lj.	III	2 bγ (hg)	II	2 bβ (mg)

同一個人ノ左右乳嘴突起ノ含氣狀態ハ例ヘバ
Turner u. Porter⁽⁸⁶⁾ ハ 88%, Talpis u. Lie-
bermann⁽⁸⁰⁾ ハ 74%, Steurer⁽⁸⁷⁾ ハ 71.5%, Beck,
J.⁽⁸⁸⁾ ハ 70%, 義江ハ 73.52%ニ於テ略ニ一致ス

ト述べ、其間ニ多少ノ變動アルモ、之等諸家ノ
成績ヲ綜合スルニ一致度ハ 70—80%ト見テ大
過ナカラン。然ラバ含氣型ノ一致ハ等質等量ノ
遺傳物質ヲ享有スル一卵兒各組ニ於テ如何ナル

關係＝アルカ將又同一環境裡＝成育スルモ遺傳物質ノ分配ヲ異ニスル二卵兒＝於テ如何ナル態度ヲ取ルモノナルカハ、先ヅ根本的＝重要ナル問題ナリ。

第1表＝ヨリテ明カナル如ク、一卵兒各組兩兒間＝於ケル4側乳嘴蜂窠系ハ管＝發育範圍ノミナラズ、蜂窠ノ排列、各蜂窠ノ大小、間壁ノ狀態、S字竇ノ膨隆度等アラユル要素ノ酷似スルモノ甚ダ多ク(16例64%)、其高度ナルモノ(第1圖、第2圖)＝於テハ細心ノ注意ヲ以テスルトモ第1兒ト第2兒トノ蜂窠像ヲ識別スルコト極メテ困難ナリ。而シテ非相似ヲ示スモノハ僅カ＝9例(EZ. 1: 4, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 23)ニシテ36%＝當ル。然ルニ二卵兒＝於テハ相似ノ程度略々一卵兒＝匹敵スルモノハ僅カ＝3例(ZZ 6, 7, 11)＝過ギズ。然モ此内第7例ハ等シク緻密骨性ヨリ成ル含氣乳嘴突起ナルモ、各兒＝於ケル錐體ノ輪廓ヲ著シク異ニシ、又第11例ハ第1兒＝於テハ間壁極メテ菲纖ナルニ對シ第2兒ノ夫レハ中等度＝肥厚スルノ差異ヲ示セリ。今相似ノ程度ヲ蜂窠ノ發育範圍及ビ蜂窠ノ排列、大小、及ビ間壁ノ狀態ナル3要素中ノ任意ノ1要素＝限定シテ觀察スルモ、該範疇＝屬スルモノトシテ更ニ3例(ZZ, 4, 12, 13)ヲ増スノミ。從ツテ相似セルモノハ16組中6組即チ約38%＝當リ之ヲ一卵兒＝比較スル時其懸隔ノ甚ダシキ＝驚カザルヲ得ズ。

次ニ一卵兒＝於ケル非相似組中注意ヲ要スルハ第15例(第3圖)及ビ第23例(第4圖)ナリ。即チ前者＝於テハ兩兒ノ乳嘴蜂窠ハ共ニⅢ—Ⅱ寧ろⅡニ近キ發育度ヲ有シ、乳嘴突起尖端＝1個ノ大ナル終末蜂窠ヲ形成シ極メテ類似シ、左側ハ共ニⅡノ發育度ヲ有シ終末蜂窠ヲ缺

キテ酷似セリ。又後者＝於テハ第1兒ノ右側ト第2兒ノ左側及ビ第1兒ノ左側ト第2兒ノ右側トハ殆ンド完全ニ一致シ、所謂鏡像現象ヲ示セリ。要スルニ之等2組＝於テハ含氣ハ4側乳嘴突起＝均等ニ分配サレズシテ夫々各側毎及ビ交互側毎ニ一致セルモノナリ。Leicherハ斯カル特殊非對稱ヲ5組(内2組ハ鏡像ヲナス)＝於テ觀察センガ何等注意スル所ナク、又Schwarzハ鏡像現象ヲ呈セン1例＝ツキ多少ノ考慮ヲ拂ヒシモ依然外的影響ヲ蒙ルモノ、中ニ算入セリ。抑々本來對稱ナルベキ形質ガ非對稱ヲ來タス本態＝關シテハ、胚胎位置異常說、發生異常說、不等加温說、優越說等諸說行ハル、モ、要スルニ v. Verschuer⁽²⁰⁾ノ投ゼル(1)受精セル卵細胞ノ發育ノ極初期＝於テ遺傳的素因＝ヨツテノミ決定サル、カ、(2)受精卵發育過程中＝蒙ムレル遺傳的素因及ビ外的影響ノ和＝由來スルカ、(3)受精卵發育＝及ボス純外的影響＝ヨルカナル3命題＝統制シ得ン。而シテ現在迄＝於ケル斯方面＝關スル研究ノ結果＝ヨレバ非對稱ガ專ラ遺傳的要約＝ヨリ惹起サル、場合モアルコトハ疑フノ餘地ナキ所ナリ。翻ツテ以上ノ見解ヲ余ノ材料＝敷衍シ考察スルニ非對稱ノ本態自カラ明瞭トナルノ觀アリ。蓋シ蜂窠系＝於ケル各側別乃至交互側別相似ハ極メテ高度ニシテ、後ニ詳述スル如ク外的影響ノ所產物ト解スル能ハザレバナリ。即チ之等兩例ハ遺傳物質ノ分配異常＝由來スルモノナル可ク、一ノ先天性畸形ト目スルヲ得ン。由是觀之、乳嘴蜂窠ノ遺傳的關係ヲ研究セン先進諸家ガ孰レモ斯カル非對稱ヲ外因ナル範疇＝屬センモ專ラ4側乳嘴蜂窠＝於ケル相似ヲ目標トセルハ大ナル誤ナリト云フ可シ。尙ホ又 v. Eiken⁽²²⁾, Steurer⁽²³⁾等

ハ同一個人ニ於テ左右乳嘴蜂窠像ノ著シク相違スルハ外因ニ影響サレシモノト説明スルヨリ外ナシトシテ Wittmaack ノ説ヲ支持セルガ、例ヘ非對稱ヲナス場合ト雖モ其中ニハ斯カル先天性畸形モ含マル、可能性アルヲ以テ 兩氏ノ所説ハ正當ナリト速斷スルヲ許サズ。茲ニ於テ余ノ双生兒研究ニヨリ確メラレタル事實ハ乳嘴蜂

窠左右非對稱ノ發生本態ニ關シテモ亦多少ノ知見ヲ加ヘタリト云フヲ得ンカ。

以上ノ見解ヨリ余ハ此特異例ヲモ相似群中ヘ編入スルヲ躊躇セズ。從ツテ一卵兒ニ於ケル相似度ハ 18 組即チ 72% トナリ、非相似度ハ 7 組即チ 28% = 減ズ。

第 3 表

報 告 者	一 卵 兒			二 卵 兒		
	總組數	相 似 組 數	非 相 似 組 數	總組數	相 似 組 數	非 相 似 組 數
Albrecht	22 組	16組=72.7%	6組=27.3%			
Leicher	39 組	24組=61.4%	15組=38.6%			
Schwarz	59 組	39組=66.1%	20組=33.9%	35 組	13組=37.1%	22組=62.9%
岡 崎	25 組	18組= 72%	7組= 28%	16 組	6組=37.5%	10組=62.5%

註 Schwarz ノ一卵兒 59 組中ニハ Albrecht ノ材料全部ヲ含ム

今余ノ成績ヲ先進諸家ノ成績ト比較センニ、第3表ニ示ス如ク、一卵兒ノ相似度ハ Leicher, Schwarz ニ比シテ甚ダ高キモ、Albrecht トハ殆ンド全ク一致セリ。尙ホ非相似ノ頻度ガ之ト逆ノ關係ニアルコト言フ俟タズ。次ニ二卵兒ヲ對照トセルモノハ Schwarz 唯1人アルノミナルガ、コハ余ノ成績ト殆ンド全ク一致セリ。之ヲ要スルニ、乳嘴蜂窠像ノ相似度ハ一卵兒ニ於テハ甚ダ高く、二卵兒ニ於テハ約 $\frac{1}{2}$ 以下ニ減ズ。然カモ二卵兒ニ於テハ相似ノ程度一卵兒

ノ域ヲ摩スルモノハ唯1例アリシノミ。即チ相似度ハ二卵兒ニ於テハ質的ニモ量的ニモ著シク減退スルヲ見ル。コハ一般遺傳ノ法則ニ全ク準ズルモノニシテ、乳嘴蜂窠ニ於ケル遺傳的要約ノ意義頗ル大ナルヲ明示スルモノナリ。

(2) 含氣型即チ發育度ニ關スル相似度。

一卵兒及ビ二卵兒ニ於ケル乳嘴蜂窠ヲ余ノ含氣型ニ從ツテ分類シ、各含氣型別ニ相似度ヲ觀察スルニ、第4表ニ示ス如シ。

第 4 表

含 氣 型	乳嘴突起個別數		含氣狀態一致セル組數	
	一 卵 兒	二 卵 兒	一 卵 兒	二 卵 兒
含氣性乳嘴突起	75 Wff	53 Wff	13組=52 Wff=69.3%	5組=20 Wff=37.5%
I	22 Wff	13 Wff	5組=20 Wff= 91%	2組= 8 Wff=61.5%
II	33 Wff	21 Wff	6組=24 Wff= 73%	2組= 8 Wff=38.1%
III	20 Wff	19 Wff	2組= 8 Wff= 40%	1組= 4 Wff= 21%
非含氣性乳嘴突起 IV	25 Wff	11 Wff	5組=20 Wff= 80%	1組= 4 Wff=36.3%
計	100 Wff	64 Wff	18 組	6 組

註 Wff ハ Warzenfortsatz ノ略。

即チ一卵兒ニ於ケル含氣性乳嘴突起 (I. II. III) ハ 75 例ニシテ内 52 例 (69.3%) ハ各組毎ニ一致シ。殘餘ノ非含氣性乳嘴突起 (IV) 25 例ニ於テハ 20 例 (80%) ハ相似シ。前者ニ比シ相似度高キコト約 10% ナリ。更ニ含氣性乳嘴突起ヲ余ノ含氣型分類ニ從ツテ觀察スルニ 相似度ハ第 1 型ニ於テ最も高く 第 3 型ニ於テ最も低シ。二卵兒ニ於ケル相似度ハ略々一卵兒ト同様ナル變遷ヲ辿ルモ、一般ニ其程度著シク低ク且ツ孰レノ含氣型ニ於テモ一卵兒ニ遙カニ及バズ。這般ノ關係ハ第 5 表ノ相似曲線ニ就テ見レバ一目瞭然タリ。

第 5 表

茲ニ注目ス可キハ一卵兒ニ於テハ第 4 型ノ非含氣性蜂窠乃至發育度極メテ僅少ナル蜂窠ガ高度ノ相似率 (80%) ヲ示シ 一見遺傳關係著明ナルコトナリ。然ルニ Wittmaack ノ主唱スル從來ノ含氣學說ニ從ヘバ、非含氣性蜂窠ハ最も強ク外的影響 (乳兒耳炎) ニ障礙サレシ殘胎症ナリトイフ。果シテ然ラバ各兒ノ享有スル遺傳物質ハ等質等量ナルガ故ニ。斯ク極メテ酷似スル蜂窠像ヲ現出スル爲ニハ 4 側 (稀ニハ各側又ハ交互側) 耳ニ作用ス可キ外因モ亦質、量及ビ時期ニ於テ相等シカラザル可カラズ。サレド物理乃

至化學的作用ナラバ知ラズ。耳炎ノ如キ病變ガ一再ナラズ。質量及ビ時期ノ 3 條件ヲ等シクシテ各異ナル 2 個人ノ 4 側耳ニ作用スルトハ到底考ヘ得ラレザル所ナリ。尙ホ此見解ヲ裏書スルモノハ同一環境裡ニ成育セルモ遺傳物質ヲ異ニスル二卵兒ニ於テハ相似ノ程度一卵兒ニ比ス可キ例殆ンド皆無ナリシコトナリ。近時 Wittmaack ハ說ヲ新ニシ中耳粘膜ハ各個人ニ遺傳サル、モノナルガ故ニ。一卵兒ニ於テハ外因ニ對スル反應モ亦相等シカルベク。從ツテ例ヘ 4 側乳嘴蜂窠像酷似セリトモ外的影響ヲ蒙ムラザル純遺傳性ノモノト斷ズル能ハズトセシ所說ハ一應尤モナルガ如キモ、仔細ニ吟味セバ此意見モ亦外因ハ等質等量ナリトノ前提ノ下ニ初メテ承認サル、モノナル以上、其誤レルコトハ自ラ明カナリ。

翻ツテ從來ノ遺傳學者ノ說ヲ見ルニ Albrecht 及 Leicher ハ共ニ非含氣性乳嘴突起ノミハ外的影響ノ所產物ト解シ就中 Leicher ノ如キハ 4 側乳嘴突起ガ等シク非含氣性ナル例ヲモ非相似群中ニ編入シタル爲メ著シク高率 (約 40%) ノ非相似度ヲ生ジ。之ヲ説明セントシテ非含氣ハ外因ノ外多クノ人ニ素質トシテ賦與サル、抑制因子ノ作用ニ因ルモノナラント述べ。部分的ニハ Wittmaack ノ所說ニ賛セリ。此中ニ在リテ獨リ、Schwarz ハ純遺傳說ヲ唱道セルガ、余ノ成績ト對照スル時ハ Schwarz ノ所論ノ極メテ妥當ナルヲ信ジテ疑ハズ。即チ少クモ非含氣性乳嘴突起ノ過半数ハ遺傳サル、モノニシテ、コハ慢性耳炎ニヨル二次的骨象牙質化ノ續發症ナリトセル從來ノ見解ヲ是正スルニ足ルノミナラズ。其發生本態ニ就キテモ Wittmaack ノ云フガ如ク含氣機轉初期ニ作用セン外因ニヨルニ非

ズシテ主トシテ遺傳的要約＝基クコトヲ一層明瞭ナラシムルモノナラン。

尙ホ第1型含氣型即チ蜂窠ノ發育正常域ヲ遙カニ超過スルモノモ Wittmaackニ從ヘバ病的蜂窠ニ數ヘラルハガ。余ノ成績ニ於テハ91%又 Schwarzノモノニ於テハ92.2%ハ相似シ。高度ノ遺傳性ヲ暗示シ。之ニ反シ第Ⅱ型即チ最近ニ於ケル Wittmaackノ見解ニヨレバ蜂窠系構成ニ與ヘル遺傳因子ハ何等障礙ヲ蒙ルコト無ク保持サレン蜂窠群ガ却ツテ比較的低キ相似度(73%, Schwarz 74.4%)ヲ呈センハ彼我對照シ頗ル興味深キ所見ナリトス。即チ正常以上ノ發育ヲナス蜂窠モ亦遺傳的要約ト緊密ナル關係ヲ有スルハ疑フベクモ非ズ。

(3) S字竇膨隆度ト含氣狀態トノ關係

S字竇膨隆度ト含氣狀態トノ間ニ一定ノ相互關係アルコトハ從來ヨリ知ラレタル所ナリ。即チ含氣不十分ナル程膨隆度強ク。含氣佳良トナルニ從ヒテ膨隆度ヲ減ズルヲ常トス。而シテS字竇膨隆度強弱ノ發生本態ハ Wittmaack 説ヨ

リスレバ當然含氣障礙ノ程度ト逆ノ關係ニアルコトナリ。換言セバ專ラ外因ノ程度如何ニ關ス。但シ Wittmaackハ此外ニ遺傳微毒及ビ佝僂病ヲモS字竇膨隆ヲ來タス因子トシテ擧ゲタリ。余ハ其眞偽ヲ再檢討セントス。

扱テ「レ」寫眞ニ就キS字竇ノ膨隆度ヲ判定スルニ當リテハ。其前緣線ノ彎曲度ノミヲ目標トスル能ハズ。何トナレバ蜂窠重疊スル爲メ或ハ頭位ノ變動ニヨリS字竇溝ノ影像ハ種々ナル差異ヲ生ズルヲ以テ余ハ像ノ濃度ヲモ參酌シ。輕度(gg. 影像不明瞭ナルモノ)。中等度(mg. 影像明瞭ナルモノ)。高度(hg. 極メテ明瞭ナルモノ)ノ3階梯ニ分チテ觀察セリ。但シ一般ニS字竇ハ左右非對稱ヲナスコト稀ナラズ。殊ニ右側ニ於テ強大ナルコト往々ナルガ故ニ。成績ノ判定ニ當リテハ此點ニ多少ノ考慮ヲ拂フヲ要ス。

余ノ成績ヲ概括スレバ第6表ノ如シ(尙ホ第1表及ビ第2表參照)。

第 6 表

S 字 竇 ノ 膨 隆 度	各 側 別 所 見		膨隆度兩側ニ於 テ一致セル組		膨隆度及ビ含氣 狀態兩側ニ於テ 一致セル組		兩側含氣度一致 セル組		含氣狀態ヲ等シ クスルモ膨隆度 ヲ異ニセル組	
	EZ	ZZ	EZ	ZZ	EZ	ZZ	EZ	ZZ	EZ	ZZ
輕 度	46 側	30 側	9 組 =36側	3 組 =12側	8 組	3 組	9 組	3 組	1 組	2 組
中 等 度	25 側	19 側	4 組 =16側	1 組 =4側	4 組	1 組	4 組	1 組		
高 度	29 側	15 側	5 組 =20側	2 組 =8側	5 組	2 組	5 組	2 組		
計	100 側	64 側	18 組	6 組	17 組 =68%	6 組 =38%				

即チ一卵兒ニ於テハS字竇ノ膨隆度ハ46側輕度。25側中等度。29側高度ニシテ。二卵兒ニ於テハ30側。15側。19側ノ順ニ同様ノ階梯ヲ占ム。而シテ此内膨隆度ガ4側耳ニ於テ同一關係

ニアルハ一卵兒18組。二卵兒6組ニシテ更ニ含氣狀態及ビS字竇ノ膨隆度ヲモ等シクスル組ハ(第5, 6圖參照)一卵兒ニ於テ1組ヲ減ズルノミ。即チ一卵兒17組(68%)。二卵兒6組(38%)

ニシテ 二卵兒ニ於ケル相似度ハ著シク低シ。
 尙ホ此通則ニ反スルモノ換言セバ含氣狀態ヲ等シクスルモ膨隆度ヲ異ニスル場合ハ同質双生兒ニ於テ1組。異質双生兒ニ於テ2組ヲ算スルノミ。次ニ膨隆度並ニ含氣狀態ヲ等シクスル1群ヲ仔細ニ觀察スルニ兩種双生兒ヲ通ジテS字窠ノ膨隆輕度ナル時ハ蜂窠ハI—IIノ發育度ヲ示シ。膨隆中等度ナルモノハII—IIIノ含氣型ニ屬シ。殘餘ノモノハ悉クIVノ發育範圍内ニアリ。以上ノ事實ハ含氣狀態ヲ等シクスル時ハS字窠ノ膨隆度モ等シク。且ツ蜂窠ノ發育度ヲ減ズルニ反比例シテ膨隆度ヲ増ストイフ緊接ナル相互關係アルヲ示スモノナリ。而シテ此際ニ於ケル相似率ガ同質双生兒ニ於テ甚ダ高ク。一方含氣狀態ガ遺傳的要約ニヨリ支配サル、コトニ想到セバ Wittmaack ニ反シS字窠ノ膨隆度モ亦遺傳性ナル可キハ察スルニ難カラズ。但シ余ノ材料ニ於テハ遺傳微毒或ハ尙儂病患者皆無ナリシヲ以テ 之等ノ疾患ガS字窠ノ發達ニ如何ナル影響ヲ及ボスモノナリヤハ批判ノ限りニ非ズ。

(4) 蜂窠發育範圍（發育度）ト爾餘構成態トノ關係

乳嘴蜂窠ノ相似度ヲ觀察スルニ當リ一卵兒ニ於テハ蜂窠ノ發育度ヲ等シクスル時ハ例外ナク爾餘ノ構成態ヲモ等シクセリ。然ルニ二卵兒ニ於テハ蜂窠ノ發育度ヲ等シクスルモ構成態ヲ異ニシ或ハ逆ニ構成態ヲ等シクスルモ發育度相違スルコト多ク。完全ナル一致ト目ス可キハ唯1例ニ過ギズ。例ヘバ二卵兒ノ第13例（第7圖）ハ2兒共蜂窠ノ發育極メテ良好ナルガ第1兒ノ蜂窠系ハ中細胞性ニシテ規則正シク。第2兒ハ排列極メテ不規則ナリ。又二卵兒ノ第8例（第8圖）ハ4側蜂窠ハ孰レモ中細胞性ニシテ。間

壁菲薄。排列規則正シキモ。第1兒ノ發育度ハIナルニ反シ第2兒ニ於テハIIノ發育度ヲ示セリ。

以上ノ事實ハ蜂窠ノ發育度ト蜂窠系構成態トノ間ニハ密接ナル關係アルヲ示スモノニシテ。然カモ之ガ殆ンド專ラ等質双生兒ニ於テノミ見ラレシハ遺傳的要約ニ基クコトヲ暗示ス。サレバ本事實ハ Wittmaack ガ含氣狀態ノ種々相ヲ質。量及ビ時期ナル3要素ノ種々ナル組合セノ下ニ作用セン外因ノ殘胎症ナリトセル說ヲ以テシテハ到底説明スル能ハザル所ニシテ。遺傳說ニヨツテノミ初メテ首肯シ得ル解答ヲ與フモノナリ。尙ホ本事實ハ蜂窠系ヲ支配スル多數ノ遺傳因子中其發育範圍ヲ規定スル因子ハ就中最モ重要ナル意義ヲ有スルコトヲ推測セシム。

(5) 相似度ノ年齡的變遷

一卵兒ト二卵兒ヲ5歳ヨリ10歳。11歳ヨリ15歳及ビ夫レ以上ノ3階梯ニ分チテ相似度ヲ觀察スルニ。第7表ニ示スガ如ク。一卵兒ニ於テハ年代ニヨリ相似度ニ大差無ク。寧ロ成長ト共ニ増加スル傾向ヲ示スガ 之ニ反シ二卵兒ニ於テハ相似度ハ年齡ヲ加フルニ從ヒ減退スルノ傾向著明ナリ。從來カ・ル關係ニ著目セル研究無ク。又余ノ觀察材料モ亦十分ナラザルガ故ニ。決定的ノコトハ云ヒ得ザルモ。少クトモ乳嘴蜂窠ノ成形ニ與ル遺傳因子ハ一卵兒ニ於テハ年齡ニヨツテ等質等量ノ均衡失ハル、コト少ク。二卵兒ニ於テハ遺傳物質ノ差異ハ次第ニ著明トナルト結論シ得ン。即チ等質遺傳物質ト異常遺傳物質トハ夫々乳嘴蜂窠系ニ甚大ナル影響ヲ及ボスモノナルヲ窺フニ足ル資料ナリ。

第 7 表

年 代 別	一 卵 兒		二 卵 兒	
	總 組 數	相似セル組數	總 組 數	相似セル組數
5 — 10 歳	6 組	4 組=66 %	7 組	3 組=43 %
11 — 15 歳	11 組	8 組=73 %	5 組	2 組=40 %
16 歳 以 上	8 組	6 組=75 %	4 組	1 組=25 %

(6) 外因ノ程度

以上各項ニ亙リテ遺傳關係ヲ立證シタルガ、更ニ之ヲ確實ニシ且ツ一方的批判ニ陥ルヲ避ケンガ爲メ、外因ニツキ考究セン。

双生兒病理ノ原則ヨリシテ形質ノ非相似ハ外因ノ影響ト解サルハモノニシテ、余ノ成績ニ於テハ既述ノ如ク（第3表）28%ヲ算ス。此價ハ Albrecht 及 Schwarz ニ略々一致シ、Leicher ニ比シ遙カニ僅少ナルモ、Leicher トハ相似ノ判定ニツキ見解ノ相違アルヨリ見レバ當然ナル結果ナリ。之等諸家ノ成績ヲ綜合シテ考フルニ外因ノ程度ハ比較的僅少ナリト云ヒ得可ク若シ遺傳的要約トノ比テ假リニ數量的ニ表セバ1對3ノ割合トナル。之ヨリシテモ、Wittmaack ノ云フ如ク大多數(80—90%)ノ蜂窠ハ潜在性耳炎ナル外的影響ヲ蒙ムレトスル所論ニハ勿論賛成スル能ハズ。ノミナラズ茲ニ興味アルハ一卵兒ノ第14例(第9圖)ナリ。即チ第1兒ハ生後3ヶ月ニシテ右側中耳化膿症ニ罹リ、第2兒ハ第1兒ヨリモ約1ヶ月遅レテ反對側即チ左側ノ中耳化膿症ヲ病ミ、共ニ略々同一經過ヲ取り約1ヶ月ニシテ全治セルモノナリ。14年後ニ行ヒシ耳鏡検査ノ結果ハ全ク病歴ト一致シ罹患側鼓膜ハ輕度ニ溷濁シ、略々中央ニ小ナル瘢痕アリ。音叉試験ニテハ輕度ノ中耳性難聴ノ所見ヲ呈スルモ、呬語ハ6mヲ聴取シ得。而シテ之等兩兒

ニ於ケル乳嘴蜂窠ノ「レ」所見ハ、4側耳ニ於テ蜂窠ハ良好ナル發達ヲ遂ゲ範圍ニ於テモ將又爾餘ノ構成態ニ於テモ甚ダ酷似シ殆ンド差異ヲ見出スコト能ハザリキ。コハ Knick u. Witte⁽³⁵⁾ノ所見ニ符合スルモノナルガ、氏等ノ研究ガ單ニ同一個人ノ健側耳ヲ對照トセルニ反シ、余ノ材料ニ於テハ更ニ別個人ノ乳嘴蜂窠像ヲモ併セ批判シタル結果ナルガ故ニ、氏等ノ見解ニ對シ一層有力ナル證明ヲ與ヘタルモノナリ。如斯例ヘ急性耳炎ニ侵サルハトモ蜂窠系ハ常ニ影響ヲ蒙リ全貌ヲ變ズルトハ限ラズ。即チ此際各個人ニ遺傳サレタル中耳粘膜ノ抵抗力如何ガ重要ナル役割ヲ演ズルコトハ疑フノ餘地ナシ。從ツテ臨牀症狀ヲ全ク缺クガ如キ極メテ輕症ナル潜在性耳炎ニ作用サレ大多數ノ蜂窠ガ變化スルトハ斷ジテ考ヘ得ザル所ニシテ、余ハ Albrecht ト共ニ本耳炎ヲ一ノ生理的現象ニ外ナラズト看做スニ躊躇セズ。然モ胎生後ニ於ケル含氣抑制ノ原因トシテモ Wittmaack⁽¹⁰⁸⁾ノ乳兒耳炎ノ外ニ Schuellei⁽⁶⁴⁾ハ Dysostosis cleidocranialis 及ビ Marmorknochenkrankheit ヲ Van Gilse⁽²⁵⁾ハ佝僂病及ビ Mongolische Idiotie ヲ Albrecht^(4, 6, 7)ハ腺樣増殖症及ビ人工榮養ニヨル榮養障礙ヲ舉ゲ 又含氣促進因子トシテ Schuellei⁽⁶⁴⁾ハ肢端肥大症ヲ Proskurjakow⁽¹⁶⁾, Yang⁽¹¹⁸⁾等ハ胸鎖乳頭筋ノ牽引ヲ説ク等其原因ハ

單一ナラズ。サレバ獨り乳兒耳炎ノミガ後年ノ乳嘴蜂窠像ヲ支配スル根本因子トスル Wittmaack ノ所説＝ハ大ナル價值ヲ置キ難シ。

要之ニ。外因ノ方面ヨリ觀察スルモ乳嘴蜂窠ガ主トシテ遺傳的要約＝ヨリ規定サル、モノナルコトハ疑ヲ容レザル所ナリ。

第三節 結 論

1. 岡山縣及ビ其隣接諸縣在住ノ双生兒中ヨリ蒐集シ得タル同性双生兒 41 組（5 歳ヨリ 23 歳ニ至ル）ヲ Simens ノ相似診斷法ヲ應用シ尙ホ耳鼻咽喉科の見地ヨリ相似形質ヲ取捨選擇シタル上、一卵兒ハ 25 組、二卵兒ハ 16 組ナルコトヲ確メタリ。

2. スクシテ鑑別シタル一卵兒 25 組ニ於ケル 100 側乳嘴蜂窠ヲ二卵兒 16 組 64 側乳嘴蜂窠ト對照シテ「レ」學的ニ相似度ヲ比較觀察セルニ。次ノ如キ結果ヲ得タリ。

（1） 概括的相似度ハ一卵兒 72%、二卵兒 37.5%ニシテ二卵兒ニ於テ著シク劣ル。且ツ二卵兒ニ於テハ質的ニモ相似ノ程度一卵兒ニ匹敵スルハ僅カニ 1 例ヲ算シタルノミ。

（2） 同質双生兒ニ於テ乳嘴蜂窠系ガ夫々各側毎及ビ交互側毎ニ一致シ。然モ其相似度極メテ高度ナルノミナラズ。現在ノ遺傳説ヨリシテ之ガ外因ノ影響ト解スル能ハザルモノ 2 組ヲ觀察セリ。此事實ヨリシテ同一個人ノ左右蜂窠像著シク相違スルハ外的影響ナリトセシ從來ノ見解ハ直チニ承認スル

ヲ得ズ。

（3） 從來ノ含氣學説ニヨレバ最キ甚大ナル外的影響ヲ蒙ムリタリト看做サレシ非含氣蜂窠及ビ病的蜂窠ノ範疇ニ屬セシメラレタル發育度正常以上ノ蜂窠ガ著シク高率ノ相似度（80%、90%）ヲ示セリ。

（4） S 字竇ノ膨隆度ハ含氣狀態ト密接ナル關係アリ。即チ膨隆著明トナルニ反比例シテ蜂窠ノ發育度ヲ減ズ。而シテ兩條件ニ關スル相似度ハ一卵兒 68%、二卵兒 38%ニシテ、二卵兒ニ於テ著シク劣ル。

（5） 一卵兒ニ於テハ蜂窠ノ發育度ヲ等シクスル時ハ常ニ爾餘ノ構成態ヲモ等シクス。コハ二卵兒ニ適合セズシテ、分配サレシ遺傳物質ノ等質ナルカ異質ナルカニ因ルモノナラン。

（6） 一卵兒ニ於テハ年齢ニヨリ相似度ニ變動ヲ來タス事僅少ナルモ、二卵兒ニ於テハ年齢ヲ増スニ從ツテ次第ニ相似度ヲ減ズ。

（7） 外因ノ程度ハ僅少ニシテ、若シ數量的ニ表セバ 28%ニ當ル。又含氣機轉初期ニ急性中耳炎ヲ經過セル場合ニ於テモ蜂窠系ノ全貌常ニ著シク變化スルトハ限ラズ。

3. 叙上ノ事實ヨリシテ余ハ Wittmaack ガ後年者ニ於ケル乳嘴蜂窠像ハ大多數乳兒耳炎ニヨリ影響サレシ殘貽像ナリトスル説ヲ承認スル能ハズシテ Albrecht 及ビ Schwarz ノ遺傳説ニ賛成スルモノナリ。

擧筆スルニ臨ミ田中教授ノ御懇切ナル御指導ト御校閲ヲ深謝ス。

文

- 1) **Albrecht**: Pneumatisation u. Konstitution. Z.f.H.N.O. Bd. 10, S. 51, 1925. 2) **Derselbe**: Mittelohreiterung u. P. des Wff. Z.f.H.N.O. Bd. 10, S. 55, 1925. 3) **Derselbe**: Die Bedeutung d. Konst. bei den Erkrankungen des Ohres u. der Luftwege. Z. f. Laryng. Bd. 14, S. 1, 1926. 4) **Derselbe**: Die Bedeutung d. Erbmasse bei Infektionen d. Schleimhäute u. die Methoden ihrer Forschung. Acta oto-laryng. Vol. 11, P. 16, 1927. 5) **Derselbe**: Zur Frage d. P. des Mittelohres. Acta oto-laryng. Vol. 14, P. 221, 1930. 6) **Derselbe**: Über Konstitutionsprobleme in der Pathogenese d. Hals-, Nasen-, u. Ohrenkrankheiten. Z.f.H.N.O. Bd. 29, 1931. 7) **Derselbe**: Die allg. Konst. u. ihre lokale Auswirkung in Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankheiten. 8) **Albrecht u. Schwarz**: Anlage u. P. A.f.O. Bd. 134, S. 50, 1933. 9) **Albrecht**: Die erblichen Ohrenleiden u. das Gesetz zur Verhütung des erkrankten Nachwuchses. Z.f.H.N.O. Bd. 36, S. 262, 1934. 10) **Altmann u. Vermes**: Über einige prinzipiell wichtige histologische Befunde an Menschenaffenschläfenbeinen. M.f.O. Jg. 67, S. 862, 1933. 11) **Amberg**: Wittmaaks views concerning the normal and pathologic P. of the temporal bone. Zbl. f.H.N.O. Bd. 3, S. 497, 1923. 12) **Aschoff**: Die Otitis media neonatorum. Z.f.O. Bd. 31, 1897. 13) **Bauer u. Stein**: Konstitutionspathologie in der Ohrenheilkunde. J. Springer. 1926. 14) **Bauer**: Vorlesungen über allg. Konstitutions) u. Vererbungslehre. J. Springer. 1923. 15) **Beck, J.**: Pathologisch-anatomische Untersuchungen über die Mastoiditis, zugleich ein Beitrag zur Frage usw. Passows Beiträge. Bd. 24, S. 12, 1926. 16) **Beck, J.**: Beziehungen d. P. d. Wff. der Nasennebenhöhlen. Z.f.H.N.O. Bd. 18, S. 672, 1927. 17) **Bezold**: Corrosionsanatomie des Ohres. München. 1882. 18) **Brock**: Trommelfelbild u. P. des Wff. Z.f.H.N.O. Bd. 15, S. 241, 1926. 19) **Carmody**: The development of the sinuses and the influence

献

- of infection upon their development. Transact. of the Acad. of Ophth. and Oto-laryng. P. 383, 1925. 20) **Curtius**: Nachgeburtsbefunde bei Zwillingen u. Ähnlichkeitsdiagnose. Arch. f. Gynaek. Bd. 140, S. 361, 1930. 21) **Decking**: Epelidenuntersuchungen zum Ausbau der Siemensschen Methode zur Diagnose der Eineiigkeit. [M.M.W. Jg. 73, S. 1188, 1926. 22) **v. Eiken**: Diskussionsbemerkung auf d. I. internat. Oto-Rhino-Laryng. Kongress in Kopenhagen. 1928. Zbl. f. O. Bd. 30, S. 149, 1929. 23) **Eisinger**: Untersuchungen über die P. des Schläfenbeins. I. intern. Kongress zu Kopenhagen. 1928. Zit. nach Zbl. f. H.N.O. Bd. 8, S. 38, 1929. 24) **Van Gilse**: Über die Entwicklung d. Keilbeinhöhle des Menschen. Z.f.H.N.O. Bd. 16, S. 202, 1926. 25) **Derselbe**: Diskussionsbemerkung auf d. I. intern. Kongress in Kopenhagen. 1928. Zbl. f.O. Bd. 30, S. 149, 1929. 26) **Görke**: Die exsudativen u. plastischen Veränderungen im Mitterohr. A.f.O. Bd. 65, S. 226, 1905. 27) **Derselbe**: Diskussionsbemerk. auf d. I. intern. Kongress in Kopenhagen. 1928. Zbl. f. O. Bd. 30, 1929. 28) **Grahe**: Hat d. Muskelzug am Sternocleidomastoideus einen Einfluss auf die P. des Processus mastoideus? Z.f.H.N.O. Bd. 20, S. 278, 1928. 29) **Hanse**: Akute M.O. Entz. u. P. des Wff. Z.f.H.N.O. Bd. 25, S. 424, 1930. 30) **秦發雄**: 一卵性双胎ト二卵性双胎トノ區別. 助産. 第368號, 2273頁, 大. 15. 31) **Heinemann**: Die Röntgenaufnahme des Wff. u. ihre klinische Bedeutung. Passows' Beiträge. Bd. 19, S. 41, 1923. 32) **Hesse**: Beiträge zur Bakteriologie u. Klinik akuter Mitterohreiterung, usw. Z.f.H.N.O. Bd. 22, S. 372, 1929. 33) **Derselbe**: Blutgruppenzugehörigkeit u. P. des Wff. Z. f. Laryng. Bd. 17, S. 240, 1929. 34) **Komai and Fukuoka**: A set of dichorionic identical triplets. Jour. of Heredity. Vol. 22, P. 233, 1931. 35) **古屋芳雄**: 優生學原理ト人類遺傳學. 昭6. 36) **Knick u. Witte**: Röntgenologische Studien

über die Entwicklung d. Warzenfortsatzzellen nach Otitis media im ersten Leben Sjahr. A.f.O. Bd. 119, S. 128, 1928. 37) **Kretschmann:** Diskussionsbemer. zum Vortrag von Wagener. Verhandl. d. Ges. dtsh. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte. 1921. 38) **Krainz:** Entstehung u. Verlauf d. Mastoiditis. Z.f.H.N.O. Bd. S. 488, 1925. 39) **Kriegsmann:** Röntgenologische Untersuchungen an Wff. nach durchgemachter Otitis. Z.f.H.N.O. Bd. 29, S. 259, 1931. 40) **國友鼎:** 双胎兒ニ現ハル、遺傳形質ノ研究. 東京醫誌, 2799號, 47頁, 昭7. 41) **Lange, S.:** Röntgenray examination of the mastoid region. Amer. Roentgenray Soc. Vol. 9, 1909. 42) **Lange, W.:** Die pathologische Anatomie d. Mastoiditis. Z.f. H.N.O. Bd. 20, S. 1, 1928. 43) **Derselbe:** Tiefgelegene Entzündungsherde im Schläfenbein. Z.f.H.N.O. Bd. 32, S. 99, 1933. 44) **Leicher:** Die Vererbung anatomischer Variationen d. Nase, ihrer Nebenhöhlen u. des Gehörgangs. München. 1928. 45) **Lenz:** Zur Frage d. Erbllichkeit d. Muttermäler. M.M.W. S. 1365, 1924. 46) **Löbell:** Ohroperation im frühen Kindesalter u. Pneumatisationsentwicklung. Z. f. Laryng. Bd. 21, S. 326, 1931. 47) **Martin:** Lehrbuch d. Anthropologie. Jena. 2. Auf. 1928. 48) **Marx:** Zur Frage d. Bedeutung d. M.O. Entz. des frühesten Kindesalters für später. A.f.O. Bd. 126, S. 71, 1930. 49) **Meirowsky:** Zwillingspathologie u. Äthiologie d. Muttermäler. Dermatol. Wochenschr. Bd. 79, S. 973, 1924. 50) **Mayer, E. G.:** Otologische Röntgendiagnostik. J. Springer. 1930. 51) **Meyer, M.:** Pathologisch-anatomische Untersuchungen zur Frage d. akuten Otitis u. d. Indikation zur Antrotomie. Passows' Beiträge. Bd. 26, S. 233, 1928. 52) **Derselbe:** Über Konst. u. Mitterohrschleimhaut. Z.f.H.N.O. Bd. 29, S. 106, 1931. 53) **Meyer, W.:** Ergebnisse röntgenologisch-klinischer Untersuchungen zur Frage d. sekundären Sklerosierung des Wff. A.f.O. Bd. 130. S. 292, 1932. 54) **見波定治:** 遺傳學. 第2版, 昭3. 55) **Mittermaier:** Die Krankheiten. d. Nasen-

nebenhöhlen u. des Ohres im Röntgenbild. 1934. 56) **Mouret:** Annales des maladies de l'oreille etc. 2, 1913. Zit nach Wittmaack; Über die normale u. pathologische P." 57) **Mygind:** Diskussionsbemer. auf d. 1. intern. Kongress in Kopenhagen. 1928. 58) **岡崎衛生:** 乳嘴蜂窠遺傳ニ就テノ研究. 大日耳鼻. 40卷, 1342頁, 昭9. 59) **岡崎衛生:** 乳嘴蜂窠遺傳ニ關スル研究. 大日耳鼻. 41卷, 1407頁, 昭10. 60) **Politzer:** Lehlubuch d. Ohrenheilkunde. Stuttgart. 1901. 61) **Proskurjakow:** Über die Wirkung des einseitig gesteigerten Muskelzuges des Sternocleidomastoideus auf den Wff. bei Torcicollis. M.f.O. Jg. 68, S. 808, 1934. 62) **Rietschel:** Die klinische Bedeutung d. Otitis media des Säuglingalters, insbesondere usw. Therapeut. Monatshfte. Bd. 23, S. 313, 1909. 63) **Richter:** Über familiäres Auftreten d. entzündlichen Mittelohrerkrankungen. Z. f. Laryng. Bd. 21, S. 319, 1931. 64) **Schüller:** Diskussionsbemer. auf d. I. intrn. Kongress in Kopenhagen. 1928. 65) **Rollin:** Beiträge zur Kenntnis der Mucosus-Otitis. A.f.O. Bd. 137, S. 333, 1924. 66) **Runge:** Über Indikationsstellung zur Mastoidoperation auf Grund d. Röntgenbildes. Z.f.O. Bd. 81, S. 351, 1921. 67) **下田伯一:** 顙顙骨ノ組織解剖學的研究. 大日耳鼻. 38卷, 1頁, 昭7. 68) **Schüller:** Über Röntgenuntersuchungen bei Krankheiten des Schädels u. Gehirns. Wien. med. W. Jg. 58, S. 501, 1908. 69) **Schwarz:** Die Bedeutung d. hereditären Anlage für d. P. der Wff. u. Nasennebenhöhlen. A.f.O. Bd. 123, S. 1929. 70) **Derselbe:** Das individuelle Verhalten d. Schleimhaut propria im Mittelohr u. ihrer Entwicklung u. ihres Gewebsaufbau. Z.f.H.N.O. Bd. 29, S. 98, 1931. 71) **Derselbe:** Untersuchungen zur individuellen Histologie des Bindegewebes. A.f.O. Bd. 129, S. 1, 1931. 72) **Schwarze u. Eysel:** Über die künstliche Eröffnung des Wff. A.f.O. Bd. 7, S. 157, 1873. 73) **Shea:** The persistent infantile ethmoid. Ann. of Otol. Vol. 33, P. 1256, 1924. 74) **Shea:** The normal

and pathological development of the sinuses. Zbl. f.H.N.O. Bd. 10, S. 508, 1927. 75) **Siemens:** Einführung in d. allg. u. spez. Vererbungspathologie des Menschen. Berlin. 2. Auf. 1923. 76) **Derselbe:** Zwillingspathologie. J. Springer. 1924. 77) **Derselbe:** Zur Äthiologie Turmschädels, nebst Mitteilung einer dermatologischen Methode zur Diagnosé d. Eineiigkeit bei Zwillingen. Virchows' Archiv. Bd. 253, S. 746, 1924. 78) **Derselbe:** Die Diagnose d. Eineiigkeit geburtshilflicher u. in dermatologischer Beobachtung. A.f. Gynäk. Bd. 126, 1925. 79) **Derselbe:** Über die Eineiigkeitsdiagnose d. Zwillinge aus den Eihäuten u. aus den dermatologischen Befunde. 80) **Derselbe:** Vererbungs- u. Konstitutionspathologie d. Ohres u. d. oberen Luftwege. Z.f.H.N.O. Bd. 29, S. 3, 1931. 81) **Derselbe:** Die Vererbungspathologie d. Mundhöhle. M.M.W. Jg. 41, S. 1747, 1928. 82) **Singer:** Über entzündliche Erkrankungen des Mittelohres usw. Z.f.H.N.O. Bd. 32, S. 110, 1933. 83) **Sommer:** Familienforschung u. Vererbungslehre. Leipzig. 1922. 84) **Sonnenkalb:** Darstellung d. pneumatischen Systems am Lebenden. Verhandl. dtsh. otol. Ges. Bd. 22, S. 367, 1913. 85) **Derselbe:** Röntgendiagnostik. Denker-Kahlers' Handb. Bd. 6, S. 1048, 1926. 86) **Stenvers:** Röntgenologie des Felsenbeines u. des bestemporalen Schädelbildes. J. Springer. 1928. 87) **Steurer:** Die Röntgenbild d. Wff. u. seine klinische Bewertung. Z.f.H.N.O. Bd. 12, S. 504, 1925. 88) **Derselbe:** Anatomische Studien über den Aufbau d. Mittelohr-Schleimhaut usw. Z.f.H.N.O. Bd. 15, S. 261, 1926. 89) **Derselbe:** Zur Frage d. P. des Wff. Z.f.H.N.O. Bd. 29, S. 113, 1931. 90) **Talpis u. Liebermann:** Über Pneumatisierung des Wff. Zbl. f. H.N.O. Bd. 11, S. 843, 1928. 91) **田中文男:** 大日耳鼻. 第30回總會ニ於ケル討論. 東京, 大15. 大日耳鼻. 32卷, 296頁, 大15. 92) **谷口虎年:** 双胎ノ研究. 昭10. 93) **Ter-Organesjan:** Entwicklung d. Nebenhöhlen d. Nase während d.

intrauterinen Lebens. Zbl. f.H.N.O. Bd. 12, S. 34, 1928. 94) **寺尾新:** 優生學ト生物測定學. 昭7. 95) **Theissing:** Röntgenologische Untersuchungen über die Struktur des Wff. Z.f.H.N.O. Bd. 25, S. 137, 1930. 96) **Turner u. Porter:** The structural type of the mastoid process, based upon the sciographic examination usw. J. of Laryng. Otol. Vol. 37, P. 115, 1922. 97) **Undritz:** Über die Bedeutung d. Erbfaktoren bei verschiedenen oto-rhino-laryng. Erkrankungen. A.f.O. Bd. 119, S. 270, 1928. 98) **Voss:** Diskussionsbemer. auf d. 5. Tagung suedwestdeutscher Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte in Tübingen. 1925. 99) **v. Vershuer:** Der gegenwärtige Stand d. Zwillingsforschung. Arch. f. soz. hyg. u. Demogr. N.F. Bd. 1, S. 140, 1925. 100) **Derselbe:** Antropologische Studien an ein- u. zweieiigen Zwillingen. Z. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungslehre. Bd. 41, S. 115, 1926. 101) **Derselbe:** Grundlegende Frage d. vererbungsbiologischen Zwillingsforschung. M.M.W. Jg. 73, S. 1562, 1926. 102) **Vesalius:** Zit nach Galen: "A brief history of the early development of the anatomy of the ear." Laryngoscope. Vol. 54, 1934. 103) **Wagener:** Zur Frage der P. des Wff. I. Verhandl. d. Ges. dtsh. Hals-, Nasen- u. Ohrenärzte in Nuerunberg. 1921. 104) **Weidenreich:** Über formbestimmende Ursachen am Skelet u. die Erbllichkeit d. Knochenform. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen. Bd. 51, S. 436, 1922. 105) **Weitz:** Studien an eineiigen Zwillingen. Z. f. klin. Med. Bd. 101, S. 115, 1924. 106) **Wildermuth:** Die lufthaltigennebenräume des Mittelohres beim Menschen. Z. f. Anat. u. Entwickl. Bd. 2, S. 22, 1877. 107) **Wittmaack:** Trommelfellbild u. Pneumatisationszustand. Passows' Beiträge. Bd. 9, S. 115, 1917. 108) **Derselbe:** Über die normale u. die pathologische P. des Schläfenbeins. Jena. 1918. 109) **Derselbe:** Der Einfluss d. Anatomie des Mittelohres auf den Verlauf d. Mittelohrentzündungen. 1. intern.

otorhino-laryng. Kongress in Kopenhagen. 1928. 110) **Derselbe:** Cholesteatombildung, P. u. Pneumatisationslehre. A.f.O. Bd. 125, S. 218, 1930. 111) **Derselbe:** Zür Frage d. Bedeutung d. M. O. Ent. des frühesten A.f.O. Bd. 129, S. 207, 1931. 112) **Derselbe:** Schleimhautkonst. u. P. A.f.O. Bd. 132, S. 261, 1932. 113) **Derselbe:** Wie entsteht ein genuines Cholesteatom? A.f.O. Bd. 137, S. 306, 1933. 114) **Yamashita, K.:**

Über die Schläfenbeinzellen. 耳鼻牀臨. 27卷, 273頁, 昭7. 115) **山下憲治:** 顙顙骨含氣蜂窠ノ構成態並ニ含氣型ニ就テ. 大日耳鼻. 41卷, 1002頁, 昭10. 116) **義江義雄:** 聽器ノノ學的研究. 大日耳鼻. 37卷, 1頁, 昭7. 117) **Yang:** Über den Einfluss des Muskelzugs auf Entstehung u. Wachstum des Wff. Z.f.H.N.O. Bd. 22, S. 272, 1928. 118) **Zuckerkanal:** Zür Anatomie des Wff. M.f.O. Jg. 13, S. 49, 1879.

附 圖 說 明

第1圖 EZ. 第21例 ♀♀ 16歳。

第1兒。兩側共蜂窠ノ發育甚ダ良好ニシテ。乳嘴突起ノ固有投影範圍ヲ越ヘ。鱗屑部。隅角部。後S字竇部ニ及ブ。蜂窠ハ中細胞性ニシテ。間壁菲纖。規則正シク排列ス。但シ邊緣ノ蜂窠ハ稍々急激ニ其大サヲ増ス。S字竇ハ中等度ニ膨隆ス。

第2兒。兩側共第1兒ニ甚ダ酷似ス。唯左側ニ於テ。鱗屑部蜂窠ノ發育優ル。

第2圖 EZ. 第22例 ♀♀ 17歳。

第1兒。蜂窠ハ左右共乳嘴突起ノ固有投影範圍ヲ完全ニ充シ尙ホ僅カニ夫レヲ超過ス。中細胞性ニシテ。間壁中等度厚。排列規則正シキモ。後縁ヲ劃スル一群ノ蜂窠ハ囊狀ニ著シク膨脹ス。S字竇ハ稍々前方ニ偏移ス。

第2兒。兩側蜂窠系ハ第1兒ニ極メテ酷似ス。唯左側ニ於テハS字竇ノ前縁線下膝部ニ於テ稍々明瞭ヲ缺ク。

第3圖 EZ. 第15例 ♀♀ 14歳。

第1兒。右側。蜂窠ハ錐體ノ固有投影範圍ヲ充シ。尙ホ鱗屑部。顙骨弓根部等モ多少含氣ス。一般ニ小細胞性ニシテ。間壁中等度厚。排列稍々不規則ナリ。特異ナルハ先端ニ1個ノ甚ダ大ナル終末蜂窠ヲ存スルコトナリ。S字竇前縁ノ像略々明瞭ナリ。左側。構成態ヲ等シクスルモ。終末蜂窠發育セズ。範圍正常。又S字竇像ヲ認メ得ズ。

第2兒。右側ハ第1兒ノ右側ニ。左側ハ第1兒ノ左側ニ極メテ酷似ス。即チ含氣狀態ハ各側毎ニ一致ス。

第4圖 EZ. 第23例 ♀♀ 18歳。

第1兒。右側。蜂窠ハ略々岩樣骨ノ固有投影範圍ヲ充ス。小細胞性ニシテ。間壁中等度厚ナルモ。

排列概ネ正規ナリ。非含氣部ハ板障性ニシテ。含氣部トノ間ニ尖銳ナル境界ヲ劃ス。S字竇ノ膨隆中等度。左側。乳嘴突起ハ一様ニ板障性骨ヨリ成リ。廣キ乳嘴竇ノ周圍ニ比較的大ナル蜂窠數個ヲ見ル。S字竇ノ影像極メテ明瞭。

第2兒。右側ハ第1兒ノ左側ニ。左側ハ第1兒ノ右側ニ一致ス。即チ交互側毎ニ酷似ス。

第5圖 EZ. 第3例 ♀♀ 8歳。

第1兒。第2兒共蜂窠ノ發育著シク不良ニシテ。唯乳嘴竇ヲ中心トシ稍々廣ク小ナル蜂窠不規則ニ散在ス。非含氣部ハ緻密骨性ニシテ含氣部ハ瀰蔓性ニ移行ス。S字竇ノ膨隆高度。即チ含氣狀態及ビS字竇ノ膨隆度ハ4側耳ニ於テ極メテ酷似ス。

第6圖 EZ. 第25例 ♀♀ 23歳。

4側耳共蜂窠ハ略々錐體投影範圍内ニ限局サル。小蜂窠性ニシテ間壁肥厚シ。排列統一ヲ缺ク。S字竇ノ膨隆度モ4側ニ於テ一致ス。

第7圖 ZZ. 第13例 ♀♀ 15歳。

第1兒及ビ第2兒共蜂窠ノ發育度及ビ間壁ノ狀態一致スルモ前者ハ中細胞性ニシテ。排列正規ナルニ反シ後者ハ小細胞性ニシテ排列不規則ナリ。

第8圖 ZZ. 第8例 ♀♀ 11歳。

4側耳共蜂窠ハ中細胞性ニシテ。隔壁菲纖。排列規則正シキモ。第1兒ノ發育度ハ極メテ可良ナルニ反シ第2兒ノ夫レハ正常域ヲ越ヘズ。

第9圖 EZ. 第14例 ♀♀ 14歳。

4側耳共蜂窠ノ發育極メテ良好。正規ノ構成態ヲ呈ス。殊ニ中耳炎ヲ經過シタル第1兒ノ右側及ビ第2兒ノ左側ニ於テモ健側耳ト比較シ含氣狀態ニ何等ノ差異ヲモ認ムル能ハズ。

(原稿到着＝昭和11・6・25)

岡崎論文附圖 1

乳嘴蜂窠ノ遺傳的關係ニ就テノ研究 (第一編 乳嘴蜂窠遺傳ト双生兒)

第 1 圖

右 側

左 側

第
1
兒

第
2
兒

第 2 圖

右 側

左 側

第
1
兒

岡崎論文附圖 2

乳嘴蜂窠ノ遺傳的關係ニ就テノ研究 (第一編 乳嘴蜂窠遺傳ト双生兒)

第 2 圖

第 3 圖

乳嘴蜂窠と遺傳的關係ニ就テノ研究 (第一編 乳嘴蜂窠遺傳ト双生兒)

第 4 圖

右 側

左 側

第
1
兒

第
2
兒

第 5 圖

右 側

左 側

第
1
兒

乳嘴蜂窠ノ遺傳的關係ニ就テノ研究 (第一編、乳嘴蜂窠遺傳ト双生兒)

第 5 圖

第 6 圖

岡崎論文附圖 5

乳嘴蜂窠ノ遺傳的關係ニ就テノ研究 (第一編 乳嘴蜂窠遺傳ト双生兒)

第 7 圖

第 8 圖

Morio Okasaki: Über die Bedeutung der Erbfaktoren bei der Pneumatisa der Warzenfortsaetze. (Erste Mitteilung: Zwillingsforschung.)

乳嘴蜂窠ノ遺傳的關係ニ就テノ研究 (第一編 乳嘴蜂窠遺傳ト双生兒)

第 8 圖

第 9 圖

Morio Okasaki: Über die Bedeutung der Erbfaktoren bei der Pneumatisa der Warzenfortsätze. (Erste Mitteilung: Zwillingsforschung.)