騒音ニヨル聽器障礙ニ關スル實驗的研究

S. Kawata: Experimentelle Studien über die Lärmschädigungen des Gehörorgans.
II. Mitteilung: Über das Verhalten des Preyerschen
Ohrmuschelreflexes bei Lärmschädigung des Gehörorgans.

九州帝國大學醫學部耳鼻咽喉科學教室 (主任 久保教授)

醫學士 河 田 政 一

第 二 編

騒音ニヨルフライエル氏耳殼反射運動ノ消長ニ就テ

目 次

第一章 緒 論	第七章 對照動物ニヨル基礎的測定
第二章 <u>フライエル氏</u> 耳殼反射運動ニ關スル 文獻ノ概要	一. 第一實驗ニ對スル基礎的測定
第三章 實驗方法	二. 第二實驗ニ對スル基礎的測定
一. 序 言	第八章 實驗成績
二. 實驗裝置	I 第一實驗ノ成績
三. 實驗施行ノ順序	II 第二實驗ノ成績
四. 騒音並ニ實驗動物	第九章 總括及ビ結論
第四章 實驗ニ關スル音響學の理論	一. 第一實驗ノ總括
第五章 實驗裝置並ニ對照動物ニ關スル基礎 的測定ニ就テノ計算法	二. 第二實驗ノ總括
一. 序 言	三. 實驗成績全體トシテノ考察
二. 最小自乘法ニヨル最モ確ラシイ 直線ノ求メ方	結 論
三. 隔壁Ⅱニ於テ既ニ耳殼反射ノ消失ス ル場合	文獻一覽表
第六章 實驗裝置ニ關スル基礎的測定	附 圖 說 明
	挿圖 3. 表 5. 表 A-F
	附圖 1 寫真圖等 3. 2 描寫曲線圖 38.

第 一 章

緒

音階ニ就テ之ヲ數理的ニ取扱ツタ歴史ハ相當
ニ古イモノデ既ニ紀元前ニ彼ノ Pythagoras ガ
研究シテ居タト謂ハレテ居ル。
近世自然科學ノ一分野トシテ音響學ガ派生シタ

論

ノハ、17世紀ノ初メニ佛蘭西ノ Mersenne ガ弦
振動ノ法則或ハ和聲等ノ原理ニ就テ研究シタノ
ニ始マリ。其後多クノ研究ガ諸學者ニヨリ行ハ
レタガ、1863年ニ獨逸ノ碩學 Helmholtz²⁾ガ

有名ナル音響感覺論ヲ發表スル頃カラ其絢爛ヲ誇ルニ至ツタ。

彼ノ研究ハ其獨自ノ繊鋭ナル數學的理論ニヨリ特色ヲ示シテ居ルガ、要スルニ徹頭徹尾理論ニ終始シテ居ルノ觀ガアル。

更ニ主觀的現象方面ノ分野ニ所謂音響心理學ナルモノガ出現スルニ至ツタガ、此心理學的音響學ト言フ體系ニトツテハ實ニ Helmholtz ノ音響感覺論ガ其本源デアルト言ヘル。

1883ニ至リ Stumpf ガ「音響心理學」ノ第1巻ヲ著ハシテヨリ。其後多クノ研究ガ此方面ニ深メラレテ行ツタ。

然シ聴覺生理ノ問題ニハ Helmholtz ノ後ニ刮目スベキ研究モ見當ラナイガ、近時眞空管ノ發達ニツレテ、之ガ應用ニヨリ所謂電氣音響學ガ開拓セラレルト共ニ、最小可聴界限ノ測定ニツイテモ米國アタリニ新シイ研究ガ現ハレテ來タノデアル。

又近頃新シク稱ヘラレルニ至ツタ問題ニハ音ノ物理的ノ強サニ對數的關係ヲ有スル量トシテノ感覺ノ「レベル」Sensation level ガアル。

感覺ノ「レベル」トハ或音波ノ壓力振幅ヲ辨別界限ニ迄低下セシメルニ要スル單位數デアルガ之ニハ Kingsbury⁽⁶⁾ノ詳細ナ實驗的研究ガアル。又複合音ノ場合ニ於ケル物理的強サト感覺上ノ強サノ關係ハ一層複雑視サレテ居リ米國ノ Steinberg 說ト獨逸ノ Barkhausen⁽⁷⁾學派トガ對立シテ居ル。

Steinberg⁽⁶⁾ニヨルト複雑ナル音ノ大サハ感覺ノ「レベル」ト音波壓力ノ「スペクトルム」ニ依ルト言フノデアツテ、頗ル複雑ナ函數ヲ假定シテ居ル。

之ニ對シテ Barkhausen ハ正弦波形ヲ示サナ

イ複雑ナ音ノ強サノ感覺ハ、其中ニ含マレテ居ル最も強イ感覺ヲ與フル部分音ノ感覺ニ等シイト言フノデアル。

此理論ハ Helmholtz 說ニ一致スルモノデ甚ダ興味深イモノガアル。而シテ又余ノ研究ノ對象タル騒音聴器障礙問題ニモ密接ナ關係ヲ有スルモノデアル。

扱テ聴覺感受ヲ客觀的ニ表現シ得ルナラバ聴器機能ノ本態ニモ觸レル事が出來テ眞ニ意義アル觀察ガ豫想サレルノデアルガ凡ソ困難ナ事柄デアラウ。

昔カラ音響ニヨリ惹起サレル動物ノ反應的舉措動作ニ就テハ既ニ多クノ人々が注意シテ居ルガ、Esser, Preyer⁽⁷⁾, Högyes, Marx⁽⁸⁾, 星野⁽⁹⁾, 颯田⁽¹⁰⁾, 齋藤⁽¹¹⁾其他ニヨリ詳細ニ論ゼラレテ居ル音響性耳殻反射所謂ブライエル氏反應ハ音響ニヨル耳殻ノ反射性律動的攣縮ノ謂ヒデアリ。人類ニ於テハ只ダ稀ニ觀察サレルノミデアル。此運動ノ定型のナルモノハ海猿ニ見ラレルモノデアリ。耳殻尖端、前耳論ヲ下方ニ、耳朶、對耳珠部ヲ上方ニ牽引シテ外聽道ヲ閉塞スル如キ態度ヲトル防禦反射トモ看做サレルモノデアル。

余ハ實驗動物海猿ニ於テ之ニ持續性騒音刺激ヲ與ヘ其障礙ヲ聴器機能の立場カラ客觀的ニ表現シタモノニ就テ觀察シ、聴能ノ消長ヲ窺ヒ、又持續的ニ作用セシメタ騒音ノ主要部分音ト障礙ノ結果ガ如何ニ音高ノ特殊性ヲ呈シテ來ルモノデアルカ等ニ亘ツテ知見ヲ得ヨウト欲シ、茲ニ實驗ヲ試ミタ。

此様ナ實驗ニハ描寫裝置ヲ介シテ客觀的ニ觀察スルノガ最も其對象ノ消長ヲ明瞭ニスル所以デアアル。

幸ヒ海獺ノ音響性耳殻反射運動ヲ「キモグラフィオン」ノ上ニ投射スルコトガ可能デ之ニ關シテハ最近多クノ研究ガ行ハレテ居ル。

余ハ從來ト方面ヲ變ヘ。些カ新シサヲ裝置ト測定法ニ見出スヲ得タノデ之ヲ基礎ニ騒音聴器障礙實驗ニ使用シタ動物ノブライエル氏耳殻反射運動ヲ描寫シタノデアル。

即チ獨自ノ防音裝置ノ下ニ標準音源ヲ發音セシメテ。之ヲ吸音物質ノ量ニヨツテ系統ヅケタ隔壁ヲ透過スルコトニヨリ順次音ノ減衰ヲ生ゼシメ。検査動物ノ耳殻反射ノ最小刺激値ニ相當スル音ノ強サヲ假ニ吸音物質ノ量デ表ハシ。更ニ之ヲ正常動物ノ夫レトノ間ニ對數感度ノ比ヲトルコトニシ。即チ音ノ強サノ比ヲ「デシベル」ニシテ觀察ニ便ナラシメタノデアル。

此數値ノ計測ヲ以テ。當該動物ノ聽覺ノ消長ヲ窺フ手懸リトナシタノデアツテ若シ之ガ理想ニ近イモノデアレバ斯カル方法ハ單ニ音響實驗ノミナラズ弘ク應用サレ得ルモノト思フ。

而シテ最小刺激値ニ相當スル音ノ強サニ減衰スル場合ノ吸音物質カラ「デシベル」ヲ導クニハ。吸音物質單位量ノ減衰度ヲ定メル必要ガ生ズルノデ。之ニハ標準音源ノ減衰狀態ヲ「コンデンサー、マイクロフォン」デ受ケ高周波用「オッシログラフ」ニヨツテ撮影シタモノニ就テ測定シタノデアル。

第二章

ブライエル氏耳殻反射運動ニ

關スル文獻ノ概要

Preyer⁽⁷⁾ハ其著 „Die Seele des Kindes”ニ於テ生後未ダ12時間ヲ出デナイ海獺ニ於テモ振動數1000以上ノ高音ニ應ジテ明カニ耳殻

ノ活潑ナ運動ヲ認メタト記載シテ居ル。

次ニ聴器ノ障礙ト言フ方面カラ此反應ニ注目シタ耳科學者ニMarx⁽⁸⁾ガアリ。彼ハ實驗的聴器障礙ナル論文中ニ適應刺激ニ因ル障礙ヲ加ヘテ居ルノデアル。

即チベツォルド、エーデルマン連續音又中ノ笛 a^4 , a^3 , a^2 , e^2 等ヲ用ヒ海獺、白鼠ヲ實驗動物トシテ居ル。

實驗ハ之等ノ笛ヲ1日數回急速ニ斷續シテ吹笛シ約4週間續ケルノデアルガ。此實驗ハ白鼠デハ成功シナカッタ。

Marxハ斯様ニ述ベテ居ル。『若シ吾人ガヘルムホルツ說ニヨツテ。一定音ノ作用ニヨリ此音ニ知覺スル蝸牛殻ノ部分ガ變性スルト言フコトヲ認容シテ見ルト。此適應刺激ニヨル聴器障礙後ニ出現シタ變性ニヨリ實驗動物ハ此音ニ對シテノミ聲デナケレバナラス事ニナル。而シテ吾人ガ海獺ニ於テ音ヲ聽イタカ否カヲ可成リ確カニ認識スル目標ハブライエル氏反應ニヨツテ得レルノデ自分ハ常ニ此反射ヲ調べタ。』ト言ツテ居ルガ。ブライエル氏反應ニ就テノ詳シイ記述ハ何モ見當ラヌ。恐ラク其有無ヲ觀察スルニ止メタモノデアラウ。

ソシテ結論トシテブライエルノ耳殻反射ハ其後ニ現ハレタ變性ニ就テ見ルト。其變性ヲ惹起セシメタ音ニノミ限り消失スルト言フコトハナイト言ツテ居ル。

ツマリブライエル氏反應ニ於テハ。變性ニ與ツタ音ニ對スル選擇性ニ就テ否定シテ居ルノデアル。

彼ノ議論ノ適否ハ兎モ角此反應ヲ此機能的検査用ニ取扱ツタノハ慧眼デアツタト言ヘヨウ。

本耳殻反射運動ノ本態ニ就テハ既ニ星野⁽⁹⁾ノ系

統的研究ガアリ。音刺激ニヨリ惹起サレタ耳殻筋ノ攣縮運動ハ、反射性デアツテ其反射弓ハ蝸牛殻神經末梢ヨリ螺旋神經節ヲ經テ延髓ニ入り聽腹核及ヒ聽結節ニ達シ大部分ハ縫線ニ於テ交叉シナイ前ニ、刺激サレタ蝸牛殻側ノ上橄欖體ヲ介シテ同名側ノ顔面神經核ニ入り同名側ノ耳殻ニ至リ其1小部分ハ交叉シテ異名側ノ耳殻ニ走ルト言フ事實ヲ明ラカニシタ。

又颯田⁽¹⁰⁾ハ『音響刺激ニヨル耳殻反射運動ノ實驗的研究』ト題シテ本耳殻反射ノ反對時ノ測定ヲ試ミ或ハ該反射ノ不應期等ヲ究メ、更ニ刺激ノ強サト反射運動ノ大サトノ關係ニ就テハ次ノ如キ實驗ヲ行ツテ居ル。

刺激源トシテハ c^4 信號笛ヲ用ヒ、最強音ヲ發スル様ニ練習シタ上、音ノ強サヲ動物ト笛ノ間ノ距離ニヨツテ調節シテ作用セシメテ居ル。

而シテ其距離ヲ耳直前カラ1m宛隔テ6mニ至リ更ニ再ビ耳直前ニ復歸セシメタノデアル。

其結果音「エネルギー」ノ大小ニヨリ耳殻反射運動ノ大小ガ系統的ニ左右サレル詳細ヲ明ラカニシタ。

齋藤⁽⁹⁾モ獨自ノ描寫裝置ニヨリエーデルマン氏改良ガルトン⁽¹¹⁾笛ヲ用ヒ耳殻反射運動ノ反射時、振幅、出現スル音ノ範圍等ノ本質的研究並ニ各種條件下ニ於ケル本反射運動ノ態度ニ就テ研究シタ。

又最近吉田⁽¹²⁾ハ『持續性音響刺激ノブライエル氏耳殻反射運動ニ及ボス影響ニ就キテノ實驗的研究』ニ従事シ、カツテ Marx ガ聴器障礙ノ機能的關係ヲブ氏反射ヲ介シテ知ラウトシテ失敗シタノニ鑑ミ、略々颯田ト類似ノ實驗方法ニヨリ之ヲ實行シタガ、彼ハ一種ノ防音裝置ト見ラレ

ル天幕様被蓋物ノ中デ實驗シタト述べ、毎回水柱20cmノ壓力デ d^3-a^4 笛ヲ吹笛スルコトニシテ、實驗動物ハ音源カラ5cm、10cmト順次5cm宛遠ザケテ反射ノ消失スル所ヲ以テ最小刺激値トシタ。

次ニ彼ハ持續性音響刺激トシテエーデルマン⁽¹³⁾笛(c^4 , g^3 , f^4)ヲ使用シ、水道陰壓ニヨリ水柱7cmニ連續發音セシメ1時間毎ニ耳殻運動ノ最小刺激値ヲ前述ノヤウニ反射消失ノ距離ヲ以テ表ハシ、之ヲ測定シタ結果正常時トノ最小刺激値ヲ百分比デ比較シテ居ル。

而シテ結論シテ、『ブライエル氏耳殻反射運動ハ著者ノ行ヘル實驗範圍ニ於テハ d^3-a^4 音ノ質的差異ニ對シテ特殊ノ變化ヲ示サズ。

ブライエル氏耳殻反射運動ハ音響ノ量的差異ニ對シテハ音響ノ強サト並行シテ其振幅ヲ變化ス。』ト述ベテ居ル。

尙ホ、『持續性音響刺激ニヨリテ耳殻反射運動ノ音響ニ對スル興奮性ハ低下ヲ來シ、持續性音響ノ作用スル時間ノ増大ト共ニ其低下甚シク、且ツ持續性音響トシテ用ヒタル音響ニ對スル耳殻反射運動ハ實驗ニ供シタル範圍内ノ他ノ音響ニ對スルヨリモ稍々顯著ニ、其興奮性ヲ低下スルモノナルガ如シ。

尙ホ持續性音響刺激5時間以上ニ及ブ時ハ持續性ニ作用シタル一定音ニ對スル反射運動興奮性モ亦實驗ニ供セル範圍内ノ他ノ音響ニ對スルモノモ平等ニ反射興奮性ノ低下ヲ示ス。』トモ言ツテ居ル。

彼ノ持續性音響ト言フノハ最長6時間ヲ以テ限度トシテ居ルモノデアル。

尙ホ最近城所⁽⁴⁾ハ同ジク『笛聲ニヨルブライエル氏耳殻反射運動ノ實驗的研究』ト言フ論文ヲ

發表シテ居ルガ、之ハ比較的精密ナ方法デ刺激ノ強サト反射時トノ關係等ニツキ實驗シタモノデアル。

第三章

實驗方法

一. 序 言

既ニ歴史ノ章下ニ於テ詳述シタ様ニ諸家ガ此種ノ實驗ニ使用シタ裝置ハ大同小異デアリ。音源トシテ概ネ笛音ヲ撰ビ之ヲ一定位置ニ保タシメタル實驗動物海狸ニ作用セシメ其際惹起セル音響性耳殻反射運動ヲ耳殻ト連結シタ書楨ヲ介シテ煙烟紙上ニ描寫セシメ。此曲線ニ就テ多ク觀察シテ居ルノデアル。即チ各種ノ海狸聽器ニ影響ヲ及ボス如キ實驗ノ前後ニ本運動ヲ描寫セシメテ其等曲線ノ間ノ振幅ヲ對比スル法即チ對照値ノ百分比ヲ指數トシテ表ハシ又一定距離宛音源ヨリ動物ヲ遠ザケテ音刺激ノ減衰ヲ圖リ反射運動ノ消失スル個所ヲ定メル方法等ガ行ハレテ居ル。然ルニ音源ト耳殻トノ間ノ距離ヲ系統的ニ順テ逐テ變更シナガラ音「エネルギー」ノ漸減ヲ企圖スルノハ、音響「エネルギー」ガ音源ヨリノ距離ノ自乗ニ逆比例スルト言フ音響學ノ理論カラ出タモノデアルコトハ言フ迄モナイガ、此關係ガ任意ノ室内デ比較的短距離例ヘバ5cm位ノ差異ノ間デ必ずシモ成立スルトハ考ヘンクイ。如何トナレバ室内ノ模様ニヨリ窓或ハ家具等ガ反響、殘響或ハ吸收等ニ關スル複雑ナ影響ヲ齎スデアラウコトハ最も考ヘ得ベキ事柄デアルカラデアル。

例ヘバ反響ニ就テ見タモ之ガ最も甚シイ場合ニハ所謂死點(焦點)ヲ現出スルモノデアリ。倫敦「セントポール」寺院ノ丸天井下ノ廻廊ニ於ケル特殊ノ現象等有名デアル。

故ニ任意ノ室内ニ於テ距離ノ差ハ嚴密ナル音「エネルギー」ノ夫レニ伴フ規則的増減ヲ音響ニ與ヘルトハ限ラヌ。遠隔デアリ乍ラ却テ強ク聽覺ニ映ズル場合モアリ得ルノデアル。先ヅ此方法ハ満足スベキモノデハナイト言ヘル。

余ノ行ツタ音響性耳殻反射運動描寫實驗カラ求メタ曲線ヲ如何ニ取扱ヒ之ニ新シイ方法ヲ用ヒタカニ就テ述ベルニ先立チ其實驗方法ヲ概括的ニ説明ショウ。

ツマリ音ニ對シテ吸音物質例ヘバ、「フェルト」、毛布、「セロティックス」ノ類ガ存在スルト之ヲ通過スル音響「エネルギー」ハ其幾何%カヲ吸收サレル爲メ減衰スル現象ガアル。

吸音物質ト音減衰ノ間ニハ稍々複雑ナ對數的ノ關係ガアルコトガ知ラレキル。

即チ之等ノ關係ヲ考慮ニ入レテ音響性耳殻反射運動描寫曲線ノ振幅ノ變異ヲ刺激音源ノ音吸收ニヨル系統的減衰ニ求メテ其振幅低減ノ曲線ヲ「グラフ」ノ上ニ再現セシメタノデアル。

騒音ニヨル聽器障礙實驗動物ノブライエル氏耳殻反射運動ヲ描寫スルニ當ツテ余ハ2種類ノ實驗ヲ行ツタ。

先ヅ聽能ノ消長ナ量ノ方面カラ類推シヨウトスル第1實驗ニ於テハ笛音⁴ヲ一律的ノ標準音トシタ。此音高ハ海狸ノ聽覺刺激ニ適當デアリ又聽器障礙ニ用ヒタ騒音ノ主要部分音ガ此音ノ含メル4打「オクターブ」中ニ分布スル處ヲモ考慮シタ結果デアル。(第1編第6章)。

次ニ吸音物質トシテノ試料ニ良質ノ「フェルト」ヲ使用シタノデアルガ、一定壓ノ下ニ吹笛サレタ⁴音ハ「フェルト」ノ色々ナ厚サノ層ヲ形成スル數種ノ隔壁デ透過サレルコトニヨリ音「エネルギー」ハ系統的ニ減衰サレツ、發音サレル譯デアル。

而シテ此際惹起シタ海狸ノ音響性耳殻反射運動ノ垂直成分ヲ一定裝置ヲ以テ擴大描寫スルノデアル。

「グラフ」ノ上デハ横軸ニ透過セシメタ「フェルト」ノ量、即チ一定單位量ノ枚數ヲ表ハシ、縦軸ニ描寫曲線振幅ヲトレバ次ノ様ナ關係ヲ生ズル。

刺激音ガ次第ニ微弱ニナルト換音スレバ音ヲ透過スル「フェルト」ノ枚數ヲ増加セシムレバ遂ニハ動物ハ音ニ對シテ耳殻反射運動ヲ示サナクナルノハ當然デアル。而シテ其場合ヲ耳殻反射ノ最少刺激値ノ個所トスル。此横軸上ノ數値ヲ假ニ q トシヨウ。

以下本編ニ現ハレル q ナル記號ハ常に此最小刺激値ノ透過枚數ト云フ概念ヲ以テ使用セラレルモノデアアルコトヲ附記スル。

先ヅ騒音障礙ヲ受ケタ動物ノ對シテ實驗ヲ行フニ先立チ正常ナ動物ヲ12頭撰ビ之等ニ就テ精密ナル豫備實驗ヲ施行シテ今述ベタ處ノ q ノ正常平均値ヲ求メタノデアル。

此 q ヲ求メルニ當ツテハ最小自乘法ヲ應用シテ正確

時期シタ。

而シテ正常ナル動物ノ示ス耳殻反射ノ最小刺激値ノ音「エネルギー」ト病的動物ノ示ス夫レトノ比ヲ設定スルコトハ、之等兩方ノ實驗動物ノ音響性耳殻反射運動描寫曲線ヨリ得タ Q ノ値ノ決定ニヨツテ容易ニ可能ナル。

然モ此比ヲ近時盛ニ稱ヘラレル音ノ新シイ單位「デシベル」ニ誘導スル爲メニ之ニ附隨スル實驗裝置ノ音響學の測定ヲモ併セ行ツテ立脚點ヲ求メタノデアル。斯クスレバ各實驗動物ノ耳殻反射ヲ惹起スル最小刺激値ノ音ノ度合ヲ「デシベル」單位式ニ一種ノ對數感度ヲ以テ表現シ得ル譯デアル。

次ニ第2實驗トシテ試ミタモノハ、騒音ニヨル聴器障礙ヲ受ケタ實驗動物ニ於ケル機能の障礙ヲ音ノ質の方面カラ觀察スベキ目的デ行ハレタノデアリ。即チ持續的ニ使用シタ騒音ヲ「オッシログラフ」ニヨリ撮影シ、此波形ヲ分析シタ結果明カニシ得タ處ノ主要部分音ヲ根底トシ、夫等ヲ刺激音トシテ作用セシメ此場合惹起サレル耳殻反射運動ノ態度ヲ究メヨウトスルモノデアル。

二. 實驗裝置

實驗裝置ノ構成ハ略々寫眞(附圖 Abb. 1)ニ示ス如キモノデアル。先ヅ音源ハエーデルマン氏笛(a^3-a^4)ヲ使用シ、第1實驗ノ音吸收ニヨル減衰ニ關シテハ專ラ此中ノ c^4 音ヲ標準音トシテ用ヒ、第2實驗ニハ $a^3, h^3, c^4, d^4, e^4, f^4, g^4, a^4$ ノ8音ヲ選ビ此順序ニ從ツテ $a^3 \rightarrow a^4$ 並ニ $a^4 \rightarrow a^3$ ト2回繰返ス方法ヲトツタ。

從來ノ諸實驗デハ多ク音源ハ室内ニ於テ開放シタ儘發音セラレテ居ルガ、之ニハ色々ノ缺陷ヲ伴フノデ余ハ完全ナル防音裝置ヲ施セル箱ヲ製シ、此箱ニ取付ケタ窓カラ音ハ外側ノ位置ニアル動物ノ外聽道ニ到達スル様ニ設計シタノデアル。

此防音箱ハ其大サ $34 \times 20 \times 17$ cmデアリ、素材ハ木製デアル。内部ニハ數cmノ間隔ヲ有スル二重壁トシテ夫等ノ間ニハ防音材料トシテ有力ナ「カボック」ヲ適宜量ニ充填シタノデアル。附圖(Abb. 2)。

而シテ壁面ハ孰レモ良質ノ「フェルト」ヲ以テ完全ニ被覆シタノデ防音設備トシテハ先ヅ申分ナイ。

又蓋ハ2段ニ拵エ、内壁ト緊密ニ接合スル様ニナツテキル。其面ハ矢張り同様に「フェルト」デ覆ハレテキル。

此箱ノ側面ニハ大サ 7.5×12 cmノ窓ガ設ケラレテ居リ縁ハ溝ヲ具ヘテ之ニ各種ノ厚サノ「フェルト」ヲ張ツタ隔壁ガ任意ニ挿シ換ヘルコトガ出來ルヤウニコシラエテアル。

故ニ此箱ハ小規模ナ Dead roomノ資格ヲ持ツテ居ルモノデアル。

箱ノ内部ノ底面ニハ笛ヲ置ク臺架ガアリ、笛ニ送ル空氣ハ「ゴム」管ヲ介シ之ハ箱ノ側面ノ小孔ヨリ導カレテ連絡ヲ保ツ。

送氣ハ主トシテ二連球ニヨリ、「ブリキ」製ノ空罐ヲ加工シテ、「タンク」ヲ製シテ之ニ貯藏シ、此間ニハ水銀壓力計ヲ連絡シ實驗中ハ絶エズ同一壓(水銀柱4cm)ニ保持セシメル。

送氣ニ二連球ヲ用フル時ハ何等其操作ニ副雜音ヲ生ゼズ都合宜シイ。

此送氣系統ハ途中「クレンメ」デ遮斷サレ使用時ニハ瞬時開放サレヌ彈條ヲ閉鎖スル。

防音箱ニオサメタ音源ノ音「エネルギー」ノ減衰ニ就テハ新シイ試ミヲ示シタガ、之ハ吸音物質ニヨル音吸收現象ニヨツタモノデアル。

「フェルト」ハ吸音物質トシテ最も有力ナルモノデアルコトハ建築音響學方面デ弘ク知ラレテキル事實デアル。

實驗ニ使用シタ「フェルト」ハ 7×11 cmノ廣サデ1枚ノ厚サ約3mm、ソノ重量ハ45gノ純良ナル品質ノ材料ヲ木製ノ枠ニ張付ケタモノヲ防音箱ノ窓ニ挿シ込メル裝置ニシタ。

此窓ニハⅠヨリⅥニ至ル6種類ノ隔壁ヲ區別シテ實驗ニ供シタ。即チ開放窓ハⅠ、「フェルト」1枚ノ厚サノ隔壁ハⅡ、3枚用ヒタモノハⅢ、5枚重ネタ隔壁ハⅣ、6枚ハⅤ、7枚ハⅥト順次番號ヲ附シテ用意シタ。

此6種類ノ隔壁ヲ通シテ發音サレル笛音ハ四圍ノ狀況ニ依リ左右サレルコトナク常に同一條件下ニ夫々定位置ノ動物聴器ニ作用スルコトガ出來ルノデアル。

第1、第2兩實驗ハ其1回ノ完了ニ夫々12分カラ15分ヲ要スル。

動物ノ固定ハ緊縛ニ依ツテハ良結果ハ望マレナイ。故ニ於テ海猿ヲ自然ノ位置ニ固定スル器具ノ必要ヲ生ジ、余ハ家兎固定器ニ類似シタ長型ノ蕐鉸狀金屬筒ニ支柱ヲ取付ケ、之ニ3ツノ關節ト螺旋ニ依リアラ

ユル方向ニ可動性ノY字型板ヲ保持セシメ動物ノ肩胛部ヲ輕ク抑ヘル装置ヲ作製セシメテ之ヲ用ヒタ。本海癭固定器ハ傾斜ヲ有スル臺ノ上ニ置ケバ迴轉性後眼震検査時ニモ併用スルコトガ出來ル。

書板ハ、「アルミニウム」薄板デ製シ軸受支柱ニ保タシメ輕キ「スプリング」ヲ以テ支ヘ。途中ノ一點ヲ動物ノ右耳殻ノ一定把持點ヲツカム心臓懸垂鈎ト纖細ナル絹絲ヲ以テ連結セシメ中間ニ金屬環ヲ經由セシメ運動作用ノ方向ヲ一定ナラシメタ。

動物ノ體位ハ音ガ右耳ノ外聽道ニ直入スル如キ位置ヲ求メ此處ニ一定スル。

隔壁ヲ用ヒテ居ルノデ吹笛時ノ空氣ノ動搖等ハ考慮スル必要ハナイ。

動物ノ耳殻ノ把持點ハ前耳輪ノ折返シノ盡キル點ヲ撰ビ一定セシメタ。此部分ハ最も耳殻運動著明デアリ且ツ耳殻ノ解剖學的見地ヨリシテモ目標トシテ簡單明瞭デアル。

明瞭ナ一點ヲ決定シ之ヨリ得タ垂直成分ノ振幅ヲ數回宛記録シタモノノ測定平均值ニ就テ論ズルコトニ眼目ヲ置イタノデアル。「キモグラフィオン」ハ油槽式ノモノヲ使用シ迴轉時ハ全然雜音ヲ伴ハス。

三、實驗施行ノ順序

(1) 第1實驗。

先づ隔壁Ⅰヨリ始メルノデ之ハ開放窓デアル。發音スレバ動物ハ耳殻ヲ攀縮セシメ描寫裝置ノ上ニ1ツノ「ツァッケ」ガ記サレル。

夫レヨリ10秒ヲ隔テテ同様ニ笛音ヲ發スルト微速度迴轉中ノ「キモグラフィオン」ノ煤煙紙ノ上ニ相隣ツテ基底線下ニ又「ツァッケ」ガ加ハル。更ニ10秒ヲ經テ又刺戟シ。カクスルコトヲ都合5回繰返シ。其後ニ30秒間ハ休止シコノ間ニ隔壁ヲⅡニ換ヘル。

音ノ強度ハコ、デ稍ク弱メラレルノデ30秒ノ休止後ニ發音セシメタ場合ノ攀縮高ハ一般ニ前回ノⅠニ於ケルヨリ稍ク減ズルノガ通常デアル。

發音ノ間程ハ同様10秒デ5回記録スル。

次デ隔壁ヲⅢニ換ヘ30秒ノ休止後ニ又5回刺戟スル。斯クシテ次々ニ隔壁ヲⅣ→Ⅴ→Ⅵト順ヲ逐フテ換ヘテ行キ音響強度ヲ減衰セシメタ場合ノ曲線ヲ求メル。

此間ニハ隔壁Ⅵニ至ラズシテ既ニ反應ヲ示サナクナル動物モ勿論存在スル譯デアル。

就中聴器ノ障礙ヲ受ケテキル動物デハ最初ノ2—3

ノ隔壁デ最早ヤ耳殻反射運動ノ消失ヲ來スモノガ多い。

扱テⅥニ達シタナラバ逆ニ前回ト全ク同様ノ間程ト休止ヲ置キツツ、Ⅴ→Ⅳ→Ⅲ→Ⅱ→Ⅰト舊ニ復セシメテ1回ノ實驗ヲ終了スル。

實驗ノ結果耳殻反射運動描寫曲線振幅ヲ實測スル場合ニハ此減衰並ニ增強ノ前後2回ノ實驗成績(附表中前者ハ[A], 後者ハ[B])トシテ掲ゲ)デ1ツノ隔壁ニ就テハ5回宛前後都合10回ノ振幅測定値ヲ得テ之ヲ平均スルコトニナルノデアル。

此平均振幅ノ數值ヲ基礎トシテ當該實驗動物ノ音響性耳殻反射運動ノ最小刺戟値ノ音減衰「フェルト」量ヲ決定スベキ曲線ノ「グラフ」ヲ引クノデアルガ此詳細ナル事項ハ第5章ニ於テ述ベル。

(2) 第2實驗。

刺戟標準音トシテハ a^3 , h^3 , c^4 , d^4 , e^4 , f^4 , g^4 , a^4 ノ8音ヲ以テシ吹笛氣壓ハ終始一定ニ保チ。隔壁ハⅠニ一定シテ實驗スル。

此場合ニ於テモ同様ニ各音イヅレモ10秒ノ間程ヲ隔テ、5回宛 $a^3 \rightarrow a^4$ ト振動數ヲ増ス方向ヘト、 $a^4 \rightarrow a^3$ ノ如ク其逆ノ方向ヘト2回宛行フノデ矢張り1音ニ就テ10回宛検査シテ其平均値ヲ求メルコトニナル。各音ヲ變更スル場合ハ同様30秒ノ休止ヲ置ク。其等各音10回ノ振幅平均値ハ附表ニ掲ゲ又觀察ニ便ナラシムル爲メ實長ノ「グラフ」ニ表ハシテ見タ。

四、騒音並ニ實驗動物

本編ニ於テ述ベル處ノ實驗ニ使用シタ海癭ハ對照動物以外ハ孰レモ持續的騒音裡ニ夫々一定期間曝露セシメタモノデアル。

之ニ使用シタ騒音音源、或ハ實驗動物ニ關シテノ詳細ハ既ニ前編ニ於テ述べ又第3編ニ於テ記載スル處モアルノデ本編デハ省略スル。〔要目表第3編ニアリ〕。

第四章

實驗ニ關スル音響學の理論

都市騒音問題ト關聯シテ建築音響學上デ重要ナノハ音響遮斷デアリ大建築物内カラ外氣ニ直接傳播サレル音響ニ就テモ最近ニ於テハ考慮セラレ。ヨリ細イ通風管ニヨリ或ハ通風口ニ吸音物質ヨリナル帽子ヲ用フル等ガ試ミラレテ居

ル。又氣流ノ通路ヲ延長スル爲メニ屈曲シタ内
壁ニ吸音材料ヲ張りヨク目的ヲ達スル消音裝置
サヘ考案セラレテ居ル。

更ニ音傳播徑路ニ壁、床等ノ隔壁ヲ通ジテ波及
スルモノガアル。

或ル試料ニ對スル音響透過ノ測定ニハ大規模ノ
設備ヲ要シ之等實驗ヲ嚴密ニ實行シテ居ル研究
所ハ乏シク獨逸ノハインリッヒ・ヘルツ實驗所、
米國ノセイビン音響研究所等ノ數個所ガアル。

又隔壁ノ音響絶縁度ニ關シテモ多クノ音響學者
ハ夫々異ツタ形式ヲ主張シ未ダ一致ヲ見ナイ。
今音響學ノ原理ニ就テミレバ、音ノ強サハ、振
幅ノ自乗、媒質ノ密度及ビ音ノ速度ニ比例スル
ト言フコトが出来ルノデアル。

余ノ實驗裝置ニ於テ防音箱中ニ笛ヲ發音セシメ
タ場合6種ノ音響減衰ノ比較ヲ次ノ如ク行ツ
タ。即チ、「コンデンサーマイクロフォン」ト「オッ
シログラフ」ヲ應用シテ ϕ^4 音ノ減衰狀態ヲ撮影
シタ。(詳細ハ後章ニ述ブ)。

扱テ一般ニ音吸收ノ存スル場合ニ音波ガ進行ス
レバ音「エネルギー」ノ減衰ニ次ノ關係ガアル。

$$\begin{aligned} I_1 &= e^{-\lambda a} I_0 \\ I_2 &= e^{-2\lambda a} I_0 \\ I_3 &= e^{-3\lambda a} I_0 \\ &\vdots \\ \text{一般ニハ } I_n &= e^{-n\lambda a} I_0 \\ &= (e^{\lambda a})^{-n} I_0 \quad \text{ト表ハサレル。} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \lambda \dots \text{減衰常数} \\ a \dots \text{吸音物質ノ} \\ \quad \text{1枚ノ厚サ} \\ I_0 \dots \text{音ノ最初ノ} \\ \quad \text{強サ} \end{array} \right\}$$

之吸音物質質量ニ伴フ音減衰ノ關係デアル。

茲ニ於テ假ニ $e^{\lambda a} = y$ ト置ケバ上ノ式ハ次ノ如
ク書キ改メラレル。

$$I_n = y^{-n} I_0$$

此關係ヲ或基準音「エネルギー」ヲ減衰セシメツ
ツ或個體ニ作用セシメル場合ニ應用シテ、今茲
ニ正常ナ聴覺ヲ有スルト想像セラレル個體ニ於

ケル音響性耳殻反射運動ノ最小刺激値ヲ示スニ
至ル基準音「エネルギー」ノ減衰狀態ヲ其場合ニ
該音ヲ透過セシメタ吸音物質「フェルト」ノ量 q_n
ニ關シテ表現スルト。

最小刺激値音響強度: $I_{\text{norm}} = I_0 y^{-q_n} (1)$ トナル
コトハ明白デアル(I_0 ハ基準音ノ強サ)。

次ニ其他ノ病的ノモノヲ含ム場合ノ音響性耳殻
反射ノ最小刺激値ノ場合ノ吸音物質透過枚數ヲ
 q デ表ハセバ其時ノ

最小刺激値音響強度: $I = I_0 y^{-q} (2)$ デアル。

而シテ一般ノ場合ノ音響性耳殻反射ノ生ズル最
小刺激値ノ音響強度ト正常ナル個體ノ夫レトノ
比ヲ設ケルト次ノ如キモノデ、之ハ聴器障礙ニ
ヨツテ反射ノ刺激閾が増加シタ場合ノ障礙度ト
モ謂フベキモノデアラウ。

假ニ此比ヲ D デ表ハセバ

$$D = \frac{I}{I_{\text{norm}}} = \frac{I_0 y^{-q}}{I_0 y^{-q_n}} = y^{q - q_n} \quad (3) \quad \text{ト言フ式ヲ得ルノデアル。}$$

次ニ之ヲ decibel 單位ニ誘導スルニハ如何スレ
バヨイカト言ヘバ、今此處ニ i_0 ナル強サノ音
ガアリ、之ニ對シテ i ナル強サノ音ヲ表現スル
ノニ $\alpha = \log_{10} \frac{i}{i_0}$ ナル式ヲ以テシテ之ニ bel ト
言フ名稱ヲ附シ實用上ニ於テハ更ニ此 bel ノ
 $\frac{1}{10}$ ヲ單位トシタモノガ用ヒラレ之ガ所謂 deci-
bel デアル。 $\alpha = 20 \log_{10} \frac{i}{i_0}$ decibel (4) Western
Electric 會社製ノ Audiometer ハ音ノ強サノ
代リニ壓力振幅ヲ以テ表ハンテ居ルカラ

$$i = kF^2 \quad (P \text{ハ壓力振幅}) \quad \text{トナリ、}$$

$$\alpha = 20 \log_{10} \frac{P}{P_0}$$

即チ此 P_0 ヲ耳ノ最小可聴界限、(Threshold of
audibility)ニ選シタモノガ Audiometer 式
decibel 單位デアル。(第1編 第5章參照)。
扱テ本論ニ戻リ先ニ述ベタ障礙度ノ比(D)ヲ更

= decibel ノ様ナ對數感度ニスルニハ(4)ノ關係カラ

$$D_{ab}=10 \log D \text{ トナルコトハ明カデ。 (3)}$$

$$=10 \log y \ q_n - q$$

$$=10(q_n - q) \log y. \text{ トナル。}$$

即チ障礙度ヲ對數感度デ表ハセバ。

$$D_{ab}=10(q_n - q) \log y.$$

(此 $\log y$ ハ音減衰ニ關スル常數デ符號 η デ表ハセバ)

$$=10\eta(q_n - q) \text{ トナル。 (5)}$$

q_n ハ豫メ正常ノ個體デ實驗シテ對照値トスレバ之又一種ノ常數デアル。

從ツテ D_{ab} ノ數値ハ當該實驗例ノ q ノ測定ニヨツテ容易ニ決定スルコトニナル。

換言スルニ一般ノ場合ノ障礙度ヲ對數感度デ表現スルニハ、 q ノ正常對照値、即チ音響性耳殼反射運動ヲ示ス處ノ最小刺激値ノ音ノ強度ニ迄減衰セシメル吸音物質ノ量カラ、當該實驗動物ノ其量ヲ差引イタモノニ常數 η ヲ乘ジ之ヲ10倍スレバヨイ譯デアル。

一般ニ正常聴覺ヲ有スル個體ハ聴覺障礙ヲ受ケタモノニ比シテヨリ多キ吸音物質ノ量デ透過セラレタ微々タル音「エネルギー」ニ對シテモ尙反應スルコトガ豫想サレルノデ。

$$\text{一般ニ } q_n > q$$

故ニ $q_n - q > 0$ ガ成立スルノデ D_{ab} ノ數値ハ普通(+)デ示サレ正常ハ0、之ニ近イモノ程0ニ近ヅキ、障礙ノ度ヲ増スニツレ q ハ0ニ近ヅキ D_{ab} ハ大トナル。

要スルニ音響性耳殼反射運動ノ消長ヲ斯カル合理的對數感度 D_{ab} デ觀察シヨウトスルモノデ本法ニヨル時ハ各個體間ノ耳殼反射運動ノ絕對ノ大サノ差異等ニ因リ何等ノ影響ヲ受ケナイ。

各個體ノ反應スル最小刺激値即チ刺激閾ノ動向ニ就テ普遍の數量デ比較スルコトガ出來ルノデアル。

第五章

實驗裝置並ニ對照動物ニ關スル

基礎的測定ニ就テノ計算法

一. 序 言

刺激音ニ對シテ反應スル動物ノ耳殼反射運動ノ大サヲ縱軸ニ、刺激音透過ノ吸音物質ノ量ヲ横軸ニツタ「グラフ」ニ於テ耳殼反射運動ノ最小刺激値ツマリ耳殼反射運動描寫曲線ノ振幅ノ減衰曲線ガ横軸ヲ切ル點ヲ決定スレバ之ガ q トナルノデアルガ此曲線ハ後章ニ於テ明示スル如ク甚ダ直線ニ近イモノデアル。

之ガ單ナル直線デ實際アレバ其儘延長シテ簡單ニ其目的ハ達セラレルガ直線ニ近クトモ曲線デアルカラ之ハ不可能デアル。

又目測デ行ヘナイコトモナイガ數量ヲ決定スル目的ニ向ツテ用フベキ方法デハナイ。

茲ニ於テ其操作稍々複雑ニナル嫌ヒナキニシモアラズデアルガ悉ク最小自乘法 (Methode der kleinsten Quadrate) ニ據ツタ。

此方法ニ依レバ曲線上ノ點ガ構成スル最モ確ラシイ直線ヲ求メルコトガ出來ル。從ツテ q ノ數量的ニ定メル上ニ最モ望マシイ方法デアル。余ハ此方法ヲ耳殼反射運動ノ減衰ノ場合ノミナラズ、吸音物質ノ減衰度測定ニ際シテモ應用シタノデ計算ノ運用上簡便ヲ期スルタメ余ノ目的ニ適シタ形ヲ具ヘタル一種ノ公式的ノ型式ヲ次ニ誘導シヨウト思フ。

二. 最小自乘法ニ依ル最モ確ラシイ

直線ノ求メ方

曲線上ノ點 (a, b) ガ此曲線ニ最モ近イト假定サレタ直線ノ方程式 $y = Ax + B$ (1) ヲ滿足スベキ爲メニハ

$$\begin{cases} b_1 = Aa_1 + B \\ b_2 = Aa_2 + B \\ b_3 = Aa_3 + B \\ \vdots \\ b_n = Aa_n + B \end{cases} \quad (2)$$

Fig. 1

ガ成立スベキデアル。

然ルニ此 n 個ノ方程式ヲ満足セシメル様ニ此 A, B ノ値ヲ決定スルノハ不可能デアル。

茲ニ v ナル任意ノ値ヲ考ヘ之ヲ喰違ヒトスレバ此値ヲ附加スルコトニヨツテ十分ニ上掲ノ (2) 式ハ満足サレル譯デアル。(Fig. 1 参照)。

故ニ之ヲ書キ直スト。

$$\begin{cases} b_1 = Aa_1 + B + v_1 \\ b_2 = Aa_2 + B + v_2 \\ b_3 = Aa_3 + B + v_3 \\ \vdots \\ b_n = Aa_n + B + v_n \end{cases} \quad \text{Observation equation} \quad (3)$$

其處デ此 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 等ノ總和 $\Sigma v^2 = \text{am'n}$ 。ニナル様ナ條件デ A, B ヲ決定スルノガ最小自乘法デア

ル。ツマリ此喰違ヒノ自乗デアル處ノ v^2 ノ總和ガ最小ニナル様ニスル場合ガ此直線ガ與ヘラレタ諸點ニ最モ近イモノニナル。

即チ A, B デ夫々微分シタモノガ零ニナル様ニトレバヨイ。

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial A} \Sigma v^2 = 0 \\ \frac{\partial}{\partial B} \Sigma v^2 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

ヲ満足スル様ニスレバヨイワケデアル。

(3) ノ式ヲ v ニ關シテ之ヲカリ易イ様ニ書キ直スト。

$$\begin{cases} v_1 = b_1 - Aa_1 - B \\ v_2 = b_2 - Aa_2 - B \\ v_3 = b_3 - Aa_3 - B \\ \vdots \\ v_n = b_n - Aa_n - B \end{cases} \quad (5)$$

之ヲ夫々自乗スルト。

$$\begin{cases} v_1^2 = (b_1 - Aa_1 - B)^2 \\ v_2^2 = (b_2 - Aa_2 - B)^2 \\ v_3^2 = (b_3 - Aa_3 - B)^2 \\ \vdots \\ v_n^2 = (b_n - Aa_n - B)^2 \end{cases} \quad (6)$$

微分ノ法則ニヨツテ $\frac{d}{dx} y^2 = 2y \frac{dy}{dx}$ デアルカラ $\frac{\partial}{\partial A} \Sigma v^2 = \Sigma 2v \frac{\partial v}{\partial A} = -2 \Sigma va = 0$ トスレバヨイ。次ニ B ノ場合ニハ。

$$\frac{\partial}{\partial B} \Sigma v^2 = -2 \Sigma v = 0 \quad \text{トナルノデ。}$$

即チ $\Sigma v = 0$

故ニ $\Sigma b - A \Sigma a - nB = 0$

又、 $\Sigma av = 0$

$$\Sigma ab - A \Sigma a^2 - B \Sigma a = 0$$

結局、

$$\begin{cases} A \Sigma a + nB = \Sigma b \\ A \Sigma a^2 + B \Sigma a = \Sigma ab \end{cases} \quad \text{Normalequation} \quad (7)$$

之ヨリ A, B ハ決定サレ得ル。

換言スレバ今迄ノ操作ハ Observationequation カラ Normalequation ヲツクリ、 A, B ヲ決定スレバヨイト言フコトニナル。

(7) カラ A, B ヲ夫々求メルト。

$$\begin{cases} A = \frac{\begin{vmatrix} \Sigma b & n \\ \Sigma ab & \Sigma a \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \Sigma a & n \\ \Sigma a^2 & \Sigma a \end{vmatrix}} = \frac{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} \\ B = \frac{\begin{vmatrix} \Sigma a & \Sigma b \\ \Sigma a^2 & \Sigma ab \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \Sigma a & n \\ \Sigma a^2 & \Sigma a \end{vmatrix}} = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} \end{cases} \quad (8)$$

以上デ此直線ハ求メラレタワケデアルガ。余ノ海狸ノ音響性耳殻反射運動描寫實驗ニ於テハ此 x 軸ニ吸音物質ノ數量、 y 軸ニ響縮曲線ノ振幅ヲトツテアル

ノデ、直線ガ x 軸ヲ切ル點ツマ $y=0$ ノ場合ノ
 x ガ q ナ示ス點トナル。 $x=q$

$$\text{故ニ} \begin{cases} x=q \\ y=0 \end{cases} \quad \text{トシテ(1)式ニ用フレバ、}$$

$$Aq+B=0 \quad \text{故ニ} \quad q=-\frac{B}{A} \quad (9)$$

此(9)ニ(8)ノ關係ヲ代入スレバ、

$$q=\frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a^2 \Sigma b - n \Sigma ab} \quad (10)$$

更ニ $x=0$ ト置ケバ此直線ガ y 軸ヲ切ル點ヲ決定スル事ガ出來ル。 $y=B$

$$Y=\frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} \quad (11)$$

即チ a, b ハ實驗ノ結果ノ實測値ヲ代入スレバヨイノ
デ、例ヘバ回數 (n ガ之ニ相當スル) ガ6デアレバ
 $n=6$ デアツテ、 a, b ガ夫々6種ノ數値デ與ヘラレ
ルノデ其等ヲ(10), (11)ノ兩公式ニ代入スレバ目的
ハ達セラレルノデアル。

以下ニ述ベル實例デハ此原理ニ據リ(10), (11)兩關
係式ヲ其儘表トシテ使用スル。

三. 隔壁ニ於テ既ニ耳殻反射ノ

消失スル場合

實驗中聴覺ヲ著シク侵サレルト隔壁Ⅲニ於テ耳殻
反射運動ハ消失スルコトモアル。斯カル場合ニハ
I, IIノ2回ノ坐標ヲ求メラレルニ過ギヌノデ此際
ニハ最小自乘法ノ必要ハナイ。2點ニ依リ直線ハ直
チニ決定スル。即チ此直線ガ x 軸ヲ切ル點ノ x ノ値
ガ q ニ相當スル。(Fig. 2)

即チ直線 $y=Ax+B$ ニ於テ次表カラ

$$\begin{pmatrix} x=0 \\ y=b_1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x=1 \\ y=b_2 \end{pmatrix} \quad \text{ガ既知デアルカラ}$$

隔壁 番號	x (既知) 「フ エル ト」枚數	y 耳殻反射 率 縮 高
I	0	b_1
II	1	b_2

$$\begin{cases} A=b_2-b_1 \\ B=b_1 \end{cases}$$

此直線ガ x 軸ヲ切ル點ハ $y=0$, $x=-\frac{B}{A}$ デアルカラ
之ニ A, B ノ値ヲ用ヒ $x=-\frac{b_1}{b_2-b_1}$ 之即チ q デア
ル。

Fig. 2

第六章

實驗裝置ニ關スル基礎的測定

音響性耳殻反射ヲ海狸ニ惹起セシメル刺戟音
源ハ教室所有ノベツォルド・エーデルマン氏連
續音又ノ1組中ニアル c^4 笛デアルガ。其物理的
強サノ比較ニ「オッシログラフ」ヲ應用シタ。

測定ニ使用セル裝置ハ總論ニ於テ騒音ノ分析ノ
章デ述ベタト同様ノ「コンデンサー・マイク
ロフォン」及ビ「オッシログラフ」デアル。

先ヅ實驗用防音箱ヲ「マイクrophon」ノ近傍ニ
置キ笛トノ間ノ距離ヲ實驗中ノ笛ト動物耳殻ト
ノ距離ト等シクスル。而シテ實驗中ト同一壓ノ
下ニ吹笛シ増幅裝置ヲ經テ高周波用「オッシ
ログラフ」ニ導キ音波ヲ撮影スル。即チ開放窓ノ
隔壁Iヨリ始メテII, III, ……VIニ至ル6回ノ
「オッシログラム」ヲトル。其減衰狀態ハ寫眞ノ
如ク次第ニ波形ノ振幅減少ニヨリ明カニ察知セ
ラレル。(附圖Abb. 3 参照)。

此振幅ヲ「オッシログラム」カラ夫々10個所ニ
於テ測定シ其平均値ヲトル。附表ニ示ス様ニ其
値ハIニ於テ最大デアリVIニ於テ最小デア
ル。夫等ノ數値ハ夫々自乗スルコトニヨリ音響「エ
ネルギー」ニ比例スル量トナルノデアル。

(Tadelle I).

Fig. 3

笛音「エネルギー」ノ減衰ト其對數ヲ表ハス曲線

Tabelle 1

隔壁番號	I	II	III	IV	V	VI
「フェルト」枚數	0	1	3	5	6	7
振	13.0	13.0	13.0	9.0	6.5	5.0
	16.0	15.5	13.5	8.5	7.5	5.5
	17.5	16.5	13.0	8.5	7.5	6.0
	17.5	16.5	12.0	7.0	7.5	6.0
	16.5	15.5	9.5	8.0	6.5	6.0
幅	13.0	13.0	11.5	8.5	7.0	5.5
	14.0	14.0	10.5	9.0	7.5	5.0
	17.5	16.5	10.5	8.5	6.5	5.5
	17.5	16.5	12.5	7.5	8.0	7.0
	17.0	16.5	13.5	7.0	7.0	6.5
* 平均	15.9	15.3	12.0	8.2	7.2	5.8

笛音「オッシログラム」ヨリ波形振幅ヲ
 測定セル數値 (mm)

振幅ノ自乗。其數値ノ對數。

隔壁番號	I	II	III	IV	V	VI
*〔振 幅〕 ²	252.81	234.09	144.00	67.24	51.84	33.64
其 對 數 $\log_{10}$	2.40280	2.36938	2.15836	1.82763	1.71466	1.52686

此値ヲ「グラフ」ニ於テ縦軸ニ表ハン。横軸ニ其
 場合ノ「フェルト」ノ枚數ヲトレバ圖ニ見ル様ナ
 減衰曲線ヲ得ル。(Fig 3)。

更ニ各數値ノ對數ヲ計算スルト前掲ノ表ニ示ス
 様ナモノニナリ「グラフ」ノ點線デ引イタモノガ
 夫レデアル。

此線カラ吸音物質ノ減衰度ヲ導ク譯デアルガ此
 儘デハ不確カナノデヲ前節ノ方法ニヨリ最モ
 近似ノ直線ニ補正スル必要ヲ生ズル。

即チ前ニ掲ゲタ公式ヲ用ヒテ次ニ計算スルコト
 ニスル(Tabelle 2)。此計算ニヨレバ校正サレ

タ直線ガx軸ヲ切ル點ハ $X=19.2$ デ。y 軸ヲ切
 ル點ハ $Y=2.48$ デアル。

Tabelle 2

坐標 隔壁	a	b	$a \times b$	a^2
I	0	2.40	0	0
II	1	2.37	2.37	1
III	3	2.16	6.48	9
IV	5	1.82	9.10	25
V	6	1.71	10.26	36
VI	7	1.53	10.71	49
Σ	$\Sigma a = 22$	$\Sigma b = 11.99$	$\Sigma ab = 38.92$	$\Sigma a^2 = 120$

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} \\ = \frac{120 \times 11.99 - 22 \times 38.92}{22 \times 11.99 - 6 \times 38.92} = 19.25 \\ Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} \\ = \frac{22 \times 38.92 - 120 \times 11.99}{22^2 - 6 \times 120} = 2.47 \\ \eta = \frac{Y}{X} = \frac{2.47}{19.26} = 0.13$$

因ツテ「フェルト」1枚ニヨル減衰度 η ハ此場合ノ $\frac{Y}{X}$ デ表ハサレル理由ハ x 軸ガ吸音物質「フェルト」ノ量ヲ示スモノデアル所以ヨリシテ明カデアル。

茲ニ算出セラレタ η ノ値0.13ヲ今後實際ニ應用スルコトニナルノデアル。

第七 章

對照動物ニヨル基礎的測定

序 言

茲ニ海猿ノ音響性耳殻反射運動ガ音「エネルギー」ト平行ニ其態度ヲ示スモノデアルコトハ既ニ諸家ニヨツテ明ラカニサレタ處デアリ。其間ニ認メラレル數學的關係ヲ颯田ハ述ベテ居ル。音吸收ノ存スル場合ニ音「エネルギー」ガ對數的ニ變化スル事ハ既述ノ如クデアルガ此方法ニヨツテ減衰シテ行ク音ノ系列デ海猿ヲ刺戟スル場合ニ音響性耳殻反射運動ノ減衰シ方ニモ何等カ略々一定ノ法則ガアリハシナイカト豫想サレルノデアル。

之ハ吾人ノ聴覺ニ感ズル音ノ大サハ音ノ或ル範圍ニ於テハ音ノ壓力、振動ノ速度或ハ「エネルギー」等ニハ比例セズ寧ロ其對數ニ比例スルコトニ於テカノウェーバー、フェヒナー法則ガ成立スルヲ思ヘバ一層此印象ハ深イ。

扱テ新シイ見地カラノ實驗方法ヲ正常ナ動物ニ

先ヅ實施スルノハ此様ナ一般の通則ヲ知ル上ニモ意味ガアリ又病的動物ノ障礙度ヲ表ハス上ニモ缺クコトノ出來ナイ要素デアルカラ。豫メ精密ナ検査ヲ了シタ健康ナル海猿10數頭ニ就テ實驗ヲ行ツタノデアル。

本編ニ述ベル實驗ハ第1、第2ノ兩實驗カラ成立シテ居ルノデ基礎的測定モ夫等ニ應ジテ2種類行ハレルコトニナル。

其1ハ標準刺戟音⁴ノ減衰ニヨツテ耳殻反射運動ヲ消失スルニ至ル最低ノ音「エネルギー」ヲ示ス吸音物質ノ量 q ヲ測定シ、病的ノ場合ヲ含ム一般ノ障礙度ヲ表ハス1ツノ公式ヲ構成スルニアル。

其2ハ³—⁴ノ間ノ8ツノ笛音ヲ同一條件デ吹笛センメ之ヲ聴取シタ實驗動物ガ夫々ニ對シ如何ナル大サノ耳殻反射運動ヲ以テ反應スルカタヲ檢シ、後ニ騒音ニヨツテ動物ハ正常ノ場合ト異ツタ態度デ之等ノ音ニ對シテ反應スルカタヲ究メル上ノ對照トスルニアル。

一、第一實驗ニ對スル基礎的測定

(附圖 Fig. 1.—Fig. 5)

q_{norm} ノ測定ニ當ツテハ各實驗夫レ自體ノ精密度ハモトヨリ例數ノ多クヲ要スルモノデアルガ實驗操作ノ複雑セシ場合ニハ制限サレルノモ止ムヲ得ナイ。

其處デ先ヅ次ニ述ベル12頭ノ海猿ノ耳殻反射運動ヲ描寫セシメテ得タ處ノ曲線カラ表ニ明示スル様ナ測定値ヲ計測シタ。(附表 A)。

各1頭ノ動物カラ得タトコロノ測定値ニ就テハ凡ソ5種類ノ小表ヲ附シテアル。

即チ第1ノ表ハ左端ニI, II, III……ノ如ク隔壁番號ヲ記載シテアル。之ハ上カラ此順序ニ依リI→VIヘト更ニVI→Iヘト繰返シ實驗ヲ行フコトヲ示シ、上端ニ1, 2, 3……ト記シタ數字ハ各隔壁ヲ換エル度ノ實驗回数デアル。

而シテ5回ノ各ノ實驗ノ間ニハ10秒。隔壁ヲ交換スル毎ニ30秒ノ休止ヲ介シセシメタノハ實驗方法ノ章

下デ詳述シテ通りデアル。

各5回ノ平均値ハ右側ニ記載シテアル。

各測定値(振幅)ノ記載欄ニアル數字ノ單位ハmmデアリ、小數點以下ノ端數ハ0又ハ5ニシタノデアル。5回ノ平均値ハ同様小數點以下1位以下ハ四捨五入シタ。

而シテ初回ノ【カラ】Ⅵマデヲ假ニ【A】トシ次ニⅥカラ【マデヲ】(B)トシテ、【A】、【B】兩平均値系列ノ相對應スル隔壁番號ノ平均ヲ更ニ示シタモノガ第2表ノ【A】、【B】ノ平均値欄デアル。之レ即チ10回分ノ總平均デアル。尤モⅥノミハ中間ニ位スルノデ5回分ノ平均デアル。

而シテ此小表ノ【A】、【B】ノ平均値ヲ以テ實驗動物ノq測定ニ使用スル基本的數値トナシタノデアル。次ニ此Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ……Ⅵニ至ル總平均數値カラ音響性耳殻反射運動ノ大サニ關スル一種ノ減衰曲線ヲ得ルヲケデアルガ、「グラフ」ニ於テ横軸ニ吸音物質ノ枚數、縱軸ニ耳殻反射運動ノ大サヲ表ハス時ハ以下ニ示ス如ク多クノ例ニ於テ略々直線ノ關係ヲ示スノデアル。〔附表A〕。

此關係ハ「グラフ」ニ現ハレテキル通りデアル。之等デ直線ノヨリ稍々外レタ例ニ於テハ恐ラク諸種ノ實驗的ノ誤差ガ直線ニシテキナイモノト想像セラレル。即チ以上ノ事實ヲ考察スルト「フェルト」ノ透過吸收ニヨリ直チニ音「エネルギー」ガ對數的ニ減衰シテ居ルノデ、之ヲ以テ斜裁シテ得タ音響性耳殻反射運動ノ減衰ガ略々直線ノ關係ヲ示スノハ、矢張り此耳殻反射運動ノ大サガ音「エネルギー」ニ對シテ對數的ノ關係ニ類スルモノヲ含ムノデハナイカト考ヘラレル。

要スルニ音「エネルギー」ノ系統的減衰ニヨリ相應シタ音響性耳殻反射運動ノ減衰ヲ認メルノデアル。

實驗ノ目的ハ此減衰狀態ガ終局ニ到達シテ遂ニ耳殻反射運動ノ消失スルニ至ル個所ヲ察知スレバヨイ。之ガ爲メ第5章デ詳述シタ最小自乘法ニヨツテ校正サレタ直線ヲ各々實驗例毎ニ計算シテ求メ之ニヨリqノ精密ナ値ヲ測定シタノデアル。

而シテ此減衰曲線ノ「グラフ」ノ坐標ヲ最小自乘法ノ公式ニ當テハメル場合ニ次ノ様ナ表デ觀察ヲ便ナラシメタ。即チ第5章デ述べタ處ノ最小自乘法ノ公式デハX坐標ヲaデ表ハシ、Y坐標ヲbデ表ハシテキルノデ之ニ當テハメル場合ニモ減衰曲線ニ關係ノア

ル吸音物質透過枚數ヤ耳殻反射運動ノ大サモ之等ニ相當サセル必要カラ、上述式ノaハ「フェルト」枚數、bハ實驗ニヨツテ得タ耳殻反射運動ノ大サヲ示スコトニナル。而シテ「フェルト」枚數ハ隔壁ニヨリⅠハ0、Ⅱハ1、Ⅲハ3ト言フ様ニ裝置ニヨリ一定シテアルカラ常數ニナル。從ツテ測定ニ與ツタ隔壁ガ【カラ】Ⅵ或ハ【カラ】Ⅶマデ等ニヨリ、a乃至ハa²ノ和即チ Σa 、 Σa^2 ガ決定スルノデ常數ニナル。之ハ甚ダ計算ニ都合ヨイ。

ソシテqヲ求メル公式ニ所要ノ項ハ Σa 、 Σb 、 Σab 、 Σa^2 トイツモ定マツテキルノデ一定ノ欄ニ書キ入レテ活用ニ便ナラシメタ。之ガ第3表デアル。nノ値ハ其場合其場合ノ坐標ノ數デアルカラ、隔壁Ⅵ迄用ヒタ時ハ6、Ⅶ迄ノ場合ハ5ニ相當スル。

第4表ハ第3表ノ數値ヲ夫々公式ニ代入シテqノ値ヲ求メル計算ヲ明ラカニシタ。

又「グラフ」ノ曲線ヲ直線ニ校正スル場合ニ單ニ此直線ガ横軸ヲ切ル點ノミナラズ縱軸ヲ切ル點が必要ナノデ唯圖示スル目的デ序ニ計算法ノ部デ既述ノ式ニ從ヒ此點Yヲモ明カニシテ置ク。此Y坐標ヲ求メル公式ノ諸項ハ前記ノqヲ求メル式ト甚ダ類似デアルカラ第3表ヲ其備用ヒラレル。

茲ニ於テq、Yガ決定シ求メル直線ハ引カレル。第5表ハ「グラフ」ガ之ニ相當スルモノデアルガ觀察ヲ容易ナラシメル爲メ12實驗例チ一括シテ本項ノ終リニ附シテアル。〔附表A〕。

此「グラフ」ハ横軸ニ「フェルト」枚數、縱軸ニ耳殻反射運動描記曲線ノ振幅ヲトリ、圖ノ實線デ示ス如キ直線ニ近い曲線ヲ得タ。前述ノq、Yノ坐標ニヨリ引イタ直線ガ點線デ示スモノデアル。

實際上障礙後ノ「デシベル」單位ヲ算出スルニハqノ値ノミデ十分デアリ、之ハ第8章ニ用ヒタ處デアル。

12ノ實驗例ニ就テqノ値ヲ計算シタ結果ハ表『對照動物ノq平均値ノ決定』ニ於テ掲ゲタ如キモノデアリ。概ネ8—9ノ前後デアルガ多少ノ差ヲ示スモノモアル。之ヲ順次 $q_1, q_2, \dots, q_{12}$ マデトシテ平均値ヲ計算スルト8.90トナル。

茲ニ於テ此數値ノ確カラシサヲ表ハス爲メ、數學的ニ平均誤差ヲ求メルコトニシタ。

所謂 mean error デアル。夫レニハ計算ノ結果 $q_{\text{norm}} = 8.90 \pm 0.43$ ガ與ヘラレタ。

之實驗ノ誤差或ハ動物個體ノ差ニヨルモノトスル所以デアル。

更ニ又 standard deviation ナ求メルト之ハ 8.90 ± 1.49 デアル。(Tabelle 3)。

Tabelle 3 對照動物ノ q 平均値ノ決定

實驗動物	q_1	q_n	$v_1 = q_m - q_n$
(1) 77	10.11	$v_1 = 8.90 - 10.11 = -1.21$	
(2) 79	9.58	$v_2 = 8.90 - 9.58 = -0.68$	
(3) 302	11.89	$v_3 = 8.90 - 11.89 = -2.99$	
(4) 303	9.01	$v_4 = 8.90 - 9.01 = -0.11$	
(5) 304	8.50	$v_5 = 8.90 - 8.50 = 0.40$	
(6) 305	8.75	$v_6 = 8.90 - 8.75 = 0.15$	
(7) 306	9.43	$v_7 = 8.90 - 9.43 = -0.53$	
(8) 307	7.63	$v_8 = 8.90 - 7.63 = 1.27$	
(9) 309	6.96	$v_9 = 8.90 - 6.96 = 1.94$	
(10) 310	10.31	$v_{10} = 8.90 - 10.31 = -1.40$	
(11) 312	6.75	$v_{11} = 8.90 - 6.75 = 2.15$	
(12) 315	7.83	$v_{12} = 8.90 - 7.83 = 1.07$	

平均値 $q_m = 8.90$

$\Sigma v^2 = 24.3020$

$$\pm \sqrt{\frac{\Sigma v^2}{n(n-1)}} = \pm 0.43$$

$$\pm \sqrt{\frac{\Sigma v^2}{n-1}} = \pm 1.49$$

茲ニ於テ $q_{\text{norm}} = 8.90 \pm 0.43$

一般ニ障礙度 D_{db} フ求メル式

コ、ニ第6章ニ於テ既ニ吸音物質單位量ノ減衰度 η ノ測定ヲ終ヘ。今又最小刺激値ノ吸音物質透過枚數ノ正常平均値 q_{norm} ニ就テ測定シタノデ一般ノ障礙度ヲ「デシベル」單位ニ表現スル式ノ諸要素ガ整ツタ課デアル。

故ニ $D_{\text{db}} = 10 \times 0.13 (8.90 - q)$

$$= 1.3 (8.90 - q)$$

即チ一般ニハ q ナ測定シテ此式ニ代入スレバヨイ。正常價ニ等シイ q ナ假定スレバ D_{db} ハ0, 刺激閾ガ増大スレバ之ハ大トナリ。 q ガ遂ニ0トナレバ D_{db} ハ11.57ノ最大値ヲ示ス。 D_{db} ハツマリ0ト此數値ノ間ヲ動ク。

[A 表] [實驗動物: 77]

隔壁番號	1	2	3	4	5	5回ノ平均値
I	11.0	11.0	10.0	11.5	11.5	11.0
II	10.5	10.0	10.5	10.0	8.5	9.9
III	7.5	9.5	9.5	7.0	8.0	8.3
IV	6.5	5.5	5.5	5.5	6.0	5.8
V	4.0	3.5	3.0	4.5	4.0	3.8
VI	2.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.1
V	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0	4.7
IV	8.0	7.0	6.5	6.0	7.0	6.9
III	9.5	9.5	8.0	7.0	7.5	8.3
II	11.5	9.5	9.0	10.5	8.0	9.6
I	10.5	12.0	10.5	10.5	13.5	11.4

(騒音: 0)

隔壁番號	I	II	III	IV	V	VI
[A][B]ノ平均値	11.2	9.8	8.3	6.4	4.3	3.1

坐標	a	b	a × b	a ²
隔壁				
I	0	11.2	0	0
II	1	9.8	9.8	1
III	3	8.3	24.9	9
IV	5	6.4	32.0	25
V	6	4.3	25.8	36
VI	7	3.1	21.7	49
Σ	Σa=22	Σb=43.1	Σab=114.2	Σa ² =120

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{120 \times 43.1 - 22 \times 114.2}{22 \times 43.1 - 6 \times 114.2} = 10.11$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{22 \times 114.2 - 120 \times 43.1}{22^2 - 6 \times 120} = 11.27$$

實驗動物: 77.

〔實驗動物：79〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均值	
I	12.0	11.0	10.5	13.5	12.5	11.9	〔A〕
II	12.5	11.5	12.0	11.5	12.5	12.0	
III	11.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.7	
IV	7.5	7.5	8.5	8.5	8.0	8.0	
V	5.0	5.5	4.5	5.0	5.0	5.0	
VI	3.5	3.0	2.5	3.5	2.5	3.0	
	5.5	3.5	3.5	4.0	3.5	4.0	〔B〕
IV	9.5	7.5	8.0	7.5	8.0	8.1	
III	11.0	12.0	11.5	11.0	11.0	11.3	
II	14.0	12.0	12.5	12.5	13.5	12.9	
I	15.0	14.5	14.0	14.0	15.5	14.6	

〔騒音：0〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均值	13.3	12.5	11.0	8.1	4.5	3.0

坐標	a	b	a×b	a ²
隔壁				
I	0	13.3	0	0
II	1	12.5	12.5	1
III	3	11.0	33.0	9
IV	5	8.1	40.5	25
V	6	4.5	27.0	36
VI	7	3.0	21.0	49
Σ	Σa=22	Σb=52.4	Σab=134.0	Σa ² =120

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} = \frac{120 \times 52.4 - 22 \times 134.0}{22 \times 52.4 - 6 \times 134.0} = 9.58$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} = \frac{22 \times 134.0 - 120 \times 52.4}{22^2 - 6 \times 120} = 14.15$$

實驗動物 79.

〔實驗動物：302〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均值	
I	14.0	14.5	14.5	14.0	15.0	14.4	〔A〕
II	13.0	12.5	13.0	13.0	13.0	12.9	
III	12.0	11.5	12.0	11.5	11.5	11.7	
IV	8.0	8.0	8.5	9.0	9.0	8.5	
V	7.0	6.0	7.0	8.0	8.0	7.2	
VI	6.0	6.0	6.5	6.0	5.5	6.0	
	7.0	7.0	7.5	7.0	7.0	7.1	〔B〕
IV	9.5	8.5	7.5	10.0	8.5	8.8	
III	12.0	13.0	12.0	13.0	11.5	12.3	
II	14.0	14.0	14.0	14.5	13.5	14.0	
I	14.5	14.5	15.0	15.5	15.0	14.9	

〔騒音：0〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均值	14.7	13.5	12.0	8.7	7.2	6.0

坐標	a	b	a×b	a ²
隔壁				
I	0	14.7	0	0
II	1	13.5	13.5	1
III	3	12.0	36.0	9
IV	5	8.7	43.5	25
V	6	7.2	43.2	36
VI	7	6.0	42.0	49
Σ	Σa=22	Σb=62.1	Σab=178.2	Σa ² =120

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} = \frac{120 \times 62.1 - 22 \times 178.2}{22 \times 62.1 - 6 \times 178.2} = 11.89$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} = \frac{22 \times 178.2 - 120 \times 62.1}{22^2 - 6 \times 120} = 14.96$$

實驗動物 302.

〔實驗動物: 303〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	13.0	10.5	10.5	13.0	12.0	11.8
II	12.0	10.5	10.5	10.5	10.5	10.8
III	8.5	8.0	9.0	9.0	9.0	8.7
IV	4.0	4.0	4.5	5.0	6.0	4.7
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	6.0	6.0	8.0	7.5	6.0	6.7
III	13.5	13.0	13.0	12.0	12.0	12.7
II	13.5	15.0	14.5	14.0	16.0	14.6
I	17.0	16.0	16.0	15.5	16.0	16.1

〔騒音: 0〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	13.9	12.7	10.7	5.7	0	0

坐標	a	b	a×b	a ²
隔壁				
I	0	13.9	0	0
II	1	12.7	12.7	1
III	3	10.7	32.1	9
IV	5	5.7	28.5	25
V				
VI				
Σ	Σa=9	Σb=43.0	Σab=73.3	Σa ² =35

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{35 \times 43 - 9 \times 73.3}{9 \times 43 - 4 \times 73.3} = 9.01$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{9 \times 73.3 - 35 \times 43}{9^2 - 4 \times 35} = 14.33$$

實驗動物: 303

〔實驗動物: 304〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	13.0	12.0	11.5	11.5	11.5	11.9
II	12.0	12.0	11.0	10.5	11.0	11.3
III	11.0	10.0	10.0	9.5	10.0	10.1
IV	7.0	6.5	6.5	7.0	6.5	6.7
V	2.0	4.5	2.0	2.5	4.0	3.0
VI	0.5	0.5	0.5	1.5	0	0.6
V	4.5	3.5	2.5	5.5	4.5	4.0
IV	6.5	7.0	6.5	7.0	6.5	6.7
III	9.0	8.5	9.5	9.5	10.5	9.2
II	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
I	11.0	11.0	10.5	10.5	10.5	10.7

〔騒音: 0〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	11.3	10.9	9.7	6.7	3.5	0.6

坐標	a	b	a×b	a ²
隔壁				
I	0	11.3	0	0
II	1	10.9	10.9	1
III	3	9.7	29.1	9
IV	5	6.7	33.5	25
V	6	3.5	21.0	36
VI	7	0.6	4.2	49
Σ	Σa=22	Σb=42.7	Σab=98.7	Σa ² =120

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{120 \times 42.7 - 22 \times 98.7}{22 \times 42.7 - 6 \times 98.7} = 8.50$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{22 \times 98.7 - 120 \times 42.7}{22^2 - 6 \times 120} = 12.51$$

實驗動物: 304

〔實驗動物: 305〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
I	12.0	12.0	11.5	11.5	11.5	11.7	〔A〕
II	12.0	10.5	11.0	11.0	10.5	11.0	
III	9.0	9.5	9.0	9.0	9.0	9.1	
IV	7.0	5.5	6.0	6.5	6.0	6.2	
V	4.0	3.0	3.0	2.5	3.0	3.1	
VI	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	1.8	〔B〕
V	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	4.2	
IV	7.5	7.0	7.0	6.5	7.0	7.0	
III	10.0	10.5	9.0	10.5	10.0	10.0	
II	12.0	11.5	12.0	11.5	11.5	11.7	
I	12.0	13.0	13.5	13.0	13.0	12.9	

〔騒音: 0〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	12.3	11.4	9.5	6.6	3.7	1.8

坐標 隔壁	a	b	a × b	a ²
I	0	12.3	0	0
II	1	11.4	11.4	1
III	3	9.5	28.5	9
IV	5	6.6	33.0	25
V	6	3.7	22.2	36
VI	7	1.8	12.6	49
Σ	Σa=22	Σb=45.3	Σab=107.7	Σa ² =120

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} = \frac{120 \times 45.3 - 22 \times 107.7}{22 \times 45.3 - 6 \times 107.7} = 8.75$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} = \frac{22 \times 107.7 - 120 \times 45.3}{22^2 - 6 \times 120} = 12.99$$

實驗動物: 305

〔實驗動物: 306〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
I	10.5	9.0	8.5	9.0	9.0	9.2	〔A〕
II	8.5	8.5	8.0	8.5	8.0	8.3	
III	7.0	5.5	6.0	6.5	6.0	6.2	
IV	5.0	5.0	5.0	5.5	5.0	5.1	
V	3.0	2.5	3.0	2.5	4.0	3.0	
VI	2.0	2.5	2.0	3.0	3.0	2.5	〔B〕
V	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.4	
IV	5.5	4.0	5.5	5.5	6.0	5.3	
III	8.0	8.0	8.0	8.5	8.0	8.1	
II	10.0	9.0	9.5	9.0	9.0	9.3	
I	11.0	10.0	11.0	10.5	10.5	10.6	

〔騒音: 0〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	9.9	8.8	7.1	5.2	3.2	2.5

坐標 隔壁	a	b	a × b	a ²
I	0	9.9	0	0
II	1	8.8	8.8	1
III	3	7.1	21.3	9
IV	5	5.2	26.0	25
V	6	3.2	19.2	36
VI	7	2.5	17.5	49
Σ	Σa=22	Σb=36.7	Σab=92.8	Σa ² =120

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} = \frac{120 \times 36.7 - 22 \times 92.8}{22 \times 36.7 - 6 \times 92.8} = 9.43$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} = \frac{22 \times 92.8 - 120 \times 36.7}{22^2 - 6 \times 120} = 10.01$$

實驗動物: 306

〔實驗動物: 307〕

隔壁番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	13.5	13.0	13.0	13.0	13.0	13.1
II	12.0	10.5	10.5	10.5	10.5	10.8
III	8.5	7.5	7.0	7.5	7.5	7.6
IV	3.5	3.5	3.5	4.5	4.0	3.8
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	4.0	3.5	4.5	4.0	3.0	4.0
III	8.5	8.0	7.5	7.5	9.0	8.1
II	11.0	10.0	10.5	10.5	10.0	10.4
I	11.0	11.0	10.0	10.0	11.5	10.7

〔騒音: 0〕

隔壁番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B)ノ平均値	11.9	10.6	7.8	3.9	0	0

坐標	a	b	a × b	a ²
隔壁				
I	0	11.9	0	0
II	1	10.6	10.6	1
III	3	7.8	23.4	9
IV	5	3.9	19.5	25
V				
VI				
Σ	Σa = 9	Σb = 34.2	Σab = 53.5	Σa ² = 35

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{35 \times 34.2 - 9 \times 53.5}{9 \times 34.2 - 4 \times 53.5} = 7.63$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{9 \times 53.5 - 35 \times 34.2}{9^2 - 4 \times 35} = 12.13$$

實驗動物: 307.

〔實驗動物: 309〕

隔壁番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	16.5	15.5	15.5	15.0	15.5	15.6
II	14.5	13.5	14.0	12.5	13.5	13.6
III	10.0	8.0	10.0	8.0	9.0	9.0
IV	4.0	3.5	3.0	3.5	5.0	3.8
V	3.5	3.0	2.5	2.5	3.0	2.9
VI	0	0	0	0	0	0
V	2.0	2.5	2.0	3.0	2.5	2.4
IV	5.5	5.0	6.0	5.5	5.0	5.4
III	14.5	12.0	11.5	11.0	10.5	11.9
II	18.5	17.5	17.0	18.0	19.0	18.0
I	19.5	19.0	20.5	20.5	19.0	19.7

〔騒音: 0〕

隔壁番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B)ノ平均値	17.7	15.8	10.5	4.6	2.7	0

坐標	a	b	a × b	a ²
隔壁				
I	0	17.7	0	0
II	1	15.8	15.8	1
III	3	10.5	31.5	9
IV	5	4.6	23.0	25
V	6	2.7	16.2	36
VI				
Σ	Σa = 15	Σb = 51.3	Σab = 86.5	Σa ² = 71

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{71 \times 51.3 - 15.0 \times 86.5}{15 \times 51.3 - 5 \times 86.5} = 6.96$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{15 \times 86.5 - 71 \times 51.3}{15^2 - 5 \times 71} = 18.04$$

實驗動物: 309

〔實驗動物: 310〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	13.5	14.0	13.0	12.0	13.0	13.1
II	13.0	12.0	12.5	11.5	11.5	12.1
III	11.0	9.5	10.5	10.5	11.0	10.5
IV	8.5	7.5	7.0	7.0	7.0	7.4
V	7.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.8
VI	5.5	3.5	4.0	3.5	3.5	4.0
V	7.5	6.0	6.0	5.5	5.0	6.0
IV	8.5	7.5	7.0	7.5	7.5	7.6
III	11.5	9.5	11.5	10.0	10.0	10.5
II	13.0	12.0	12.5	12.5	11.5	12.3
I	15.0	14.0	14.5	13.5	16.0	14.6

〔騒音: 0〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	13.9	12.2	10.5	7.5	5.9	4.0

坐標 隔壁	a	b	a × b	a ²
I	0	13.9	0	0
II	1	12.2	12.2	1
III	3	10.5	31.5	9
IV	5	7.5	37.5	25
V	6	5.9	35.4	36
VI	7	4.0	28.0	49
Σ	Σa=22	Σb=54	Σab=144.6	Σa ² =120

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} = \frac{120 \times 54 - 22 \times 144.6}{22 \times 54 - 6 \times 144.6} = 10.30$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} = \frac{22 \times 144.6 - 120 \times 54}{22^2 - 6 \times 120} = 13.98$$

實驗動物: 310.

〔實驗動物: 312〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	9.0	9.0	10.5	8.0	11.5	9.6
II	7.5	7.5	9.0	7.5	8.0	7.9
III	7.5	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5
IV	3.0	3.5	3.0	3.0	3.0	3.2
V	1.0	1.0	2.0	1.0	0.5	1.1
VI	0	0	0	0	0	0
V	1.0	1.0	1.0	0.5	1.5	1.0
IV	3.5	4.5	2.5	3.5	4.5	3.6
III	6.5	6.5	7.0	6.0	9.0	7.0
II	9.0	9.0	11.0	12.0	12.0	10.6
I	15.0	14.5	14.0	14.5	14.0	14.4

〔騒音: 0〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	12.0	9.3	6.3	3.4	1.1	0

坐標 隔壁	a	b	a × b	a ²
I	0	12.0	0	0
II	1	9.3	9.3	1
III	3	6.3	18.9	9
IV	5	3.4	17.0	25
V	6	1.1	6.6	36
VI	7	0	0	49
Σ	Σa=15	Σb=32.1	Σab=51.8	Σa ² =71

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} = \frac{71 \times 32.1 - 15 \times 51.8}{15 \times 32.1 - 5 \times 51.8} = 6.75$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} = \frac{15 \times 51.8 - 71 \times 32.1}{15^2 - 5 \times 71} = 11.55$$

實驗動物: 312

(實驗動物: 315)

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	12.5	12.0	11.0	13.5	12.5	12.3
II	13.5	10.5	10.5	12.0	11.5	11.6
III	9.0	8.0	8.0	9.0	9.5	8.7
IV	4.5	5.0	5.5	5.0	5.0	5.0
V	1.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.1
VI	1.0	1.0	1.5	0.5	0.5	0.9
V	2.5	3.5	3.0	2.5	3.0	2.9
	5.0	6.0	5.5	7.5	8.0	6.4
III	11.0	10.5	11.0	10.0	12.0	10.9
II	12.0	12.5	12.0	12.0	11.0	11.9
I	14.0	13.0	14.0	13.0	12.0	13.2

[A]

[B]

(騒音: 0)

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
[A][B] ノ平均値	12.8	11.8	9.8	5.7	2.5	0.9

坐標 隔壁	a	b	a × b	a ²
I	0	12.8	0	0
II	1	11.8	11.8	1
III	3	9.8	29.4	9
IV	5	5.7	28.5	25
V	6	2.5	15.0	36
VI	7	0.9	6.3	49
Σ	Σa=22	Σb=43.5	Σab=91.0	Σa ² =120

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} = \frac{120 \times 43.5 - 22 \times 91}{22 \times 43.5 - 6 \times 91} = 7.83$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} = \frac{22 \times 91 - 120 \times 43.5}{22^2 - 6 \times 120} = 13.64$$

實驗動物: 315

二. 第二實驗ニ對スル基礎的測定

(附圖 Fig. 6—Fig. 11)

此實驗ノ順序ハ既ニ述ベタノデ省略スルガ要スルニ第1實驗ト異ル處ハ笛音ヲc⁴ト限ラズa³—a⁴ニ至ル間ノ8音ニ就テ反應ヲ調べルノデ隔壁ノ交換ハ此場合行ハズ常ニIニシテアル。平均値ノ計算法モ第1實驗ト全然同様デアル。只隔壁番號ト笛音ノ種類ガ入レ替ヘラレタノデ隔壁ハ6種デアルガ笛音ハ8種類用ヒル爲メ實驗所要時間ハ稍々延長スル。各音ニ就テノ10回ノ平均値ヲ一目瞭然タラシメル目的デ之ヲ本項ノ末尾ニ掲ゲル如キ「グラフ」ニシタ。横軸ニ音高ヲ表シシ夫レニ應ズル耳殻反射描寫曲線振幅ヲ實長デ示シタモノデアル。之ハ第8章實驗成績ニ於テモ作製シ孰レモ實長デアルカラ彼我相対比出來ル。

以下8實驗例ノ一々ニ就テハ記載シナイデ表ニシタ。概ネ孰レモa³—a⁴マデ相似タ壓縮高ヲ示シ、高音部デ多少低クナル傾向モ見ラレルガ311.ノ如キ反對ノ例モアル。〔B表〕

各個體相互ノ間ニ於テ海猴ハ耳殻反射ノ絶對の大サヲ異ニスルノハ當然デアルガ、事實其10mm未満ナルモノ或ハ20mmニ垂ントスルモノモアル。一般ニハ10—15mmノ間ガ多イ。之ヲ以テ觀テモ本反射ノ消長ニ余ノ第1實驗ノ如キ方法ガ最モ妥當ナコトハ充分窺ハレルノデアル。

之ヲ要スルニ余ノ實驗裝置ニヨリ正常海猴ニ同一氣壓デa³—a⁴8音ヲ吹笛シテ聽取セシメタ場合ニハ略略相似ノ壓縮高ヲ以テ反應シ、其刺激音ノ質的變化ニヨル著差ヲ認メナイ。コノ點吉田ノ成績ト一致シテキル。

〔B 表〕

〔實驗動物：77〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
a ³	12.5	12.5	10.5	11.0	11.5	11.6
h ³	12.5	11.0	13.5	12.5	12.5	12.4
c ⁴	16.0	15.5	14.5	13.5	13.5	14.6
d ⁴	15.0	14.0	14.5	13.5	14.5	14.3
e ⁴	15.0	13.5	12.5	13.0	13.0	13.4
f ⁴	11.0	11.0	12.0	11.0	10.5	11.1
g ⁴	12.5	12.5	12.5	11.0	11.0	11.7
a ⁴	11.0	10.5	11.5	11.0	11.5	11.1
g ⁴	11.5	14.0	13.5	11.0	10.5	12.1
f ⁴	11.0	16.0	16.0	13.0	12.0	13.6
e ⁴	14.0	14.0	11.5	14.0	13.5	13.1
d ⁴	16.5	14.0	11.5	14.0	13.5	13.9
c ⁴	15.5	13.5	11.5	16.0	11.5	13.6
h ³	14.0	12.0	11.5	11.5	11.5	12.1
a ³	11.0	16.0	17.0	15.5	17.0	15.3

〔騒音：0〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	13.5	12.3	14.1	14.1	13.3	12.4	11.9	11.1

〔實驗動物：303〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
a ³	19.0	18.5	19.0	18.0	21.0	19.1
h ³	19.0	19.0	18.5	17.5	19.5	18.7
c ⁴	19.5	18.0	19.0	17.5	18.0	18.4
d ⁴	18.5	18.5	18.0	18.0	18.0	18.2
e ⁴	19.5	19.0	17.5	18.5	18.5	18.6
f ⁴	19.0	16.5	17.0	17.5	17.5	17.5
g ⁴	17.5	19.5	17.5	16.5	16.0	17.4
a ⁴	17.0	18.0	18.5	16.0	16.5	17.2
g ⁴	17.0	18.0	17.0	18.0	16.5	17.3
f ⁴	19.5	17.0	14.5	18.0	17.5	17.3
e ⁴	16.5	17.0	17.5	17.5	17.0	17.1
d ⁴	19.0	18.5	18.0	18.0	18.0	18.3
c ⁴	20.5	18.5	17.5	20.5	20.0	19.4
h ³	19.5	22.0	20.5	21.5	20.5	20.8
a ³	20.5	20.5	19.5	20.0	20.0	20.1

〔騒音：0〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	19.6	19.8	18.5	18.3	17.9	17.4	17.4	17.2

〔實驗動物：79〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
a ³	9.0	7.0	9.5	9.5	9.5	8.9
h ³	9.5	9.0	8.0	9.0	8.5	8.8
c ⁴	8.0	8.0	8.0	7.5	7.5	7.8
d ⁴	10.5	8.0	7.0	9.0	9.0	8.7
e ⁴	7.0	8.0	7.0	7.0	8.0	7.4
f ⁴	7.5	6.5	6.5	5.0	5.5	6.2
g ⁴	7.5	5.0	6.5	6.0	6.5	6.3
a ⁴	6.5	6.0	6.5	7.0	6.5	6.5
g ⁴	6.5	6.5	5.5	6.0	6.5	6.2
f ⁴	6.0	6.5	6.0	7.0	6.0	6.3
e ⁴	7.5	7.5	7.5	7.0	6.5	7.2
d ⁴	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.8
c ⁴	9.0	8.0	8.5	8.5	8.0	8.4
h ³	10.5	7.5	8.5	9.0	8.5	8.8
a ³	9.5	8.5	8.5	8.5	8.0	8.6

〔騒音：0〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	8.8	8.8	8.1	8.8	7.3	6.3	6.3	6.5

〔實驗動物：305〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
a ³	15.0	14.5	15.0	14.5	15.0	14.8
h ³	14.5	14.5	15.0	14.0	14.5	14.5
c ⁴	14.5	14.0	13.0	12.5	14.0	13.6
d ⁴	15.5	14.5	13.5	14.0	14.5	14.4
e ⁴	15.0	13.0	12.5	14.5	14.0	13.8
f ⁴	15.5	14.0	14.5	14.0	14.0	14.4
g ⁴	11.0	12.0	12.0	11.0	12.5	11.7
a ⁴	13.5	12.5	12.0	13.5	12.5	12.8
g ⁴	12.5	12.5	12.5	12.5	14.0	12.8
f ⁴	12.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.2
e ⁴	13.5	13.0	13.0	13.0	14.0	13.3
d ⁴	15.5	13.0	14.0	14.0	13.0	13.9
c ⁴	14.0	13.0	14.0	14.0	13.0	13.6
h ³	12.5	14.0	13.0	12.0	13.0	12.9
a ³	13.0	12.0	14.0	13.0	12.0	12.8

〔騒音：0〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	13.8	13.7	13.6	14.1	13.6	13.8	12.3	12.8

〔實驗動物：306〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
a ³	8.0	9.0	8.5	8.5	9.0	8.6
h ³	8.5	7.5	8.0	9.0	8.5	8.3
c ⁴	8.5	7.5	8.5	9.0	8.5	8.4
d ⁴	9.0	8.5	7.5	8.5	10.0	8.7
e ⁴	11.0	7.5	7.5	8.5	9.5	8.8
f ⁴	13.0	10.0	8.5	9.5	7.5	9.7
g ⁴	8.0	8.5	8.5	7.5	8.5	8.2
a ⁴	7.5	7.5	7.0	8.5	8.5	7.8
g ⁴	9.5	7.5	8.5	9.5	8.0	8.6
f ⁴	9.5	10.0	8.0	9.5	10.5	9.5
e ⁴	9.0	9.5	9.0	9.0	9.5	9.2
d ⁴	9.0	9.5	10.0	8.5	9.0	9.2
c ⁴	10.0	8.0	10.0	10.5	8.0	9.5
h ³	8.0	8.0	9.0	8.5	8.0	8.3
a ³	8.5	8.5	9.0	9.5	10.5	9.2

〔騒音：0〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	8.9	8.3	9.0	9.0	9.6	9.6	8.4	7.8

〔實驗動物：310〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
a ³	10.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.3
h ³	9.0	9.0	8.5	9.0	7.5	8.6
c ⁴	10.5	10.0	8.5	10.0	9.5	9.7
d ⁴	11.0	10.0	9.5	9.5	9.0	9.8
e ⁴	9.5	7.5	8.5	8.0	8.5	8.4
f ⁴	9.0	8.0	7.5	7.5	7.0	7.8
g ⁴	9.5	8.5	8.5	9.0	8.5	8.8
a ⁴	8.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1
g ⁴	9.5	8.5	11.5	8.5	10.0	9.6
f ⁴	11.5	10.0	10.0	11.5	10.0	10.6
e ⁴	10.5	11.0	10.5	11.0	8.0	10.2
d ⁴	13.0	11.0	9.5	9.5	10.5	11.5
c ⁴	11.5	10.0	9.5	9.5	10.5	10.2
h ³	11.5	11.5	11.0	9.0	10.5	10.7
a ³	11.5	10.5	11.5	11.5	11.0	11.2

〔騒音：0〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	10.3	9.7	10.0	10.7	9.3	9.2	9.2	8.1

〔實驗動物：307〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
a ³	19.5	17.5	20.5	19.5	18.0	19.0
h ³	20.0	19.0	18.5	18.5	18.0	18.8
c ⁴	17.0	17.0	16.5	15.0	13.0	15.7
d ⁴	20.0	17.0	15.0	18.0	15.0	17.0
e ⁴	16.5	17.0	17.0	14.5	17.0	16.4
f ⁴	16.0	14.0	14.0	13.0	14.0	14.2
g ⁴	14.5	14.0	15.5	13.0	14.0	14.2
a ⁴	13.0	12.0	12.0	12.5	13.0	12.5
g ⁴	15.5	14.0	13.5	12.5	12.5	13.6
f ⁴	15.5	14.0	13.5	14.0	14.0	14.2
e ⁴	16.5	15.5	14.5	14.5	16.5	15.5
d ⁴	17.0	16.5	16.5	17.0	18.0	17.0
c ⁴	14.0	12.0	13.5	13.5	13.5	13.3
h ³	17.5	16.5	17.5	21.5	17.5	18.1
a ³	17.0	18.5	18.5	16.5	18.0	17.7

〔騒音：0〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	18.4	18.5	14.5	17.0	16.0	14.2	13.9	12.5

〔實驗動物：311〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
a ³	11.0	11.0	11.5	10.5	11.5	11.1
h ³	10.5	10.5	11.5	10.5	11.0	10.8
c ⁴	11.0	10.0	10.0	9.0	10.5	10.1
d ⁴	11.0	10.0	11.0	11.5	12.0	11.1
e ⁴	12.5	11.0	10.0	11.5	15.5	12.1
f ⁴	13.0	11.5	12.5	14.5	14.0	13.1
g ⁴	15.5	14.5	13.5	14.5	12.5	14.1
a ⁴	12.5	13.0	13.0	14.0	15.0	13.5
g ⁴	9.5	13.0	13.0	14.0	15.0	13.5
f ⁴	12.5	12.5	13.0	11.5	12.0	12.3
e ⁴	14.0	13.5	14.0	13.5	13.0	13.6
d ⁴	15.0	14.0	15.0	14.5	14.5	14.6
c ⁴	14.0	12.5	14.0	14.5	14.5	13.9
h ³	14.0	14.5	14.5	14.5	13.0	14.1
a ³	12.5	16.0	14.5	12.5	13.5	13.8

〔騒音：0〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	12.5	12.5	12.0	12.9	12.9	12.7	12.8	13.5

第八章

實驗成績

77.

79

303.

305.

306.

307.

310.

311.

ブライエル氏耳殻反射運動ノ正常ニ出現スル
海猿ニ就テノ基礎的測定ハ前編ニ既ニ述ベタ處
デ。此處ニ於テハ夫等ノ裝置ヲ應用シテ。第1
編ニ述ベタ如キ實驗方法ニ從ツテ騒音發生裝置
ノ騒音裡ニ或期間曝露シタ實驗動物ニ就テ同様
ニ測定セル結果ヲ記載スル。

即チ第1實驗ニ於テ實驗動物ノ最低感度ヲ表ハ
ス「デシベル」測定ノ結果ヲ得。第2實驗ニ於テ
ハ a^1-a^4 ノ各音ニ對スル耳殻反射運動ノ態度ヲ
描寫シタノデアル。

騒音曝露中ノ動物ヲ直チニ描記實驗ニ持ツテ來
ルノハ妥當デナイノデ。長期間ニ亘ルモノハ前
日ノ騒音實驗終了後翌日迄休養セシメテ然ル後
耳殻反射描寫實驗ヲ行フコトニシタノデアル。

I 第一實驗ノ成績

(1) 短時間騒音裡曝露ノ實驗例〔C表〕

a. 曝露時間 30 分。

此實驗ニハ5頭ノ海猿ヲ使用シタ。實驗ハ短
時間デアルカラ若シ海猿ガ檻ノ中デ音源カラ遠
ク離レテ居テハ條件ノ一致ヲ缺ク懼レガアルノ
デ海猿固定器中ニ入レタ儘發生裝置ノ圓筒カラ
約7 cmノ距離ノ個所ニ一定シテ正30分宛放置
シタ直後ニ描寫シタモノデアル。

實驗動物: 77, 本例デハ隔壁〔I〕ニ於テ4mm
前後ノ振幅ヲ示シ〔III〕デハ僅カニ痕跡ヲ示シ第
5回目ノ測定値ハ0デアル。更ニ〔IV〕ヨリ〔VI〕
迄ハ反應ナク更ニ〔V〕, 〔IV〕ト戻リ〔III〕ニ來テ
同様僅カニ反應ヲ示シテ居ルガ前回〔A〕ニ比シ
テ平均値ヲ増シテ居ル。

其結果最低感度透過枚數ヲ計算スルト表ニ示ス

如ク、3.33 デ正常平均値ノ8.90ニ比シ甚ダシク懸隔シテ居ル。「デシベル」ニスルト7.24 デアル(以下「デシベル」ハdb.ト略ス)。

實驗動物：79. 此例デハ振幅ノ實測値ハ前例ト殆ンド著差ヲ見ナイ程度デアル。同様に反射運動ハ隔壁〔Ⅳ〕ニ於テ消失シテ居ル。

qノ數値ハ3.16 デアルカラ77.ノ夫レト殆ンド同値デアル。db.ハ7.46 デアル。

實驗動物：302. 本例デハ〔A〕回デハ隔壁〔Ⅰ〕ニ於テ振幅ハ前2者ニ比シ稍々低イガ反射ハ〔Ⅳ〕ニ於テモ認メラレ〔Ⅴ〕ニ於テ初メテ消失シテ居ル。從ツテ障礙度モ低ク3.85db.ニ過ギナイ。

實驗動物：303. 先ヅ隔壁〔Ⅱ〕デ1mmヲ出デズ、qハ僅カニ1.4 デアルカラ障礙度モ著シク大デ最大值ニ接近セル9.75db.ノ如キ高度ヲ呈シテ居ル。

實驗動物：308. 隔壁〔Ⅲ〕ニ於テ反射ハ消失シテ居ルガ〔Ⅱ〕ノ數値ガ相當量アルノデ障礙度ハ8.47db. デアル。

要スルニ以上ノ成績ヲ見ルト、77.79.ニ於テ略略類似ノ値ヲ呈シ303. 308.ノ2例ハ前2者ヨリ稍々高度ノ障礙ヲ呈シ、只302.デハ障礙ノ程度ハ著シク輕度デアル。

即チ海狸ハ30分間ノ騒音作用ニヨリ最大值ニ近イ障礙度ヲ示スモノ或ハ中等度ニ留ルモノ又障礙度ノ輕キモノ等區々デ一致ヲ見ナイ。

h. 曝露時間1時間。

實驗ノ方法ハ前回ト全然同様デアル。

實驗動物：302. 隔壁〔Ⅰ〕ニ於テ振幅ハ僅カニ3mm前後デアリ、〔A〕ヨリ〔B〕ノ方一般ニ低イノヲ認メル。qハ2.36ナノデ障礙度ハ8.50db. デアル。

實驗動物：303. 隔壁〔Ⅰ〕ノ振幅ハ前者ヨリ

稍々低イガ〔A〕ニ於テ隔壁〔Ⅲ〕デ尙ホ痕跡ヲ殘シテ居ル。而シテ〔B〕ノ値ガ孰レモ〔A〕ニ比シテ小サイコト同様デアル。qハ3.33トナリ障礙度ハ7.24db. デアル。

實驗動物：304. 本例ノ示ス處デハqハ2.68デアリ障礙度ハ8.09db.ヲ示ス。

實驗動物：305. 此例デハqハ2.67デ8.10db.ヲ示シテ居ル。

實驗動物：307. 隔壁〔Ⅱ〕デ既ニ第4—5回目デ0ヲ呈スル。

從ツテ聴覺障礙度モ甚ダシク9.53db.ノ高率デアル。

以上ノ成績ヲ通覽スルト騒音作用ガ既ニ1時間ニ及ブ場合ハ孰レノ動物モ殆ンド同様ナ歩調デ障礙ノ度ヲ進メル事實ハ明白デアル。

即チ騒音作用1時間ニシテ障礙度ハ殆ンド8.0db.ヲ越エル飽和狀態ニ近イモノニ到達スルノデアル。

Tabelle 4

短時間騒音裡曝露ノ實驗例

I. 30分

實驗動物	測定値(Dab)
(1) 77	7.24
(2) 79	7.46
(3) 302	3.85
(4) 303	9.75
(5) 308	8.48

II. 1時間

(1) 302	8.50
(2) 303	7.24
(3) 304	8.09
(4) 305	8.10
(5) 307	9.53

〔C 表〕 〔實驗動物：77〕

隔壁番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	5.0	4.0	4.5	4.0	4.0	4.3
II	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.8
III	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0.4
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0.5	2.0	0.5	1.0	1.0	1.0
II	3.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.4
I	6.5	5.0	4.5	5.0	5.5	5.3

〔騒音：30分〕

隔壁番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕ノ平均値	4.8	2.1	0.7	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a×b	a ²
I	0	4.8	0	0
II	1	2.1	2.1	1
III	3	0.7	2.1	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa=4	Σb=7.6	Σab=4.2	Σa ² =10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{10 \times 7.6 - 4 \times 4.2}{4 \times 7.6 - 3 \times 4.2} = 3.33$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{4 \times 4.2 - 10 \times 7.6}{4^2 - 3 \times 10} = 4.23$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 3.33) = 7.24$$

〔實驗動物：79〕

隔壁番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	5.0	5.0	4.5	3.5	4.5	4.5
II	3.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0
III	1.0	0.5	0.5	0	0	0.4
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.4
II	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
I	4.5	4.0	5.0	4.5	5.0	4.6

〔騒音：30分〕

隔壁番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕ノ平均値	4.6	2.3	0.4	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a×b	a ²
I	0	4.6	0	0
II	1	2.3	2.3	1
III	3	0.4	1.2	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa=4	Σb=7.3	Σab=3.5	Σa ² =10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{10 \times 7.3 - 4 \times 3.5}{4 \times 7.3 - 3 \times 3.5} = 3.16$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{4 \times 3.5 - 10 \times 7.3}{4^2 - 3 \times 10} = 4.20$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 3.16) = 7.46$$

〔實驗動物：302〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	4.0	4.5	4.0	3.5	3.5	3.9
II	3.5	2.5	3.5	3.0	3.0	3.1
III	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0	2.1
IV	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.8
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.4
III	4.5	5.0	4.5	4.5	4.5	4.6
II	5.5	6.0	6.0	6.0	6.5	6.0
I	8.0	7.0	6.5	8.0	7.5	7.4

〔騒音：30分〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	5.7	4.6	3.4	0.6	0	0

坐標 隔壁	a	b	a × b	a ²
I	0	5.7	0	0
II	1	4.6	4.6	1
III	3	3.4	10.2	9
IV	5	0.6	3.0	25
V				
VI				
Σ	Σa=9	Σb=14.3	Σab=17.8	Σa ² =35

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{35 \times 14.3 - 9 \times 17.8}{9 \times 14.3 - 4 \times 17.8} = 5.92$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{9 \times 17.8 - 35 \times 14.3}{9^2 - 4 \times 35} = 5.77$$

$$D_{db} = 1.3(8.90 - 5.92) = 3.85$$

〔實驗動物：303〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	4.5	1.0	3.0	3.5	1.5	2.7
II	0.5	0.5	0	1.0	1.0	0.6
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
I	4.0	3.5	4.0	1.5	1.0	2.8

〔騒音：30分〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	2.8	0.8	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	2.8
II	1	0.8

$$q = \frac{2.8}{2.8 - 0.8} = 1.4$$

$$D_{db} = 1.3(8.90 - 1.4) = 9.75$$

〔實驗動物：308〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	〔A〕
I	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
II	2.0	2.5	2.5	3.0	2.0	2.4	
III	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	
VI	0	0	0	0	0	0	〔B〕
V	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
III	0	0	0	0	0	0	
II	5.5	3.0	2.5	3.0	3.0	3.4	
I	6.0	6.0	5.5	6.0	6.5	6.0	

〔騒音：30分〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	5.0	2.9	0	0	0	0

坐標	x	y
隔壁		
I	0	5.0
II	1	2.9

$$q = \frac{5.0}{5.0 - 2.9} = 2.38$$

$$D_{10} = 1.3(8.90 - 2.38) = 8.48$$

〔實驗動物：302〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	〔A〕
I	3.5	3.0	3.5	2.5	3.5	3.2	
II	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.7	
III	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	
VI	0	0	0	0	0	0	〔B〕
V	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
III	0	0	0	0	0	0	
II	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.2	
I	2.0	1.5	2.0	2.5	2.0	2.0	

〔騒音：1時間〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	2.6	1.5	0	0	0	0

坐標	x	y
隔壁		
I	0	2.6
II	1	1.5

$$q = \frac{2.6}{2.6 - 1.5} = 2.36$$

$$D_{10} = 1.3(8.90 - 2.36) = 8.50$$

〔實驗動物：303〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均值
I	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6
II	2.5	1.0	1.0	1.5	2.0	1.6
III	0.5	0.5	0	0.5	0	0.3
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.3
I	1.5	2.0	2.0	1.0	1.5	1.6

〔騒音：1時間〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均值	2.1	1.5	0	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a × b	a ²
I	0	2.1	0	0
II	1	1.5	1.5	1
III	3	0.2	0.6	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa=4	Σb=3.8	Σab=2.1	Σa ² =10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{10 \times 3.8 - 4 \times 2.1}{4 \times 3.8 - 3 \times 2.1} = 3.33$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{4 \times 2.1 - 10 \times 3.8}{4^2 - 3 \times 10} = 2.11$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 3.33) = 7.24$$

〔實驗動物：304〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均值
I	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	6.2
II	3.5	3.0	3.5	3.5	3.0	3.3
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	4.0	3.5	4.5	4.0	4.0	4.0
I	6.0	6.0	5.5	5.0	5.5	5.6

〔騒音：1時間〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均值	5.9	3.7	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	5.9
II	1	3.7

$$q = \frac{5.9}{5.9 - 3.7} = 2.68$$

$$D_{b1} = 1.3(8.90 - 2.68) = 8.09$$

〔實驗動物：305〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値	
I	2.0	0.5	1.0	1.5	1.5	1.3	〔A〕
II	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.9	
III	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	
VI	0	0	0	0	0	0	〔B〕
V	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
III	0	0	0	0	0	0	
II	0.5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	
I	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	1.9	

〔騒音：1時間〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	1.6	1.0	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	1.6
II	1	1.0

$$q = \frac{1.6}{1.6 - 1.0} = 2.67$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 2.67) = 8.10$$

〔實驗動物：307〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値	
I	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	〔A〕
II	0.5	0.5	0.5	0	0	0.3	
III	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	
VI	0	0	0	0	0	0	〔B〕
V	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
III	0	0	0	0	0	0	
II	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.4	
I	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	

〔騒音：1時間〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	1.1	0.4	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	1.1
II	1	0.4

$$q = \frac{1.1}{1.1 - 0.4} = 1.57$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 1.57) = 9.53$$

(2) 持續性騒音裡曝露ノ長期ニ亘レル實驗例

此實驗ハ後編ヲ述ベル處ノ聽器ノ病理組織學的研究ト不可分ノ關係ニ立ツモノデアリ。又實驗材料ヲ共通トシテモ居ルノデ此點ヲ考慮ニ入レテ此機能的實驗ヲ進行サセタノデアル。

然シ乍ラ、海狸ノ長期間飼育ハ種々ノ故障ヲ生ジ易ク、満足スベキ様ニ實驗日數ヲ系統的ニ揃ヘルノニハ苦心ヲ要シタ。

而シテ大體 50 日ヲ最短トシテ 200 日以上ニ及ブ 8 群ニ分類シテ觀察シタノデアル。

1. 50—90日	5. 130日
2. 90—100日	6. 150—160日
3. 100—110日	7. 170—190日
4. 110—120日	8. 190日以後
1. 50—90日。〔D表参照〕

實驗動物：68. 〔A〕ニ於テハ隔壁〔IV〕デ0トナリ〔B〕デハ同様〔III〕ニ於テ出現スル。qハ4.33デ正常量ノ約半分デアル。障礙度ハ5.94db. デアル。(實驗日數：50日)。(Fig. 12).〔附記本章ニ於ケル Figハスベテ附圖(卷末)ノ番號〕。

實驗動物：83. 此實驗動物ハ裝置ノ發スル笛音ノ最強度ニ對シテモ反應シナカツタモノデアアル。全然0デアル。qヲ0トシテ障礙度ハ11.57 db. ノ最大値ヲ呈示スルモノデアアル。

(實驗日數：50日)(第3編第4章第2群記載參照)。

實驗動物：106_(a). 〔A〕ニ於テハ隔壁〔III〕デ僅カニ痕跡ヲ示シ。〔B〕ニ於テハ〔III〕デ未ダ出現シナイ。〔B〕ノ値ハ〔A〕ヨリ低イ。qハ3.00デ7.67db. デアル。(實驗日數：56日)。

實驗動物：72. 隔壁〔III〕ニ於テ消失シテ居ルガqハ1.71デ障礙度ハ9.35db. ノ高度ヲ呈シテ居ル。(實驗日數：58日)。(Fig. 13)。

實驗動物：85. 隔壁〔III〕デ反應ハ消失シテ居ル。〔B〕ノ平均値ハ〔A〕ヨリ低イ。qハ1.65デアリ。障礙度ハ9.43db. デアル。(實驗日數：58日)。(Fig. 14)。

實驗動物：81. 本例デハ隔壁〔III〕デ反射ハ消失シテ居ルガ、qハ2.62デ障礙度ハ8.16db. デアル。(實驗日數：75日)。

以上ノ成績ヲ通覽スルト同ジク實驗日數50日デアツテモ68. ハ比較の輕度ノ障礙ニ留ルガ83ハ最大値ヲ示ス。58日ニ及ブ72ト85ハ殆ンド同一値ヲ示シ9.4db. ニ略々一致スル。

尙ホ少シ日數ヲ隔テルガ實驗日數75日ニ及ブ例デハ障礙度ヲ稍々減ジテキル。先ヅ大部分ニ於テ8.0db. ニ近イカ或ハ此値ヲ越エテキル。

2. 90—100日。

實驗動物：64_(v). 隔壁〔I〕ニ於テハ平均9.2mmデ振幅ハ可ナリ大キイノデアル。〔III〕ニ於テモ約3mmヲ呈シ。〔IV〕デ消失スル。

qハ5.07デ障礙度ハ4.98db. デアル。(實驗日數：93日)。

實驗動物：104_(t). 隔壁〔I〕. 〔II〕ニ於ケル振幅ハ10mmヲ越エルガ〔IV〕ニ於テ反射ハ消失シテキル。qハ4.12デ6.21db. ノ障礙度ヲ示ス。(實驗日數：94日)。

實驗動物：82. 本例ニ於テハ隔壁〔VI〕ニ於テ反射運動ハ0デアルガ、qハ3.63デ障礙度ハ6.85db. デアル。

此90—100日ニ至ル間ノ諸例ハ孰レモ隔壁〔III〕迄ハ明瞭ニ反應スルモノデアアル。

長期間ノ割ニ障礙度ハ輕度ヲ孰レモ近似ノ6.0db. 前後デアル。即チ此期間ニ於テハ障礙度ノ比較の輕度ナル印象ヲ受ケル。

3. 100—110日。

實驗動物: 63. 本例デハ隔壁〔Ⅳ〕カラ消失シテ居リ。qノ値ハ3.22デ障礙度ハ7.38db.ヲ示シテキル。(實驗日數: 102日)。

實驗動物: 87. 隔壁〔Ⅲ〕ヨリ反射運動ハ消失シテキル。qノ値ハ2.30デ障礙度ハ8.58db. デアル。(實驗日數: 104日)。(Fig. 15)。

實驗動物: 65. 〔A〕デハ隔壁〔Ⅲ〕カラ反射ハ消失シテキルガ、〔B〕デハ〔Ⅲ〕ニ於テモ3回測定サレテキル。其最低感度透過枚數ハ2.84デ障礙度ハ7.88db. デアル。(實驗日數: 105日)。(Fig. 21)。

實驗動物: 64. 本例デハ隔壁〔Ⅲ〕カラ耳殻反射運動ハ消失シテ居リ。qハ1.53デ障礙度ハ9.58db. デアル。(實驗日數: 106日)。(Fig. 16)。

實驗動物: 62. 耳殻反射運動ハ只僅カニ隔壁〔Ⅰ〕ニ於テ痕跡ヲ示スニ過ギナイ。此場合ノ障礙度ハ殆ンド11.57 db. ニ近似ノモノデアル。(實驗日數: 109日)。(Fig. 20)。

實驗動物: 84. 隔壁〔Ⅳ〕迄反應ヲ示シ〔Ⅴ〕ニ於テ完全ニ消失シテキル。最低感度透過枚數ハ5.42デ障礙度ハ4.52db. デ表ハサレル。(實驗日數: 110日)。

以上6例ヲ通ジテ見ルト84ガ中等度ヲ示ス他ハ孰レモ多ク7.3db.カラ最大值ニ至ル處ノ高率ヲ示シテキル。先ヅ中等度高率ノ障礙ト云ヒ得ヨウ。

4. 110—120日.

實驗動物: 71. 隔壁〔Ⅲ〕カラ耳殻反射運動ヲ消失シ。最小刺激値透過枚數ハ1.54デアリ。障礙度モ高ク9.57ヲ示ス。(實驗日數: 115日)。(Fig. 22)。

實驗動物: 74. 此例ハ隔壁〔Ⅲ〕カラ耳殻反射ハ消失シテキルガ、〔Ⅰ〕、〔Ⅱ〕デ現ハレル振幅ハ非常ニ大デアリ。隔壁〔Ⅰ〕デハ實ニ17mmヲ

越エル様ナ値ヲ見セテキル。之ニモ拘ハラズ障礙度ハ著シイ。此事實ハ單ナル振幅ノミノ對比デ此耳殻反射運動ノ比較ガ到底行ハルベクモナイ状態ヲヨク示シテキル。

qヲ計算スルト僅カニ1.86デアルカラ障礙度モ大キク9.15db. ノ高率ヲ呈スル。(實驗日數: 115日)。

實驗動物: 106. 此例デハqノ値ハ非常ニ低ク1.22ヲ以テ表ハサレ。從ツテ障礙度モ高率デ9.98db. アル。(實驗日數: 122日)。

以上3例ヲ通ジテ考察スルト此期間デハ、障礙度略々9.1—9.9db. ノ間ニ在ツテ顯著ナ高率ヲ現ハスモノデアルコトガワカツタ。

74ノ如キ例デハ相當大ナル音ノ強サニハ強く反應スルガ、僅カノ減衰ニヨリ急激ニ耳殻反射運動ノ消失ヲ見ルモノデアル。

5. 130日.

實驗動物: 67. 本例デハ〔A〕、〔B〕兩回共ニ隔壁〔Ⅱ〕ニ於テ反射ヲ消失シタ部分ヲ處々ニ見ル。而シテ〔Ⅲ〕デ完全ニ消失ヲ示シテキル。

最低感度透過枚數ヲ求ムレバ1.37デアリ。障礙度ハ9.79db. ノ高率ヲ見ル。(實驗日數: 130日)

實驗動物: 82. 隔壁〔Ⅰ〕デハ大抵10mm以上ヲ計測セラレ〔Ⅳ〕ニ於テ初メテ完全ニ消失スルヲ認メルノデアル。從ツテqノ値ハ比較的大デアリ4.47。又障礙度ハ低ク5.76db. デアル。

實驗動物: 84. 隔壁〔Ⅰ〕ノ振幅及ビ〔Ⅱ〕ノ振幅ハ相當大キイ數值デアルニモ拘ハラズ隔壁〔Ⅳ〕カラ完全ニ反射ハ消失シテ居ル。最低感度透過枚數qハ3.56デアル。障礙度ハ6.24db. デアル。(Fig. 19)。

實驗動物: 101. 先ヅ隔壁〔Ⅲ〕ニ於テ反射ハ0ニナリ。qヲ求メルト1.43デ9.71db. ヲ示

ス。(Fig. 18)。

以上ノ4例ハ孰レモ實驗日數131日デアルガ其半ハ10db.ニ近イ値ヲ示シ半バ僅カニ6db.前後ニ過ギナイ。

6. 150-160日。

實驗動物: 64. 隔壁〔Ⅲ〕ニ於テ耳殻反射運動ノ消失ヲ見ル。qノ値ハ2.2デアリ障礙度ハ8.71db. デアル。(實驗日數: 150日)。

實驗動物: 65. 同様ニ隔壁〔Ⅲ〕ニ於テ完全ナル耳殻反射運動ノ消失ヲ見セテキル。qヲ求メルト1.41デ障礙度ハ9.73db. ヲ示ス。(實驗日數: 150日)。

實驗動物: 66. 本例ハ隔壁〔Ⅱ〕ニ於テ〔A〕, 〔B〕兩回共ニ反射運動ヲ消失セル部分ガアル。qハ殆ンド1ニ近ク1.21デアリ。障礙度モ10.00ノ如キ最大值ニ近イモノヲ示ス。(實驗日數: 151日)。

實驗動物: 103. 隔壁〔Ⅲ〕デ振幅ハ0ヲ示シテ居ル。qハ1.74デ障礙度ハ9.31db. ヲ呈スル。(實驗日數: 162日)。

即チ約5ヶ月以上騒音程ニ曝露センメタ動物デハ此様ニ孰レモ高率ノ障礙度ヲ現ハシテキル。凡ソ此期間ニ於テ障礙ノ極點ニ到達シタ觀ヲ示シ尙ホ之等實驗動物ノ聴器組織ノ所見ト共ニ考察スル場合一層其感ヲ深クスル。

7. 170-190日。

實驗動物: 104. 耳殻反射運動ハ隔壁〔Ⅳ〕デ消失シ。再ビ〔Ⅲ〕デ出現シテキル。qヲ求ムレバ、4.63デアリ。障礙度ハ5.55db. ヲ示ス。(實驗日數: 175日)。

實驗動物: 64. 隔壁〔Ⅳ〕ニ於テモ明カニ反射ハ現ハレテ居リ。〔Ⅴ〕デ初メテ消失シテキル。故ニqノ數値モ正常値ニ比較的近シタモノデ

5.64ヲ示シテキル。

障礙度ハ4.24db. ノ如ク中等度ヨリ稍ニ低イモノデアル。(實驗日數: 177日)。

實驗動物: 106. 耳殻反射運動ハ隔壁〔Ⅳ〕ニ於テ完全ニ消失スル。qノ値ハ4.35デアリ障礙度ハ5.91db. デアル。(實驗日數: 185日)。

以上ノ3例デハ孰レモ5db. 前後ノ比較の輕度ノ障礙ヲ示スモノデアリ騒音作用日數6ヶ月ニ及ブモノハ稍ニ障礙ノ恢復ヲ見ルノデアル。

8. 190日以後。

實驗動物: 104. 耳殻反射運動ハ隔壁〔Ⅳ〕ニ於テ完全ニ消失スル。最小刺激値ノ透過枚數ヲ求メルト3.16デアリ障礙度ハ7.46db. デアル。(實驗日數: 194日)。

實驗動物: 106. 隔壁〔Ⅱ〕ニ於テ既ニ振幅ハ微少デアリ。〔Ⅲ〕ニ至ツテ完全ニ消失シテ居ル。qヲ計算スレバ1.33デ9.84db. デアル。(實驗日數: 194日)。

實驗動物: 54. 耳殻反射運動ハ〔Ⅲ〕ニ於テ消失スル。qハ1.43デ9.71db. ノ高率ヲ示ス。(實驗日數: 210日)。(Fig. 22)。

實驗動物: 55. 本例ハ8ヶ月間騒音程ニ飼育シタモノデアルガ。耳殻反射運動描寫曲線振幅ハ〔A〕ニ於テハ隔壁〔Ⅳ〕迄反射ノ出現ヲ示シ。〔Ⅴ〕ニ至ツテ消失シテ居ル。〔B〕ニ於テハ隔壁〔Ⅳ〕デハ第1カラ第4回迄ハ0デ5回目ニ於テ初メテ0.5mm現ハレテキル。qハ4.86デ障礙度ハ5.25db. デ中等度デアル。(實驗日數: 240日)。

以上ノ實驗成績ヲ考察シテミレバ障礙度ハ、10.00db. ニ近イ高率ノモノ又8ヶ月ノ長期間ニ亘ツタモノデ却テ5.2db. ノ如キ比較的低率ヲ見テ居リ一致シナイ。

即チ實驗動物ハ6ヶ月カラ8ヶ月ニ至ル經過ノ

間ニ其障礙度カラ觀察スルト。著シイマ、ニ留
マルモノト稍々恢復ノ傾向ヲ有スルモノトガ相
混ジテキルト看做サレルノデアル。

Tabelle 5

持續性騒音裡曝露ノ長期ニ亘レル實驗例

1. 50日-90日		
實驗動物	實驗日數	測定値(D _{db})
(1) 68	50	5.94
(2) 83	50	11.57
* (3) 106 ₍₂₎	56	7.67
(4) 72	58	9.35
(5) 85	58	9.43
(6) 81	75	8.16
2. 90日-100日		
(1) 64 ₍₁₎	93	4.98
(2) 104 ₍₁₎	94	6.21
(3) 82	98	6.85
3. 100日-110日		
(1) 63	102	7.38
(2) 87	104	8.58
(3) 65	105	7.89
(4) 64	106	9.58
(5) 62	109	11.57
(6) 84	110	4.52
4. 110日-120日		
(1) 71	115	9.57
(2) 74	115	9.15
(3) 106	122	9.98
5. 130日		
(1) 67	131	9.79
(2) 82	131	5.76
(3) 84	131	6.94
(4) 101	131	9.71
6. 150日-160日		
(1) 64	150	8.71
(2) 65	150	9.74
(3) 66	151	10.00
(4) 103	162	9.32
7. 170日-190日		
(1) 104	175	5.55
(2) 64	177	4.23
(3) 106	185	5.92
8. 190日-240日		
(1) 104	194	7.46
(2) 106	194	9.84
(3) 54	210	9.71
(4) 55	240	5.25

* 實驗動物番號ノ右下ノ小數字番號ハ母數字動物ヨ
リ産レタル仔。z. B. 106₍₂₎ ハ 106 ノ仔 2 號ノ意。

〔D 表〕 〔實驗動物：68〕

隔壁番號	1	2	3	4	5	5 回ノ 平均値
I	7.0	8.0	8.0	9.0	8.5	8.1
II	4.5	3.5	6.0	5.0	5.5	4.9
III	2.5	1.5	2.0	2.0	2.5	2.1
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	2.5	2.5	3.5	1.5	3.5	2.7
II	7.0	7.0	4.0	6.0	6.5	6.1
I	9.5	8.5	7.5	6.0	5.0	7.3

(騒音：50日)

隔壁番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕ノ平均値	7.7	5.5	2.4	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a×b	a ²
I	0	7.7	0	0
II	1	5.5	5.5	1
III	3	2.4	7.2	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa=4	Σb=15.6	Σab=12.7	Σa ² =10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{10 \times 15.6 - 4 \times 12.7}{4 \times 15.6 - 3 \times 12.7} = 4.33$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a^2 - n) \Sigma a^2}$$

$$= \frac{4 \times 12.7 - 10 \times 15.6}{4^2 - 3 \times 10} = 7.51$$

$$D_{db} = 1.3(8.90 - 4.33) = 5.94$$

〔實驗動物：83〕

隔壁番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0

〔騒音：50日〕

隔壁番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕ノ平均値	0	0	0	0	0	0

〔實驗動物：106₍₂₎〕

隔壁番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	6.5	7.0	7.5	6.5	8.0	7.1
II	2.5	3.5	3.0	2.5	3.0	2.9
III	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.6
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	2.0	3.0	2.5	1.5	2.5	2.3
I	4.0	5.0	2.5	4.5	6.0	4.4

〔騒音：56日〕

隔壁番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕ノ平均値	5.8	2.6	0.3	0	0	0

坐標	a	b	a×b	a ²
隔壁				
I	0	5.8	0	0
II	1	2.6	2.6	1
III	3	0.3	0.9	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa=4	Σb=8.7	Σab=3.5	Σa ² =10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} = \frac{10 \times 8.7 - 4 \times 3.5}{4 \times 8.7 - 3 \times 3.5} = 3.00$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a^2 - n \Sigma a^2)} = \frac{4 \times 3.5 - 10 \times 8.7}{4^2 - 3 \times 10} = 5.21$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 3.00) = 7.67$$

〔實驗動物：72〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	3.5	3.5	4.0	3.5	3.0	3.5
II	1.0	1.0	0.5	1.5	2.0	1.2
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	1.5	1.0	0.5	0.5	0	0.7
I	1.0	1.0	1.5	2.0	1.0	1.3

〔騒音：58日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	2.4	1.0	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	2.4
II	1	1.0

$$q = \frac{2.4}{2.4 - 1.0} = 1.71$$

$$D_{db} = 1.3(8.90 - 1.71) = 9.35$$

〔實驗動物：85〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	5.0	3.0	3.0	4.5	5.0	4.1
II	1.5	1.5	2.0	2.0	1.0	1.6
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	0.5	0.5	1.5	3.0	1.0	1.3
I	2.5	3.5	3.0	4.5	3.5	3.4

〔騒音：58日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	3.8	1.5	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	3.8
II	1	1.5

$$q = \frac{3.8}{3.8 - 1.5} = 1.65$$

$$D_{db} = 1.3(8.90 - 1.65) = 9.43$$

〔實驗動物: 81〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	3.0	3.0	2.5	3.0	2.5	2.8
II	1.0	2.5	2.0	2.0	2.0	1.9
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	3.5	2.0	2.5	1.5	2.0	2.3
I	6.0	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0

〔騒音: 75日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	3.4	2.1	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	3.4
II	1	2.1

$$q = \frac{3.4}{3.4 - 2.1} = 2.62$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 2.62) = 8.16$$

〔實驗動物: 64₍₁₎〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	9.5	9.5	9.0	9.0	9.0	9.2
II	7.0	6.5	8.0	6.5	5.0	6.6
III	4.5	3.5	3.0	3.0	2.5	3.3
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	5.0	4.5	3.5	3.0	3.5	3.9
II	7.5	6.5	6.5	6.5	7.0	6.8
I	7.5	8.0	8.5	9.5	8.0	8.3

〔騒音: 93日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	8.8	6.7	3.6	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a × b	a ²
I	0	8.8	0	0
II	1	6.7	6.7	1
III	3	3.6	10.8	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa = 4	Σb = 19.1	Σab = 17.5	Σa ² = 10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} = \frac{10 \times 19.1 - 4 \times 17.5}{4 \times 19.1 - 3 \times 17.5} = 5.07$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} = \frac{4 \times 17.5 - 10 \times 19.1}{4^2 - 3 \times 10} = 8.64$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 5.07) = 4.98$$

〔實驗動物：104₍₁₎〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	16.5	15.0	16.5	13.0	13.5	14.9
II	15.0	11.0	10.5	8.5	10.0	11.0
III	5.0	5.0	4.5	3.5	3.0	4.2
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	3.0	5.0	3.5	4.5	5.0	4.2
II	10.0	12.5	12.0	12.0	11.5	11.6
I	16.5	15.0	15.0	15.0	16.5	15.6

〔騒音：94日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	15.3	11.3	4.2	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a×b	a ²
I	0	15.3	0	0
II	1	11.3	11.3	1
III	3	4.2	12.6	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa=4	Σb=30.8	Σab=23.9	Σa ² =10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{10 \times 30.8 - 4 \times 23.9}{4 \times 30.8 - 3 \times 23.9} = 4.12$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{4 \times 23.9 - 10 \times 30.8}{4^2 - 3 \times 10} = 15.17$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 4.12) = 6.21$$

〔實驗動物：82〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	10.0	9.5	10.0	10.0	8.0	9.5
II	5.5	5.0	4.5	6.0	6.0	5.4
III	2.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
II	5.0	3.5	6.0	6.5	6.0	5.4
I	9.0	8.5	9.0	9.5	9.0	9.0

〔騒音：98日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	9.3	5.4	1.8	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a×b	a ²
I	0	9.3	0	0
II	1	5.4	5.4	1
III	3	1.8	5.4	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa=4	Σb=16.5	Σab=10.8	Σa ² =10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{10 \times 16.5 - 4 \times 10.8}{4 \times 16.5 - 3 \times 10.8} = 3.63$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{4 \times 10.8 - 10 \times 16.5}{4^2 - 3 \times 10} = 8.70$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 3.63) = 6.85$$

〔實驗動物：63〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
I	11.0	10.5	9.0	10.0	8.0	9.7	〔A〕
II	4.5	4.5	4.0	5.0	4.0	4.4	
III	1.0	1.0	2.0	0.5	1.0	1.1	
IV	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	
VI	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	〔B〕
IV	0	0	0	0	0	0	
III	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.7	
II	4.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.7	
I	6.0	10.5	6.5	7.5	9.0	7.9	

〔騒音…102日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	8.8	4.6	0.9	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a × b	a ²
I	0	8.8	0	0
II	1	4.6	4.6	1
III	3	0.9	2.7	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa = 4	Σb = 14.3	Σab = 7.3	Σa ² = 10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{10 \times 14.3 - 4 \times 7.3}{4 \times 14.3 - 3 \times 7.3} = 3.22$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{4 \times 7.3 - 10 \times 14.3}{4^2 - 3 \times 10} = 8.13$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 3.22) = 7.38$$

〔實驗動物：87〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
I	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5	4.3	〔A〕
II	3.5	3.0	2.5	2.5	2.0	2.7	
III	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	
VI	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	〔B〕
IV	0	0	0	0	0	0	
III	0	0	0	0	0	0	
II	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	2.4	
I	5.5	4.5	4.5	5.0	4.5	4.8	

〔騒音：104日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	4.6	2.6	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	4.6
II	1	2.6

$$q = \frac{4.6}{4.6 - 2.6} = 2.30$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 2.30) = 8.58$$

〔實驗動物：65〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値	〔A〕
I	8.0	6.5	4.5	6.0	5.0	6.0	
II	1.5	1.0	2.5	1.5	1.0	1.5	
III	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	
VI	0	0	0	0	0	0	〔B〕
V	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
III	0	0.5	0.5	0	0.5	0.3	
II	4.0	2.0	1.0	4.5	1.5	2.6	
I	10.0	5.5	6.0	6.5	9.0	7.4	

〔騒音：105日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	6.7	2.1	0.3	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a×b	a ²
I	0	6.7	0	0
II	1	2.1	2.1	1
III	3	0.2	0.6	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa=4	Σb=9.0	Σab=2.7	Σa ² =10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{10 \times 9 - 4 \times 2.7}{4 \times 9 - 3 \times 2.7} = 2.84$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{4 \times 2.7 - 10 \times 9}{4^2 - 3 \times 10} = 5.66$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 2.84) = 7.88$$

〔實驗動物：64〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値	〔A〕
I	5.5	4.5	4.5	4.0	5.5	4.8	
II	1.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	
III	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	
VI	0	0	0	0	0	0	〔B〕
V	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
III	0	0	0	0	0	0	
II	4.5	3.5	3.0	2.5	2.5	3.2	
I	8.0	7.0	7.0	7.0	7.5	7.3	

〔騒音：106日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	6.1	2.1	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	6.1
II	1	2.1

$$q = \frac{6.1}{6.1 - 2.1} = 1.53$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 1.53) = 9.58$$

〔實驗動物：62〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.8
II	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0
I	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2

〔騒音：109日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	1.0	0	0	0	0	0

坐標	x	y
隔壁 I		
II		

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} =$$

$$D_{ab} = 11.57$$

〔實驗動物：84〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	11.5	12.5	14.0	14.0	14.0	13.2
II	8.5	8.5	11.5	11.5	10.0	10.0
III	6.5	6.5	6.5	7.5	6.5	6.7
IV	1.0	1.0	0.5	0	0	0.5
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.8
III	8.0	6.5	6.5	5.0	6.5	6.5
II	11.5	10.5	11.5	11.0	9.0	0.7
I	13.0	12.5	12.0	14.0	15.0	13.3

〔騒音：110日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	13.3	10.4	6.6	0.7	0	0

坐標	a	b	a · b	a ²
隔壁 I	0	13.3	0	0
II	1	10.4	10.4	1
III	3	6.6	19.8	9
IV	5	0.7	3.5	25
V				
VI				
Σ	Σa = 9	Σb = 31.0	Σab = 33.7	Σa ² = 35

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} = \frac{35 \times 31.0 - 9 \times 33.7}{9 \times 31.0 - 4 \times 33.7} = 5.42$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} = \frac{9 \times 33.7 - 35 \times 31.0}{9^2 - 4 \times 35} = 13.08$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 5.42) = 4.52$$

〔實驗動物：71〕

隔壁番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	5.5	5.0	4.0	5.5	6.0	5.2
II	0.5	1.0	1.0	3.0	2.0	1.5
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.2
I	4.5	5.0	6.5	6.0	5.0	5.5

〔A〕

〔B〕

〔騒音：115日〕

隔壁番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕ノ平均値	5.4	1.9	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	5.4
II	1	1.9

$$q = \frac{5.4}{5.4 - 1.9} = 1.54$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 1.54) = 9.57$$

〔實驗動物：74〕

隔壁番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	15.0	18.0	16.0	18.0	18.5	17.1
II	12.0	5.0	5.5	8.0	8.0	7.7
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	10.0	8.0	7.0	9.0	7.0	8.2
I	11.0	13.5	18.5	18.5	18.0	17.5

〔A〕

〔B〕

〔騒音：115日〕

隔壁番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕ノ平均値	17.3	8.0	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	17.3
II	1	8.0

$$q = \frac{17.3}{17.3 - 8.0} = 1.86$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 1.86) = 9.15$$

〔實驗動物：106〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
I	6.5	6.5	4.5	7.0	4.5	5.8	〔A〕
II	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.9	
III	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	
VI	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	〔B〕
IV	0	0	0	0	0	0	
III	0	0	0	0	0	0	
II	0	0.5	1.0	1.0	2.0	0.9	
I	5.5	4.0	4.5	2.5	4.0	4.1	

〔騒音：122日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	5.0	0.9	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	5.0
II	1	0.9

$$q = \frac{5.0}{5.0 - 0.9} = 1.22$$

$$D_{db} = 1.3(8.90 - 1.22) = 9.98$$

〔實驗動物：67〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
I	2.0	2.0	2.5	2.0	2.5	2.2	〔A〕
II	0.5	0.5	0.5	0	0	0.3	
III	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	
VI	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	〔B〕
IV	0	0	0	0	0	0	
III	0	0	0	0	0	0	
II	0.5	0	0.5	1.5	1.5	1.0	
I	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	3.0	

〔騒音：131日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	2.6	0.7	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	2.6
II	1	0.7

$$q = \frac{2.6}{2.6 - 0.7} = 1.37$$

$$D_{db} = 1.3(8.90 - 1.37) = 9.79$$

〔實驗動物：82〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	13.0	11.5	10.0	10.0	9.0	10.7
II	8.0	6.5	5.5	7.0	6.0	6.6
III	4.0	2.0	1.5	3.0	2.0	2.5
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	5.5	5.5	4.5	4.5	5.0	5.0
II	9.0	10.5	8.0	8.5	6.5	8.5
I	13.0	12.0	11.5	10.0	11.5	11.8

〔A〕

〔B〕

〔騒音：131日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	11.3	7.6	3.8	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a×b	a ²
I	0	11.3	0	0
II	1	7.6	7.6	1
III	3	3.8	11.4	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa=4	Σb=22.7	Σab=19	Σa ² =10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{10 \times 22.7 - 4 \times 19}{4 \times 22.7 - 3 \times 19} = 4.47$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{4 \times 19 - 10 \times 22.7}{4^2 - 3 \times 10} = 10.79$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 4.47) = 5.76$$

〔實驗動物：84〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	19.0	18.5	19.5	18.0	18.0	18.6
II	12.0	11.5	10.5	12.5	12.0	11.7
III	2.5	5.0	3.0	2.5	2.5	3.1
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	1.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0
II	11.5	10.5	9.5	9.0	9.0	9.9
I	14.0	19.0	19.5	17.5	15.0	17.0

〔A〕

〔B〕

〔騒音：131日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	17.8	10.8	3.1	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a×b	a ²
I	0	17.8	0	0
II	1	10.8	10.8	1
III	3	3.1	9.3	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa=4	Σb=31.7	Σab=20.1	Σa ² =10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{10 \times 31.7 - 4 \times 20.1}{4 \times 31.7 - 3 \times 20.1} = 3.56$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{4 \times 20.1 - 10 \times 31.7}{4^2 - 3 \times 10} = 16.83$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 3.56) = 6.94$$

〔實驗動物：101〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	8.0	7.0	7.5	7.0	7.5	7.4
II	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	1.7
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	3.0	1.0	2.5	3.5	3.0	2.6
I	8.0	7.0	8.0	6.0	7.0	7.2

〔騒音：131日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	7.3	2.2	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	7.3
II	1	2.2

$$q = \frac{7.3}{7.3 - 2.2} = 1.43$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 1.43) = 9.71$$

〔實驗動物：64〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	3.0	3.0	3.0	2.5	3.0	2.9
II	2.0	1.0	1.5	1.0	0.5	1.2
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	1.5	1.0	0.5	1.5	1.0	1.1
I	2.0	1.5	1.0	1.0	2.0	1.5

〔騒音：150日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	2.2	1.2	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	2.2
II	1	1.2

$$q = \frac{2.2}{2.2 - 1.2} = 2.2$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 2.2) = 8.71$$

〔實驗動物：65〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	6.0	5.0	6.0	5.5	4.0	5.3
II	2.0	1.5	0.5	1.0	0.5	1.1
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	1.5	1.5	2.5	4.0	2.0	2.3
I	6.5	7.0	4.0	7.0	6.5	6.2

〔騒音：150日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	5.8	1.7	0	0	0	0

坐標	x	y
隔壁		
I	0	5.8
II	1	1.7

$$q = \frac{5.8}{5.8 - 1.7} = 1.41$$

$$D_{db} = 1.3(8.90 - 1.41) = 9.74$$

〔實驗動物：66〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	3.0	3.0	2.5	3.0	2.5	2.8
II	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0.4
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	0.5	0	0.5	0	0	0
I	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.6

〔騒音：151日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	1.7	0.3	0	0	0	0

坐標	x	y
隔壁		
I	0	1.7
II	1	0.3

$$q = \frac{1.7}{1.7 - 0.3} = 1.21$$

$$D_{db} = 1.3(8.90 - 1.21) = 10.00$$

〔實驗動物：103〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
II	1.5	1.5	1.0	2.0	2.0	1.6
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	1.5	1.5	2.5	2.5	3.5	2.3
I	4.5	5.0	5.5	4.5	5.0	4.9

〔騒音：162日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
[A][B] ノ平均値	4.7	2.0	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	4.7
II	1	2.0

$$q = \frac{4.7}{4.7 - 2.0} = 1.74$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 1.74) = 9.32$$

〔實驗動物：104〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
I	7.0	9.0	6.5	8.5	6.5	7.5
II	4.5	4.0	4.0	5.5	5.5	4.7
III	2.5	2.5	3.5	3.0	2.0	2.7
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	2.5	3.0	2.5	2.5	2.5	2.6
II	5.0	5.5	5.5	4.0	5.0	5.0
I	8.0	7.5	6.5	7.0	8.5	7.5

〔騒音：175日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
[A][B] ノ平均値	7.5	4.9	2.7	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a × b	a ²
I	0	7.5	0	0
II	1	4.9	4.9	1
III	3	2.7	8.1	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa = 4	Σb = 15.1	Σab = 13.0	Σa ² = 10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} = \frac{10 \times 15.1 - 4 \times 13.0}{4 \times 15.1 - 3 \times 13.0} = 4.63$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} = \frac{4 \times 13.0 - 10 \times 15.1}{4^2 - 3 \times 10} = 7.07$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 4.63) = 5.55$$

(實驗動物: 64)

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	9.5	8.5	9.5	8.5	9.0	9.0
II	8.0	8.0	8.0	7.5	8.0	7.9
III	4.5	5.0	3.5	3.5	4.0	4.1
IV	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.7
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	1.0	0.5	2.0	2.0	1.5	1.4
III	4.5	4.5	3.5	5.0	4.5	4.4
II	8.5	7.0	9.0	8.5	8.5	8.3
I	11.0	8.0	9.0	9.5	10.0	9.5

(騒音: 177日)

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	9.3	8.1	4.3	1.1	0	0

坐標 隔壁	a	b	a×b	a ²
I	0	9.3	0	0
II	1	8.1	8.1	1
III	3	4.3	12.9	9
IV	5	1.1	5.5	25
V				
VI				
Σ	Σa=9	Σb=22.8	Σab=26.5	Σa ² =35

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{35 \times 22.8 - 9 \times 26.5}{9 \times 22.8 - 4 \times 26.5} = 5.64$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{9 \times 26.5 - 35 \times 22.8}{9^2 - 4 \times 35} = 9.48$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 5.64) = 4.24$$

(實驗動物: 106)

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	8.5	9.5	12.0	8.5	9.0	9.5
II	6.5	4.5	7.5	5.5	9.0	6.6
III	3.5	3.5	2.0	2.5	2.5	2.8
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	2.0	3.0	2.5	3.5	3.0	2.8
II	4.0	3.0	4.5	4.5	5.5	4.3
I	8.5	7.0	7.0	8.5	8.0	7.8

(騒音: 165日)

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	8.7	5.5	2.8	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a×b	a ²
I	0	8.7	0	0
II	1	5.5	5.5	1
III	3	2.8	8.4	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa=4	Σb=17	Σab=13.9	Σa ² =10

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{10 \times 17.0 - 4 \times 13.9}{4 \times 17.0 - 3 \times 13.9} = 4.35$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{4 \times 13.9 - 10 \times 17.0}{4^2 - 3 \times 10} = 8.17$$

$$D_{(b)} = 1.3(8.90 - 4.35) = 5.92$$

(實驗動物: 104)

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	12.5	8.5	10.5	11.5	10.5	10.7
II	5.5	5.5	8.0	6.5	5.0	6.1
III	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.3
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	1.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.3
II	4.0	5.5	6.5	5.5	5.5	5.4
I	11.0	12.5	10.5	9.5	8.5	10.4

(騒音: 194日)

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	10.6	5.8	1.3	0	0	0

坐標 隔壁	a	b	a × b	a ²
I	0	10.6	0	0
II	1	5.8	5.8	1
III	3	1.3	3.9	9
IV				
V				
VI				
Σ	Σa = 4	Σb = 17.7	Σab = 9.7	Σa ² = 10

$$r = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab}$$

$$= \frac{10 \times 17.7 - 4 \times 9.7}{4 \times 17.7 - 3 \times 9.7} = 3.16$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2}$$

$$= \frac{4 \times 9.7 - 10 \times 17.7}{4^2 - 3 \times 10} = 9.87$$

$$D_{ab} = 1.3 (8.90 - 3.16) = 7.46$$

(實驗動物: 106)

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
I	1.5	2.0	2.0	1.5	3.0	2.0
II	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
II	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
I	1.5	2.5	2.0	2.0	1.5	1.9

(騒音: 194日)

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
(A)(B) ノ平均値	2.0	0.5	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	2.0
II	1	0.5

$$r = \frac{2.0}{2.0 - 0.5} = 1.33$$

$$D_{ab} = 1.3 (8.90 - 1.33) = 9.84$$

〔實驗動物：54〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値	
I	3.5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.3	〔A〕
II	2.0	1.0	1.5	1.0	0	1.1	
III	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
V	0	0	0	0	0	0	
VI	0	0	0	0	0	0	〔B〕
V	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0	0	
III	0	0	0	0	0	0	
II	1.0	1.0	1.0	0	1.0	0.8	
I	3.5	3.0	3.5	3.5	3.0	3.3	

〔騒音：210日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	3.3	1.0	0	0	0	0

坐標 隔壁	x	y
I	0	3.3
II	1	1.0

$$q = \frac{3.3}{3.3 - 1.0} = 1.43$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 1.43) = 9.71$$

〔實驗動物：55〕

隔壁 番號	1	2	3	4	5	5回/ 平均値	
I	12.5	10.5	12.0	11.5	11.0	11.5	〔A〕
II	8.0	8.0	9.5	6.5	8.0	8.0	
III	2.5	1.5	3.5	3.0	3.5	2.8	
IV	1.5	1.0	0.5	0.5	1.5	1.0	
V	0	0	0	0	0	0	
VI	0	0	0	0	0	0	〔B〕
V	0	0	0	0	0	0	
IV	0	0	0	0	0.5	0.1	
III	3.0	1.0	3.0	0.5	2.0	1.9	
II	5.0	4.5	6.5	5.5	6.5	5.6	
I	10.5	10.0	10.0	8.0	9.0	9.5	

〔騒音：240日〕

隔壁 番號	I	II	III	IV	V	VI
〔A〕〔B〕 ノ平均値	10.5	6.8	2.4	0.6	0	0

坐標 隔壁	a	b	a × b	a ²
I	0	10.5	0	0
II	1	6.8	6.8	1
III	3	2.4	7.2	9
IV	5	0.6	3.0	25
V				
VI				
Σ	Σa = 9	Σb = 20.3	Σab = 17.0	Σa ² = 35

$$q = \frac{\Sigma a^2 \Sigma b - \Sigma a \Sigma ab}{\Sigma a \Sigma b - n \Sigma ab} = \frac{35 \times 20.3 - 9 \times 17}{9 \times 20.3 - 4 \times 17} = 4.86$$

$$Y = \frac{\Sigma a \Sigma ab - \Sigma a^2 \Sigma b}{(\Sigma a)^2 - n \Sigma a^2} = \frac{9 \times 17 - 35 \times 20.3}{9^2 - 4 \times 35} = 9.45$$

$$D_{ab} = 1.3(8.90 - 4.86) = 5.25$$

II. 第二實驗ノ成績

此實驗ニ於テハ實驗動物海猿ニ a^3-a^4 ノ間ノ 8 音ヲ聴取センメ騒音ニヨリ障礙サレタ聴覺ガ刺激音ノ質的變化ニ對シテ如何ナル態度ヲトルカ。作用センメタ騒音ヲ分析シタ結果ノ部分音ニ對シ選擇的ナ障礙ヲ蒙ツテキルカ等ヲ明白ニシヨウトスルモノデアル。

既ニ前章ニ於テ明ラカニシタ様ニ正常ナル聴覺ヲ有スル海猿ハ一定壓ヲ以テ之等ノ音ヲ發センメル場合略々同ジ高サノ攣縮高ヲ以テ應ズルノデアルカラ。障礙ヲ受ケタ動物ニ就テ其耳殻反射運動ノ大サヲ比較スルニ當ツテモ各音ニ相對應スル攣縮高ヲ其儘相互ニ對比檢討スルコトガ可能デアル譯デアル。此場合モ對照動物ト同様ニ $a^3, h^3, c^4, d^4, e^4, f^4, g^4, a^4$ ト順次高音ニ向フ場合ヲ〔A〕回トシテ續キ a^4 ヨリ逆ニ a^3 ニ向フ場合ヲ〔B〕回トシ各音ニ就キ 5 回宛實驗スルノデ 1 音ニ就キ 10 回測定セラレ夫等ヲ平均シテ得タル値ヲ「グラフ」ニ表ハシテ觀察ヲ便ナラシメタノデアル。〔表 E, F〕。

1. 40—60日。

實驗動物：71. a^3-a^4 ノ間ニ 1 mm 以上ノ攣縮高ヲ示スモノハ見當ラナイ。 c^4, g^4, a^4 デ耳殻反射運動ハ完全ニ 0 デアル。(實驗日數：43日)。(Fig. 24)。

實驗動物：68. a^3 カラ d^4 マデハ略々 6 mm 前後ノ數値ヲ示スガ e^4, f^4 デ急ニ低ク僅カ 1.6 mm ニ過ギズ。 g^4 ハ稍々高く 3 mm, a^4 ハ最も低ク 1.3 mm デアル。(實驗日數：50日)。(Fig. 26)。

實驗動物：83. a^3 カラ d^4 マデ完全ニ 0 デ此間ハ海猿ハ全聾デアル。本例ハ組織學的檢索ノ所見ト併セ考ヘ興味アル 1 例デアル。(實驗日數：50日)。(Fig. 25)。(第 3 編第 4 章參照)。

實驗動物：106₍₂₎. a^3 ヨリ d^4 マデハ 8 mm 前後デアル。 e^4 ハ稍々低ク f^4 カラ急ニ低ク 3.7 mm, g^4 ハ 3.9 mm, a^4 ハ 3.2 mm デアル。(實驗日數：56日)。

實驗動物：72. 全體トシテ振幅ハ小サイ。孰レモ 3 mm 以上ノモノハナイ。 f^4 デ更ニ低ク 1.3 mm ヲ示シ。 g^4, a^4 デハ全然反應シナイ。

(實驗日數：58日)。(Fig. 28)。

以上ノ 6 例ニ就キ考察スルト a^3-a^4 ノ間全體トシテ略々一樣ニ低クナツテキルノハ 83ノ全體トヲ除イテハ 71 及ビ 72 デアリ。夫等デハ g^4, a^4 ハ消失シテキル。其他 68, 106₍₂₎ 等デハ一樣ニ勿論高サヲ減ジテ居ルガ a^3-d^4 迄ノ減ジ方ハ輕度デ e^4 ヨリ a^4 迄急激ニ顯著ニ高サヲ減ジテキル。要スルニ程度コソ異ルガ e^4, f^4, g^4, a^4 ニ於テ此期間ニ攣縮高ノ減少ヲ認メルノデアル。

2. 75—100日。

實驗動物：81. 全體トシテ振幅ハ低ク 3 mm 未満ノモノガ多イ。之モ同様 e^4 ニ至ツテ急ニ低ク 1.8 mm トナリ。 f^4 ハ更ニ減ジテ 0.9 mm, g^4 デハ消失シ。 a^4 デハ只僅カニ 3 mm デアル。

(實驗日數：75日)。

實驗動物：73. a^3, h^3 デハ 9 mm ヲ越エ。 c^4, d^4 ハ 7 mm 前後アルガ e^4 ハ稍々低ク 5.9 mm, f^4 ハ 4.2 mm, g^4 ハ 3.8 mm, a^4 ハ 4.8 mm デアルカラ一般ニ減リ方ハ著シクナイ。然シ f^4-a^4 ノ間ガ最高ナルモノハ約半分ヲ保ツテキル。(實驗日數：87日)。(Fig. 29)。

實驗動物：64₍₁₎. 概ネ f^4 迄ハ 8 mm カラ 10 mm 迄アリ相當高ク。 g^4 ハ 5.8 mm, a^4 モ尙ホ 6.8 mm ヲ有スル。(實驗日數：93日)。

實驗動物：103₍₂₎. 此例モ前者即チ 64₍₁₎ ト類似デアル。 a^3 デ最も高く 11.8 mm, h^3-d^4 ノ間

ハ8mm以上アリ。e⁴デ稍々低ク6.2mm. f⁴ハ最も低ク5.0mm. g⁴ハ6.8mm. a⁴ハ5.8mmデアル。(實驗日數: 94日)。

實驗動物: 104₀。f⁴トg⁴ヲ除イテハ全體トシテ振幅ハ低クナイ。a³カラd⁴マデハ15mmニ近イカ。其以上ノ數値ヲ示シe⁴ハ11.3mm. f⁴ハ急ニ低ク僅カ3.8mmデアリ。g⁴モ低ク5.9mmデアル。a⁴ニ至ツテ再び復シe⁴ニ其高サ略々等シク11.1mmデアル。此例デハf⁴. g⁴ノ2音ハ全ク島嶼狀ニ小サクナツテキル。(實驗日數: 94日)。

實驗動物: 82。此例デハ同様ニa³. h³ノ2音ハ最も高ク10mmヲ越エ。c⁴カラe⁴迄ハ8mm以上アリ。f⁴トg⁴ノ急ニ低ク。f⁴ハ3.8mmデg⁴ハ4.4mmヲ示シa⁴ハ又高ク8mmヲ保ツテ居ル。其狀態ハ全ク前者ト相似テキル。以上ノ6例ヲ通ジテ考察スレバ、實驗日數ノ75日デアル81ヲ除イテハ全體トシテノ振幅ハ概シテ高ク、10mmニ近イモノ或ハ遙カニ10mmヲ越エルモノデアルガf⁴. g⁴ノ2音ダケハ顯著ニ低イモノガ多クe⁴之ニ次グ。即チ此期間ニ於テハe⁴. f⁴. g⁴等ヲ除イテハ著シク他ノ音ニ對スル振幅ヲ恢復スルノ觀ヲ呈シテキル。

3. 100—120日。

實驗動物: 63。本例デハa³カラc⁴迄ハ5mm前後デアルガ、d⁴ハ3mmデ稍々低ク。e⁴ハ2.8mmデアリ。f⁴ニ於テハ消失シテ0デアル。次ニg⁴ニ於テ1.8mmト現ハレa⁴ハ1.8mmデアル。(實驗日數: 102日)。(Fig. 30)。

實驗動物: 87。之モ前者ト略々同様デa³. h³ハ夫々約5mm. c⁴ハ稍々低ク3.9mm. d⁴ハ4.3mm. e⁴ニ至ツテハ3.5mmト下リ。f⁴ハ0.4mm

デ最低デアリ。g⁴ハ0.7mm. a⁴ハ0.9mmデ之ニ次グ。(實驗日數: 104日)。

實驗動物: 65。a³ニ於テ耳殻反射ハ最も高ク12.5mmデh³カラd⁴迄ハ8mm前後。e⁴ハ稍々低ク5.5mmデアル。更ニf⁴ニ至リ3.5mmニ下リg⁴ハ最低デ1.1mmニ過ギスカラ最高ノa³ノ1/10以下デアル。a⁴ハ2.1mmデ之ニ次グ。(實驗日數: 105日)。(Fig. 31)。

實驗動物: 64。a³カラd⁴ニ至ル迄ハ略々4mmヲ保持シテ居ル。e⁴ニ於テ稍々低ク2.7mmヲ示シf⁴ハ最も低ク0.3mmデ。g⁴之ニ次ギ0.7mm. a⁴ハ稍々高ク1.2mmデアル。(實驗日數: 106日)。(Fig. 32)。

實驗動物: 62。全體トシテ著シク振幅ハ低イ。即チa³デハ僅カニ1.3mm. l³ハ2.1mmデ。c⁴ハ更ニ低ク0.6mmデアル。d⁴デハ2.1mm. e⁴ニ於テハ著シク低クテ0.3mmヲ示シ。f⁴. g⁴. a⁴ハ孰レモ消失シテ0デアル。(實驗日數: 109日)。(Fig. 33)。

實驗動物: 84。此例ニ於テハ一般ニ振幅ハ高クa³カラc⁴迄孰レモ10mm以上デアル。f⁴ニ至ツテ急ニ下リ僅カニ3.6mmヲ示スニ過ギス。g⁴デハ6.3mm. a⁴デハ4.9mmデアル。(實驗日數: 110日)。

實驗動物: 71。a³ハ最高デ7.3mmデh³. c⁴. d⁴ハ孰レモ5mmト6mmノ間ニアリ。e⁴デ稍々下ツテ3.8mmヲ示シf⁴. g⁴ハ0. a⁴ハ3.3mmデアル。(實驗日數: 115日)。(Fig. 34)。

實驗動物: 74。耳殻反射運動振幅ハa³ニ於テ17.2mmノ高イ數値ヲ示シ。h³ハ15.4mm. c⁴ハ14.1mm. d⁴ハ11.3mm. e⁴ニ至ルト稍々低ク9.3mmデアル。而シテf⁴デハ僅カニ2.1mmニ過ギナイ。g⁴ハ7.9mm. a⁴ハ4.5mmデアル。

(實驗日數: 115日)。

要スルニ62ニ於テ比較的普遍性ニ低マツテキル他ニハ孰レモ f^4 , g^4 ガ特ニ消失又ハ著シク微弱ニ反應シテ居ルニ對シ他ノ音ハ相當ニ反應シ其間ノ開キヲ大ニシテ居ルコトガワカル。 f^4 , g^4 ニ次ギ a^4 及ビ e^4 ガ低イノモ明白デアル。

4. 120—130日。

實驗動物: 106. a^3 — c^4 迄ハ5mm内外。 d^4 ハ稍ニ低ク3.2mm。 e^4 ニ於テ又5mm。 f^4 ハ著シク低ク1.7mmデ g^4 ハ0.6mm。 a^4 ハ0.8mmデアル。(實驗日數: 122日)。

實驗動物: 67. a^3 — d^4 ノ間ハ約4mm。 e^4 デハ2.4mm。 f^4 ハ顯著ニ低ク0.3mm。 g^4 ハ0.7mmデ a^4 ニ於テ稍ニ増大シテ3.2mmデアル。(實驗日數: 131日)。

實驗動物: 82. a^3 — d^4 ノ間ハ略ニ同高デ孰レモ11mmヲ越エ。 e^4 ハ9.4mm。 f^4 ハ7.2mmデ g^4 ハ6.9mm。 a^4 ハ最低デ3mmデアル。(實驗日數: 131日)。(Fig. 35)。

實驗動物: 84. a^3 ト h^3 ハ著シク高ク20mmヲ越エ。 c^4 ト d^4 ハ17mmヲ越エ。 e^4 ハ急ニ低クテ8.4mmデアル。 f^4 ハ2.7mmト更ニ下リ。 g^4 ハ3.2mm。 a^4 ハ稍ニ高ク6.3mmデアル。(實驗日數: 131日)。(Fig. 36)。

實驗動物: 101. a^3 カラ d^4 迄ハ5—6mmヲ有シ e^4 ハ稍ニ低ク3.2mm。 f^4 ハ僅カニ0.6mm。 g^4 , a^4 ハ全ク消失シテ居リ0デアル。(實驗日數: 131日)。(Fig. 37)。

概シテ攣縮高ハ低マリ。 f^4 , g^4 ノ減少ハ愈々著シク a^4 , e^4 ノ低下ニ次グ。84ノ如ク a^3 ヨリ d^4 迄ノ間ハ著シク高イガ夫レダケ f^4 , g^4 , a^4 等ノ低下ハ顯著ニナツテキル。

5. 150—160日。

實驗動物: 64. a^4 ガ最低デ1.4mm。 a^3 — d^4 迄ハ3mmカラ4mm。 e^4 — g^4 迄ハ2mmヲ越エル數値デ全體トシテ揃ツテ低イ。(實驗日數: 150日)。

實驗動物: 65. a^3 ト h^3 ハ最高デ8mmヲ越エ。 c^4 , d^4 ハ5mmヲ越エ。 e^4 ハ稍ニ低ク4.5mm。 f^4 デ著シク低下シテ1.4mm。 g^4 ハ更ニ低ク0.9mm。 a^4 ハ完全ニ消失シテ0デアル。(實驗日數: 150日)。

實驗動物: 66. a^3 — c^4 ノ間ハ3mmヲ越エ。 d^4 ハ稍ニ低ク e^4 ハ更ニ低ク1.8mm。 f^4 , g^4 ハ完全ニ消失シテ0デアリ。 a^4 ハ0.8mmヲ示ス。(實驗日數: 151日)。

實驗動物: 106. a^3 ガ最高デ5.9mm。 h^3 ト e^4 ハ3—4mmノ間。 d^4 ハ1.6mm。 e^4 ハ急ニ下ツテ0.3mmデアリ。 f^4 , g^4 ハ完全ニ消失シテ0。 a^4 ハ0.6mmデアル。(實驗日數: 162日)。

以上ノ4例ヲ通覽スルト e^4 ノ下降ト f^4 , g^4 , a^4 ノ順序ノ消失ヘノ傾向及ビ全體トシテノ低下ガ認めラレル。

6. 170—190日。

實驗動物: 104. a^3 — d^4 迄ハ8—9mmノ間ニアリ。 e^4 ニ於テハ5.4mmニ低下シ。 f^4 デハ僅カニ1.6mm。 g^4 ハ2mm。 a^4 ハ1.2mmニ過ギナイ。(實驗日數: 175日)。

實驗動物: 64. 全體トシテ振幅ハ相當高ク。 a^3 — d^4 ノ間ハ10mmヲ越エ。 e^4 ハ8.4mmデ。 f^4 ハ6.1mm。 g^4 ハ6.9mm。 a^4 ハ最低デ5mmデアル。(實驗日數: 179日)。

實驗動物: 106. f^4 , g^4 ハ完全ニ消失シ e^4 ハ1.4mm。 a^4 ハ1.8mmデ a^3 — d^4 ノ間ハ略ニ3—5mmヲ占メル。(實驗日數: 185日)。

7. 190—240日。

實驗動物: 104. a^3 ハ最高デ 14.6mm デ h^3 ハ 12.3mm. c^4 ハ 12.1mm デアリ. d^4 = 至ツテ急ニ下降シテ 6.9mm. e^4 ハ 6.3mm デアル. f^4 及ビ g^4 ハ共ニ消失シテ 0 デアリ a^4 ハ痕跡デ 0.2mm ヲ示ス。(實驗日數: 194日)。

實驗動物: 106. 此例デハ f^4 カラ a^4 迄ハ完全ニ 0 デアリ他モ著シク低ク a^3 , h^3 ハ 3mm 未滿デ. c^4 — e^4 ハ 1mm 餘デアル。(實驗日數: 194日)。

實驗動物: 54. 本例モ同様 f^4 カラ a^4 迄完全ニ消失シテ 0 デアリ. a^3 — c^4 迄ハ約 5mm 内外. d^4 ハ 3.1mm. e^4 ハ僅カ 1.7mm デアル。(實驗日數: 210日)。

實驗動物: 55. a^3 ハ 10.3mm. h^3 ハ 9.8mm. c^4 ハ 12.5mm デ d^4 ハ 11.1mm デアルガ. e^4 = 至リ急ニ低下シテ 6.2mm. f^4 ハ最モ低ク 1.8mm. g^4 ハ 4.4mm デ. a^4 ハ 3.8mm ヲ示ス。(實驗日數: 240日)。(Fig. 38)。

之ヲ要スルニ 55ヲ除イテ f^4 , g^4 , a^4 ノ完全ナル消失ガ著シイ。55ニ於テモ a^3 — d^4 迄ノ耳殻反射運動ノ大サハ略々安定シタ値ヲ示シ. e^4 = 於テ稍稍低ク. f^4 ハ最モ低ク. g^4 , a^4 之ニ次グト云フ第2實驗全體トシテノ定型トモ謂フ可キ状態ヲ此最長期間ノ例ニ見ルノデアル。

〔E 表〕

〔實驗動物: 71〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a^3	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.4	〔A〕
h^3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
c^4	0	0	0	0	0	0	
d^4	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.9	
e^4	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.8	
f^4	0.5	0	0.5	0	0.5	0.3	
g^4	0	0	0	0	0	0	〔B〕
a^4	0	0	0	0	0	0	
g^1	0	0	0	0	0	0	
f^1	0	0	0	0	0	0	
e^1	0	0	0	0	0	0	
d^1	0	0	0.5	0.5	0	0.2	
c^1	0	0	0	0	0	0	
h^3	0	0	0	0	0	0	
a^3	0	0	0	0	0	0	

〔騒音: 43日〕

音階	a^3	h^3	c^4	d^4	e^4	f^4	g^4	a^4
〔A〕〔B〕ノ平均値	0.7	0.3	0	0.6	0.4	0.2	0	0

〔實驗動物: 68〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a^3	7.5	6.5	6.0	8.0	7.0	7.0	〔A〕
h^3	6.5	6.5	7.5	6.5	8.0	7.0	
c^4	8.5	9.0	9.5	9.5	10.0	9.3	
d^4	6.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	
e^4	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.2	
f^4	2.0	2.0	0.5	0.5	1.5	1.3	
g^4	4.0	4.0	1.5	2.5	2.5	2.9	〔B〕
a^4	1.5	2.0	1.0	1.0	1.0	1.3	
g^1	3.0	2.5	3.0	3.0	3.5	3.0	
f^1	2.0	2.5	1.0	2.0	2.0	1.9	
e^1	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	1.9	
d^1	5.0	6.5	5.0	3.0	6.0	5.1	
c^1	6.5	5.5	5.5	6.0	6.0	5.9	
h^3	6.5	5.0	5.5	6.0	6.0	5.5	
a^3	6.5	5.0	5.0	7.5	6.0	6.0	

〔騒音: 50日〕

音階	a^3	h^3	c^4	d^4	e^4	f^4	g^4	a^4
〔A〕〔B〕ノ平均値	6.5	6.3	7.6	5.6	1.6	1.6	3.0	1.3

〔實驗動物：83〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	0	0	0	0	0	0	〔A〕
h ³	0	0	0	0	0	0	
c ⁴	0	0	0	0	0	0	
d ⁴	0	0	0	0	0	0	
e ⁴	0	0	0	0	0	0	
f ⁴	0	0	0	0	0	0	
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
a ⁴	0	0	0	0	0	0	〔B〕
h ⁴	0	0	0	0	0	0	
c ⁵	0	0	0	0	0	0	
d ⁵	0	0	0	0	0	0	
e ⁵	0	0	0	0	0	0	
f ⁵	0	0	0	0	0	0	
g ⁵	0	0	0	0	0	0	

〔騒音：50日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	0	0	0	0	0	0	0	0

〔實驗動物：72〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	2.0	1.5	1.5	2.0	2.5	1.9	〔A〕
h ³	1.5	2.0	2.0	2.0	1.5	1.8	
c ⁴	2.0	1.5	1.5	1.5	2.0	1.7	
d ⁴	2.0	2.0	2.5	3.0	2.5	2.4	
e ⁴	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.4	
f ⁴	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
a ⁴	0	0	0	0	0	0	〔B〕
h ⁴	0	0	0	0	0	0	
c ⁵	0	0	0	0	0	0	
d ⁵	1.0	1.0	1.5	2.0	2.5	1.6	
e ⁵	3.0	2.0	2.0	3.0	2.5	2.5	
f ⁵	4.5	4.0	3.0	2.5	3.5	3.5	
g ⁵	3.5	3.5	2.5	3.0	3.0	3.1	

〔騒音：58日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	2.5	2.7	2.4	3.0	2.0	1.3	0	0

〔實驗動物：106₍₂₎〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	7.5	7.0	7.5	7.5	6.5	7.2	〔A〕
h ³	10.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.2	
c ⁴	9.5	7.5	9.0	9.0	8.0	8.6	
d ⁴	9.0	8.0	10.5	8.5	9.0	9.0	
e ⁴	6.0	6.0	7.0	7.0	5.5	6.3	
f ⁴	4.0	4.0	3.0	3.0	3.5	3.5	
g ⁴	5.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.6	
a ⁴	3.0	4.5	2.0	2.5	4.0	3.2	〔B〕
h ⁴	4.5	2.5	4.5	4.5	5.0	4.2	
c ⁵	6.0	4.0	3.0	3.0	3.5	3.9	
d ⁵	5.5	6.0	3.5	7.0	5.5	5.5	
e ⁵	9.0	9.5	10.5	11.0	9.0	9.8	
f ⁵	9.5	8.5	9.5	9.0	8.5	9.0	
g ⁵	8.0	9.0	9.5	6.5	8.0	8.2	

〔騒音：56日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	7.4	8.2	8.8	9.4	5.9	3.7	3.9	3.2

〔實驗動物：85〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	9.0	7.0	7.5	7.5	8.0	7.8	〔A〕
h ³	7.5	5.0	4.5	5.0	5.0	5.4	
c ⁴	3.5	2.0	3.0	3.5	4.0	3.2	
d ⁴	5.0	3.0	4.0	4.5	3.0	3.9	
e ⁴	4.5	5.0	5.5	5.0	3.5	4.7	
f ⁴	4.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.2	
g ⁴	1.5	2.0	2.0	2.5	1.5	1.9	
a ⁴	4.0	2.0	4.0	3.5	4.5	3.6	〔B〕
h ⁴	3.0	4.5	6.0	3.0	5.0	4.3	
c ⁵	5.5	5.0	5.0	8.0	6.0	5.9	
d ⁵	7.0	6.5	6.5	6.0	7.0	6.6	
e ⁵	8.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	
f ⁵	6.0	4.0	4.5	4.5	5.0	4.8	
g ⁵	6.0	6.0	5.5	5.0	6.0	5.7	

〔騒音：58日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	7.6	5.6	4.0	5.6	5.7	4.6	3.1	3.6

〔實驗動物：81〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	4.5	4.0	4.0	3.5	4.0	4.0	〔A〕
h ³	3.5	3.0	4.0	3.5	2.0	3.2	
c ⁴	3.0	3.0	3.0	2.0	3.5	2.9	
d ⁴	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	
e ⁴	2.0	2.0	2.0	1.5	1.0	1.7	
f ⁴	0.5	0	0.5	0.5	0	0.3	
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
a ⁴	0.5	0.5	0.5	0	0	0.3	〔B〕
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
f ⁴	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.4	
e ⁴	2.0	2.5	1.5	1.5	2.0	1.9	
d ⁴	3.5	3.0	2.5	2.0	2.5	2.7	
c ⁴	2.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.3	
h ³	4.0	2.5	2.0	2.5	1.5	2.5	
a ³	4.0	2.5	3.0	3.5	3.5	3.3	

〔騒音：75日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	3.7	2.9	2.6	2.7	1.8	0.9	0	0.3

〔實驗動物：64₍₁₎〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	12.0	12.5	13.0	11.5	10.5	11.9	〔A〕
h ³	10.0	10.0	10.0	11.0	10.0	10.2	
c ⁴	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
d ⁴	10.5	9.0	10.0	8.5	8.5	9.3	
e ⁴	8.0	7.0	8.5	8.0	8.0	7.9	
f ⁴	8.0	7.5	8.0	8.5	8.5	8.1	
g ⁴	7.5	6.0	6.0	7.0	7.5	6.8	
a ⁴	8.0	7.0	6.5	6.0	6.5	6.8	〔B〕
g ⁴	4.5	4.5	5.0	4.0	6.0	4.8	
f ⁴	8.0	8.0	8.0	9.5	9.0	8.5	
e ⁴	8.5	7.5	8.5	7.5	7.5	7.9	
d ⁴	9.5	7.5	8.5	7.5	8.0	8.2	
c ⁴	9.5	8.5	8.0	8.5	8.0	8.5	
h ³	10.5	8.5	9.0	10.5	10.0	9.7	
a ³	11.0	11.0	10.0	8.0	8.5	9.7	

〔騒音：93日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	10.8	10.0	8.8	8.8	7.9	8.3	5.8	6.8

〔實驗動物：73〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	12.5	12.5	12.0	11.5	9.5	11.6	〔A〕
h ³	11.5	10.0	9.5	10.5	10.5	10.4	
c ⁴	8.5	8.0	10.0	8.0	8.0	8.5	
d ⁴	9.0	9.5	7.5	8.0	7.5	8.3	
e ⁴	7.0	5.0	5.5	5.5	6.0	5.8	
f ⁴	5.0	3.5	6.5	5.5	3.5	4.8	
g ⁴	3.5	3.5	3.0	3.5	3.0	3.3	
a ⁴	5.5	4.5	4.0	5.0	5.0	4.8	〔B〕
g ⁴	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.2	
f ⁴	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	3.6	
e ⁴	6.5	6.0	5.5	6.5	5.5	6.0	
d ⁴	7.5	7.5	6.5	5.5	6.5	6.7	
c ⁴	5.5	5.5	3.5	5.5	5.5	4.7	
h ³	7.5	8.5	7.5	8.5	7.5	7.9	
a ³	7.5	8.0	7.0	6.5	6.5	7.1	

〔騒音：87日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	9.4	9.2	6.6	7.5	5.9	4.2	3.8	4.8

〔實驗動物：103₍₂₎〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	18.5	14.0	15.5	8.5	7.0	12.7	〔A〕
h ³	7.5	8.0	8.5	8.5	6.5	7.8	
c ⁴	7.5	7.5	8.5	6.0	5.0	6.9	
d ⁴	6.0	7.5	7.0	8.0	8.5	7.4	
e ⁴	4.0	7.0	8.5	6.5	6.5	6.5	
f ⁴	5.0	3.5	4.5	4.5	5.5	4.6	
g ⁴	9.0	6.5	4.0	7.5	5.5	6.5	
a ⁴	5.5	7.5	5.0	4.0	7.0	5.8	〔B〕
g ⁴	8.0	8.0	5.5	6.5	7.0	7.0	
f ⁴	6.0	6.0	4.0	5.5	5.5	5.4	
e ⁴	6.5	5.5	6.5	6.0	5.0	5.9	
d ⁴	8.5	8.0	8.5	8.5	9.0	8.5	
c ⁴	9.5	9.5	10.0	10.5	8.5	9.6	
h ³	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	
a ³	9.5	8.5	10.5	13.5	12.0	10.8	

〔騒音：94日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	11.8	9.2	8.3	8.0	6.2	5.0	6.8	5.8

〔實驗動物：104₍₁₎〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	9.0	13.5	11.0	13.5	13.5	12.1	〔A〕
h ³	15.5	15.0	16.0	15.0	15.0	15.3	
c ⁴	14.0	13.0	13.0	13.5	13.5	13.4	
d ⁴	14.5	13.5	16.5	13.5	14.5	14.5	
e ⁴	11.0	11.5	10.5	10.5	10.0	10.7	
f ⁴	4.5	3.5	3.5	3.0	3.5	3.6	
g ⁴	6.5	5.0	5.5	5.5	6.5	5.8	
a ⁴	10.5	9.5	10.0	15.0	10.5	11.1	
g ⁴	5.0	5.5	6.5	5.0	7.5	5.9	〔B〕
f ⁴	5.0	2.5	5.5	4.0	3.0	4.0	
e ⁴	15.0	12.0	11.0	10.5	10.5	11.8	
d ⁴	20.0	16.5	15.5	16.5	16.5	17.0	
c ⁴	20.5	14.5	16.5	15.5	13.0	16.0	
h ³	14.5	15.0	15.0	13.5	15.0	14.6	
a ³	13.5	13.5	13.0	15.0	17.5	14.5	

〔騒音：94日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	13.3	15.0	14.7	15.8	11.3	3.8	5.9	11.1

〔實驗動物：82〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	12.5	13.5	12.0	9.5	11.5	11.8	〔A〕
h ³	12.5	11.0	11.0	10.5	12.0	11.4	
c ⁴	10.5	8.5	8.0	9.0	8.0	8.8	
d ⁴	8.5	7.0	9.0	8.5	8.5	8.3	
e ⁴	7.5	8.5	8.0	9.5	8.0	8.3	
f ⁴	3.5	3.0	2.0	2.0	2.0	2.5	
g ⁴	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	4.6	
a ⁴	8.5	7.5	7.0	8.5	8.5	8.0	
g ⁴	4.5	2.5	4.5	4.5	5.0	4.2	〔B〕
f ⁴	5.5	4.0	5.5	6.0	4.0	5.0	
e ⁴	10.0	10.0	8.5	8.5	10.0	9.4	
d ⁴	9.0	11.0	10.0	10.0	9.0	9.8	
c ⁴	8.5	7.5	7.0	9.0	8.0	8.0	
h ³	14.0	12.0	11.0	8.5	12.0	11.5	
a ³	11.0	8.0	9.0	8.5	9.5	9.2	

〔騒音：98日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	10.5	11.5	8.4	9.1	8.9	3.8	4.4	8.0

〔實驗動物：63〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.3	〔A〕
h ³	4.5	5.0	4.0	4.0	4.5	4.3	
c ⁴	4.5	4.0	3.5	4.0	4.5	4.1	
d ⁴	2.5	3.0	2.0	3.5	2.0	2.6	
e ⁴	3.0	3.0	3.0	3.5	1.5	2.8	
f ⁴	0	0	0	0	0	0	
g ⁴	1.5	2.5	2.0	2.0	1.0	1.8	
a ⁴	1.5	1.5	2.0	2.5	1.0	1.7	
g ⁴	1.5	1.5	1.5	2.5	2.0	1.8	〔B〕
f ⁴	0	0	0	0	0	0	
e ⁴	2.5	4.0	1.5	3.0	2.5	2.7	
d ⁴	3.5	4.0	3.5	3.5	2.0	3.3	
c ⁴	4.5	5.0	4.0	4.5	4.5	4.5	
h ³	8.5	5.0	6.0	5.5	7.0	6.4	
a ³	5.0	6.5	4.0	3.5	6.5	5.1	

〔騒音：102日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	4.7	5.4	4.3	3.0	2.8	0	1.8	1.7

〔實驗動物：87〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	6.5	6.5	5.5	6.0	5.5	6.0	〔A〕
h ³	5.5	5.0	4.5	4.5	4.5	4.8	
c ⁴	4.5	4.0	5.0	4.5	5.0	4.6	
d ⁴	5.0	4.5	4.5	4.0	4.5	4.5	
e ⁴	2.5	2.5	2.5	2.0	3.0	2.5	
f ⁴	0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.7	
g ⁴	1.5	1.5	0	0	1.5	0.9	
a ⁴	1.0	1.5	1.0	1.0	0	0.9	
g ⁴	0	1.0	0	0.5	0.5	0.4	〔B〕
f ⁴	0	0	0	0	0	0	
e ⁴	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	
d ⁴	5.0	5.0	4.0	3.0	3.5	4.1	
c ⁴	2.5	2.5	3.5	3.5	4.5	3.3	
h ³	5.5	5.0	5.0	4.5	5.5	5.1	
a ³	5.0	4.5	5.5	4.0	5.5	4.9	

〔騒音：104日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	5.5	5.0	3.9	4.3	3.5	0.4	0.7	0.9

〔實驗動物：65〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
a ³	13.5	12.5	11.0	11.5	12.0	12.1
h ³	8.0	6.0	6.5	5.5	5.5	6.3
c ⁴	8.5	5.5	7.0	8.5	5.5	7.0
d ⁴	8.0	7.5	7.5	7.5	6.5	7.4
e ⁴	6.0	3.5	4.5	3.0	4.5	4.3
f ⁴	4.5	1.5	3.0	2.0	4.0	3.0
g ⁴	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.8
a ⁴	2.0	2.5	2.0	1.5	2.5	2.1
g ⁴	1.5	1.0	2.0	1.0	1.0	1.3
f ⁴	5.5	3.0	3.0	3.5	4.5	3.9
e ⁴	8.0	6.0	5.5	6.0	8.0	6.7
d ⁴	12.0	9.5	9.5	9.5	9.5	10.0
c ⁴	9.0	8.5	9.0	9.5	11.5	9.5
h ³	6.5	7.0	7.0	6.5	5.5	6.5
a ³	12.5	11.5	13.0	11.0	16.0	12.8

〔騒音：105日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	12.5	6.4	8.3	8.7	5.5	3.5	1.1	2.1

〔實驗動物：64〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
a ³	4.5	4.0	5.0	5.5	4.0	4.6
h ³	5.0	4.5	5.0	5.5	5.0	5.0
c ⁴	4.5	4.5	4.5	3.5	2.5	3.7
d ⁴	4.0	3.5	3.0	3.5	2.5	3.3
e ⁴	2.5	1.5	2.0	2.5	2.0	2.1
f ⁴	0	0	0	0	0	0
g ⁴	0.5	0.5	1.0	1.5	0.5	0.8
a ⁴	1.0	1.5	0.5	1.5	1.5	1.2
g ⁴	0.5	0	0	1.0	1.0	0.5
f ⁴	0.5	1.0	0	1.0	0	0.5
e ⁴	4.0	3.5	3.0	3.5	4.0	3.6
d ⁴	5.0	5.0	3.5	3.5	5.0	4.4
c ⁴	6.0	3.5	3.5	4.5	4.5	4.4
h ³	4.0	3.0	3.5	2.5	3.0	3.2
a ³	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.8

〔騒音：106日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	4.7	4.1	4.1	3.9	2.7	0.3	0.7	1.2

〔實驗動物：62〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
a ³	3.0	3.5	1.5	1.5	1.0	2.1
h ³	4.5	4.0	2.0	1.0	1.0	2.5
c ⁴	1.5	1.5	0.5	1.0	1.0	1.1
d ⁴	2.5	2.5	4.5	3.0	2.0	2.9
e ⁴	0	0	0.5	0	0.5	0.2
f ⁴	0	0	0	0	0	0
g ⁴	0	0	0	0	0	0
a ⁴	0	0	0	0	0	0
g ⁴	0	0	0	0	0	0
f ⁴	0	0	0	0	0	0
e ⁴	0	0.5	0	0.5	0.5	0.3
d ⁴	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.3
c ⁴	0	0	0	0	0	0
h ³	2.5	1.0	1.0	1.5	2.0	1.6
a ³	0.5	1.0	0	0.5	0.5	0.5

〔騒音：109日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	1.3	2.1	0.6	2.1	0.3	0	0	0

〔實驗動物：84〕

騒音	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値
a ³	9.0	9.5	9.0	10.5	11.0	9.8
h ³	12.5	14.0	14.5	15.5	14.0	14.0
c ⁴	15.0	15.5	14.5	15.0	14.5	14.9
d ⁴	12.0	11.0	12.0	9.5	8.5	10.6
e ⁴	10.5	9.5	11.5	10.5	11.5	10.7
f ⁴	6.5	4.5	4.0	3.5	4.5	4.6
g ⁴	7.5	6.5	7.5	4.5	6.5	6.5
a ⁴	5.5	5.0	5.0	3.5	5.5	4.9
g ⁴	6.5	6.5	6.0	5.5	5.5	6.0
f ⁴	3.0	2.5	1.5	3.5	2.5	2.6
e ⁴	12.0	11.5	11.5	11.0	11.5	11.5
d ⁴	12.0	9.5	11.5	11.0	10.5	10.9
c ⁴	13.5	12.5	11.5	9.5	11.0	11.6
h ³	14.5	13.5	13.0	14.0	13.5	13.7
a ³	12.0	12.5	12.5	11.5	11.0	11.9

〔騒音：110日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	10.9	13.9	13.3	10.8	11.1	3.6	6.3	4.9

〔實驗動物：71〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	9.0	8.0	7.5	7.0	7.5	7.8	〔A〕
h ³	6.5	6.5	5.5	5.0	3.5	5.4	
c ⁴	5.0	5.5	5.5	4.5	3.5	4.8	
d ⁴	6.0	5.5	5.0	5.0	3.0	4.9	
e ⁴	4.0	3.0	2.5	3.5	3.0	3.2	
f ⁴	0	0	0	0	0	0	〔B〕
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
a ⁴	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.3	
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
f ⁴	0	0	0	0	0	0	
e ⁴	4.5	5.5	5.0	3.0	3.5	4.3	〔B〕
d ⁴	7.5	7.0	6.0	4.0	6.5	6.2	
c ⁴	6.0	5.0	5.0	6.5	5.5	5.6	
h ³	4.5	5.5	6.5	6.0	6.0	5.5	
a ³	7.0	7.5	7.0	6.0	6.5	6.8	

〔騒音：115日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	7.3	5.5	5.2	5.6	3.8	0	0	3.3

〔實驗動物：106〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	6.5	6.0	7.0	4.5	5.0	5.8	〔A〕
h ³	4.0	5.5	5.5	6.0	4.5	5.1	
c ⁴	6.5	3.5	3.5	4.5	3.5	4.2	
d ⁴	3.5	2.0	2.5	3.5	2.5	2.8	
e ⁴	5.0	5.5	5.5	6.0	4.5	5.3	
f ⁴	2.5	1.0	0.5	2.0	3.0	1.8	〔B〕
g ⁴	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.4	
a ⁴	2.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.8	
g ⁴	0.5	1.5	0.5	0.5	1.0	0.8	
f ⁴	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	1.6	
e ⁴	7.5	4.5	6.0	3.5	4.5	5.2	〔B〕
d ⁴	2.5	3.0	6.5	2.5	3.5	3.6	
c ⁴	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	
h ³	5.0	5.5	4.5	4.0	5.5	4.9	
a ³	5.5	5.5	5.5	5.5	4.5	5.3	

〔騒音：122日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	5.6	5.0	4.5	3.2	5.3	1.7	0.6	0.8

〔實驗動物：74〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	16.5	13.0	14.5	13.0	14.0	14.2	〔A〕
h ³	14.0	12.5	11.5	13.0	13.5	12.9	
c ⁴	11.0	9.5	10.5	10.5	8.5	9.8	
d ⁴	7.0	8.0	8.0	8.5	8.5	8.0	
e ⁴	7.5	6.5	4.0	7.0	6.5	6.3	
f ⁴	0.5	1.0	1.0	1.5	0	0.8	〔B〕
g ⁴	7.5	6.5	5.5	3.5	6.0	5.7	
a ⁴	5.5	4.5	3.5	5.5	3.5	4.5	
g ⁴	11.5	10.0	9.5	9.5	10.5	10.0	
f ⁴	5.5	1.5	3.5	2.5	4.0	3.4	
e ⁴	15.5	9.5	13.5	13.5	9.5	12.3	〔B〕
d ⁴	15.5	18.0	18.5	13.5	12.5	15.6	
c ⁴	21.0	18.0	18.5	15.0	19.0	18.3	
h ³	19.0	17.5	19.0	16.5	17.0	17.8	
a ³	20.0	20.5	20.5	21.0	18.5	20.1	

〔騒音：115日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	17.2	15.4	14.1	11.8	9.3	2.1	7.9	4.5

〔實驗動物：67〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	4.5	4.0	3.5	3.5	4.0	3.9	〔A〕
h ³	4.0	3.0	3.0	3.0	2.5	3.1	
c ⁴	2.5	3.0	2.5	3.0	3.0	2.8	
d ⁴	2.5	3.0	3.5	3.0	3.5	3.1	
e ⁴	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.4	
f ⁴	0	1.5	0	0.5	0.5	0.5	〔B〕
g ⁴	1.0	0.5	1.5	1.0	1.5	1.1	
a ⁴	2.0	2.5	3.0	5.5	3.0	3.2	
g ⁴	0.5	0.5	0	0	0	0.2	
f ⁴	0	0	0	0	0	0	
e ⁴	3.5	4.0	3.0	3.5	2.5	3.3	〔B〕
d ⁴	4.5	5.0	5.5	5.0	4.0	4.8	
c ⁴	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.8	
h ³	4.0	4.0	3.0	2.5	1.5	3.0	
a ³	3.0	4.5	4.5	5.0	3.5	4.1	

〔騒音：131日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	4.0	3.1	3.3	4.0	2.4	0.3	0.7	3.2

〔實驗動物：82〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	14.5	15.0	13.5	14.0	13.0	14.0	〔A〕
h ³	13.5	13.0	13.5	12.5	12.5	13.0	
c ⁴	14.5	14.0	10.5	10.5	10.5	12.0	
d ⁴	13.5	12.5	12.5	12.0	12.5	12.6	
e ⁴	9.5	15.5	8.5	8.5	8.0	10.0	
f ⁴	6.5	9.5	8.0	5.5	5.0	6.8	
g ⁴	5.0	7.0	6.5	5.5	5.0	5.8	
a ⁴	3.0	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	
g ⁴	8.0	6.5	6.5	7.5	11.5	8.0	〔B〕
f ⁴	6.5	9.5	7.5	7.5	7.5	7.7	
e ⁴	7.5	7.5	12.5	9.0	7.5	8.8	
d ⁴	9.5	9.5	11.5	12.5	11.5	10.0	
c ⁴	10.5	12.5	11.0	11.0	13.5	11.7	
h ³	12.0	11.5	12.5	11.5	10.0	11.5	
a ³	10.5	9.5	7.5	9.0	8.5	9.0	

〔騒音：131日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕ノ平均値	11.5	12.3	11.9	11.8	9.4	7.3	6.9	3.0

〔實驗動物：101〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	6.5	5.0	5.5	5.5	5.5	5.6	〔A〕
h ³	5.0	4.5	4.5	5.5	4.0	4.9	
c ⁴	5.5	5.5	5.5	5.5	5.0	5.4	
d ⁴	7.5	6.5	7.5	5.0	5.5	6.4	
e ⁴	3.5	2.5	3.0	2.5	2.0	2.7	
f ⁴	0.5	0.5	0	0	1.0	0.4	
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
a ⁴	0	0	0	0	0	0	
g ⁴	0	0	0	0	0	0	〔B〕
f ⁴	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.8	
e ⁴	4.5	3.5	2.5	4.0	4.0	3.7	
d ⁴	7.5	6.5	6.0	6.0	6.0	6.4	
c ⁴	7.0	6.0	6.5	6.0	5.5	6.2	
h ³	6.0	4.5	4.0	4.0	4.5	4.6	
a ³	5.0	4.5	3.0	4.5	4.5	4.3	

〔騒音：131日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕ノ平均値	5.0	4.8	5.8	6.4	3.2	0.6	0	0

〔實驗動物：84〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	18.5	21.5	21.5	19.5	19.0	20.0	〔A〕
h ³	21.5	22.5	23.0	21.5	22.5	22.2	
c ⁴	21.5	20.0	20.5	19.0	17.5	19.7	
d ⁴	21.0	20.0	16.5	18.5	18.5	19.0	
e ⁴	8.5	10.5	6.5	7.5	7.5	8.1	
f ⁴	2.0	2.5	3.5	2.5	3.0	2.7	
g ⁴	2.5	5.0	3.0	2.5	4.0	3.4	
a ⁴	6.0	7.0	4.0	9.0	5.5	6.3	
g ⁴	5.0	1.5	3.5	1.5	3.5	3.0	〔B〕
f ⁴	2.0	1.0	2.0	4.0	4.0	2.6	
e ⁴	9.5	11.0	7.0	8.0	8.0	8.7	
d ⁴	17.5	17.5	16.0	16.0	17.0	16.8	
c ⁴	15.0	14.0	16.0	15.5	14.5	15.0	
h ³	18.5	18.0	20.5	17.5	22.0	19.3	
a ³	22.0	23.0	19.0	20.0	21.5	21.1	

〔騒音：131日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕ノ平均値	20.6	20.8	17.4	17.9	8.4	2.7	3.2	6.3

〔實驗動物：64〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	5.0	5.5	4.5	3.5	4.0	4.5	〔A〕
h ³	4.5	3.5	4.0	3.5	3.5	3.8	
c ⁴	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.7	
d ⁴	3.5	4.0	3.5	4.0	3.5	3.7	
e ⁴	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
f ⁴	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
g ⁴	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	
a ⁴	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.4	
g ⁴	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	〔B〕
f ⁴	2.5	2.5	2.5	3.0	3.5	2.8	
e ⁴	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
d ⁴	2.5	3.0	3.5	3.0	2.5	2.9	
c ⁴	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.2	
h ³	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	
a ³	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	

〔騒音：150日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕ノ平均値	3.9	3.6	3.0	3.3	2.5	2.9	2.5	1.4

〔實驗動物：65〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	10.0	9.0	9.5	9.0	8.5	9.2	〔A〕
h ³	9.5	8.5	8.0	8.0	8.0	8.4	
c ⁴	4.5	5.5	5.0	5.0	5.5	5.1	
d ⁴	5.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.3	
e ⁴	5.0	4.5	4.5	4.5	3.5	4.4	
f ⁴	2.0	1.0	0	1.5	1.0	1.1	
g ⁴	0.5	0.5	0.5	0	0	0.3	
a ⁴	0	0	0	0	0	0	
g ⁴	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	
f ⁴	1.5	2.0	2.0	1.5	1.5	1.7	
c ⁴	5.0	5.0	5.0	3.0	4.5	4.5	〔B〕
d ⁴	5.5	4.5	3.5	5.5	6.0	5.0	
e ⁴	6.0	6.5	5.5	4.5	5.5	5.6	
h ³	8.5	8.0	7.5	8.5	8.0	8.1	
a ³	8.5	8.5	7.5	8.5	7.0	8.0	

〔騒音：150日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕ノ平均値	8.6	8.3	5.4	5.7	4.5	1.4	0.9	0

〔實驗動物：106〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	6.0	5.5	4.5	5.5	6.0	5.5	〔A〕
h ³	5.0	3.5	3.0	3.5	2.5	3.5	
c ⁴	2.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.2	
d ⁴	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.6	
e ⁴	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
f ⁴	0	0	0	0	0	0	
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
a ⁴	0	0	0.5	1.5	1.0	0.6	
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
f ⁴	0	0	0	0	0	0	
e ⁴	0	0	0	0	0	0	〔B〕
d ⁴	1.5	1.5	0.5	1.5	2.5	1.5	
c ⁴	4.5	3.5	2.5	2.5	3.5	3.3	
h ³	3.5	4.0	2.5	3.5	3.5	3.4	
a ³	6.0	5.5	6.0	6.5	7.0	6.2	

〔騒音：162日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕ノ平均値	5.9	3.5	3.8	1.6	0.3	0	0	0.6

〔實驗動物：66〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	4.5	4.0	3.5	4.0	3.5	3.9	〔A〕
h ³	5.0	4.0	4.5	3.5	4.0	4.2	
c ⁴	4.0	3.5	4.5	3.5	5.0	4.1	
d ⁴	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.4	
e ⁴	1.5	2.0	2.5	1.5	1.5	1.8	
f ⁴	0	0	0	0	0	0	
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
a ⁴	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.8	
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
f ⁴	0	0	0	0	0	0	
e ⁴	2.0	1.5	1.5	1.5	2.0	1.7	〔B〕
d ⁴	2.5	3.0	3.0	2.0	2.5	2.6	
c ⁴	3.0	2.5	2.0	2.0	2.0	2.3	
h ³	2.5	4.0	3.5	3.0	3.0	3.2	
a ³	3.5	3.0	4.5	3.5	4.0	3.7	

〔騒音：151日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕ノ平均値	3.8	3.3	3.2	2.5	1.8	0	0	0.8

〔實驗動物：104〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	8.5	9.0	7.5	7.0	8.5	8.1	〔A〕
h ³	12.5	9.0	9.5	9.5	9.5	10.0	
c ⁴	10.5	9.0	9.5	9.0	9.0	9.4	
d ⁴	9.5	9.5	9.5	8.0	8.0	8.9	
e ⁴	5.0	5.5	4.5	5.0	5.5	5.1	
f ⁴	2.0	1.0	3.0	1.5	1.0	1.7	
g ⁴	1.5	2.5	2.5	2.0	1.5	2.0	
a ⁴	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.2	
g ⁴	2.0	2.0	1.5	2.5	2.0	2.0	
f ⁴	2.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	
e ⁴	6.0	5.5	5.5	4.5	6.5	5.6	〔B〕
d ⁴	8.0	7.5	6.5	6.5	7.5	7.2	
c ⁴	6.5	5.5	7.0	9.5	9.5	7.6	
h ³	9.5	8.5	8.0	9.5	7.5	8.6	
a ³	8.0	7.5	7.5	8.0	8.5	7.9	

〔騒音：175日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕ノ平均値	8.0	9.3	8.5	8.1	5.4	1.6	2.0	1.2

〔實驗動物: 64〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	14.0	13.0	13.0	12.5	12.5	13.0	〔A〕
h ³	13.0	12.0	12.0	11.5	12.5	12.2	
c ⁴	12.5	12.5	12.5	11.5	10.5	11.9	
d ⁴	10.5	11.5	10.5	11.5	10.5	10.8	
e ⁴	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	
f ⁴	4.5	5.5	5.0	6.5	7.0	5.7	
g ⁴	8.5	6.5	7.5	7.0	6.0	7.1	
a ⁴	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
g ¹	6.0	5.5	7.0	7.5	7.5	6.7	
f ¹	6.5	6.5	6.5	5.5	7.5	6.5	
e ¹	8.0	7.5	8.5	9.5	8.0	8.3	〔B〕
d ¹	10.5	11.0	9.0	10.5	10.5	10.3	
c ¹	11.0	11.0	9.5	9.5	13.5	10.9	
h ³	12.5	8.5	8.5	8.0	7.5	9.0	
a ³	10.0	10.5	8.5	7.5	8.0	8.9	

〔騒音: 177日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	11.0	10.6	11.4	10.6	8.4	6.1	6.9	5.0

〔實驗動物: 104〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	15.5	15.5	11.0	12.5	15.5	14.0	〔A〕
h ³	17.5	16.5	16.0	12.5	12.5	15.0	
c ⁴	17.0	18.5	16.5	12.5	11.0	15.1	
d ⁴	6.0	6.0	6.0	6.5	6.0	6.1	
e ⁴	4.0	3.0	5.0	4.5	4.5	4.2	
f ⁴	0	0	0	0	0	0	
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
a ⁴	0.5	0.5	0	0	0	0.2	
g ¹	0	0	0	0	0	0	
f ¹	0	0	0	0	0	0	
e ¹	9.0	8.0	9.5	6.5	8.5	8.3	〔B〕
d ¹	7.0	8.5	8.0	7.5	7.5	7.7	
c ¹	10.0	7.5	9.0	9.5	9.5	9.1	
h ³	10.0	10.5	8.5	8.0	11.0	9.6	
a ³	14.5	18.0	12.5	15.0	15.5	15.1	

〔騒音: 194日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	14.6	12.3	12.1	6.9	6.3	0	0	0.2

〔實驗動物: 106〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	5.5	5.5	4.5	2.5	4.0	4.4	〔A〕
h ³	2.0	2.0	2.5	2.0	3.0	2.3	
c ⁴	3.5	3.0	1.5	2.0	2.0	2.4	
d ⁴	3.0	2.0	2.5	2.5	4.5	2.9	
e ⁴	1.5	0.5	0.5	1.0	0	0.7	
f ⁴	0	0	0	0	0	0	
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
a ⁴	1.5	4.0	1.0	1.0	1.5	1.8	
g ¹	0	0	0	0	0	0	
f ¹	0	0	0	0	0	0	
e ¹	2.5	2.5	1.5	2.5	1.5	2.1	〔B〕
d ¹	5.5	4.0	3.0	5.0	2.0	3.9	
c ¹	4.5	5.5	5.0	4.0	5.5	4.9	
h ³	3.0	4.5	3.0	2.5	2.0	3.0	
a ³	5.0	5.5	6.5	5.0	3.5	5.1	

〔騒音: 185日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	4.8	2.7	3.7	3.4	1.4	0	0	1.8

〔實驗動物: 106〕

音階	1	2	3	4	5	5回ノ 平均値	
a ³	3.0	2.5	3.0	3.0	3.5	3.0	〔A〕
h ³	3.5	3.0	2.5	2.5	2.5	2.8	
c ⁴	1.0	2.5	1.5	1.5	1.5	1.6	
d ⁴	0.5	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0	
e ⁴	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.7	
f ⁴	0	0	0	0	0	0	
g ⁴	0	0	0	0	0	0	
a ⁴	0	0	0	0	0	0	
g ¹	0	0	0	0	0	0	
f ¹	0	0	0	0	0	0	
e ¹	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	〔B〕
d ¹	1.5	1.5	1.0	1.0	1.5	1.3	
c ¹	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
h ³	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.9	
a ³	1.5	1.5	3.5	3.5	3.5	2.7	

〔騒音: 194日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	2.9	2.4	1.6	1.2	1.1	0	0	0

〔實驗動物: 54〕

音階	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
a ³	5.0	5.0	6.0	5.0	5.0	5.2
h ³	6.0	5.5	5.0	4.5	5.0	5.2
c ⁴	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	5.1
d ⁴	2.5	2.0	3.5	3.0	3.0	2.8
e ⁴	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.6
f ⁴	0	0	0	0	0	0
g ⁴	0	0	0	0	0	0
a ⁴	0	0	0	0	0	0
g ⁴	0	0	0	0	0	0
f ⁴	0	0	0	0	0	0
e ⁴	1.5	1.0	2.0	2.0	2.0	1.7
d ⁴	4.0	2.5	3.0	3.5	3.5	3.3
c ⁴	4.5	4.5	5.5	5.5	5.0	5.0
h ³	5.0	3.5	5.0	4.5	4.5	4.5
a ³	4.5	4.5	4.0	4.5	3.5	4.2

〔騒音: 210日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	4.7	4.9	5.1	3.1	1.7	0	0	0

〔實驗動物: 55〕

音階	1	2	3	4	5	5回/ 平均値
a ³	9.5	9.0	10.5	8.5	7.0	8.9
h ³	10.0	10.0	8.5	9.0	6.5	8.8
c ⁴	14.0	12.0	11.5	12.5	12.5	12.5
d ⁴	11.0	11.0	10.5	10.0	10.5	10.6
e ⁴	5.0	5.5	4.0	5.5	5.0	5.0
f ⁴	1.0	1.5	2.5	0	2.5	1.5
g ⁴	3.5	2.5	5.0	4.0	3.0	3.6
a ⁴	5.0	3.5	3.0	3.5	4.0	3.8
g ⁴	6.0	5.0	5.0	4.5	5.5	5.2
f ⁴	2.0	3.0	1.0	3.0	1.5	2.1
e ⁴	8.0	8.5	6.5	6.0	8.0	7.4
d ⁴	11.5	12.5	12.5	10.5	11.0	11.6
c ⁴	13.5	13.0	12.0	13.0	11.0	12.5
h ³	10.5	10.0	11.0	12.5	10.0	10.8
a ³	12.0	10.0	12.5	11.5	12.0	11.6

〔騒音: 240日〕

音階	a ³	h ³	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴
〔A〕〔B〕 ノ平均値	10.3	9.8	12.5	11.1	6.2	1.8	4.4	3.8

〔表 F〕

71. 騒音: 43日

72. 騒音: 58日

68. 騒音: 50日

85. 騒音: 58日

83. 騒音: 50日

81. 騒音: 75日

106. 騒音: 56日

73. 騒音: 87日

64. 騒音: 93B

62. 騒音: 109B

103. 騒音: 94B

84. 騒音: 110B

104. 騒音: 94B

71. 騒音: 115B

82. 騒音: 98B

74. 騒音: 115B

63. 騒音: 102B

106. 騒音: 122B

87. 騒音: 104B

67. 騒音: 133B

65. 騒音: 105B

82. 騒音: 131B

64. 騒音: 106B

84. 騒音: 131B

101. 騒音: 131B

104. 騒音: 194B

64. 騒音: 150B

106. 騒音: 194B

65. 騒音: 150B

54. 騒音: 210B

66. 騒音: 151B

55. 騒音: 240B

106. 騒音: 162B

104. 騒音: 175B

64. 騒音: 177B

106. 騒音: 185B

第九章

總括及結論

一、第一實驗ノ總括

音響性耳殻反射運動ニ於テハ攀縮ノ大サ自體ノ比較デハ假令描寫裝置ノ條件ヲ等シクスルトモ各個體相互ノ間ニ、耳殻反射運動ノ消長ヲ判定スルノニ不十分デアル。

茲ニ於テ個體ノ反應スル最小刺激値ニ至ラシメル音ノ強サヲ其正常ナモノト對數的ニ比較セル障礙度ナルモノヲ設ケ、此比ノ數値間ニ於テ各實驗動物相互ノ間ニ對比ヲ試ミルヲ妥當ト考ヘル。

既ニ前編ニ於テ述ベタ如ク實驗ニ使用シタ騒音ハ凡ソ 100「デシベル」ヲモ越エル強サヲ有シテキルガ之ノ持續的作用ニヨリ動物聽器ノ障礙、ヒイテハ音響性耳殻反射運動ニ如何ニ影響シ、茲ニ設定セル障礙度ハ作用期間ニ對シテドノ様ナ傾向ヲ示スカト言フト次ノ様ナ結果ニナル。先づ短時間此騒音裡ニ曝露サレタ海狸ノ障礙ハ作用時間 30 分ニ於テハ未ダ障礙ノ左程著シクナイモノ、相當高率ノ障礙度ヲ示スモノ、或ハ又最大值ニ近イ高率ヲ示スモノ等ガアリ、3.85—9.75db. ノ間ノ數値ヲ示シテ未ダ一致シタ處ヲ有シテ居ラナイ。(Tabelle 4)。

然ルニ 1 時間騒音ヲ作用セシメタ場合ニハ、概ネ 8.0db. 以上ノ數値ヲ出シテ居リ高度ノ障礙ニ於テ可成リ安定シタ状態ニアル。

次ニ長期間ノ持續的騒音作用ヲ與ヘタ動物デハ先づ實驗日數 50—90 日ノ期間デハ、既ニ D_{ab} ハ 11.57db. ノ如キ最大值ヲ示スモノモアリ、又比較的障礙度ノ輕イモノモアルガ大部分ニ於テ 9.0db. ニ近イ値ヲ有シテ居ル。(Tabelle 5)。

要スルニ此期間ニ於テ海狸ハ非常ナ影響ヲ受ケテ障礙度ヲ進メ個體ニヨツテハ其最大值ヲ呈スルニ至ルモノデアル。

然ルニ實驗日數ガ 90 日ヲ過ギル頃、稍々障礙ノ度ハ恢復スル傾向ヲ示シ約 30% ヲ減ジテ居ル。

更ニ 100 日カラ 110 日ニ至ルモノデハ多少ノ差ハアルガ障礙度ハ 8.0db カラ以上最大值ニ達シテ居ル。

之ガ 120 日ニ近ヅクト何レモ 9.0db. 以上 10.0db. ニ近イ障礙度ヲ呈シ、130 日ヲ越エタルモノデハ 10.0db. ニ近イ高率ヲ示ス例ト、6.0db. 前後ノ例ト相半バスル。

次イデ實驗日數ガ 150 日カラ 160 日ノ間ノモノデハ大部分ガ 9.0db. ヲ越エ D_{ab} ハ最も大ナル觀ヲ呈スルガ、更ニ 170 日ト 190 日ノ間デハ又障礙ハ稍々輕度トナリ、4.0—5.0db. ヲ示シ 6.0db. 以上ノモノヲ見ナイ。

190 日ヲ越エタモノデハ甚シイ障礙ヲ蒙ツテ留ルモノ、又稍々恢復シタモノヲ認メ、長期間ト雖モ必ズシモ最大值ニ邁進スル傾向ハ認メラレナイ。

240 日ニ達シタモノデハ却テ恢復シタ如キ状態デ、障礙度モ約 50% ニ過ギヌ。

斯ク以上ノ期間ノ實驗例ヲ通ジテ觀察スルト聽覺ニ關スル障礙度ノ進行ハ單純ナル一方向ヘノ歸趨トハ考ヘ難イノデアリ、之等ヲ唯單ナル個體差ナル遁辭デ説明スルコトハ出來ナイ。

即チ 90 日ト 100 日ノ間デ稍々恢復ヲ示シ、120 日デ又著シク障礙ヲ進メ更ニ又 170 日カラ 190 日ノ間デ恢復ノ状態ニ在ル現象ヲ窺ヘルノデアル。尙ホ此考察ヲ進メル上ニ次ニ掲ゲル第 2 實驗ノ結果ハ與ツテカアルモノデアラウ。

二、第二實驗ノ總括

既ニ前編ニ於テ此騒音聴器障礙實驗ニ使用シタ處ノ騒音ノ音響學的分析ニ就テ明カニシタ如ク、之ハ f^4 音ヲ最大振幅トシテ其前後ノ音ヲ主要ナル部分音トスル性質ヲ持ツテキルガ、之ヲ長期間海狸ニ作用セシメタ場合ニ實驗動物ハ其部分音ニ相當スル音ニ對シテ如何ナル耳殻反射運動ノ大サデ反應スルモノデアルカヲ明瞭ニスル目的デ實施シタノガ本實驗デアル。

茲ニ一定ノ強サデエーデルマン氏笛ノ a^3-a^4 ノ間ノ8音ヲ順次聴取セシメル場合、正常ナル動物デハ此範圍デハ其出現スル耳殻反射運動ノ大サノ間ニ著差ヲ認メナイガ、之等ノ關係ハ長期間ニ亘ツテ彼ノ騒音ヲ作用セシメタ實驗動物ニ於テハ大イニ異ツタ結果ヲ示スノデアル。

早クモ騒音作用日數50日デ a^3-a^4 ノ8音ニ對シ全然反應シナイ動物モアルガ此期間デハ一般ニ著シク全體ノ攣縮高ヲ減ジテ居リ、 e^4 カラ上ハ殊ニ著シク高サヲ減ジ、 f^4 デ更ニ低ク、 g^4, a^4 デハ全然消失シテ居ルモノヲ認メルノデアル。

75日カラ100日ノ間デハ100日ニ近ヅクニ從ツテ f^4 ノ攣縮高ガ最モ低ク之ニ次イデ g^4, a^4 デ高サヲ著シク減ジテ居ルノニ反シ、他ノ a^3, h^3, c^4, d^4 等デハ却テ40-60日ノ間ノ例ニ比シ其高サヲ著シク恢復シテ居ルノガ一見シテワカル次第デアル。

即チ夫レ迄全體トシテモ低カツタモノガ或種ノモノヲ除キ恢復スベキモノハ恢復シタト言ヘウ。

處ガ騒音曝露ノ實驗日數ガ100日カラ120日ニ至ルト又モヤ全體トシテノ攣縮高ハ減ジテ來ル他ニ特ニ f^4 音ニ於ケル高サガ顯著ニ低下シ、此音ダケ消失ヲ示ス例モアリ、他ノ音トノ差異ガ最

モ明瞭ニナツテ來ル。

之ニ次イデハ g^4, a^4 ガ甚ダシク高サヲ減ジ、 e^4 モ a^3-d^4 ノ4音ニ比シテ低下シ、主要部分音ノ選擇的障礙ノ現ハレハ愈々ハツキリシテ來タノデアル。

120-130日ノ間ニ於テモ此狀態ハ連續シ、程度ヲ増シタ觀ヲ呈シ障礙ノ動向ハ既ニ決マツタモノノ如クデアル。

尙ホ、150-160日ノ實驗日數ノ例デモ f^4, g^4 デ完全ニ反射運動ヲ消失シタモノ、又夫レニ近イモノガ多ク、8音全體トシテノ攣縮高ノ減ジ方モ著シイ。

170日カラ190日ノ實驗日數ノモノデハ f^4, g^4, a^4 ヲ消失シタモノガ大部分デアル。而シテ e^4 ハ之等ニ次イデ高サヲ減ジ、又 a^3, h^3, c^4, d^4 等ハ150-160日ノ間ノ實驗例ニ比ベテ攣縮高ヲ増シテ居ルモノヲ多ク認メルノデアル。

190日以後ノ實驗例デハ f^4, g^4, a^4 等ニ對スル選擇的障礙ノ狀勢ハ極致ニ達シテキル。

以上ニ就テ大局カラ觀察スルト f^4 音ニ對スル耳殻反射運動ノ大サガ最モ著シク減退シ此障礙ガ特別ニ甚大デアルノヲ思ハシメル。之ニ次イデハ g^4, a^4 ノ2音ニ對シテ侵害セラレ、更ニ之ニ次イデハ e^4 ノ攣縮高ガ低下シテ居ル。

而シテ之等ノ4音ハ他ノ4音ニ比シテ耳殻反射ヲ全然消失スルカ又ハ痕跡ノヲ反射ノ大サヲ示スニ留マリ著差ヲ以テ相對スルモノデアリ、初メ40-60日ノ期間デハ8音全體トシテモ攣縮高ヲ減ジタモノガ次第ニ選擇的ニ侵サレル様ニナリ、100日ニ近イ頃 a^3, h^3, c^4, d^4 ノ4音デハ攣縮高ヲ恢復シテ來ル。

之ガ120日ヲ過ギルト再ビ4音ハモトヨリ全體トシテモ低下ヲ示シ、之ヨリ日數ガ増スニ從ツ

テ f^1 , g^1 , a^1 及ビ e^1 ニ於ケル消失減退ハ一層顯著トナリ、170日ヲ經過スル頃カラ又他ノ4音ハ恢復ヲ呈スルノガ窺ハレルノデアル。

三、實驗成績全體トシテノ考察

本編ニ於ケル第1、第2ノ兩實驗ハ全然異ツタ見地カラ。前者デハ音ニ對スル耳殻反射ノ最小刺激値ノ變動ヲ、後者ハ騒音ノ部分音ニ對スル耳殻反射ノ大サニ就テ質的ニ觀察シタモノデアル。

第1實驗ノ結果ニ於テ最初ノ50日カラ90日ノ間デ實驗動物ハ一般ニ著シイ障礙ヲ蒙リ、障礙度ヲ増大シテ居ル處ハ、第2實驗ノ此期間ニ於ケル例デ a^3 カラ a^4 ニ至ル8音ニ對スル耳殻反射運動ノ大サヲ全體トシテ減退シテ居ル事實ニ一致シテ居ル。但シ後者ニ於テハ同時ニ e^1 カラ上ノ4音ニ於テ一層顯著ナ消失又ハ減退ヲ見セテ居ル。

而シテ實驗日數90日ヲ過ギル頃障礙度ヲ減ジテ居ル狀態ハ、 f^1 , g^1 , a^1 等ヲ除ク他ノ音ニ於テ攣縮ノ大サヲ増大シ恢復シタ様ナ觀ヲ呈スル處ト正ニ一致スル。

然ルニ實驗日數ガ100日ヲ經過スル頃カラ次第ニ又障礙度ヲ増ス傾向ガアルガ、此頃カラ同様ニ8音全體トシテモ攣縮高ヲ減ジテ f^1 ニ於ケル耳殻反射ノ大サヲ顯著ニ減ジテ居ル。

尙ホ150—160日ノ間デハ最も障礙ノ甚シイ印象ヲ受ケル點デ兩實驗ハ同様ノ相ヲ示シテ居ルモノデアラウ。

更ニ170—190日ノ頃ニ兩實驗共ニ稍々恢復ノ傾向ヲ示ス處モ認メラレ、此期間カラ後ハ大キナ障礙度デ留ルモノ又稍々恢復シテ居ルモノヲ見ルガ、他方又一定音ニ對スル選擇的障礙ノ態度ヲ明ラカニシテ居ル。

要スルニ105「デシベル」ノ強サヲ有シ、 f^1 ヲ最大振幅トシテ其前後ノ音（振動數：1820—4095「ヘルツ」）ヲ主要部分音トスル騒音ノ持續的作用ニヨリ、最大值又ハ之ニ近イ處ノ著シイ障礙ヲ受ケルガ此障礙度ハ實驗日數ニ比例シテ累加スルモノデハナク、90日カラ100日ノ間及ビ170日カラ190日ノ間デ稍々恢復ノ微ヲ示シ、又刺激音ノ質的關係ニ關シテハ騒音ノ持續的作用ニヨリ主要部分音ニ對スル選擇的障礙ガ認メラレ、就中最大振幅ノ部分音 f^1 ニ對シテ耳殻反射ハ多ク消失或ハ極度ノ減退ヲ示シ、 a^3 , h^3 , e^1 , d^1 ノ諸音ニ對シテハ色々ノ消長ガアルガ前記2回ノ期間デ同様ニ稍々恢復ノ態度ヲ呈スルコトニ於テ一致シテキルノデアル。

結 論

(1)、一定強度ノ然モ音響學的分析ノ結果ヲ明カニセル騒音ヲ持續的ニ海狸ニ作用セシメ、一定基準音ニ對スル海狸ノ音響性耳殻反射運動ヲ數量的ニ觀察スル爲メ曲線描寫ヲ企圖シタ。

(2)、音響性耳殻反射運動ノ消長ニヨツテ聴覺盛衰ノ一部ガ説明サレルナレバ機能的檢索ニ資スル處多大デアル。

(3)、此目的ヲ以テ該耳殻反射運動檢査用ノ刺激基準音ヲ e^1 ニ撰ビ、其強度ヲ先ヅ一定ニシテ、之ヲ吸音物質「フェルト」ノ一定量ニヨリ系統的ニ減衰セシメ刺激音トスル裝置ヲ創案シ、以テ耳殻反射運動ノ最小刺激値ニ相當スル音響強度ヲ正常對照個體ノ夫レニ比シ「デシベル」單位式ノ對數感度デ表現シヨウト試ミタ。

(4)、海狸ニ於テハ吸音物質透過ニヨリ減衰セシメタ音響強度系列ニ對シ、耳殻反射運動ノ大サハ略々直線のナル減衰ヲ呈スル平行關係ノ

存在スルノヲ知ツタ。

(5). 此耳殻反射運動ノ減衰曲線ヲ最小自乘法ヲ用ヒテ直線ニ校正シ、最小刺激値ニ相當スル音響強度ニ至ラシムル吸音物質透過量ヲ推算スル方法ヲトリ此量ヲ假ニ q ト名付ケタ。

正常ノ對照實驗動物ニヨツテ測定計算シタ q ノ平均値ハ 8.90 ± 0.43 デアル。

(6). 「オッシログラフ」ヲ使用シテ音響強度減衰狀態ヲ觀察計測セル結果、「フェルト」1枚(厚サ3 mm)ニヨル減衰度ハ0.13デアルノヲ知ツタ。

(7). 音響性耳殻反射運動ノ消長ヲ對數感度デ求ムレバ $D_{ab} = 1.3(8.90 - q)$ デ表現セラレ、之ヲ以テ障礙度トナシタ。

(8). 105「デシベル」ノ強度ヲ有シ、 f^4 ヲ最大振幅トシ其前後ノ音ヲ主要部分音トスル騒音ノ持續的作用ニヨリ、海獺ハ最大値(11.57 db.)

又ハ夫レニ近イ高度ノ障礙度ヲ示スガ、其消長ハ單ニ作用實驗日數ニ比例スルモノデハナク、90日ト100日ノ間及ビ170日ト190日ノ間デ稍々恢復ノ徴アルヲ觀察シタ。

(9). 一定ノ強サデ $a^3 - a^4$ ノ間ノ8音ヲ撰ビ之等ヲ刺激音トシテ作用セシムレバ、正常ノ海獺デハ此範圍ノ音デ出現スル耳殻反射運動ノ大サニ著差ヲ認メナイ。

(10). 此方法ヲ以テ持續的騒音聴器障礙實驗例ヲ検査スルト、 $a^3 - a^4$ ノ8音全體ニ對スル耳殻反射運動ノ減退ト共ニ騒音ヲ構成スル主要部分音ニ對スル選擇的障礙ヲ呈シ、就中最大振幅ノ部分音 a^4 ニ對シテ耳殻反射運動ハ多ク消失スルカ或ハ只痕跡ニ留マリ、 a^3 、 a^4 及ビ a^5 ニ對スル減退之ニ次ギ他ノ検査音ニ就テハ(8)ニ於テ述ベタト同様ナ期間ニ稍々恢復ノ傾向ヲ認メタ。

稿ヲ了ルニ臨ミ終始懇篤ナル御指導ヲ忝ウシ御校閲ヲ賜ハリタル恩師久保教授ニ衷心ヨリ感謝ノ意ヲ表シ、尙ホ有益ナル御助言ヲ仰ギタル工學部物理學教室渡邊助教ニ深甚ナル謝意ヲ捧ゲル。(昭和9年11月19日)

主 要 文 献

1) **Barkhausen, H. u. G. Lewicki:** Phys. Zs. 25 p. 537, (1924) zit. * 2) **v. Helmholtz, H.:** Die Lehre von den Tonempfindungen. (1863). 3) **Hoshino, T. (星野貞次):** 音刺激ニ因ル反射性耳殻運動ニ就テ. 東京醫會誌. 37卷, 313頁, (1923). 4) **Kidokoro, S. (城所信五郎):** 笛聲ニヨル プライエル氏耳殻反射運動ノ實驗的研究. 東京醫會誌. 47卷, 6號, 113頁, (1933). 5) **Marx, H.:** Untersuchung über experimentelle Schädigungen des Gehörorgans. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 59, S. 333, (1909). 6) **Obata, J. (小幡重一):** 實驗音響學. (1933). * 7) **Preyer, W.:** Die Seele des

Kindes. (1923), S. 51. 8) **Sabine, P. E.:** Acoustics and Architecture. (1932), p. 81. 9) **Saito, M. (齋藤慎):** 音刺激ニ因ル反射性耳殻運動ニ就テノ實驗的研究. 耳鼻臨牀. 22卷, 101頁, (1928). 10) **Satta, C. (颯田琴次):** 音響刺激ニ因ル耳殻反射ノ實驗的研究. 大日耳鼻. 35卷, 763頁, (1929). 11) **Tanabe, H. (田邊尚雄):** 音樂原論. 世界音樂講座. 春秋社. (1934). 12) **Yoshida, S. (吉田三郎):** 持續性音響刺激ノ プライエル氏耳殻反射運動ニ及ボス影響ニ就キテノ實驗的研究. 大日耳鼻. 36卷, 1345頁. (1930).

河田論文附圖(1)

騒音ニヨル聴器障礙ニ關スル實驗的研究(第二編)

Abb. 1.

Abb. 2.

S. Kawata: Experimentelle Studien über Lärmschädigungen des Gehörorgans.
II. Mitteilung: Über das Verhalten des Preyerschen Ohrmuschelreflexes
bei Lärmschädigung des Gehörorgans.

河田論文附圖(2)

騒音ニヨル聴器障礙ニ關スル實驗的研究(第二編)

Abb. 3.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

S. Kawata: Experimentelle Studien über Lärmschädigungen des Gehörorgans.
 II. Mitteilung: Über das Verhalten des Preyerschen Ohrmuschelreflexes
 bei Lärmschädigung des Gehörorgans.

河田論文附圖(3)

騒音ニヨル聽器障礙ニ關スル實驗的研究(第二編)

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

S. Kawata: Experimentelle Studien über Lärmschädigungen des Gehörorgans.
II. Mitteilung: Über das Verhalten des Preyerschen Ohrmuschelreflexes
bei Lärmschädigung des Gehörorgans.

河田論文附圖(4)

騒音ニヨル聽器障礙ニ關スル實驗的研究(第二編)

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 21.

Fig. 22.

河田論文附圖(5)

騒音ニヨル聴器障礙ニ關スル實驗的研究(第二編)

Fig. 23.

Fig. 24.

Fig. 25.

Fig. 26.

Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Fig. 31.

S. Kawata: Experimentelle Studien über Lärmschädigungen des Gehörorgans.
II. Mitteilung: Über das Verhalten des Preyerschen Ohrmuschelreflexes
bei Lärmschädigung des Gehörorgans.

河田論文附圖(6)

騒音ニヨル聽器障礙ニ關スル實驗的研究(第二編)

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 34.

Fig. 35.

Fig. 36.

Fig. 37.

Fig. 38.

S. Kawata: Experimentelle Studien über Lärmschädigungen des Gehörorgans.

II. Mitteilung: Über das Verhalten des Preyerschen Ohrmuschelreflexes
bei Lärmschädigung des Gehörorgans.

附 圖 說 明

Abb. 1. 音響性耳殻反射描寫實驗裝置。

Abb. 2. 吸音物質ニヨル音減衰裝置ノ防音箱。

Abb. 3. C⁴音ノ吸音物質透過ニヨル減衰ヲ示ス
「オッシログラム」。(I. II等ハ隔壁番號)

(I) 第一實驗ニ對スル對照實驗

(Fig. 1.—Fig. 5.)

實驗動物番號

Fig. 1. 77.

Fig. 2. 79.

Fig. 3. 302.

Fig. 4. 310.

Fig. 5. 313.

(II) 第二實驗ニ對スル對照實驗

(Fig. 6.—Fig. 11.)

Fig. 6. 310.

Fig. 7. 307.

Fig. 8. 306.

Fig. 9. 311.

Fig. 10. 303.

Fig. 11. 79.

(1) 第一實驗

實驗動物番號 騒音作用日數

Fig. 12. 68. 50日

Fig. 13. 72. 58日

Fig. 14. 85. 58日

Fig. 15. 87. 104日

實驗動物番號

騒音作用日數

Fig. 16. 64. 106日

Fig. 17. 63. 102日

Fig. 18. 101. 131日

Fig. 19. 84. 131日

Fig. 20. 62. 109日

Fig. 21. 65. 105日

Fig. 22. 54. 210日

Fig. 23. 71. 115日

(2) 第二實驗

Fig. 24. 71. 43日

Fig. 25. 83. 50日

Fig. 26. 68. 50日

Fig. 27. 72. 58日

Fig. 28. 85. 58日

Fig. 29. 73. 87日

Fig. 30. 63. 102日

Fig. 31. 65. 105日

Fig. 32. 64. 105日

Fig. 33. 62. 109日

Fig. 34. 71. 115日

Fig. 35. 82. 131日

Fig. 36. 84. 131日

Fig. 37. 101. 131日

Fig. 38. 55. 240日

(原稿到着ニ昭和10. 11. 23)