大日本耳鼻咽喉科會報

第四十三卷 第一號

(昭和十二年一月)

原 著

類「デフテリー」性中耳炎耳漏ヨリ分離セル 新桿菌ニ就テ

G. Konischi: Über einen neuen aus diphtheroider Otitis erfundenen Bacillus.

大阪帝國大學醫學部耳鼻咽喉科教室 (主任 山川教授)

助手 醫學士 小 西 儀 一

内 容 目 次

第一章 緒 言	第二項 諸種藥物ニヨル抵抗
第二章 類「デフテリー」性中耳炎ニ關スル
文獻概要	(A) 石炭酸ニヨル影響
第三章 本研究ノ目的	(B) 酒精ニヨル影響
第四章 症例並ニ症例ノ總括並ニ考案	(C) Tripaflavin ニヨル影響
第五章 研究材料並ニ研究方法
附 余ノ使用セル染色方法	第六節 毒力試験
第六章 檢出シタル新桿菌ノ形態並ニ生物學	第一項 實驗方法
第一節 新桿菌ノ形態並ニ染色	第二項 實驗成績
第二節 培養所見	(A) (イ) 竹内菌ノ「マウス」ニ對ス
ル毒性
第一項 實驗方法	(ロ) 竹内菌ノ海狗ニ對スル毒性
第二項 實驗成績	(B) (イ) 福岡菌ノ「マウス」ニ對ス
ル毒性
第三節 培養基水素「イオン」濃度ガ菌發
育ニ及ボス影響	(ロ) 福岡菌ノ海狗ニ對スル毒性
第四節 瓦斯發生試験「インドール」產生
ノ有無及ビ酸素トノ關係	(C) (イ) 村田菌ノ「マウス」ニ對ス
ル毒性
第一項 瓦斯發生試験	(ロ) 村田菌ノ海狗ニ對スル毒性
第二項 「インドール」產生ノ有無	(D) (イ) 咽頭「デ」患者ヨリ分離セ
シ「デ」菌ノ「マウス」ニ
對スル毒性
第三項 菌増殖ト酸素トノ關係	(ロ) 咽頭「デ」患者ヨリ分離セ
シ「デ」菌ノ海狗ニ對スル
毒性
第四項 菌培養ニ伴フ培地水素「イオン」
濃度ノ變化	
第五節 新桿菌ノ抵抗ニ就テ	第七節 各種含水炭素分解試験
第一項 溫度ニ對スル抵抗	

- 第一項 實驗方法
 第二項 實驗成績
 (A) 竹内菌
 (B) 福岡菌
 (C) 傳研F菌
 (D) 北研F菌
 (E) 綠膿菌
 (F) 大腸菌
 (G) 「サフテリー」菌
 (H) 村田菌
- 第七章 血清學的檢索
 第一節 凝集反應
 第一項 實驗方法
 (A) 使用菌株
 (B) 菌液ノ製法
 (C) 免疫血清ノ製法
 (1) 免疫實施方法
 (ロ) 家兎免疫操作中ニ於ケル體重ノ増減
 (D) 凝集反應操作
- 第二項 實驗成績
 (A) 各菌各自ノ免疫血清ノ凝集價
 (B) 竹内菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應
 (C) 福岡菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應
 (D) 傳研F菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應
 (E) 北研F菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應
 (F) 綠膿菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應
 (G) 大腸菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應
 (H) 「サ」菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應
 (I) Proteus X19 菌、靈菌、乳酸菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應

- 第三項 凝集反應試驗總括並ニ考案
 第二節 吸收試驗 (カステラニー氏)
 第一項 實驗方法
 第二項 吸收試驗成績
 A) 竹内菌免疫血清使用
 B) 福岡菌免疫血清使用
 C) 傳研F菌免疫血清使用
 D) 北研F菌免疫血清使用
 E) 綠膿菌免疫血清使用
- 第三項 總括並ニ考案
 第三節 補體結合反應
 第一項 實驗方法
 (A) 各菌ノ抗原ノ製法
 (B) 使用血清ノ種類
 (C) 溶血系統
 (1) 溶血素
 (2) 免疫血清ノ溶血價測定法
 (3) 感作血球
 (D) 補體
 (1) 補體ノ最小溶血價測定方法
 (E) 實驗操作
 (1) 抗原ノ抗補體作用測定並ニ使用量ノ決定
 (2) 補體結合反應術式
 (3) 對照試驗
 (1) 血清對照
 (ロ) 抗原對照
 (ハ) 補體對照
- 第二項 實驗成績
 (A) 竹内菌ヲ抗原トセル試驗
 (B) 福岡菌ヲ抗原トセル試驗
 (C) 傳研F菌ヲ抗原トセル試驗
 (D) 北研F菌ヲ抗原トセル試驗
 (E) 綠膿菌ヲ抗原トセル試驗
- 第三項 實驗成績總括並ニ考案
 第八章 全編ノ總括並ニ考案
 第九章 結論
 文献並ニ附圖

第一章

緒言

中耳炎ノ起炎菌並ニ耳漏中ノ細菌ガ臨牀上中耳炎經過ニ重大ナル役目ヲナスハ言フ要セズ。而シテ吾人日常屢ニ遭遇スル中耳炎患者ノ耳漏ノ塗抹標本ヲ檢査スル時其處ニ多種多様ノ細菌ノ出現スルヲ見ル。特ニ大小不同ノ桿菌ガ中耳

炎ノ性狀ニ從ツテ時ニ粘液性連鎖狀球菌、肺炎球菌、双球菌、連鎖狀球菌、葡萄狀球菌等ト混在シテ時ニ殆ンド之等桿菌ノ純培養狀ニ出現スルヲ見ル。我が耳科領域ニ於テ 1880 年 Löwenberg ニヨリテ初メテ細菌學的研究ヲナサレ、

其後 1881 年 Zaufel 出デテ中耳炎發生ニ對スル多數ノ細菌ノ意義ヲ明カニナセリ。更ニ Leu-tert (1899) ハ中耳炎並ニ其合併症ニ對スル細菌ノ意義ヲ記載セリ。其後此方面ノ研究次第ニ増加シ 1926 年 Streit ハ Denker-Kahler ノ著書中ニ中耳炎ニ關スル 34 種類ノ細菌ヲ記載セリ。

然レ共中耳炎耳漏中ノ多種多様ノ桿菌ニ至ツテハ一定ノ細菌學的並ニ血清學的檢索ニ依ラズンバ之等ノ菌ヲ決定スル事不可能ナリ。而シテ斯卡ル桿菌ノ從來記載セラレタル何菌種ニ屬スルヤ等ノ記載ナキニ非ズト雖モ夫レノ細菌學的並ニ血清學的ニ詳細ニ檢索セルモノナシ。

余ハ中耳炎耳漏中ニ屢ニ「デフテリー」菌狀排列ヲ有スル桿菌ノ存在スルコトニ着目シ昭和 10 年 1 月ヨリ同 6 月迄約 6 ヶ月間ニ中耳粘膜ニ義膜ヲ形成シ且ツ塗抹標本ニ於テ殆ンド純培養狀ニ出現セル「デ」(以下「デフテリー」ヲ「デ」ト記載ス) 菌狀排列ヲ呈セル 3 例ノ中耳炎患者ニ遭遇シ「デ」性中耳炎ノ疑ノ下ニ「デ」特殊療法ヲ施行セリ。而シテ其 1 例ニ於テ相當效果ヲオサメ得タルモ他ノ 2 例ニ於テハ全然奏效セズ。極メテ長キ經過ヲ取り全ク治癒ノ傾向ヲ認メザリキ。而シテ上記 3 例ニ關シ恩師山川教授ノ命ニヨリ其中耳分泌物ノ詳細ナル生物學的並ニ血清學的研究ニ着手セリ。

而シテ余ハ「デ」特殊療法ニ奏效セザル類「デ」性中耳炎患者ヨリ文獻上未ダ記載セラレザル螢光菌 (Pseudomonas fluorescenz) ニ近似セル Genus Pseudomonas ニ屬スル 1 新桿菌ヲ檢出シ得タルヲ以テ茲ニ報告シ併セテ螢光菌族ト余ノ新桿菌トノ關係ヲ種々ノ方面ヨリ殊ニ血清學的ニ詳細ニ檢索シ一定ノ成績ヲ得タレバ茲ニ報

告シ諸賢ノ御批判ヲ仰ガントス。

第二章

類「デ」性中耳炎ニ關スル文獻

抑モ中耳粘膜ニ義膜ヲ形成セル疾患ハ今日迄記載セラル、所ニヨレバ。(1)「デ」性中耳炎。(2) 綠膿菌ニヨル中耳炎。(3) Plaut-Vincent'sche Bakterien ニヨル中耳炎。(4) 結核性中耳炎トス。(義膜ト眞珠腫塊又ハ剝離上皮細胞ト鑑別スベキハ論ヲ俟タズ。)

(1) 「デ」性中耳炎。

「デ」性様炎症ノ中耳粘膜ニ來タレルコトヲ初メテ記載セシハ 1868 年 Wreden ナリ。彼ハ「デ」性中耳炎ノ標題ノ下ニ 2 例ヲ記載セリ。第 1 例ハ生後 6 週目ノ幼兒ニシテ歐氏管並ニ中耳腔ニ膿汁及ビ義膜形成ヲ見タリ。第 2 例ハ 3 ヶ月ノ幼兒ニシテ壞疽性「デ」性中耳炎ナリキト。1870 年 Wendt ハ「デ」ノ爲メニ死亡セル 5 例ノ死體解剖所見並ニ聽器ノ病理解剖學的所見ヲ記載セリ。同時代ニ Moos ハ咽頭「デ」經過中ニ於ケル鼓膜ヨリノ出血ヲ記載セリ。1884 年 Moos ハ Steinbrugge ト共ニ「デ」ニヨリテ死亡セル 6 例ノ顱顙骨ノ組織學的所見ヲ記載セリ。1898 年 Moos ハ 2 歳ヨリ 7 歳迄ノ小兒 6 例ノ「デ」性中耳炎ヲ。1876 年 Küpfer ハ「デ」ニテ死亡セル 4 歳ノ小兒ノ鼓室粘膜ニ「デ」性炎症ヲ見。同年 Heydloff 及ビ 1891 年 Gottstein ハ各々「デ」性中耳炎ノ 1 例ヲ記載セリ。Burckhardt-Merian ハ猩紅熱ヲ伴フ時ハ「デ」性中耳炎ハ増悪スルモノナリト記載セリ。1880 年 Wolf ハ歐氏管經由感染ノ重症中耳「デ」ノ多數例ヲ擧ゲタリ。1881 年 Blau ハ急性傳染病時ニ於ケル聽器ノ變化殊ニ「デ」

性疾患ヲ記載セリ。又 1880-1882 年＝Marian
ハ 21 例ヲ。1882-1883 年 Bezold ハ其 15 例＝
就キ。1889 年 Hirsch ハ 2 例ノ「デ」性中耳炎
ヲ報告セリ。更ニ 1891 年 Siebenmann, Harke
ハ其 16 例ノ「デ」性中耳炎ノ中耳所見ヲ記載
セリ。

尙ホ當時迄「デ」ノ病原體未ダ發見セラレザリ
シヲ以テ同時代迄ノ記載ハ總テ其臨牀的或ハ病
理解剖學的觀察ニノミ止マリ其病原體ニ關スル
記載ハ無カリキ。然ルニ 1884 年 Löffler ハ血
清培地ニ純培養セル「デ」菌ヲ發見セシヨリ細
菌學的記載モ出現スルニ至レリ。即チ 1897 年
Lommel ハ 25 例ノ「デ」性中耳炎患者ニ關シ
詳細ナル義膜ノ性状並ニ細菌學的研究ヲナシ此
方面ニ光明ヲ與ヘタリ。

19 世紀ニ至リ 1900 年 Krepuska ハ鼓室ノ原
發性「デ」ヲ。1904 年 Kobrak ハ義膜形成ナ
キ「デ」性中耳炎ニ關シ歐氏管感染ノ比較的多
キヲ述ベタリ。1902 年 Podack ハ Maser-Cro-
up ト「デ」性中耳炎ノ關係ヲ論ジ。1904 年 Daase
ハ 11 歳ノ小兒ノ原發性中耳「デ」ヲ記載セリ。
更ニ 1908 年 Kobrak モ亦原發性「デ」性中耳
炎ニ關シ。同年 Hamilton ハ假性「デ」菌ニヨ
ル中耳炎ヲ報告セリ。同年 Carli モ其 1 例ヲ報
告セリ。

1913 年ニ至リ Bénesi Oskar モ其 1 例ヲ。1913
年及ビ 1915 年ニハ Szmurlo ノ「デ」性中耳炎
ノ記載アリ。1917 年ニハ Körner。1918 年ニハ
Münchmeyer und Nast。1919 年ニハ Douges
und Ellfeldt。1921 年ニハ Davidson u. Hecke
ハ耳分泌物中ノ「デ」菌ニ就キテ記載セリ。
1922 年 Gugenheim ハ 3 ケ年ニ經驗セシ 12 例
ノ「デ」性中耳炎ニ關シ詳細ナル報告ヲナセリ。

尙ホ 1926 年 Alexander ハ「デ」性中耳炎ヨリ
顳骨突起ノ化膿例ヲ。同年 Meyer ハ Denker-
Kahler ノ著書中ニ於テ「デ」性中耳炎ニ關シ
總括的記載ヲナセリ。其後 1927 年 Suarez,
Andres ハ Angina ニ續發セル「デ」性乳嘴突
起炎ノ 2 例ヲ。又同年 Borian ハ 4 歳ノ小兒ノ
原發性中耳「デ」ノ 1 例ヲ記載セリ。

1930 年 Georg Claus ハ中耳「デ」ト題シテ
Gugenheim 以來ノ文献的記載ヲナセリ。又同
年 Constantin 及ビ Laroque ハ「デ」性中耳
炎ヨリ乳嘴突起炎ヲ起セル症例ヲ。1931 年ニハ
Fox, Noach ハ Bradykardie ヲ有スル「デ」
性乳嘴突起炎ヲ頭蓋内合併症ト誤診サレタル症
例ヲ報告セリ。1932 年 Kopác ハ 6 歳ノ小兒ノ
「デ」性中耳炎ヨリ乳嘴突起炎及ビ骨膜下膿瘍
ヲ起セル症例ヲ。同年 Underwood 及ビ Ash-
worth ハ「デ」ノ合併症トシテノ乳嘴突起炎例
ヲ報告セリ。

我國ニ於テハ「デ」性中耳炎ニ注目セシハ最近
ノ事ニシテ中島。上村。渡邊孝。渡邊悌二。原。
美田。緒方。種村。館。古閑。鈴木等ノ報告ア
ルニ過ギズ。而シテ之等多クハ唯臨牀的觀察ニ
過ギズ。之ヲ細菌學的ニ研究セシハ誠ニ寥々タ
ルモノニシテ腰野ガ乳嘴突起炎開鑿創ヨリ得タ
ル 9 例ノ Paradiptérie 菌ニ就キテノ細菌學
的研究アルニ過ギズ。

(2) 「デ」菌以外ノ菌ニヨル中耳ノ義膜形成
ハ 1906 年 Voss ニヨリテ綠膿菌ニヨル事アル
ヲ記載セルノミ。

(3) 1912 年 Gerlach ハ Plaut-Vincent'
sche Bakterien ニヨリテ外耳ニ義膜ヲ形成シ更
ニ中耳粘膜ニモ同様義膜形成セル十數例ノ中耳
炎ヲ報告セリ。此場合勿論「デ」菌ハ證明シ得ザ

リシヲ以テ *Plant-Vincent'sche Bakterien* = ヨリテ義膜形成セラル、モノナリトセリ。1921年 Frenzel モ 同様 *Plaaut-Vincent'sche Bakterien* = ヨリテ中耳粘膜＝義膜形成アル數例ヲ報告セリ。

(4) 1926年 Meyer ハ猩紅熱又ハ中耳結核＝中耳＝義膜形成セラル、コトアルヲ述べ「デ」性中耳炎ト鑑別スベキモノナリトセリ。最近佐藤ハ中耳結核＝鼓膜＝剝離シ難キ固キ「フィブリン」性物質ノ附着セルコトアルヲ記載セリ。

第三章

本研究ノ目的

凡ソ一細菌ガ從來記載セラレタル何菌族＝屬スルヤ決定スルハ菌種＝ヨリ困難ナラザル場合アレド、通常同一菌族＝於テモ多數ノ菌型＝區別セラレ且ツ其類似菌アルヲ以テ之ヲ正確＝決定センニハ一定ノ細菌學的並ニ血清學的檢索ヲ要スルモノナリ。余ハ下記中耳＝義膜形成ヲナス類「デ」性中耳炎ノ3例ヨリ得タル桿菌＝關シ果シテ如何ナル菌ナリヤ決定シ、且ツ類似菌ト鑑別並ニ關係ヲ種々ノ方面ヨリ詳細ニ研究シ、「デ」菌診斷ノ一助ナラシメント本研究ヲ企テタリ。

第四章

症 例

第一例 患者。竹内伸○。6歳男兒。職業會社員族。

家族歴。父母兩系。父系ノ祖父母健在ナルモ祖母老衰ヲ以テ死亡ス。父母共ニ強健ニシテ何等特記スベキモノナシ。兄弟ナシ。

既往症。患者ハ生來寒目＝罹リ易ケレドモ著

患ナカリキ。昭和8年6月、咽頭「デ」＝罹患シ血清注射ヲ受ケ約10日間入院加療＝ヨリテ全治退院セリ。其他著患ヲ知ラズ。約2年前ヨリ患者ハ左側中耳炎＝罹リ山梨縣ニテ醫治ヲ受ケ其間14回ノ鼓膜切開ヲ受ケタルモ耳漏止マズ。耳痛ナシ。患者ハ2日前ヨリ風邪＝罹リ發熱アルモ耳痛、頭痛ハ無カリキ。

主 訴。左側耳漏及ビ難聴。

初 診。昭和10年1月18日外來「カルテ」番號418。

全身所見。體格。榮養共ニ佳良ナルモ顔面稍蒼白ナリ。胸部＝輕度ノ氣管枝炎症狀アルモ其他著變ナク、尿亦正常ニシテ糞便中ニ寄生蟲卵ヲ證明セズ。

局所所見。左側乳嘴突起部壓痛及ビ腫脹ヲ認メズ。左側外聽道＝ハ多量ノ濃厚ナル膿汁ヲ充タス。之ヲ綿棒ヲ以テ清淨トナスニ鼓膜ハ大ナル穿孔ヲ來タシ僅カニ其周邊部ヲ殘留スルニ過ギズ。而シテ鼓室ノ後、下部ハ褐白色ノ義膜様物質ヲ以テ充滿セラル。其一部ヲ「ピンセット」ニテ比較的容易ニ除去シ得タリ。此際出血ハ殆ンド伴ハザリキ。而シテ鼓室粘膜ハ發赤シ輕度ノ腫脹ヲ認ム。而シテ上鼓室＝モ亦發赤ヲ認メタリ。兩側鼻腔清淨ナルモ兩側鼻中隔前庭部ニ菲薄ナル白色義膜様物質ヲ認メタリ。兩側口蓋扁桃腺亦輕度ノ腫脹アリ。

細菌學的 檢 査

1月18日、耳漏ノ塗抹標本ヨリ純培養狀ニ出現セル「デ」菌様排列ヲ呈セル桿菌ト極メテ僅少ナル双球菌ヲ認メタリ。

本桿菌ハナイセル氏染色法ニヨリテ異染體ハ染色セザレドモ多少顆粒構造ヲ認メタリ。而シテ結核菌ハ證明セザリキ。尙ホ鼻腔ヨリモ殆ンド

同形ノ桿菌ヲ證明セリ。而シテ研究材料トシテ耳漏ヲ血液寒天並ニレフレル氏血清培地上ニ塗抹シ其純培養ヲ得タリ。

上記所見ヨリ「デ」性中耳炎ノ疑ノ下ニ1月21日入院。1月22日再ビ耳漏ヨリ同様なル桿菌ヲ認メタリ。當時體溫 36.8°C 。脈搏 100 ナリキ。同一 6000 單位ノ「デ」血清ヲ注射セリ。注射後耳漏ノ性状等ヲ觀察スルト注射前ト著變ナカリキ。1月29日即チ血清注射後7日ニシテ發熱 38.5°C ニ及ビ全身殊ニ胸部。兩側四肢ニ血清疹ヲ見タリ。2月2日再ビ細菌學的検査ヲナスニ塗抹標本並ビニ培養上前記セント同一所見ナリキ。依テ本桿菌ノ純培養ヲ生理的食鹽水 1.0ccニ1mg, 2mg, 4mg, 6mg, ノ割合ニ菌浮游液ヲ作製シ海狸ノ腹腔内ニ注射セシニ2mg, 4mg, 6mg, ノ菌量ニ於テ海狸ハ24時間内ニ斃死セリ。

患者ハ其後症狀ニ大差ナキヲ以テ1月28日退院セリ。其後2月14日ヨリ毎日太陽燈ヲ5分間宛左耳部ニ放射療法ヲナスモ殆ンド治癒ノ傾向ヲ示サザリキ。患者ハ一身上ノ都合ニヨリ郷里山梨縣ニ歸郷セリ。其後3月21日。即チ約2ヶ月ヲ經過シテ再ビ來院。耳漏尙ホ相當多量排出シ鼓膜像。其他一般狀態ニ變化ヲ認メザリキ。其後同年8月3度目來院セリ。此時ニ於テモ以前ト大差ヲ認メザルモ鼓膜穿孔ハ少シク大トナレリ。著明ナル義膜形成ハ認メザリキ。細菌検査ヲナスモ以前ト略ニ同一ナル細菌ヲ檢出セリ。

第二例 患者。福岡和○。4歳12ヶ月ノ女兒。職業會社員族。

家族歴。父母兩系ノ祖父母健在ナリ。父母亦壯健ニシテ特記スベキ事ナシ。

既往症。患者ハ生來虛弱ニシテ屢々感冒ニ侵カサル、モ其都度醫治ニヨリテ治癒ス。2歳位ヨリ兩側鼻漏中等度ニ存シ殊ニ肝息アリ。約7ヶ月前ニ百日咳ニ罹患シ醫治ニヨリテ全治セント。其後右側耳漏アリ。尙ホ當時患者ハ耳痛ヲ訴ヘタルモ耳漏出ズルニ及ビテ耳痛殆ンド消失セリト。其後何等認ムベキ誘因ナク左側耳漏ヲ見タリ。専門醫ノ治療ヲ受クルモ殆ンド治癒ノ傾向ヲ認メ得ザリシト。

主 訴。兩側耳漏及ビ難聴。

初 診。昭和10年3月8日。

全身所見。體格。榮養共ニ中等度。顔面ヤ、蒼白ナルモ內科的ニ認ムベキ疾患ナク尿中蛋白。糖ヲ證明セズ。

局所所見。外聽道ハ兩側共ニ粘液様分泌物ヲ以テ充タサレ兩側鼓膜前下部ニ中等度ノ穿孔アリ。鼓膜腫脹ナシ。左側中耳粘膜ニ僅カノ白色義膜様物質ノ附着セルヲ認ム。綿棒ヲ以テ比較的容易ニ清淨トナシ得タリ。右側鼓室ニハ義膜様物質ヲ認メズ。鼻腔。咽頭共ニ異常ナシ。

細菌検査

兩側耳漏ノ塗抹標本ニ於テ殆ンド純培養ニ近キ狀態ニ「デ」菌様桿菌並ニ極メテ少數ノ双球菌ヲ證明セリ。而シテ該桿菌ハ多核白血球内ニ於テモ集團シ其排列狀態「デ」菌ニ酷似セルモノアリ。結核菌ハ認メザリキ。而シテ本例ニ於テモ研究材料トシテ耳漏ヲ血液寒天並ニ「レフレル」血清培地上ニ移植セリ。上記所見ヨリ「デ」性中耳炎ノ疑ノ下ニ3月10日「デフテリ」フォルモワクチン」0.3cc注射。以後隔日又ハ3日毎ニ0.4—0.5ccヲ12回注射セシモ臨牀上何等認ムベキ治癒ノ傾向ヲ示サザリキ。

第三例 患者。村田謙○。2歳10ヶ月ノ男

兒。職業會社員族。

家族歴。父母共ニ健全ニシテ兄弟4人亦何レモ健在ナリ。

既往症。患者ハ生來健康ニシテ大病ニ罹リタルコトナシ。5ヶ月以來右側耳漏ヲ訴ヘ以來不機嫌トナレリ。耳痛ハ訴ヘザリキ。發熱ナク食欲亦可良ナリ。今日迄醫治ヲ受ケシコトナク自宅ニテ排出セル耳漏ヲ清淨トナシモ治癒セズ。3日前ヨリ右側外聽道ニ濕疹アリ。

主 訴。右側耳漏。

初 診。昭和10年5月30日。「カルテ」番號4070。

全身所見。體格。榮養中等度。顔面健康色ヲ呈シ内科的疾患ヲ認メズ。尿中蛋白。糖ナク。糞便中寄生蟲卵ナシ。

局所所見。右側外聽道濕潤シ部分的ニ痂皮ヲ以テ被覆サル。外聽道ハ多量ノ膿樣物質ヲ以テ充タサル。右側鼓膜ハ下。後部ニ心臟狀ノ大ナル穿孔アリ。鼓室粘膜ハ褐白色ノ義膜存スルヲ見ル。綿棒ヲ以テ除去セントスルモ困難ナルヲ以テ「ピンセット」ニテ一部除去スルニ輕度ノ出血ヲ見タリ。乳嘴突起部壓痛ナシ。鼻腔清淨ナルモ咽頭粘膜ニ輕度ノ發熱。腫脹アリ。兩側口蓋扁桃腺中等度ニ肥大セリ。

細菌検査。5月30日耳漏ノ塗抹標本ニ於テ異染體ノ濃染セル「デ」菌並ニ少數ノ葡萄狀球菌ヲ證明シレフレル氏血清培地ニ於テモ亦純培養狀ニ出現セル「デ」菌ヲ認ム。而シテ本例ニ於テモ結核菌ハ認メザリキ。

上記所見ヨリ「デ」性中耳炎ノ診斷ノ下ニ5月31日「デフテリーフォルモワクチン」0.2cc。以後隔日ニ0.3cc, 0.4cc, 0.5ccト増量的ニ10回注射ヲナセリ。6月20日ニ至リ耳漏稍ニ減少シ

義膜ハ耳漏ト共ニ排出シ鼓室粘膜露出シ發赤稍減退セリ。而シテ治癒ノ傾向ヲ認メタリ。然レ共患者ハ其以後來院セザリシヲ以テ其後ノ經過ヲ十分觀察シ得ザリシハ余ノ遺憾トスル所ナリ。外聽道濕疹ハ軟膏塗布ニヨリテ治癒セリ。

症例ノ總括並ニ考案

以上述べタル3症例ハ要スルニ小兒中耳炎症例ニシテ3例共ニ咽頭。喉頭。鼻腔等ニ全ク「デ」症狀ヲ缺除シ發熱其他何等ノ障礙ヲモ訴ヘザルモノナリ。而シテ何レモ慢性中耳炎ニシテ第1例ハ2年來ノ耳漏。第2例ハ7ヶ月來。第3例ニ於テハ5ヶ月來ノ耳漏ニシテ耳漏ノ性状第1例。第2例ニ於テハ惡臭著明ナラザル黃色濃厚ナル分泌物アリ。第3例ニ於テハ惡臭アル耳漏ナリキ。何レモ鼓膜ニ穿孔アリ鼓室粘膜ニ「デ」性樣義膜ヲ形成セリ。而シテ其塗抹標本ヨリ其排列狀態「デ」菌ニ酷似ノ桿菌ヲ檢出シタルヲ以テ「デ」性中耳炎ノ疑ノ下ニ上記セシ如ク「デ」特殊療法ヲ施行セシニ第1及ビ第2例ニ於テハ全ク奏效セズ。第3例ニ於テ稍ニ奏效セシ3症例ナリ。

抑ニ「デ」菌ハ通常咽頭。喉頭。鼻腔等ヲ罹患セシムル事最モ屢ニナルモ又時ニ聽器ノ總テノ部分即チ外聽道。中耳腔。迷路。聽神經ヲモ侵シ得ルモノナリ。而シテ聽器中比較的多キハ中耳ニ於ケル「デ」性疾患ニシテ M. Meyer ハ之ヲ Diphtherie des Mittelohres トスルカ或ハ Otitis media bei Diphtherie トシテ觀察スルカハ其耳漏中ニ存スル「デ」菌ガ細菌學的ニ Virulente Bazillen ナル時ハ Otitis media diphtherica ト云ヒ avirulente Diphtherie Bazillen ガ他ノ病原菌ト共存スルカ又ハ「デ」菌ガ存在セザル時ハ之ヲ Otitis media puru-

lenta od. Catarrhalis bei Diphtherie ト云ヘリ。「デ」菌=ヨリテ起ル中耳炎症ハ通常「デ」菌單獨感染=非ラズシテ混合感染ナリ。而シテ生體內=於テ連鎖狀球菌、葡萄狀球菌、肺炎菌其他ノ菌ガ混合感染=ヨリテ「デ」菌=對シ如何ナル態度ヲ取ルヤハ不明ナリ。

吾人ハ通常「デ」性中耳炎ヲ原發性並ニ二次的感染ニ區別ス。

而シテ原發性「デ」性中耳炎トハ鼻腔、咽頭、喉頭其他=「デ」性疾患ヲ證明セズシテ Virulente Diphtherie Bazillen =ヨリテ惹起セラルル中耳炎ヲ云フ。カハル原發性中耳「デ」症例ハ Krepusca, Daase, de Carli, Stein, Benesi, Szmurlo Kobrak, Pfeiffer 等=ヨリテ報告サル。而シテ二次的感染ハ既ニ鼻腔、咽頭、喉頭等=「デ」性疾患アリテ二次的=中耳=「デ」性疾患ヲ惹起スルモノナリ。而シテ其感染徑路ハ通常(1)上氣道經由、(2)外聽道經由、(3)血行經由ヲ考ヘラル。上記3感染徑路ノ中歐氏管ヲ經由シテ中耳ニ傳染スルハ屢々見ラル。而シテ此場合=於テハ歐氏管自身モ罹患セルモノナリ。最近 Gugenheim 及ビ Scheibe =ヨリテ報告セラレン症例ハ「デ」菌ガ「デ」性疾患ヲ有スル外聽道カラ中耳ニ迷入セルモノナリキ。而シテ M. Meyer ハ外聽道經由傳染ハ既存ノ Trockene Perforation ノ場合ニハ原發性中耳「デ」ナリト云ヘリ。第3ハ血行即チ淋巴道ヲ經由シテノ感染ナリ。斯カル場合ハ恐ラク他=「デ」性疾患アリテ轉移性=炎症ガ發來スルノデアル。斯カル症例ハ極メテ稀有ニシテ唯 Lommel ノ報告アルノミ。然レ共血行ニヨル Bacillenlos toxische Mittelohrinfection ハ發生シ得ルモノデアル。N. Acusticus 並ニ其 Ast

又ハ N. Facialis =來ルモノデアル。之ハ神經自身ガ「デ」毒素ニ親和力ヲ有スルコトモ一原因ナランモ血行ニヨル Toxinwirkung ト考ヘラレテイル。斯カル事實ハ吾人ハ中耳ノ疾患ナキ「デ」患者ニ時ニ耳聾ガ來ル事アルニヨリテ知ラル。

「デ」性中耳炎ハ M. Meyer ノ記載セル所ニヨレバ「デ」性疾患ノ性質上急性中耳炎ニ來タルモノニシテ持續的長期耳漏ノ存スル場合=於テサヘ鼓膜穿孔ヲ來タスハ稀有ナリト。而シテ其分泌物ハ一般ニ粘稠度ヲ有スルト云ヘリ。翻ツテ余ノ3例ヲ假ニ「デ」性中耳炎ト考ヘルナレバ3症例ハ何レモ慢性中耳炎ニシテ此點先人ノ報告ト異ナルヲ見ル。而シテ中耳炎ニ於ケル義膜形成ニ關シテハ「デ」性中耳炎ニ於テ發來スルハ周知ナルモ既ニ上述セル如ク「デ」菌以外ノ Bac. Pyocyaneus(Voss) 及ビ Plaut-Vincent'sche Bakterien =ヨリテモ形成セラル(Gerlach u. Frenzel)。又 Scharlach 及ビ中耳結核ニ於テモ形成セラル(M. Meyer)。然レ共「デ」性中耳炎ノ場合ニ於テモ義膜形成ノ伴ハザル事アリ。斯カル症例ヲ Kobrak ハ Otitis media diphtherobacillaris purulenta non Pseudomembranacea(Kobrak) ト云ヘリ。斯カル症例ニ於テ手術ニヨリテ義膜ノ發見セラルル場合アリト。又義膜ハ中耳粘膜ノ全部ニ形成セラルハニ非ラズシテ所々形成セラルハヲ以テ臨牀上發見困難ナル場合存スルト。反之中耳ニ義膜形成アルヲ Otitis media diphtherobacillaris pseudomembranacea ト云ヘリ。斯カル症例ハ Kobrak 以來多數報告セラレタリ。余ノ3症例ニ於テ第1、第2例ハ既ニ鼻腔ヨリモ中耳分泌物中ニ檢出セルト同様ナル桿菌ヲ見

タルヲ以テ歐氏管經由二次的感染ト考ヘルヲ至當ナリトス。第3例＝於テハ鼻腔、咽頭等＝「デ」性疾患ヲ認メズ。又「デ」菌ヲ證明セズ。從ツテ既＝存在セル化膿性中耳炎＝原發性＝中耳ノ「デ」性疾患ヲ惹起セルモノト考フ。而シテ3例共＝義膜形成ヲ見タリ。

「デ」性中耳炎ノ診斷ハ中耳ヨリ Virulent ノ Diphtherie Bazillen ヲ證明スル事第一ナリ。而シテ余ノ3症例即チ第1、第2例＝於テハ耳漏中ノ塗抹標本＝於テ唯「デ」菌様排列ヲ有スル桿菌ヲ證明セシノミニシテ第3例＝於テハ「デ」菌＝全ク酷似ノ桿菌（即チ「デ」菌）ヲ檢出セリ。而シテ3例＝關シ如何ナル治療ヲ行フモ治癒ノ傾向ヲ示サザリシヲ以テ「デ」性中耳炎ノ疑ノ下＝上記セシ如キ特殊療法ヲ施行セシモノナリ。其結果特殊療法ノ奏效セザル事及ビ其他ヨリ本菌が如何ナル菌ナルヤヲ決定スルハ誠＝意義アル所ナリ。

第五章

研究材料並ビニ研究方法

（附。余ノ使用セル各種染色法）

本研究ニ使用セル菌株ハ前記竹内、福岡、村田ノ3患者耳漏ヨリ分離セシ3菌株（孰レモ「デ」特殊療法施行前ニ滅菌白金耳ヲ滅菌耳漏斗ヲ通ジ中耳ヨリ直接血液平板、普通平板寒天、レフレル血清培地ニ移植シ發育シ來タレル菌ヨリ所要ノ菌ヲ得タリ）並ニ阪大微生物研究所谷口教授ノ御厚意ニヨリ同所貯藏ノ大腸菌、「デフテリー」菌、傳染病研究所ノ螢光菌（傳研Fト記載ス）、北里研究所ノ螢光菌（北研Fト記載ス）、綠膿菌「プロテウス」X19菌、靈菌、乳酸菌ノ分譲ヲ受ケタルモノ及ビ余自ラ重篤ナル咽

頭「デ」患者ヨリ分離セル「デ」菌ノ計12菌株ヲ比較對照セリ。

研究方法トシテ余ハ分離菌ヲ形態學的及ビ生物學的即チ各種人工培養基上ノ培養所見、培地PHト發育トノ關係並ニ瓦斯發生試驗、「インドール」產生ノ有無、酸素トノ關係、培養ニ伴フPHノ變化、溫熱並ニ各種藥物ニ對スル抵抗ヲ檢シ、「マウス」並ニ海獺ニ對スル毒性ヲ「デフテリー」菌ト比較シ、各種糖類分解作用ハ上記諸菌ヲ用ヒテ比較對稱セリ。更ニ血清學的ニハ上記諸菌ヲ對照トシテ交互ノ凝集反應、カステラ＝二氏吸收試驗並ニ補體結合反應ニヨリテ特ニ類似菌トノ關係並ニ鑑別點ヲ詳細ニ檢索セリ。

附。余ノ使用セル各種染色方法

（1）グラム氏法。

Objektglass 塗抹、乾燥、固定、2.5%石炭酸「ゲンチアナ」紫（又ハ「アニン」水、「ゲンチアナ」紫）ニテ加溫染色1分、餘分ノ液ヲ捨テ（洗滌セズニ）グラム氏液（沃度1.0g, 沃度加里2.0g, 水300cc）ニテ1分間處置、無水酒精ヲ注ギ（又ハ無水酒精中ニ入レ振盪ス）十分脫色シ（1—2分）、水洗乾燥セシメ10倍稀釋「フクシン」液ニテ後染色（30秒）ナス。本法ニヨリテ「グラム」陽性菌ハ黑紫色ニ、「グラム」陰性菌ハ赤色ニ見ユ。

（2）ナイセル氏法。

甲液（「メチレン」青粉末1.0g, 純酒精20.0cc, 氷醋酸50.0cc, 蒸餾水100.0cc）ト乙液（「クリスタルヴィオレット」1.0g, 純酒精10.0cc, 蒸餾水300.0cc）トヲ2:1ノ比ニ混ジ先ヅ10秒—15秒染色シ、水洗後更ニ丙液（「クリソイデン」又ハ「ビスマルクブラウ」1.0g, 蒸餾水300.0cc煮沸シテ溶解ス）ニテ10秒間染色ス。余ノ經驗ニ

ヨレバ、前者染色時間ヲ少シク長ムル方が染色佳良ナリ。但シ甲乙兩液混合ハ染色時ニ新調スベク混合液ハ保存ニ耐エズ。本法ニヨリテ異染體ハ青黑色、菌體ハ黃褐色ニ染色サル。

(3) ゾンネンシャイン (Sonnenschein)

氏法。

第1液。マンソン氏液(硼砂 5.0g, 「メチレン」青 3.0g, 蒸餾水 100.0cc)ニテ5分間染色シ。第2液。「クリソイデン」2.0g, 蒸餾水 300.0cc煮沸ス)ニテ5秒染色スルトキハ異染體ハ綠黑色ニ。菌體ハ淡ク綠褐色ニ美麗ニ染色サル。

(4) ストルテンベルグ (Stolzenberg)

氏法。

「メチールグリューン」, 「トルイデンプラウ」各 2.5g, 99%ノ氷醋酸 100.0ccヲ加ヘテ溶解セシメ、重「クローム」酸加里ノ飽和溶液 20 滴ヲ冷却ノ下ニ滴下還元シ。次イデ蒸餾水ヲ加ヘテ全量ヲ 1000.0 cc トナセルモノニシテ 15 秒—30秒染色シテ水洗スレバ足ル。本法ニテハ異染體ハ赤染シ。菌體ハ青染ス。

上記ノ3種ノ異染體染色法ヲ比較スル時ゾンネンシャイン氏法最モ優リ異染體ノ染色セザル事ナキモ染色ニ5分以上ヲ要スル不便アリ。更ニストルテンベルグ氏法ハ最モ簡單ナレドモ時ニ異染體ノ染色不鮮明ナル憾アリ。余ハ余ノ經驗上ナイセル氏法ヲ推奨スルモノナリ。

(5) レフレル Löffler 氏鞭毛染色法。

本法ハ最モ困難ニシテ可檢菌ハ16時間—18時間培養ノ菌1白金耳ヲ約5ccノ生理的食鹽水中ニ靜カニ浮游シタルモノヲ用ヒ Objektglasニ靜カニ塗布。乾燥。固定シレフレル媒染劑(「タンニン」酸粉末 2.0g, 蒸餾水 10.0 ccヲ加温溶解シ。次ニ硫酸鐵冷飽和溶液 5.0cc, 「フクシン」

原液 1.0 ccヲ混和。數日ノ後使用ス。而シテ使用前ハ必ズ濾過セリ)ヲ注ギ加温處置スル事1分間。而シテ水洗。70%酒精ニテ暫次洗滌シ硝子面ヲ清淨ナラシメタリ。次ニ「アニリン」水。「フクシン」液ニ1.0%苛性曹達ヲ約1%ノ割ニ加ヘ輕度ノ濁濁ヲ生ゼシメタルモノニシテ加温染色1分間ナス。本法ニテ菌體及ビ鞭毛ハ赤黑色ニ染色サル。

(6) 抗酸性染色法 (Ziel-Neelsen 氏法)

先ヅ石炭酸「フクシン」液ニテ加温染色2分間。水洗。3%鹽酸酒精ニテ全ク白色トナル迄數回反復シ「レフレル・メチレンブラウ」ニテ再染色ヲナス。本法ニヨリ抗酸性菌ハ赤色ニ非抗酸性菌ハ青色ニ染色サル。

第六章

檢出シタル新桿菌ノ形態及ビ生物學

第一節 新桿菌ノ形態並ニ染色

本菌ノ形態ハ一見「デ」菌ニ似タル桿菌ニシテ多クハ多少彎曲シ顆粒構造ヲ認ム。其排列モ亦「デ」菌ニ酷似シ多クハ開指狀、松葉狀、堆積狀ニ密集シ又時ニ不規則ナル排列ヲトル。古キ培養ニ於テハ2—3個連續シテ Chainヲナス事アリ。長短種々アリテ長キハ長桿菌、短キハ短桿菌ニシテ平均。長徑2—3 μ 。幅比較的一様ニシテ0.4 μ 内外ナルヲ常トス。

染色。レフレル氏「メチレンブラウ」, 10倍石炭酸「フクシン」液等ノ鹽基性「アニリン」色素ニヨク染色ス。グラム氏染色陰性。ナイセル氏法。ゾンネンシャイン氏法。ストルテンベルグ氏法ニヨリテ異染體ヲ認メズ。レフレル氏鞭毛染色法ニテ周圍性ニ多數ノ鞭毛ヲ認メ。懸

滴標本ニテ著明ナル固有運動ヲ認ム。本菌ハ芽胞並ニ莢膜ヲ有セズ。非抗酸性菌ナリ。

第二節 培養所見

第一項 實驗方法

余ハ新桿菌（竹内菌、福岡菌）ハ上記形態並ニ染色所見ヨリ恐ラク大腸菌族ナラズヤノ疑ノ下ニ阪大微生物研究所貯藏ノ大腸菌。並ニ村田菌ハ「デフテリー」菌ニ全ク一致セルヲ以テ同所貯藏ノ「デ」菌ヲ對照トシテ研究ヲ進メタリ。而シテ使用培養基ハ固形培養基トシテハ普通寒天培地。「グリセリン」寒天培地。1%葡萄糖寒天斜面並ニ高層寒天。卵黃寒天。家兎血液寒天。レフレル氏血清凝固培地。「ゲラチン」培地。遠

藤氏「フクシン」培地。馬鈴薯培地ニシテ液狀培地トシテハ牛乳培地。「ブイヨン」。1%「ペプトン」水ヲ使用セリ。而シテ各培地水素「イオン」濃度（ P_H ）測定ハ小島。矢追式水素「イオン」濃度測定用比色計ヲ使用シ $P_H=7.2$ ノ培養基ヲ作製セリ。而シテ分離菌ノ1白金耳ヲ移植 $37^{\circ}C$ 。24時間後ニ觀察セリ。而シテ血液寒天。「ゲラチン」培地。馬鈴薯。牛乳培地ノ性狀ハ必要ニ應ジ長時日觀察セリ。

第二項 實驗成績

新桿菌即チ竹内菌並ニ福岡菌ノ性狀ハ全ク一致セル爲メートシテ記載シ且ツ其他ノ各菌ノ各培地上ノ性狀ハ煩雜ヲ避ケル爲メ表示セリ。

第 1 表

培養基種類	菌名	新 菌 桿	大 腸 菌	村 田 菌	「デ」 菌
1 普 通 寒 天 培 地		發育極メテ可良ニシテ菌叢落ハ圓形ニシテ中央部隆起著明ナラズ。黃色乃至綠色ヲ帶ビ其周邊ハ螢光色ヲ呈ス。而シテ聚落ハ極メテ融合性強ク菌苔ヲ作ル。特有ノ色素ハ既ニ18時間培養ニ於テ見ラル。而シテ寒天層ニ融解シテ螢光性綠色ヲ呈ス。菌苔表面ハ稍々金屬性光澤ヲ有ス。故ニ培養面ハ濕潤ナラズシテ乾燥感アリ	發育極メテ可良ニシテ聚落ハ融合性ニ富ム。菌苔ハ不透明白色ヲ帶ブ。本聚落ハ一見余ノ所謂新桿菌ニ近似ス。	發育可良ナラザレドモ僅カニ發育スル聚落ハ極小透明ニシテ多少灰白色ヲ帶ビ連鎖狀球菌聚落ニ似タリ。	發育可良ナラザレド僅カニ發育ス。聚落ノ性狀全ク村田菌ニ一致ス。
2 Glycerin 寒 天 培 地		同 上	同 上	普通寒天培地ヨリ發育稍々可良ナリ。	普通寒天培地ヨリ發育稍々可良ナリ
3 葡萄糖寒天斜面培地		同 上	同 上	同 上	同 上
4 葡 萄 糖 高 層 寒 天		穿刺培養ヲ爲スニ穿刺入口部ニハ發育著明ナルモ穿刺線ニ沿ヒテ僅カニ發育スルニ過ギズ。瓦斯發生ヲ認メズ。	穿刺入口部發育可良ニシテ穿刺線ニ沿ヒテ僅カニ發育ス。著明ナル瓦斯形成ヲ認ム。	發育可良ナラズ。瓦斯形成ナシ。	發育可良ナラズ。又瓦斯形成ナシ。
5 卵 黃 寒 天 培 地		發育極メテ可良ニシテ普通寒天培地上ニ於ケルガ如キ黃色著明ナラザレドモ菌叢落ハ一般ニ肥厚ス。	新桿菌ト同様ナル聚落ヲ形成シ。本培地ニ於テハ區別シ得ズ。	發育可良ニシテ小ナル圓形聚落ハ融合シテ菌苔ヲ形成シ貯留液亦白濁ス。	左ニ同ジ。

6	血液平板 寒天培地	37°C. 24時間ニシテ金屬性光澤ヲ有スル融合性強キ聚落ヲ形成ス。聚落ハ大ニシテ直径0.4—0.6mmヲ有ス。構造均一ニシテ著明ナル溶血作用アリ。之ヲ檢鏡スルニ全培地殆ンド血球ヲ認メズ。聚落ノ周邊0.5mmニ於テ溶血ス。然レ共緑色帯ハ著明ナラズ。37°C. 48時間ニ於テ惡臭ヲ放チ全培地ヲ褐色ナラシム。水室24時間放置スルモ著明ナル差ヲ認メズ。	37°C. 24時間ニシテ圓形濕潤ニシテ僅カニ隆起セル聚落ヲ作ル。而シテ融合性強キ白色ノ菌苔ヲ形成ス。聚落ハ大ニシテ1—1.5mmノ直径ヲ有シ構造均一ニシテ溶血作用ヲ有ス。而シテ溶血環ハ聚落ノ周圍1.5—1.0mmニ及ブ。37°C. 48時間ニシテ又全培地ヲ褐色ナラシム。水室24時間放置スルモ著明ナル差異ヲ認メズ。	37°C. 24時間ニシテ濕潤ナル白色。光澤アル中央部隆起セル圓形聚落ヲ形成ス。直径0.08—0.1mmノ小ナル聚落ニシテ構造均一ニシテ周邊圓滑ナリ。溶血作用ヲ有ス。溶血環ハ聚落ノ周圍0.05—0.15mmニ及ブ。然レ共又不完全ナル溶血作用ヲ呈スル聚落ヲモ見タリ。37°C. 48時間ニ於テハ溶血環ハ其幅ヲ増シ透明度稍増加スルモ其中ニ殘溜セル血球ヲ認ムルモノアリ。水室24時間放置スルモ溶血環ハ0.15mm以上ニハ大トナラザリキ。培地ハ褐色ナラシメズ。	37°C. 24時間ニシテ濕潤ナル灰白色光澤アル中央部隆起セル極メテ小ナル直径0.1—0.15mmノ聚落ヲ形成ス。構造均一ナリ。溶血作用ハ未ダ發現セズ。肉眼的ニモ顯微鏡的ニモ透明ナル溶血域ヲ認メズ。然レ共37°C. 48時間ニ於テハ極メテ輕度ノ溶血作用ヲ認メタリ。即チ聚落ノ周圍0.05—0.1mmノ溶血環ヲ認ム。然レ共其ノ部ニ於テモ尙ホ殘溜血球ヲ認メタリ。水室24時間放置スルモ著明ナル差異ヲ認メズ。又培地ヲ褐色トナサズ。
7	レフレル 血清 凝固培地	發育綠メテ可良ニシテ白色ニシテ融合性強キ聚落ハ菌苔ヲ形成シ。37°C. 96時間ニシテ培地ヲ融解ス。4日—6日ニ至リ培地ヲ完全ニ溶解シ其基質ヲ液狀トナス。貯溜液ヲ白濁セシム。	發育綠メテ可良ニシテ聚落ハ融合シテ菌苔ヲ形成ス。而シテ新桿菌ニ認メルガ如キ基質ノ融解性ナシ。	發育可良ニシテ37°C. 24時間ニシテ圓形。灰白色凸面ヲ有スル聚落ヲ作ル。其直径2—3mm. 多クハ灰白色菌苔ヲナシ。其周邊不正形ヲナス。	左ニ同ジ。 (村田菌ト同様ナル性狀ヲ呈ス。)
8	「ゲラチン」 培地	表面性聚落ハ初メ圓形ニシテ後多少不規則トナル。深層聚落ハ多少黃色乃至綠黃色ヲ帶ブ。18°C. 96時間ニ於テ圓筒狀液化ヲ開始シ液化セルモノハ定型的ニ綠色乃至帶青綠色性螢光色ヲ呈ス。瓦斯形成作用ナシ。	穿刺線ニ沿ヒテ發育可良ナルモ「ゲラチン」液化作用ナシ。瓦斯形成アリ特ニ18°C. 72時間後ハ著明ナリ。	發育不良。 液化作用ナシ。	發育不良。 液化作用ナシ。
9	遠藤氏 「フクシン」 培地	發育可良ナリ。 聚落ハ赤變セズ。	發育可良ニシテ聚落ハ赤變ス。	發育不良ナリ。	發育不良ナリ。
10	馬鈴薯培地	發育可良ニシテ濕性ニシテ厚キ菌苔ヲ形成シ菌苔ハ初メ綠色ナルモ後ニハ薄「セピア」色變褐色ニ變ズ。	發育可良ニシテ肉眼ニテモヨク見得ル菌苔ヲ形成ス。特有ナル褐色ナシ。	發育不良ナリ。	發育不良ナリ。
11	牛乳培地	發育可良ニシテ37°C. 24時間ニシテ凝固ヲ始メ4日ニシテ完結シ且ツ液化並ニ透化ス。	發育可良ニシテ37°C. 24時間—48時間ニシテ凝固ス。 (之乳糖ヲ分解シテ乳酸トナスニヨル。)	發育可良ナルモ凝固セズ。	發育可良ナルモ凝固セズ。

12	「ブイオン」 培地	發育可良ニシテ全液ヲ濁濁セシメ液面ニ菌膜ヲ形成シ。液表面ハ黄綠色ニ着色ス。古キ培養ニ於テハ多量ニ白色沈澱ヲ生ジ一種ノ惡臭ヲ放ツ。培地ハ強「アルカリ」性ニ變ズ。	發育可良ニシテ全液ヲ濁濁セシメ表面菌膜ヲ形成ス。管底ニ著明ナル沈澱ヲ生ズ。	發育不良。全液ヲ輕度ニ濁濁セシム。表面菌膜ヲ形成ス。	發育可良ニシテ液面菌膜ヲ形成シ。全液僅カニ濁濁ス。沈澱形成著明ナラズ。
13	「レプトン」 水	發育可良ニシテ液面著明ナル菌膜形成アリ。液ノ表面部ハ黄綠色ニ着色ス。全液濁濁著明ナリ。	發育可良ニシテ菌膜形成著明ナラザルモ全液濁濁ス。	發育中等度。輕度ノ濁濁アリ。菌膜形成ヲ認メズ。	發育稍可良ニシテ全液輕度ニ濁濁ス。上面菌膜ヲ形成ス。

上表ニ示ス如ク余ノ所謂新桿菌（竹内菌、福岡菌）ハ普通寒天培地、「グリセリン」寒天培地、葡萄糖寒天培地、卵黄寒天培地、血液寒天培地、「ゲラチン」培地、遠藤氏「フクシン」培地、馬鈴薯培地、牛乳培地、「ブイオン」、「レプトン」水等ニ發育可良ニシテ特有ノ性狀ヲアラハス。（上表参照）。

而シテ新桿菌ノ特有ナルハ普通寒天培地上ニ黄綠色ヲ呈シ培地ヲモ着色セシメ、「ゲラチン」培地ヲ液化シ美麗ナル黄綠色ヲ呈スルコトナリ。大腸菌並ニ「デ」菌及ビ村田菌ニハ其形態並ニ排列狀態酷似スル點アルモ、

1. 色素形成スルコト。
2. レフレル血清培地ヲ3日ニ至リ融解泥狀トナスコト。
3. 「ゲラチン」培地ヲ液化シ、特有ナル美麗ナル色素ヲ形成スルコト。
4. 馬鈴薯培地ノ性狀。

5. 牛乳培地ノ性狀。

等ヨリ本桿菌ハ大腸菌並ニ「デ」菌並ニ村田菌ト劃然タル相違ヲ見出セリ。而シテ寧ロ螢光菌族（綠膿菌ヲモ含ム）ニ近似ノ性狀アルヲ知レリ。村田菌ハ「デ」菌ト其性狀全ク一致ス。

第三節 培養基水素「イオン」濃度ガ

菌發育ニ及ボス影響

P_{H} ヲ異ニセル即チ $P_{H}=4.0$ ヨリ $P_{H}=10.0$ 迄20種ノ3%寒天培地ヲ作製シ本菌ヲ「ブイオン」1.0ccニ1白金耳ノ割合ニ浮游セルモノヲ塗抹セリ。尙ホ對照トシテ大腸菌、「デフテリー」菌、村田菌ヲモ同様移植セリ。而シテ觀察方法ハ37°C 24時間、48時間、72時間、96時間ノ4回トシ發育陽性ノ程度ニ應ジ卅、廿、十、一ノ符號ヲ使用セリ。而シテ新桿菌即チ竹内並ニ福岡菌ハ殆ンド同一ノ結果ナリシヲ以テ之亦一トシテ記載セリ。

第 2 表 新桿菌（竹内、福岡菌）

時間 (37°C)	P_{H}	4.0	4.6	5.0	5.4	5.6	6.0	6.6	7.0	7.4	7.6	8.0	8.4	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0
24		—	—	—	+	+	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+	+	+	+	±	—
48		—	+	+	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	++	—
72		±	—	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	++	—
96		+	+	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	++	—

第 3 表 大 腸 菌

時間 (37°C) \ P _H	4.0	4.6	5.0	5.4	5.6	6.0	6.6	7.0	7.4	7.6	8.0	8.4	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0
24	—	—	+	++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	+	+	+	—	—	—
48	+	+	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+	+	+	—	—	—
72	++	++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+	+	—	—	—
96	++	++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+	+	—	—	—

第 4 表 「デフテリ」菌

時間 (37°C) \ P _H	4.0	4.6	5.0	5.4	5.6	6.0	6.6	7.0	7.4	7.6	8.0	8.4	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0
24	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	±	—	—	—	—
48	—	—	—	±	+	+	++	++	++	++	+	+	+	+	—	—	—	—	—
72	—	—	—	+	+	+	++	++	++	++	+	+	+	+	—	—	—	—	—
96	—	—	+	+	+	+	++	++	+++	+++	+	+	+	+	—	—	—	—	—

第 5 表 村 田 菌

時間 (37°C) \ P _H	4.0	4.6	5.0	5.4	5.6	6.0	6.6	7.0	7.4	7.6	8.0	8.4	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0
24	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—
48	—	—	—	+	+	+	+	++	++	++	+	+	+	±	—	—	—	—	—
72	—	—	—	+	+	+	++	++	++	++	+	+	+	+	—	—	—	—	—
96	—	—	—	+	+	+	++	++	++	++	+	+	+	+	—	—	—	—	—

上表ノ如ク新桿菌（竹内、福岡菌）ハP_H=6.6—8.4, 37°C, 96時間ニ於テハ P_H=5.4—8.8ニ於テヨク發育ス。而シテ大腸菌ニ於ケルト成績略ニ一致セルモ「デ」菌（及ビ村田菌）ハ普通寒天上ノ發育可良ナラズシテ P_H=6.6—8.8ニ於テ僅カニ發育スルニ過ギズ。

第四節 瓦斯發生試験。「インドール」

產生ノ有無並ニ酸素トノ關係

第一項 瓦斯發生試験

新桿菌ヲ 20.0%「ゲラチン」培養基並ニ 1.0%

葡萄糖高層寒天ニ穿刺培養ヲナスニ瓦斯形成ヲ見ザリキ。然ルニ新桿菌ト形態上略々同一ナル大腸菌ニ於テハ著明ナル瓦斯發生ヲ見タリ。又「デ」菌（村田菌）ニ於テハ孰レモ瓦斯發生ヲ見ザリキ。

第二項 「インドール」產生ノ有無

試験方法トシテ Kitasato und Salkowski 氏法ヲ用ヒタリ。即チ各菌ノ液體培養（ブイヨン培養）約 10ccニ 0.01%亞硝酸加里液 1.0ccヲ加ヘ次ニ純硫酸數滴（2—3 滴）ヲ加ヘテ混和セ

リ。

「インドール」存在スル時ハ茲ニ所謂 Nitrosoindol ガ形成セラレ赤色ヲ呈ス。尙ホ成績不明瞭ナル時ハ Amylalkohol ヲモ使用セリ。而シテ成績ハ 10 日觀察シ初メ 3 日間ハ連続的ニ以後隔日ニ檢セリ。

新桿菌即チ竹内、福岡菌及ビ大腸菌ハ孰レモ陽性ニシテ「ヂ」菌、(村田菌)ハ陰性ナリキ。

第三項 菌増殖ト酸素トノ關係

新桿菌ヲ 1% 葡萄糖高層寒天穿刺培養ニヨリ、37°C、24 時間ニ於テ穿刺線ノ中央部迄僅カニ發育スルヲ見タリ。尙ホ ブフネル氏嫌氣性培養法ニヨリテ普通寒天培地上ニ於テハ 37°C、24 時間ニテ僅カニ増殖シ、48 時間ニ於テハ可成著明ニ増殖ス。即チ新桿菌ハ酸素ノ有無ニ關セズ發育増殖スルモノナリ。尙ホ「デフテリー」菌並ニ村田菌ヲモ ブフネル氏嫌氣性培養法ニヨリテ試ミルニ レフレル氏血清凝固培地ニ於テ 24 時間ニ於テ僅カニ増殖シ 48 時間ニ於テ可成著明ニ増殖セルヲ見タリ。

第四項 菌培養ニ伴フ培地水素

「イオン」濃度ノ變化

凡ソ細菌ヲ培養液中ニ培養スル時ハ細菌ノ生活ニ伴フ新陳代謝ノ結果酸或ハ「アルカリ」ヲ產生シ之ガ爲メニ培地ノ P_{H} ノ變化ヲ來タス。而シテ此變化タルヤ培地中ノ諸成分殊ニ糖ノ含否ニヨリテ差異アルノミナラズ細菌ノ種類ニヨリテ多少特有ノ變化ヲ來タスモノアリ。

試 驗 法

培養基ヲ容ル、試験管ハ孰レモ硬質硝子ヲ用ヒ 1 ヶ月以上使用シタルモノヲ選ビ試験管ハヨク洗滌シ各管ニ「ブイオン」10cc 宛分注。3 日間連續滅菌シ 22°C ニ於ケル水素「イオン」濃

度 P_{H} ＝7.0 トセリ。

培養ニ際シテハ菌ノ移植セザル培養基ヲ對稱トシテ毎回之レヲ加ヘ置キ培養基自己ニ於ケル反應ノ狀況ヲ知悉センガ爲メニ培養シタルモノ、變化ヲ檢スル都度此 P_{H} ヲモ測定セリ。

測定法ハ小島、矢追式水素「イオン」濃度測定用比色計ヲ使用セリ。使用菌株ハ新桿菌並ニ對照トシテ大腸菌、「ヂ」菌(村田菌)ヲ使用シ、37°C、24 時間培養ノ 1 白金耳ヲ所要ノ液體培地ニ移植セリ。觀察法ハ 14 日間ニシテ 10 日間ハ毎日檢セリ。實驗成績ヲ判然ナラシムル爲メ次ニ表示及ビ圖示ス。

第 6 表

37°C 培養日数	竹内菌	福岡菌	大腸菌	村田菌	「ヂ」菌	對照
1	7.15	7.15	7.05	6.8	6.8	7.0
2	7.1	7.1	7.15	6.7	6.7	7.0
3	7.1	7.3	7.3	6.65	6.6	7.0
4	7.4	7.4	7.4	7.0	6.8	7.0
5	7.5	7.5	7.4	7.2	6.8	7.0
6	7.5	7.6	7.6	7.3	6.8	7.0
7	7.6	7.6	7.6	7.5	6.8	7.0
8	7.6	7.6	7.7	7.5	6.7	7.0
9	7.6	7.7	7.7	7.6	6.8	7.0
10	7.7	7.7	7.8	7.6	6.8	7.0
14	8.2	8.2	8.0	8.0	6.8	7.0

即チ上示ノ如ク新桿菌ハ培養 24 時間ニシテ
既ニ培地ヲ「アルカリ」性ニ變ジ培養 14 日ニ
シテ強「アルカリ」性ニ變化セリ。大腸菌ニ於
テモ略々新桿菌ト同様ナリ。

余ノ使用セル「デ」菌ハ培養 24 時間ニシテ酸性
トナリ 14 日ニ及ブモ「アルカリ」性ニ變化ス
ル事ナシ。「村田菌」ハ培養 24 時間ニシテ一旦
培地ヲ酸性トナラシメ 4 日ニシテ中性トナリ以
來「アルカリ」度ヲ増加シ 14 日ニ於テハ強「ア
ルカリ」性ニ變ズ。

以上形態學的並ニ生物學的性状ヨリ新桿菌ハ大
腸菌並ニ「デ」菌ト全ク異リタル菌ニシテ寧ロ
培養上ノ性質ヨリ螢光菌ニ酷似スルヲ知リタ
リ。

第五節 新桿菌ノ抵抗ニ就テ

第一項 温度ニ對スル抵抗

實驗ニ使用セル菌株ハ普通寒天培養 20 代ヨ
リ 25 世代ニ至ル新桿菌（竹内、福岡菌）ナリ。
實驗方法トシテ普通寒天培地ニ 37°C 24 時間
培養セル竹内菌及ビ福岡菌ノ 1 白金耳ヲ「プイ
ヨン」10. cc 中ニ浮游セシメ谷口式加温器ニテ
40°, 56°, 60°C ニ加温シ 1 分、5 分、10 分、20
分、30 分、60 分毎ニ各試験管ヨリ 1 白金耳宛普
通寒天斜面ニ塗抹移植シ、48 時間 37°C ニ培養
シテ成績ヲ觀察シタリ。

第 7 表 竹内菌ノ温度ニ對スル抵抗

作用 時間 温度	1 分	5 分	10 分	20 分	30 分	60 分
40°	+++	+++	+++	+++	++	++
56°	++	+	-	-	-	-
60°	-	-	-	-	-	-

第 8 表 福岡菌ノ温度ニ對スル抵抗

作用 時間 温度	1 分	5 分	10 分	20 分	30 分	60 分
40°	+++	+++	+++	+++	++	++
56°	++	++	-	-	-	-
60°	-	-	-	-	-	-

上表ノ如ク新桿菌ハ 56°C. 10 分ニシテ死滅ス。

第二項 諸種藥物ニヨル影響

本實驗ニ使用セル藥物ハ主トシテ日常使用サ
ル、石炭酸、酒精、Tripaflavin ノ 3 種ヲ撰ベ
リ。菌株ハ本菌ノ 20 世代ヨリ 25 世代ニ至ル
モノヲ使用セリ。試驗方法トシテ普通寒天培地
37°C 24 時間培養セル新桿菌 1 白金耳ヲ試驗藥
1 cc 中ニ浮游混和シ、直後、30 秒、1 分、2 分、
3 分、5 分、10 分、20 分、30 分、60 分ノ時間的
間隔ヲ以テ豫メ用意セル普通寒天斜面ニ 1 白金
耳宛塗抹移植シ此菌移植培地ヲ 37°C 48 時間培
養シテ成績ヲ觀タリ。而シテ成績疑ハシキモノ
ハ再試驗ヲナセリ。

第 9 表 A. 石炭酸ニヨル影響

		直後	30 秒	1 分	2 分	3 分	5 分	10 分	20 分	30 分	60 分
1% 石炭酸	竹内菌	+++	+++	++	++	++	-	-	-	-	-
	福岡菌	+++	+++	++	++	+	-	-	-	-	-
3% 石炭酸	竹内菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福岡菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5% 石炭酸	竹内菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福岡菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 10 表 B. 酒精ニヨル影響

		直後	30秒	1分	2分	3分	5分	10分	20分	30分	60分
70% 酒精	竹内菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福岡菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98% 酒精	竹内菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福岡菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第 11 表 C. Tripaflavin ニヨル影響

		直後	30秒	1分	2分	3分	5分	10分	20分	30分	60分
0.5% Trip.	竹内菌	++	+	+	+	+	+	—	—	—	—
	福岡菌	++	++	+	+	+	+	—	—	—	—
0.1% Trip.	竹内菌	+++	++	++	+	+	+	—	—	—	—
	福岡菌	+++	++	++	+	+	+	—	—	—	—
0.01% Trip.	竹内菌	+++	+++	++	++	++	+	+	—	—	—
	福岡菌	+++	+++	+++	++	++	++	+	—	—	—

上表ノ如ク竹内、福岡兩菌間ノ藥物ニ對スル極抗力ノ差異ヲ認メズ。1%石炭酸溶液ニ於テハ5分ニシテ3%並ニ5%石炭酸溶液ニ於テハ直後ニ死滅ス。

酒精ニ對スル抵抗力極メテ弱ク70%及ビ98%ニ於テ直後ニ死滅ス。

Tripaflavin 溶液ニ於テハ0.5%及ビ0.1%ニ於テ10分間ニシテ死滅シ0.01%ニ於テハ20分間ニシテ死滅ス。

第六節 毒 力 試 驗

第一項 實 驗 方 法

先ヅ實驗動物トシテハ體重12g内外ノ「マウス」ヲ使用シ豫メ7日間飼育シ其健全ナルヲ確メテ後試験ニ供セリ。

菌量ハ普通寒天培地培養ノ第25世代ノ竹内、福岡菌及ビレフレル氏血清培地培養ノ20世代ノ村田菌並ニ余自ラ重症咽頭「デ」患者ヨリ分離

セン1世代ノ「デ」菌ヲ滅菌生理的食鹽水浮游液ヲ作り順次適當ニ稀釋シ其2. 1. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{5}$.

$\frac{1}{10}$. $\frac{1}{20}$. $\frac{1}{50}$. $\frac{1}{100}$. $\frac{1}{500}$ 標準白金耳量ヲ生理的食鹽水 0.5cc 中ニ含有セル如ク作製セリ。而シテ各菌ニ就キ「マウス」18頭ヲ2頭宛9群ニ分チ 0.5cc 宛腹腔内ニ注射セリ。而シテ注射後7日間ニ於ケル生。死ヲ觀察シ死後直チニ「マウス」ノ心臟、肝臟、脾臟、腎臟ヨリ適當培地ニ塗抹、37°C. 48時間培養セリ。

次ニ余ハ細菌ハ其種類ニヨリテ動物ニ多大ノ感受性ノ相違アルヲ以テ更ニ體重250g内外ノ海狸ヲ用ヒタリ。

菌株ハ前記「マウス」ニ使用セルモノト同一ニシテ菌量ハ滅菌生理的食鹽水 1.0cc 中ニ其2. 1. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$ 標準白金耳ヲ含有セル如ク作製シ。其1.0ccヲ豫メ脱毛、消毒セル海狸ノ腹部皮下ニ注射シ以後7日間觀察シ其生死ヲ判定セリ。

第二項 實驗成績

第 12 表 (A) (イ). 竹内菌ノ「マウス」ニ對スル毒性

「マウス」番 號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
體 重(g)	13.5	12.0	14.0	13.0	12.0	11.0	12.0	11.0	11.5	10.5	11.5	12.0	12.0	10.5	11.5	11.0	11.0	12.0
注射量(白金耳)	2		1		$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{5}$		$\frac{1}{10}$		$\frac{1}{20}$		$\frac{1}{50}$		$\frac{1}{100}$		$\frac{1}{500}$	
注射後 1 日	死	死	死	死	死	死	死	死	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
〃 2 日	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 3 日	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 4 日	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 5 日	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 6 日	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 7 日	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

第 13 表 (ロ). 竹内菌ノ海狸ニ對スル毒性

海 狸 番 號	1	2	3	4	海 狸 番 號	1	2	3	4
體 重(g)	270	300	250	260	體 重(g)	270	300	250	260
注射量(白金耳)	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	注射量(白金耳)	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
注射後 1 日	生	生	生	生	注射後 5 日	生	生	生	生
〃 2 日	〃	〃	〃	〃	〃 6 日	〃	〃	〃	〃
〃 3 日	〃	〃	〃	〃	〃 7 日	〃	〃	〃	〃
〃 4 日	〃	〃	〃	〃					

第 14 表 (B) (イ). 福岡菌ノ「マウス」ニ對スル毒性

「マウス」番 號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
體 重(g)	12.0	13.0	13.5	11.0	12.0	12.5	11.0	12.0	12.5	11.0	12.0	13.0	13.5	12.0	12.0	11.0	10.5	11.0
注射量(白金耳)	2		1		$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{5}$		$\frac{1}{10}$		$\frac{1}{20}$		$\frac{1}{50}$		$\frac{1}{100}$		$\frac{1}{500}$	
注射後 1 日	死	死	死	死	死	死	死	死	死	生	生	生	生	生	生	生	生	生
〃 2 日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 3 日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 4 日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 5 日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 6 日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 7 日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

第 15 表 (ロ)。福岡菌ノ海猿ニ對スル毒性

海猿番號	5	6	7	8	海猿番號	5	6	7	8
體重(g)	240	280	300	220	體重(g)	240	280	300	220
注射量(白金耳)	2	1	1/2	1/4	注射量(白金耳)	2	1	1/2	1/4
注射後1日	生	生	生	生	注射後5日	生	生	生	生
〃 2 日	〃	〃	〃	〃	〃 6 日	〃	〃	〃	〃
〃 3 日	〃	〃	〃	〃	〃 7 日	〃	〃	〃	〃
〃 4 日	〃	〃	〃	〃					

第 16 表 (C) (イ)。村田菌ノ「マウス」ニ對スル毒性

「マウス」番號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
體重(g)	10.5	9.0	12.0	11.0	13.5	12.5	14.0	12.0	13.0	9.5	12.0	11.0	9.5	14.0	13.5	8.5	10.5	12.0
注射量(白金耳)	2		1		1/2		1/5		1/10		1/20		1/50		1/100		1/500	
注射後 1 日	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
〃 2 日	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 3 日	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 4 日	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 5 日	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 6 日	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 7 日	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

第 17 表 (ロ)。村田菌ノ海猿ニ對スル毒性

海猿番號	9	10	11	12	海猿番號	9	10	11	12
體重(g)	300	280	250	270	體重(g)	300	280	250	270
注射量(白金耳)	2	1	1/2	1/4	注射量(白金耳)	2	1	1/2	1/4
注射後1日	生	生	生	生	注射後5日	死	死	生	生
〃 2 日	死	死	〃	〃	〃 6 日	—	—	〃	〃
〃 3 日	—	—	〃	〃	〃 7 日	—	—	〃	〃
〃 4 日	—	—	〃	〃					

第 18 表

(D) (イ). 咽頭「デ」患者ヨリ分離セル「デ」菌ノ「マウス」ニ對スル毒性

「マウス」番 號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
體 重 (g)	14.0	12.0	12.5	11.0	11.0	9.0	10.0	15.0	12.0	13.5	10.5	11.0	12.0	13.0	13.5	9.5	9.5	10.0
注射量(白金耳)	2		1		$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{5}$		$\frac{1}{10}$		$\frac{1}{20}$		$\frac{1}{50}$		$\frac{1}{100}$		$\frac{1}{500}$	
注射後 1 日	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
〃 2 日	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 3 日	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 4 日	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 5 日	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 6 日	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
〃 7 日	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

第 19 表

(ロ). 咽頭「デ」患者ヨリ分離セル「デ」菌ノ海猿ニ對スル毒性

海 猿 番 號	13	14	15	16	海 猿 番 號	13	14	15	16
體 重 (g)	300	240	320	280	體 重 (g)	300	240	320	280
注射量(白金耳)	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	注射量(白金耳)	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
注射後 1 日	生	生	生	生	注射後 5 日	死	死	死	生
〃 2 日	死	死	死	生	〃 6 日	—	—	—	〃
〃 3 日	—	—	—	〃	〃 7 日	—	—	—	〃
〃 4 日	—	—	—	〃					

上ニ表示セシ如ク竹内菌ハ體重 12g 内外ノ「マウス」(腹腔内注射)ニ對スル最小致死量ハ $\frac{1}{5}$ 白金耳ニシテ福岡菌ハ $\frac{1}{10}$ 白金耳ナリ。

即チ「マウス」ニ對スル兩菌毒性ニ著明ナル差異ヲ認メズ。而シテ死亡「マウス」ノ心臓、肝臓、脾臓、腎臓ヨリ普通寒天斜面ニ塗抹 37°C 48 時間培養セシニ何レモ本菌ノ純培養ヲ得タリ。海猿(皮下)ニ對シテハ兩菌ハ毒力微弱ニシテ 2 白金耳ヲ以テハ局所ニ於テモ何等ノ變化ヲ呈セザリキ。然ルニ村田菌並ニ咽頭「デ」患

者ヨリ分離セシ「デ」菌ハ「マウス」(腹腔内注射)ニ對シテ殆ンド毒性ナキモ海猿(皮下)ニ對シテ感受性頗ル強ク村田菌ハ 1 白金耳、「デ」菌ハ $\frac{1}{2}$ 白金耳ヲ以テ 48 時間ニシテ 250g 内外ノ海猿ヲ死亡セシメ局所ニ於テハ發赤、浸潤、硬結等ヲ呈シ死亡海猿ニ於テハ局所ニ壞疽ヲ呈セルモノアリ。又、腹腔體液ノ著明ナル増加ヲ示セルモノアリキ。

是ニヨリテ培養上並ニ毒力試験ニ於テモ村田菌ハ眞性「デ」菌ナリト斷言シ得。

第七節 各種含水炭素分解試験

新桿菌(竹内、福岡菌)ハ形態並ニ培養上ノ性
狀全ク酷似セル傳研F。北研F及ビ綠膿菌並ニ
稍ニ似タル大腸菌、「デフテリ菌」、村田菌ヲ
同一操作ノ下ニ比較研究セリ。

第一項 實驗方法

1.0%ノ「ペプトン」水ヲ3日間100°C=1
時間宛斷續滅菌シ各種糖及ビシユリング、カ
ルバウム會社製「ラクムス」液ヲ各1.0%ノ割合
ニ加ヘ、標示藥ヲ以テ中性(PH=7.0)トナシ中試
驗管ヘ約4cc宛分注シ100°C30分宛3日
間連續加熱滅菌シ(加熱滅菌後直チニ冷水ヲ以
テ冷却ス)。2日間37°Cノ温室ニ保チ各管ノ色
調ニ變化ナキヲ確メテ後「ブイヨン」菌浮游液ヨ
リ1白金耳宛各試験管ヘ菌ヲ移植培養シ37°C

ノ温室ニ靜置シ翌日ヨリ21日間ニ亘リ其成績
ヲ觀察セリ。而シテ使用糖類ハ單糖類トシテ
Glucose, Laevulose, Mannose, Galactose. 複
糖類トシテ Saccharose, Lactose, Maltose. 多
糖類トシテ Stärke Inulin, Dextrin, Raffinose.
高級「アルコール」トシテ Glycerin, Ery-
thrit, Arabinose, Mannit, Dulcitolヲ用ヒ、尙
ホ Milchzuckerノ17種ノ糖類ヲ使用セリ。
而シテ赤變ノ程度ニ應ジ卅、廿、十ヲ以テアラ
ハス。±ハ培地ノ全ク褪色シ中性トナレルモノ
ヲ示シーハ培地ヲ變色セザルモノヲアラハス。
(卅)、(廿)、(十)、(±)ハ其青變ノ程度ヲアラ
ハスモノトス。

第二項 實驗成績

第20表 A) 竹内菌

37°C 日数		1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	17	21
單 糖 類	Glucose	卅	廿	+	±	±	±	±	廿	廿	廿	廿	廿
	Laevulose	卅	卅	+	±	±	±	±	±	±	±	+	廿
	Mannose	卅	卅	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+
	Galactose	卅	卅	+	±	±	±	±	±	±	±	±	±
複 糖 類	Saccharose	-	-	-	±	±	±	-	-	-	-	-	-
	Lactose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maltose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多 糖 類	Stärke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dextrin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Raffinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高級「アル コ	Glycerin	-	-	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	Erythrit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arabinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mannit	-	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±

Dulcit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上表ノ如ク竹内菌ハ37°C. 24 時間=シテ Glucose, Laevulose, Mannose, Galactose ヲ分解シ赤變シ酸性トナス。而シテ赤變ハ3日目ヨリ褪色シ5日—8日=於テ完全=褪色シ培地ハ中性トナル。然ル=9日目ヨリ再ビ赤變シ始メ21日迄持續セリ。又 Lactose, Maltose,

Stärke, Inulin, Dextrin ハ5日=至リ極メテ輕度=青變シ「アルカリ」性トナスヲ見ル。Glycerin 及ビ Mannit =於テモ3日=至リ完全=褪色シ中性トナス。其他ノ糖=於テハ色調ノ變化ヲ見ザリキ。

第 21 表 B) 福 岡 菌

37°C. 日数		1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	17	21
單糖類	Glucose	+++	+++	+	±	±	±	++	+	+	+	+	+
	Laevulose	+++	+++	+	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	Mannose	+++	+++	+	±	±	±	+	+	+	+	+	+
	Galactose	++	++	+	±	±	±	±	±	±	±	±	±
複糖類	Saccharose	-	-	-	±	±	±	-	-	-	-	-	-
	Lactose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maltose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多糖類	Stärke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dextrin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Raffinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高級「アルコール」	Glycerin	-	-	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	Erythrit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arabinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mannit	-	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	Dulcit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Milch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本菌ノ成績ハ竹内菌ト殆ンド同一ナリキ。

第 22 表 C) 傳 研 F 菌

糖類	37°C 日数	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	17	21
單糖類	Glucose	-	+	+	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	Laevulose	-	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	Mannose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Galactose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
複糖類	Saccharose	-	-	-	-	-	-	±	±	±	±	±	±
	Lactose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maltose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多糖類	Stärke	-	-	±	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	Inulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dextrin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Raffinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高級「アルコール」	Glycerin	-	-	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	Erythrit	-	-	-	-	-	-	(±)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	Arabinose	-	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	Mannit	-	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	Dulcitol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Milch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本菌ハ單糖類中 Glucose フ 2 日シテ赤變シ酸性トナスモ間モナク「アルカリ」性ニ變ジ色調全ク褪色シテ中性トナル。Laevulose ハ Arabinose, Mannit ハ 2 日ニシテ Glycerin ハ 2 日ニシテ褪色シテ中性トナス。Saccharose ハ 6

日迄變色ナキモ 7 日目ヨリ中性トナス。Stärke ハ特異ニシテ 3 日ニシテ中性トナシ 4 日目ヨリ青變シ「アルカリ」性トナス。其他ニ於テハ色調ノ變化ヲ認メズ。

第 23 表 D) 北 研 F 菌

糖類	37°C 日数	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	17	21
單糖類	Glucose	-	±	±	±	±	±	(±)	(+)	(++)	(+++)	(+++)	(+++)
	Laevulose	-	-	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	Mannose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Galactose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

複糖類	Saccharose	-	-	(±)	(+)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lactose	-	-	(±)	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	Maltose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多糖類	Stärke	-	-	±	(+)	(+)	(+)	(+)	(±)	(±)	(±)	(±)	(±)
	Inulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dextrin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Raffinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高級「アルコール」	Glycerin	-	-	-	-	±	±	±	±	±	±	±	±
	Erythrit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arabinose	-	-	-	-	-	±	±	±	±	±	±	±
	Mannit	-	-	-	-	-	±	±	±	±	±	±	±
	Dulcitol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Milch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本菌ハ單糖類中 Glucose フ2日ニシテ極メテ輕度ニ赤變シ弱「酸性」トナスモ7日ニシテ青變シ始メ21日間ニ於テハ極メテ強度ニ青變シテ強「アルカリ」性トナス。Laevulose, Lactose,

Glycerin, Arabinose, Mannit フ數日ニシテ色調ヲ全ク褪色セシメ完全ニ中性トナス。

Saccharose 及ビ Stärke ニ於テハ4日ニシテ青變セシメ「アルカリ」性トナス。

第24表 E) 綠膿菌

		37°C 日數											
糖類		1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	17	21
單糖類	Glucose	-	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	Laevulose	-	±	(±)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
	Mannose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Galactose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
複糖類	Saccharose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lactose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maltose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多糖類	Stärke	-	(+)	(+)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)
	Inulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dextrin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Raffinose	-	-	-	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)

高級「アルコール」	Glycerin	—	—	—	(+)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)
	Erythrit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Arabinose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Mannit	—	—	—	(+)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)
	Dulcit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Milch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

本菌ハ Glucose ヲ 2 日ニシテ中性トナシ色
調ヲ完全ニ褪色セシム。Laevulose ハ 2 日ニシ
テ中性トナシ 4 日ヨリ色調ヲ青變シ「アルカリ」
性トナス。其他 Stärke, Raffinose, Glycerin,

Mannit モ夫々 2 日、4 日、4 日、3 日ニシテ
青變シ「アルカリ」性トナス。而シテ Stärke
ニ於テ最モ著明ナリ。其他ノ糖ハ全然分解セズ。

第 25 表 F) 大 陽 菌

37°C 日数		1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	17	21
單 糖 類	Glucose	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Laevulose	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	++	++	++	++
	Mannose	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	++
	Galactose	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	++	++	++	++
複 糖 類	Saccharose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lactose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maltose	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
多 糖 類	Stärke	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Inulin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dextrin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Raffinose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高級「アルコール」	Glycerin	—	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	Erythrit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Arabinose	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
	Mannit	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Dulcit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Milch	—	—	±	±	+	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++

本菌ハ Glucose, Laevulose, Mannose, Galactose, 及ビ Maltose 及ビ Arabinose, Mannit
ヲ 1 日ニシテ既ニ強度ニ赤變シ酸性トナス。

Glycerin ハ 2 日ニシテ色調ヲ變化シ中性ナラシム。Milch ハ 3 日ニシテ中性トナシ後赤變強度トナル。

第 26 表 G) 「アフテリー」菌

37°C 日數		1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	17	21
單糖類	Glucose	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Laevulose	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	++	++	++	++
	Mannose	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	++
	Galactose	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
複糖類	Saccharose	+	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+
	Lactose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maltose	+++	+++	+	±	±	±	±	-	-	-	-	-
多糖類	Stärke	±	±	+	+	+	+	±	±	-	-	-	-
	Inulin	-	+	+	+	+	+	+	±	-	-	-	-
	Dextrin	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++
	Raffinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高級「アルコール」	Glycerin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erythrit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arabinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mannit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dulcitol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milch		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本「デ」菌ハ Glucose, Laevulose, Mannose, Galactose, Saccharose, Maltose, Dextrin ヲ 37°C. 24 時間ニシテ著明ナル赤變ヲ來タシ培地ヲ酸性トナス。Maltose ノミハ 4 日ニシテ赤

變ノ度ヲ減ジ中性トナス。Stärke 及ビ Inulin ハ弱度ナガラ分解シテ酸性トナス。其他ノ糖ニ於テハ全然色調ノ變化ヲ來タサズ。

第 27 表 H) 村田 菌

37°C 日數		1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	17	21
單糖類	Glucose	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Laevulose	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	++	++	++	++
	Mannose	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	++
	Galactose	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++

複糖類	Saccharose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lactose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maltose	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	++	++	++
多糖類	Stärke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dextrin	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	++	++	++
	Raffinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高級「アルコール」	Glycerin	-	-	-	+	+	+	++	++	++	+++	+++	+++
	Erythrit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arabinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mannit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dulcit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Milch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本菌ハ Glucose, Laevulose, Mannose, Galactose, Maltose, Dextrin ヲ既ニ 37°C. 24 時間ニシテ強度ニ赤變シ酸ヲ形成ス。而シテ Glycerin ハ 4 日ニ至リ初メテ輕度ニ分解セラレ 13 日ニシテ強度トナル。

上記表示セシ如ク余ノ所謂新桿菌（竹内、福岡菌）ハ Glucose, Laevulose, Mannose, Galactose ヲ 37°C. 24 時間ニシテ既ニ強度ノ赤變ヲ示シ酸ヲ發生スルモ、傳研 F 及ビ北研 F ハ唯 Glucose ノミヲ僅カニ赤變スルニ過ギズ。此點ハ余ノ新桿菌ハ傳研 F、北研 F 並ニ綠膿菌ト異ル所ナリ。

而シテ螢光菌ニ關スル成人ノ糖分解能力試験ハ極メテ謬々タルモノナリ。唯 1907 年 W. N. Klimenko, St. Petersburg ガ Glucose, Galactose, Laevulose 及ビ Arabinose ヲ分解シテ酸ヲ形成スル *Bacillus fluorescens non liquefaciens* 即チ *Bacillus fluorescens putidus* Flugge ヲ報告セリ。而シテ之等ハ Malto-

se, Dextrin 及ビ Mannit ヲ分解セズト。又、1912 年 E. Jacobsthal ガ多數ノ螢光族ノ糖分解作用ヲ檢セシ所ニヨレバ糖分解作用並ニ酸ヲ形成スルコトナシト。然レ共其二、三ノ Stamm ハ Glykogen, Galactose, Mannose, Maltose, Saccharose ヲ醗酵シ Raffinose 及ビ Fruktose ヲ分解セザル Stamm ヲ記載セリ。

余ノ所謂新桿菌ハ W. N. Klimenko, St. Petersburg ノ記載セル菌トハ Gelatin ヲ液化スル點ニ於テ大差アル外糖分解能力ニ於テモ劃然タル區別アリ。又 Jacobsthal ノ記載セル螢光菌トハ生物學的性狀相似ルモ Maltose, Saccharose ヲ分解セザル點ニ於テ異ナルモノナリ。又對稱トシテ使用セシ綠膿菌トハ其性狀相似スル點多キモ色素產生能力ニ差異ヲ認メ。又糖分解作用ニ於テモ綠膿菌ハ Glucose, Laevulose, Mannose, Galactose ヲ分解シテ酸ヲ形成セザルモ余ノ所謂新桿菌ハ之等ヲ分解シテ酸ヲ形成スル點ニ相違ヲ見得。其他大腸菌（阪大微研貯

藏)ハ Glucose, Laevulose, Mannose, Galactose ヲ分解シテ酸ヲ發生スル點ハ余ノ新桿菌ト稍々相似タルモ Maltose, Arabinose, Mannit, Milch 等ヲ分解シテ酸ヲ形成スル點ニ大差アリ。其他「デ」菌並ニ村田菌ニ對シテモ Glucose, Laevulose, Mannose, Galactose ヲ分解スル點ハ稍々相似タルモ Saccharose, Maltose, Dextrin, Glycerin 等ノ性状ハ全ク異ナルモノナリ。

即チ余ノ類「デ」性中耳炎ノ2患者ノ耳漏ヨリ分離セシ2桿菌ハ同一菌種ニシテ糖分解力ニ於テ未ダ記載セラレザル新桿菌ナラント思惟ス。

第七章

血清學的檢索

第一節 凝集反應

第一項 實驗方法

(A) 使用菌株

余ノ新桿菌ノ免疫學的檢索ヲナスト同時ニ本菌ト形態並ニ培養上ノ性状酷似シ且ツ含水炭酸ノ分解ニ於テノミ異リ他ハ全ク一致セル傳染病研究所螢光菌。北里研究所螢光菌及ビ之等ニ近縁ナル阪大微生物研究所貯藏綠膿菌ヲ用ヒテ免疫學的研索ヲナシ尙ホ更ニ大腸菌。村田菌。「デ」菌。Proteus X 19 菌。靈菌。乳酸菌ヲモ對照トシテ比較研究セリ。

(B) 菌液ノ製法

生理的食鹽水 1.0ccニ付キ 37°C. 24 時間普通寒天培養ノ菌。2mgヲ浮游セシメ之ヲ菌液トス。但シ「デ」菌(村田菌)ハ一般ニ生理的食鹽水中ニ於テ自發性凝集反應ヲ呈シ其結果ヲ不明瞭ナラシムルヲ以テ 3.0% 食鹽水ヲ使用シテ自發性凝集反應ヲ除去シ得タリ。依テ「デ」菌ハ生理

的食鹽水ノ代リニ 3.0% 食鹽水ヲ使用セリ。

菌液ハ實驗ノ都度同一操作ニテ新調セリ。

(C) 免疫血清

(イ). 免疫實施方法。

體重約 2 kg—3 kg ノ家兎ニ上記諸菌ノ普通寒天 37°C. 24 時間培養(「デ」菌ハレフレ氏凝固血清培地ヲ使用ス)ノ菌ヲ生理的食鹽水 1.0ccニ 2 mg ノ割合ニ浮游セシメ。58°C ノ水槽(谷口式加温器)中ニテ 30 分間加熱セルモノヲ免疫元トシテ 1 週間ノ間隔ヲ以テ家兎耳靜脈内注射ヲ行ヒタリ。注射量ハ第 1 回ハ 1.0 cc. 第 2 回ハ 2.0cc. 第 3 回ハ 4.0cc宛ニシテ即チ倍量的ニ増量シ全量 8.0ccヲ以テ第 3 回注射後 6 日目ニ耳靜脈ヨリ一部採血シ其凝集價ヲ測定シ相當高キニ及ベバ之ニテ完結シ次デ全採血ヲナセリ。而シテ尙ホ凝集價低キ時ハ第 3 回注射後 7 日目ニ再ビ 4.0ccヲ注射スル時ハ大抵相當價ノ免疫血清ヲ得タリ。而シテ免疫操作中家兎ハ著シク體重ノ減弱ヲ來タシ時ニ死亡スルモノアリ。依テ余ハ斯カル場合ニ於テハ體重ノ回復ヲ待チテ注射スルコトセリ。

然レ共一般ニ「デ」菌ニアリテハ其免疫血清ノ作製ハ容易ノ業ニ非ラズシテ他種族例ヘバ大腸菌或ハ余ノ新桿菌ノ夫等ニ比シテ操作煩雜。又ハ長期間ヲ要シテ初メテ免疫體ヲ產生スルヲ知レリ。

全採血方法ハ專ラ頸靜脈ヨリナセリ。而シテ氷室ニ 1 夜靜置シテ血清ヲ分離シ次デ遠心分離シタル血清ヲ滅菌大試験管ニ收メ。之ヲ谷口式血清加温器ニテ 56°C. 30 分間加熱シテ非動物性トナシ 5.0% ノ割合ニ石炭酸ヲ加ヘ。更ニ之ヲ 1 ccノ褐色「アンブレ」ニ分注シ氷室ニ貯ヘ用ニ臨ミテ使用セリ。

第 28 表

家兎免疫操作中ニ於ケル體重ノ増減

(體重ハgヲ以テ表ハス)

菌名	注射回数	第1回	第2回	第3回	第4回	菌名	注射回数	第1回	第2回	第3回	第4回
	家兎番號 注射量	1 cc.	2 cc.	4 cc.	4 cc.		家兎番號 注射量	1 cc.	2 cc.	4 cc.	4 cc.
竹内菌	No. 5	2320	2240	2250		傳研F菌	No. 17	2900	2880	2970	
	No. 24	2040	1730	1610			No. 18	3400	3550	3480	
	No. 70	2230	2170	2070		北研F菌	No. 19	2400	1930	2000	
	No. 51	2720	2830	2850			No. 20	2720	2600	2600	
	No. 53	2700	2670	2720		綠膿菌	No. 33	2940	2880	2880	
福岡菌	No. 92	3080	2070	2080	1490		No. 34	3080	2970	2700	
	No. 1	3250	2350	2270	2060	大腸菌	No. 2	2300	2100	2170	
	No. 96	2450	2230	2360	2340		No. 40	1800	1800	1800	1940
	No. 55	2600	2380	2300							
	No. 56	2550	2650	2650							

第 29 表

「ガ」 菌		注射日	9/8 ³⁵	14/8	18/8	23/8	30/8	6/9	13/9
		注射量	1 cc.	2 cc.	3 cc.	5 cc.	6 cc.	6 cc.	
菌	No. 77	體重	2320	2280	2350	2350	2210	2220	全採血
	No. 79	體重	2580	2600	2630	2310	2120	2250	全採血
	No. 80	注射日	9/9 ³⁵	13/9	18/9	21/9	27/9	3/10	
		注射量	1 cc.	3 cc.	5 cc.	5 cc.	10 cc.		
		體重	2950	2870	3080	2920	2800	全採血	

第 30 表

村田菌		注射日	20/8 ³⁵	2/9	6/9	11/9	20/9	28/9
		注射量	1 cc.	3 cc.	3 cc.	5 cc.	10 cc.	
菌	No. 61	體重	2450	2550	2590	2560	2480	全採血
	No. 62	體重	2820	2820	2830	2540	2830	全採血
	No. 63	體重	2350	2550	2130	2550	2520	全採血

(D) 凝集反應操作

前記血清ヲ生理的食鹽水ニテ稀釋シタルモノ
ノ遞降量ヲ食鹽水ヲ以テ 0.5cc トナセルモノニ
菌液 0.5cc ヲ加ヘテヨク振盪シテ 37°C ノ温室

ニ 2 時間靜置後取り出シ。24 時間氷室ニ靜置
シタル後成績ヲ判定セリ。對照ハ生理的食鹽水
0.5cc ニ菌液 0.5cc ヲ加ヘシモノナリ。術式ヲ圖
示スレバ下ノ如シ。

第 31 表

小 試 驗 管	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
生理的食鹽水	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5
血 清 1 : 5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
菌 液	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
血清稀釋倍數	20	40	80	100	200	400	800	1000	2000	4000	8000	10000	對照

第二項 實 驗 成 績

第 32 表 (A) 各菌各自ノ免疫血清ノ凝集價

菌名	血清 稀釋倍數	20	40	80	100	200	400	800	1000	2000	4000	8000	10000	對照
竹 内 菌	No. 5	++	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	±	-
	No. 24	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+	+	-	-
	No. 70	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-
	No. 51	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-
	No. 53	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-
福 岡 菌	No. 92	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-
	No. 1	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-
	No. 96	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-
	No. 55	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-
	No. 56	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-
傳 研 F 菌	No. 17	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-
	No. 18	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-
北 研 F 菌	No. 19	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-
	No. 20	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-
綠 膿 菌	No. 33	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-
	No. 34	++	++	++	++	++	++	++	++	++	±	-	-	-

大腸菌	No. 2	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	±	—
	No. 40	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	—	—
「デ」菌	No. 77	++	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—
	No. 79	++	++	++	++	+	+	+	±	—	—	—	—	—
	No. 80	++	++	++	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—
村田菌	No. 61	++	+	+	+	+	+	+	±	—	—	—	—	—
	No. 62	++	++	++	+	+	+	+	+	±	—	—	—	—
	No. 63	++	++	++	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—

即チ余ノ所謂新桿菌竹内菌並ニ福岡菌、及ビ傳研F、北研F、大腸菌ハ3回—4回ノ免疫操作ニヨリテヨク8000倍程度ノ凝集價ヲ有スル免疫血清ヲ得タリ。然ルニ「デ」菌ニ於テハ如何ナル方法ヲ以テスルモ凝集價800倍程度ノ免疫血清ヲ得タルノミ。

以下順ヲ追ツテ之等各菌及ビ其免疫血清ニ交叉的ニ凝集反應ヲ試験セリ。(33—40表參照)

第三項 凝集反應試験總括並ニ考案

33—40表ニ示セン如ク余ノ所謂新桿菌(竹内菌、福岡菌)、傳研F菌、北研F菌、綠膿菌ト之等各菌ノ免疫血清ハ全ク交叉的ニ凝集反應ヲ行ヒタルニ竹内菌ニ對シ福岡血清ハ2000倍迄凝集反應陽性ヲ示シ又福岡菌ニ對シテ竹内血清ハ4000倍迄凝集反應陽性ナリ。即チ竹内、福岡菌ハ互ニ各自ノ免疫血清ト同程度ノ凝集反應ヲ示ス。即チ竹内、福岡兩菌ハ凝集反應上ヨリ全ク同一菌種ナリト云ヒ得。

而シテ竹内菌並ニ福岡菌ハ傳研F血清、北研F血清、綠膿菌血清ニ對シテ多少弱レドモ夫々2000倍—800倍ノ凝集反應陽性ヲ示ス。傳研F菌ハ竹内、福岡血清ニ2000倍、北研F菌血清ニ對シ2000—4000倍、綠膿菌血清ニ對シテハ800—2000倍ノ陽性ヲ呈ス。北研F菌ハ竹内菌及ビ

福岡菌血清ニ對シテ800倍、傳研F菌血清ニ對シテ400倍、綠膿菌血清ニ200倍ノ凝集反應陽性ヲ呈ス。而シテ綠膿菌ハ竹内菌及ビ福岡菌免疫血清ニ對シテ1000—2000倍、傳研F血清ニ1000倍、北研F血清ニ1000倍ノ陽性ヲ示ス。而シテ大腸菌ハ竹内菌、福岡菌血清、北研F菌血清、傳研F菌血清ニ對シテ殆ンド凝集反應ヲ呈セズ。「デ」菌ハ村田菌血清ニ對シテ其固有血清ト同程度(800倍)ノ凝集反應ヲ呈スルモ他ノ菌ニ對シテハ凝集反應ヲ呈セズ。

而シテ Proteus X 19 菌、靈菌、乳酸菌ハ竹内菌、福岡菌、傳研F菌、北研F菌、綠膿菌、大腸菌、「デ」菌、村田菌ノ各免疫血清ニ對シテ殆ンド凝集反應ヲ呈セズ。

即チ余ノ所謂新桿菌ハ凝集反應上傳研F菌、北研F菌ニ最モ近縁ニシテ綠膿菌ニモ相當近縁ナルヲ知レリ。然レ共此凝集反應試験成績ヲ以テ直チニ余ノ所謂新桿菌ガ傳研F菌、北研F菌ト同一菌種ナリトハ斷言シ難シ。依テ余ハ更ニ吸收試験(カステラーニ氏)ヲ施行シテ是等ノ關係ヲ詳細ニ檢索セント企テタリ。

第二節 カステラーニ氏吸收試験

余ハ更ニ進ミテ余ノ所謂新桿菌(竹内菌、福岡菌)、傳研F菌、北研F菌、綠膿菌及ビ是等各

各ノ家兎免疫血清ヲ使用シテ交叉的ニ吸收試験
(カステラー氏)ヲ施行セリ。

第一項 實驗方法

免疫血清ノ 25 倍稀釋セルモノ、10ccニ普
通寒天特大斜面 37°C. 24 時間培養ノ菌。3 斜
面ノ菌ヲ浮游混和シ。37°Cノ孵卵器ニ 3 時間
放置。時々振盪シテ後「エルゴス」ノ遠心沈澱
器(1 分時約 3000 回)ニテ 1 時間—1 時間半遠

心沈澱シ透明ナル上澄液ヲ得。而シテ此上澄液
ニ前記セント同様操作ヲ繰返ス事 3 回—5 回ニ
シテ吸收ニ使用セシ菌ノ凝集素ハ全ク吸收セラ
ルハヲ知レリ。依テ余ハ其上澄液ニツキ吸收ニ
使用セシ菌ヲ以テ既ニ凝集反應ノ起ラザルヲ確
メタル後竹内菌。福岡菌。傳研 F 菌。北研 F 菌。
綠膿菌ヲ以テ凝集反應ヲ施行セリ。

凝集反應術式ハ圖示スベシ。(41 表参照)

第 33 表 (B) 竹内菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應
各菌免疫血清ハ煩ヲ避ケル爲其代表的ナルモノ一種ヲ以テノ成績ヲ記載セリ。

血清名	20	40	80	100	200	400	800	1000	2000	4000	8000	10000	對照
竹内菌血清	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	+	±	-	-
福岡菌血清	+++	+++	+++	+++	++	++	++	+	+	+	-	-	-
傳研 F 菌血清	+++	+++	++	++	++	+	+	+	±	-	-	-	-
北研 F 菌血清	++	++	+	+	+	+	±	-	-	-	-	-	-
綠膿菌血清	++	+	+	+	+	+	±	-	-	-	-	-	-
大腸菌血清	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
「ア」菌血清	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
村田菌血清	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常家兎血清	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 34 表 (C) 福岡菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應

血清名	20	40	80	100	200	400	800	1000	2000	4000	8000	10000	對照
竹内菌血清	+++	++	++	+	+	+	+	+	+	±	-	-	-
福岡菌血清	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	±	-	-	-
傳研 F 菌血清	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	+	+	-	-	-
北研 F 菌血清	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+	+	-	-	-
綠膿菌血清	+++	+++	++	++	+	+	+	+	-	-	-	-	-
大腸菌血清	++	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
「ア」菌血清	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
村田菌血清	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常家兎血清	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 35 表 (D) 傳研F菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應

血清稀釋倍數 血清名	20	40	80	100	200	400	800	1000	2000	4000	8000	10000	對照
竹内菌血清	卅	卅	卅	+	+	+	+	+	+	±	-	-	-
福岡菌血清	卅	卅	卅	卅	卅	+	+	+	+	±	-	-	-
傳研F菌血清	卅	卅	卅	卅	卅	+	+	+	+	+	-	-	-
北研F菌血清	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	+	+	-	-	-
綠膿菌血清	卅	卅	卅	卅	+	+	+	+	+	-	-	-	-
大腸菌血清	+	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
「ゲ」菌血清	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
村田菌血清	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常家兔血清	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 36 表 (E) 北研F菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應

血清稀釋倍數 血清名	20	40	80	100	200	400	800	1000	2000	4000	8000	10000	對照
竹内菌血清	卅	卅	卅	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
福岡菌血清	卅	卅	卅	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
傳研F菌血清	卅	卅	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
北研F菌血清	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	+	+	-	-	-	-
綠膿菌血清	卅	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌血清	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
「ゲ」菌血清	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
村田菌血清	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常家兔血清	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 37 表 (F) 綠膿菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應

血清稀釋倍數 血清名	20	40	80	100	200	400	800	1000	2000	4000	8000	10000	對照
竹内菌血清	卅	卅	卅	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
福岡菌血清	卅	卅	卅	卅	+	+	+	+	+	±	-	-	-
傳研F菌血清	卅	卅	卅	卅	+	+	+	+	±	-	-	-	-
北研F菌血清	卅	卅	卅	卅	+	+	+	+	-	-	-	-	-
綠膿菌血清	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	+	+	-	-	-
大腸菌血清	卅	+	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-
「ゲ」菌血清	卅	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
村田菌血清	卅	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常家兔血清	卅	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 38 表 (G) 大腸菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應

血清名	血清稀釋倍數	20	40	80	100	200	400	800	1000	2000	4000	8000	10000	對照
竹内菌血清		+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡菌血清		+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
傳研 F 菌血清		+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北研 F 菌血清		+	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
綠膿菌血清		±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌血清		++	++	++	++	++	++	++	++	++	+	+	+	-
「ダ」菌血清		++	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
村田菌血清		++	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常家兔血清		+	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 39 表 (H) 「ダ」菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應

血清名	血清稀釋倍數	20	40	80	100	200	400	800	1000	2000	4000	8000	10000	對照
竹内菌血清		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡菌血清		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
傳研 F 菌血清		+	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北研 F 菌血清		±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
綠膿菌血清		±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌血清		±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
「ダ」菌血清		++	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
村田菌血清		++	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
正常家兔血清		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 40 表 (I) Proteus X 19 菌。靈菌。乳酸菌ノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應

血清名	血清稀釋倍數	20	40	80	100	200	400	800	1000	2000	4000	8000	10000	對照
竹内菌血清		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡菌血清		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
傳研 F 菌血清		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北研 F 菌血清		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
綠膿菌血清		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌血清		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
「ダ」菌血清		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
村田菌血清		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正常家兔血清		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proteus X 19. 靈菌, 乳酸菌ヲ以テノ各菌免疫血清ニ對スル凝集反應ハ略ニ同一ナリキ。(上表參照)

第 41 表

小 試 驗 管	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
生理的食鹽水		0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
血 清 1:25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.5↓ ↑0.5	0.5	0.5	0.5↓ 0.5	0.5
菌 液	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
血清稀釋倍数	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照

第二項 實 驗 成 績

第 42 表 (A) 使用血清 竹內菌免疫血清

吸收菌名	血清稀釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
竹 內 菌	竹 內 菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福 岡 菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	傳研F菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
	綠 膿 菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-

第 43 表

吸收菌名	血清稀釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
福 岡 菌	竹 內 菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福 岡 菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	傳研F菌	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	+	+	±	-	-	-	-	-	-	-
	綠 膿 菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-

第 44 表

吸收菌名	血清稀釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
傳 研 F 菌	竹 內 菌	++	++	+	+	+	±	-	-	-	-
	福 岡 菌	++	++	+	+	+	+	-	-	-	-
	傳研F菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-
	綠 膿 菌	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-

第 45 表

吸收菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
北 研 F 菌	竹 内 菌	++	++	++	++	+	+	+	±	-	-
	福 岡 菌	++	++	++	++	+	+	+	-	-	-
	傳研F菌	+	±	-	-	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	綠 膿 菌	++	++	+	+	±	-	-	-	-	-

第 46 表

吸收菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
綠 膿 菌	竹 内 菌	++	++	+	+	+	-	-	-	-	-
	福 岡 菌	++	++	+	+	+	-	-	-	-	-
	傳研F菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	綠 膿 菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 47 表 (B) 使用血清 福岡菌免疫血清

吸收菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
竹 内 菌	竹 内 菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福 岡 菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	傳研F菌	+	+	+	±	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	+	+	+	+	±	-	-	-	-	-
	綠 膿 菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-

第 48 表

吸收菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
福 岡 菌	竹 内 菌	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福 岡 菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	傳研F菌	+	+	+	±	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	+	+	±	-	-	-	-	-	-	-
	綠 膿 菌	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-

第 49 表

吸收菌名	血清稀釋度 菌名	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
傳研F菌	竹内菌	++	++	+	+	+	+	+	±	-	-
	福岡菌	++	++	++	+	+	+	+	+	-	-
	傳研F菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	綠膿菌	++	+	+	+	-	-	-	-	-	-

第 50 表

吸收菌名	血清稀釋度 菌名	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
北研F菌	竹内菌	++	++	+	+	+	+	+	+	-	-
	福岡菌	++	++	++	+	+	+	+	+	-	-
	傳研F菌	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	綠膿菌	+	+	+	+	±	-	-	-	-	-

第 51 表

吸收菌名	血清稀釋度 菌名	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
綠膿菌	竹内菌	++	++	+	+	+	+	±	-	-	-
	福岡菌	++	++	+	+	+	+	±	-	-	-
	傳研F菌	++	+	+	+	+	+	-	-	-	-
	北研F菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	綠膿菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 52 表 (C) 使用血清。傳研F菌免疫血清

吸收菌名	血清稀釋度 菌名	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
竹内菌	竹内菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福岡菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	傳研F菌	++	++	++	+	+	-	-	-	-	-
	北研F菌	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
	綠膿菌	+	+	+	+	±	-	-	-	-	-

第 53 表

吸收菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
福 岡 菌	竹 内 菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福 岡 菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	傳研F菌	++	++	++	+	+	-	-	-	-	-
	北研F菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	綠 膿 菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-

第 54 表

吸收菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
傳 研 F 菌	竹 内 菌	+	+	±	-	-	-	-	-	-	-
	福 岡 菌	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
	傳研F菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	綠 膿 菌	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-

第 55 表

吸收菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
北 研 F 菌	竹 内 菌	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
	福 岡 菌	+	+	±	-	-	-	-	-	-	-
	傳研F菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	綠 膿 菌	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-

第 56 表

吸收菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
綠 膿 菌	竹 内 菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	福 岡 菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	傳研F菌	++	++	+	+	+	+	+	-	-	-
	北研F菌	++	+	+	+	+	+	-	-	-	-
	綠 膿 菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 57 表 (D) 使用血清 北研F菌免疫血清

吸收菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
竹 内 菌	竹 内 菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福 岡 菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	傳研F菌	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—
	北研F菌	++	+	+	+	+	+	+	—	—	—
	綠 膿 菌	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—

第 58 表

吸收菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
福 岡 菌	竹 内 菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	福 岡 菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	傳研F菌	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—
	北研F菌	++	+	+	+	+	+	+	±	—	—
	綠 膿 菌	+	+	+	±	—	—	—	—	—	—

第 59 表

吸收菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
傳 研 F 菌	竹 内 菌	+	+	+	±	—	—	—	—	—	—
	福 岡 菌	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—
	傳研F菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北研F菌	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	綠 膿 菌	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—

第 60 表

吸收菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
北 研 F 菌	竹 内 菌	+	+	+	+	±	—	—	—	—	—
	福 岡 菌	+	+	+	+	+	—	—	—	—	—
	傳研F菌	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北研F菌	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	綠 膿 菌	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—

第 61 表

吸收菌名	血清稀釋度 菌名	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
綠膿菌	竹内菌	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	福岡菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	傳研F菌	++	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	北研F菌	++	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	綠膿菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 62 表 (E) 使用血清 綠膿菌免疫血清

吸收菌名	血清稀釋度 菌名	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
竹内菌	竹内菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福岡菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	傳研F菌	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	綠膿菌	++	++	++	+	+	+	+	±	-	-

第 63 表

吸收菌名	血清稀釋度 菌名	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
福岡菌	竹内菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	福岡菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	傳研F菌	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	綠膿菌	++	++	++	+	+	+	+	+	-	-

第 64 表

吸收菌名	血清稀釋度 菌名	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
傳研F菌	竹内菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	福岡菌	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
	傳研F菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	綠膿菌	++	+	+	+	+	+	+	-	-	-

第 65 表

吸収菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
北 研 F 菌	竹 内 菌	++	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	福 岡 菌	++	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	傳研F菌	+	+	±	-	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	綠 膿 菌	++	++	++	++	+	+	+	+	+	-

第 66 表

吸収菌名	血清稀 菌名 釋度	50	100	200	400	500	800	1000	2000	4000	對照
綠 膿 菌	竹 内 菌	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
	福 岡 菌	+	+	+	+	±	-	-	-	-	-
	傳研F菌	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
	北研F菌	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
	綠 膿 菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第三項 實驗成績總括並ニ考案

先ヅ竹内菌ノ免疫血清ヲ使用シタ場合ニ於テ竹内菌ヲ以テ完全ニ吸收セラレシ竹内血清ハ福岡菌ニ對シテ全ク凝集反應陰性ナリ。然レ共傳研F菌ニ400倍、北研F菌ニ200倍、綠膿菌ニ400倍迄凝集反應陽性ナリ。次ニ福岡菌ヲ以テ完全ニ吸收セラレシ竹内血清ハ既ニ竹内菌ニ對スル凝集素モ有セズ。傳研F菌ニ200倍、北研F菌ニ100倍、綠膿菌ニ400倍迄凝集反應ヲ呈ス。同様ニ傳研F菌ヲ以テ完全ニ吸收セラレシ竹内血清ハ北研F菌ニ對スル凝集素モ殆ンド含有セザルニ反シ竹内菌及ビ福岡菌ニ對シテハ1000倍、綠膿菌ニ對シテ200倍迄凝集反應陽性ナリ。北研F菌ヲ以テ吸收セラレシ竹内血清ハ傳研F菌ニ對スル凝集素モ殆ンド吸收セラル、ニ反シ竹内菌及ビ福岡菌ニ對シテ尙ホ1000倍迄、綠

膿菌ニ對シテハ400倍迄凝集反應陽性ナリ。

又綠膿菌ヲ以テ吸收セラレシ竹内血清ハ竹内菌並ニ福岡菌ニ對シテ500倍、傳研F菌及ビ北研F菌ニ對シテ400倍迄凝集反應陽性ナリ。

次ニ福岡菌免疫血清ヲ使用セル場合ニ於テ竹内菌ヲ以テ完全ニ吸收セシ福岡血清ハ既ニ福岡菌ニ對シテモ凝集反應全ク陰性ナルニ傳研F菌、北研F菌、綠膿菌ニ夫々400倍迄凝集反應陽性ナリ。福岡菌ヲ以テ全ク吸收セラレシ福岡菌ハ既ニ竹内菌ニ對シテモ凝集反應ヲ呈セズ。傳研F菌ニ200倍、北研F菌ニ100倍、綠膿菌ニ500倍迄凝集反應ヲ呈ス。同様ニ傳研F及ビ北研F菌ヲ以テ完全ニ吸收セシ福岡血清モ竹内菌及ビ福岡菌ニ夫々1000—2000倍、綠膿菌ニ400倍迄凝集反應陽性ナリ。又綠膿菌ニテ吸收セシ福岡血清ハ竹内菌ニ800倍、福岡菌ニ1000倍、傳研F

菌 = 800 倍。北研 F 菌 = 400 倍迄凝集反應陽性ナリ。

傳研 F 菌免疫血清ヲ使用セシ場合ニ於テハ竹内菌ニテ完全ニ吸收セラレシ傳研 F 菌血清ハ福岡菌ニモ全く凝集反應ヲ呈セザレドモ傳研 F 菌ニハ 500 倍。北研 F 菌ニハ 200 倍。綠膿菌ニハ 400 倍迄凝集反應陽性ナリ。又福岡菌ニテ吸收セラレシ傳研 F 菌血清ハ傳研 F 菌 = 500 倍。北研 F 菌並ニ綠膿菌 = 400 倍迄凝集反應陽性ナリ。同様ニ傳研 F 菌及ビ北研 F 菌ヲ以テ吸收セラレシ傳研 F 菌血清ハ夫々尙ホ竹内菌ニ對シテ 200 倍。福岡菌ニ對シテ 100 倍。綠膿菌ニ對シテ 200 倍ノ凝集反應ヲ呈ス。綠膿菌ヲ以テ吸收セラレシ傳研 F 菌血清ハ竹内菌及ビ福岡菌ニ對シテ 400 倍。傳研 F 菌ニ對シテ 1000 倍。北研 F 菌 = 800 倍迄凝集反應陽性ナリ。

北研 F 菌免疫血清ヲ使用セシ場合ニ於テハ竹内菌ヲ以テ完全ニ吸收セラレシ北研 F 菌血清ハ福岡菌ニモ全く凝集反應ヲ呈セズ。傳研 F 菌 = 100 倍。北研 F 菌 = 1000 倍。綠膿菌 = 200 倍迄凝集反應ヲ呈ス。又福岡菌ニテ吸收セラレシ北研 F 菌血清ハ竹内菌ニ對シテ全く凝集反應ヲ呈セザルニ傳研 F 菌ニ對シテ 200 倍。北研 F 菌 = 1000 倍。綠膿菌 = 200 倍迄陽性ナリ。傳研 F 菌及ビ北研 F 菌ヲ以テ吸收セン北研 F 菌血清ハ夫々竹内菌及ビ福岡菌ニ對シ 400 倍。綠膿菌ニ對シテハ 200 倍迄凝集反應ヲ呈ス。綠膿菌ニテ吸收セラレシ北研 F 菌血清ハ竹内菌ニ對シテ 500 倍。福岡菌ニ對シテ 400 倍。傳研 F 菌及ビ北研 F 菌ニ對シテ 500 倍迄凝集反應ヲ呈ス。

綠膿菌免疫血清ヲ使用セシ場合ニ於テ竹内菌ヲ以テ完全ニ吸收セン綠膿菌血清ハ福岡菌ニ對シテハ全然凝集反應ヲ呈セズ。傳研 F 菌 = 200 倍。

北研 F 菌 = 400 倍。綠膿菌 = 1000 倍迄凝集反應ヲ呈ス。福岡菌ヲ以テ吸收セン綠膿菌血清ハ竹内菌ニ對シテモ凝集反應陰性ニシテ傳研 F 菌 = 200 倍。北研 F 菌 = 400 倍。綠膿菌 = 2000 倍迄凝集反應ヲ呈ス。傳研 F 菌ニテ吸收セン綠膿菌血清ハ竹内菌及ビ福岡菌ニ夫々 400 倍迄。北研 F 菌 = 50 倍迄。綠膿菌 = 1000 倍迄凝集反應ヲ呈ス。北研 F 菌ニテ吸收セラレシ綠膿菌血清ハ竹内菌。福岡菌ニ夫々 500 倍。傳研 F 菌 = 100 倍。綠膿菌 = 4000 倍迄凝集反應ヲ呈ス。最後ニ綠膿菌ヲ以テ吸收セラレシ綠膿菌血清ハ竹内菌ニ對シテハ 500 倍。福岡菌ニ對シテハ 400 倍。傳研 F 菌及ビ北研 F 菌ニ對シテハ 200 倍迄凝集反應陽性ナリ。

即チ竹内菌免疫血清ハ福岡菌ニヨリテ又福岡菌免疫血清ハ竹内菌ニヨリテ全然吸收セラル、ヲ知ル。即チ竹内菌及ビ福岡菌ハカステラーニ氏吸收試験ノ結果全然同一ニシテ區別シ得ズ。而シテ其形態並ニ生物學的諸性狀酷似セル傳研 F 菌。北研 F 菌。綠膿菌ト余ノ所謂新桿菌トハ劃然ト區別セラル、ヲ見タリ。而シテ余ノ實驗成績ニヨレバ余ノ新桿菌ト劃然ト區別セラル、傳研 F 菌並ニ北研 F 菌ハ血清學的ニモ極メテ近縁ニシテ綠膿菌トハ區別セラル、ヲ見タリ。

第三節 補體結合反應

余ハ更ニ進ミテ補體結合反應ニ依リテモ新桿菌ハ果シテ傳研 F 菌。北研 F 菌及ビ綠膿菌ト區別シ得ルヤ否ヤヲ檢セントシ又是等 5 菌間ニ於テ全く交叉的ニ補體結合反應試驗ヲ施行セリ。

(A) 「アンチゲン」ノ製法

1 cc ノ生理的食鹽水ニ各菌ノ普通寒天 37°C。24 時間培養ノ菌 2 mg ノ割合ニ浮游混和シ 1 分間 3000 迴轉ノ遠心沈澱器ヲ以テ約 3 分間遠心

沈澱シ其上澄液ヲ得之ヲ「アンチゲン」トシテ使用セリ。而シテ該「アンチゲン」ハ生菌其儘ヲ使用シ加熱其他ノ操作ヲ加ヘザリキ。

(B) 使用血清ノ種類

免疫血清ハ凝集反應ニ用ヒシモノ同一ナルモノヲ使用セリ。而シテ各菌其代表的ナル免疫血清一ツ宛ヲ選ビ試験ニ供セリ。即チ竹内菌免疫血清。福岡菌免疫血清。傳研F菌免疫血清。北研F菌免疫血清。綠膿菌免疫血清。大腸菌免疫血清及ビ正常家兎血清ヲ使用セリ。

(C) 溶血系統

補體結合反應ニ使用スル溶血系統ハ抗牛溶血系ヲ使用セリ。

(1) 溶血素

脱纖維牛血液ヲ3回生理的食鹽水ニテ遠心器ニカケ上澄液ノ透明ニナル迄3—4回洗滌シ上澄液ヲ捨テ沈渣血球ノミヲ生理的食鹽水ヲ以テ稀釋シ家兎耳靜脈内ヘ1週間ノ間隔ヲ以テ2cc, 4cc, 4ccト漸次増量のニ3回注射シ最後ノ注射日ヨリ6日目ニ耳靜脈ヨリ一部採血シテ溶血價ヲ測定シ所要ノ溶血價ヲ有スル時ハ翌日即チ最後ノ注射日ヨリ7日目ニ全採血シ一夜氷室ニ靜置シ血清ヲ分離シ1ccノ褐色。「アンブレー」中ニ封入シ。56°Cノ水槽中ニ於テ30分間加熱。非動性トナシ之ヲ氷室中ニ貯ヘ。1週後ニ至リ再ビ溶血價ヲ測定シ使用ス。但シ最少溶血價M. H. D. 0.001以上ノ溶血素即チ余ハM. H. D. 0.0005ナル溶血素ヲ使用セリ。

(2) 免疫血清溶血價ノ測定方法

非動性血清ヲ生理的食鹽水ヲ以テ20倍ニ稀釋シ豫メ0.5ccノ生理的食鹽水ヲ入レタル一列ノ試験管ニ0.01, 0.015, 0.02, 0.025, 0.03ccト遞増量ニ注加シ。夫レニ3%ノ牛血球浮游液

0.5ccヲ加ヘ。ヨク振盪混和セシメタル後(約15分間以上室温ニ放置)。補體トシテエールリッヒ氏寒冷分離法ニ依リ正常抗牛溶血素ヲ除去シタル海獺血清0.05cc宛加ヘ37°C1時間15分ノ後完全溶血ヲ示ス血清量ヲ以テ最小溶血價ト決定ス。

(3) 感作血球

脱纖維牛血1ニ生理的食鹽水3ノ割ニ加ヘ。遠心沈澱器ニカケ。3—4回洗滌シテ血清ヲ全ク除キタル血球沈渣3.0ccヲ別ニ要ニ用意シタル生理的食鹽水97ccヲ2分シ。其一半ニ浮游セシメ。他ノ半分ニハ前記抗牛溶血價ノ7倍量ヲ加ヘ。兩半ヲ混合シタル後15分時以上室温ニ靜置シタル後使用ス。

(D) 補體

補體ハ海獺血清ヲ使用セリ。3頭以上ノ海獺ヨリ心臟穿刺ニテ採血シタル混合血液ヲ氷室ニ18時間以上靜置シタルモノヲ分離シテ使用ス。(而シテ溶血ノ起ラザル様注意セリ。)

(1) 補體ノ最少溶血價測定方法

前記海獺血清ヲ生理的食鹽水ヲ以テ4倍ニ稀釋シ。豫メ生理的食鹽水ヲ0.5cc宛入レタル6本ノ試験管ニ0.01, 0.02, 0.025, 0.03, 0.04ccト遞増量ニ加ヘ。之ニ3%感作牛血球浮游液0.5cc宛加ヘ。時々振盪シツ、37°Cノ孵卵器中ニ保ツコト1時間15分時ノ後完全溶血ヲ呈シタル血清量ヲ以テ1單位トセリ。

(E) 實驗操作

(1) 抗原ノ抗補體作用測定

竝ニ使用量ノ決定

前記各菌(竹内菌。福岡菌。傳研F菌。北研F菌。綠膿菌)抗原0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7ccヲ各試験管ニ取り是レニ補體ノ2單位

ヲ加へ。0.4cc 以下ハ各試験管ノ全量 0.5cc トナル様ニ生理的食鹽水ヲ加へ。37°C ノ温室ニ時々振盪シテ 1 時間半作用セシメ。3% 感作血球浮游液ヲ 0.5cc 宛加へ。再ビ 37°C ノ温室ニ時々振盪シテ 1 時間 15 分作用セシメ。完全溶血ヲ示セシ量ノ半量ヲ使用セリ。

竹内菌ヨリ作りシ抗原ハ 0.6cc。福岡菌ハ 0.4cc。傳研 F 菌ハ 0.4cc。北研 F 菌ハ 0.6cc。綠膿菌ハ 0.5cc ニテ夫々完全溶血ヲ示セシヲ以テ各々其半量即チ 0.3cc。0.2cc。0.2cc。0.3cc。0.25cc。ヲ使用セリ。

(2) 補體結合反應術式

被檢血清 0.05cc ニ前記抗原使用量ヲ加へ。生理的食鹽水ヲ加ヘテ全量ヲ 0.5cc トナシ補體ヲ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 單位ト遞増量ヲ加へ。1 時間半 37°C ノ温室ニ收メ時々振盪シ次デ 0.5 cc 宛 3% 感作牛血球浮游液ヲ各管ニ加へ。再ビ 37°C ノ温室ニ 1 時間 15 分時收メ時振盪シ成績ヲ判定セリ。

(3) 對 照 試 驗

(1) 血 清 對 照

血清使用量及ビ其 2 倍量ノ血清ヲ豫メ生理的食鹽水 0.5cc 宛入レタル試験管ニ加へ。是レニ 2 單位ノ補體ヲ加ヘ主試験同様ニ處置ス。

(ロ) 抗 原 對 照

各菌ノ抗原ノ使用量並ニ 2 倍量ノ抗原ヲ豫メ生理的食鹽水 0.5cc 宛入レタル試験管ニ加へ。是ニ 2 單位ノ補體ヲ加ヘ主試験同様ニ處置ス。

(ハ) 補 體 對 照

前記補體最少溶血價測定方法ト全く同様ノ操作ヲナス。

(4) 成 績 判 定

次ノ判定法ニ從フ。

第 67 表

c	complete lysis.	溶血%	100%
jc	just complete lysis.	〃	98%
ac	almost complete lysis.	〃	96%
vm	very marked lysis.	〃	90%
m	marked lysis.	〃	80%
d	distinct lysis.	〃	65%
tr	trace lysis.	〃	45%
fttr	faint trace lysis.	〃	25%
o	none	〃	0%

第二項 實 驗 成 驗

(A) 竹内菌ヲ抗原トセル場合ノ福岡菌、傳研 F 菌、北研 F 菌、綠膿菌ノ各免疫血清トノ補體結合反應。

第 68 表

	補體量[K=M. H. D.]									
	K ₂	K ₃	K ₄	K ₅	K ₆	K ₈	K ₁₀	K ₁₂	K ₁₄	
竹內菌血清	o	o	fr	fr	tr	d	vm	ac	c	
福岡菌血清	o	o	fr	tr	tr	d	m	ac	c	
傳研 F 菌血清	jc	ac	c	c	c	c	c	c	c	
北研 F 菌血清	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
綠膿菌血清	jc	c	c	c	c	c	c	c	c	
大腸菌血清	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
正常家兔血清	c	c	c	c	c	c	c	c	c	

(B) 福岡菌ヲ抗原トセル場合ノ各菌免疫血清トノ補體結合反應。

第 69 表

	補體量[K=M. H. D.]									
	K ₂	K ₃	K ₄	K ₅	K ₆	K ₈	K ₁₀	K ₁₂	K ₁₄	
竹内菌血清	o	o	fr	tr	tr	d	vm	d	c	

福岡菌血清	o	o	o	ftr	ftr	tr	m	c	c
傳研F菌血清	c	c	c	c	c	c	c	c	c
北研F菌血清	ftr	m	ac	c	c	c	c	c	c
綠膿菌血清	d	ac	jc	c	c	c	c	c	c
大腸菌血清	c	c	c	c	c	c	c	c	c
正常家兔血清	c	c	c	c	c	c	c	c	c

(C) 傳研F菌ヲ抗原トセル場合ノ各菌免疫血清トノ補體結合反應。

第 70 表

	補體量〔K=M. H. D.〕									
	K ₂	K ₃	K ₄	K ₅	K ₆	K ₈	K ₁₀	K ₁₂	K ₁₄	
竹内菌血清	d	ac	c	c	c	c	c	c	c	
福岡菌血清	d	vm	c	c	c	c	c	c	c	
傳研F菌血清	o	o	ftr	tr	tr	d	vm	c	c	
北研F菌血清	ftr	ftr	tr	m	ac	c	c	c	c	
綠膿菌血清	d	ac	jc	c	c	c	c	c	c	
大腸菌血清	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
正常家兔血清	c	c	c	c	c	c	c	c	c	

(D) 北研F菌ヲ抗原トセル場合、各菌免疫血清トノ補體結合反應。

第 71 表

		補體量(K=M. H. D.)									
		K ₂	K ₃	K ₄	K ₅	K ₆	K ₈	K ₁₀	K ₁₂	K ₁₄	
竹内菌血清	m	ac	c	c	c	c	c	c	c		
福岡菌血清	d	jc	c	c	c	c	c	c	c		
傳研F菌血清	ftr	d	m	jc	c	c	c	c	c		
北研F菌血清	o	o	ftr	ftr	tr	d	ac	c	c		
綠膿菌血清	vm	jc	c	c	c	c	c	c	c		
大腸菌血清	c	c	c	c	c	c	c	c	c		
正常家兔血清	c	c	c	c	c	c	c	c	c		

(E) 綠膿菌ヲ抗原トセル場合各免疫血清トノ補體結合反應。

第 72 表

		補體量[K=M. H. D.]									
		K ₂	K ₃	K ₄	K ₅	K ₆	K ₈	K ₁₀	K ₁₂	K ₁₄	
竹內菌血清	d	jc	c	c	c	c	c	c	c	c	
福岡菌血清	m	ac	c	c	c	c	c	c	c	c	
傳研F菌血清	ftr	m	jc	c	c	c	c	c	c	c	
北研F菌血清	m	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
菌綠膿血清	o	o	ftr	ftr	tr	d	vm	jc	c	c	
大腸菌血清	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
正常家兔血清	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	

第三項 實驗成績總括並ニ考案

上記セル如ク竹内菌ヲ抗原トセル補體結合反應ニ於テハ竹内菌血清ハ 10 單位迄、福岡菌血清モ 10 單位迄補體結合ヲ呈ス。

即チ竹内菌血清並ニ福岡菌血清ハ同程度ニ補體結合反應ヲ呈スルモ傳研F菌血清及ビ綠膿菌血清ハ 2 單位迄極メテ弱ク結合スルノミニシテ北研F菌、大腸菌血清並ニ正常家兔血清ハ全ク補體結合反應ヲ呈セズ。補體結合物質ナキモノト認ム。

福岡菌ヲ抗原トセルモノニ對シテ竹内菌血清ハ 12 單位迄、福岡菌血清ハ 10 單位迄補體結合反應ヲ呈スルモ、北研F菌血清ハ 3 單位迄、綠膿菌血清ハ 2 單位迄結合スルノミナリ。而シテ傳研F菌血清、大腸菌血清並ニ正常家兔血清ハ補體結合反應ヲ呈セズ。

傳研F菌ヲ抗原トセルモノニ對シテハ傳研F菌血清ハ 10 單位、北研F菌血清ハ 5 單位迄補體結合反應ヲ呈スルモ竹内菌血清ハ 2 單位迄、福岡菌血清ハ 3 單位、綠膿菌ハ 2 單位迄補體結合

反應ヲ呈スル＝過ギズ。

北研F菌ヲ抗原トセルモノニ對シテハ北研F菌血清ハ8單位迄、傳研F菌血清ハ4單位迄補體結合スルモ竹内菌、福岡菌及ビ綠膿菌ノ各々ノ免疫血清ハ2單位迄補體ヲ結合スルノミニシテ大腸菌及ビ正常家兎血清ハ全ク補體結合反應ヲ呈セズ。

最後ニ綠膿菌ヲ抗原トセルモノニ於テハ綠膿菌血清ハ10單位迄、傳研F菌血清ハ3單位迄、北研F菌、竹内菌及ビ福岡菌ノ各免疫血清ハ2單位補體結合反應ヲ呈スル＝過ギズ。

要之、竹内菌及ビ福岡菌ハ同程度ノ補體結合物質ヲ有ス。

換言スレバ竹内菌及ビ福岡菌ハ全ク同一菌種ナリト斷言シ得ベシ。

以上血清學的檢索ニ於テ凝集反應ニ於テハ顯著ナル差異ヲ呈スル事ナキモカステラニー氏吸收試驗及ビ補體結合反應試驗ノ結果傳研F菌、北研F菌及ビ綠膿菌ト劃然ト區別セラル、モノナリ。

第 八 章

全編ノ總括並ニ考案

余ハ臨牀上類「デ」性中耳炎患者2例ヨリ一新桿菌ヲ分離セリ。

2例ヨリ分離セル2桿菌ハ詳細ナル細菌學的性狀並ニ血清學的檢索ニ依リテ全ク同一菌種ナリキ。

類「デ」性中耳炎患者2例ニ「デ」特殊療法ヲ施行セルモ全ク效果ヲ見ズ。長キ經過ヲ取り治療ノ傾向ヲ認メザリキ。他ノ1例ニ於テハ「デ」特殊療法奏效シ其耳漏中ヨリハ定型的ナル眞性「デ」菌ヲ檢出セリ。

余ノ發見セル新桿菌ハ普通染色上其排列狀態

「デ」菌ニ類似シ形態のニハ螢光菌ニ近似ス。菌ハ長サ2—3 μ 、幅0.4 μ ニシテ眞直ナルモノ多キモ又輕度ニ彎曲セルモノアリ。グラム氏染色陰性ニシテ莢膜、芽胞ヲ有セズ。周邊性ニ多數ノ鞭毛ヲ有スル非抗酸菌ナリ。

本菌ハ普通寒天、「グリセリン」寒天、葡萄糖寒天、卵黃寒天、血液寒天、レフレル血清培地、「ゲラチン」培地、遠藤氏「フクシン」培地、牛乳培地、「ペプトン」水等ノ培地ニ發育極メテ可良ニシテ各培地ニ本菌特有ノ性狀ヲ發現ス。

本菌ハPn 6.6—8.8ノ間ニ於テハ最モヨク發育ス。

本菌ハ石炭酸、酒精ニ對シテハ抵抗力弱ケレドモ Tripaflavin ニ對シテハ比較的抵抗力強シ。56°Cノ溫槽中ニ於テハ10分ニシテ既ニ死滅ス。

竹内菌ノ12g内外ノ「マウス」ニ對スル最小致死量ハ $1/10$ 白金耳ニシテ福岡菌ハ $1/10$ 白金耳ナリ。而シテ兩菌共ニ250g内外ノ海狸ニ對シテハ殆ンド毒性ヲ認メザリキ。

新桿菌ハGlucose, Laevulose, Mannose, Saccharoseヲ分解シテ酸ヲ發生スルモLactose, Maltose, Stärke, Inulin, Dextrin, Raffinose, Glycerin, Erythrit, Arabinose, Mannit, Dulcitol, Milchzuckerヲ分解セズ。

本菌ヲ以テ家兎ヲ免疫セシニ特異凝集素(8000倍迄)、補體結合物質(補體10單位迄)ヲ產生セリ。

本菌ハ凝集反應試驗ニ依リテハ傳研F菌、北研F菌、綠膿菌ト顯著ナル差異ヲ示サザルモカステラニー氏吸收試驗、補體結合反應ニ依リテ劃然ト區別セラル。即チ余ノ實驗成績ヨリ以テス

レバ「デ」菌。大腸菌。綠膿菌。螢光菌（傳研F菌。北研F菌）ト明カニ區別セラレルベキモノニシテ余ノ考ヘテハ螢光菌族ノ一新菌型トスルヲ至當ナラントス。

次ニ余ハ余ノ新桿菌ト形態學上並ニ生物學的性狀近似セル諸菌トノ鑑別ヲ述ブレバ次ノ如シ。

（1）「デフテリー」菌トノ區別

形態並ニ排列稍々類似スレドモ新桿菌ハ「グラム」陰性ナルコト。Babes-Ernstノ極小體ヲ認メザルコト。周邊性ニ多數ノ鞭毛ヲ有シ。固有運動顯著ナルコト。普通寒天培地上ノ發育「デ」菌ニ比シ遙カニ可良ニシテ綠黃色ニ培地ヲモ着色セシムルコト。「ゲラチン」培地ニ於テ發育極メテ可良ニシテ圓筒狀液化ヲ示シ液化部ヲ綠黃色ナラシムルモ「デ」菌ハ「ゲラチン」培地ニハ發育不良ナルコト。馬鈴薯培地ニ於テモ新桿菌ハ發育極メテ可良ニシテ初メハ黃綠色。後「セピア」色ノ菌苔ヲ形成スルモ「デ」菌ハ發育不良ナルコト。牛乳培地ニ於テ初メハ凝固シ後液化スルモ「デ」菌ハ凝固セシメザルコト。新桿菌ハ「インドール」反應陽性ナルモ「デ」菌ハ陰性ナルコト。糖分解作用ニ於テGlucose, Laevulose, Mannose, Galactoseヲ分解スル點ハ兩菌近似スルモ「デ」菌ハ勿論菌株ニ依リテ多少ノ差異アレドモ多クハSaccharose, Maltose, Dextrin, Stärke, Inulinヲ分解スルモ余ノ新桿菌ハ是等ヲ分解セザルコト。凝集反應ニ於テモ劃然タル區別セララルコト。

（2）大腸菌トノ區別

大腸菌トハ形態酷似スルモ新桿菌ハ普通寒天培地。馬鈴薯培地。其他ノ培地ニ於テ黃綠色ノ色素ヲ形成スルモ大腸菌ハ色素形成ナキ事。「ゲラチン」培地ヲ液化スルモ大腸菌ハ液化作用ナ

キ事。尙ホ大腸菌ハ葡萄糖高層寒天穿刺培養並ニ「ゲラチン」穿刺培養ニ於テ顯著ナル瓦斯形成ヲナスモ新桿菌ハ形成セザルコト。糖分解作用ニ於テGlucose, Laevulose, Mannose, Galactoseヲ分解スル點相似ルモ大腸菌ハ其他Maltose, Arabinose, Mannitヲ分解スルモ余ノ新桿菌ハ之等ヲ分解セザルコト。

凝集反應ニ於テモ劃然ト區別セララルコト。

（3）綠膿菌トノ區別

新桿菌ハ周邊性ニ多數ノ鞭毛ヲ有スルモ綠膿菌ハ通常菌體ノ一端ニ1本ノ鞭毛ヲ有ス（竹内松次郎。青木）。然レ共Burckhardtハ3—4本ノ鞭毛ヲ有スル綠膿菌ヲ記載セリ。

糖分解作用ニ於テGlucose, Laevulose, Mannose, Galactoseヲ分解スルモ綠膿菌ハ之等ヲ分解セズ。凝集反應。カステラニー氏吸收試驗及ビ補體結合反應ニヨリテモ之等ト區別セラ

（4）螢光菌族トノ關係

（a）傳研F菌及ビ北研F菌トノ區別

糖分解作用ニ於テ新桿菌ハGlucose, Laevulose, Mannose, Galactoseヲ分解スルモ傳研F菌及ビ北研F菌ハGlucoseノミヲ分解スルニスギザルコト。

カステラニー氏吸收試驗。補體結合反應ニヨリテ確然ト區別シ得ラル。

（b）Jacobsthalノ記載セル螢光菌トハ形態並ニ培養上ノ性狀及ビGlucose, Laevulose, Mannose, Galactoseヲ分解スル點ハ余ノ新桿菌ト相似ルモMaltose, Saccharoseヲ分解スルコトニヨリテ區別セララル。

（c）F. Fischerノ記載セル螢光菌ハ唯Glucoseノミヲ分解シ酸ヲ形成スルニスギズ。

(d) *Bacillus putidum* (*Bacillus fluorescens nonliquefaciens*)

形態的並ニ培養狀ノ性狀相似ルモ *Bacillus putidum* ハ「ゲラチン」培地ヲ液化セザル點ニ於テ劃然ト區別セラル。

第九章

結 論

本類「デフテリー」性中耳炎ヨリ分離セル新桿菌ハ生物學的及ビ血清學的諸性狀螢光菌 (*Pseudomonas fluorescenz*) ニ最モ近似ナルヲ以テ Genus *Pseudomonas* ニ屬スベキ一新菌種ト推定ス。

摺筆＝臨ミ御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ賜ハリシ恩師山川教授並ニ始終御鞭撻下サレシ細菌學教室谷口教授並ニ講師陸博士ニ滿腔ヨリ深謝ノ意ヲ表ス。
併セテ本研究ニ種々便宜ヲ圖ラレシ阪大微生物研究所員ニ感謝ス。

文 献 並 ニ 附 圖

文 献

1) **Wreden:** Anhang zur Otitis media neonatorum. Petersburg. 1868. Monatschrift für Ohrenheilkunde. 1868, N. 10. 2) **Wendel:** Sektionbefunde des Mittelohres bei Diphtheritis und Croup der benachbarten Schleimhaut. Archiv der Heilkunde. 11 u. 13. 1870 u. 1873. 3) **Moss:** Plötzlicher Bluterguss in die rechte Trommelfelhöhle in Verlauf von Angina Diphtherica. Archiv für Augen-, Ohrenheilkunde. 1, 2, 1864. 4) **Moss und Steinbügge:** Histologische Befunde an 6 Schläfenbein dreier an Diphtherie verstorbener Kinder. Zeitschr. f. Ohrenheilk. XII. 4. 5) **Moss:** Histologische und bakterielle Untersuchung über Mittelohrentzündungen bei den verschiedenen Formen der Diphtherie. Zeitschr. f. Ohrenheilk. XX, 3 u. 4. 6) **Moss:** Weitere Untersuchungen über Labyrinthbefunde. Zeitschr. f. Ohrenheilk. XXXI. 7) **Küpfer:** Croupöse Entzündung der Schleimhaut der Paukenhöhle und Ohrtrompete. Archiv für Ohrenheilk. XI. 1876. 8) **Heydloff:** Über Ohrkrankheiten als Folge und Ursache von allgemeinkrankheiten. Inaugural-Dissertation. Hall. 1876. 9) **Gottstein:** Beiträge zu den in Ver-

laufe der acuten Exantheme auftretenden Ohrenkrankheiten. Archiv für Ohrenheilkunde. XVII. P. 16. 10) **Burckhardt-Merian:** Über den Scharlach in seinen Beziehungen zum Gehörgang. Sammlung klinischer Vorträge von B. Volkmann. N. 182. 11) **Wolf:** Zeitschr. f. Ohrenheilk. XV. u. XVIII. 1880. 12) **Blan:** Die diphtherischen Erkrankungen des Gehörorgans bei Scarlatina. Berliner klinische Wochenschrift. 1881. Nr. 49. 13) **Marian:** Bericht über die 1880-1883 behandelten Ohrerkrankungen. Archiv für Ohrenheilkunde. XXI. 14) **Bezold:** Gesamtbericht über die 1881-1883 behandelten Ohrerkrankungen. Archiv für Ohrenheilkunde. XXI. 15) **Hirsch:** Diphtherische Entzündung der Paukenschleimhaut. Zeitschrift für Ohrenheilkunde. XIX. 1889, S. 101-110. 16) **Löring:** American Journal of Otologie. Bd. III. 2. 17) **Siebenmann:** Beiträge zur Frage zur Beteiligung von Mikroorganismen bei der Otitis media diphtherica. Zeitschrift für Ohrenheilk. XXI. 68, 1891. 18) **Kirchner:** Beiträge zur Pathologie der Paukenhöhle. Zentralbl. f. allg. Pathologie. u. path. Anat. 1, 1890. 19) **Schwarze:** Handbuch der Ohrenheilkunde.

20) **Harke**: Beiträge zur pathologie und Therapie der oberen Atmungswege einschliesslich des Gehörs. Wiesbaden. 1895. 21) **Rudolf** und **Rezold**: 18 Sektionsberichte über das Gehörorgan bei Masern. Zeitschr. f. Ohrenheilk. 1896. 22) **Rezold**: Über die Erkrankungen des Gehörorgans bei Heotyphus. Archiv f. Ohrenheilkunde. Bd. 21. 23) **Leutert**: Bakteriologisch-klinische Studien über Komplikation. u. s. w. Archiv f. Ohrenheilk. Bd. 46/47. 47) **Lewin, L.**: Über das klinische und patholog.-anatom. Verhalten des Gehörorgans bei genuinen Diphtherie. Archiv f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfhheilk. 52.- Lommel, Zeitschrift f. Ohrenheilk. u. f. krankh. d. Luftwege. 29, 1866. 25) **Krepasea**: Ein Fall von primäre Diphtherie der Paukenhöhle. Sitzungsber. d. Ges. d. ungar. Ohrärzte. 1897. N. 1. (Ref. Archiv f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfhheilk. 50, 1900. 26) **Kobrak (1)**: Über Mittelohrdiphtherie ohne Membranbildung. Archiv f. Ohrenheilkunde. Bd. 62, 1904. 27) **Kobrak (2)**: Das Vorkommen primäre Diphtherie im Mittelohr. Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohres, d. Nase u. d. Hals. Bd. 2, S. 319, 1903. 28) **Dasse, H.**: Über primäre Ohrdiphtherie. Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. Krankh. d. Luftwege. 52, 3. (Ref. Monatschr. f. Ohrenheilk. u. Laryng-Rhinolog. 1907, S. 468.) 29) Über die Beziehungen des sog. Masercroups und der im Gefolge von Diphtherie auftretenden Erkrankungen des Mittelohrs zum Klebs-Löfflerschen Diphtheriebacillus. Dtsch. Archiv f. klin. Med. 56, 1896. (Ref. bei Schilling, Über den Pseudodiphtheriebacillus bei akuter Mittelohrentzündung. Monatschr. f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. 36, 1902. 30) **Hamilton, Alice**: Pseudodiphtheriebacillen als Ursache der Mittelohrentzündung. Jour. of infect. dis. Vol. 4. No. 3, 1903. 31) **Carli, de**: Ein Fall von Diphtherie des Ohres. (Ref. Internation. Zentralbl. f. Ohrenheilk. 6, 531, 1903.) 32) **Benesi, Oskar**: Ein Beitrag zur Diphtherie des

Mittelohres. Wien. Klin. Wochenschrift. 1912, Nr. 37. 33) **Szmulo**: Beiträge zur Frage der unter der Form einer gewöhnlichen Eiterung verlaufenden Diphtheritis des Mittelohres. Monatschr. f. Ohrenheilk. u. Laryng.-Rhinolog. 1913. 34) **Szmurlo**: Über durch Diphtheriebacillen hervorgerufene Mittelohreiterung. Monatschr. f. Ohrenheilk. u. Laryng.-Rhinol. 1915. 35) **Körner (Muskau)**: Die bakteriologische Nachuntersuchung bei Diphtherie und die Behandlung der Bacillenträger. Dtsch. Med. Wochenschr. 1917, N. 32. (Ref. Internation. Zentralbl. f. Ohrenheilk. 1917, S. 18). 36) **Mänchemeyer** und **Nast**: Beitrag zur Einkeimung der Diphtheriebacillenträger. Med. Klinik. 47, 1918. 37) **Pfeiffer**: Klin. Studien an Diphtheriebacillenträgern. Archiv f. Laryngolog. u. Rhinol. 31, H. 1. 38) **Donges** und **Ellfeldt**: Beiträge zum Befunde von Diphtheriebacillen in Wunden. Dtsch. med. Wochenschr. 1919, N. 20. 39) **Davidson u. Hecke**: Über das Vorkommen von Diphtheriebacillen in Ohrsekret. Berlin. Klin. Wochenschr. 1921. 40) **Stein, W.**: Zur Kenntnis der primären Mittelohrdiphtherie. Zeitschr. f. Ohrenheilk. 56. 41) **Gugenheim**: Über Diphtherie des Mittelohres. Zeitschr. f. Hals-, Nase- u. Ohrenheilk. Bd. 1, 1922. 42) **Gerlach**: Otitis externa ulcero-membranacea. Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. Krankheit. d. Luftwege. Bd. 64, S. 309. 43) **Meyer, M.**: Im Denker u. Kahler Handbuch der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Bd. 7, S. 296-309, 1926. 44) **Hermann Streit-Königberg**: Im Denker u. Kahler Handbuch der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Bd. I, S. 906-925. 45) **Lotar Hofman**: Die Keimflora fötiden acuter und chronischer Otitiden. Zeitschrift f. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk. Bd. 24, 1929. 46) **Zesse**: Zur Bakteriologie der chronischen Mittelohreiterung. Zeitschr. f. Hals-, Nasen-Ohrenheilk. Bd. 29, 1913. 47) **Streit (1)**: Beiträge zur Bakteriologie der oberen Luftwege. Archiv f. Laryng. u. Rhinol. Bd. 27. 48) **St-**

reit(2): Weitere Beiträge zur Histologie und Pathologie der Meningitis und Sinusthrombose. Archiv f. Ohrenheilk. Bd. 89, S. 177. 49) **Scheibe, A.**: Die Lebensgefährlichkeit der versch. Formen der Mitteleiterung. Zeitschr. f. Ohrenheilk. u. f. Krankh. d. Luftwege. 75. 50) **Schmidt-Hackenberg**: Primäre Nasendiphtherie bei Kindern. Pass. Beitr. 8, H. 1-3. 51) **Berghaus**: Die Verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Bacillus alcaligenes und den Typhusbacillus. Hygienische Rundschau. 15. Jahrgang. 1905, S. 761-764. 52) **Philipp Eisenberg**: Über die Anpassung der Bakterien an die Abwehrkräfte des infizierten Organismus. Zentralbl. f. Bakteriolog. Original 34, Bd. 1903, S. 739. 53) **W.N. Klimentko, St. Petersburg**: Die Gruppe des Bact. Faecalis alcaligenes. Zentralbl. f. Bakteriologie. Bd. 43 S. 1907, S. 755. 54) **Ernst Pribram und Cand. med. Ewin Palay**: Beiträge zur Systematik der Mikroorganismen. Zentralbl. f. Bakteriolog. etc. 1. Abt. Originale Bd. 76, Heft. 5. 55) **Richard Trommsdorff**: Zur Kenntnis des Bakterium Pyocyaneus. Zentralbl. f. Bakteriologie. Bd. 78, s. 493-502. 56) **J. L. Burekhardt**: Die Begeisung als differential-diagnostisches Merkmal in der Fluorescens-Gruppe. Zentralbl. f. Bakt. etc. 1 Abt. Originale Bd. 79, Heft. 6, S. 321. 57) **Otto, Goetze**: Biologische Abteilung des ärztlichen Vereins in Hanburg. Münchener medizinische Wochenschrift. 59 Jahrg. II. 1912, s. 1247-1248. 58) **Carl, Klienberger**: Pyocyaneus-infection der Harnwege mit hoher Agglutininbildung für Pyocyaneusbacillen und Mitagglutination von Typhusbakterien. Münchener medizinische Wochenschrift. 54 Jahrg. 11, 1907, S.

1330-1333. 59) **Lode, A.**: Bacillus Pyocyaneus. Im W. Kolle, u. Kraus u. P. Uhlenhuth Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Bd. VI. S. 149-183. 60) **Bergey's Manual of Determinative Bacteriology**. Fourth Edition. 1934. 61) **古村良久**: 一種ノ表在性周邊角膜炎ノ原因ト認ム可キ一新桿菌ニ就テ. 阪醫會誌. 第30卷, 第3號別刷(昭和6年3月). 62) **秋田五郎**: 尿路ニ於ケル細菌ノ研究. 日微生物誌. 第27卷, 第1號, 第2號, 昭和8年1月, 2月. 63) **小川藏木**: 大腸菌ノ遠藤氏培地上ニ於ケル赤變性ニ就テ. 愛知醫大誌. 64) **高橋三千彦**: 「ゲフテリー」菌ノ凝集反應ニ就テ. 實驗醫誌. 第11卷, s. 93, 昭和2年. 65) **渡口精三次**: 「マラチフス」A型免疫血清及ビ赤痢異型第3菌免疫血清ニ凝集スル一種ノ細菌ニ就テ. 細菌誌. 大正6年. 66) **中橋幸吉**: 赤痢各型菌ノ生物化學上ノ性質及ビ免疫反應ニ就テノ比較試驗 附. 菌型分類ニ就テ. 細菌誌. 大正8年, 109-140頁. 67) **安東洪次**: 培養基ノ性(水素イオン濃度測定法ノ應用)細菌誌. 大正12年, 437頁. 68) **古川強二**: 本邦ニ於ケル「ゲフテリー」菌型ニ關スル研究. 東京市駒込病院第19回報告. 69) **小泉透**: 「ゲフテリー」菌屬ノ生物學的研究. 京府醫大誌. 第3卷, 第2號. 70) **小山景治**: 「ゲフテリー」菌ノ毒素產生ト水素「イオン」濃度トノ關係ニ就テ. 阪醫會誌. 第26卷, 第12號, 昭和3年2月. 71) **石橋卯吉**: 「ゲフテリー」菌ノ生物學的研究. 日微生物病理誌. 第10號. 72) **梶浦毅四郎**: 「ムーズ」中耳炎患者ヨリ分離シタル粘液性連鎖狀球菌ノ研究. 福岡醫大誌. 第26卷, 第3號. 73) **信太格二郎**: 大腸菌ノ研究補遺. 京府醫大誌. 第3卷, 第1號, 昭和4年1月. 74) **手塚悦郎**: 大腸菌族ノ鑑別培養法ニ就テ. 實驗醫誌. 第18卷, 第4號. 75) **安田誠之輔**: 大阪市ニ於ケル赤痢及ビ赤痢樣疾患ニ就テ. 日傳染會誌. 第6卷, 第2, 第3號, 昭和6年11.12月.

小 西 論 文 附 圖

類「ダフテリー」性中耳炎耳漏ヨリ分離セル新桿菌ニ就テ

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

小 西 論 文 附 圖

類「ダフテリー」性中耳炎耳漏ヨリ分離セル新桿菌ニ就テ

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

附 圖 說 明

(總テ レフレル「メチレン」青染色標本)

第1圖 耳漏中ノ新桿菌(竹内菌1:1000)

第2圖 普通寒天培地ヨリノ新桿菌(竹内菌1:1000)

第3圖 耳漏中ノ新桿菌(福岡菌1:1000)

第4圖 普通寒天培地ヨリノ新桿菌(福岡菌1:1000)

第5圖 レフレル血清培地ヨリノ村田菌(1:1000)

第6圖 大腸菌(阪大微生物研究所貯藏)(1:1000)

第7圖 螢光菌(傳染病研究所貯藏)(1:1000)

第8圖 螢光菌(北里研究所貯藏)(1:1000)

第9圖 綠膿菌(阪大微生物研究所貯藏)(1:1000)

第10圖 新桿菌(竹内菌)ノ「ゲラチン」培地 18°C 10
日間ノ性狀。圓筒狀液化並ニ液化部黃綠色ニ着
色セルヲ示ス。

第11圖 新桿菌(福岡菌)ノ「ゲラチン」培地 18°C 10
日間ノ性狀。圓筒狀液化並ニ液化部黃綠色ニ着
色ヲ呈ス。

(原稿到着=昭和11. 8. 10)

— 急 載 —