本邦高齢者ノ耳鼻咽喉科領域ニ於ケル 臨牀所見ノ統計的觀察 (其二) 聽器ノ官能檢查成績

Dr. Haruzo Okano: Klinisch-statistische Untersuchungen der japanischen
Greise in dem oto-rhino-laryngologischen Gebiete.
II Abteilung: Ergebnisse der Funktionsprüfungen der Ohren.

東京帝國大學醫學部耳鼻咽喉科教室 (主任 増田教授)

岡 野 治 三
オカ ノ ヘル ヲウ

第 五 章

全身狀態ト耳官能トノ關聯

既ニ第2章ノ初メニ記セル如ク、本檢查ニ當リテハ被檢者ハ能フ限り健康ナルモノヲ選ブコトニ心懸ケ、特ニ檢查時ニハ著明ナル全身並ニ局所病變ノナキモノヲ選ビタルモノナルガ、然モ内科的ニ診テ高度ナル動脈硬化症、腦動脈硬化症、高血壓、輕度ナル半身不隨症、パルキンソン氏病、老人性癡呆、萎縮腎、心臟瓣膜症、脊髓癆、貧血、榮養不良等ノ診斷ヲ下サレタル全身狀態ノ可良ナラザルモノモ相當ニ混在セシヲ以テ、茲ニ全身狀態ト耳官能トノ關聯ニツキテ考察セントス。

第一節 全身狀態ト聽能

(第44表参照)

聽力檢查ヲ行ヒタルモノハ男女共ニ111名宛合計222名ニシテ、此中全身狀態可良ナルモノ男女共ニ74名宛合計148名、可良ナラザルモノ男女共ニ37名宛合計74名ニシテ即チ可良ナルモノト可良ナラザルモノトノ比ハ2:1ノ割合ナリ、而シテ囁語聽距60歳代ニテ6m以上、70歳代ニテ5m以上、80歳以上ニテ4m以上ナルモノヲ聽力可良ナルモノトシ、夫レ以下ノモノヲ聽力不良ナルモノトシテミルニ、60歳代男子ニ於テハ全身狀態可良ナルモノ(以

下健者ト略ス)18名(36耳)中聽力可良ナルモノ34例(94.4%)、不良ナルモノ2例(5.6%)ニシテ可良ナルモノ絶對多數ヲ占ム。全身狀態可良ナラザルモノ(以下弱者ト略ス)ハ15名ニシテ中聽力可良ナルモノ20例(74.1%)、不良ナルモノ7例(25.9%)(但シ實數10例ナルモ鼓膜ニ病變アルモノ3例アリシヲ以テ之ヲ除外スルコト、セリ、以下同様ニス。)ニシテ、弱者ニ於テハ聽力不良ナルモノ健者ニ比シテ遙ニ多數ナリ。女子ニ於テハ健者19名中聽力可良ナルモノ23例(71.9%)、不良ナルモノ9例(28.1%)、弱者12名中聽力不良ナルモノ15例(71.4%)、不良ナルモノ6例(28.6%)ニシテ即チ女子ニ於テハ健者ト弱者トノ間ニ聽力ノ可否ニ關シ殆ンド差異ヲ認メラレザル有様ナリ。男女ヲ通ジテミルニ、健者37名中聽力可良ナルモノ57例(83.8%)、不良ナルモノ11例(16.2%)、弱者27名中聽力可良ナルモノ35例(72.9%)、不良ナルモノ13例(27.1%)ニシテ、60歳代ニ於テハ聽力不良ナルモノハ弱者ノ方ニ多キヲ認ム。70歳代ニ於テハ男子健者32名中聽力可良ナルモノ15例(26.8%)、不良ナルモノ41例(73.2%)ニシテ不良ナルモノハ可良ナルモノ、凡ソ3倍ヲ占ム。又弱者20名中聽力可良ナルモノ

16例(41.0%)。不良ナルモノ 23例(59.0%)ニシテ不良ナルモノハ可良ナルモノノ凡ソ 1.5倍ニ相當セリ。而シテ聴力不良ナルモノハ弱者ヨリ却ツテ健者ニ多キヲ示シタルハ興味アルコトナルベシ。女子ニ於テハ健者 32名中聴力可良ナルモノ 25例(47.2%)。不良ナルモノ 28例(52.8%)ニシテ是亦不良ナルモノノ幾分多ク。弱者 19名中聴力可良ナルモノ 11例(34.4%)。不良ナルモノ 21例(65.6%)ニテ後者ハ前者ノ凡ソ 2倍ニ相當セリ。男女ヲ合シテミルニ。健者 64名中聴力可良ナルモノ 40例(36.7%)。不良ナルモノ 69例(63.3%)。弱者 39名中聴力可良ナルモノ 27例(38.0%)。不良ナルモノ 44例(62.0%)ニシテ。即チ 70歳代ニ於テハ聴力ハ健。弱者間ニ殆ンド差異ヲ認メザル有様ニテ。然モ聴力不良ナルモノノ方遙ニ多シ。

60歳以上ニ於テハ。男子健者 24名中聴力可良ナルモノ 11例(22.9%)。不良ナルモノ 37例(77.1%)。弱者 2名中聴力可良ナルモノハ 1例モナク。不良ナルモノ 4例(100.0%)ナリ。女子ハ健者 23名中聴力可良ナルモノ 8例(21.1%)。不良ナルモノ 30例(78.9%)。弱者 6名中聴力可良ナルモノ 3例(25.0%)。不良ナルモノ 9例(75.0%)。男女ヲ通ジテミルニ。健者 47名中聴力可良ナルモノ 19例(22.1%)。不良ナルモノ 67例(77.9%)。弱者 8名中聴力可良ナルモノ 3例(18.8%)。不良ナルモノ 18例(81.2%)ニシテ即チ本年代ニ於テモ聴力ノ良否ハ全身状態ノ良否ナルモノノ間ニ於テ殆ンド差異ヲ認メザル有様ニシテ。然モ聴力不良ナルモノハ健。弱者共ニ不良ナルモノノ凡ソ 4倍ヲ占ム。全被檢者ニツイテミルニ。男子健者 74名中聴力可良ナルモノハ 60例(42.9%)。不良ナルモノ

ノ 80例(57.1%)。弱者 37名中聴力可良ナルモノ 36例(51.4%)。不良ナルモノ 34例(48.6%)ニシテ。聴力不良ナルモノハ弱者ニ比シ寧ロ健者ニ多キヲ認ム。又女子健者 74名中聴力可良ナルモノハ 56例(45.5%)。不良ナルモノ 67例(54.5%)。弱者 37名中聴力可良ナルモノ 29例(44.6%)。不良ナルモノ 36例(55.4%)ニテ。女子ニ於テハ聴力ノ良否ハ健。弱者間ニ殆ンド差異ハ認メラレザル有様ナリ。男女ヲ通ジテミルニ。健者 148名中聴力可良ナルモノハ 116例(44.1%)。不良ナルモノハ 147例(55.9%)ニシテ後者ノ方多ク。弱者 74名中聴力可良ナルモノ 65例(48.1%)。不良ナルモノ 70例(51.9%)ニシテ是亦後者ノ方少シク多ケレドモ其差少シ。而シテ健者ト弱者トニツキ聴力ノ良否ヲミルニ從來稱ヘラレタル如キ弱者ニ於テハ健者ニ比シ聴力ノ可良ナルモノノ少キ状態ハ認メラレズ。健弱者共ニ殆ンド同様ナル率ヲ示シ。弱者ノ方ニ却ツテ聴力可良ナルモノノ幾分多キヲ認メタルハ注目ス可キコトナルベシ。

即チ高齢者ニ於ケル聴力ハ。本検査ニ當リテハ 60歳代男子ニ於テハ弱者ノ方ニ聴力可良ナルモノノ少キヲ認メタルモ。60歳代女子並 70歳以上ノモノニ於テハ全身状態ノ可良ナラザルモノノ方ニ却ツテ聴力可良ナルモノノ多キガ如キ成績ヲ示シタルヲ以テ。全身状態ト聴力トノ間ニハ從來稱ヘラレタル如キ通則ハ認メラレザルモノナリト云フコトヲ得ベシ。但シ宮田氏ノ報告セラレタル健康状態不良ナラザル 50歳以上ノ高齢者ニ於テ聴力可良ナルモノ 43%ヲ認メタリトノ成績ハ。余ノ健者ニ於ケル成績ト殆ンド一致セルモノナルコトヲ附記ス。

第二節 全身狀態ト前庭器機能

(第44表参照)

前庭器機能検査ヲ行ヒタルモノハ男子93名、女子84名、合計177名ニシテ、此中全身狀態可良ナルモノハ男子65名、女子54名、合計119名。可良ナラザルモノハ男子28名、女子30名、合計58名ナリ。而シテ廻轉並ニ溫熱刺激試驗ニ際シ眼球震盪ノ著明ニ發現セルモノヲ前庭器機能可良ナルモノトシ、單ニ「發現」及「發現? Andeutung」、陰性ナルモノ等ヲ不良ナルモノトシテミルニ、

60歳代ニ於テハ男子健者17名中機能尙ホ可良ナルモノハ20例(58.8%)、不良ナルモノ14例(41.2%)、又弱者13名中機能可良ナルモノ14例(53.8%)、不良ナルモノ12例(46.2%)ニシテ、即チ弱者ニ於テハ可良ナルモノ健者ニ比シ多少少キモ些シタル差異ヲ認メズ、聽力ノ場合ニ比シ大ニ其趣ヲ異ニセリ。女子ニ於テハ健者16名中可良ナルモノ28例(87.5%)、不良ナルモノ4例(12.5%)、又弱者12名中可良ナルモノハ18例(75.0%)、不良ナルモノ6例(25.0%)ニシテ是亦可良ナルモノ弱者ノ方ニ少ク、而シテ女子ノ場合ハ聽力ニ於ケルト略々等シキ成績ヲ示シタリ。男女ヲ通ジテミルニ、健者33名中可良ナルモノハ48例(72.7%)、不良ナルモノ18例(27.3%)ニシテ前者ハ後者ノ凡ソ3倍ヲ占ム。又弱者25名中可良ナルモノハ32例(64.0%)、不良ナルモノ18例(36.0%)ニシテ、此際ハ前者ハ後者ノ漸ク2倍弱ニ當ルノミ。即チ弱者ニ於テハ可良ナルモノハ健者ニ比シテ多少少キヲ認ムル有様ナルモ著明ナル差異ハ發見セラレズ。

70歳代ニ於テハ男子健者30名中可良ナルモノ

ハ38例(63.3%)、不良ナルモノ22例(36.7%)、又弱者13名中可良ナルモノハ14例(53.8%)、不良ナルモノ12例(46.2%)ナルヲ以テ、弱者ニ於テハ可良ナルモノ健者ニ比シ尙ホ多少少ナキヲミル。女子ニ於テハ健者22名中可良ナルモノ19例(43.2%)、不良ナルモノ25例(56.8%)、弱者13名中可良ナルモノ11例(42.3%)、不良ナルモノ15例(57.7%)ニシテ、此際ハ健弱者間ニ殆ンド差異ナク、然モ不良ナルモノ幾分多シ。男女ヲ通ジテミルニ健者52名中可良ナルモノ57例(54.8%)、不良ナルモノ47例(45.2%)、弱者26名中可良ナルモノ25例(48.1%)、不良ナルモノ27例(51.9%)ニシテ、即チ健者ニ於テハ可良ナルモノ弱者ニ比シ幾分多キヲ示スモ著明ナル差異ナク、又可良、不良ノ間ニモ殆ンド差異ヲ認メザル程度ナリ。

80歳以上ニ於テハ男子健者18名中可良ナルモノ19例(52.8%)、不良ナルモノ17例(47.2%)、又弱者2名中可良ナルモノハナク不良ナルモノ4例(100.0%)ナリ。女子ニテハ健者16名中可良ナルモノ21例(65.6%)、不良ナルモノ11例(34.4%)、弱者5名中可良ナルモノ7例(70.0%)、不良ナルモノ3例(30.0%)ナリ。男女ヲ通ジテミルニ健者34名中可良ナルモノ40例(58.8%)、不良ナルモノ28例(41.2%)、弱者7名中可良ナルモノ7例(50.0%)、不良ナルモノ亦7例(50.0%)ニテ相半バス。即チ80歳以上ニ於テモ可良ナルモノハ健者ノ方多少多キモ著明ナル差異ハ認メ難シ。

全被檢者ニツイテミルニ、男子健者65名中可良ナルモノハ77例(59.2%)、不良ナルモノ53例(40.8%)、弱者28名ニ於テハ可良ナルモノト不良ナルモノトハ相等シク即チ28例(50.0%)

ヅハヲ示シタリ。女子ニ於テハ健者總數 54 名中可良ナルモノ 68 例(63.0%)。不良ナルモノ 40 例(37.0%)。弱者 30 名中可良ナルモノ 36 例(60.0%)。不良ナルモノ 24 例(40.0%) ナリ。男女ヲ通ジテミルニ。健者總數 119 名中可良ナルモノ 145 例(60.9%)。不良ナルモノ 93 例(39.1%)ニシテ可良ナルモノハ不良ナルモノノ凡ソ 1 倍半ニ相當セリ。又弱者總數 58 名中可良ナルモノハ 64 例(55.2%)。不良ナルモノ 52 例(44.8%)ニテ可良ナルモノハ不良ナルモノヨリ凡ソ 10%多ク。健弱者ヲ比較スルニ可良ナルモノハ健者ニ於テ凡ソ 5%方多クレドモ著明ナル差異ヲ認ムルコト能ハズ。

即チ高齢者ニ於ケル前庭器機能ハ。全身狀態ノ良否ニヨリテ著明ナル影響ヲ受クルコト少ナキガ如ク。健者ト弱者トニ於ケル機能可良者ノ率ハ前者僅ニ凡ソ 5%方多キニ過ギズ。更ニ前庭器機能ニ於テハ健弱者共ニ尙ホ可良ナルモノハ不良ナルモノニ比シ凡ソ 10—20%方多クシテ。コハ聽力ニ於テ健弱者共ニ不良ナルモノノ、方可良ナルモノヨリ凡ソ 4—12%方多キト殆ンド逆ノ關係ニアルコトモ興味アルコトナリ。

第三節 血壓ト耳官能

高齢者ノ血壓ニ關スル統計ハ其數少ナカラズ。日小田氏ハ 60 歳以上ノ最大血壓ハ 130—220mm。平均 172 ナリトシ。今堀氏ハ老人ノ 1/2。ハ最高血壓 110—200 内ニアリテ全體ノ平均ハ 153 ナリト報告シ。尼子。中澤兩氏ノ浴風園ニ於ケル 669 名(男子 371 名。女子 298 名)ニ就キテノ報告ニヨレバ。最大血壓ハ之ヲ低血壓 100 mm 以下。正常血壓 100—139。輕度高血壓 140—169。中等度高血壓 170—199。高度高血壓 200 以上トスレバ表示セルモノノ如ク。尙ホ平均最大血壓

ハ大多數ニ於テ 160—180mm ノ間ニアリ。

年代。計 血壓別	60歳代	70歳代	80歳代	全被檢者
低 血 壓	1.1%	0.9%	1.4%	1.0%
正 常 血 壓	21.0	18.6	18.3	19.5
輕 度 高 血 壓	29.8	27.2	30.9	28.7
中 等 度 高 血 壓	26.5	30.8	21.1	28.1
高 度 高 血 壓	21.3	22.3	28.1	22.5

余モ亦本検査ニ當リ各人ニツキテ最高。最低血壓ノ測定ヲ行ヒシガ。余ハ便宜上最高血壓ヲ低血壓 100mm 以下。正常血壓 100—139。輕度並ニ中等度高血壓 140—179。高度高血壓 180 以上トナシテミタルニ。低血壓ノモノハ 60 歳代女子ニ於テ唯 1 例(0.5%)ヲ認メタルノミニシテ。正常血壓ノモノ 45 名(20.3%)。輕度並ニ中等度高血壓ノモノ 103 名(45.9%)。高度高血壓ノモノ 74 名(33.3%)ヲ認メタリ。依ツテ是等ノ各各ニツキ検査成績ヲ觀察シ。血壓ト耳官能トノ關聯ヲ見ントスルモノナリ。

而シテ聽能ニ於テハ主トシテ呼語聽距ヲ標準トシ。60 歳代ニ於テハ聽距 6 m 以上ノモノヲ優。6—4m ノモノヲ良。4—2m ノモノヲ可。2 m 以下ノモノヲ不可トシ。70 歳代ニ於テハ 5 m 以上優。5—3m 良。3—1m 可。1 m 以下不可トシ。80 歳以上ニ於テハ 4 m 以上優。4—2m 良。2—0.5m 可。50cm 以下不良トナシ。又前庭器機能ニ於テ廻轉並ニ溫熱刺激ニヨリ眼震ノ發現狀態ヲ以テシ。即チ「著明發現」ノモノヲ優。「發現」ノモノヲ良。「發現? Andeutung」ノモノヲ可。陰性ノモノヲ不可トシテ觀察スルコトセリ。

第一項 低並ニ正常血壓者ト耳官能

(第 45 表参照)

低血壓者ハ唯1例62歳ノ女子(検査番號35)ノミニシテ、聽力ハ右側可、左側良。前庭器機能ハ兩側共ニ優ナルヲ認メ、尙ホ冷刺激ニ際シ兩側共ニ眩暈或ハ惡心ノ隨伴現象ヲ訴ヘタリ。

正常血壓ノモノ、聽能ハ、

60歳代ニ於テハ男子13名中優17例(70.8%)、良3例(12.5%)、可ハナク、不可4例(16.7%)。女子7名ノ中優10例(71.4%)、良2例(14.3%)、可ハナク、不可2例(14.3%)。男女ヲ通ジ20名中優27例(71.1%)、良5例(13.2%)、可ハナク、不可6例(15.8%)ナリ。

70歳代ニ於テハ男子10名ノ中優ハ僅ニ4例(20.0%)、良3例(15.0%)、可1例(5.0%)、不可12例(60.0%)。女子ハ9名中優7例(38.9%)、良7例(38.9%)、可1例(5.6%)、不可3例(16.7%)。男女ヲ通ジ19名中優11例(28.9%)、良10例(26.3%)、可2例(5.3%)、不可15例(39.5%)ナリ。

80歳以上ニ於テハ男子3名中優良ハ1例モナク、可1例(16.7%)、不可5例(83.3%)。女子亦3名中優良可ハ1例モナク不可ノミ6例(100.0%)ナリ。男女ヲ通ジ6名中可1例(8.3%)、不可11例(91.7%)ヲ認ム。

全被檢者ニツイテミルニ、男子26名中優21例(42.0%)、良6例(12.0%)、可2例(4.0%)、不可21例(42.0%)。女子19名中優17例(44.7%)、良9例(23.8%)、可1例(2.6%)、不可11例(28.9%)。男女ヲ通ジ被檢者45名ノ中優38例(43.2%)、良15例(17.0%)、可3例(3.4%)、不可32例(36.4%)ナリ。

次ニ正常血壓ノモノ、前庭器機能ヲミルニ、

60歳代ニ於テハ男子11名中優14例(63.6%)、良3例(13.6%)、可4例(18.2%)、不可1例(4.5

%)。女子ハ6名中優9例(75.0%)、良2例(16.7%)、可1例(8.3%)、不可ハナク。男女ヲ通ジ17名中優23例(67.6%)、良5例(14.7%)、可亦5例(14.7%)、不可1例(2.9%)ニシテ、隨伴現象アリシハ男子4例(18.2%)、女子7例(58.3%)、合計11例(32.4%)ナリ。

70歳代ニ於テハ男子9名ノ中優9例(50.0%)、良4例(22.2%)、可1例(5.6%)、不可4例(22.2%)。女子ハ6名中優7例(58.3%)、良3例(25.0%)、可ハナク、不可2例(16.7%)。男女ヲ通ジ15名ノ中優16例(53.3%)、良7例(23.3%)、可1例(3.3%)、不可6例(20.0%)。尙ホ隨伴現象ハ男子ニハナク女子ニ6例(50.0%)、合計6例(20.0%)ナリ。

80歳以上ニ於テハ男子3名中優、可各々1例(16.7%)宛、良、不可各々2例(33.3%)宛ヲ見、女子2名中優ハナク、良2例(50.0%)、可、不可各々1例(25.0%)宛ニシテ、男女ヲ通ジ5名ノ中優1例(10.0%)、良4例(40.0%)、可2例(20.0%)、不可3例(30.0%)ナリ。而シテ隨伴現象ハ男子ニ唯1例(16.7%)ヲミタルノミ。

全被檢者ニツイテミルニ、男子23名中優24例(52.2%)、良9例(19.6%)、可6例(13.0%)、不可7例(15.2%)。女子14名中優16例(57.1%)、良7例(25.0%)、可2例(7.1%)、不可3例(10.7%)。男女ヲ通ジ37名ノ中優40例(54.1%)、良16例(21.6%)、可8例(10.8%)、不可10例(13.5%)ニシテ、隨伴現象ヲ認メタルハ男子5例(10.9%)、女子13例(46.4%)、合計18例(24.3%)ナリ。

第二項 輕度並ニ中等度高血壓者ト

耳官能 (第46表參照)

輕度並ニ中等度高血壓ノモノ、聽能ヲミルニ

60 歳代ニ於テハ男子 13 名中優 2 例(83.5%)、良、可、不可各 1 例(3.8%)宛ニシテ、女子ハ 14 名中優 17 例(60.7%)、良 7 例(25.0%)、可、不可ハ共ニ 2 例(7.1%)宛ナリ。男女ヲ通ジ 27 名ノ中優 40 例(74.1%)、良 8 例(14.8%)、可、不可ハ共ニ 3 例(5.6%)宛ナリ。

70 歳代ニ於テハ男子 26 例中優 19 例(38.8%)、良 4 例(8.2%)、可 7 例(14.3%)、不可 19 例(38.8%)、女子ハ 21 例中優 15 例(38.5%)、良 7 例(17.9%)、可 4 例(10.3%)、不可 13 例(33.3%)。男女ヲ通ジ 47 名ノ中優 34 例(38.6%)、良 11 例(12.5%)、可 11 例(12.5%)、不可 32 例(36.4%)ナリ。

80 歳以上ニ於テハ男子 14 名中優 6 例(21.4%)、良 2 例(7.1%)、可 6 例(21.4%)、不可 14 例(50.0%)。女子ハ 13 名中優 3 例(13.0%)、良、可ハ各 2 例(8.7%)、不可 16 例(69.6%)。男女ヲ通ジテミルニ、27 名ノ中優 9 例(17.6%)、良 4 例(7.8%)、可 8 例(15.7%)、不可 30 例(58.8%)ナリ。

全被檢者ニツイテミルニ、男子 53 名中優 48 例(46.6%)、良 7 例(6.8%)、可 14 例(13.6%)、不可 34 例(33.0%)。女子ハ 48 名中優 35 例(33.9%)、良 16 例(17.8%)、可 8 例(8.9%)、不可 31 例(34.4%)。男女ヲ通ジ 101 名ノ中優 83 例(43.0%)、良 23 例(11.9%)、可 22 例(11.4%)、不可 65 例(33.7%)ナリ。

更ニ前庭器機能ヲミルニ、

60 歳代ニ於テハ男子 12 名中優 15 例(62.5%)、良 3 例(12.5%)、可 4 例(16.7%)、不可 2 例(8.3%)。女子ハ 12 名中優 20 例(83.3%)、良 1 例(4.2%)、可ハナク、不可 3 例(12.5%)。男女ヲ通ジ 24 名ノ中優 35 例(72.9%)、良、可ハ共ニ 4

例(8.3%)、不可 5 例(10.4%)ニシテ、随伴現象ハ男女共ニ 3 例(12.5%)宛合計 6 例(12.5%)ニミラレタリ。

70 歳代ニ於テハ男子 22 名中優 29 例(65.9%)、良 7 例(15.9%)、可 5 例(11.4%)、不可 3 例(6.8%)。女子ハ 13 名中優 10 例(38.5%)、良 2 例(7.7%)、可 4 例(15.4%)、不可 10 例(38.5%)。男女ヲ通ジ 35 名ノ中優 39 例(55.7%)、良、可ハ共ニ 9 例(12.9%)、不可 13 例(18.6%)ニシテ、随伴現象ハ男子 10 例(22.7%)、女子 6 例(23.1%)、合計 16 例(22.9%)ニ認メラレタリ。

80 歳以上ニ於テハ男子 10 名中優 10 例(50.0%)、良 3 例(15.0%)、可 4 例(20.0%)、不可 3 例(15.0%)。女子ハ 12 名中優 10 例(41.7%)、良 6 例(25.0%)、可 1 例(4.2%)、不可 7 例(29.2%)。男女ヲ通ジ 22 名中優 20 例(45.5%)、良 9 例(20.5%)、可 5 例(11.4%)、不可 10 例(22.7%)ニシテ、随伴現象ハ男子ニハナク女子ノミ 6 例(25.0%)、合計 6 例(13.6%)ナリ。

各年代ヲ通ジテミルニ、男子 44 名中優 54 例(61.4%)、良、可ハ共ニ 13 例(14.8%)宛、不可 8 例(9.1%)。女子ハ 37 名中優 40 例(54.1%)、良 9 例(12.2%)、可 5 例(6.8%)、不可 20 例(27.0%)。男女ヲ通ジテ 81 名中優 94 例(58.0%)、良 22 例(13.6%)、可 18 例(11.1%)、不可 28 例(17.3%)ニシテ、随伴現象ハ男子 13 例(14.8%)、女子 15 例(20.3%)、合計 28 例(17.3%)ニ認メラレタリ。

第三項 高度高血壓者ト耳官能

(第 47 表參照)

高度高血壓ノモノ、聴能ヲミルニ、

60 歳代ニ於テ男子ハ 7 名悉ク優ニシテ即チ 14 例(100.0%)、其他ノモノハナク、女子ハ 9

名ノ中優 11 例(64.7%)。良。可ハ 1 例モナク。不可 6 例(35.3%)。男女ヲ通ジ 16 名中優 25 例(80.7%)。良。可ハ共ニナク。不可 6 例(19.4%)ナリ。

70 歳代ニ於テハ男子 15 名ノ中優 5 例(17.9%)。良 3 例(10.7%)。可 2 例(7.1%)。不可 18 例(64.3%)。女子ハ 21 名ノ中優 7 例(17.1%)。良 13 例(31.7%)。可 7 例(17.1%)。不可 14 例(34.1%)。男女ヲ通ジ 36 名ノ中優 12 例(17.4%)。良 16 例(23.2%)。可 9 例(13.0%)。不可 32 例(46.4%)ナリ。

80 歳以上ニ於テハ男子 9 名ノ中優 3 例(16.7%)。良 1 例(5.6%)。可ハナク。不可 14 例(77.8%)。女子ハ 12 名中優 9 例(40.9%)。良 5 例(22.7%)。可。不可ハ共ニ 4 例(18.2%)ニシテ。男女ヲ通ジテミルニ。21 名ノ中優 12 例(30.0%)。良 6 例(15.0%)。可 4 例(10.0%)。不可 18 例(45.0%)ナリ。

全被檢者ニツイテミルニ。男子 31 名ノ中優 22 例(36.7%)。良 4 例(6.7%)。可 2 例(3.3%)。不可 32 例(53.3%)。女子ハ 42 名ノ中優 27 例(33.8%)。良 18 例(22.5%)。可 11 例(13.8%)。不可 24 例(30.0%)。男女ヲ通ジ總計 73 名ノ中優 49 例(35.0%)。良 22 例(15.7%)。可 13 例(9.3%)。不可 56 例(40.0%)ナリ。

次ニ前庭器機能ヲミルニ。

60 歳代ニ於テハ男子 7 名ノ中優。良共ニ 3 例(21.4%)宛。又可。不可共ニ 4 例(28.6%)宛ヲ認メ。女子ハ 9 名ノ中優 14 例(77.8%)。良。可ハ共ニ 2 例(11.1%)宛ヲ示シ。不可ハナク。男女ヲ通ジ 16 名ノ中優 17 例(53.1%)。良 5 例(15.6%)。可 6 例(18.8%)。不可 4 例(12.5%)ニシテ。尙ホ隨伴現象ハ男子ニ 1 例(7.1%)。女子ニ 7 例

(38.9%)。合計 8 例(25.0%)ニ認メラレタリ。70 歳代ニ於テハ男子 12 名ノ中優 8 例(33.3%)。良 3 例(12.5%)。可 9 例(37.5%)。不可 4 例(16.7%)。女子ハ 16 名ノ中優 9 例(28.1%)。良 3 例(9.4%)。可 6 例(18.8%)。不可 14 例(43.8%)。男女ヲ通ジテミルニ 28 名ノ中優 17 例(30.4%)。良 6 例(10.7%)。可 15 例(26.8%)。不可 18 例(32.1%)ニシテ。隨伴現象ハ男子ニハナク。女子ノミ 3 例(9.4%)。合計 3 例(5.4%)認メラレタリ。

80 歳以上ニ於テハ男子 7 名中優 5 例(35.7%)。良 2 例(14.3%)。可 5 例(35.7%)。不可 2 例(14.3%)。女子ハ 7 名中優 9 例(64.3%)。良 4 例(28.6%)。可ハナク。不可 1 例(7.1%)。男女ヲ通ジ 14 名ノ中優 14 例(50.0%)。良 6 例(21.4%)。可 5 例(17.9%)。不可 3 例(10.7%)ニシテ。尙ホ隨伴現象ハ男子ニハナク。女子ニ 1 例(7.1%)。合計 1 例(3.6%)ニミラレタリ。

全被檢者ニツイテミルニ。男子 26 名ノ中優 16 例(30.8%)。良 8 例(15.4%)。可 18 例(34.6%)。不可 10 例(19.2%)。女子ハ 32 名ノ中優ハ其半數タル 32 例(50.0%)ヲ占メ。良 9 例(14.1%)。可 8 例(12.5%)。不可 15 例(23.4%)。男女ヲ通ジ總計 58 名ノ中優 48 例(41.4%)。良 17 例(14.7%)。可 26 例(22.4%)。不可 25 例(21.6%)ニシテ。尙ホ隨伴現象ヲ認メタルハ男子 1 例(1.9%)。女子 11 例(17.2%)。合計 12 例(10.3%)ナリ。

第四項 各種血壓ノモノト耳官能 (小括) (第 48 表參照)

以上各種血壓ノモノト耳官能トノ關聯ヲ總括的ニミルニ。先ヅ聽能ハ。

60 歳代ニ於テハ輕。中等度高血壓ノモノ最モ良

キ成績ヲ示シ。正常血壓ノモノハ之ヨリ却ツテ少シク劣リ殊ニ不可ナルモノハ前者ヨリ凡ソ1割方多シ。高度高血壓ノモノハ優凡ソ8割ニテ此點ハ最も良ケレ共。他ハ孰レモ不可ニシテ凡ソ2割ヲ占メ。中間ノモノハ認メラズ。

70歳代ニ於テモ輕。中等度ノモノハ最も自然ナル如キ成績ヲ示シ。即チ優。不可共ニ凡ソ4割ヅハ。良。可ハ遙ニ少クシテ凡ソ1割ヅハヲ認メタリ。正常ナルモノハ優良共ニ殆ンド同率ニテ凡ソ半数以上ヲ占メ。他ノ殆ンド大部ハ不可ニ屬シテ凡ソ4割ヲ認メ。全體トシテノ成績ハ前者ニ及バズ。高度ナルモノハ更ニ不良ニシテ良好ナルモノ激減シ不可ナルモノ益々多クシテ凡ソ半数ヲ占ムル有様ナリ。

80歳以上ニ於テハ高度ナルモノ最も良キ成績ヲ示シ。輕。中等度ナルモノ之ニ次ギ。正常ナルモノハ大多數ハ不可ナル成績ヲ示シタリ。

各年代ヲ通ジテミルニ各種血壓ノモノハ聽能間ニハ著明ナル差異ハ認メラザルガ然モ優良ナルモノハ正常凡ソ6割。輕。中等度凡ソ5割5分。高度凡ソ5割ノ如キ成績ヲ示シ。更ニ不可ナルモノハ輕。中等度ノモノ凡ソ $\frac{1}{3}$ ニテ最も少ク。正常ノモノハ之ヨリ少シク多ク。高度ナルモノハ4割ヲ占メテ最も多シ。

即チ血壓ト聽能トノ關聯ヲミルニ。正常血壓ノモノハ概シテ良好ナル聽力ヲ有スルモノ多キモ80歳以上ニ於テ尙ホ140mm以下ノ血壓ヲ有スルモノハ如キハ却ツテ聽力不良ナル成績ヲ示シ。輕・中等度高血壓ノモノハ孰レノ年代ニ於テモ最も多く被檢者ノ凡ソ4割6分ヲ占ムル程ニテ。此程度ノ血壓上昇ハ身體ノ各機能ヲ遂行スルニ當リテハ或程度迄必要ナルモノナル可ク。從ツテ聽力ニ於テモ此類ノモノハ最も自然

ナリト思考セラルハ平均成績ヲ示シ。高度高血壓ノモノハ概シテ不良ナル聽力ヲ示スモ各年代ニツイテミルニ。60歳代ニテハ極メテ良好ナルモノト頗ル不良ナルモノトニ分レ。70歳代ニ於テハ他ノ類ノモノヨリ幾分惡ク。80歳以上ニ於テハ却ツテ他ノ類ノモノヨリ遙ニ良好ナルモノ多キガ如キ興味アル成績ヲ示シタリ。

次ニ前庭器機能ハ。60歳代ニ於テハ正常血壓ノモノ最も良キ成績ヲ示シ優良ナルモノ凡ソ8割ニテ不可ハ極メテ少數ナリ。之ニ次グハ輕。中等度高血壓ノモノニシテ優良ナルモノハ尙ホ凡ソ8割ヲ占ムレ共不可ナルモノ増加ス。高度高血壓ノモノハ優良ナルモノ幾分少クシテ凡ソ7割ヲ占メ。他ノ凡ソ3割ハ不良ナルモノナリ。70歳代ニ於テモ依然正常ナルモノ最良ノ成績ヲ示シ優良ナルモノ尙ホ8割近キ數ヲ示セリ。輕・中等度ナルモノハ之ヨリ少シク劣リテ優良ナルモノ凡ソ7割ナルガ。高度ナルモノハ優良ト認メラルハモノ僅ニ4割ニ過ギズシテ。其凡ソ $\frac{1}{3}$ ハ極メテ不良ナルモノナリ。80歳以上ニ於テハ之等ノ模様ハ著シク異リ。高度ナルモノ最も良キ成績ヲ示シ。即チ優良ナルモノ7割以上ヲ占メ不良ナルモノハ比較的少シ。輕。中等度ノモノハ優良凡ソ6割5分ナルガ正常ナルモノハ優良5割ニテ成績最も惡シ。各年代ヲ通ジテミルニ。優良ナルモノハ正常血壓ノモノ最も多クシテ凡ソ7割5分ヲ占メ。輕。中等度血壓ノモノ之ニ次ギテ凡ソ7割。高度高血壓ノモノハ凡ソ5割5分ニ過ギズ。

即チ血壓ト前庭器機能トノ關聯ヲミルニ。正常血壓ノモノハ概シテ良好ナル成績ヲ示シ。6・70歳代ニ於テハ尙ホ優良ナル機能ヲ有スルモノ多キモ。80歳以上ニ於テハ不良ナルモノ凡ソ半数

ヲ占ムル有様ナリ。輕、中等度高血壓ノモノハ60歳代ニハ尙ホ優良ナルモノ凡ソ8割ヲ存シ、年代ノ進ムニ從ヒ凡ソ1割方ヅ、ノ低下ヲ示セ共、高度高血壓ノモノハ概シテ成績惡シキモノ多ク、60歳代ニテハ尙ホ優良ナルモノ凡ソ7割ヲ認ムルモ70歳代ニ於テハ凡ソ4割ニ減ジ、80歳以上ニ於テハ再び凡ソ7割ニ増加スルガ如キ興味アル成績ヲ示シタリ。

尙ホ隨伴現象ハ60歳代ニテハ正常血壓ノモノ最モ多クシテ3割以上ニ認メラレ、高度高血壓ノモノ之ニ次ギテ2割5分ヲ示シ、輕、中等度高血壓ノモノハ最モ少クシテ更ニ其半數ノミナリ。70歳以上ニ於テハ正常、輕、中等度共ニ殆ンド相等シキ成績ニテ70歳代凡ソ2割、80歳以上凡ソ1割ナルガ、高度ナルモノハ70歳以上ハ急激ニ減少シテ5分4厘、3分6厘ノ如キ成績ヲ示シタリ。各年代ヲ通ジテミルニ、正常血壓ノモノハ其凡ソ $\frac{1}{4}$ ニ隨伴現象ヲ認ムレ共、輕、中等度ノモノハ凡ソ1割7分、高度ナルモノハ最モ少クシテ僅ニ凡ソ1割ニ認メラルルニミ。而シテ一般ニハ隨伴現象ハ前庭器機能ノ良好ナルモノニ認メラルレ共、時ニハ機能ノ比較的不良ナルモノニモ認メラルハコトアリ。

之ヲ要スルニ、正常血壓ノモノハ一般ニ耳官能モ良好ナルモノ多ク、輕、中等度高血壓ノモノ之ニ次ギ、高度高血壓ノモノハ概シテ機能不良ナルモノ多キガ如ク、尙ホ隨伴現象ハ一般ニ機能良好或ハ異常興奮状態ニアルモノニ認メラル所ナルガ、時ニハ機能不良ナルモノモ拘ハラズ隨伴現象ノアラハルハコトアリ。故ニC. Stein等ノ云ヘル如ク機能不良ナルモノニ却ツテ隨伴現象ノ多クアラハルハトイフハ當ラザルモノト考フルモ、時ニハ之ニ該當スルモノモ認メラル

ル場合アリト考ヘラル。

第四節 血液ワ氏反應陽性者ノ

耳官能(第49表參照)

本検査ノ被検査者中ニハ、血液ノワ氏反應陽性ナルモノノ男女合セテ42名ノ相當多數ヲ認メ、是等ノモノ、検査成績ニハ些カ興味ヲ感ジタルヲ以テ茲ニ之ヲ記サントス。尤モ是等42名中15名ハ本章ノ初メニ記シタル如キ諸種ノ疾病ヲ有シ、全身状態ノ可良ナラザルモノニシテ、尙ホ是等42名中身體ニ慢性病變ヲ認メタルモノハ僅ニ3名ノミナリシコトモ特記スルニ足ルモノナルベシト信ゼラル。

第一項 ワ氏反應陽性者ノ聽能

聽能ノ良否ハ便宜上主トシテ囁語聽距ヲ以テスルコト、シ、即チ60歳代ニ於テハ6m以上70歳代ニ於テハ5m以上、80歳以上ニ於テハ4m以上ナルモノヲ以テ聽力可良ナルモノトシ、夫レ以下ナルモノヲ不良ナルモノトシテミルニ、

60歳代ニ於テ男子8名中可良ナルモノハ14例(87.5%)、不良ナルモノ2例(12.5%)。女子13名中可良ナルモノハ15例(65.2%)、不良ナルモノ8例(34.8%)。男女ヲ通ジテミルニ被検査者21名中可良ナルモノ29例(74.4%)、不良ナルモノ10例(25.6%)ナリ。

70歳代ニ於テハ男子7名中可良ナルモノ3例(21.4%)、不良ナルモノ11例(78.6%)。女子8名中可良ナルモノ7例(43.7%)、不良ナルモノ9例(56.3%)。男女ヲ通ジテミルニ15名中可良ナルモノ10例(33.3%)、不良ナルモノ20例(66.7%)ヲ認メタリ。

80歳以上ニ於テハ男子2名中可良ナルモノハナク、不良ナルモノ4例(100.0%)。女子3名中

可良ナルモノ 4 例 (66.7%)、不良ナルモノ 2 例 (33.3%)。男女ヲ通ジテミルニ 5 名中可良ナルモノ 4 例 (80.0%)、不良ナルモノ 1 例 (20.0%) ナリ。

全被檢者ニツイテミルニ、男子 18 名中可良ナルモノト不良ナルモノトハ相半バシテ共ニ 17 例 (50.0%) 宛ナリ。又女子 24 名中可良ナルモノハ 23 例 (57.8%)、不良ナルモノ 19 例 (42.2%) ナリ。男女ヲ通ジテミルニ 41 名中可良ナルモノ 43 例 (54.4%)、不良ナルモノ 36 例 (45.6%) ナリ。

即チ高齢者ニ於ケルㄩ氏反應陽性者ノ聽力ハ可良ナルモノ凡ソ 5 割 5 分、不良ナルモノ 4 割 5 分ニテ可良ナルモノ、幾分多キヲ認メタリ。而シテ特ニ興味ヲ覺ユルハ、是等可良ナル聽力ヲ有スルモノハ殆ンド總テニ於テ頗ル良好ナルヲ認ムルニ反シ、不良ナルモノハ又頗ル聽力惡シクシテ嚙語ノ如キハ殆ンド聴取不能ノ程度ノモノ多ク、輕度不良ト稱ス可キモノハ極メテ少數ニシテ、即チ可良、不良共ニ兩極端ヲ占ムルモノ多ク中庸ナルモノハ頗ル少ナカリシ事實ナリ。

第二項 ャ氏反應陽性者ノ前庭器機能

前庭器機能ノ良否ハ廻轉並ニ溫熱刺戟試驗ニ際シ眼球震盪ノ「著明發現」セルモノヲ以テ可良ナルモノトシ、單ナル「發現」並ニ「發現? Andeutung」、陰性ナルモノヲ不良ナルモノトシテミルニ、

60 歳代ニ於テハ男子 8 名中可良ナルモノ 12 例 (75.0%)、不良ナルモノ 4 例 (25.%)。女子 12 名中可良ナルモノハ 20 例 (87.5%)、不良ナルモノ 4 例 (12.5%)。男女ヲ通ジテミルニ被檢者 20 名中可良ナルモノ 32 例 (80.0%)、不良ナル

モノ 8 例 (20.0%) ニシテ、コハ 60 歳代健者平均ヨリ良好ナル成績ヲ示スモノナリ。

70 歳代ニ於テハ男子 7 名中可良ナルモノ 5 例 (35.7%)、不良ナルモノ 9 例 (64.3%)。女子 7 名中可良ナルモノ 3 例 (21.4%)、不良ナルモノ 11 例 (78.6%)。男女ヲ通ジテミルニ 14 名中可良ナルモノハ 8 例 (28.6%)、不良ナルモノ 20 例 (71.4%) ニシテ、コハ 70 歳代ニ於ケル健者ハ勿論、弱者ノ平均ヨリモ不良ナル成績ナリ。

80 歳以上ニ於テハ男子 1 名ハ兩側共ニ不良ニシテ、女子 3 名ハ可良、不良共ニ 3 例 (50.0%) 宛ヲ示シ、男女ヲ通ジテ 4 名中可良ナルモノ 3 例 (37.5%)、不良ナルモノ 5 例 (62.5%) ニシテ、是亦 80 歳以上ニ於ケル健者ハ勿論、弱者ノ平均ヨリ遙ニ不良ナルモノナリ。

全被檢者ニツイテミルニ、男子 16 名中可良ナルモノハ 17 例 (53.1%)、不良ナルモノ 15 例 (46.9%)。女子ハ 22 名中可良ナルモノ 26 例 (59.1%)、不良ナルモノ 18 例 (40.9%)。男女ヲ通ジテミルニ被檢者 38 名中可良ナルモノ 43 例 (56.6%)、不良ナルモノ 33 例 (43.4%) ヲ認メタリ。而シテ是等ノ成績ハ余ノ検査セル範圍ニ於ケル全平均ニ略ニ等シク、寧ロ可良ナルモノハ幾分比率多キガ如キ有様ナリ。尙ホ 60 歳代男子 1 名、女子 6 名、70 歳代男子 2 名、女子 1 名、80 歳以上ノ女子 1 名、合計 11 名ニ於テハ前庭器ノ異常興奮性ヲ認メタルモ興味アル事ナルベシ。

即チ高齢者ニ於ケルㄩ氏反應陽性者ノ前庭器機能ハ、可良ナルモノ凡ソ 5 割 7 分、不良ナルモノ凡ソ 4 割 3 分ニテ殆ンド聽力ノ際ト相等シキ成績ヲ示シタリ。而シテ可良ナルモノ、略ニ半数ニ於テハ異常興奮性ヲ認メタリ。

更ニワ氏反應陽性者ニ於ケル聽能ト前庭器機能トノ狀態ヲミルニ、聽力可良ナルモノハ概シテ前庭器機能ハ正常値ヲ示セルモノ多ク、聽力不良ナルモノハ前庭器機能亦不良ナルカ或ハ逆ニ頗ル興奮性ノ高キモノモ相當ニ認メラレタルハ興味アルコトナルベシ。

尙ホ是等ワ氏反應陽性者中聽能ノミ高度ニ不良ニシテ前庭器機能ハ正常或ハ却ツテ亢進セルモノ6名11例(13.4%)(検査番號47, 51, 61, 63, 113, 151), 聽能ハ殆ンド正常ニシテ前庭器機能ノミ不良ナルモノ5名9例(11.8%)(検査番號16, 22, 77, 147, 153), 聽能前庭器機能共ニ不良ナルモノ4名8例(検査番號84, 117, 167, 209)ヲ認メタルガ、是等15名ノ者ノ機能障礙ガ果シテ微毒性病變ノミニヨルモノナルヤ否ヤハ今俄ニ斷ゼラレザルモ、然モ之ト密接ナル關係ノ存スルモノニ非ズヤト思考セラル、モノナリ。

第六章

總括

以上記載セル所ヲ總括スレバ大要次ノ如シ。

第1.

本研究ハ60歳以上ノモノ223名(男子111名女子112名)ニ就キ聽能並ニ前庭器機能ノ検査ヲ行ヒタルモノナリ。

第2. 聽能。

1) c音又ニヨルウェーベル氏法。

音ノ兩側耳ニ同様ニ聽取セラル、モノト、左右孰レニカ偏達スルモノトハ其數殆ンド相半バス。即チ兩側ニ聽取セラル、モノ凡ソ4割7分、右側ニ偏達スルモノ之ニ次ギテ凡ソ3割2分、左側ニ偏達スルモノハ凡ソ2割ニテ最少ク、

尙ホ80歳以上ノ高度難聽者ニ於テ聽取不能ナルモノ3例(1.3%)ヲ認メタリ。

2) c音又ニヨル氣導聽取時間。

60歳以上ノ高齢者ニ於ケル氣導聽取時間ハ青壯年者ノ凡ソ5割6分ニシテ、之ヲ年代別ニミルニ、60歳代ニ於テハ尙ホ比較的長ク聽取セラルレ共、然モ青壯年者ニ比スレバ平均値ハ其75.5%ニ過ギズ。70歳代ニ至レバ其前半ニ於テ既ニ53.1%ニ短縮シ、後半ニ於テハ更ニ減ジテ44.9%トナル。然レ共80歳以上ニ於テハ45.2%ニテ70歳代後半ト殆ンド變ラザルヲ以テ、一般ニハ高齢者ニ於ケル氣導ハ70歳代後半ヨリ稽留性トナリ、其後ノ時間短縮ハ頗ル徐々タルモノナル可シ。

3) c音又ニヨル骨導聽取時間。

高齢者ニ於ケル骨導聽取時間ハ平均青壯年者ノ凡ソ8割ニテ、之ヲ年代ニヨルニ、60歳代ニ於テハ93.8%ニテ殆ンド青壯年者ト異ラザルモノ多キモ、70歳代ニ至レバ其前半ニ於テ既ニ75.2%トナリ、後半ニハ更ニ67.9%ニ減ジ、80歳以上ニ於テハ尙ホ多少短縮シテ64.7%ナル平均値ヲ示シタリ。

4) fis⁴音又ニヨル氣導聽取時間。

高齢者ニ於ケル高調音ノ氣導聽取時間ハ青壯年者ノ凡ソ4割6分ニシテ、之ヲ年代別ニミルニ、60歳代ニ於テ既ニ58.4%ニテ著明ナル短縮ヲ認メ、其後モ尙ホ凡ソ1割方宛短縮シテ70歳代前半ニ於テ45.9%、後半ニ於テ35.5%ノ成績ヲ示シタルモ、80歳以上ニ於テハ33.8%ニテ前年代後半ト殆ンド變ラザルヲ認ム。

5) 高齢者ニ於テハcノ如キ低調音又ニヨル氣導、骨導ハ共ニ漸次其聽取時間短縮スルモ、然モ其程度ハ兩者ニ於テ著明ナル差異ヲ示シ、

即チ各年代ヲ通ジテ氣導ノ方凡ソ2割方短縮度強シ。

更ニ低調音ト高調音トノ氣導ヲ比較スルニ、各年代ヲ通ジ後者ハ前者ニ比シ聴取不良ニシテ殊ニ60歳代ニ於テ著明ナリ。

6) リンネ氏法。

骨導ハ氣導ニ比シ其聴取時間短縮度一般ニ輕度ナレ共、然モリンネ氏法ハ特殊ナルモノ以外ハ通常陽性ナリ。

7) 高齢者ノ囁語聴取能力ハ60歳代ニ於テハ未ダ可良ナレ共、年代ノ進ムニ從ヒ急激ニ減退シ、殊ニ高調音ノ聴取比較の不良ナリ。

8) ハルトマン・エーデルマン氏音又列ニヨル量的聴力検査成績ハ、60歳代ニ於テ既ニ各音ニ亙リ全般的ニ聴取時間ノ短縮ヲ來タセルモノ多ク殊ニ高音部ニ於テ著明ナリ。然モ低音部ニ於テスラ7—8割ノ間ニアリテ高音部ハ是ヨリ更ニ10—20%方低下ス。70歳代前半ニ於テハ各音共更ニ8—15%方短縮シ殊ニ低音部ニ著明ナリ。後半ニ至レバ更ニ各音共ニ凡ソ8—15%方ノ低下ヲ來タシ聴取時間ハ青壯年者ノ凡ソ5割或ハ夫以下トナレルモノ多シ。80歳以上ニ於テモ尙ホ低下ハ認メラレ共其程度僅少トナリ、然モ各音共ニ5—4割ノ聴取時間トナリテ相互間ノ差異ハ比較の僅少トナル。

9) 高齢者ノ下音界ハ、60歳代ニ於テハ尙ホC₂D₂等青壯年者ト殆ンド異ラザルモノ多キモ、70歳代ニ至レバ是等ノモノハ大凡半數トナリ、他ハ漸ク上昇ヲ示スモ其程度輕クG₂或ハA₂ニ止マルモノ凡ソ3割、其他モ多クハ半乃至1音階内ニアリ。80歳以上ニ至レバ漸ク著明ナル上昇ヲ示シC₂D₂等ニ止マルモノハ極ク少數ニシテF₂G₂等半音階上昇セルモノ凡ソ4割ヲ占

メ、半乃至1音階上昇セルモノ及ビ1半乃至2音階上昇セルモノ各々凡ソ2割ヲ占ム。

10) 上音界ハ60歳代ニ於テ既ニ早く下降セルモノ多ク青壯年者ノ如キモノハ凡ソ3割ニ過ギズシテ凡ソ1音階下降セルf⁶—a⁶内ニアルモノ凡ソ半數ナリ。70歳代ニ至レバ青壯年者ノ如キモノハ殆ンドナク半音階以内ノ下降ヲ示スモノ凡ソ5割、其他ハ1乃至1半音階下降セルモノ多ク、全體トシテ前年代ニ比シ2—3音階下降ス。80歳代ニ於テハ其大部ハ1乃至1半音階ノ下降ヲ示ス。然レ共高齢者ノ上音界下降ヲミルニ多クハ6符音階内ニ止マリ、5符音階内ニ下降スルハ特殊ナルモノ、ミナリ。尙ホ各年代ニ於テ最も多キハ60歳代ヨリ順次a⁶, g⁶, f⁶ニシテ1年代毎ニ1音宛ノ下降ヲ認ム。

11) 上音界ト下音界。

高齢者ニ於テハ上音界ノ下降ハ下音界ノ上昇ニ比シ早期ニアラハルモノ多ク、上下兩音界共ニ縮小スル際ニハ上音界ノ下降度ハ下音界ノ上昇度ニ比シ各年代ヲ通ジテ凡ソ半乃至1音階著明ナリ。

12) 男女兩性間ニ於ケル聴能ノ差異ハ各年代ニヨリ幾分異ナレ共一般ニ女子ハ男子ニ比シ氣導、骨導共ニ多少良好ナリ。

尙ホ左右耳間ニ於テモ著明ナル差異ハ認メラザルモ一般ニ左耳ハ右耳ニ比シ聴能良好ナルモノ多シ。

13) 以上種々ナル検査成績ニヨリ高齢者ノ聴能減退ハ主トシテ感音器ノ障礙ニヨルモノナルコトハ明カナル事實ナルモ、氣導聴取不良ナルモノニ於テハ常ニ骨導モ亦不良トナレルヲ認メ、然モ前者ノ程度ハ後者ニ比シ著明ナルモノ多ク且ツ斯カルモノニ於テハ殆ンド必ズ種々ナ

ル程度ノ下音界上昇ヲ認ムルヲ以テ傳音器ノ障礙モ亦與ツテ力アルモノナリト考ヘラル。

第3 前庭器機能。

I〕廻轉性眼球震盪。

1) 發現狀態。直立頭位ヲ保タシメ、20秒10. 廻轉ノ刺戟ヲ與フルニ、6—70 歳代ニ於テハ男女共ニ孰レモ著明ナル眼震ノ發現ヲミタルモ80 歳以上ニ於テハ男女共ニ凡ソ其1割ニ眼震ノ全ク發現セザルモノヲ認メタリ。

2) 眼震ノ持續時間。年代ニヨリテ多少ノ差ハアレ共大體ニ於テ21—30 秒ノモノ凡ソ半數ヲ占メ、31—40 秒ノモノ及ビ20—11 秒ノモノ各々凡ソ2割ニ認メラレ其他ハ極メテ少數ナリ。而シテ持續時間モ亦年代ト共ニ短縮スルモノ漸次増加ス。

3) 震盪數。高齢者ニ於テハ年代ト共ニ漸次減少セルモノ多ク、31—60 ヲ示スモノ凡ソ半數ヲ占メ、30 以下ノモノハ年代ト共ニ増加スルニ反シ60 以上ノモノハ年代ト共ニ減少ス。

4) 眼震ノ性状。眼震ハ孰レモ水平性ノモノニシテ、其方向ハ廻轉方向ト反對ナリ。而シテ廻轉休止後2—3 秒間ハ大打性緩慢ニシテ其後ハ小打性迅速ナルモノ多キモ、最初ヨリ最後迄大打性ナリシモノ60 歳代ニ9.0%、70 歳代ニ11.8%、80 歳以上ニ於テハ51.2%ト年代ト共ニ著明ニ増加スルヲ認ム。

5) 隨伴現象ハ惡心ヲ第1トシ、其他眩暈、頭痛等ニシテ、之ヲ年代別ニミルニ60 歳代ニ於テハ男子3.3%、女子35.0%、平均19.0%、70 歳代ニ於テハ男子11.9%、女子23.1%、平均16.2%、80 歳以上ニ於テハ男子2.5%、女子11.9%、平均7.3%ニシテ即チ年代ト共ニ減少シ、女子ハ男子ニ比シテ遙カニ多數ナルヲ認メ、左廻轉

ニ際シ右廻轉ヨリ多少多シ。

尙ホ青壯年者ニ比シ頗ル少キモノナリ。

II〕冷刺戟ニヨル眼球震盪。

1) 60° 後屈頭位ヲ保タシメ、18°C ノ冷水20cc.ヲ用ヒテ刺戟セルニ、眼震ノ著明ニ發現セルモノ70.6%、「發現」セルモノ14.4%、「發現? Andeutung」ノモノ11.3%、全ク發現セザルモノ3.7%ニシテ、著明發現ハ年代ト共ニ減少シ「發現」、「發現?」、「陰性」ナルモノハ反對ニ多少増加ス。而シテ一般ニ女子ハ男子ニ比シ敏感ナルモノ多ク殊ニ60 歳代ニ於テ著明ナリ。

2) 眼震ノ潜伏時間。孰レノ年代ニ於テモ21—30秒ノモノ最モ多クシテ4—3割ヲ占メ、11—20 秒ノ如キ興奮性ノ高キモノハ60 歳代ニテハ尙ホ凡ソ1/3ニ認メラル、モ年代ト共ニ著明ニ被少シテ70 歳代凡ソ2割、80 歳以上凡ソ1割4分トナル。之ニ反シ31—40 秒ノモノ及ビ夫レ以上ノモノハ年代ト共ニ増加ス。

3) 眼震ノ持續時間。60 歳代ニ於テハ90 秒以上ノモノ尙ホ半數以上ヲ認ムルモ、70 歳代ニ至レバ斯クノ如ク長キモノハ急激ニ減少シテ凡ソ2割トナリ、80 歳以上ニ於テハ更ニ凡ソ1割ニ過ギズ。之ニ反シ90 秒以下ノモノハ年代ト共ニ急激ニ増加ス。

4) 震盪數。年代ノ進ムニ從ヒ多キモノ漸次減少シ、少キモノ漸次増加ス。而シテ51—100ノモノ24.2%ニテ最モ多ク、101—150 及50—21ノモノ夫々19.0%、17.5%ニテ殆ンド等シク、其他151—200、200 以上、20—11ノモノ各々凡ソ1割ヲ占メ、10 以下ノモノ5.2%、發現セザルモノ3.4%ナリ。尙ホ女子ハ一般ニ男子ニ比シテ震盪數多ク、左耳ハ右耳ニ比シ多少多

シ。

5) 眼震ノ性状。眼震ハ孰レモ刺戟側ト反對ノ方向ヲ示シ、大多數ハ純水平性ナリシモ少數例ニ於テハ水平性ニ多少旋廻性ノ混ジタルヲ認メタリ。尙ホ一般ニ眼震ハ小打性ノモノナリシガ、大打性ノモノモ少數ヲ認メラレ、即チ60歳代8.3%、70歳代5.5%、80歳以上ニハナク、年代ト共ニ減少スルハ廻轉刺戟ノ際ト反對ナリ。

6) 隨伴現象。一般ニ頗ル少ク惡心 2.1%、眩暈2.8%、不快感1.2%等ニシテ廻轉刺戟ニ於ケルヨリモ更ニ少シ。

Ⅲ) 溫刺戟ニヨル眼球震盪。

1) 被檢者ヲシテ 60° 後屈頭位ヲ保タシメ、45°C ノ温水 20cc ヲ外聽道内ニ注入シテ溫刺戟ヲ與フルニ、眼震ノ著明ニ發現セルモノ凡ソ4割、「發現」並「發現? Andeutung」ハ殆ンド相伯仲シテ凡ソ2割ヅ、ヲ占メ、眼震ノ全ク發現セザルモノ亦凡ソ2割ニ認メラル。

2) 眼震ノ潛伏時間。21—30秒ノモノ凡ソ3割、31—40 秒ノモノ凡ソ2割、41—50 秒ノモノ凡ソ1割ニテ時間ノ短キモノハ年代ト共ニ漸次減少シ長キモノハ漸次増加スル傾向アルモ50秒以上ノモノ及ビ 20 秒以下ノモノハ極メテ少シ。

3) 眼震ノ持續時間。年代ト共ニ短縮セルモノ多ク、31—60 秒ノモノ凡ソ3割、61—90秒ノモノ並ニ 30 秒以下ノモノ各々凡ソ2割ニシテ90秒以上ノモノハ凡ソ1割ニ過ギズ。

4) 震盪數。一般ニ少ク 21—50 ノモノト20以下ノモノトハ殆ンド同率ニテ凡ソ2割7分ヅツヲ占メ、51—80 ノモノ凡ソ1割5分、80 以上ノモノハ凡ソ1割ニ過ギズ。

5) 眼震ノ性状。眼震ハ刺戟側ト同側ニ向フ水平性ノモノニシテ大多數ハ小打性ノモノナリシガ、唯 60 歳代ニ於テ男女2例ヅ、合計4例(3.7%)ニ大打性ノモノヲ認メタリ。

6) 隨伴現象ヲ訴ヘタルモノハ極メテ少ク、全被檢者ヲ通ジ僅ニ4名ノミ。

第4. 全身狀態ト耳官能トノ關聯。

1) 全身狀態ト聽能トノ間ニハ顯著ナル關係ハ認メラレ難ク、聽力優良ナルモノハ全身狀態ノ可良ナルモノト可良ナラザルモノトニ於テ夫夫44.1%、43.1%ヲ示シ、後者ノ方却ツテ多少勝リ、聽力不良ナルモノハ健者ニ 55.9%、弱者ニ 51.9%ヲ認メタリ。

2) 前庭器機能モ亦全身狀態ノ良否ニヨリテ著明ナル影響ヲ受クルコト少キガ如ク、優良ナル機能ヲ有スルモノ健者ニ 60.9%、弱者ニ 55.2%ヲ認メ、機能不良ナルモノハ健者ニ 39.1%、弱者ニ 44.8%ニ認メラル。

第5. 血壓ト耳官能。

1) 聽 能。

正常血壓(最高血壓 100—139mm)ノモノハ概シテ聽力良好ニシテ優良ナルモノ凡ソ6割、不良ナルモノ凡ソ4割ナリ。サレド80歳以上ニ於テ尙ホ 140mm 以下ノ血壓ヲ有スルモノ、如キハ却ツテ聽力不良ナルモノ多シ。

輕、中等度高血壓(最高血壓 140—179mm)ノモノハ聽力優良ナルモノ凡ソ5割5分、不良ナルモノ凡ソ4割5分ヲ占ム。

高度高血壓(最高血壓 180mm 以上)ノモノハ聽力概シテ不良ニシテ優良ナルモノト不良ナルモノト殆ンド相半バス。然レ共 80 歳以上ニ於テハ他ノ類ノモノヨリ遙ニ聽力良好ナルモノ多シ。

2) 前庭器機能。

正常血壓ノモノハ 6—70 歳代ニ於テハ前庭器機能モ亦概シテ良好ナルモノ多キモ(凡ソ8割)。80 歳以上ニ於テハ優良ナルモノト不良ナルモノト相半バス。

輕、中等度高血壓ノモノハ前庭器機能優良ナルモノ凡ソ7割。不良ナルモノ凡ソ3割ナリ。

高度高血壓ノモノハ前庭器機能モ亦他ノ類ノモノニ比シ優良ナルモノ少ク。即チ優良凡ソ5割5分。不良凡ソ4割5分ヲ示シタリ。

3) 隨伴現象ハ一般ニ年代ト共ニ減少シ。正常血壓ノモノ最モ多クシテ凡ソ2割5分。輕、中等度高血壓ノモノ凡ソ1割7分。高度高血壓ノモノハ凡ソ1割ニ認メラレタルノミ。

第6. ㄩ氏反應陽性者ノ耳官能。

本検査ニ當リ被検査者中ニ 42 名ノㄩ氏反應陽性者ヲ認メタルガ、之等ノ中 23 名ハ耳官能ニ何等變リナク。更ニ 5 名モ検査セル範圍内(4 名ハ聽力検査ノミ。1 名ハ前庭器機能検査ノミ行ヒシモノ)ニ於テハ殆ンド正常ナリシガ。他ノ 15 名(男子 6 名。女子 9 名)ニ於テハ聽能ノミ或ハ前庭器機能ノミ或ハ兩者共ニ高度ナル機能減退アルモノヲ認メタリ。

第7. 高齢者ニ於テハ耳官能ハ聽能並前庭器機能共ニ漸次減退スルモノ多キモ其程度ハ聽能ノ方幾分著明ナルモノ多ク。聽能不良ナルモノハ優良ナルモノヨリ 4—12%方多キモ。前庭器機能ハ優良ナルモノ、方 10—20%方多シ。

擧筆スルニ當リ本研究ニ際シ御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ賜ハリタル恩師増田教授ニ深謝スルト共ニ。常ニ多大ノ御便宜ト御後援トヲ賜ハリシ浴風園關係各位殊ニ尼子博士並ニ醫局諸兄ニ厚ク感謝ス。

(尙ホ本論文ノ大要ハ大日本耳鼻咽喉科會第 37 回總會並ニ同東京地方會第 168 回及ビ第 172 回例會席上ニ於テ發表シタルモノナリ。)

(原稿到着ニ昭和 12・8・13)

第 1 表
被 検 者 (其 1)

年代別 性別計	60歳 代	70 歳 代			80歳 以上	總被 検者
		70— 74歳	75— 79歳	小計		
男 子	83	25	27	52	26	111
女 子	82	28	23	51	29	112
計	65	53	50		55	223
		103				

第 2 表
被 検 者 (其 2)

年 齡 計	性 別 計	男 子	女 子	計
60		1	1	2
61		0	1	1
62		2	1	3
63		0	2	2
64		3	2	5
65		3	3	6
66		1	3	4
67		10	10	20
68		5	5	10
69		8	4	12
小 計		33	32	65

70	8	7	10
71	8	2	10
72	4	4	8
73	4	5	9
74	6	10	16
75	4	7	11
76	7	6	13
77	4	7	11
78	5	1	6
79	7	2	9
小 計	52	51	103
80	4	4	8
81	3	5	8
82	6	7	13
83	5	4	9
84	2	5	7
85	1	2	3
86	2	0	2
87	0	0	0
88	1	0	1
89	1	2	3
101	1	0	1
小 計	26	29	55
總 計	111	112	223

第 3 表

ウェーベル氏法成績

年代計	偏 達 側	兩 側		右 側		左 側		聽 取 不 能		被 検 者 數
	症例數 百分比	症例數	百分比	症例數	百分比	症例數	百分比	症例數	百分比	
60歳代	男 子	20	60.6	9	27.3	4	12.1	0	0	33
	女 子	11	34.4	8	25.0	13	40.6	0	0	32
	計	31	47.7	17	26.2	17	26.2	0	0	65

70歳代	男 子	24	46.2	19	36.5	9	17.3	0	0	52
	女 子	19	37.2	19	37.2	13	25.6	0	0	51
	計	43	41.7	38	36.9	22	21.4	0	0	103
80 歳 以 上	男 子	16	61.5	6	23.1	2	7.7	2	7.7	26
	女 子	14	48.3	10	34.5	4	13.8	1	3.5	29
	計	30	54.5	16	29.1	6	10.9	3	5.5	55
總 被 検 者	男 子	60	54.1	34	30.6	15	13.5	2	1.8	111
	女 子	44	39.3	37	33.0	30	26.8	1	0.9	112
	總 計	104	46.6	71	31.8	45	20.2	3	1.3	223

備 考 兩側ニ聴取セラレタルモノ 104 名ノ中ニハ音ノ顫頂部ニ感セラレタルモノ 5 名ヲ含ム。

第 4 表
c 音又ニヨル氣導、骨導並ニ fis⁴ 音又ニヨル氣導検査成績

年 齡	種 別			c 音 又 氣 導		c 音 又 骨 導		fis ⁴ 氣 導	
	性 平均 計	被 檢 者 数	時間 百分比 側 平均	聴取時間(秒)	%	聴取時間(秒)	%	聴取時間(秒)	%
60 — 69 歳	男子	33名	右 耳	22.9	74.8	14.2	92.8	10.2	55.7
			左 耳	24.9	81.6	15.4	100.0	11.2	61.2
			平 均	23.9	78.2	14.8	96.4	10.7	58.4
	女子	31名	右 耳	21.0	68.8	12.9	84.3	9.9	54.1
			左 耳	23.5	77.1	14.8	96.7	11.5	62.9
			平 均	22.2	72.9	13.9	90.5	10.7	58.4
	男女 平均 計	64名	右 耳	21.9	71.8	13.6	88.9	10.1	55.2
			左 耳	24.2	79.3	15.1	98.7	11.3	61.7
			平 均	23.1	75.5	14.3	93.8	10.7	58.4
70 — 74 歳	男子	25名	右 耳	16.4	53.8	10.8	70.6	7.7	42.1
			左 耳	15.1	49.5	10.4	67.9	7.7	42.1
			平 均	15.7	51.6	10.6	69.2	7.7	42.1
	女子	27名	右 耳	18.0	59.0	13.0	84.9	9.6	52.5
			左 耳	17.5	57.4	13.8	90.2	9.8	53.6
			平 均	17.7	58.2	13.4	87.5	9.7	53.1
	男女 平均 計	52名	右 耳	16.6	54.4	11.4	74.5	8.3	45.4
			左 耳	15.7	51.5	11.6	75.8	8.4	45.9
			平 均	16.2	53.1	11.5	75.2	8.4	45.9

75—79 歳	男子	25名	右 耳	10.9	35.7	9.4	61.4	4.9	26.8
			左 耳	11.7	38.4	9.5	62.1	5.4	29.5
			平 均	11.3	37.0	9.5	61.8	5.2	28.2
	女子	28名	右 耳	15.7	51.4	10.8	70.6	7.3	39.9
			左 耳	16.9	55.4	12.1	79.1	8.5	46.4
			平 均	16.3	53.4	11.5	74.9	7.9	43.2
	男女 平均 計	48名	右 耳	13.2	43.3	10.1	66.0	6.1	33.3
			左 耳	14.2	46.6	10.7	69.9	6.8	37.2
			平 均	13.7	44.9	10.4	67.9	6.5	35.5
70歳代計.平均		100名		15.0	49.1	10.9	71.2	7.5	40.9
80 歳 以 上	男子	25名	右 耳	14.7	48.2	9.2	60.1	6.8	37.2
			左 耳	15.7	51.4	9.8	64.0	6.8	37.2
			平 均	15.2	49.8	9.5	62.1	6.8	37.2
	女子	28名	右 耳	12.2	40.0	10.1	66.0	6.7	36.6
			左 耳	13.6	44.6	10.4	67.9	7.9	43.2
			平 均	12.9	42.3	10.3	66.9	7.3	39.9
	男女 平均 計	53名	右 耳	13.0	42.6	9.7	63.4	6.8	37.2
			左 耳	14.6	47.9	10.1	66.0	7.4	40.4
			平 均	13.8	45.2	9.9	64.7	7.1	38.8
全 被 検 者	男子	108名	右 耳	16.6	54.4	11.2	73.2	7.5	40.9
			左 耳	17.3	56.7	11.5	75.2	7.9	43.2
			平 均	17.0	55.6	11.4	74.2	7.8	42.1
	女子	109名	右 耳	16.8	55.1	11.8	77.1	8.4	45.9
			左 耳	18.0	59.0	12.3	83.7	9.5	51.9
			平 均	17.4	57.1	12.2	80.4	8.9	48.9
	男女 平均 計	217名	右 耳	16.7	54.8	11.5	75.2	8.0	43.9
			左 耳	17.7	58.0	12.2	79.7	8.7	47.5
			平 均	17.2	56.4	11.9	77.8	8.4	45.9

第 5 表
リッネ氏法成績

年 代	種 別		陽 性		陰 性		(±)	
	性. 計	例耳數 側別 %	症例耳數	百 分 比	症例耳數	百 分 比	症例耳數	百 分 比
60 歲 代	男 子	右	30	90.0	1	3.0	2	6.1
		左	31	93.9	1	3.0	1	3.0
	女 子	右	28	90.3	3	9.7	0	0
		左	26	83.9	3	9.7	2	6.4
	男 女 小 計		115	89.8	8	6.3	5	3.9
70 歲 代	男 子	右	30	58.8	8	15.7	13	25.5
		左	29	56.9	8	15.7	14	27.4
	女 子	右	35	68.6	8	15.7	8	15.7
		左	38	74.5	8	15.7	5	9.8
	男 女 小 計		132	64.7	32	15.7	40	19.6
80 歲 以 上	男 子	右	22	88.0	0	0	3	12.0
		左	20	80.0	3	12.0	2	8.0
	女 子	右	12	42.9	8	28.6	8	28.6
		左	18	64.3	4	14.3	6	21.4
	男 女 小 計		72	67.9	15	14.2	19	17.9
全 被 檢 査 者			319	72.8	55	12.6	64	14.6

第 6 表
リッネ氏法陰性並(±)ナル者ノ聴器所見

年 代	種 別		内 陷 鼓 膜		歐氏管狭窄		高 度 難 聴		濁 濁 鼓 膜		中 耳 炎 殘 胎 症 例		慢 性 中 耳 炎	
	種別	性計	例耳数	百分比	例耳数	百分比	例耳数	百分比	例耳数	百分比	例耳数	百分比	例耳数	百分比
60 歳 代	陰性	男 子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
		女 子	0	0	0	0	2	33.3	0	0	4	66.7	0	0
		計	0	0	0	0	2	25.0	0	0	4	50.0	2	25.0
	(±)	男 子	0	0	3	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女 子	0	0	1	50.0	0	0	0	0	1	50.0	0	0
		計	0	0	4	80.0	0	0	0	0	1	20.0	0	0

70 歳 代	陰性	男 子	0	0	5	81.3	10	62.5	0	0	1	6.3	0	0
		女 子	0	0	5	85.7	5	35.7	0	0	4	28.6	0	0
		計	0	0	10	83.3	15	50.0	0	0	5	16.7	0	0
	(±)	男 子	3	10.0	6	20.0	6	20.0	8	26.7	1	3.3	0	0
		女 子	0	0	2	15.4	2	15.4	4	30.8	2	15.4	0	0
		計	3	7.0	8	18.6	8	18.6	12	27.9	3	7.0	0	0
80 歳 以 上	陰性	男 子	0	0	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0	0	0
		女 子	4	33.3	0	0	7	58.3	0	0	0	0	1	8.4
		計	4	26.7	1	6.7	8	53.3	1	6.7	0	0	1	6.7
	(±)	男 子	2	40.0	2	40.0	0	0	1	20.0	0	0	0	0
		女 子	5	35.7	6	42.9	0	0	3	21.4	0	0	0	0
		計	7	36.8	8	42.1	0	0	4	21.1	0	0	0	0

備考 70 歳代ニテ(±)ノ者ノ中ニハ鼓膜所見モ殆ンド變リナク、聴力モ中等度ナル難聴ノミナルモノアリ。即チ男子6耳(20%); 女子3耳(28.1%)。

第 7 表
嚔 語 検 査 成 績

年 代	性別	聴取 距離 種 別	7 m	6 m	5 m	4 m	3—2m	2—1m	100— 50cm	50—25 cm	25—12 cm	12—6 cm	6—ad.c. cm	0
60 歳代 (女子 8183 名)	男子	高調音	59.1%	10.6%	7.6%	4.6%	1.5%	3.0%	7.6%	1.5%	4.6%	0	0	0
		低調音	59.1	22.7	1.5	3.0	3.0	1.5	3.0	3.0	3.0	0	0	0
	女子	高調音	48.4	8.1	14.6	4.8	4.8	0	4.8	3.2	1.6	1.6	0	8.1
		低調音	51.6	9.7	8.1	3.2	8.1	0	4.8	3.2	1.6	1.6	0	8.1
	男女 平均	高調音	53.9	9.4	10.9	4.6	3.1	1.6	6.2	2.3	3.1	0.8	0	3.9
		低調音	55.5	16.4	4.6	3.1	5.4	0.8	3.9	3.1	2.3	0.8	0	3.9
70 歳代 (女子 5151 名)	男子	高調音	13.7	7.8	5.9	3.9	1.9	9.9	9.8	11.8	10.8	6.9	10.8	9.8
		低調音	13.7	7.8	7.8	5.9	2.9	8.8	9.8	10.8	8.8	3.9	10.8	8.8
	女子	高調音	2.9	15.8	14.7	15.8	10.8	5.9	3.9	3.9	7.8	5.9	5.9	6.9
		低調音	2.9	16.7	16.7	13.7	11.8	4.9	3.9	4.9	6.9	6.9	4.9	5.9
	男女 平均	高調音	8.3	11.8	10.3	9.8	6.4	6.4	6.9	7.8	9.3	6.4	8.3	8.3
		低調音	8.3	12.3	12.3	9.8	7.4	6.9	6.9	7.8	7.8	5.4	7.8	7.4

80歳以上 女子 男子 2826名	男子	高調音	3.8	1.9	5.8	0	5.8	7.7	17.3	15.4	21.2	3.8	5.8	11.5
		低調音	3.8	1.9	11.5	3.8	3.8	13.5	11.5	15.4	15.4	0	7.7	11.5
	女子	高調音	5.4	8.9	0	1.8	10.7	10.7	5.4	5.4	12.5	10.7	17.9	10.7
		低調音	5.4	8.9	3.6	3.6	7.1	12.5	5.4	8.9	16.1	5.4	12.5	10.7
	男女平均	高調音	4.6	5.6	2.8	0.9	8.3	9.3	11.1	10.2	16.7	7.4	12.0	11.1
		低調音	4.6	5.6	7.4	3.7	5.6	13.0	8.8	12.0	15.8	2.8	10.2	11.1

第 8 表

ハルトマン・エーデルマン氏音叉列ニヨル量的聴力検査成績(%) (其1)

年 齡		性	側. 平均	音種	c	c ¹	c ²	c ³	c ⁴	g ³	c ⁴	g ⁴	c ⁵
60 歲代 女男 3133 名名	男 子	右	側		77.6	84.4	74.7	69.6	66.5	86.6	74.7	66.7	59.3
		左	側		80.8	88.4	75.8	70.9	66.5	84.6	67.4	61.7	58.5
		平	均		79.2	86.4	75.3	70.3	66.5	85.6	71.0	64.2	58.9
	女 子	右	側		72.1	72.8	64.7	58.3	61.9	77.4	67.7	64.2	59.3
		左	側		77.3	82.8	69.3	65.5	62.3	79.3	68.3	68.2	59.5
		平	均		74.7	77.8	67.0	61.9	62.1	78.3	65.5	63.7	59.4
	男 女 平 均				77.0	82.2	71.2	66.2	64.4	82.7	68.4	64.0	59.1
	70 歲代 男女子 5050 名名	70—74 歲 女男 2725 名名	男 子	右	側	52.1	66.3	68.6	61.6	56.1	68.4	60.7	54.6
左				側	60.5	65.7	66.4	60.2	54.3	69.4	59.6	50.1	46.0
平				均	60.0	52.1	67.5	60.9	55.2	68.9	60.2	52.3	51.9
女 子		右	側	59.4	69.5	65.7	62.6	57.0	69.8	64.3	61.8	57.9	
		左	側	58.7	66.1	65.2	59.3	58.6	66.9	60.3	58.3	53.3	
		平	均	59.0	67.8	65.4	60.9	55.3	68.3	62.3	59.5	55.6	
男 女 平 均				59.5	67.0	66.4	60.9	55.2	68.6	61.3	56.3	59.4	
75—79 歲 女男 2325 名名		男 子	右	側	36.5	48.1	48.6	38.8	37.1	42.2	38.5	31.2	28.3
			左	側	41.0	56.1	49.7	45.2	36.9	47.3	44.9	33.4	31.0
			平	均	38.8	56.1	49.1	42.0	37.0	44.7	41.7	32.3	29.6
		女 子	右	側	50.3	65.5	58.0	57.9	44.8	62.8	53.6	52.0	47.9
			左	側	50.6	42.5	65.0	61.1	50.6	69.9	53.3	51.1	48.7
			平	均	50.5	67.8	61.5	59.5	47.7	66.4	53.4	51.6	48.3
	男 女 平 均				44.0	59.9	55.1	50.4	42.1	60.3	47.3	41.5	39.1
	70 歲代全平均				52.2	63.4	61.0	55.9	48.8	62.1	53.1	49.2	46.0

80 歲以上 (女男子 2825 名名)	男 子	右 側	41.7	51.3	57.0	48.3	42.4	50.2	45.5	40.4	43.5
		左 側	46.8	51.6	60.5	49.7	40.3	47.5	45.1	40.1	36.2
		平 均	45.8	51.5	58.8	49.0	41.3	48.8	45.3	40.2	39.9
	女 子	右 側	32.7	42.5	41.5	42.8	37.4	36.8	43.1	47.0	44.7
		左 側	40.6	50.1	49.0	48.4	40.5	44.7	41.9	48.3	41.6
		平 均	36.7	46.3	45.3	45.7	38.9	40.8	42.5	47.7	43.1
	男 女 平 均		41.0	48.7	51.6	47.2	40.1	44.6	43.8	44.1	41.6

第 9 表

各年代ノ聾の聴力検査成績 (%) (其2)

年代、計	被検査者	c	c ¹	c ²	c ³	c ⁴	g ³	c ⁴	g ⁴	c ⁵
60歳代	64名	77.0	82.2	71.2	66.2	64.4	82.7	68.4	64.0	59.1
70—74歳	52名	59.5	67.0	66.4	60.9	55.2	68.6	61.3	56.3	52.4
75—79歳	48名	44.0	59.6	55.1	50.4	42.1	60.3	47.3	41.5	39.1
70歳代ノ計、平均	100名	52.2	63.4	61.0	55.9	48.8	62.1	53.1	49.2	46.0
80歳以上	53名	41.0	48.7	51.6	47.2	40.1	44.6	43.8	44.1	41.6
全被検査者	217名	56.8	65.3	61.7	56.8	51.3	63.9	55.3	52.3	48.8

第 10 表

下音界検査成績 (其1)
ベツオールド・エーデルマン連續音叉ニヨル

年齢	性	音階 例耳数 %	最低音階							低音階						
			C ₂	D ₂	E ₂	F ₂	G ₂	A ₂	H ₂	C ₁	D ₁	E ₁	F ₁	G ₁	A ₁	H ₁
60歳代	男子	例耳数	46	3	2	4	1	0	0	0 ————— 0						
		%	79.3	5.2	3.5	6.9	1.7	0	0	0 ————— 0						
	女子	例耳数	26	6	1	0	1	0	0	1 1 1 0 0 0 2						
		%	59.4	14.0	2.3	0	2.3	0	0	2.3 2.3 2.3 0 0 0 4.7						
70歳代	男子	例耳数	36	11	3	2	11	5	0	0 7 3 0 2 1 0						
		%	42.8	13.0	3.6	2.4	13.0	5.9	0	0 8.3 3.6 0 2.4 1.2 0						
	女子	例耳数	29	6	8	5	7	5	3	3 5 1 0 0 1 1						
		%	36.3	7.5	10.0	6.3	8.8	6.3	3.8	3.8 6.3 1.3 0 0 1.3 1.3						
80歳以上	男子	例耳数	4	0	1	5	12	4	0	1 4 3 1 2 2 0						
		%	8.3	0	2.1	10.4	25.0	8.3	0	2.1 8.3 6.3 2.1 4.2 4.2 0						
	女子	例耳数	2	0	1	5	12	1	0	2 6 2 0 1 7 0						
		%	4.0	0	2	10	26	2	0	4 12 4 0 2 14 0						

大 音 階							小 音 階							1 符音階	2 符 音 階						
C	D	E	F	G	A	H	c	d	e	f	g	a ^{ab}	h	c ¹ —h ¹	c ²	d ²	e ²	f ² —h ²			
0	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	0	0—0	0	—	—	—	—	—	—
0	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	0	0—0	0	—	—	—	—	—	—
0	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	0	0—0	1	1	1	0—0			
0	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	0	0—0	2.3	2.3	2.3	0—0			
0	—	—	—	—	—	0	0	2	0	—	—	—	0	0—0	0	0	1	0—0			
0	—	—	—	—	—	0	0	2.4	0	—	—	—	0	0—0	0	0	1.2	0—0			
1	0	1	0	—	—	0	0	2.4	0	—	—	—	0	0—0	0	—	—	—			
1.3	0	1.3	0	—	—	0	1.3	0	0	1.3	0	2.5	0	0—0	0	—	—	—			
0	—	—	—	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0—0	0	0	1	0—0			
0	—	—	—	0	2.1	0	0	0	4.2	0	0	0	2.1	0—0	0	0	2.1	0—0			
0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0—0	0	—	—	—			
0	0	0	2	2	0	0	0	0	8	0	0	2	0	0—0	0	—	—	—			

第 10 表

下音界検査成績 (其2)
ベツオールド・エーデルマン連續音叉ニヨル

年代 計	音 階 別 例耳 数 %	最 低 音 階							低 音 階						
		C ₂	D ₂	E ₂	F ₂	G ₂	A ₂	H ₂	C ₁	D ₁	E ₁	F ₁	G ₁	A ₁	H ₁
60代	例耳数	72	9	3	4	2	0	0	1	1	1	0	0	0	2
女男 2229 名名	百分比	70.6	8.0	2.9	3.9	2.0	0	0	1.0	1.0	1.0	0	0	0	2.0
70代	例耳数	65	17	11	7	18	10	3	3	12	4	0	2	2	1
女男 4042 名名	百分比	39.6	10.0	6.7	4.3	11.0	6.1	1.8	1.3	7.3	2.4	0	1.2	1.2	0.6
80以 歳上	例耳数	6	0	1	2	10	25	5	3	10	5	1	3	9	0
女男 2524 名名	百分比	6.1	0	1.0	2.0	10.2	25.5	5.1	3.1	10.2	5.1	1.0	3.1	9.2	0
全 検査 被者	例耳数	143	26	16	21	45	15	3	7	23	10	1	5	11	3
女男 8795 名名	百分比	39.3	7.1	4.4	5.7	12.4	4.1	0.8	1.9	6.3	2.7	0.3	1.4	3.0	0.8

大 音 階							小 音 階							1 符音階	2 符 音 階			
C	D	E	F	G	A	H	c	d	e	f	g	a	h	c ¹ ——h ¹	c ²	d ²	e ²	f ² ——h ²
0—————0							0—————0							0——0	1	1	1	0—0
0—————0							0—————0							0——0	1.0	1.0	1.0	0—0
1	0	1	0	—————0			1	2	0	1	0	2	0	0——0	0	0	1	0—0
0.6	0	0.6	0	—————0			0.6	1.2	0	0.6	0	1.2	0	0——0	0	0	0.6	0—0
0	0	0	1	2	0	0	0	0	6	0	0	1 ¹	1	0——0	0	0	1	0—0
0	0	0	1.0	2.0	0	0	0	0	6.1	0	0	1.0 ^{1.0}	1.0	0——0	0	0	1.0	0—0
1	0	1	1	2	0	0	1	2	6	1	0	3 ¹	1	0——0	1	1	3	0—0
0.3	0	0.3	0.3	0.5	0	0	0.3	0.5	1.6	0.3	0	0.8 ^{0.3}	0.3	0——0	0.3	0.3	0.3	0—0

第 11 表

ベツオールド・エーデルマン連続音又並ニガルトン笛ニヨル上音界検査成績 (其1)

年代 員數	音 階		5 符 音 階							6 符 音 階						
	性	音種別 例耳數 %	c ⁵	d ⁵	e ⁵	f ⁵	g ⁵	a ⁵	h ⁵	c ⁶	d ⁶	e ⁶	f ⁶	g ⁶	a ⁶	h ⁶
60 歳代 男子 2229 名	男	例耳數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	7	8	13	6
		%	0	0	0	0	0	0	0	1.7	3.5	0	12.2	13.9	22.6	10.4
	女	例耳數	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	8	6	1
		%	2.3	0	0	0	0	4.7	0	2.3	0	0	4.7	18.6	14.0	2.3
70 歳代 男子 4042 名	男	例耳數	0	0	0	0	0	1	1	8	12	5	7	22	16	12
		%	0	0	0	0	0	1.2	1.2	3.6	14.3	5.9	8.3	26.2	19.0	14.3
	女	例耳數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	17	9	11	15
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	10.0	2.5	21.3	11.3	13.8	13.8
80 以 上 男子 2524 名	男	例耳數	0	1	0	0	1	3	0	3	7	6	10	8	5	2
		%	0	2.1	0	0	2.1	6.3	0	6.3	14.6	12.5	20.8	16.6	10.4	4.2
	女	例耳數	0	0	0	0	0	1	2	2	5	11	16	10	2	1
		%	0	0	0	0	0	2	4	4	10	22	32	20	4	2

7 符 音 階						
c ⁷	d ⁷	e ⁷	f ⁷	g ⁷	a ⁷	h ⁷
3	5	7	4	2	0	0
5.2	8.7	12.2	7.0	3.5	0	0
3	0	13	6	0	0	0
7.0	0	30.2	14.0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0
4.6	1.2	0	0	0	0	0
11	7	0	0	0	0	0
13.8	8.8	0	0	0	0	0
0	2	0	0	0	0	0
0	4.2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

第 11 表
 ベツオールド・エーデルマン氏連續音叉並ニガルトン
 笛ニヨル上音界検査成績(其二)

年代 計	音 階	5 符 音 階						
	音別 例耳 数 %	c ⁵	d ⁵	e ⁵	f ⁵	g ⁵	a ⁵	h ⁵
60代 歳 (女男 2229 名名)	例 耳 数	1	0	0	0	0	2	0
	百 分 比	1.0	0	0	0	0	2.0	0
70代 歳 (女男 4042 名名)	例 耳 数	0	0	0	0	0	1	1
	百 分 比	0	0	0	0	0	0.6	0.6
80以 歳上 (女男 2524 名名)	例 耳 数	0	1	0	0	1	4	2
	百 分 比	0	1.0	0	0	1.0	4.1	2.0
全檢 被省 (女男 8795 名名)	例 耳 数	1	1	0	0	1	7	3
	百 分 比	0.3	0.3	0	0	0.3	1.9	0.8

6 符 音 階							7 符 音 階						
c ⁶	d ⁶	e ⁶	f ⁶	g ⁶	a ⁶	h ⁶	c ⁷	d ⁷	e ⁷	f ⁷	g ⁷	a ⁷	h ⁷
2	2	0	9	16	19	7	6	5	20	10	2	0	0
2.0	2.0	0	8.8	15.7	18.6	6.9	5.9	4.9	19.6	9.8	2.0	0	0
3	20	7	24	31	27	27	15	8	0	0	0	0	0
1.8	12.2	4.3	14.7	18.9	16.5	16.5	9.2	4.9	0	0	0	0	0
5	12	17	26	18	7	3	0	2	0	0	0	0	0
5.1	12.2	17.3	26.5	18.4	7.1	3.1	0	2.0	0	0	0	0	0
10	34	24	59	65	53	37	21	15	20	10	2	0	0
2.7	9.3	6.6	16.2	17.9	14.6	10.2	5.7	4.1	5.4	2.7	0.5	0	0

第 12 表

60 歳代廻轉性眼球震盪

種 別	性 別. 計	男 子 (30名)						女 子 (20名)						合計 (50名)	
	種 別. 計	右 廻		左 廻		計		右 廻		左 廻		計			
	時間. 數	例數%		例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比
		例數	百分比												
持 續 時 間 (秒)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1——10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.0	1	2.5	1	1.0
	11——20	8	26.7	8	26.7	16	26.7	3	15.0	1	5.0	4	10.0	20	20.0
	21——30	21	70.0	18	60.0	39	65.0	10	50.0	12	60.0	22	55.0	61	61.0
	31——40	1	3.3	4	13.3	5	8.3	7	35.0	6	30.0	13	32.5	18	18.0
	41——50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
震	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1——10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.0	1	2.5	1	0
	11——20	2	6.7	1	3.3	3	5.0	1	5.0	0	0	1	2.5	4	4.0
	21——30	1	3.3	1	3.3	2	3.3	0	0	1	5.0	1	2.5	3	3.0
	31——40	6	20.0	6	20.0	12	20.0	4	20.0	3	15.0	7	17.5	19	19.0
	41——50	9	30.0	4	13.3	13	21.7	3	15.0	2	10.0	5	12.5	18	18.0
	51——60	4	13.3	8	26.7	12	20.0	4	20.0	2	10.0	6	15.0	18	18.0
盪	61——70	6	20.0	4	13.3	10	16.7	3	15.0	2	10.0	5	12.5	15	15.0
	71——80	2	6.7	4	13.3	6	10.0	2	10.0	5	25.0	7	17.5	13	13.0
	81——90	0	0	2	6.7	2	3.3	0	0	2	10.0	2	5.0	4	4.0
數	91——100	0	0	0	0	0	0	3	15.0	2	10.0	5	12.5	5	5.0
	101——110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111——120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121——130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131——140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	141——150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70 歳代迴轉性眼球震盪

種 別	性 別. 計	男 子 (42名)						女 子 (26名)						合計 (68名)	
	種 別. 計 時間. 數	右 廻		左 廻		計		右 廻		左 廻		計			
		例數%	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比	例數		
持 續 時 間 (秒)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1——10	0	0	1	2.4	1	1.2	0	0	0	0	0	0	1	0.7
	11——20	8	19.0	9	21.4	17	20.2	6	23.1	4	15.4	10	19.2	27	19.9
	21——30	19	45.2	22	52.4	41	48.8	11	42.3	12	46.2	23	44.2	64	47.1
	31——40	14	33.3	7	16.7	21	25.0	6	23.1	9	34.6	15	28.8	36	26.5
	41——50	1	2.4	3	7.1	4	4.8	3	11.5	0	0	3	5.7	7	5.2
	51——60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.8	1	1.9	1	0.7
震 盪 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1——10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11——20	3	7.1	2	4.8	5	6.0	3	11.5	2	7.7	5	9.6	10	7.4
	21——30	5	11.9	7	16.7	12	14.2	4	15.4	6	23.1	10	19.2	22	16.2
	31——40	5	11.9	5	11.9	10	11.9	5	19.2	2	7.7	7	13.5	17	12.6
	41——50	7	16.7	6	14.2	13	15.5	6	23.1	7	26.9	13	25.0	26	19.2
	51——60	6	14.2	3	7.1	9	10.7	3	11.5	3	11.5	6	11.5	15	11.1
	61——70	6	14.2	7	16.7	13	15.5	2	7.7	5	19.2	7	13.5	20	14.7
	71——80	4	9.5	6	14.2	10	11.9	0	0	0	0	0	0	10	7.4
	81——90	3	7.1	1	2.4	4	4.7	0	0	0	0	0	0	4	2.9
	91——100	0	0	2	4.7	2	2.4	1	3.8	1	3.8	2	3.8	4	2.9
	101——110	1	2.4	0	0	1	1.2	2	7.7	0	0	2	3.8	3	2.2
	111——120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121——130	0	0	3	7.1	3	3.6	0	0	0	0	0	0	3	2.2
	131——140	2	4.7	0	0	2	2.4	0	0	0	0	0	0	2	1.5
	141——150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80 歳以上廻轉性眼球震盪

種 別	性 別. 計	男 子 (20名)						女 子 (21名)						合計 (41名)	
	種 別. 計	右 廻		左 廻		計		右 廻		左 廻		計			
	時間. 數	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比
持 續 時 間 (秒)	0	3	15.0	1	5.0	4	10.0	2	9.5	3	14.3	5	11.9	9	11.0
	1——10	0	0	1	5.0	1	2.5	0	0	0	0	0	0	1	1.2
	11——20	4	20.0	4	20.0	8	20.0	8	38.1	4	19.0	12	28.5	20	24.4
	21——30	8	40.0	12	60.0	20	50.0	8	38.1	9	42.8	17	40.5	37	45.1
	31——40	5	25.0	2	10.0	7	17.5	3	14.3	5	23.8	8	19.1	15	18.3
	41——50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51——60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
震	0	3	15.0	1	5.0	4	10.0	2	9.5	3	14.3	5	11.9	9	11.0
	1——10	0	0	1	5.0	1	2.5	0	0	1	4.8	1	2.4	2	2.4
	11——20	3	15.0	2	10.0	5	12.5	5	23.8	1	4.8	6	14.3	11	13.4
	21——30	1	5.0	4	20.0	5	12.5	2	9.5	2	9.5	4	9.5	9	11.0
	31——40	2	10.0	3	15.0	5	12.5	3	14.3	6	28.6	9	21.4	14	17.1
	41——50	5	25.0	2	10.0	7	17.5	6	28.6	4	19.0	10	23.8	17	20.7
	51——60	3	15.0	4	20.0	7	17.5	1	4.8	3	14.3	4	9.5	11	13.4
盪	61——70	1	5.0	1	5.0	2	5.0	1	4.8	1	4.8	2	4.8	4	4.9
	71——80	1	5.0	2	10.0	3	7.5	1	4.8	0	0	1	2.4	4	4.9
	81——90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
數	91——100	1	5.0	0	0	1	2.5	0	0	0	0	0	0	1	1.2
	101——110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111——120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121——130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131——140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	141——150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第 13 表

各年代迴轉性眼球震盪

種別	年代.計	60 歲 代		70 歲 代		80 歲 以 上		全 被 檢 者 (159名)	
	時間.數 例數.%	例 數	百 分 比	例 數	百 分 比	例 數	百 分 比	例 數	百 分 比
持 續 時 間 (秒)	0	0	0	0	0	9	11.0	9	2.8
	1—10	1	1.0	1	0.7	1	1.2	3	0.9
	11—20	20	20.0	27	19.9	20	24.4	67	21.1
	21—30	61	61.0	64	47.1	37	45.1	162	50.9
	31—40	18	18.0	36	23.5	15	18.3	69	21.7
	41—50	0	0	7	5.2	0	0	7	2.2
	51—60	0	0	1	0.7	0	0	1	0.3
震 盪 數	0	0	0	0	0	9	11.0	9	2.8
	1—10	1	1.0	0	0	2	2.4	3	0.9
	11—20	4	4.0	10	7.4	11	13.4	25	7.9
	21—30	3	3.0	22	16.2	9	11.0	34	10.7
	31—40	19	19.0	17	12.6	14	17.1	50	15.7
	41—50	18	18.0	23	19.2	17	20.7	61	19.2
	51—60	18	18.0	15	11.1	11	13.4	44	13.8
	61—70	15	15.0	20	14.7	4	4.9	39	12.3
	71—80	13	13.0	10	7.4	4	4.9	27	8.5
	81—90	4	4.0	4	2.9	0	0	8	2.5
	91—100	5	5.0	4	2.9	1	1.2	10	3.1
	101—110	0	0	3	2.2	0	0	3	0.9
	111—120	0	0	0	0	0	0	0	0
	121—130	0	0	3	2.2	0	0	3	0.9
	131—140	0	0	2	1.5	0	0	2	0.6
	141—150	0	0	0	0	0	0	0	0

第 14 表 60 歳代温熱性眼球震盪

冷温	反 應 別		著 明 發 現		發 現		發 現 ?		陰 性	
	性別 被檢 者數	例耳數 側計 平均 %	例 數	百分比	例 數	百分比	例 數	百分比	例 數	百分比
温	男 (27名)	右 耳	9	33.3	5	18.5	8	29.6	5	18.5
		左 耳	11	40.7	6	22.2	8	29.6	2	7.4
		計, 平均	20	37.0	11	20.3	16	29.6	7	12.0
水 (45°C)	女 (27名)	右 耳	15	55.6	7	25.9	3	11.1	2	7.4
		左 耳	20	74.1	5	18.5	1	3.7	1	3.7
		計, 平均	35	64.9	12	22.2	4	7.4	3	5.6
	男女左右平均計		55	50.9	23	21.3	20	18.5	10	9.3
冷	男 (27名)	右 耳	20	74.1	4	14.8	2	7.4	1	3.7
		左 耳	19	70.4	4	14.8	4	14.8	0	0
		計, 平均	39	72.3	8	14.8	6	11.1	1	1.9
水 (18°C)	女 (27名)	右 耳	24	88.9	1	3.7	2	7.4	0	0
		左 耳	25	92.6	2	7.4	0	0	0	0
		計, 平均	49	90.7	3	5.6	2	3.7	0	0
	男女左右ノ計平均		88	81.5	11	10.2	8	7.4	1	0.9

70 歳代温熱性眼球震盪

冷温	反 應 別		著 明 發 現		發 現		發 現 ?		陰 性	
	性別 被檢 者數	例耳數 側計 平均 %	例 數	%	例 數	%	例 數	%	例 數	%
温	男 (39名)	右 耳	16	41.0	9	23.1	9	23.1	5	12.8
		左 耳	15	38.5	14	35.9	4	10.3	6	15.4
		計, 平均	31	39.7	23	29.5	13	16.7	11	14.1
水 (45°C)	女 (34名)	右 耳	6	17.6	8	23.5	6	17.6	14	41.2
		左 耳	8	23.5	4	11.8	9	26.4	13	38.2
		計, 平均	14	20.6	12	17.6	15	22.1	27	39.7
	男女ノ計及平均		45	30.8	35	24.0	28	19.1	38	26.0
冷	男 (39名)	右 耳	27	69.2	7	17.9	5	12.8	0	0
		左 耳	27	69.2	7	17.9	4	10.3	1	2.6
		計, 平均	54	69.2	14	17.9	9	11.5	1	1.3
水 (18°C)	女 (34名)	右 耳	23	67.9	5	14.7	4	11.8	2	5.9
		左 耳	20	58.8	7	20.6	5	14.7	2	5.9
		計, 平均	43	63.2	12	17.6	9	13.2	4	5.9
	男女ノ計及平均		97	66.4	26	17.8	18	12.3	5	3.4

80 歳以上温熱性眼球震盪

冷温	反 應 別		著 明 發 現		發 現		發 現 ?		陰 性	
	性別 被檢者數	側計 平均 例耳數 %	例 數	百 分 比	例 數	百 分 比	例 數	百 分 比	例 數	百 分 比
温 水 (45°C)	男 (20名)	右 耳	8	40.0	3	15.0	6	30.0	3	15.0
		左 耳	7	35.0	2	10.0	8	40.0	3	15.0
		計. 平均	15	37.5	5	12.5	14	35.0	6	15.0
	女 (17名)	右 耳	4	23.5	5	29.4	5	29.4	3	17.6
		左 耳	6	35.3	4	23.5	4	23.5	3	17.6
		計. 平均	10	29.4	9	23.5	9	23.5	6	17.6
	男女ノ計及ビ平均		25	33.8	14	18.9	23	31.1	12	16.2
	男 (20名)	右 耳	12	60.0	4	20.0	3	15.0	1	5.0
		左 耳	11	55.0	3	15.0	4	20.0	2	10.0
		計. 平均	23	57.5	7	17.5	7	17.5	3	7.5
水 (18°C)	女 (16名)	右 耳	12	75.0	2	12.5	0	0	2	12.5
		左 耳	10	62.5	1	6.3	4	25.0	1	6.3
		計. 平均	22	68.8	3	9.4	4	12.5	3	9.4
	男女ノ計及ビ平均		45	62.5	10	13.9	11	15.3	6	8.3

第 15 表
各 年 代 温 熱 性 眼 球 震 盪

冷温	反 應 別		著 明 發 現		發 現		發 現 ?		陰 性	
	年代 計	被檢者數 例耳數 百分比	例 數	%	例 數	%	例 數	%	例 數	%
温 水 (45°C)	60歳代	54 名	55	50.9	23	21.3	20	18.5	10	9.3
	70歳代	73 名	45	30.8	35	24.0	28	19.1	38	23.0
	80 歳以上被檢者	37 名	25	33.8	14	18.9	23	31.1	12	16.2
	全被檢者	161 名	125	38.1	72	22.0	71	21.6	60	18.3
冷 水 (18°C)	60歳代	54 名	88	81.5	11	10.2	8	7.4	1	0.9
	70歳代	73 名	97	66.4	26	17.8	18	12.3	5	3.4
	80 歳以上被檢者	36 名	45	62.5	10	13.9	11	15.3	6	8.3
	全被檢者	163 名	230	70.6	47	14.4	37	11.3	12	3.7

第 16 表
60 歳代温熱性眼球震盪 (冷刺激)

種 別	性 別 計	男 子 (27名)						女 子 (27名)						合計(54名)	
	側 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳數 百分比	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
	時間(秒)														
潛 伏 時 間	0	1	3.7	0	0	1	1.9	0	0	0	0	0	0	1	0.9
	1——10	0	0	0	0	0	0	1	3.7	0	0	1	1.9	1	0.9
	11——20	5	18.5	6	22.2	11	20.4	14	51.9	12	44.4	26	48.1	37	34.3
	21——30	14	51.9	10	37.0	24	44.4	9	33.3	12	44.4	21	38.9	45	41.7
	31——40	4	14.8	6	22.2	10	18.5	0	0	2	7.4	2	3.7	12	11.1
	41——50	2	7.4	3	11.1	5	9.3	2	7.4	0	0	2	3.7	7	6.5
	51——60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.7	1	1.9	1	0.9
	61——70	0	0	1	3.7	1	1.9	0	0	0	0	0	0	1	0.9
	71——80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	81——90	1	3.7	0	0	1	1.9	1	3.7	0	0	1	1.9	2	1.9
	91——100	0	0	1	3.7	1	1.9	0	0	0	0	0	0	1	0.9

70 歳代温熱性眼球震盪 (冷刺激)

種 別	性 別 計	男 子 (39名)						女 子 (34名)						合計(73名)	
	側 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳数 百分比	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%		
	時間(秒)														
潛 伏 時 間	0	0	0	1	2.6	1	1.3	2	5.9	2	5.9	4	5.9	5	3.4
	1——10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11——20	6	15.4	8	20.5	14	17.9	9	17.6	9	26.5	15	22.1	29	19.9
	21——30	10	41.0	13	33.3	29	37.2	8	23.5	8	23.5	16	23.5	45	30.8
	31——40	9	23.1	10	25.6	19	24.4	9	26.5	3	8.8	12	17.6	31	21.3
	41——50	3	7.7	4	10.3	7	9.0	6	17.6	6	17.6	12	17.6	19	13.0
	51——60	2	5.1	1	2.6	3	3.8	1	2.9	4	11.8	5	7.4	8	5.5
	61——70	0	0	1	2.6	1	1.3	2	5.9	1	2.9	3	4.4	4	2.7
	71——80	1	2.6	0	0	1	1.3	0	0	0	0	0	0	1	0.7
	81——90	2	5.1	0	0	2	2.6	0	0	0	0	0	0	2	1.4
	91——100	0	0	1	2.6	1	1.3	0	0	1	2.9	1	1.5	2	1.4

80 歳以上温熱性眼球震盪 (冷刺激)

種 別	性 別 計	男 子 (20名)						女 子 (16名)						合計(36名)	
	側 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳数 百分比	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
	時間(秒)														
潛 伏 時 間	0	1	5.0	1	5.0	2	5.0	2	12.5	1	6.3	3	9.4	5	6.9
	1——10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11——20	4	20.0	3	15.0	7	17.5	2	12.5	1	6.3	3	9.4	10	14.9
	21——30	9	45.0	7	35.0	16	40.0	6	37.5	8	50.0	14	43.8	30	41.7
	31——40	3	15.0	4	20.0	7	17.5	4	25.0	2	12.5	6	18.8	13	18.1
	41——50	0	0	3	15.0	3	7.5	1	6.3	2	12.5	3	9.4	6	8.3
	51——60	1	5.0	1	5.0	2	5.0	1	6.3	0	0	1	3.1	3	4.2
	61——70	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3	1	3.1	1	1.4
	71——80	1	5.0	0	0	1	2.5	0	0	0	0	0	0	1	1.4
	81——90	1	5.0	0	0	1	2.5	0	0	1	6.3	1	3.1	2	2.8
91——100	0	0	1	5.0	1	2.5	0	0	0	0	0	0	1	1.4	

第 17 表

各年代温熱性眼球震盪 (冷刺激)

種別	年 代 計	60 歳 代		70 歳 代		80 歳 以 上		全 被 検 者 (163名)	
	例耳数 百分比	例 数	%	例 数	%	例 数	%	例 数	%
	時間(秒)								
潜 伏 時 間	0	1	0.9	5	3.4	5	6.9	11	3.4
	1—10	1	0.9	0	0	0	0	1	0.3
	11—20	37	34.3	29	19.9	10	13.9	76	23.3
	21—30	45	41.7	45	30.8	30	41.7	120	36.8
	31—40	12	11.1	31	21.3	13	18.1	56	17.2
	41—50	7	6.5	19	13.0	6	8.3	32	9.8
	51—60	1	0.9	8	5.5	3	4.2	12	3.7
	61—70	1	0.9	4	2.7	1	1.4	6	1.8
	71—80	0	0	1	0.7	1	1.4	2	0.6
	81—90	2	1.9	2	1.4	2	2.8	6	1.8
	91—100	1	0.9	2	1.4	1	1.4	4	1.2

第 18 表

60 歳代温熱性眼球震盪 (冷刺激)

種 別	性 別 計	男 子 (27名)						女 子 (27名)						合計(54名)	
	側 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳數 百分比 時間(秒)	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
持	0	1	3.7	0	0	1	1.9	0	0	0	0	0	0	1	0.9
	1——10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11——20	1	3.7	1	3.7	2	3.7	1	3.7	0	0	1	1.9	3	2.8
	21——30	0	0	3	11.1	3	5.6	0	0	0	0	0	0	3	2.8
	31——40	4	14.8	4	14.8	8	14.8	1	3.7	0	0	1	1.9	9	8.3
	41——50	2	7.4	1	3.7	3	5.6	0	0	0	0	0	0	3	2.8
續	51——60	2	7.4	0	0	2	3.7	0	0	1	3.7	1	1.9	3	2.8
	61——70	4	14.8	6	22.2	10	18.5	1	3.7	3	11.1	4	7.4	14	13.0
	71——80	2	7.4	2	7.4	4	7.4	2	7.4	0	0	2	3.7	6	5.6
	81——90	2	7.4	2	7.4	4	7.4	1	3.7	2	7.4	3	5.6	7	6.5
	91——100	0	0	2	7.4	2	3.7	2	7.4	2	7.4	4	7.4	6	5.6
	101——110	5	18.5	1	3.7	6	11.1	3	11.1	2	7.4	5	9.3	11	10.2
時	111——120	1	3.7	0	0	1	1.9	3	11.1	4	14.8	7	13.0	8	7.4
	121——130	3	11.1	2	7.4	5	9.3	2	7.4	2	7.4	4	7.4	9	8.3
	131——140	0	0	0	0	0	0	2	7.4	0	0	2	3.7	2	1.9
	141——150	0	0	0	0	0	0	6	22.2	4	14.8	10	18.5	10	9.3
	151——160	0	0	2	7.4	2	3.7	1	3.7	3	11.1	4	7.4	6	5.6
	161——170	0	0	0	0	0	0	1	3.7	3	11.1	4	7.4	4	3.7
間	171——180	0	0	1	3.7	1	1.9	0	0	0	0	0	0	1	0.9
	181——210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211——240	0	0	0	0	0	0	1	3.7	0	0	1	1.9	1	0.9
	241——270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	271——300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	301——360	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.7	1	1.9	1	0.9

70 歳代溫熱性眼球震盪 (冷刺激)

種 別	性 別 計	男 子 (39名)						女 子 (34名)						合計(73名)	
	側 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳数 百分比	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
	時間(秒)														
持	0	0	0	1	2.6	1	1.3	2	5.9	2	5.9	4	5.9	5	3.4
	1——10	2	5.1	0	0	2	2.6	0	0	1	2.9	1	1.5	3	2.1
	11——20	4	10.3	3	7.7	7	9.0	1	2.9	1	2.9	2	2.9	9	6.2
	21——30	1	2.6	3	7.7	4	5.1	1	2.9	1	2.9	2	2.9	6	4.1
	31——40	1	2.6	2	5.1	3	3.8	4	11.8	3	8.8	7	10.3	10	6.8
	41——50	3	7.7	3	7.7	6	7.7	4	11.8	5	14.7	9	13.2	15	10.3
續	51——60	7	17.9	7	17.9	14	17.9	4	11.8	1	2.9	5	7.4	19	13.0
	61——70	5	12.8	4	10.3	9	11.5	3	8.8	4	11.8	7	10.3	16	11.0
	71——80	5	12.8	2	5.1	7	9.0	5	14.7	4	11.8	9	13.2	16	11.0
	81——90	4	10.3	5	12.8	9	11.5	4	11.8	3	8.8	7	10.3	16	11.0
	91——100	1	2.6	3	7.7	4	5.1	3	8.8	3	8.8	6	8.8	10	6.8
	101——110	0	0	0	0	0	0	2	5.9	2	5.9	4	5.9	4	2.7
時	111——120	1	2.6	1	2.6	2	2.6	0	0	0	0	0	0	2	1.4
	121——130	2	5.1	1	2.6	3	3.8	1	2.9	3	8.8	4	5.9	7	4.8
	131——140	1	2.6	2	5.1	3	3.8	0	0	0	0	0	0	3	2.1
	141——150	1	2.6	0	0	1	1.3	0	0	0	0	0	0	1	0.7
	151——160	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.9	1	1.5	1	0.7
	161——170	1	2.6	0	0	1	1.3	0	0	0	0	0	0	1	0.7
間	171——180	0	0	2	5.1	2	2.6	0	0	0	0	0	0	2	1.4
	181——210														
	211——240														
	241——270														
	271——300														

80 歳以上温熱性眼球震盪 (冷刺激)

種 別	性 別. 計	男 子 (20名)						女 子 (16名)						合計(36名)	
	側 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳數 百分比 時間(秒)	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
持 續	0	1	5.0	1	5.0	2	5.0	2	12.5	1	6.3	3	9.4	5	6.9
	1——10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11——20	1	5.0	2	10.0	3	7.5	1	6.3	2	12.5	3	9.4	6	8.3
	21——30	2	10.0	4	20.0	6	15.0	0	0	2	12.5	2	6.3	8	11.1
	31——40	2	10.0	0	0	2	5.0	0	0	0	0	0	0	2	2.8
	41——50	2	10.0	0	0	2	5.0	4	25.0	1	6.3	5	15.6	7	9.7
	51——60	3	15.0	4	20.0	7	17.5	1	6.3	0	0	1	3.1	8	11.1
	61——70	2	10.0	3	15.0	5	12.5	0	0	4	25.0	4	12.5	9	12.5
	71——80	4	20.0	4	20.0	8	20.0	4	25.0	2	12.5	6	18.8	14	19.4
	81——90	2	10.0	0	0	2	5.0	1	6.3	1	6.3	2	6.3	4	5.6
	91——100	0	0	0	0	0	0	1	6.3	0	0	1	3.1	1	1.4
	101——110	0	0	1	5.0	1	2.5	0	0	1	6.3	1	3.1	2	2.8
時 間	111——120	0	0	0	0	0	0	2	12.5	1	6.3	3	9.4	3	4.2
	121——130	0	0	1	5.0	1	2.5	0	0	0	0	0	0	1	1.4
	131——140	1	5.0	0	0	1	2.5	0	0	0	0	0	0	1	1.4
	141——150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	151——160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	161——170	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3	1	3.1	1	1.4
	171——180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	181——210														
	211——240														
	241——270														
	271——300														

第 19 表

各年代温熱性眼球震盪 (冷刺激)

種別	年代.計	60 歳 代		70 歳 代		80 歳 以 上		合計 (163名)	
	時間(秒) 例耳數 百分比	例 數	%	例 數	%	例 數	%	例 數	%
持	0	1	0.9	5	3.4	5	6.9	11	3.4
	1——10	0	0	3	2.1	0	0	3	0.9
	11——20	3	2.8	9	6.2	6	8.3	18	5.5
	21——30	3	2.8	6	4.1	8	11.1	17	5.2
	31——40	9	8.3	10	6.8	2	2.8	21	6.4
	41——50	3	2.8	15	10.3	7	9.7	25	7.6
	51——60	3	2.8	19	13.0	8	11.1	30	9.2
	61——70	14	13.0	16	11.0	9	12.5	39	11.9
	71——80	6	5.6	16	11.0	14	19.4	36	11.0
	81——90	7	6.5	16	11.0	4	5.6	27	8.3
續	91——100	6	5.6	10	6.8	1	1.4	17	5.2
	101——110	11	10.2	4	2.7	2	2.8	17	5.2
	111——120	8	7.4	2	1.4	3	4.2	13	4.0
	121——130	9	8.3	7	4.8	1	1.4	17	5.2
	131——140	2	1.9	3	2.1	1	1.4	6	1.8
	141——150	10	9.3	1	0.7	0	0	11	3.4
	151——160	6	5.6	1	0.7	0	0	7	2.1
	161——170	4	3.7	1	0.7	1	1.4	6	1.8
	171——180	1	0.9	2	1.4	0	0	3	0.9
	181——210	0	0	0	0	0	0	0	0
時	211——240	1	0.9	0	0	0	0	1	0.3
	241——270	0	0	0	0	0	0	0	0
	271——300	0	0	0	0	0	0	0	0
	301——360	1	0.9	0	0	0	0	1	0.3

第 20 表

60 歳代温熱性眼球震盪 (冷刺戟)

種 別	性 別. 計	男 子 (27名)						女 子 (27名)						合計(54名)	
	側. 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳數 數百分比	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
震	0	1	3.7	0	0	1	1.9	0	0	0	0	0	0	1	0.9
	1——10	1	3.7	0	0	1	1.9	2	7.4	0	0	2	3.7	3	2.8
	11——20	3	11.1	6	22.2	9	16.7	0	0	0	0	0	0	9	8.3
	21——30	2	7.4	2	7.4	4	7.4	0	0	1	3.7	1	1.9	5	4.6
	31——40	2	7.4	1	3.7	3	5.6	0	0	3	11.1	3	5.6	6	5.6
	41——50	4	14.8	2	7.4	6	11.1	1	3.7	0	0	1	1.9	7	6.5
	51——60	1	3.7	3	11.1	4	7.4	1	3.7	0	0	1	1.9	5	4.6
	61——70	1	3.7	1	3.7	2	3.7	2	7.4	2	7.4	4	7.4	6	5.6
	71——80	1	3.7	1	3.7	2	3.7	2	7.4	1	3.7	3	5.6	5	4.6
	81——90	1	3.7	0	0	1	1.9	1	3.7	1	3.7	2	3.7	3	2.8
	91——100	1	3.7	0	0	1	1.9	2	7.4	0	0	2	3.7	3	2.8
盪	101——110	1	3.7	3	11.1	4	7.4	1	3.7	2	7.4	3	5.6	7	6.5
	111——120	0	0	1	3.7	1	1.9	3	11.1	1	3.7	4	7.4	5	4.6
	121——130	1	3.7	1	3.7	2	3.7	1	3.7	0	0	1	1.9	3	2.8
	131——140	2	7.4	1	3.7	3	5.6	2	7.4	2	7.4	4	7.4	7	6.5
	141——150	1	3.7	2	7.4	3	5.6	0	0	1	3.7	1	1.9	4	3.7
數	151——160	0	0	1	3.7	1	1.9	0	0	3	11.1	3	5.6	4	3.7
	161——170	1	3.7	1	3.7	2	3.7	0	0	0	0	0	0	2	1.9
	171——180	2	7.4	0	0	2	3.7	0	0	0	0	0	0	2	1.9
	181——190	1	3.7	0	0	1	1.9	2	7.4	1	3.7	3	5.6	4	3.7
	191——200	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7.4	2	3.7	2	1.9
	201——250	0	0	1	3.7	1	1.9	2	7.4	2	7.4	4	7.4	5	4.6
	251——300	0	0	0	0	0	0	4	14.8	2	7.4	6	11.1	6	5.6
	301——350	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11.1	3	5.6	3	2.8
	351——400	0	0	0	0	0	0	1	3.7	0	0	1	1.9	1	0.9

70 歳代温熱性眼球震盪 (冷刺激)

種 別	性 別 計	男 子 (39名)						女 子 (34名)						合計(73名)	
	側 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳數 數 百分比	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
震	0	0	0	1	2.6	1	1.3	2	5.9	2	5.9	4	5.9	5	3.4
	1——10	5	12.8	2	5.1	7	9.0	2	5.9	3	8.8	5	7.4	12	8.2
	11——20	3	7.7	4	10.3	7	9.0	2	5.9	3	8.8	5	7.4	12	8.2
	21——30	0	0	2	5.1	2	2.6	1	2.9	4	11.8	5	7.4	7	4.8
	31——40	5	12.8	3	7.7	8	10.3	5	14.7	2	5.9	7	10.3	15	10.3
	41——50	2	5.1	3	7.7	5	6.4	1	2.9	2	5.9	3	4.4	8	5.5
	51——60	4	10.3	3	7.7	7	9.0	1	2.9	1	2.9	2	2.9	9	6.2
	61——70	2	5.1	5	12.8	7	9.0	3	8.8	2	5.9	5	7.4	12	8.2
	71——80	1	2.6	1	2.6	2	2.6	4	11.8	1	2.9	5	7.4	7	4.8
	81——90	1	2.6	1	2.6	2	2.6	1	2.9	1	2.9	2	2.9	4	2.7
盪	91——100	3	7.7	0	0	3	3.8	3	8.8	1	2.9	4	5.9	7	4.8
	101——110	0	0	1	2.6	1	1.3	0	0	1	2.9	1	1.5	2	1.4
	111——120	3	7.7	1	2.6	4	5.1	1	2.9	3	8.8	4	5.9	8	5.5
	121——130	1	2.6	1	2.6	2	2.6	0	0	1	2.9	1	1.5	3	2.1
	131——140	1	2.6	2	5.1	3	3.8	2	5.9	0	0	2	2.9	5	3.4
	141——150	1	2.6	1	2.6	2	2.6	1	2.9	0	0	1	1.5	3	2.1
	151——160	2	5.1	0	0	2	2.6	1	2.9	0	0	1	1.5	3	2.1
	161——170	1	2.6	3	7.7	4	5.1	1	2.9	1	2.9	2	2.9	6	4.1
	171——180	0	0	1	2.6	1	1.3	0	0	1	2.9	1	1.5	2	1.4
	181——190	0	0	1	2.6	1	1.3	0	0	0	0	0	0	1	0.7
數	191——200	0	0	0	0	0	0	2	5.9	1	2.9	3	4.4	3	2.1
	201——250	2	5.1	0	0	2	2.6	1	2.9	4	11.8	5	7.4	7	4.8
	251——300	2	5.1	1	2.6	3	3.8	0	0	0	0	0	0	3	2.1
	301——350	0	0	2	5.1	2	2.6	0	0	0	0	0	0	2	1.4
	351——400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80 歳以上溫熱性眼球震盪 (冷刺激)

種 別	性 別 計	男 子 (20名)						女 子 (16名)						合計 (36名)	
	側 計	右 耳 左 耳 計						右 耳		左 耳		計			
	例耳數 數 百分比	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
震	0	1	5.0	1	5.0	2	5.0	2	12.5	1	6.3	3	9.4	5	6.9
	1——10	1	5.0	1	5.0	2	5.0	0	0	0	0	0	0	2	2.8
	11——20	3	15.0	4	20.0	7	17.5	1	6.3	3	18.8	4	12.5	11	15.3
	21——30	1	5.0	3	15.0	4	10.0	0	0	2	12.5	2	6.3	6	8.3
	31——40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41——50	2	10.0	0	0	2	5.0	1	6.3	0	0	1	3.1	3	4.2
	51——60	1	5.0	1	5.0	2	5.0	3	18.8	0	0	3	9.4	5	6.9
	61——70	3	15.0	2	10.0	5	12.5	0	0	0	0	0	0	5	6.9
	71——80	1	5.0	0	0	1	2.5	0	0	0	0	0	0	1	1.4
	81——90	0	0	1	5.0	1	2.5	2	12.5	2	12.5	4	12.5	5	6.9
盪	91——100	1	5.0	1	5.0	2	5.0	0	0	0	0	0	0	2	2.8
	101——110	1	5.0	1	5.0	2	5.0	0	0	1	6.3	1	3.1	3	4.2
	111——120	1	5.0	2	10.0	3	7.5	1	6.3	0	0	1	3.1	4	5.6
	121——130	0	0	0	0	0	0	2	12.5	1	6.3	3	9.4	3	4.2
	131——140	1	5.0	1	5.0	2	5.0	1	6.3	1	6.3	2	6.3	4	5.6
	141——150	0	0	1	5.0	1	2.5	0	0	0	0	0	0	1	1.4
	151——160	1	5.0	0	0	1	2.5	0	0	0	0	0	0	1	1.4
	161——170	2	10.0	0	0	2	5.0	1	6.3	1	6.3	2	6.3	4	5.6
	171——180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	181——190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
數	191——200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	201——250	0	0	1	5.0	1	2.5	1	6.3	2	12.5	3	9.4	4	5.6
	251——300	0	0	0	0	0	0	1	6.3	1	6.3	2	6.3	2	2.8
	301——350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	351——400	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3	1	3.1	1	1.4

第 21 表

各年代溫熱性眼球震盪 (冷刺激)

種別	年代計	60 歳代		70 歳代		80 歳以上		合計 (163名)		
	例耳数 数 百分比	例 数	%	例 数	%	例 数	%	例 数	%	
震	0	1	0.9	5	3.4	5	6.9	11	3.4	VII
	1—10	3	2.8	12	8.2	2	2.8	17	5.2	
	11—20	9	8.3	12	8.2	11	15.3	32	9.8	VI
	21—30	5	4.6	7	4.8	6	8.3	18	5.5	
	31—40	6	5.6	15	10.3	0	0	21	6.4	III
	41—50	7	6.5	8	5.5	3	4.2	18	5.5	
	51—60	5	4.6	9	6.2	5	6.9	19	5.8	I
	61—70	6	5.6	12	8.2	5	6.9	23	7.1	
	71—80	5	4.6	7	4.8	1	1.4	13	4.0	
	81—90	3	2.8	4	2.7	5	6.9	12	3.7	
	91—100	3	2.8	7	4.8	2	2.8	12	3.7	
盪	101—110	7	6.5	2	1.4	3	4.2	12	3.7	II
	111—120	5	4.6	8	5.5	4	5.6	17	5.2	
	121—130	3	2.8	3	2.1	3	4.2	9	2.8	
	131—140	7	6.5	5	3.4	4	5.6	16	4.9	
	141—150	4	3.7	3	2.1	1	1.4	8	2.5	
	151—160	4	3.7	3	2.1	1	1.4	8	2.5	V
	161—170	2	1.9	6	4.1	4	5.6	12	3.7	
	171—180	2	1.9	2	1.4	0	0	4	1.2	
	181—190	4	3.7	1	0.7	0	0	5	1.5	
	191—200	2	1.9	3	2.1	0	0	5	1.5	
数	201—250	4	3.7	7	4.8	4	5.6	15	4.6	VI
	251—300	6	5.6	3	2.1	2	2.8	11	3.4	
	301—350	3	2.8	2	1.4	0	0	5	1.5	
	351—400	1	0.9	0	0	1	1.4	2	0.6	

第 22 表

60 歳代温熱性眼球震盪 (温刺激)

種 別	性 別. 計	男 子 (27名)						女 子 (27名)						合計(54名)	
	側. 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳數 時間(秒) 百分比	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
潛 伏	0	5	18.5	2	7.4	7	18.0	2	7.4	1	3.7	3	5.6	10	9.3
	1——10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11——20	0	0	2	7.4	2	3.7	1	3.7	3	11.1	4	7.4	6	5.6
	21——30	11	40.7	6	22.2	17	31.5	14	51.9	16	59.3	30	55.6	47	43.5
	31——40	3	11.1	5	18.5	8	14.8	5	18.5	4	14.8	9	16.7	17	15.7
	41——50	3	11.1	2	7.4	5	9.3	2	7.4	1	3.7	3	5.6	8	7.4
	51——60	0	0	1	3.7	1	1.9	1	3.7	1	3.7	2	3.7	3	2.8
時 間	61——70	1	3.7	5	18.5	6	11.1	1	3.7	1	3.7	2	3.7	8	7.4
	71——80	0	0	0	0	0	0	1	3.7	0	0	1	1.9	1	0.9
	81——90	1	3.7	2	7.4	3	5.6	0	0	0	0	0	0	3	2.8
	91——100	1	3.7	0	0	1	1.9	0	0	0	0	0	0	1	0.9
	101——110	0	0	1	3.7	1	1.9	0	0	0	0	0	0	1	0.9
	111——120	1	3.7	1	3.7	2	3.7	0	0	0	0	0	0	2	1.9
	121——130	1	3.7	0	0	1	1.9	0	0	0	0	0	0	1	0.9

70 歳代温熱性眼球震盪 (温刺激)

種 別	性 別. 計	男 子 (39名)						女 子 (34名)						合計(73名)	
	側. 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳数 時間(秒) 百分比	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
潛 伏	0	5	12.8	6	15.4	11	14.1	14	41.2	13	38.2	27	39.7	38	26.0
	1——10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11——20	2	5.1	1	2.6	3	3.8	0	0	0	0	0	0	3	2.1
	21——30	6	15.4	7	17.9	13	16.7	8	23.5	3	8.8	11	16.2	24	16.4
	31——40	13	33.3	13	33.3	26	33.3	5	14.7	4	11.8	9	13.2	35	24.0
	41——50	4	10.3	7	17.9	11	14.1	1	2.9	5	14.7	6	8.8	17	11.6
	51——60	3	7.7	2	5.1	5	6.4	2	5.9	4	11.8	6	8.8	11	7.5
時 間	61——70	4	10.3	1	2.6	5	6.4	0	0	1	2.9	1	1.5	6	4.1
	71——80	0	0	1	2.6	1	1.3	1	2.9	1	2.9	2	2.9	3	2.1
	81——90	0	0	0	0	0	0	1	2.9	1	2.9	2	2.9	2	1.4
	91——100	1	2.6	0	0	1	1.3	0	0	1	2.9	1	1.5	2	1.4
	101——110	1	2.6	1	2.6	2	2.6	1	2.9	1	2.9	2	2.9	4	2.7
	111——120	0	0	0	0	0	0	1	2.9	0	0	1	1.5	1	0.7
	121——130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80 歳以上温熱性眼球震盪 (温刺激)

種 別	性 別. 計	男 子 (20名)						女 子 (17名)						合計(37名)	
	側. 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳數 百分比 時間(秒)	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
潛 伏	0	3	15.0	3	15.0	6	15.0	3	17.6	3	17.6	6	17.6	12	16.2
	1——10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11——20	2	10.0	1	5.0	3	7.5	0	0	1	5.9	1	2.9	4	5.4
	21——30	4	20.0	6	30.0	10	25.0	4	23.5	4	23.5	8	23.5	18	24.3
	31——40	4	20.0	2	10.0	6	15.0	2	11.8	6	35.3	8	23.5	14	18.9
	41——50	3	15.0	1	5.0	4	10.0	3	17.6	1	5.9	4	11.8	8	10.8
	51——60	1	5.0	2	10.0	3	7.5	1	5.9	0	0	1	2.9	4	5.4
時 間	61——70	0	0	2	10.0	2	5.0	3	17.6	0	0	3	8.8	5	6.8
	71——80	1	5.0	0	0	1	2.5	0	0	2	11.8	2	5.9	3	4.1
	81——90	2	10.0	2	10.0	4	10.0	0	0	0	0	0	0	4	5.4
	91——100	0	0	1	5.0	1	2.5	1	5.9	0	0	1	2.9	2	2.7
	101——110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111——120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121——130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第 23 表

各年代温熱性眼球震盪 (温刺激)

種別	年 代. 計	60 歳 代		70 歳 代		80 歳 以上		全 被 検 者 (164名)	
	時間(秒) 例耳数 百分比	例 数	%	例 数	%	例 数	%	例 数	%
潜 伏	0	10	9.3	38	26.0	12	16.2	60	18.3
	1—10	0	0	0	0	0	0	0	0
	11—20	6	5.6	3	2.1	4	5.4	13	4.0
	21—30	47	43.5	24	16.4	18	24.3	89	27.1
	31—40	17	15.7	35	24.0	14	18.9	66	20.1
	41—50	8	7.4	17	11.6	8	10.8	33	10.1
	51—60	3	2.8	11	7.5	4	5.4	18	5.5
時 間	61—70	8	7.4	6	4.1	5	6.8	19	5.8
	71—80	1	0.9	3	2.1	3	4.1	7	2.1
	81—90	3	2.8	2	1.4	4	5.4	9	2.7
	91—100	1	0.9	2	1.4	2	2.7	5	1.5
	101—110	1	0.9	4	2.7	0	0	5	1.5
	111—120	2	1.9	1	0.7	0	0	3	0.9
	120—130	1	0.9	0	0	0	0	1	0.3

第 24 表

60 歳代温熱性眼球震盪 (温刺激)

種 別	性 別 計	男 子 (27名)						女 子 (27名)						合計(54名)	
	側 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳數 時間(秒) 百分比	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
持 續	0	5	18.5	2	7.4	7	13.0	2	7.4	1	3.7	3	5.6	10	9.3
	1——10	2	7.4	0	0	2	3.7	0	0	0	0	0	0	2	1.9
	11——20	3	11.1	3	11.1	6	11.1	2	7.4	0	0	2	3.7	8	7.4
	21——30	3	11.1	2	7.4	5	9.3	0	0	0	0	0	0	5	4.6
	31——40	3	11.1	4	14.8	7	13.0	1	3.7	1	3.7	2	3.7	9	8.3
	41——50	2	7.4	2	7.4	4	7.4	2	7.4	3	11.1	5	9.3	9	8.3
	51——60	3	11.1	5	18.5	8	14.8	0	0	2	7.4	2	3.7	10	9.3
	61——70	2	7.4	4	14.8	6	11.1	5	18.5	6	22.2	11	20.4	17	15.7
	71——80	1	3.7	1	3.7	2	3.7	4	14.8	3	11.1	7	13.0	9	8.3
時 間	81——90	0	0	1	3.7	1	1.9	3	11.1	2	7.4	5	9.3	6	5.6
	91——100	0	0	1	3.7	1	1.9	1	3.7	2	7.4	3	5.6	4	3.7
	101——110	1	3.7	1	3.7	2	3.7	1	3.7	3	11.1	4	7.4	6	5.6
	111——120	0	0	0	0	0	0	2	7.4	2	7.4	4	7.4	4	3.7
	121——130	1	3.7	0	0	1	1.9	3	11.1	1	3.7	4	7.4	5	4.6
	131——140	0	0	1	3.7	1	1.9	1	3.7	0	0	1	1.9	2	1.9
	141——150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	151——160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	161——170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171——180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181——210	1	3.7	0	0	1	1.9	0	0	1	3.7	1	1.9	2	1.9	

70 歳代温熱性眼球震盪 (温刺激)

種 別	性 別 計	男 子 (39名)						女 子 (34名)						合計(73名)	
	側 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳數 百分比 時間(秒)	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
持 續	0	5	12.8	6	15.4	11	14.1	14	41.2	13	38.2	27	39.7	38	26.0
	1——10	2	5.1	0	0	2	2.6	1	2.9	0	0	1	1.5	3	2.1
	11——20	6	15.4	2	5.1	8	10.3	1	2.9	5	14.7	6	8.8	14	9.6
	21——30	2	5.1	5	12.8	7	9.0	6	17.6	4	11.8	10	14.7	17	11.6
	31——40	4	10.3	3	7.7	7	9.0	1	2.9	1	2.9	2	2.9	9	6.2
	41——50	3	7.7	4	10.3	7	9.0	3	8.8	1	2.9	4	5.9	11	7.5
	51——60	4	10.3	7	17.9	11	14.1	1	2.9	3	8.8	4	5.9	15	10.3
	61——70	4	10.3	4	10.3	8	10.3	2	5.9	5	14.7	7	10.3	15	10.3
	71——80	3	7.7	4	10.3	7	9.0	5	14.7	0	0	5	7.4	12	8.3
	81——90	1	2.6	0	0	1	1.3	0	0	1	2.9	1	1.5	2	1.4
時 間	91——100	2	5.1	0	0	2	2.6	0	0	0	0	0	0	2	1.4
	101——110	2	5.1	0	0	2	2.6	0	0	0	0	0	0	2	1.4
	111——120	1	2.6	1	2.6	2	2.6	0	0	0	0	0	0	2	1.4
間	121——130	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.9	1	1.5	1	0.7
	131——140	0	0	1	2.6	1	1.3	0	0	0	0	0	0	1	0.7
	141——150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	151——160	0	0	1	2.6	1	1.3	0	0	0	0	0	0	1	0.7
	161——170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	171——180	0	0	1	0	1	1.3	0	0	0	0	0	0	1	0.7
	181——210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80 歳以上溫熱性眼球震盪 (溫刺激)

種 別	性 別 計	男 子 (20名)						女 子 (17名)						合計(37名)	
	側. 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳數 百分比 時間(秒)	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
持 續 時 間	0	3	15.0	3	15.0	6	15.0	3	17.6	3	17.6	6	17.6	12	16.2
	1——10	0	0	0	0	0	0	2	11.8	0	0	2	5.9	2	2.7
	11——20	5	25.0	5	25.0	10	25.0	0	0	2	11.8	2	5.9	12	16.2
	21——30	5	25.0	2	10.0	7	17.5	3	17.6	2	11.8	5	14.7	12	16.2
	31——40	2	10.0	3	15.0	5	12.5	2	11.8	2	11.8	4	11.8	9	12.2
	41——50	1	5.0	3	15.0	4	10.0	1	5.9	3	17.6	4	11.8	8	10.8
	51——60	2	10.0	2	10.0	4	10.0	4	23.5	2	11.8	6	17.6	10	13.5
	61——70	1	5.0	1	5.0	2	5.0	2	11.8	3	17.6	5	14.7	7	9.5
	71——80	1	5.0	1	5.0	2	5.0	0	0	0	0	0	0	2	2.7
	81——90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	91——100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
間	101——110														
	111——120														
	121——130														
	131——140														
	141——150														
	151——160														
	161——170														
	171——180														
181——210															

第 25 表

各年代溫熱性眼球震盪 (溫刺戟)

種別	年代計	60 歲 代		70 歲 代		80 歲 以 上		全 被 檢 者 (164名)	
	時間 (秒)	例 數	%	例 數	%	例 數	%	例 數	%
特 續 時 間	0	10	9.3	38	23.0	12	16.2	60	18.3
	1 — 10	2	1.9	3	2.1	2	2.7	7	2.1
	11 — 20	8	7.4	14	9.6	12	16.2	34	10.4
	21 — 30	5	4.6	17	11.6	12	16.2	34	10.4
	31 — 40	9	8.3	9	6.2	9	12.2	27	8.2
	41 — 50	9	8.3	11	7.5	8	10.8	28	8.5
	51 — 60	10	9.3	15	10.3	10	13.5	35	10.7
	61 — 70	17	15.7	15	10.3	7	9.5	39	11.9
	71 — 80	9	8.3	12	8.3	2	2.7	23	7.0
	81 — 90	6	5.6	2	1.4	0	0	8	2.4
	91 — 100	4	3.7	2	1.4	0	0	6	1.8
	101 — 110	6	5.6	2	1.4	0	0	8	2.4
	111 — 120	4	3.7	2	1.4	0	0	6	1.8
間	121 — 130	5	4.6	1	0.7	0	0	6	1.8
	131 — 140	2	1.9	1	0.7	0	0	3	0.9
	141 — 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	151 — 160	0	0	1	0.7	0	0	1	0.3
	161 — 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	171 — 180	0	0	1	0.7	0	0	1	0.3
	181 — 210	2	1.9	0	0	0	0	2	0.6

第 26 表

60 歳代温熱性眼球震盪 (温刺戟)

種 別	性 別. 計	男 子 (27名)						女 子 (27名)						合計 (54名)	
	側. 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳数 百分比 数	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
震	0	5	18.5	2	7.4	7	13.0	2	7.4	1	3.7	3	5.6	10	9.3
	1 — 10	6	22.2	4	14.8	10	18.5	2	7.4	0	0	2	3.7	12	11.1
	11 — 20	4	14.8	6	22.2	10	18.5	3	11.1	2	7.4	5	9.3	15	13.9
	21 — 30	3	11.1	1	3.7	4	7.4	1	3.7	3	11.1	4	7.4	8	7.4
	31 — 40	2	7.4	6	22.2	8	14.8	4	14.8	3	11.1	7	13.0	15	13.9
	41 — 50	2	7.4	1	3.7	3	5.6	1	3.7	4	14.8	5	9.3	8	7.4
	51 — 61	1	3.7	2	7.4	3	5.6	3	11.1	4	14.8	7	13.0	10	9.3
	61 — 70	3	11.1	1	3.7	4	7.4	3	11.1	1	3.7	4	7.4	8	7.4
	71 — 80	0	0	0	0	0	0	1	3.7	0	0	1	1.9	1	0.9
	盪	81 — 90	0	0	3	11.1	3	5.6	1	3.7	2	7.4	3	5.6	6
91 — 100		0	0	0	0	0	0	1	3.7	1	3.7	2	3.7	2	1.9
101 — 110		0	0	1	3.7	1	1.9	1	3.7	1	3.7	2	3.7	3	2.8
數	111 — 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121 — 130	0	0	0	0	0	0	1	3.7	1	3.7	2	3.7	2	9.1
	131 — 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	141 — 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	151 — 160	0	0	0	0	0	0	2	7.4	1	3.7	3	5.6	3	2.8
	161 — 170	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.7	1	1.9	1	9.0
	171 — 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	181 — 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	191 — 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.7	1	1.9	1	0.9
	201 — 250	1	3.7	0	0	1	1.9	0	0	0	0	0	0	1	0.9
	251 — 300	0	0	0	0	0	0	1	3.7	1	3.7	2	3.7	2	1.9

70 歳代 溫熱性眼球震盪 (溫刺戟)

種 別	性 別、計		男 子 (39名)								女 子 (34名)								合計(73名)	
	側、計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計								
	例耳數 百分比	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%					
震	0	5	12.8	6	15.4	11	14.1	14	41.2	13	38.2	27	39.7	38	26.0					
	1——10	5	12.8	2	5.1	7	9.0	2	5.9	2	5.9	4	5.9	11	7.5					
	11——20	7	17.9	8	20.5	15	19.2	5	14.7	6	17.6	11	16.2	26	17.8					
	21——30	6	15.4	5	12.8	11	14.1	1	2.9	4	11.8	5	7.4	16	11.0					
	31——40	5	12.8	6	15.4	11	14.1	5	14.7	1	2.9	6	8.8	17	11.6					
	41——50	1	2.6	1	2.6	2	2.6	0	0	2	5.9	2	2.9	4	2.7					
	51——60	5	12.8	2	5.1	7	9.0	3	8.8	3	8.8	6	8.8	13	8.9					
	61——70	1	2.6	1	2.6	2	2.6	1	2.9	0	0	1	1.5	3	2.1					
	71——80	1	2.6	3	7.7	4	5.1	2	5.9	0	0	2	2.9	6	4.1					
	盪	81——90	2	5.1	1	2.6	3	3.8	1	2.9	0	0	1	1.5	4	2.7				
91——100		1	2.6	0	0	1	1.3	0	0	1	2.9	1	1.5	2	1.4					
101——110		0	0	1	2.6	1	1.3	0	0	0	0	0	0	1	0.7					
111——120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
121——130		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.9	1	1.5	1	0.7					
131——140		0	0	1	2.6	1	1.3	0	0	1	2.9	1	1.5	2	1.4					
141——150		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
151——160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
161——170		0	0	1	2.6	1	1.3	0	0	0	0	0	0	1	0.7					
171——180		0	0	1	2.6	1	1.3	0	0	0	0	0	0	1	0.7					
數	181——190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	191——200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

80 歳以上溫熱性眼球震盪 (溫刺激)

種 別	性 別 計	男 子 (20名)						女 子 (17名)						合計 (37名)	
	側. 計	右 耳		左 耳		計		右 耳		左 耳		計			
	例耳數 數百分比	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
震	0	3	15.0	3	15.0	6	15.0	3	17.6	3	17.6	6	17.6	12	16.2
	1——10	3	15.0	5	25.0	8	20.0	1	5.9	0	0	1	2.9	9	12.2
	11——20	5	25.0	3	15.0	8	20.0	6	35.3	2	11.8	8	28.5	16	21.6
	21——30	3	15.0	2	10.0	5	12.5	3	17.6	5	29.4	8	28.5	13	17.6
	31——40	1	5.0	2	10.0	3	7.5	0	0	2	11.8	2	5.9	5	6.8
	41——50	2	10.0	1	5.0	3	7.5	0	0	1	5.9	1	2.9	4	5.4
盪	51——60	1	5.0	1	5.0	2	5.0	1	5.9	2	11.8	3	8.8	5	6.8
	61——70	0	0	0	0	0	0	1	5.9	0	0	1	2.9	1	1.4
	71——80	0	0	1	5.0	1	2.5	1	5.9	1	5.9	2	5.9	3	4.1
	81——90	1	5.0	2	10.0	3	7.5	1	5.9	0	0	1	2.9	4	5.4
	91——100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9	1	2.9	1	1.4
	101——110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
數	111——120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121——130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131——140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	141——150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	151——160	1	5.0	0	0	1	2.5	0	0	0	0	0	0	1	1.4
	161——170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	171——180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第 27 表

各年代溫熱性眼球震盪(溫刺戟)

種別	年代. 計	60 歲 代		70 歲 代		80 歲 以 上		全 被 檢 者 (164名)	
	例耳數 數 百分比	例 數	%	例 數	%	例 數	%	例 數	%
震	0	10	9.3	38	26.0	12	16.2	60	18.3
	1—10	12	11.1	11	7.5	9	12.2	32	9.8
	11—20	15	13.9	26	17.8	16	21.6	57	17.4
	21—30	8	7.4	16	11.0	13	17.6	37	11.3
	31—40	15	13.9	17	11.6	5	6.8	37	11.3
	41—50	8	7.4	4	2.7	4	5.4	16	4.9
	51—60	10	9.3	13	8.9	5	6.8	23	8.5
	61—70	8	7.4	3	2.1	1	1.4	12	3.7
	71—80	1	0.9	6	4.1	3	4.1	10	3.0
	81—90	6	5.6	4	2.7	4	5.4	14	4.3
盪	91—100	2	1.9	2	1.4	1	1.4	5	1.5
	101—110	3	2.8	1	0.7	0	0	4	1.2
	111—120	0	0	0	0	0	0	0	0
	121—130	2	1.9	1	0.7	0	0	3	0.9
	131—140	0	0	2	1.4	0	0	2	0.6
	141—150	0	0	0	0	0	0	0	0
	151—160	3	2.8	0	0	1	1.4	4	1.2
	161—170	1	0.9	1	0.7	0	0	2	0.6
	171—180	0	0	1	0.7	0	0	1	0.3
	181—190	0	0	0	0	0	0	0	0
數	191—200	1	0.9	0	0	0	0	1	0.3
	201—250	1	0.9	0	0	0	0	1	0.3
	251—300	2	1.9	0	0	0	0	2	0.6

第 28 表

耳官能ト全身状態トノ關聯

		聽 能						前 庭 器 機 能							
年代 計	性 別	被檢 者數	種 別		良		不 良		被檢 者數	種 別		良		不 良	
			健弱者	被檢者	例耳數	%	例 耳 數	%		健弱者	被檢者	例耳數	%	例耳數	%
60 歲 代	男子	38	健者 弱者	18 15	34 20	94.4 74.1	2 7 (10—3)	5.6 25.9	30	健者 弱者	17 13	20 14	58.8 53.8	14 12	41.2 46.2
	女子	31	健者 弱者	19 12	23 15	71.9 71.4	9 (15—6) 6 (9—3)	28.1 28.6	28	健者 弱者	16 12	23 18	87.5 75.0	4 6	12.5 25.0
70 歲 代	男子	52	健者 弱者	32 20	15 16	26.8 41.0	41 (49—8) 23 (24—1)	73.2 59.0	43	健者 弱者	30 13	38 14	63.8 53.8	22 12	36.7 46.2
	女子	51	健者 弱者	32 19	25 11	47.2 34.4	28 (39—11) 21 (27—6)	52.8 65.6	35	健者 弱者	22 13	19 11	43.2 42.8	25 15	56.8 57.7
80 歲 以 上	男子	26	健者 弱者	24 2	11 0	22.9 0	37 4	77.1 100.0	20	健者 弱者	18 2	19 0	52.8 0	17 4	47.2 100.0
	女子	29	健者 弱者	23 6	8 3	21.1 25.0	30 (33—8) 9	78.9 75.0	21	健者 弱者	16 5	21 7	65.6 70.0	11 3	34.4 30.0
計	男子	111	健者 弱者	74 37	60 36	42.9 51.4	80 (88—8) 34 (38—4)	57.1 48.6	93	健者 弱者	65 28	77 28	59.2 50.0	53 28	40.8 50.0
	女子	111	健者 弱者	74 37	56 29	45.5 44.6	67 (92—25) 36 (45—9)	54.5 55.4	84	健者 弱者	54 30	68 36	63.0 60.0	40 24	37.0 40.0
全被檢者		222	健者 弱者	148 74	116 65	44.1 48.1	147 (180—33) 70 (83—13)	55.9 51.9	177	健者 弱者	119 58	145 64	60.9 55.2	48 52	39.1 44.8

備 考：聴能不良ナルモノ、例耳數中括弧内ノモノハ實數ヨリ局所病變ノ
アルモノヲ除外セルモノナリ。

第 29 表

正 常 血 壓 者 ト 耳 官 能

			聽 能								前 庭 器 機 能											
年代	性別	被檢者數	被檢者數	優		良		可		不 可		被檢者數	優		良		可		不 可		隨 現	件 象
計	計		例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	
60 歲代	男子	13	13	17	70.8 ³ (4-1)	12.5 ⁰ (1-1)	0	0	4	16.7	11	14	63.6	3	13.6	4	18.2	1	4.5	4	18.2	
	女子	7	7	10	71.4	2	14.3	0	0	2	14.3	6	9	75.0	2	16.7	1	8.3	0	0	7	58.3
	計	20	20	27	71.1	5	13.2	0	0	6	15.8	17	23	67.6	5	14.7	5	14.7	1	2.9	11	32.4
70 歲代	男子	10	10	4	20.0	3	15.0	1	5.0	12	60.0	9	9	50.0	4	22.2	1	5.6	4	22.2	0	0
	女子	9	9	7	38.9	7	38.9	1	5.6	3	16.7	6	7	58.3	3	25.0	0	0	2	16.7	6	50.0
	計	19	19	11	28.9	10	26.3	2	5.3	15	39.5	15	16	53.3	7	23.3	1	3.3	6	20.0	6	20.0
80 歲以上	男子	3	3	0	0	0	0	1	16.7	5	83.3	3	1	16.7	2	33.3	1	16.7	2	33.3	1	16.7
	女子	3	3	0	0	0	0	0	0	6	100.0	2	0	0	2	50.0	1	25.0	1	25.0	0	0
	計	6	6	0	0	0	0	1	8.3	11	91.7	5	1	10.0	4	40.0	2	20.0	3	30.0	1	10.0
全被檢者	男子	26	26	21	42.0	6	12.0	2	4.0	21	42.0	23	24	52.2	9	19.6	6	13.0	7	15.2	5	10.9
	女子	19	19	17	44.7	9	23.8	1	2.6	11	23.9	14	16	57.1	7	25.0	2	7.1	3	10.7	13	46.4
	總計	45	45	38	43.2	15	17.0	3	3.4	32	36.4	37	40	54.1	16	21.6	8	10.8	10	13.5	18	24.3

備 考 聽能良及ビ不良ナルモノ、例耳數中括弧内ノモノハ實數ヨリ局所病
變ノアルモノヲ除外セルモノナリ。

輕 度 並 ニ 中 等 度 高 血 壓 者 ト 耳 官 能

		聽 能										前 庭 器 機 能											
年代	性別	被檢者數	被檢者例數	優 %	良 例數	%	可 例數	%	不 例數	可 例數	%	被檢者例數	優 例數	%	良 例數	%	可 例數	%	不 例數	可 例數	%	隨現	件象
計	計																						
60 歲代	男子	13	13	23	88.5	1	3.8	1	3.8	1	3.8	12	15	62.5	3	12.5	4	16.7	2	8.3	3	12.5	
	女子	14	14	17	60.7	7	25.0	2	7.1	2	7.1	12	20	83.3	1	4.2	0	0	3	12.5	3	12.5	
	計	27	27	40	74.1	8	14.8	3	5.6	3	5.6	24	35	72.9	4	8.3	4	8.3	5	10.4	6	12.5	
70 歲代	男子	27	26	19	38.8	4 6-2	8.2	7	14.3	19 (20-1)	38.8	22	29	65.9	7	15.9	5	11.4	3	6.8	10	22.7	
	女子	21	21	15	38.5	7	17.9	4	10.3	13 (16-3)	33.3	13	10	38.5	2	7.7	4	15.4	10	38.5	6	23.1	
	計	48	47	34	38.6	11	12.5	11	12.5	32 (4-2)	36.4	35	39	55.7	9	12.9	9	12.9	13	18.6	16	22.9	
80 歲以上	男子	14	14	6	21.4	2	7.1	6	21.4	14 16	50.0	10	10	50.0	3	15.0	4	20.0	3	15.0	0	0	
	女子	13	13	3	13.0	2	8.7	2 (4-2)	8.7	16 (17-1)	69.6	12	10	41.7	6	25.0	1	4.2	7	29.2	6	25.0	
	計	27	27	9	17.6	4	7.8	8	15.7	30	58.8	22	20	45.5	9	20.5	5	11.4	10	22.7	6	13.6	
全被檢者	男子	54	53	48	46.6	7	6.8	14	13.6	34	33.0	44	54	61.4	13	14.8	13	14.8	8	9.1	13	14.8	
	女子	48	48	35	38.9	16	17.8	8	8.9	31	34.4	37	40	54.1	9	12.2	5	6.8	20	27.0	15	20.3	
	總計	102	101	83	43.0	23	11.9	22	11.4	65	33.7	81	94	58.0	22	13.6	18	11.1	28	17.3	28	17.3	

高 度 高 血 壓 者 ト 耳 官 能

			聽 能										前 庭 器 機 能									
年代	性別	被檢者數	被檢者	優		良		可		不 可		被檢者	優		良		可		不 可		隨 現	件 象
計	計	者數	檢者	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	檢者	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
60歲代	男子	7	7	14	100.0	0	0	0	0	0	0	7	3	21.4	3	21.4	4	28.6	4	28.6	1	7.1
	女子	9	9	11	61.7	0	0	0	0	6(7-1)	35.3	9	14	77.8	2	11.1	2	11.1	0	0	7	38.9
	計	16	16	25	80.7	0	0	0	0	6	19.4	16	17	53.1	5	15.6	6	18.8	4	12.5	8	25.0
70歲代	男子	15	15	5	17.9	3	10.7	2	7.1	18(20-2)	64.3	12	8	33.3	3	12.5	9	37.5	4	16.7	0	0
	女子	21	21	7	17.1	13	31.7	7	17.1	14(15-1)	34.1	16	9	28.1	3	9.4	6	18.8	14	43.8	3	9.4
	計	36	36	12	17.4	16	23.2	9	13.0	32	46.4	28	17	30.4	6	10.7	15	26.8	18	32.1	3	5.4
80歲以上	男子	9	9	3	16.7	1	5.6	0	0	14	77.8	7	5	35.7	2	14.3	5	35.7	2	14.3	0	0
	女子	13	12	9	40.9	5	22.7	4	18.2	4(6-2)	18.2	7	9	61.3	4	28.6	0	0	1	7.1	1	7.1
	計	22	21	12	30.0	6	15.0	4	10.0	18	45.0	14	14	50.0	6	21.4	5	17.9	3	10.7	1	3.6
全被檢者	男子	31	31	22	36.7	4	6.7	2	3.3	32	53.3	26	16	30.8	8	15.4	13	34.6	10	19.2	1	1.9
	女子	43	42	27	33.8	18	22.5	11	13.8	24	30.0	32	32	50.0	9	14.1	8	12.5	15	23.4	11	17.2
	總計	74	73	49	35.0	22	15.7	13	9.8	56	40.0	58	48	41.4	17	14.7	26	22.4	25	21.6	12	10.3

血 壓 ト 耳 官 能

			聽 能										前 庭 器 機 能									
年代	類別	被檢者數	被檢者	優		良		可		不 可		被檢者	優		良		可		不可		隨 件 現 象	
				例數	%	例數	%	例數	%	例數	%		例數	%	例數	%	例數	%	例數	%	例數	%
60 歲代	正 常	20	20	27	71.1	5	13.2	0	0	6	15.8	17	23	67.6	5	14.7	5	14.7	1	2.9	11	32.4
	輕 度	27	27	40	74.1	8	14.8	3	5.6	3	5.6	24	35	72.9	4	8.3	4	8.3	5	10.4	6	12.5
	高 血 壓 者	16	16	25	80.7	0	0	0	0	6	19.4	16	17	53.1	5	15.6	6	18.8	4	12.5	8	25.0
70 歲代	正 常	19	19	11	28.9	10	26.3	2	5.3	15	39.5	15	16	53.3	7	23.3	1	3.3	6	20.0	6	20.0
	輕 度	48	47	34	38.6	11	12.5	11	12.5	32	36.4	35	39	55.7	9	12.9	9	12.9	13	18.6	16	22.9
	高 血 壓 者	36	36	12	17.4	16	23.2	9	13.0	32	46.4	28	17	30.4	6	26.8	15	26.8	18	32.1	3	5.4
80 歲以上	正 常	6	6	0	0	0	0	1	8.3	11	91.7	5	1	10.0	4	40.0	2	20.0	3	30.0	1	10.0
	輕 度	27	27	9	17.6	4	7.8	8	15.7	30	58.8	22	20	45.5	9	20.5	5	11.4	10	22.7	6	13.6
	高 血 壓 者	22	21	12	30.0	6	15.0	4	10.0	18	45.0	14	14	50.0	6	21.4	5	17.9	3	10.7	1	3.6
全被檢者	正 常	45	45	38	43.2	15	17.0	3	3.4	32	36.4	37	40	54.1	16	21.6	8	10.8	10	13.5	18	24.3
	輕 度	102	101	83	43.0	23	11.9	22	11.4	65	33.7	81	94	58.0	22	13.6	18	11.1	28	17.3	23	17.3
	高 血 壓 者	74	73	49	35.0	22	15.7	13	9.3	56	40.0	58	48	41.4	17	14.7	26	22.4	25	21.6	12	10.3
全 被 檢 者		221	219	170	40.4	60	14.3	38	9.0	153	36.3	176	182	51.7	55	15.6	52	14.8	63	17.9	58	16.6

第 30 表
血液 丕氏反應陽性者ノ耳官能

年代別 計	性別、計	丕氏反 應陽性 者數	聽 能						前 庭 器 機 能			
			被檢者	良		不 良		被檢者	良		不 良	
				例耳數	%	例耳數	%		例耳數	%	例耳數	%
60 歲 代	男 子	8	8	14	87.5	2	12.5	8	12	75.0	4	25.0
	女 子	13	13	15	65.2	8 (11—3)	34.8	12	20	87.5	4	12.5
	計	21	21	29	74.4	10	25.6	20	32	80.0	8	20.0
70 歲 代	男 子	8	7	3	21.4	11	78.6	7	5	35.7	9	64.3
	女 子	8	8	7	43.7	9	56.3	7	3	21.4	11	78.6
	計	16	15	10	33.3	20	66.7	14	8	28.6	20	71.4
80 歲 以 上	男 子	2	2	0	0	4	100.0	1	0	0	2	100.0
	女 子	3	3	4	66.7	2	33.3	3	3	50.0	3	50.0
	計	5	5	4	40.0	6	60.0	4	3	37.5	5	62.5
全 被 檢 者	男 子	18	17	17	50.0	17	50.0	16	17	53.1	15	46.9
	女 子	24	24	26	57.8	19	42.2	22	26	59.1	18	40.9
	計	42	41	43	54.4	36	45.6	38	43	56.6	33	43.4

備考：1) 聽能不良ナルモノ、例耳數中括弧内ノモノハ實數ヨリ局所病變ノアルモノヲ除外セルモノナリ。

2) 丕氏反應陽性者ハ別表被檢者ノ中次ノ如キ検査番號ノモノナリ。

60 歲代 { 男子 3, 5, 9, 16, 22, 25, 28, 32 8 名
 { 女子 37, 38, 39, 42, 43, 47, 51, 52, 53, 56, 59, 61, 63 13 名
70 歲代 { 男子 74, 77, 78, 84, 86, 109, 113, 116 8 名
 { 女子 117, 121, 133, 147, 151, 153, 154, 160 8 名
80 歲代 { 男子 167, 181 2 名
 { 女子 193, 208, 209 3 名

第 9 圖 (第 17 表ノ圖表)

第 10 圖 (第 19 表ノ圖表)

第 11 圖 (第 21 表ノ圖表)

第 12 圖 (第 23 表ノ圖表)

第 13 圖 (第 25 表ノ圖表)

第 14 圖 (第 27 表ノ圖表)

主 要 文 献

- 1) 尾子, 中澤: 老齡者ノ血壓ニ就テ。浴風閣調査研究紀要。第2輯, (昭和6年6月)。
- 2) Bárány: Untersuchungen über den vom Vestibularapparat des Ohres reflektorisch ausgelösten rhythmischen Nystagmus und seine Begleiterscheinungen. Monatschr. f. Ohrenheilk. Jg. 40, S. 191.
- 3) Bárány: Weitere Untersuchungen über den vom Vestibularapparat des Ohres reflektorisch ausgelösten rhythmischen Nystagmus und seine Begleiterscheinungen. Monatschr. f. Ohrenheilk. Jg. 41, S. 477.
- 4) Berberich: Beiträge zur Klinik und Therapie der Altersschwerhörigkeit. Zeitschr. f. Hals-, Nasen- und Ohrenheilk. 15 Bd. 1926, S. 413.
- 5) Bezold: Untersuchungen über das durchschnittliche Hörvermögen im Alter. Zeitschr. f. Ohrenheilk. XXIV, 1893, S. 1.
- 6) Bezold: Einige weitere Mitteilungen über die kontinuierliche Tonreihe, insbesondere über die physiologische obere und untere Tongrenze. Ebenda. Bd. 23, 1892, S. 254.
- 7) Bezold: Eine Analyse des Rinneschen Versuches. Ebenda. 57, 1900, S. 197.
- 8) Boeters: Vergleichende Untersuchungen über den Drehnystagmus u. d. Kalorischen Nystagmus. Ebenda. LXXI. 1914, S. 77.
- 9) Brünings: Über quantitative Funktionsprüfungen des Vestibularapparates. Verhandl. d. Deutsch. otol. Gesellsch. 1910, S. 180.
- 10) Denker-Kahler: Handbuch d. H.N. u. O. Bd. 7.
- 11) Freystadt: Beitrag zur Untersuchung des calor. Nystagmus. Monatschr. f. Ohrenheilk. 43, 1909, S. 321.
- 12) Grahe: Beiträge zur kalorischen Auslösung der Vestibularreaktionen. Passows Beitr. Bd. 15, 1920.
- 13) Grahe: Weitere Mitteilungen über die Auslösung der kalorischen Vestibularreaktionen. Passows Beitr. Bd. 17, 1921.
- 14) Griessmann: Kalorische Erregung des Ohrlabirinth. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. 19, 1922.
- 15) Güttich: Beitrag zur Physiologie des Vestibularapparates. Passows Beitr. Bd. 7, S. 1.
- 16) Henri Patenotre: Examen fonctionnel du labyrinthe chez le Vieillard. Annal. d. Malad. d. l'oreille, du larynx 1912, P. 158.
- 17) 今堀: 長壽者ト血壓〔山間部落ト漁業地ノ比較〕。臨牀日本。第1卷, 第6號, (昭和9年), 778頁。
- 18) 岩田: 本邦人ノ正規聽力試驗成績。大日耳鼻。第12卷, 281頁, 明治39年。
- 19) 菊池: 耳語ニ對スル日本人ノ聽力檢査成績補遺。大日耳鼻。第12卷, 213頁, 明治39年。
- 20) Kipproff: Quantitative Messung des calor. Nystagmus bei Labyrinthgesunden. Passows Beitr. Bd. 2.
- 21) Kobrak: Beiträge zum experimentellen Nystagmus. Passows Beitr. Bd. 10, 1918.
- 22) Lederer: Altersveränderungen am Gehörorgan. Denker-Kahler's Handbuch. VI. Bd. S. 705.
- 23) 金野: 正常聽力ノ時間的動搖ニ就テ。大日耳鼻。第37卷, 1236頁。
- 24) 松田: ストルリッケン式「モノコルド」ニテ測定シタル本邦人ノ上唇界ニ就テ。大日耳鼻。第33卷, 102頁。
- 25) O. Mayer: Das anatomische Substrat der Altersschwerhörigkeit. Arch. f. Ohren- Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. 105, 1920, S. 1.
- 26) 宮田: 高齢者ノ聽能ニ就テ。大日耳鼻。第22卷, 625頁, 大正5年。
- 27) Müller: Die Untersuchung der akustischen Funktion des Ohres. Zentralbl. f. Ohrenheilk. Bd. 2, 1908.
- 28) 奈良: 健康邦人ニ於ケル冷溫性微弱刺激ノ檢査成績。耳喉。第7卷, 401頁。
- 29) Richter: Vergleichende Hörprüfungen an Individuen verschiedener Altersklassen. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 36, 1894, S. 241.
- 30) Rottin: Denker-Kahler's Handbuch. VI. Bd.
- 31) 篠田: 微弱刺激ノ迴轉性後眼球震盪ニ就テ。耳喉。第3卷, 601頁。
- 32) Siebenmann: Beiträge zur funktionellen Prüfungen des normalen Ohres. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 22, 1892, S. 285.
- 33) Sporleder: Über funktionelle Prüfungsergebnisse im höheren Alter. Monatschr. f. Ohrenheilk. Bd. 34, 1900, S. 27.
- 34) Stein: Tierexperimentelle und klinische Untersuchungen über die Beziehungen des Blutdruckes zum statischen Apparate. M. f. O. L. Rh. Jg. 58,

[illegible]

検査 番 號	姓 名	年 齡	性 別	検査 種 別 血 壓	検査表																																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					聴力																前庭器検査表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Weber法				c音叉				Rinne法				fis ⁴				呬語				ハルトマン・エーデルマン音叉列 (百分比)																上音界		下音界		廻轉性眼球震盪 (20秒10回) 直立頭位				溫熱性眼球震盪 (60° 後方屈曲頭位)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					氣導		骨導		右		左		右		左		右		左		右		左		右				左				右					左				右				左				右				左				右				左																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					右	左	右	左	右	左	右	左	右	左	c	c ¹	c ²	c ³	c ⁴	g ³	c ⁴	g ⁴	c ⁵	c	c ¹	c ²	c ³	c ⁴	g ³	c ⁴	g ⁴	c ⁵	右	左	右	左		持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間	持續時間	震盪數	性	質	隨伴現象	潛伏時間

[illegible]

1924. 35) 杉浦: 電話交換手ノ聽力検査成績. 大日耳鼻. 第32卷, 305頁, 大正15年. 35) 杉原: 叫語ノ聽取距離ト音又聽取時間トノ相互的關係. 耳鼻臨牀. 第22卷, 341頁. 37) 渡邊: 聽力検査ノ1・2事項ニ就テ. 耳喉. 第1卷, 251頁. 38) 吉田: 左右側耳ノ聽覺及骨導ヲ比較検査セル成績ニ就テ. 耳鼻臨牀. 第9卷, 32頁. 39) Zalewski: Quantitative Untersuchungen über den kalorischen Nystagmus. Monatschr. f. Ohrenheilk. u. Laryng-

Rhinolog. 1914, S. 694. 40) Zwaardemaker: Das presbycusische Gesetz. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 24, 1893, S. 280. 41) Zwaardemaker: Der Verlust der hohen Töne mit Zunehmendem Alter. Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 32, S. 53. 42) Zwaardemaker: Über d. Presbycusische Gesetz an d. unteren Grenze unseres Gehörs. A. f. O. Bd. 35, S. 299.

— 完 —