上顎齒槽突起及ビ上顎竇底ノレ線學的 並ニ病理組織學的研究 (第二報)

Dr. Saburo Tsunooka: Röntgenologische und patho-histologische Untersuchungen über die Beziehungen zwischen dem Alveolarfortsatz und der Oberkieferhöhle. (II. Mitteilug).

名古屋醫科大學耳鼻咽喉科教室(指導 醫學博士 阿久根教授)
大連醫院耳鼻咽喉科(主任 醫學博士 塚本 醫長)

角 岡 三 郎
ツノ オカ ヲノ ラウ

(本論文ノ要旨ハ昭和12年6月27日第35回大日本
耳鼻咽喉科會滿洲地方會ニ於テ發表セリ。)

目 次

第一章 緒論並ニ文献摘要	第五章 慢性上顎竇炎ニ於ケル竇骨壁ノ變化 ニ就テ
第二章 研究材料並ニ研究方法	第一項 上顎竇粘膜ノ病理組織學的變化ニ 就テ
第三章 實驗成績	第二項 慢性上顎竇炎ノ上顎竇底部齒槽 突起ニ及ボス影響ニ就テ
第四章 病理解剖學的所見ノ總括並ニ考案	第三項 慢性上顎竇炎ノ齒牙周圍組織ニ 及ボス影響ニ就テ
第一節 肉眼的所見ニ就テ	第六章 「レ」線像ノ病理組織學的所見トノ 比較
第二節 組織學的所見ニ就テ	第七章 口外撮影法ト口内撮影法トノ比較
第一項 齒牙周圍組織ニ炎症アルモノ、 齒槽突起ノ變化ニ就テ	第八章 結 論
第二項 齒槽突起炎症ノ上顎竇底部、 竇粘膜ニ及ボス影響ニ就テ	文 献
第三項 齒牙脱落セル場合ノ齒槽突起、 上顎竇底部、上顎竇粘膜ノ變化ニ 就テ	附圖説明
第四項 齒牙周圍組織ニ異常ナキノ、齒 槽突起並ニ上顎竇粘膜ニ就テ	

第 一 章

緒論並ニ文献摘要

齒牙疾患ニ因ル齒槽突起ノ炎症ガ上顎竇炎ノ
發生ニ對シ密接ナル關係ヲ有スルコトハ、古來
幾多ノ先輩諸學者ノ注意セル處ニシテ、之ニ關
スル研究業績モ夥シキ數ニ上レリ。特ニ上顎竇
粘膜ノ病變ニ就テハ殆ンド餘蘊ナキ迄ニ釋明セ

ラレ。此領域ノ疾病ノ治療ニ從事スル耳鼻咽喉
科及ビ齒科醫師ハ常ニ其病理學的關係ニ注意ス
ルトコロナリ。

然レドモ、從來齒性上顎竇蓄膿症ノ頻度ニ對シ
テハ、多數學者ノ經驗區々ニシテ其述ブルトコ

ロー致セズ。嘗テハ、上顎竇蓄膿症ノ總テノ場合ハ齒牙(主トシテ臼齒)ヨリ來タルカノ如ク考ヘラレ。上顎竇ノ手術モ亦齒槽ヨリ行ハレタル時代アリシハ周知ノ事實ナルモ、其後ノ文献ヲ涉獵スルニ、齒牙疾患＝由來スル上顎竇炎ハ所謂鼻性上顎竇炎ニ比シ稀有ナルコトハ諸學者間ノ定説ナリ。而シテ鼻科、齒科ノ臨牀家ニヨル報告＝於テハ、頻度比較的多シセラレ。反之、解剖學者ニヨル報告＝於テハ、甚ダ稀有ナリトセラル。臨牀家方面ヨリ其統計ヲ見ルニ、齒科＝於テハ鼻科ニ比シ其頻度大ナリト主張セラル。試ミニ之ヲ列舉スレバ Gaudier ハ 52 例＝於テ 13.3%、荻野氏ハ 81 例中約 8.7%、Wasowski, ハ 112 例＝於テ 10.0%、Hinsberg ト Kallisch ハ全觀察例ノ 5.0%、Tonnendorf ハ 5.0%、Hirsch ハ 10.0%、Berberich ハ 10.0—15.0%、Skillern ハ 20.0%、Lermoyez ハ 50.0%ナリト云ヒ、一方 Shea ハ 60.0—80.0%、Hove ハ 25.0%ナリトモ云ヒ、其他 Partsch, Reinmoller, Meyerhofer 等ノ齒科諸大家モ亦齒性上顎竇炎ハ一般ニ想像セラルハモノヨリ、其頻度遙カニ大ナルコトヲ述ベタリ。然ルニ、解剖學者ハ其頻度僅少ナルヲ稱ヘ、Dmochowski ハ 152 例ノ屍體ノ中、1 例モ之ヲ見ズト云ヒ、Zuckermandl(1893) ハ 300 例ノ剖檢＝於テ、上顎竇化膿ト齒牙疾患ト直接連絡アルモノ 1 例ノミヲ見タリト云ヒ、Harke (1895) ト E. Fränkel(1896) モ亦、剖檢ノ結果 Zuckermandl ト同様甚ダ稀有ナルコトヲ確證セリ。近年 Wilker(1934) ハ 2000 ノ副鼻竇炎ノ統計的觀察ヲ行ヘルニ、肉眼的ニ齒牙ヨリ發來セル上顎竇炎ナルコト明確ナルモノハ僅カニ 5 例ノミナリト。

翻ツテ、齒牙疾患＝由來スル所謂齒性上顎竇炎ノ發生機轉＝就キ之ヲ觀ルニ、往古ヨリ種々論議セラレタル所ニシテ、今尚ホ諸説紛々トシテ歸一スル所アルヲ知ラズ。今其大要ヲ述ブレバ Hajek (1909) ハ齒槽突起ノ急性炎症タルト慢性炎症タルトヲ問ハズ、竇ハ常ニ骨組織ヲ通ジテ感染スルモノナリト云ヒ、Tilley ハ竇ノ感染ハ淋巴管又ハ血管ヲ通ジテ起ルカ、或ハ齒牙ニ隣接セル竇粘膜ノ刺激セラルハコトニ因リテ起ルモノナリト云ヒ、Killian (1892) ト Zarniko (1894) ハ神經並ニ血管腔ヲ通ジテ起ルモノナリト云ヘリ、Strubell(1904) ハ上顎竇粘膜ノ深層即チ骨膜層ニ存スル毛細管網、上顎骨海綿質内ニアル粗大網及ビ齒槽及ビ齒根膜細網トハ互ニ極メテ密接ナル結合ヲナシ、故ニ炎症ノ蔓延ハ血管分岐ノ結合ニヨリテ可能ナルコトヲ述ベタリ。我が國ニ於テモ、大正 2 年久保(猪)氏ハ齒根ト上顎竇トノ間ノ骨壁ハ極メテ薄ク、齒根膜ト上顎竇粘膜トノ血管ノ間ニハ、多數ノ吻合アリテ相通ズルガ故ニ、之ニ因リテ病變ハ容易ニ上下ニ移行シ得ルモノナリト述ベタリ。昭和 11 年羽田野氏ハ動物實驗ニヨリ上顎齒牙殊ニ近域ノ臼齒ニ於テハ、上顎竇ト或程度ノ淋巴路ノ連絡ヲ有スル事ヲ證シ、齒性上顎竇炎ノ成因ニ關シ、淋巴路ニヨル轉位感染ノ可能ナルヲ立證セリ。然レドモ、今其齒性上顎竇炎ノ發生機轉ニ關スル研究ハ暫ク措キ古ク文献ヲ徵スルニ、齒牙疾患ニヨル齒槽突起部慢性炎症ノ如何ナル方法、如何ナル狀態ノモトニ上顎竇ニ感染スルモノナリヤニ就キ、之ヲ病理組織學的ニ檢索ヲ行ヘルモノ甚ダ寥寥タリ。

Weski(1921) ハ屍體上顎ニ於テ、「レ」線像ト病理組織像トヲ精密ニ檢索セルモ、主トシテ齒

牙疾患＝就キテ論ジ。上顎竇トノ關係消息＝就キテハ論及セズ。唯ダ二三症例＝於テ。骨炎症ノ竇＝進行波及セルヲ確認セルノミ。

Siegmund(1929)ハ「齒牙性顎骨炎」ト題シ。動物實驗並ニ屍體上顎竇＝於テ。齒牙周圍組織＝炎症アル場合。必ズ慢性粗鬆性骨炎ヲ隨伴スルモノナリト述べ。其他顎骨ノ病變＝就キ。微ニ入り細ニ亙リ述ブルトコロアリテ。個々＝就キテハ。骨炎ノ竇＝進行スル組織像ヲ圖示シタルモ。骨炎ト上顎竇トノ關係消息＝就キ記載スル所ナシ。

Hoepfel(1936)モ同ジク。屍體上顎骨＝於テ。病理組織學の檢索ヲ行ヒタルモ。専ラ齒牙周圍組織＝炎症アル場合ノ上顎竇粘膜ノ病變＝就キ着目觀察シ。齒牙周圍組織炎＝際シテハ竇底骨ノ吸收融解ナクトモ。穿孔管＝沿ヒテ炎症ハ竇＝波及スルコトアルヲ證セリ。

之等ハ皆。齒槽突起＝炎症アル場合ノ上顎竇ノ變化＝就キ論ジタルモ。之ヲ逆ニ上顎竇粘膜＝炎症アル場合。上顎齒槽突起並ニ齒牙＝變化ヲ及ボスコトハ容易ニ想像サル、所ナルモ。此際＝於ケル骨組織並ニ齒牙ノ檢索ハ殆ンド閉却視サレタル觀アリ。唯ダ僅カニ Manasse(1922), Nüßmann(1926), Berberich(1932)等之＝就キ述ブルトコロアリト雖モ。甲論乙駁。未ダ定説アルヲ知ラズ。

斯クノ如ク。上顎齒槽突起ト上顎竇底トノ相連關セル病理組織學の關係＝就キテハ。更ニ研究ヲ要スベキ事項ヲ多ク遺セルハ。臨牀上。上顎竇並ニ齒槽突起ヲ切除シ。以テ組織學のニ其病理ヲ檢索スルコトノ殆ンド不可能ナルコト＝原因スト云フヲ得ベシ。

一方。戦近「レ」線學ノ長足ノ進歩ト共ニ。近

時漸ク上顎齒槽突起及び上顎竇底ノ「レ」線學的の檢査ヲ行フモノアレドモ。此部「レ」線像判讀＝就テハ。未ダ解決サレザル點極メテ多ク。特ニ上顎竇底部＝於ケル「レ」線像＝就テハ詳細ニ釋明ヲ企テタルモノナク。殆ンド未解決ノ状態＝アリ。之余ガ本研究ヲ企圖シタル所以ニシテ。先ニ第1報(大日本耳鼻咽喉科會報第42卷第3號參照)＝於テ。屍體33體上顎骨66個＝就キ。上顎齒槽突起及び上顎竇底ノ「レ」線學的の檢査ヲ口外並ニ口内撮影法ニヨリ施行セル成績ヲ發表シ置ケリ。更ニ今茲ニ之等ノ病理組織學の檢査ヲ遂ゲタルヲ以テ。先ニ述べタル「レ」線學的研究トノ比較對照ヲ行ヒ。尙ホ口外撮影法ト口内撮影法トノ異同點ニ言及シ。相互ノ關係ヲ稍ニ釋明シ。些カ見ルベキ成績ヲ得タルヲ以テ。之ヲ發表シ。大方諸賢ノ御批判ヲ仰ガントス。

第二章

研究材料並ニ研究方法

研究材料。本研究第1報ニ用ヒタルモノト同ジ。

研究方法。標本部位ハ第1報ニ述べタル「レ」線像ニ相當スル部位ヲ擇ベリ。

標本ハ豫メ屍體ノ血管内ニ「フォルマリン」水溶液ヲ注入シテ屍體全部ヲ「アルコール」ニ貯藏シタル材料ヨリ上顎骨ヲ切除シ。之ヲ今村、隼稻氏ノ賞用シタルミューレル氏液(重「クローム」酸加里2.5。硫酸「ナトリウム」1.0。水100.0cc)100ccニ硝酸5.0ccヲ加ヘタル液體ヲ以テ脱灰シタリ。即チ最初1週間ハ毎日脱灰液ヲ替ヘ。第2週ハ2日毎ニ1回交換シ。此間＝於テ。銳刀ニテ上顎骨ヲ2—3個ニ分割シタリ。

以後ハ3日毎ニ1回脱灰液ヲ交換シ、脱灰ノ完全ナルヲ俟チ、10日間充分ニ水洗シ、後70%「アルコール」ニテ4日間、80%「アルコール」ニテ2日間、90%「アルコール」ニテ3日間、無水「アルコール」ニテ3日間脱水シ、次イデ「ツェロイジン」包埋ヲ施シテ組織切片ヲ作成シ、「ヘマトキシリンエオジン」染色法ヲ行ヒテ検索ニ供セリ。

組織切片ハ全部頰舌面ノ方向ニ切り、可及的大形ニ作リテ組織全體ノ構造及ビ周圍トノ關係ヲ明瞭ニ研索シ得ル様努メタリ。

第三章 實驗成績

各症例ノ病理組織學的所見ヲ述ブルニ先ダチ、上顎齒槽突起及び上顎竇底ノ局所解剖ニ就キ、特ニ注目セル部位ニ就キ説明ヲ加ヘン。

先ヅ、齒槽突起ハ齒牙(白堊質)、齒髓、齒齦、齒根膜及ビ齒槽骨ヨリ成ル。右ノ中近年齒科學ニ於テ、齒牙(白堊質)、齒根膜、齒槽骨ハ生理的ニモ解剖學的ニモ發生學的ニモ單一的ノモノナリトノ見解ノモトニ、之等三者ヲ綜合シテ齒牙周圍組織(Paradentium, Parodontium)ナル名稱ヲ以テ現ハサルニ至レリ。即チ所謂齒根膜 Periodontium ハ白堊質ト齒槽骨トヲ靱帶連合ヲ以テ結合スルモノニシテ、此間ニハ血管、淋巴管並ニ神經アリテ、之等白堊質ト齒骨ヲ連絡スルモノニシテ、齒根膜モ齒牙周圍組織ノ一部ニ屬ス。從ツテ齒根膜ニ炎症アル場合ハ必然的ニ齒槽骨ニ炎症ヲ及ボスモノナルニヨリ、之ヲ單ニ齒根膜炎ナル名稱ヲ以テ呼ブハ妥當ナラズトナスモノナリ。

此齒牙周圍組織ナル名稱ハ1927年 Landsber-

ger, Weski ノ嚙メテ唱導セントコロニシテ、此研究業績發表セラル、ヤ。齒科學ニ於テ臨牀並ニ治療上ニ一大進歩ヲ劃シ、爾來諸大家ニヨリテモ盛ニ賞用セラルニ至レリ。余モ亦 Landsberger ト Weski ノ説ニ倣ヒ、齒牙(白堊質)、齒根膜、齒槽骨ヲ總合シテ齒牙周圍組織ト呼ベリ。

從ツテ、此部ニ於テ炎症性變化アルモノヲ齒牙周圍組織炎ト呼ビ、炎症ノ齒根端ニ局限スルモノヲ根端性齒牙周圍組織炎、炎症ノ齒根端ニ局限セズシテ、齒根膜全體ニ亙リテ存スルモノヲ周緣性齒牙周圍組織炎ト命名セリ。

尙ホ齒牙周圍組織炎ナル名稱ハ前述ノ如ク齒槽骨々炎ノ存在スルコトヲ意味スルモノナレドモ、余ハ之等ノ中特ニ齒槽突起ノ病變、即チ齒牙周圍組織炎ニ附隨セル骨炎ニ注目觀察シ、之ヲ便宜上炎症ノ齒根端ニ局限スルモノヲ根端性骨炎、齒根端ニ局限セザルモノヲ瀰蔓性骨炎ト命名セリ。

齒牙周圍組織ノ齒槽骨及ビ之ヲ遠ザカル部位ノ齒槽骨ハ多數ノ網狀ヲナセル骨梁アリテ、其間脂肪組織ヲ見ル。骨梁ハ人、年齡ニヨリテモ或ハ部位ニヨリテモ其太サヲ異ニスルモノナレドモ、大體ニ於テ第6症例左側ヲ正常ナル對照トシテ他ノモノト比較シ、骨梁ノ粗トナリテ細クナレルモノヲ萎縮セルモノトセリ。之等齒槽骨骨梁甚ダシク萎縮減少シ、尙ホ該骨梁間結締組織増殖セルモノヲ病理組織學上纖維性骨炎ト命名セリ。

次ニ特ニ竇底骨部ニ注目スルニ、此部ニハ竇底皮質ヲ成ス骨壁アリテ、齒槽骨ト上顎竇トヲ境スレドモ、所々ハーベルス氏管間隙アリテ齒槽骨々髓ハ上顎竇粘膜ト交通セリ。竇底皮質ヲ成

ス骨壁ハ即チ網狀ヲナセル海綿質骨梁ノ上縁ニシテ、他ノ骨梁トヨク區別サル、場合アリ。或ハ他ノ骨梁ト相交錯シ區別劃然タラザルモノアレドモ、該齒槽骨々梁ト比較シ、大體ニ於テ第6症例左側ノ竇底皮質ヲ成ス骨壁ヲ肥厚セザルモノ、對照トシ。肥厚セルモノト肥厚セザルモノトニ區別セリ。尙ホ其外骨増殖機轉（造骨細胞）ノ有無ヲ檢セリ。

脂肪骨髓ノ結締織性ニ變化セルモノヲ纖維髓ト呼稱セリ。

尙ホ齒槽突起骨梁間、破骨細胞、造骨細胞ヲ認ムルモノアリ。之等ヲ著明ニ認ムルモノヲ記載シ、著明ナラザルモノハ之ヲ省略セリ。

齒髓ニ就キテハ專ラ齒科學ニ屬シ、余ノ研究目的ニ非ラザルヲ以テ單ニ生活髓ニシテ異常ナキモノト、壞死ニ陷レルモノトニ區別シ、詳細ニ就キテハ之ヲ述ベズ。其他齒齦ニ就キテモ其記載ヲ省略セリ。

次ニ上顎竇底粘膜ハ骨膜、上皮下組織、上皮組織ニ大別セラル。竇粘膜ニ異常ナキモノハ、例之第6症例左側ノ如ク骨膜ハ他部ニ比シ結締織纖維稍ニ密ナリ。

上皮下組織モ一般ニ極メテ鬆粗ナル結締織ヨリ成リ、腺ハ分歧セル管狀葡萄狀細胞腺ニシテ、其周圍ニモ炎症性變化ヲ認メズ。又腺腔ノ擴大セルモノナシ。

上皮組織ハ重層扁平圓柱細胞ヨリ成リ、盃狀細胞ヲ含ム。

即チ、第6症例左側ヲ上顎竇底粘膜ノ異常ナキモノ、對照トシ、炎症性變化ヲ認ムルモノニ就キテハ之ヲ骨膜、上皮下組織、上皮組織ノ各層ニ分テ之ヲ記載セリ。

細胞浸潤ハ淋巴球、「プラスマ」細胞、「エオジ

ン」嗜好細胞、組織球等アレドモ、之等ヲ闡明ニ圓形細胞ト記載シ、以テ多核白血球浸潤ト區別セリ。

各症例ノ病理組織學の所見ハ次ノ如シ。

症例番號1。性♂。年齢30。兩側。標本部位第2大臼齒。

齒槽突起部。齒髓異常ヲ認メズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根アリテ、全齒牙周圍組織ニ炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位ニ於テモ異常ナシ。骨梁ハ全體ニ亘リテ萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ菲薄ニシテ、骨造殖、造骨細胞ヲ認メズ。此部骨髓ニ著變ナシ。骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管ニモ異常ナシ。

竇底粘膜部。骨膜ニ異常ナク、其他上皮下組織、上皮組織ニ炎症性變化ヲ認メズ。唯上皮ハ所々人工的ニ剝脱シ、僅カニ盃狀細胞ノ増加セルヲ見ル。

病理組織學の診斷。兩側共異常ナシ。

症例番號2。性♂。年齢34。兩側。標本部位第1大臼齒。

齒槽突起部。齒髓異常ヲ認メズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根アリテ、全齒牙周圍組織ニ炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位ニ於テモ異常ナシ。骨梁ハ全體ニ亘リテ萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ所々造骨細胞アリ。此部位ニ於ケル骨髓ニハ異常ナシ。骨髓ト竇底トヲ結ブハーベルス氏管ニハ異常ナシ。

竇底粘膜部。骨膜ニハ結締織増殖セルモ、細胞浸潤ナシ。上皮下組織ハ浮腫狀ニ肥厚シ、全

體ニ亙リテ輕度ノ圓形細胞ノ浸潤アリ。上皮組織ハ毳毛圓柱上皮ニシテ、一般ニ盃狀細胞増加ス。所々人工的ニ剝脫ス。

病理組織學的診斷。慢性上顎竇炎。

症例番號3。性♂。年齢39。(1) 左側。標本部位。第2大白齒。

齒槽突起部。齒髓異常ヲ認メズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根アリテ。全齒牙周圍組織ニ炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位ニ於テモ異常ナシ。骨梁ハ全體ニ亙リテ萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ニ骨増殖。造骨細胞ナク。一般ニ菲薄ナリ。此部骨髓ニ著變ナク竇底ニ通ズルハーベルス氏管ニモ著變ナシ。

竇底粘膜部。炎症性變化ヲ認メズ。

病理組織學的診斷。異常ナシ。

(2) 右側。標本部位。第2小白齒。

齒槽突起部。齒髓ハ標本ニ現ハレズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根及び頰側根アリテ。兩根端ハ著明ナル吸收ノ像ヲ呈ス。兩根端部ニ多核白血球。圓形細胞ノ浸潤アリテ。肉芽組織ヲ形成シ。上皮帶ナシ。肉芽組織ノ周圍ハ緻密ナル結締組織ヲ以テ圍繞セラルコトナク。境界不明ニ周圍骨梁間ニ移行ス。周圍骨梁ハ吸收サレ。其間圓形細胞ノ浸潤アリテ骨梁ニ波及スレドモ。周圍ハ劃然ト纖維髓ヲ以テ圍繞セラル。細胞浸潤ハ血管周圍ニ著明ナレドモ竇底ニ波及セズ。之ヲ遠ザカル部モ多クハ纖維髓トナレリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ニ肥厚増殖ナシ。此部位ニ於ケル骨髓ニ異常ナク。骨髓ヨリ竇底ニ通ズルハーベルス氏管ニモ異常ヲ認メズ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織増殖スレドモ。細

胞浸潤ナシ。上皮組織ハ主トシテ圓形細胞ノ浸潤アリ。腺組織増殖シ腺管擴張シ。其間圓形細胞ノ浸潤強シ。上皮組織ハ毳毛圓柱細胞ニシテ。盃狀細胞増加ス。所々人工的ニ剝脫ス。

病理組織學的診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎。慢性根端性骨炎。慢性上顎竇炎。

症例番號4。性♀。年齢76。(1) 左側。標本部位。無齒上顎ニシテ。大白齒ニ該當スル部位。

齒槽突起部。骨梁ハ一般ニ著明ニ萎縮ス。骨髓ノ大部分ハ脂肪細胞ヲ以テ充タサレ。骨梁間ニ炎症性變化ヲ認メズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ニ肥厚増殖。造骨細胞ナシ。此部位ニ於ケル骨髓ニ著變ナク所々竇底ニ通ズルハーベルス氏管アレドモ異常ナシ。

竇底粘膜部。全ク炎症性變化ヲ認メズ。上皮組織ハ所々人工的ニ剝脫ス。

病理組織學的診斷。異常ナシ。

(2) 右側。標本部位。無齒上顎ニシテ。大白齒ニ該當スル部位。

齒槽突起部。骨梁ハ一般ニ著明ニ萎縮ス。骨梁間ニ炎症性變化ナク。大部分ハ脂肪細胞ヲ以テ充サル。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ著明ニ肥厚増殖シ。造骨細胞アリ。此部位ニ於ケル骨髓ニ著變ナク。所々骨髓ト竇底ニ通ズルハーベルス氏管アレドモ異常ナシ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織増殖シ。細胞浸潤ナシ。上皮組織ハ結締組織増殖シ浸潤少シ。腺ハ輕度ニ増殖ス。上皮組織ハ所々人工的ニ剝脫スレドモ。著變ナク傾カニ盃狀細胞増加セリ。

病理組織學的診斷。慢性上顎竇炎。

症例番號5。性♂。年齢70。(1) 左側。標本部位。第1大白齒。

齒槽突起部。齒髓ハ全ク壞疽＝陥ル。

齒牙周圍組織。口蓋側根端白堊質ハ著明ナル吸收ノ像ヲ呈ス。口蓋根端＝上皮帶ヲ有スル肉芽組織ヲ形成シ。周圍ハ緻密ナル結締組織纖維ヲ以テ圍繞セラル。該結締組織纖維ハ著明ニ層狀ヲナシテ走。纖維間及ビ纖維外ニ主トシテ多核白血球ノ著明ニ浸潤スルアリテ。周圍骨髓＝波及シ。急性炎症像ヲ示メセリ。多核白血球ノ浸潤ハ血管ニ沿ヒテ著明ナレドモ。齒根ト竇底トノ間隔大ニシテ竇底皮質＝及ベズ。周圍骨梁ハ著明ニ吸收サレ所々破骨細胞アリ。之ヲ遠ザカル部位ハ多クハ纖維髓ニシテ脂肪髓ヲナス部ハ極メテ尠シ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ著明ニ造骨細胞アリ。此部位ニ於ケル骨髓ニ著變ナシ。骨髓ト竇底トヲ通ズルハーペルス氏管ニモ著變ヲ見ズ。

竇底粘膜部。骨膜＝ハ結締組織ノ増殖並ニ細胞浸潤アリ。上皮下組織ハ多核白血球。圓形細胞ノ浸潤高度ナリ。腺組織ハ強ク増殖シ腺管ノ擴大セルモノアリ。上皮組織ハ毳毛圓柱上皮ニシテ所々人工的ニ剝脱シ。盃狀細胞増加セリ。

病理組織學的診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎(急性ノ轉機ヲトレルモノ)。慢性根端性骨炎。慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。無齒上顎ニシテ。略略大白齒＝該當スル部位。

齒槽突起部。骨梁ハ著シク萎縮ス。骨梁間稍結締組織多キモ。大部分ハ脂肪細胞ヲ以テ充タサレ。炎症性變化ヲ認メズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ニ肥厚増殖ナシ。

此部位ニ於ケル骨髓ニ著變ナク。竇底＝通ズルハーペルス氏管ニモ異常ナシ。

竇底粘膜部。全ク炎症性變化ヲ認メズ。上皮組織ハ人工的ニ全ク剝脱セリ。

病理組織學的診斷。異常ナシ。

症例番號6。性♂。年齢54。兩側。標本部位。第2大白齒。

齒槽突起部。齒髓異常ヲ認メズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根アリテ兩根端ハ竇底ト甚ダ接近シ。僅カニ薄キ骨壁ヲ以テ隔テラル。齒牙周圍組織ハ全體ニ亙リテ炎症性變化ナシ。之ヲ遠ザカル部位ニ於テモ異常ナシ。骨梁ハ全體ニ亙リテ萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ菲薄ニシテ。骨増殖。造骨細胞ナシ。此部位ノ骨髓ニモ著變ナク。骨髓ヨリ竇底＝通ズルハーペルス氏管ニ異常ヲ認メズ。

竇底粘膜部。骨膜＝異常ナク。上皮下組織。上皮組織＝炎症性變化ヲ認メズ。唯ダ上皮組織ハ人工的ニ剝脱シタリ。

病理組織學的診斷。兩側トモ異常ナシ。

症例番號7。性♀。年齢33。(1) 左側。標本部位。第2大白齒。

齒槽突起部。齒髓異常ナシ。

齒牙周圍組織。口蓋側根アリテ。齒牙周圍組織全體ニ亙リテ炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位ニ於テモ異常ナシ。骨梁ハ全體ニ亙リテ萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ菲薄ニシテ骨増殖。造骨細胞ナシ。此部骨髓ニ著變ナシ。骨髓ト竇底トヲ通ズルハーペルス氏管ニモ異常ナシ。

竇底粘膜部。炎症性變化ヲ認メズ。上皮組織

ハ人工的ニ剝脱シ。僅カニ盃狀細胞ノ増加セルヲ見ル。

病理組織學的診斷。異常ナシ。

(2) 右側。標本部位。第2大臼齒。

齒槽突起部。齒髓異常ヲ認メズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根トアリテ。齒牙周圍組織全體ニ亙リテ炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位ニ於テモ異常ナシ。骨梁ハ一般ニ萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ造骨細胞アリ。此部骨髓ニ異常ナク。骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管ニモ異常ナシ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織強ク増殖スレドモ。細胞浸潤ナシ。上皮下組織ニ結締組織増殖シ細胞浸潤少シ。腺ハ増殖シ腺腔擴大セルモノアリ。上皮組織ハ毳毛圓柱細胞ニシテ盃狀細胞多シ。所々人工的ニ剝脱ス。

病理組織學的診斷。慢性上顎竇炎。

症例番號8。性♀。年齢50。兩側。標本部位。第2大臼齒。

齒槽突起部。齒髓異常ヲ認メズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根アリテ。左側ニ於テハ根端ハ竇内ニ裸出シ。竇粘膜ヲ以テ被覆サル。齒牙周圍組織ハ全體ニ亙リテ炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位ニ於テモ炎症性變化ナシ。骨梁ハ一般ニ萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ菲薄ニシテ。骨増殖ナシ。此部位ニ於ケル骨髓ニ著變ナク。骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管ニモ異常ナシ。

竇底粘膜部。炎症性變化ナシ。上皮組織ハ人工的ニ剝脱シ盃狀細胞増加セリ。

病理組織學的診斷。異常ナシ。

症例番號9。性♀。年齢49。兩側。標本部位。無齒上顎ニシテ大臼齒ニ該當スル部位。

齒槽突起部。骨梁ハ一般ニ著明ニ萎縮ス。

骨髓ハ脂肪細胞ヲ以テ充タサレ。炎症性變化ヲ認メズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ニ増殖ナシ。此部骨髓ニ著變ナク。竇底ニ通ズルハーベルス氏管ニモ異常ナシ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織増殖シ。細胞浸潤ナシ。上皮下組織ハ結締組織増殖シ浸潤少シ。腺ハ輕度ニ増殖ス。上皮組織ハ毳毛圓柱上皮ニシテ。所々人工的ニ剝脱シ盃狀細胞増加セリ。

病理組織學的診斷。慢性上顎竇炎。

症例番號10。性♂。年齢50。(1) 左側。標本部位。大臼齒ニ該當スル部位。

齒槽突起部。骨梁ハ一般ニ萎縮減少シ。其間著明ナル結締組織ノ増殖アリ。然レドモ。骨髓ニハ竇底骨部ヲ徐キ。細胞浸潤ナシ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ著明ニ肥厚増殖シ所々ニ造骨細胞アリ。此部位ニ於ケル骨髓ハ結締組織増殖シ。且ツ瀰蔓性ニ輕度ノ圓形細胞浸潤アリ。骨髓ト竇底トヲ結ブハーベルス氏管ニモ瀰蔓性ニ細胞浸潤アリ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織ノ増殖著明ニシテ。其間白血球ノ浸潤アリ。上皮下組織ハ白血球ノ浸潤高度ニシテ血管ノ増殖著明ナリ。腺組織ハ殆ンド認メラレズ。上皮組織ハ大部分剝脱セリ。盃狀細胞ノ増加ヲ見ル。

病理組織學的診斷。纖維性骨炎。慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。第2大臼齒。

齒槽突起部。齒髓異常ヲ認メズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根トアリ

テ齒牙周圍組織＝全ク炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位＝於テモ異常ヲ認メズ。骨梁ハ一般＝萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ緻密トナリテ肥厚増殖シ所々造骨細胞アリ。此部位＝於ケル骨髓＝著變ナク。竇底＝通ズルハーペルス氏管組織中＝ハ認メラレズ。

竇底粘膜部。骨膜＝ハ太キ結締組織増殖スレドモ、細胞浸潤認メラレズ。上皮組織ハ主トシテ浮腫狀ヲ呈シ。一部ハ結締組織増殖ス。「プラスマ」細胞、淋巴球ノ浸潤アリ。腺ハ増殖シ。血管壁甚ダシク肥厚ス。上皮組織ハ所々人工的＝剝脱スレドモ、氈毛圓柱細胞ニシテ、盂狀細胞増加ス。

病理組織學の診斷。慢性上顎竇炎。

症例番號 11。性♂。年齢 46。兩側。標本部位。第 2 大臼齒。

齒槽突起部。齒髓異常ナシ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根トアリテ。口蓋根端ハ竇内ニ裸出シ竇粘膜ノミヲ以テ被覆サレ。僞メ＝竇底骨壁ハ此部＝於テ缺如セリ。然レ共齒牙周圍組織ハ全體＝亙リテ炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位＝於テモ異常ヲ認メズ。骨梁ハ一般＝萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ主トシテ齒根ト竇底トヲ境スル骨壁ニシテ、菲薄ニシテ骨増殖ナシ。此部位＝於ケル骨髓＝著變ナク。骨髓ト竇底トヲ通ズルハーペルス氏管＝モ異常ナシ。

竇底粘膜部。全ク炎症性變化ヲ認メズ。上皮組織ハ人工的＝所々剝脱シ。盂狀細胞増加ス。

病理組織學の診斷。異常ナシ。

症例番號 12。性♀。年齢 38。兩側。標本部位。無齒上顎ニシテ、略ニ大臼齒＝該當スル部位。

齒槽突起部。骨梁ハ一般＝萎縮ス。骨髓ハ脂肪細胞ヲ以テ充タサレ。炎症性變化ヲ認メズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ所々造骨細胞アリ。但シ此部位＝於テモ骨髓＝變化ナク。竇底＝通ズルハーペルス氏管＝モ異常ヲ認メズ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織増殖シ。細胞浸潤ナシ。上皮組織ハ浮腫狀ヲ呈シ。其間白血球ノ浸潤アリ。腺組織ハ輕度＝増殖シ。其間結締組織ノ増殖著明ナリ。上皮組織ハ氈毛圓柱上皮ニシテ。盂狀細胞増加ス。所々人工的＝剝脱ス。

病理組織學の診斷。慢性上顎竇炎。

症例番號 13。性♀。年齢 74。(1) 左側。標本部位。第 2 大臼齒。

齒槽突起部。齒髓ハ壞疽＝陷ル。

齒牙周圍組織。口蓋側根ハ組織標本製作時損傷脱落シ遠心頰側根ノミ殘ル。遠心根端白堊質ハ著明ナル吸收ノ像ヲ呈ス。遠心根端＝於テハ上皮帶ヲ有スル肉芽組織ヲ形成シ。周圍ハ緻密ナル結締組織纖維ヲ以テ圍繞セラル。周圍骨梁ハ吸收セラレ。其間圓形細胞ノ浸潤アリテ周圍骨髓＝波及セリ。細胞浸潤ハ血管＝沿ヒテ著明ニシテ竇底＝達セリ。之ヲ遠ザカル部位モ多クハ纖維髓トナレリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ造骨細胞アリ。此部位＝於ケル骨髓＝ハ、前記齒牙周圍炎症ノ圓形細胞ノ浸潤アリ。尙ホ圓形細胞浸潤ハ、骨髓ト竇底トヲ通ズルハーペルス氏管内血管＝沿ヒテ竇底骨膜＝波及セリ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織増殖シ。齒牙周圍組織炎＝隣接スル部位＝ハ圓形細胞ノ浸潤著明ナリ。上皮組織ハ主トシテ、多核白血球。圓形細胞ノ浸潤アリ。腺ハ増殖シ管腔擴張ス。血

管壁ノ肥厚著明ナリ。細胞浸潤ハ齒牙ト近接スル部ニ於テ著明ナリ。上皮組織ハ毳毛圓柱上皮ニシテ、盃狀細胞増加ス。所々人工的ニ剝脫ス。

病理組織學の診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎、慢性根端性骨炎、慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。第2大臼齒。

齒槽突起部。齒髓ニ著變ヲ認メズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根アリテ、齒牙周圍組織全體ニ亙リ炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位ニテモ著變ナシ。骨梁ハ一般ニ萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ菲薄ニシテ骨増殖ナシ。此部位ニ於ケル骨髓ニ著變ナク、竇底ニ通ズルハーベルス氏管組織中ニ認メラレズ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織増殖シ、細胞浸潤アリ。上皮組織ハ高度ノ浮腫ヲ呈シ其間ニ白血球浸潤ス。腺組織ハ輕度ニ増殖シ其間ニモ、浮腫並ニ細胞浸潤アリ。上皮組織、大部分ハ人工的ニ剝脫セルモ、毳毛圓柱細胞ニシテ盃狀細胞多シ。

病理組織學の診斷。慢性上顎竇炎。

症例番號 14。性♂。年齢 52。(1) 左側。標本部位。第2大臼齒。

齒槽突起部。口蓋側根ト近心頰側根トアリテ、齒牙周圍組織ニハ全體ニ亙リテ炎症性變化ナシ。之ヲ遠ザカル部位ニ於テモ異常ナシ。骨梁ハ一般ニ萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ著シク肥厚増殖シ、造骨細胞アリ。此部位ニ於ケル骨髓ニ著變ナシ。骨髓ヨリ竇底ニ通ズルハーベルス氏管ハ組織中ニハ認メラレズ。

竇底粘膜部。骨膜ニハ結締組織増殖スレドモ、

細胞浸潤ナシ。上皮組織ハ結締組織強ク増殖シ輕度ノ浮腫アリテ、白血球ノ浸潤少シ。腺ハ増殖シ、腺管ノ擴張セルモノ。又ハ囊腫ヲ形成セルモノアリ。上皮組織ハ毳毛圓柱細胞ニシテ盃狀細胞多シ。所々人工的ニ剝脫ス。

病理組織學の診斷。慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。第1大臼齒。

齒槽突起部。齒髓ハ全ク壞疽ニ陥ル。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心側根アリテ、兩根端白聖質ハ著明ニ吸收サル。兩根端ニ肉芽組織ヲ形成シ、上皮帶ヲ有セズ。肉芽組織ノ周圍ハ緻密ナル結締組織纖維ヲ以テ圍繞セラル。周圍骨梁ハ吸收サレ、其間圓形細胞ノ浸潤アリテ、僅カニ周圍骨髓ニ波及セルモ竇底ニ及バズ。周圍骨梁間所々破骨細胞ヲ認ム。之ヲ遠ザカル部位モ多クハ纖維髓トナレリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ造骨細胞アリ。此部位ニ於ケル骨髓ハ纖維髓ナレドモ細胞浸潤ナシ。骨髓ト竇底ヲ通ズルハーベルス氏管ニ異常ヲ認メズ。

竇底粘膜部。骨膜ニ結締組織増殖スレドモ細胞浸潤ナシ。上皮組織ハ浮腫ヲ主トシテ、其間多核白血球ノ浸潤アリ。腺組織ハ高度ニ増殖シ其間浮腫並ニ浸潤アリ。上皮組織ハ全ク人工的ニ剝脫セリ。

病理組織學の診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎、慢性根端性骨炎、慢性上顎竇炎。

症例番號 15。性♀。年齢 68。兩側。標本部位。無齒上顎ニシテ大臼齒ニ該當スル部位。

齒槽突起部。骨梁ハ一般ニ著シク萎縮ス。骨髓ニ著變ヲ認メズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ緻密トナリテ著明ニ肥厚増殖シ、所々造骨細胞アリ。但シ此部

位＝當ル骨髓＝變化ナク。竇底＝通ズルハーベルス氏管＝モ異常ヲ認メズ。

竇底粘膜部。骨膜ハ太キ結締組織増殖シ其間白血球少シク浸潤ス。上皮下組織ハ浮腫ヲ主トシ浸潤著シカラズ。腺ハ著明ニ増殖シ。此部ニ於テモ輕度ノ浮腫アリ。上皮組織ハ氈毛圓柱細胞ニシテ。盂狀細胞多シ。所々人工的ニ剝脱セリ。

病理組織學的診斷。慢性上顎竇炎。

症例番號 16. 性♂。年齢 64. 兩側。標本部位。殆ンド無齒上顎＝近く。略々大白齒＝該當スル部位。

齒槽突起部。骨梁ハ一般ニ著シク萎縮ス。骨髓ハ脂肪細胞ヲ以テ充タサレ著變ナシ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ。造骨細胞アリ。但シ此部位ニ於テモ骨髓＝變化ナク。竇底＝通ズルハーベルス氏管＝モ異常ヲ認メズ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織強ク増殖シ肥厚スレドモ。細胞浸潤ナシ。上皮下組織ニハ結締組織強ク増殖シ輕度ノ白血球浸潤アリ。腺ハ増殖ス。上皮組織ハ悉ク人工的ニ剝脱セリ。

病理組織學的診斷。慢性上顎竇炎。

症例番號 17. 性♂。年齢 56. (1) 左側。標本部位。殆ンド無齒上顎ニシテ大白齒＝該當スル部位。

齒槽突起部。骨梁ハ一般ニ萎縮減少シ。其間結締組織ノ増殖著明ナリ。骨髓ニハ竇底骨部ヲ徐々。細胞浸潤ヲ認メズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ。所造骨細胞ヲ認ム。此部骨髓ニモ結締組織増殖シ。圓形細胞浸潤ス。骨髓ト竇底トヲ結ブハーベルス氏管ニハ悉ク瀰蔓性ニ圓形細胞浸潤セ

リ。

竇底粘膜部。骨膜ニハ太キ結締組織ノ増殖アリテ。其間多核白血球ノ浸潤アリ。上皮下組織ハ浮腫狀ヲナシテ肥厚シ。多核白血球瀰蔓性ニ浸潤セリ。腺組織ノ増殖認メラレズ。上皮組織ハ殆ンド大部分剝脱スレドモ。氈毛圓柱上皮ニシテ盂狀細胞増加ス。

病理組織學的診斷。纖維性骨炎。慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。第 1 大白齒。

齒槽突起部。齒髓異常ナシ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根トアリテ。齒牙周圍組織ハ全體ニ亘リテ炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位ニテモ異常ナシ。骨梁ハ一般ニ萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ著シク肥厚増殖シ。所々造骨細胞ヲ認ム。此部位ニ於ケル骨髓ニ著變ナク。竇底＝通ズルハーベルス氏管ハ組織中ニハ認メラレズ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織増殖シ輕度ニ肥厚ス。細胞浸潤ナシ。上皮下組織ハ浮腫ヲ主トシ其間ニ白血球浸潤アリ。腺組織極メテ強ク増殖シ。腺腔ノ擴大囊腫ヲ作ルモノアリ。上皮組織ハ所々人工的ニ剝脱スレドモ。氈毛圓柱上皮ニシテ細胞浸潤ス。盂狀細胞増加ス。

病理組織學的診斷。慢性上顎竇炎。

症例番號 18. 性♀。年齢 56. (1) 右側。標本部位。第 2 大白齒。

齒槽突起部。齒髓ハ全ク壞疽ニ陥ル。

齒牙周圍組織。口蓋根端白聖質ハ著明ナル吸收ノ像ヲ呈ス。齒根端部ニ上皮帶ヲ有スル肉芽組織アリテ。周圍ハ結締組織ヲ以テ圍繞セラル。周圍骨梁ハ吸收サレ其間瀰蔓性ニ圓柱細胞ノ浸

潤アレドモ、竇粘膜トノ間ニハ健全ナル骨層アリテ、骨炎ト竇トノ間ニ直接ノ連絡ヲ證セズ。齒牙周圍組織ヲ遠ザカル部位ハ多クハ脂肪髓ナリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ニ肥厚増殖ナシ。此部位ニ於ケル骨髓ニ異常ナク、骨髓ヨリ竇底ニ通ズルハーペルス氏管ニ富メドモ異常ナシ。

竇底粘膜部。骨膜ニハ結締組織増殖スレドモ細胞浸潤ナシ。上皮組織ハ大部分浮腫狀ヲ呈シ、一部ハ反ツテ結締組織ノ増殖ヲ見、一般ニ輕度ノ圓形細胞浸潤アリ。粘液腺稍々増加スレドモ血管ノ變化著明ナラズ。上皮組織ハ氈毛圓柱細胞ニシテ所々人工的ニ剝脱シ、盃狀細胞増加ス。又上皮層内所々空胞ノ形成著明ナリ。

病理組織學的診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎、慢性根端性骨炎、慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。第2大臼齒。

齒槽突起部。齒髓、齒牙ハ標本製作時損傷ニヨリ悉ク脱落シタルヲ以テ不詳ナリ。

齒牙周圍組織。齒根端ニ該當スル部ニ於テ、多核白血球、圓形細胞ノ浸潤アリテ肉芽組織ヲ形成ス。上皮帶ナシ。肉芽組織ハ緻密ナル結締組織ヲ以テ圍繞セラル、コトナク境界不明ニ周圍骨梁間ニ侵入ス。周圍骨梁ハ吸收サレ其間瀰蔓性ニ多核白血球ノ浸潤アリ。細胞浸潤ハ血管ニ沿ヒテ進行シ竇底骨壁ニ達ス。所々破骨細胞ヲ見ル。齒牙周圍組織ヲ遠ザカル部位ハ脂肪髓ナリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ニ肥厚増殖ナシ。此部骨髓ハ齒根端ニ當リ、齒牙周圍炎症ノ細胞浸潤玆ニ波及シ尙ホ骨髓ト竇底トヲ通ズルハーペルス氏管内血管ニ沿ヒテ竇骨膜、粘膜ニ達ス。

竇底粘膜部。骨膜ハ一般ニ結締組織増殖シ、細胞浸潤ナシ。前記ノ如ク唯齒根端ト隣接スル部ニ於テ、僅カニ細胞浸潤ヲ認ム。上皮組織ハ浮腫狀ニ肥厚シ全體ニ輕度ノ圓形細胞ノ浸潤アリテ、齒牙ニ隣接スル部ニ於テ著明ナルヲ認ム。腺組織ハ増殖シ腺管ハ著明ニ擴張ス。所々圓形細胞浸潤ノ集積アリ。上皮ハ大部分剝脱シ亂雜トナレドモ、氈毛圓柱細胞ニシテ一般ニ盃狀細胞増加ス。

病理組織學的診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎、慢性根端性骨炎、慢性上顎竇炎。

症例番號 19。性♀。年齡 87。(1) 左側。標本部位。殆ンド無齒上顎ニ近ク大臼齒ニ該當スル部位。

齒槽突起部。骨梁ハ高度ニ萎縮減少ス。骨梁間ニハ結締組織ノ増殖著明ナリ。但シ細胞浸潤ヲ見ズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ著明ニ肥厚増殖シ所々造骨細胞アリ。骨増殖シ所々骨膜肥厚組織内ニ突起狀ヲナシテ入り込メリ。骨髓ト竇底トヲ結ブハーペルス氏管結締組織増殖アレドモ細胞浸潤ナシ。

竇底粘膜部。骨膜ニハ強キ結締組織ノ増殖アリテ肥厚スレドモ、細胞浸潤ナシ。上皮組織ハ高度ニ肥厚シ、大部分ハ浮腫狀ヲ呈シ細胞浸潤著シカラズ。腺組織ハ増殖シ、腺腔擴大シ、大ナル囊腫ヲ作ルモノ多數アリ。血管ノ増殖亦著明ナリ。上皮組織ハ剝脱崩壊シ、盃狀細胞著明ニ増加ス。又圓形細胞ノ浸潤ヲ見ル。

病理組織學的診斷。纖維性骨炎、慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。第2小臼齒。

齒槽突起部。齒髓ハ全ク壞死ニ陥ル。

齒牙周圍組織。口蓋頰側根白堊質ハ著明ナル吸收ノ像ヲ呈ス。齒根端周圍ニ多核白血球、圓形細胞ノ浸潤アリテ肉芽組織ヲ形成シ上皮帶ナシ。周圍ハ緻密ナル結締組織纖維ヲ以テ圍繞セラル。周圍骨梁ノ吸收像著明ニシテ、破骨細胞甚ゾ多シ。骨梁間圓形細胞ノ浸潤アリテ周圍骨髓ニ波及シ竇底近クニ達セリ。細胞浸潤ハ血管ニ沿ヒテ殊ニ著明ナリ。之ヲ遠ザカル部位ニ於テモ、多クハ纖維髓ニシテ脂肪髓少シ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ粗ニシテ肥厚増殖ナシ。此部位ニ於ケル骨髓ハ纖維髓ナリ。骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管血管ニ沿ヒテ圓形細胞浸潤シ竇骨膜ニ達セリ。

竇底粘膜部。骨膜ハ一般ニ結締組織増殖シ。僅カニ細胞浸潤アリ。特ニ前記齒牙周圍組織炎ニ隣接ハーベルス氏管附近ニ於テ圓形細胞ノ浸潤著明ナリ。上皮下組織ハ浮腫狀ヲ呈シ、厚サ不同ニシテ多數ノ皺襞アリ。瀰漫性ニ輕度ノ圓形細胞浸潤アリ。腺組織ハ増殖シ腺腔擴大ス。上皮ハ破壊剝脱シ(人工的ナラズ)著明ナル盃狀細胞ノ増加ヲ見ル。

病理組織學的診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎。慢性根端性骨炎。慢性上顎竇炎。

症例番號 20。性♂。年齡 35。兩側。標本部位。第2大白齒。

齒槽突起部。骨髓異常ヲ認メズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根トアリテ、齒牙周圍組織ニ全ク炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位ニ於テモ異常ナシ。骨梁ハ一般ニ萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ粗ニシテ甚ダ菲薄ナリ。骨増殖ヲ認メズ。此部位ニ於ケル骨髓ニ著變ナシ。骨髓ト竇底トヲ結ブハーベルス氏

管アレドモ異常ナシ。

竇底粘膜。全ク炎症性變化ヲ認メズ。上皮組織ハ所々人工的ニ剝脱ス。

病理組織學的診斷。異常ナシ。

症例番號 21。性♀。年齡 89。(1) 左側。標本部位。第2大白齒。

齒槽突起部。齒髓ハ全ク壞死ニ陥ル。

齒牙周圍組織。口蓋側根。近心頰側根アリテ、兩側齒根端白堊質ハ著明ナル吸收ノ像ヲ呈ス。根端ニ上皮帶ヲ有スル肉芽組織ヲ形成シ。周圍ハ緻密ナル結締組織纖維ヲ以テ圍繞セラル。周圍骨梁ハ吸收サレ。其間圓形細胞浸潤アリテ周圍骨髓ニ波及スレドモ、竇底ニ及バズ。齒牙周圍組織ヲ遠ザカル部位ノ骨髓モ、多クハ纖維髓トナレリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ニ肥厚増殖ナシ。此部位ニ於ケル骨髓モ纖維髓ナリ。骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管ニハ異常ヲ認メズ。

竇底粘膜部。全ク炎症性變化ヲ認メズ。

病理組織學的診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎。慢性根端性骨炎。

(2) 右側。標本部位。第2小臼齒。

齒槽突起部。齒髓ハ全ク壞死ニ陥ル。

齒牙周圍組織。口蓋側根。頰側根。白堊質ハ著明ナル吸收像ヲ呈ス。齒根端ニ上皮帶ヲ有スル肉芽組織ヲ形成シ。周圍ハ結締組織纖維ヲ以テ圍繞セラル。周圍骨梁ハ吸收サレ。其間圓形細胞ノ浸潤アリテ周圍骨髓ニ波及セリ。細胞浸潤ハ血管ニ沿ヒテ著明ナレドモ、竇底ニ及バズ。齒牙周圍組織ヲ遠ザカル部位モ骨髓ハ可ナリ廣範ニ亘リテ纖維髓トナリ。脂肪髓ハ少シ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ造骨細胞アリ。此部位ニ於ケル骨髓ニ異常ナク。竇

底＝通ズルハーベルス氏管＝モ異常ヲ認メズ。

竇底粘膜部。骨膜ハ輕度ニ結締組織増殖スレドモ。細胞浸潤ナシ。上皮下組織ハ主トシテ結締組織増殖シ白血球ノ浸潤少シ。腺組織ハ増殖シ腺管擴張セルモノアリ。上皮組織ハ毳毛圓柱上皮ニシテ。盞狀細胞増加ス。

病理組織學の診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎。慢性根端性骨炎。慢性上顎竇炎。

症例番號 22。性♀。年齡 76。(1) 左側。標本部位。殆ンド無齒上顎ニシテ。大臼齒＝該當スル部位。

齒槽突起部。骨梁ノ萎縮著明ナリ。骨髓ハ脂肪細胞ヲ以テ充タサレ。炎症性變化ヲ認メズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁＝肥厚増殖ヲ認メズ。此部位＝於ケル骨髓＝變化ナク。竇底ト通ズルハーベルス氏管＝モ異常ヲ認メズ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織増殖シ肥厚スレドモ細胞浸潤ナシ。上皮下組織ハ結締組織増殖シ輕度ノ浮腫ト白血球浸潤アリ。腺ハ輕度ニ増殖シ腺管擴張セルモノアリ。上皮組織ハ毳毛圓柱上皮ニシテ白血球浸潤アリ。所々人工的ニ剝脱ス。

病理組織學の診斷。慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。第1大臼齒。

齒槽突起部。齒髓ハ全部壞疽＝陷ル。

齒牙周圍組織。口蓋側根端白堊質ハ著明ナル吸收ノ像ヲ呈ス。根端部＝多核白血球。圓形細胞ノ浸潤アリテ。肉芽組織ヲ形成シ上皮帶ナク。周圍ハ結締組織纖維ヲ以テ圍繞セラル。此部ノ骨梁ハ吸收セラレ。其間圓形細胞ノ浸潤アリテ僅カ＝周圍骨髓＝波及スレドモ竇底＝及バズ。之ヲ遠ザカル部位＝於ケル骨髓モ廣範ニ亘リテ纖維腫トナレリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁＝肥厚増殖ナシ。此部骨髓ハ多クハ纖維髓ナレドモ細胞浸潤ナシ。竇底＝通ズルハーベルス氏管＝ハ異常ナシ。

竇底粘膜部。炎症性變化ヲ認メズ。唯ダ上皮組織ハ人工的ニ所々剝脱ス。

病理組織學の診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎。慢性根端性骨炎。

症例番號 23。性♂。年齡 41。(1) 左側。標本部位。第2小臼齒。

齒槽突起部。齒髓ハ壞死＝陷ル。

齒牙周圍組織。口蓋根。頰側根ノ兩根端白堊質ハ著明ナル吸收ノ像ヲ呈ス。根端部＝當リテ肉芽組織ヲ形成シ周圍ニ緻密ナル結締組織アリ。肉芽組織ハ主トシテ「プラスマ」細胞ヨリナリ。上皮帶ヲ有セズ。周圍骨梁ハ吸收サレ。然カモ中央齒根端部＝當リ。竇底骨壁ハ吸收サレ大ナル骨ノ缺損ヲ認ム。此部位ハ前記肉芽組織周壁ノ緻密ナル結締組織ヲ以テ埋メラレ。多核白血球。圓形細胞浸潤シ直接上顎竇骨膜＝移行ス。肉芽組織周壁ノ骨梁間＝ハ僅カ＝圓形細胞浸潤セリ。之ヲ遠ザカル部位モ。多クハ皆纖維腫トナレリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁＝肥厚増殖ナシ。齒根端＝隣接スル部位ハ前記ノ如ク。齒牙周圍組織炎ノ爲メ吸收缺損ヲ見。其間細胞浸潤ノ波及アリ。其他＝骨髓ト竇底トヲ結ブハーベルス氏管ヲ見ズ。

竇底粘膜部。骨膜ハ一般ハ結締組織増殖セルモ細胞浸潤尠シ。但シ竇底骨壁ハ吸收サレ。前記齒牙周圍組織炎症波及セル部＝於テハ。特ニ細胞浸潤著明ニシテ且ツ骨膜ノ走行甚ダシク亂レタリ。上皮下組織ハ一部ハ浮腫狀トナリ。一部＝

於テハ反ツテ結締組織増殖シ。其間多核白血球ノ浸潤アリ。腺組織ハ増殖シ。腺管擴大セリ。細胞浸潤ハ前記齒根部炎症ノ波及セル部ニ於テ特ニ著明ナリ。上皮組織ハ全體ニ亙リテ氈毛圓柱上皮ニシテ。盃狀細胞増加シ所々人工的ニ剝脱ス。

病理組織學的診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎。慢性根端性骨炎。慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。第2大白齒。

齒槽突起部。齒髓ハ壞疽ニ陥ル。

齒牙周圍組織。口蓋側根端白堊質ハ著明ニ吸收ノ像ヲ呈ス。齒根膜全體ニ亙リテ上皮帶ヲ有スル肉芽組織アリテ。周圍ハ緻密ナル結締組織纖維ヲ以テ圍繞セラル。周圍骨梁ハ吸收サレ其間圓形細胞ノ浸潤アリテ。周圍骨髓ニハ血管ニ沿ヒテ著明ニ浸潤シ竇底ニ達セリ。之ヲ遠ザカル部位モ。多クハ纖維髓トナレリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ造骨細胞アリ。此部ニ於ケル骨髓ニハ圓形細胞浸潤セリ。尙ホ圓形細胞浸潤ハ骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管内血管ニ沿ヒテ竇底骨膜ニ波及セリ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織増殖シ。圓形細胞ノ浸潤アリ。特ニ齒牙ニ近接セル部ニ於テ著明ナリ。上下組織ハ結締組織増殖シ多核白血球ノ浸潤アリ。腺組織ハ増殖シ腺腔擴大セルモノアリ。上皮組織ハ氈毛圓柱上皮ニシテ。盃狀細胞増加シ。白血球ノ浸潤アリ。

病理組織學的診斷。慢性周緣性齒牙周圍組織炎。慢性瀰漫性骨炎。慢性上顎竇炎。

症例番號 24。性♂。年齢 40。(1) 左側。標本部位。第3大白齒。

齒槽突起部。齒髓ハ全ク壞死ニ陥ル。

齒牙周圍組織。口蓋側端白堊質ハ著明ナル吸收ノ像ヲ呈ス。齒根端ニ於テ。多核白血球。圓形細胞ノ浸潤アリテ。肉芽組織ヲ形成シ上皮帶ヲ有セズ。周圍ハ緻密ナル結締組織ヲ以テ圍繞セラルコトナク。直チニ境界不明ニ骨梁ニ移行ス。周圍骨梁ハ吸收セラレ。其間圓形細胞ノ浸潤アリテ。僅カニ周圍骨髓ニ波及シ。周圍ハ剝然ト纖維髓ヲ以テ圍マレ竇底ニ及バズ。之ヲ遠ザカル部位ニテモ多クハ纖維髓トナレリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ造骨細胞アリ。此部骨髓ハ纖維髓トナレリ。骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管ニハ著變ナシ。

竇底粘膜部。骨膜ハ輕度ニ肥厚スルノミニテ細胞浸潤ナシ。上皮組織ハ浮腫ヲ主トシ。其間僅カニ多核白血球ノ浸潤アリ。腺組織ハ輕度ニ増殖ス。上皮組織ハ氈毛圓柱細胞ニシテ。盃狀細胞多シ。

病理組織學的診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎。慢性根端性骨炎。慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。第2大白齒。

齒槽突起部。齒髓ハ全ク壞死ニ陥ル。

齒牙周圍組織。口蓋側根端白堊質ハ著明ニ吸收ノ像ヲ呈ス。齒根端ニ多核白血球。圓形細胞ノ浸潤アリテ。肉芽組織ヲ形成シ上皮帶ヲ有セズ。肉芽組織ハ緻密ナル結締組織纖維ヲ以テ圍繞セラル。周圍骨梁ハ吸收セラレ。其間僅カニ圓形細胞ノ浸潤アリテ周圍骨梁ニ波及セルモ。竇底トノ間ニハ尙ホ正常ナル骨髓ヲ以テ境セラル。之ヲ遠ザカル部位ハ多クハ脂肪髓ナリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ニ肥厚増殖ナシ。此部位ニ於ケル骨髓ハ脂肪髓ニシテ。竇底ニ通ズルハーベルス氏管ニ異常ナシ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織増殖セルモ細胞浸

潤ナシ。上皮下組織ハ浮腫アリテ、其間圓形細胞僅カニ浸潤ス。腺組織ハ増殖シ腺管擴張セルモノアリ。血管モ亦増殖ス。上皮組織ハ毳毛圓柱上皮ニシテ、盞狀細胞増加ス。

病理組織學の診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎、慢性根端性骨炎、慢性上顎竇炎。

症例番號 25。性♀。年齢 64。(1) 左側。標本部位。無齒上顎ニシテ、大白齒ニ該當スル部位。

齒槽突起部。骨梁ハ一般ニ著明ニ萎縮ス。骨髓ハ竇底骨部ヲ除キ、脂肪細胞ヲ以テ充タサレ炎症性變化ヲ見ズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ著明ニ肥厚増殖シ。造骨細胞アリ。此部位ニ於ケル骨髓ニハ圓形細胞僅カニ浸潤シ。骨髓ト竇底トヲ結ブハーベルス氏管ニモ細胞浸潤瀰蔓性ニアリ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織増殖シ、其間白血球ノ浸潤著明ナリ。上皮下組織ハ極メテ高度ナル多核白血球圓形細胞ノ浸潤ヲ見ル。腺ハ増殖シ、腺管擴張ス。上皮組織ハ所々人工的ニ剝脱シ。盞狀細胞増加ス。

病理組織學の診斷。慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。無齒上顎ニシテ、大白齒ニ該當スル部位。

齒槽突起部。骨梁ハ一般ニ著明ニ萎縮ス。骨髓ハ竇底骨部ヲ除キ、一般ニ脂肪細胞ヲ以テ充タサレ、炎症性變化ヲ認メズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ全體ニ亙リ、著シク肥厚増殖シ。造骨細胞アリ。此部骨髓並ニ骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管ニハ圓形細胞瀰蔓性ニ浸潤セリ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織増殖シ、其間多核白血球、圓形細胞ノ浸潤著明ナリ。上皮下組織

ハ極メテ高度ナル多核白血球、圓形細胞ノ浸潤ヲ見ル。腺ノ増殖認メラレズ。上皮組織ハ殆ンド剝脱崩壊シ。所々僅カニ認メラルハニ過ギズ。盞狀細胞ノ増加ヲ見ル。

病理組織學の診斷。慢性上顎竇炎。

症例番號 26。性♀。年齢 40。(1) 左側。標本部位。第2大白齒。

齒槽突起部。齒髓異常ヲ認メズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根トアリテ、齒牙周圍組織全體ニ亙リテ、炎症性變化ナシ。之ヲ遠ザカル部位ニ於テモ異常ナシ。骨梁ハ一般ニ萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ菲薄ニシテ骨増殖ナシ。此部骨髓ニ著變ナク、竇底ト通ズルハーベルス氏管ニモ異常ヲ認メズ。

竇底粘膜部。全ク炎症性變化ヲ認メズ。上皮組織ハ所々人工的ニ剝脱ス。

病理組織學の診斷。異常ナシ。

(2) 右側。標本部位。第1大白齒。

齒槽突起部。齒髓ハ全ク壞死ニ陥ル。

齒牙周圍組織。口蓋側根根端白堊質ハ著明ナル吸收ノ像ヲ呈ス。齒根端ニハ上皮帶ヲ有スル肉芽組織ノ形成アリ。肉芽組織中、上皮帶ヲ以テ被覆サレタル囊腫腔形成アリ。肉芽組織周圍ハ緻密ナル結締組織纖維ヲ以テ圍繞セラル。周圍骨梁ハ吸收サレ。其間圓形細胞ノ浸潤ヲ見周圍骨髓ニ波及ス。細胞浸潤ハ血管ニ沿ヒテ、著明ニシテ竇底近クニ達セリ。之ヲ遠ザカル部位モ骨髓ハ多クハ纖維髓トナレリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ニ肥厚増殖ナシ。此部位ニ於ケル骨髓ハ纖維髓ナリ。尙ホ骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管血管ニ沿ヒテ圓形細胞浸潤シ、竇骨膜ニ達セリ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締織増殖シ。齒牙周圍組織ト隣接セル部位＝當リ。圓形細胞ノ浸潤アリ。上皮下組織ハ主トシテ。結締織増殖シ。多核白血球。圓形細胞ノ浸潤少シ。腺組織ノ増殖著明ナラズ。上皮組織ハ毳毛圓柱上皮ニシテ。所々人工的＝剝脱ス。盃狀細胞増加ス。

病理組織學的診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎。慢性根端性骨炎。慢性上顎竇炎。

症例番號 27。性♀。年齢 24。兩側。標本部位。第 2 大白齒。

齒槽突起部。齒髓異常ヲ認メズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根トアリテ。齒牙周圍組織全體＝亙リテ。炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位＝於テモ異常ナシ。骨梁ハ一般＝萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ緻密トナリテ。著明＝肥厚増殖シ造骨細胞ヲ認ム。竇底骨部＝相當スル骨髓並ニ骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管＝僅カ＝圓形細胞ノ浸潤アリ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締織増殖シ。僅カ＝細胞浸潤アリ。上皮下組織ハ高度ノ浮腫ヲ呈シ。其間＝白血球浸潤ス。腺ハ増殖シ管腔ノ擴大セルモノアリ。血管壁ノ肥厚著明ナリ。上皮組織ハ毳毛圓柱細胞ニシテ。盃狀細胞多數＝増加シ。多核白血球浸潤アリ。所々人工的＝剝脱ス。

病理組織學的診斷。慢性上顎竇炎。

症例番號 28。性♂。年齢 28。兩側。標本部位。第 1 大白齒。

齒槽突起部。齒髓異常ナシ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根トアリテ。右側ハ口蓋側根ハ竇底ト甚ダ接近シ。甚ダ菲薄ニシテ纖維様トナレル骨壁ヲ以テ竇底ト境

セラル。齒牙周圍組織＝炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位＝テモ異常ナシ。骨梁ハ一般＝萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖ナク。造骨細胞認メラレズ。此部骨髓＝著變ナク。骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管＝モ異常ナシ。

竇底粘膜部。全ク炎症性變化ヲ認メズ。上皮組織ハ人工的＝所々剝脱ス。

病理組織學的診斷。異常ナシ。

症例番號 29。性♀。年齢 82。(1) 左側。標本部位。第 1 大白齒。

齒槽突起部。齒髓ハ全ク壞死＝陷ル。

齒牙周圍組織。近心頰側根根端白堊質ハ著明ナル吸收ノ像ヲ呈ス。齒牙全周圍＝亙リテ上皮帶ヲ有スル肉芽組織ヲ以テ圍マル。周圍ハ緻密ナル結締織纖維アリ。周圍骨梁ハ吸收サレ。其間圓形細胞ノ浸潤アリテ附近骨髓＝波及セルモ竇底＝達セズ。此附近ノ骨髓ハ皆纖維髓トナレリ。之ヲ遠ザカル部位ハ多クハ脂肪髓ナリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ緻密トナリテ肥厚増殖シ造骨細胞アリ。此部位＝於ケル骨髓ハ纖維髓ナリ。骨髓ト竇底＝通ズルハーベルス氏管＝ハ異常ヲ認メズ。

竇底粘膜部。骨膜＝結締織ノ増殖アレドモ。細胞浸潤ナシ。上皮下組織ハ高度＝浮腫狀ヲナシテ肥厚シ。所々多核白血球ノ浸潤アリ。腺ハ増殖シ大ナル囊腫ヲ作レルモノアリ。上皮組織ハ毳毛圓柱上皮ニシテ。所々剝脱シ盃狀細胞＝富ミ多核白血球ノ浸潤アリ。

病理組織學的診斷。慢性周緣性齒牙周圍組織炎。慢性瀰漫性骨炎。慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。殆ンド無齒上顎ニシ

テ。大白齒＝該當スル部位。

齒槽突起部。一般＝骨梁ハ萎縮減少シ。其間著明ナル結締織ノ増殖アリ。骨髓＝ハ竇底骨部ヲ除キ。細胞浸潤ヲ見ズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁＝肥厚増殖ナシ。此部位＝於ケル骨髓＝ノミ輕度ノ圓形細胞ノ浸潤アリ。骨髓ト竇底トヲ結ブハーベルス氏管＝モ。彌蔓性＝圓形細胞浸潤セリ。

竇底粘膜部。骨質＝結締織ノ増殖アリテ。其間多核白血球ノ浸潤アリ。上皮下組織ハ不正＝肥厚シ。高度ノ多核白血球ノ浸潤アリ腺管ハ殆ンド認メラレズ。上皮組織ハ毳毛圓柱細胞＝シテ。盃狀細胞ノ増加ヲ見ル。所々人工的＝剝脱ス。

病理組織學的診斷。纖維性骨炎。慢性上顎竇炎。

症例番號 30。性♀。年齢 36。兩側。標本部位。第2大白齒。

齒槽突起部。齒髓＝異常ナシ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根トアリテ。齒牙周圍組織全體＝亙リテ。炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位＝テモ異常ヲ認メズ。骨梁ハ一般＝萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁＝肥厚増殖ナク。造骨細胞認メラレズ。此部位＝於ケル骨髓＝著變ナク。骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管＝モ異常ナシ。

竇底粘膜部。全ク炎症性變化ヲ認メズ。上皮組織ハ人工的＝所々剝脱シ。盃狀細胞増加セリ。

病理組織學的診斷。異常ナシ。

症例番號 31。性♂。年齢 27。(1) 左側。標本部位。第1大白齒。

齒槽突起部。齒髓ハ全ク壞死＝陷ル。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根端白質ハ著明ナル吸收ノ像ヲ呈ス。兩根端＝多核白血球。圓形細胞ノ浸潤アリテ。肉芽組織ヲ形成シ上皮帶ヲ有セズ。周圍＝ハ緻密ナル結締織維アリ。周圍骨梁ハ吸收サレ。其間圓形細胞浸潤シ周圍骨髓＝波及セルモ竇底＝及バズ。細胞浸潤ハ血管周圍＝沿ヒテ著明＝進行ス。骨梁＝破骨細胞及ビ造骨細胞多シ。之ヲ遠ザカル部位モ皆纖維髓トナレリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁＝肥厚増殖ナシ。此部位＝於ケル骨髓ハ纖維髓ナリ。所々骨髓ト竇底トヲ結ブハーベルス氏管アレドモ。異常ヲ認メズ。

竇底粘膜部。骨膜＝ハ結締織ノ増殖アレドモ細胞浸潤ナシ。上皮下組織ハ浮腫狀ヲナシテ肥厚シ。輕度ノ圓形細胞ノ浸潤アリ。腺組織ハ増殖シ。腺管ハ擴張ス。所々圓形細胞ノ集積アリ。上皮組織ハ所々剝脱スレドモ美麗ナル毳毛圓柱細胞＝シテ。一般＝盃狀細胞増加ス。

病理組織學的診斷。慢性根端性齒牙周圍組織炎。慢性根端性骨炎。慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。第1大白齒。

齒槽突起部。齒髓ハ壞疽＝陷ル。

齒牙周圍組織。口蓋側根端白質ハ著明＝吸收ノ像ヲ呈ス。齒牙周圍ハ全體＝亙リテ上皮帶ヲ有スル肉芽組織ヲ以テ圍繞セラル。周圍＝ハ緻密ナル結締織アリ。周圍骨梁ハ吸收サレ。然モ根端部＝當ル竇底骨壁ハ吸收サレ骨壁ハ缺損セリ。缺損部ハ前記肉芽組織周壁ノ緻密ナル結締織ヲ以テ埋メラレ。其間多核白血球。圓形細胞浸潤シ。直接上顎竇骨膜＝移行ス。其他一般＝肉芽組織周壁ノ骨梁間＝ハ彌蔓性＝圓形細胞

浸潤セリ。之ヲ遠ザカル部位モ多クハ纖維髓トナレリ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖ナク。骨膜面＝當ル骨梁＝破骨細胞ヲ認ム。齒根端＝相當スル部位ハ、前記ノ如ク骨吸収サレ、細胞浸潤ノ波及ヲ見ル。此部位＝於ケル骨髓ハ一般＝纖維髓ナレドモ、齒根端部＝於テハ多核白血球、圓形細胞浸潤シ、該部ヨリ竇底＝通ズルハーベルス氏管血管周圍＝沿ヒテ僅カニ竇底骨膜＝波及スルヲ見ル。

竇底粘膜部。骨膜ハ一般＝結締組織増殖、細胞浸潤ナキモ齒根部ト近接スル部位ハ結締組織増殖シ、圓形細胞ノ浸潤アリテ特ニ竇底骨壁缺損部＝當リテ著明ナリ。上皮下組織ハ全體＝亙リ輕度ノ圓形細胞ノ浸潤アリテ浮腫狀ヲナシ、腺組織ハ増殖シ、腺管ハ擴張ス。上皮組織ハ毳毛圓柱細胞ニシテ、一般＝盃狀細胞増加ス。所々空胞存ス。

病理組織學的診斷。慢性周緣性齒牙周圍組織炎、慢性瀰蔓性胃炎、慢性上顎竇炎。

症例番號 32。性♂。年齡 27。(1) 左側。標本部位。第2大白齒。

齒槽突起部。齒髓異常ヲ認メズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根アリテ、齒牙周圍組織ハ全體＝亙リテ炎症性變化ヲ認メズ。根端ハ竇内＝裸出シ、竇粘膜ノミヲ以テ被覆サル。齒牙周圍組織ヲ遠ザカル部位＝於テモ異常ナシ。骨梁ハ一般＝萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁＝肥厚増殖ナク。造骨細胞認メラレズ。此部位＝於ケル骨髓＝異常ナク。骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管組織中＝認メラレズ。前記根端ノ竇内＝裸出セル部＝於テ、竇底骨壁ハ缺如セリ。

竇底粘膜部。全ク炎症性變化ヲ認メズ。上皮組織ハ所々人工的ニ剝脫ス。

病理組織學的診斷。異常ナシ。

(2) 右側。標本部位。第2大白齒。

齒槽突起部。齒髓異常ヲ認メズ。

齒牙周圍組織。口蓋側根ト近心頰側根アリテ、齒牙周圍組織＝ハ全ク炎症性變化ヲ認メズ。之ヲ遠ザカル部位＝於テモ異常ナシ。骨梁ハ一般＝萎縮セズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ一般＝著シク肥厚増殖シ所々造骨細胞ヲ認ム。此部位＝於ケル骨髓＝著變ナシ。所々ハーベルス氏管アリテ、骨髓ト竇底トヲ通ズルモ異常ナシ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織増殖シ細胞浸潤アリ。上皮下組織ハ一般＝結締組織多ク、多核白血球ノ輕キ瀰蔓性浸潤アリ、腺組織ハ増殖シ、腺管ハ著明ニ擴張ス。所々圓形細胞浸潤ノ集積アリ。上皮組織ハ總ベテ人工的ニ剝脫ス。

病理組織學的診斷。慢性上顎竇炎。

症例番號 33。性♂。年齡 37。(1) 左側。標本部位。第1大白齒。

齒槽突起部。齒髓ハ壞疽＝陷ル。

齒牙周圍組織。口蓋側根根端白聖質ハ著明ナル吸収ノ像ヲ呈ス。齒根端＝於テ、上皮帶ヲ有スル肉芽組織ヲ形成シ、主トシテ多核白血球ヨリ成ル。周圍ハ緻密ナル結締組織纖維ヲ以テ圍繞セラルハモ、尙ホ肉芽組織ノ多核白血球ハ、此結締組織纖維間及ビ結締組織纖維外＝浸潤シ、周圍骨髓＝波及シ、慢性炎症ハ急性増悪ノ轉機ヲトレルヲ示セリ。細胞浸潤ハ血管周圍＝沿ヒテ著明ニ波及シ、竇底骨壁＝達セリ。肉芽組織周圍ノ骨梁ハ著明ニ吸収サレ、其一部ノ骨梁ハ壞疽＝陷ル。骨梁＝破骨細胞並ニ造骨細胞ヲ著明ニ

認ム。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁＝肥厚増殖ナシ。
齒牙＝隣接スル部位ノ骨髓ハ前記齒牙周圍組織
ノ炎症波及シ。尙ホ該部ヨリ竇底＝通ズルハー
ベルス氏血管周圍＝沿ヒテ細胞浸潤シ竇骨膜
＝波及セリ。然レドモ此部ヲ達ザカル竇底骨部
＝ハ異常ナシ。

竇底粘膜部。骨膜ハ一般＝結締組織増殖シ。細胞
浸潤著明ナラザルモ。齒牙ト隣接セル部位。
特＝ハーベルス氏管附近＝ハ圓形細胞ノ浸潤著
明ナリ。上皮下組織ハ一般＝結締組織纖維多ク。
所々浮腫狀ヲ呈ス。一般＝圓形細胞輕度＝浸潤
ス。上皮組織ハ所々人工的＝剝脱スレドモ。甞
毛圓柱細胞＝シテ。一般＝盂狀細胞増加ス。

病理組織學の診斷。慢性根端性齒牙周圍組織
炎(急性炎症ノ轉機ヲトレルモノ)。慢性根端性
骨炎。慢性上顎竇炎。

(2) 右側。標本部位。大白齒＝該當スル部
位。

齒槽突起部。骨梁ハ一般＝著明ニ萎縮ス。骨
髓ハ脂肪細胞ヲ以テ充タサレ。炎症性變化ヲ認
メズ。

竇底骨部。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ所々
造骨細胞アリ。但シ此部位＝於テモ骨壁＝變化
ナク。竇底＝通ズルハーベルス氏管＝モ異常ヲ
認メズ。

竇底粘膜部。骨膜ハ結締組織ノ増殖著明ナレド
モ。細胞浸潤ナシ。上皮下組織ハ浮腫ヲ主トシ
其間白血球ノ浸潤アリ。腺組織ハ増殖シ腺腔擴
大シ。大ナル囊腫ヲ作ルモノ多數アリ。此部＝
於テモ輕度ノ浮腫アリ。上皮組織ハ甞毛圓柱細
胞＝シテ盂狀細胞多シ。所々人工的＝剝脱セ
リ。

病理組織學の診斷。慢性上顎竇炎。

第 四 章

病理解剖學の所見ノ

總括並ニ考按

第一節 肉眼の所見ニ就テ

余ノ實驗材料 66 個ノ上顎骨＝就キ。齒槽突
起及ヒ上顎竇底ノ肉眼の所見ハ。先ニ本研究第
一報＝於テ述ベタルトコロナルヲ以テ。今之ヲ
總括的ニ述ベントス。

上顎齒槽突起＝於テハ。齒牙＝見ラル、種々ナ
ル變化即チ齦齒咬耗症。或ハ齒齦退縮＝依リ。
齒根露出セルモノアル外特別ノ變化ヲ認ムベキ
モノナク。齒牙全ク脱落セル齒槽突起ハ萎縮シ
テ平坦トナレリ。

次ニ上顎竇底粘膜ハ肥厚ヲ認ムルモノ 23 例。
肥厚ヲ認メザルモノ 43 例ナリ。

竇内容ハ凝固セル灰白黃色ノ物質。或ハ褐紅色
ノ蛋白凝固物質アリテ。化膿性物質。或ハ炎症
性滲出物ノ存在スルコトヲ示メセルモノ 19 例
アリ。其中 2 例＝於テ暗赤色ノ物質ヲ認メタル
ハ。死後出血＝由來スルモノト思惟セラル。

又上顎竇粘膜＝發赤アルモノ 25。發赤ナキモノ
41 例アリ。發赤アルモノ 25 例中 2 例ハ竇＝死
後出血ニヨル暗赤色ノ物質アリテ。粘膜ノ發赤
ハ恐ラク死後出血ニヨル血液沈降 Hypostase
ニヨルモノナラン。

之ヲ要スルニ。肉眼の＝上顎竇底粘膜＝炎症性
變化ヲ認ムルモノハ 23 例ニシテ比較的尠ク。
其他ハ皆竇粘膜ハ正常ナルヲ思ハシメタリ。
上顎竇底ノ狀態ヲ見ル＝竇底ノ平坦ナルモノアリ。
不平坦ナルモノアリ。竇底不平坦ナルモノ
ヲ精査スルニ。上顎竇内ニ齒根先端隆起シテ。

爲メ＝竇粘膜ノ膨隆ヲ來タセルモノアリ。

此隆起ハ上顎竇ト最モ密接ノ關係アル上顎第1、第2大白齒及ヒ第2小白齒ノ齒根端部＝相當セルモ、隆起ハ硬度固ク、齒根ト竇粘膜トノ間＝骨層アルヲ思ハシメタリ。即チ肉眼のニハ上顎齒牙疾患ヲ有スルモノニ於テ、齒牙疾患ヨリ、上顎竇底＝直接病變ヲ及ボシタル形跡ヲ認ムルモノナシ。

第二節 組織學の所見＝就テ

叙上ノ顯微鏡の所見ヲ總括通覽スルニ、先ヅ齒槽突起＝於テハ、

(1) 齒牙周圍組織炎ヲ有スルモノ 19 例。

(2) 齒牙脱落セルモノ 19 例。

(3) 齒牙周圍組織正常ナルモノ 23 例。

上顎竇底粘膜＝

(1) 慢性炎症性變化アルモノ 44 例。

(2) 炎症性變化ナキモノ 22 例。

＝シテ、肉眼のニハ何等變化ヲ認メザルモノト雖モ、鏡檢的ニハ多少＝拘ハラズ炎症性變化ヲ認メタルモノ多シ。

今之等ノモノ＝就キ、以下齒牙周圍組織炎ノ齒槽突起＝、更ニ齒槽突起炎症ノ上顎竇＝及ボス影響＝就キテ考究シ、逆ニ慢性上顎竇炎ノ齒槽突起及ヒ齒牙周圍組織＝及ボス影響＝就キテ檢討シ、更ニ本實驗成績ヲ基礎トシ之ト關係アル諸問題＝就キテ、各項＝分チ逐時説明ヲ加ヘ聊カ歸見ヲ述ベントス。

第一項 齒牙周圍組織＝炎症アルモノ、

齒槽突起ノ變化＝就テ

余ノ實驗成績＝於テ、齒牙周圍組織＝炎症アルモノ 19 例＝就キ之ヲ總括スルニ、之等ハ總テ慢性齒牙周圍組織炎ノ像ヲ呈シ、急性齒牙周圍組織炎ノ像ヲ呈スルモノナシ。之等ノ中、

(1) 慢性根端性齒牙周圍組織炎ノモノ 16 例 (症例番號、3 右、5 左、13 左、14 右、18 左、19 右、21 左右、22 右、23 左、24 左右、26 右、31 左、33 左) ニシテ大部分ヲ占メ、

(2) 慢性周緣性齒牙周圍組織炎ノモノ 僅カニ 3 例 (症例番號 23 右、29 左、31 右) ナリ。前者ハ即チ、齒根端＝多核白血球、圓形細胞ノ浸潤アリテ、肉芽組織ノ形成アリ。肉芽組織ノ周圍ハ多クハ細胞＝乏シク且ツ緻密ナル結締組織纖維ノ被包ヲ以テ圍繞サレタリ。唯僅カニ 2 例 (症例番號 3 右、24 左) ニ於テハ肉芽組織ハ結締組織被包ヲ以テ圍繞セラル、コトナク、直チ＝境界不明ナル狀態ノモトニ周圍骨梁ニ移行セリ。

之等結締組織破包ノ有無＝拘ハラズ、周圍骨梁ハ吸收サレ、其間圓形細胞或ハ多核白血球ノ浸潤アリテ、特ニ血管周圍＝沿ヒテ進行シ、皆慢性根端性骨炎ノ像ヲ呈セリ。尙ホ之ヲ圍ム齒槽骨々髓ハ結締組織性＝變化シ所謂纖維髓トナレリ。

此慢性根端性齒牙周圍組織炎ハ臨牀上所謂齒根肉芽腫ト呼バル、モノナリ。而シテ余ノ症例中肉芽組織＝上皮帶ヲ有スルモノト有セザルモノトアリテ、中ニハ上皮帶ヲ以テ被覆サレタル囊腫ヲ形成セルモノアリ (症例番號 26 右側)。上皮帶ヲ有スルモノハ囊腫性肉芽腫、上皮帶ヲ有セザルモノハ實質性肉芽腫ト云ハレ。前者ハ齒根囊腫發生ニモ意義アルモノニシテ、此發生＝就キテハ齒科學ニ於テ種々論爭セラル、所ナレドモ、余ノ研究目的ニ非ザルヲ以テ詳細ニ就キテハ之ヲ述ベズ、唯ダ之ヲ記載スルニ止メタリ。

次ニ後者、即チ慢性周緣性齒牙周圍組織炎ノモノ

ノ3例ヲ見ルニ、皆齒牙周圍ニ上皮帶ヲ有スル肉芽組織アリテ、周圍ハ緻密ナル結締組織纖維ヲ以テ圍マル。周圍骨梁ハ吸收サレ、其間圓形細胞ノ浸潤アリテ、特ニ血管ニ沿ヒテ周邊ニ波及スルモノアリテ、皆慢性瀰蔓性骨炎ノ像ヲ呈セリ。尙ホ之ヲ圍ム骨髓ハ纖維髓トナレリ。

近年 Landsberger ト Weski(1927)ニヨリナサレタル研究業績、即チ齒牙(白堊質)齒根膜、齒槽骨ヲ總合シテ、齒牙周圍組織ト呼稱スベシト提唱セラレシ以來、近年齒牙疾患ヲ論ズル場合、單ニ齒牙、齒根膜ノ病變ニ止マラズ、齒槽骨ノ病變ニ就キ注目スルニ至レルハ、當然ノ理ト云フヲ得ベシ。從ツテ之ニ關スル研究モ日ヲ追ツテ益々盛ナラントスル趨勢ニアルハ亦故ナキニアラズ。

Siegmund-Weber(1926)ハ根端性齒牙周圍組織炎ハ即チ骨炎ナルコトヲ述べ、以前ヨリ記載サレタル齒根膜炎、或ハ齒根肉芽腫ナル名稱ハ事實病理組織學上正シカラズト云ヘリ。

Siegmund(1929)ハ更ニ、動物實驗並ニ屍體解剖ニヨリ顎骨ニ於ケル急性齒牙周圍組織炎並ニ慢性齒牙周圍組織炎ニ就キ詳述シ、此慢性齒牙周圍組織炎ノ原型ハ限局性粗鬆性骨炎ニシテ、即チ齒牙周圍組織ノ炎症性變化ハ周圍海綿質骨髓ニ波及スルモノナリト云ヘリ。

近年 Wassmund(1935)ハ骨炎ヲ臨牀上ヨリ種種ナル型ニ分類セリ。即チ(1)滲出性骨炎、(2)吸收性骨炎、(3)増殖性骨炎、(4)急性壞疽性骨炎(骨髓炎)、(5)慢性骨髓炎ニ分類シ得ルモノナリト述べタリ。

余ノ實驗成績ニ於テハ、慢性根端性齒牙周圍組織炎アルモノハ慢性根端性骨炎ヲ、慢性周縁性齒牙周圍組織炎アルモノハ慢性瀰蔓性骨炎ヲ隨

伴セルヲ以テ、略シ Siegmund, Weberノ主張ニ對シ、贊意ヲ表スルモノニシテ、慢性骨炎ノ細胞浸潤ハ血管周圍ニ沿ヒテ、著明ニ波及スルヲ以テ、慢性骨炎症像ハ齒槽骨海綿質ノ可ナリ廣汎ニ亙リテ見ラレ、決シテ限局性ナラズ、又往古ニ考ヘラレタルガ如ク、劃然タル境界アルニ非ラズ。

由是觀之、慢性齒牙周圍組織炎症ノ齒槽骨ニ波及スル場合、先ヅ血管周圍ニ沿ヒテ浸潤進行シ、次イデ慢性骨炎ハ漸時擴大スルモノニシテ、血管周圍組織ハ骨炎ノ進行波及ニ際シ重大ナル役割ヲ演ズルモノ、如シ。

Wassmundノ骨炎分類ニ從ヘバ、余ノ實驗症例ニ於ケル慢性齒牙周圍組織炎ハ所謂吸收性骨炎ニ該當スルモノナレドモ、之等ニ於テ齒槽骨ノ一部骨吸收機轉著明ナルト共ニ、他方ニ於テハ骨増殖機轉認メラル、例勘カラズ。故ニ之等慢性齒牙周圍組織炎ヲ其孰レカニ確然ト區別ズルハ至難ノコトニ屬ス。

慢性齒牙周圍組織炎ノ齒根端及ヒ齒牙周縁ノ肉芽組織ハ主トシテ、圓形細胞(多クハ淋巴球、

「プラスマ」細胞)ヨリナリ、且ツ周圍骨梁ハ結締組織纖維ニヨリテ圍繞セラレタレドモ、尙ホ圓形細胞ハ周圍骨梁ニ浸潤シ、炎症ハ所謂靜止ノ狀態ヲ示シタリ。其中、2例(症例番號3右、24左)ニ於テハ、肉芽組織ハ結締組織被包ヲ以テ圍繞セラル、コトナク、直チニ周圍骨梁ニ移行セルハ、未ダ防禦機轉ナク、炎症ノ比較的急性ニ進行スルコトヲ示スモノニシテ、慢性炎症ノ中ニテモ、亞急性齒牙周圍組織炎ト名ヅベキモノナリ。

其他、小數例(症例番號5左、33左)ニ於テハ肉芽組織中多核白血球増加シ、尙ホ周圍ノ結締

組織維間及ヒ纖維外ニ。主トシテ多核白血球游出シ。尙ホ血管周圍ニ沿ヒテ著明ニ波及セルハ。慢性炎症ノ急性ノ機轉ヲトレルコトヲ示スモノナリ。

元來。肉芽組織ヲ圍繞スル緻密ナル結締組織纖維ハ肉芽腫被包ト呼バレ。齒根膜炎症波及ニ對シ。防禦機能ヲ有スルモノト考ヘラレタレドモ。如斯。慢性炎症ノ急性炎症ヲトレルモノハ勿論。慢性炎症ノ靜止ノ狀態ニ於テスラ。尙ホ且ツ多少共細胞浸潤周圍骨梁ニ波及セル事實ヨリスレバ。之ガ炎症波及ニ對スル防禦機能ハ一面。絶對的ノモノニアラズ。即チ之ニ關シ古來ヨリ論ゼラレタルガ如ク。重大ナル意義ヲ有スルモノニアラザルベシト思考ス。

肉芽組織周圍骨梁ハ皆吸收サレ。骨梁間破骨細胞。造骨細胞ヲ認ムルモノ多シ。其中唯ダ1例慢性炎症ノ急性増悪機轉ヲトレルモノ(症例番號33左)ニ於テハ。周圍骨梁ハ吸收サレ且ツ壞疽ニ陥レリ。

最後ニ慢性根端性骨炎及ヒ慢性瀰蔓性骨炎炎症像ヲ圍繞スル周圍骨髓ハ。脂肪髓ヲ見ルコトナク。皆結締組織纖維ニ變化シ。所謂纖維髓トナレルヲ見ル。例之。肉芽組織周圍ニ結締組織被包ナキモノ(症例番號3右。24左)ニ於テ。骨炎症周圍ノ骨髓ハ著明ニ。且ツ劃然ト結締組織纖維ニ變化セリ。

Siegmundハ先ニ。齒根部ニ於ケル骨髓ノ纖維化ヲ以テ。既往ニ於テ此部ニ炎症性過程存在セシ體左トナスコトヲ得ト云ヘリ。余ハ以上ノ如キ所見ヨリ。骨髓ノ結締組織化ハ寧ろ齒牙周圍組織炎症波及ニ對シ。一種ノ防禦機能ノ役割ヲ演ズルモノト思惟スルモノナリ。

第二項 齒槽突起炎症ノ上顎竇底部。

竇粘膜ニ及ボス影響ニ就テ

余ノ實驗症例中。齒槽突起ニ慢性根端性骨炎。慢性瀰蔓性骨炎アルモノ。上顎竇粘膜ヲ見ルニ。

(1) 殆ンド大部分ハ慢性上顎竇炎ノ組織像ヲ認メ。

(2) 竇粘膜ニ全ク炎症性變化ヲ認メザルモノハ僅カニ2例(症例番號。21左。22右)ナリ。前者齒槽突起並ニ上顎竇粘膜ニ炎症性變化アルモノニ於テ。

1). 症例番號。13左。18右。19右。23左右。26右。31右。33左ノ8例ハ齒槽突起ノ慢性根端性骨炎。或ハ慢性瀰蔓性骨炎々症ハ上顎竇底ニ。或ハ竇骨壁ニ達シ次デ竇骨膜粘膜ニ波及セリ。

然モ之等ノ骨炎症ノ上顎竇ヘノ波及方法ニ2種類アリ。即チ。

(イ) 症例番號。23左。31右ノ2例ハ各々齒槽突起ニ慢性根端性齒牙周圍組織(骨炎)。慢性周緣性齒牙周圍組織炎(骨炎)アリテ。之ガ爲メ各々竇底皮質ヲ成ス骨壁モ吸收融解サレ。該部ヨリ齒牙周圍組織ノ慢性炎症ハ。直接上顎竇骨膜。粘膜ニ波及セリ。然モ上顎竇骨膜。粘膜ノ炎症像ハ齒牙ニ隣接セル部ニ於テ最モ著明ナリ。

(ロ) 症例番號。13左。18右。19右。23右。26右。33左ノ6例ハ慢性根端性骨炎。慢性瀰蔓性骨ト上顎竇トノ間ニハ尙ホ骨層アリテ。竇底皮質ヲ成ス骨壁モ吸收破壊セラルハコトナキモ。骨炎々症像ハ瀰蔓性ニ或ハ血管周圍ニ沿ヒテ明ニ竇底ニ波及シ。更ニ齒槽突起骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏血管周圍ニ沿ヒテ。

圓形細胞浸潤シ竇骨膜。粘膜ニ波及セリ。然モ上顎竇骨膜。粘膜ノ炎症像ハ齒牙ニ隣接スル部ニ於テ最モ著明ナリ。

2). 其他ノ症例番號。3 右。5 左。14 右。18 左。21 左。24 左右。29 左。31 左ノ9例ハ齒槽突起ニ慢性根端性。或ハ瀰漫性骨炎ヲ認ムルモ。骨炎ハ竇底ニ達スルコトナク。慢性上顎竇炎トハ正常ナル骨層ヲ以テ境セラレ。兩者ノ炎症ニ連絡ヲ認メズ。

以上余ノ實驗成績ノ概括ヲ述ベタルモ。以下之等齒牙疾患部。即チ齒槽突起骨炎ニヨル上顎竇感染ニ就キ。種々述ベントスルニ先立チ。注意スベキハ。之等ハ最初ヨリ其局所解剖學的關係ニヨリテ左右セラル、コトナリ。

即チ竇ニ接近セル大白齒。小白齒ニ於テハ。其他ノ齒牙ニ比シ竇ヘノ感染容易ニシテ。之等ノ齒牙ノ中ニテモ。齒牙ト竇ト甚ダ接近シ。僅カニ紙狀ヲ成ス薄キ骨壁ヲ以テ隔テラル、場合。或ハ齒根端ノ竇内ニ裸出シ。單ニ竇粘膜ヲ以テ被覆サル、場合ニ於テハ。感染ノ尙ホ容易ナルハ當然ノ理ナリ。反之。之等齒牙ノ中ニテモ。齒牙ト竇底トノ局所的關係ハ甚ダ變異ヲ示シ。種々多様ニシテ。齒根ト竇底トノ距離大ニシテ兩者間厚キ骨層存在スル場合ハ炎症ノ竇ニ波及スルコト難シ。

抑々齒牙疾患ノ上顎竇感染ニ對シ。急性炎症トシテ擧ゲラル、ハ齒根膿瘍ナレドモ。余ノ實驗症例中。急性齒根膿瘍。換言スレバ急性齒牙周圍組織炎ノ像ヲ呈スルモノハアツモ遭遇セズシテ。皆慢性炎症ノ症例ノミナルヲ以テ。急性炎症ニ就キテハ暫ク之ヲ措キ。專ラ慢性齒牙周圍組織炎(骨炎)ノ上顎竇ニ及ボス影響ニ就キ以下余ノ實驗成績ニ基キ。先輩諸學者ノ諸說ヲ述

ベ聊カ之ガ考案ヲ試ミントスルモノナリ。

齒根部ニ於ケル慢性炎症ニテ上顎竇炎ヲ惹起スルモノトシテハ。夙ニ肉芽腫擧ゲラレ。從ツテ肉芽腫ノ上顎竇感染ニ對シテモ。屢ニ論議シタリ。今之ニ關スル諸學者ノ所說ヲ擧ゲルニ。Hejek (1909) ハ既ニ肉芽腫ニヨリテハ上顎竇感染ハ頻發スルモノニ非ズト述べ。肉芽腫ハ骨ヲ吸收シ漸時増大シ。次イデ竇ニ波及スルモノナレバ肉芽腫ニヨル竇感染ハ急性膿瘍ノ場合ニ於ケルガ如ク。齒根ト上顎竇底トノ解剖學的要素ヲ必要トセザルモノナルコトヲ述ベタリ。

其他 Partsch, Williger, Weiser, Reinmüller, Christ 等ノ齒科ノ諸大家モ擧ツテ肉芽腫ニヨル上顎竇炎ハ其頻度甚ダ尠シト述べ。肉芽腫ノ竇内ニ突出シ單ニ竇粘膜ノミヲ以テ被ハル、モノヲ拔齒シ竇ヲ開放シタルニ。竇粘膜炎症ノ缺如セルヲ確メタリ。

近年 Berberich (1932) ハ肉芽腫ヲ慢性根端性齒牙周圍組織炎ナル名稱ヲ以テ呼ビ。此場合齒槽骨々炎アルコトヲ認メタルモ。尙ホ之ニヨリテハ上顎竇炎ハ頻發スルモノニ非ズト云ヒ。之ガ發生ハ。肉芽腫ノ急性炎症ニ再燃増悪スルコトニヨリテノミ可能ナリト。

之等ハ皆論說ニ過ギザレドモ。個々ノ屍體上顎骨ニ就キ。組織學的ニ檢索セシモノニ Weski ノ業績アリテ。骨炎症ノ竇ニ進行スルヲ認メタリ。其1例ニ於テ齒根端ノ病竈ヨリ竇ニ瘻ヲ形成シタルモ。竇粘膜ニハ特別ノ變化ナク。又著膿症モ認メラレザルヲ以テ。齒牙系統ヨリ侵入スル化膿性炎症ニ對シ。竇粘膜ハ高度ノ抵抗力ヲ有スルモノナリト結論セリ。

Hoepfel (1935) ハ屍體組織標本ニテ。齒牙周圍

組織＝慢性炎症アルモノハ、總ベテ竇粘膜＝モ炎症性變化アルコトヲ認メ、炎症ノ竇＝進行スルニハ竇底骨ノ吸收サレルコトナクモ、骨炎ハ齒槽骨海綿質骨髓ニ波及シ、次イデ竇＝炎症ヲ及ボスモノナリト云ヘリ。即チ炎症ハ竇底骨部＝見ラルハ穿孔管 Perforierenden Kanälenヲ經テ竇ニ波及スルモノヲ示メセリ。

余ノ實驗成績ニテハ、慢性齒牙周圍組織炎(骨炎)ノ上顎竇粘膜ニ波及セルモノハ8例ニシテ其中2例ハ竇底骨壁ヲ吸收シ、炎症進行セルモ、他ノ6例ハ骨炎症ハ齒槽骨々髓ト竇底トヲ結ブハーベルス氏管血管周圍ニ沿ヒテ、波及セルハ Hoepfel ノ穿孔管ヲ經テ竇ニ波及スルヲ觀察ルト相一致ス。Hoepfel ノ穿孔管ト呼ベルハ即チハーベルス氏管ナリト思惟ス。如斯、骨炎症像ハ竇底骨膜、粘膜ニ波及スルヲ以テ、Weski ノ云ヘルガ如ク、竇底粘膜ノ齒性ヨリノ炎症ニ對シ、強キ抵抗力ヲ有スルモノナリトハ考ヘラレザル所ナリ。

其ノ中、1例(症例番號 33 左)ハ、齒牙周圍組織慢性炎症ノ急性増悪ノ轉機ヲトリテ竇底粘膜ニ波及シタルモ、其他ノ大部分(7例)ハ、慢性炎症ノ儘、上顎竇底骨壁ヲ吸收シ、或ハハーベルス氏管血管周圍ニ沿ヒテ竇粘膜ニ波及シタリ。症例番號、5 左ハ慢性炎症ノ急性ノ轉機ヲトレルモ、炎症ハ竇ニ波及スルニ至ラズ。由是觀之、齒牙周圍組織炎ノ上顎竇感染ハ Berberich ノ云ヘルガ如ク、必ズシモ慢性炎症ノ急性増悪スルコトヲ必要トセザルモノニシテ、慢性炎症ノ儘ニテモ、竇ヘノ感染可能ナリ。

一般ニ齒根肉芽腫ハ結締織被包ヲ以テ圍繞セラレ、此結締織被包ハ上顎竇感染ニ對シ、一種ノ防禦網ノ役割ヲナスモノト考ヘラレタリ。Runge,

Nühsman 此結締織被包ノ防禦機能ハ、炎症ノ再燃増悪スルコトニヨリ破レ、初メテ上顎竇ニ感染スルモノナリト。

思フニ、之等事項ハ肉芽腫ガ慢性齒根膜炎ナリトノ概念ノモトニ齒根膜炎ノミヲ觀察シ、骨ノ變化、即チ骨炎ニ就キ注意ヲ拂ハザリシコトニ歸因スルニ非ラザルカ。之ヲ前述ノ如ク、齒牙周圍組織ナル概念ノモトニ觀察スルニ、之等慢性齒牙周圍組織炎ハ慢性炎症ノ儘、所謂靜止ノ狀態ニテモ、皆周圍ニ骨炎存在シ、特ニ血管周圍ニ沿ヒテ浸潤著明ニシテ、次イデ竇粘膜ニ波及スルコトヲ明ラカニ示セルヲ以テ、齒根肉芽腫結締織被包ノ上顎竇感染ニ對シ、防禦機能ヲ有スルコトニ關シテハ Runge Nühsman ノ云ヘルガ如ク、重大ナル意義ヲ有スルモノニ非ラザルベシ。

斯如、之等慢性根端性骨炎、慢性瀰蔓性骨炎ハ竇底骨壁ヲ吸收シテ、直接竇ニ波及シ或ハ竇底骨壁ヲ吸收スルニ至ラザルモ、骨炎ハハーベルス氏管血管周圍ニ沿ヒテ著明ニ竇底ニ波及シ、然カモ炎症像ハ齒牙周圍組織ニ隣接セル部ニ著明ナルヲ以テ、慢性上顎竇炎ノ齒牙疾患ニ由來スルモノナルコト明ラカナリ。

以上ノ如キ病理組織學の所見ヨリ考察スルニ、齒槽突起慢性骨炎症ハ先ヅ血管周圍ニ沿ヒテ明ラカニ波及セルヲ以テ、炎症ノ竇粘膜ニ向ツテ進行スル場合モ亦、先ヅ竇底ニ通ズルハーベルス氏管血管周圍ニ沿ヒテ、波及スルモノニシテ、齒性上顎竇炎ハ余ノ實驗成績ニテ明ラカナルガ如ク、以前ニ於テ考ヘラレタルヨリ多數存在スルモノナリ。

次ニ、此場合多クハ骨炎症ノ細胞浸潤ハ竇底骨部骨髓ニ達セルモ、尙ホ少數(症例番號、19 右、

26 右)ハ竇底骨部ハ僅カニ纖維髓ニシテ、細胞浸潤ヲ認メズシテ、然モ竇底＝通ズルハーベルス氏血管＝沿ヒテ、竇底粘膜＝波及スルモノアルハ、之ツ＝組織標本ノ部位ニヨリ、細胞浸潤現ハレザルモ、連續的ニハ孰レカ其中心部位ニ於テ、骨炎症ハ必ズ竇底皮質ヲ成ス骨壁ニ達シ、次イデ竇底＝通ズルハーベルス氏血管＝沿ヒテ竇粘膜＝波及スルモノナリト思考ス。Zange(1932)ハ齒牙疾患ニヨリ上顎竇炎症ヲ來タセルモノニ於テ、尙ホ臨牀上、上顎竇蓄膿症ノ症候ヲ現ハサマルモノアリト。臨牀上ニ於テノミ之ヲ論ジ、之ヲ Sinusitis comitans 隨伴性上顎竇炎ト稱セリ。

余ノ實驗成績＝見ラレタル、之等齒槽突起骨炎症ノハーベルス氏血管周圍＝沿ヒテ、竇粘膜＝波及スルモノ、慢性炎症ノ儘經過スル場合ハ、臨牀上如何ナル症候ヲ現ハスヤハ興味深キ問題ナレドモ、之等ハ齒性上顎竇炎ナルコト明ラカニシテ、著明ナルト著明ナラザルトヲ問ハズ臨牀上ニモ何等カノ症候現ハスモノナルベシト推斷ス。

如斯、之等ハ慢性炎症ノ儘ニテモ、既ニ上顎竇＝炎症波及スルモノナレバ、潜伏性ニ經過スルモノト雖モ、之等ニシテ拔齒等ノ操作ニヨリ一旦慢性炎症ノ再燃シテ急性炎症ヲトル事アランカ、齒牙周圍組織炎ハ直ニ化膿性膿瘍性トナリ、或ハ骨ハ壞疽＝陥リテ廣汎ナル急性骨炎(骨髓炎)ヲ招來シ、次イデ急激ナル上顎竇炎ヲ惹起スルニ至ラン。

如斯、齒牙疾患ニヨリ上顎竇粘膜＝慢性炎症波及セルモノニシテ、尙ホ若シ更ニ上顎竇ノ鼻性感染、例之、急性鼻加答兒等ニ罹患スルコトアランカ、上顎竇粘膜ハ正常ナル場合ニ比シ、炎

症ニ對スル抵抗力薄弱ニシテ、爲メニ層一層重篤ナル上顎竇炎ヲ惹起スルコト疑ヒナシ。

3). 次ニ症例番號、3 右、5 左、14 右、18 左、21 右、24 左、24 右、29 左、31 左ノ 9 例ニ於テハ、之等慢性上顎竇炎ハ齒牙周圍組織炎＝由來スルモノナリヤ、或ハ感冒等ノ際鼻腔ヨリ感染セルモノナリヤニ就キ考フルニ、之等ハ皆齒牙周圍組織炎即チ齒槽突起骨炎トハ全ク炎症ノ連絡ナキヲ以テ齒性上顎竇炎トシテノ根據ナク恐ラク皆鼻腔ヨリ感染セルモノト看做スヲ妥當トス。

然レドモ、之等骨炎症ノ初期、即チ急性炎症ノ際、起炎菌ハ羽田野氏ノ實驗ニヨリテ推察シ得ラル、如ク、淋巴路ヲ傳ハリテモ、上顎竇底ニ運搬セラレ、之ニ轉移性ニ炎症ヲ惹起スル場合ナキニシモ非ザルヲ以テ、之等上顎竇炎ニ就キテモ齒性感染アルコトヲ全然否定シ得ザルナリ。

而シテ、余ノ實驗成績ニテ慢性根端性或ハ瀰蔓性骨炎ヲ認メタルモノハ、上顎竇粘膜＝於テモ、又慢性炎症ヲ認ムルモノ殆ンド大多數ヲ占メ、竇粘膜＝炎症ナキモノ甚ダ尠キ事實ヨリシテ、之等ノモノハ中、上顎竇炎ノ齒牙周圍組織炎＝由來スルモノアルコトヲ想像スルモ不當ニアラズ。

而シテ之等上顎竇炎ガ果シテ齒牙周圍組織炎(骨炎)＝由來スルモノナリヤ、或ハ鼻腔ヨリノ感染＝基クモノナリヤ、其確實ナル判斷ヲ下スコトハ容易ノ業ニアラズ。

故ニ齒性上顎竇炎ノ發生機轉ノ判斷ハ、前者ノ場合ノ如ク連續性ノモノハ、其判斷容易ナルモ後者ノ場合ノ多ク、中間ニ於テ炎症症狀著明ナラザルカ、或ハ全ク之ヲ缺如セルガ如キ場合ハ

臨牀上全ク不可能ナリト云フヲ得ベシ。

之、齒性上顎竇炎ノ發生頻度ニ就テ正確ナル統計ヲ擧グルコト困難ナル所以ナリ。

第三項 齒牙脱落セル場合ノ齒槽突起。

上顎竇底骨部。上顎竇粘膜ノ

變化ニ就キテ

齒牙脱落セル場合(症例番號4左右、5右、9左右、10左、12左右、15左右、16左右、17左、19左、22左、25左右、29右、33右)ノ齒槽突起ヲ見ルニ、皆齒槽骨骨梁ハ全般ニ細クナリテ萎縮ニ陥ルモ、炎症性變化ナク、骨梁ハ脂肪細胞ヲ以テ充タサレタリ。

其ノ中、慢性上顎竇炎アルモノ17例。

慢性上顎竇炎ナキモノ2例ニシテ、上顎竇底骨部モ大部分ハ炎症性變化ヲ認メズ。少數ニ於テハ、上顎竇底骨部ニ纖維性骨炎アルモノ(症例番號、10左、17左、19左、27右)、或ハ上顎竇底骨部骨髓ニ圓形細胞浸潤アルモノ(症例番號、10左、17左、25左右、29右)ヲ見ルモ、之等ハ皆慢性上顎竇炎ニ隨伴セルモノナレバ、之ニ關シテハ後章(慢性上顎竇炎ノ齒槽突起ニ及ボス變化)ニ於テ述ブルコトセリ。以上、余ノ實驗成績ヨリ之ヲ觀ルニ、壯年ニシテ齒牙健在スルモノニアリテハ、ヨク齒牙ヲ支持スル爲メ齒槽突起骨梁太ク、老人ニシテ齒牙全ク脱落セルモノニアリテハ、咀嚼機能全ク減退スルニ至リ。爲メニ齒槽突起骨梁モ萎縮退化スルモノニシテ、遂ニハ齒槽突起全般ニ亙リ菲薄トナリ、口腔ト上顎竇トノ間ハ、僅カニ細キ骨橋ヲ以テ境セラレ、爲メニ上顎竇ハ沈下セルガ如キ狀ヲ呈スルニ至ルモノナリ。

齒槽突起ニ認メラレタル炎症性變化ハ上顎竇底骨部ニノミ止マリ、其他ニ炎症性變化ヲ認メザ

ルヲ以テ齒牙ノ自然脱落セルカ、病變アリテ脱落シ、病竈ノ治癒シタルモノナリヤ不明ナリ。孰レニセヨ齒槽突起ヨリ炎症ヲ上顎竇ニ及ボシタル形跡ナシ。

因リテ、之等上顎竇炎ノ發生機轉モ、既往ニ於ケル齒性感染ヲ除外セバ、即チ知らズ知ラズノ間ニ感冒等ノ際鼻腔ヨリ感染シタル所謂鼻性慢性上顎竇炎ナリト推察セラル。

第四項 齒牙周圍組織ニ異常ナキモノ、

齒槽突起並ニ上顎竇粘膜ニ就テ

齒牙周圍組織ニ異常ナキモノ(症例番號、1左右、2左右、3左、6左右、7左右、8左右、10右、11左右、13右、14左、17右、20左右、26左、27左右、28左右、30左右、32左右)ノ28例ニシテ、之等齒槽突起骨梁間ニモ炎症性變化ナク、骨梁ノ萎縮モナシ。

其ノ中、

(1) 症例番號2左右、7右、10右、13右、14左、17右、27左右、32右ノ10例ハ慢性上顎竇炎アリ。

(2) 症例番號1左右、3左、6左右、7左、8左右、11左右、20左右、26左、28左右、20左右、32左ノ18例ハ上顎竇粘膜ニ異常ヲ認メズ。

前者ハ即チ鼻腔ヨリ感染シタル慢性上顎竇炎ナルコト明瞭ナリ。

之等上顎竇底骨部モ殆ンド總ベテ異常ヲ認メザルモ、少數例(症例番號27左右)ニ於テ、竇底骨部骨髓ニ圓形細胞浸潤アリ。之ハ慢性上顎竇炎ニ隨伴スルモノナレバ、後章(慢性上顎竇炎ノ齒槽突起ニ及ボス變化ニ就テ)ニ於テ之ヲ述ブベシ。

第五章

慢性上顎竇炎ニ於ケル

竇骨壁ノ變化ニ就テ

第一項 上顎竇粘膜ノ病理組織學的

變化ニ就テ

余ノ檢索セル上顎竇粘膜ノ病理組織像ヲ見ルニ、慢性炎症ヲ認ムルモノ多ク44例(症例番號2左右、3右、4右、5左、7右、9左右、10左右、12左右、13左右、14左右、15左右、16左右、17左右、18左右、19左右、21右、22左、23左右、24左右、25左右、26右、27左右、29左右、31左右、32右、33左右)ヲ占メ、全ク炎症性變化ヲ認メザルモノ尠ク、22例(症例番號、1左右、3左、4左、5右、6左右、7左、8左右、11左右、20左右、21左、22右、26左、28左右、30左右、32左)ナリ。

上顎竇粘膜ノ病理組織學的變化ニ就テハ、1892年、Zuckerkindlノ業績アル他、Dmochowski, Wertheim, E. Fränkel, Oppikofer, Hajek, Uffenorde, Goerke, Manasse, 衣川、宮城、海江田、加藤、後藤氏等ニ因リテ、微ニ入り細ニ亘リ、研究サレ殆ンド餘ストコロナキガ如ク、茲ニ贅言ヲ要セザルトコロナリ。

今余ノ檢索セル症例ノ炎症性變化ヲ各層ニ分チテ簡單ニ證明スレバ次ノ如シ。

上皮組織ハ重層扁平細胞柱上皮ニシテ、多クハ著變ナキモ盃狀細胞ノ増加スルモノ大部分ヲ占メ、少數ニ於テハ(症例番號19左、22左、23右、27左右、29左)多核白血球、圓形細胞ノ浸潤ヲ認メタリ。所々空胞ノ形成ヲ認メタルモノアリ(症例番號、18左、31右)。

又所々上皮ノ剝脫セルモノ多キモ、此上皮ノ剝

脫ハ周圍細胞ノ狀況ヨリシテ病理的變化ニ非ズシテ、寧ろ標本製作時損傷ニヨル人工的產物ナリト思考サル。唯極ク少數例(症例番號、19右)ニテハ、病理的變化トシテ上皮ノ剝脫ヲ見タリ。尙ホ余ノ實驗症例中ニハ上皮ノ扁平上皮ニ化生セルモノハ一ツモ之ヲ見タルコトナシ。

上皮下組織ニ於テハ一般ニ細胞浸潤、結締組織増殖、浮腫、粘液腺ノ増加、血管ノ擴張等ノ變化アリ。之等ノ中細胞浸潤ヲ主トナスモノ、或ハ結締組織増殖ヲ主トナスモノ、或ハ浮腫ヲ主トスルモノアリテ、之等ノ炎症像ハ多種多様ニ現ハレタリ。且ツ同一組織標本ノ竇粘膜ニテモ部分的ニ全ク相異ナル組織像ヲ示スモノアリ。

骨膜ニハ總ベテ結締組織ノ増殖アリテ、其中、單ニ結締組織ノ増殖ノミヲ認ムルモノ(23例)ト、多核白血球、圓形細胞ノ浸潤アルモノ(21例)アリ。

從來、上顎竇粘膜炎症ノ病理組織學的分類ニ就テハ Manasse, Hajek, Nühsmann, 小室並ニ海江田、Rnngge 等ノ研究業績アレドモ、各々其趣ヲ多少異ニシ。且ツ之等上顎竇粘膜ハ種々多様ナル組織像ヲ現ハシ。嚴密ナル分類ハナシ得ズトハ諸學者ノ稱フル所ニシテ、Oppikoferハ多數ノ副鼻腔粘膜ノ組織學的檢索ヲ行ヘルモ、之ヲ類別スルコトナク、唯各症例ニ就キ其病理組織學的所見ヲ述ブルニ止メタリ。又故無キニ非ラズ、余モ亦單ニ之等慢性炎症性變化ヲ記載スルニ止メタリ。

第二項 慢性上顎竇炎ノ上顎竇底骨部、

齒槽突起ニ及ボス影響ニ就テ

慢性上顎竇炎アルモノ(44例)ニ於テ、逆ニ上顎竇底骨部、齒槽突起ニ及ボス影響如何、

其ノ中、症例番號13左、18右、19右、23

左右, 26 右, 31 右, 33 左ノ 8 例ハ、先ニ『齒槽突起炎症ノ上顎竇底骨部竇粘膜ニ及ボス影響ニ就テ』ノ項ニ於テ述ベタルガ如ク、慢性上顎竇炎ノ病變ヲ認メタレドモ、之等ハ皆齒牙周圍組織炎(骨炎)ニヨリ、發來セルコト明ラカニシテ、炎症ハ上行性ニ進行セルモノナレバ、本項ニ於テハ、之ヲ度外視セリ。

即チ其他ノ慢性上顎竇炎アルモノ 36 例ニ於テ、上顎竇底骨部ヲ見ルニ、皮質ヲ成ス骨壁ハ多少共肥厚増殖セルモノ多ク、27 例(症例番號 2 左右, 4 右, 5 左, 7 右, 10 左右, 12 左右, 14 左右, 15 左右, 16 左右, 17 左右, 19 左右, 21 右, 24 左, 25 左右, 27 左右, 29 左, 32 右, 33 右)ニシテ、造骨細胞ヲ甚ダ多數認ムルモノト、著明ナラズシテ少數ヲ認ムルモノトアリ。之等ハ殆ンド總テニ於テ、骨増殖ハ骨膜面ニ平均ニ増殖シ竇底骨壁ハ平坦ナレドモ、其中 1 例(症例番號, 19 左)ハ、竇底骨著明ニ肥厚増殖シ、骨膜内ニ突起狀ヲナシテ入り込メリ。

慢性上顎竇炎アレドモ皮質ヲナス骨壁ニ肥厚増殖ナキモノハ尠ク、僅カニ 9 例(症例番號 3 左, 9 左右, 13 右, 18 左, 22 左, 24 右, 29 右, 31 左)ノミ。

次ニ慢性上顎竇炎症ガ竇底骨部ニ波及シ圓形細胞浸潤ヲ來タセルモノモ尠ク、7 例(症例番號 10 左, 17 左, 25 左右, 27 左右, 29 右)ナリ。

之等ハ竇底骨部ニ相當スル骨髓、竇底ト骨髓ニ通スルハーペルス氏管ニ滲透性ニ圓形細胞浸潤セリ。然レドモ之等ハ竇底骨部ニ止マリ、齒槽突起深部組織ニ迄廣汎ニ亙リテ細胞浸潤セルモノナシ。

尙ホ、少數例(症例番號, 10 左, 17 左, 19 左, 29 右)ニ於テハ、上顎竇底骨部或ハ齒槽突起深部組織ニ亙リ、齒槽骨骨梁著シク萎縮シ、其間結締組織増殖アリテ、所謂纖維性骨炎ヲ示セリ。以上ハ余ノ實驗成績ノ大要ナレドモ、之ニ就キ先輩諸學者ノ說ト比較對照シ、考案ヲ述フレバ次ノ如シ。

從來、上顎竇炎存在スル場合、骨組織ニ變化ヲ及ボスベキコトハ諸學者ニヨテ述ベラレタル所ナレドモ、詳細ナル研究ヲ缺キ之ニ對スル檢案ハ上顎竇粘膜ノ病理ニ比スレバ、閑却視サレタル感ナキニ非ズ。

Dmochowski ハ慢性上顎竇炎 18 症例ニ就キ檢案シ、7 例ハ著明ナル骨變化アルヲ認メ、即チ骨全壁ニ亙リ平均セル骨ノ肥厚ヲ認メ、1 例ノ如キハ 1.5cm ニ達スルヲ見タリト。或ハ小骨板ガ粘膜深部骨膜層ニ介在シ、或ハ骨壁ト游離シ、或ハ微細ニ連絡スルアリテ所謂葉狀骨ヲ見タリト云ヒ、Berberich モ亦之ニ左擔セリ。

Uffenorde ハ慢性上顎竇炎ノ場合、骨ノ通常肥厚緻密化 Verdichtungs- und Verdickungsprozesse ヲ認メ、附加現象 Appositionsvorgänge ヲ主徴セリ。

Manasse(1922) ハ此場合、骨ノ肥厚ヲ見ズシテ、却ツテ骨ノ萎縮ヲ見ルモノナリ。然レドモ組織學的ニハ第 1 ニ骨壁ニ骨新生機轉アルヲ認ムルモノニシテ、肉眼的ニハ骨變化ナキモノニ於テモ、尙ホ骨膜面ニ造骨細胞ガ絨緞狀ノ層ヲナシテ存在シ、所謂骨樣組織アルヲ見ルモノナリト述べ、尙ホ骨新生ハ必ズシモ骨壁ノ厚サヲ増加スルモノニ非ズシテ、骨壁全ク萎縮セルモノニ於テモ、骨樣組織アルヲ認メタリト。余ノ實驗成績ニ於テハ、即チ多クハ竇底骨壁ニ

造骨細胞アリテ、骨新生増殖スルヲ認メ、且ツ肥厚スルヲ認メタルモ、Manasseノ云ヘルガ如ク骨ノ萎縮ヲ見タルコトナシ。

Dmochowski, Berberichノ稱ヘタル所謂葉狀骨ノ像ヲ著明ニ示スモノナキモ、症例番號19左側ハ骨増殖シテ骨膜ニ突起狀ニ入り込メルハ、著明ナル骨増殖ヲ示スモノナリ。

即チ Berberich, Dmochowski, Uffenordeノ肥厚説ニ賛意ヲ表スモノナレドモ、Manasseノ萎縮説ニハ賛意ヲ表スルヲ得ズ。

Oppikofer, Manasseハ慢性上顎竇炎アル場合、竇底骨髓ニ破骨細胞ヲ認ムルコト極メテ稀有ナリト述ベタリ。

余ノ實驗成績ニテ偶々前述ノ如ク、症例番號31右側ニ於テ、竇底骨膜面及ヒ骨髓ニ破骨細胞ヲ著明ニ認メタルモ、之ハ齒牙周圍組織炎(骨炎)ノ竇底ニ波及セルニヨルモノニシテ、慢性上顎竇炎ニ由來スルモノヲ見ズ。

而シテ之等竇底骨壁ノ肥厚並ニ新生増殖ハ上顎竇粘膜ニ炎症性變化ナキモノニ於テハ、一ツモ認メラレザルヲ見レバ、之等變化ハ慢性上顎竇炎ニ由來スルモノナルコト明ナリ。

然ラバ之等骨肥厚、増殖ハ竇粘膜炎症ノ中、特ニ骨膜ノ著明ナル炎症性變化ノ有無ニヨリ招來セラル、モノナリヤ否ヤノ問題ニ逢着スルモノニシテ、此問題ハ今尙ホ未解決ノ狀態ニアリテ、唯ダ Nühsman(1926)ハ慢性上顎竇炎ノ際ノ竇底骨壁ノ肥厚ハ骨膜炎ノ有無ニ係ハラザルモノ、如シトノ意見ヲ述ベタルニ過ギズ。

之ニ就キ余ノ實驗成績ヲ見ルニ、竇底骨壁ノ肥厚、増殖ハ單ニ結締組織増殖セル骨膜ヲ有スルモノニ於テ見ラレ、細胞浸潤著明ナルモノニテモ、竇底骨膜ニ肥厚増殖ナキモノアルヲ以テ、

骨壁ノ肥厚増殖ハ、骨膜炎症ノ有無ニハ關係セザルモノニシテ、之ハ粘膜炎症ノ爲メノ二次的反應の所産ナリト思考サル。

次ギニ上顎竇ニ慢性炎症アル場合、齒槽突起骨髓ニ結締組織増殖スルコトニ就テハ、囊ニ Manasse(1922), Nühsman(1926)ガ述ベタルノミニテ他ニ詳細ナル記載ヲ見ズ。

余ノ實驗症例ニテモ、齒槽骨々梁ハ全體ニ亙リテ萎縮減少シ、且ツ竇底骨部ニ著明ニ齒槽突起廣汎ニ亙リテ骨梁間結締組織増殖シ、所謂纖維性骨炎ノ像ヲ呈セリ。

該纖維性骨炎ノ像ハ特ニ竇底ニ沿ヒテ著明ニシテ、齒槽骨深部ニハ輕度ニシテ慢性上顎竇炎ニヨリ二次的ニ招來セルモノト思惟サル。

即チ、慢性上顎竇炎ニヨリ纖維性骨炎ヲ招來スルモノナルコトヲ述ブルハ余ヲ以テ嚆矢トナス。

次ニ上顎竇炎症ガ竇底骨部齒槽突起ニ波及スルコトニ就テモ、唯 Manasse, Nühsmanニヨリテ、骨髓又ハ血管腔ニ圓形細胞ノ浸潤ヲ見ルモノナリト述ベラレタリ。

余ノ實驗症例ニテモ、例ニ於テ之ヲ見、僅カニ竇底骨部、竇底ト骨髓トヲ結ブハーベルス氏管ニ圓形細胞浸潤セリ。且ツ之等ハ齒性感染ノ場合、齒牙周圍組織炎(骨炎)ニ隣接セルハーベルス氏管血管ニ沿ヒテ竇ニ波及セルト其狀態ヲ異ニシ、此場合ハ竇底所々ニ存スル總テノハーベルス氏管ニ彌蔓性ニ細胞浸潤セルヲ以テ、之等ハ慢性上顎竇炎ノ竇底骨部ニ波及セシモノナルコト明ラカニシテ、骨吸收破壊ノ組織像著明ナラザルモ、慢性上顎竇炎ニ隣伴セル骨炎ナリト云フヲ得ベシ。

且ツ、之等細胞浸潤ヲ認ムルモノハ中、3例

(症例番號 10 左, 17 左, 29 右) ハ同時ニ纖維性骨炎ノ像ヲ認メタル事實ヨリスレバ、纖維性骨炎ト何等カノ因果關係アルモノ、如シ。

要之、成人ニ於テハ、上顎竇底皮質ヲ成ス骨壁ハ慢性上顎竇炎症ニ對シ、防禦機能アルモノ、如ク、依ツテ竇慢性炎症ノ下行性ニ竇底骨部、齒槽突起ニ炎症ヲ及ボスコト甚ダ尠ク、又其程度極メテ僅少ニシテ、多クハ竇底骨壁ノ肥厚、増殖ヲ惹起スルニ止マリ、著明ナル骨破壊ヲ見ズ。

反之、初生兒及ビ第 2 生齒期以前ノ小兒ニテハ、成人ト稍々其趣ヲ異ニシ、急性上顎竇炎症等ニヨリ往々骨髓炎ヲ發シ急速ニ骨破壊ヲ來タスコトアルハ、之幼兒ニテ竇底皮質ヲ成ス骨壁未ダ發達セズ、骨質軟弱ニシテ骨髓ニ富ミ且ツ竇底ト骨髓トヲ通ズルハーペルス氏管多キニヨリ、炎症ノ下行性波及容易ナルガ爲メナラン。

第三項 慢性上顎竇炎ノ齒牙周圍ニ

及ボス影響ニ就テ

余ノ實驗成績ニ於テ、慢性上顎竇炎症ノ齒牙周圍組織ニ及ボス影響如何ヲ見ルニ、炎症齒槽突起ニ波及セルモノニ於テモ、其程度輕度ニシテ上顎竇底骨部ニ止マリ齒牙周圍組織ニ影響ヲ及ボシタル形跡ナシ。

然レドモ、齒根端ノ竇内ニ裸出スルト、或ハ甚ダ接近シ僅カニ紙狀ノ骨壁ヲ以テ竇粘膜ノ境セラルハ場合、前項ノ如ク、竇粘膜ノ慢性炎症ハ假令僅少ナリトハ云ヘ、下行性ニ竇底骨部ニ波及スルコトアルヲ以テ、局所解剖學的位置ニヨリテハ、炎症ハ又齒牙周圍組織ニ波及スルコト可能ナルベシ。

第六章

「レ」線像ト病理組織學的

所見トノ比較

余ハ先ニ本研究第 1 報ニ於テ、上顎齒槽突起及上顎竇底ノ種々ナル「レ」線像ニ就キ、詳細ニ述ベルトコロアリタリ。又其病理組織學的檢索ヲ遂ゲ、前述ノ如キ所見ヲ得タリ。今茲ニ兩者ヲ比較對照スルニ、臨牀上極メテ興味深キヲ覺ユ。

即チ本研究第 1 報ニ述ベタル種々ナル「レ」線像ハ病理組織學的ニハ、如何ナルコトヲ意味スルモノナリヤ、又如何ナル程度ノ眞實性ヲ有スルモノナリヤ、之ハ余ガ本研究ヲ企テタル窮極ノ目的ニシテ、以下暫ク之ニ就キ論述シ最後ニ上顎竇底竝ニ齒槽突起疾患ノ「レ」線診斷ニ就テノ注意ヲ述ベントス。

余ハ本研究第 1 報ニ於テ、上顎齒槽突起部骨梁ノ「レ」線像ハ、網狀走行(紋理)ヲ示シ、然モ其紋理ハ種々ナル像ヲ以テ表ハレタリ。即チ紋理整然タルモノ、或ハ薄板狀ヲナセルモノ、或ハ紋理亂レタルモノ、或ハ陰影アルモノ、或ハ紋理全ク消失セルモノアリ。今其本態ヲ追求セントス。

(1) 齒牙周圍組織並ニ齒槽突起ニ炎症性變化ナキモノ、「レ」線像紋理ヲ見ルニ、口外撮影法ニテハ、紋理整然タルノ 23 例ヲ占メ、僅カニ 5 例ノミハ紋理亂レタリ。口内撮影法ニテモ、紋理整然タルモノ 23 例、紋理亂レタルモノ 3 例、薄板狀ヲナスモノ 1 例、紋理消失セルモノ 1 例ナリ。

(2) 齒牙脱落セルモノ、「レ」線像紋理ハ、口外撮影法ニテハ、全部薄板狀ヲ示シ、口内撮

影法ニテハ薄板狀ヲ示メスモノ 12 例。紋理亂レタルモノ 4 例。陰影ヲ呈スルモノ 2 例。紋理整然タルモノ 1 例ナリ。之等ノ中、纖維性骨炎ノモノハ 4 例ノ中 2 例ハ紋理亂レ、或ハ陰影ヲ呈セリ。

(3) 慢性根端性或ハ周緣性齒牙周圍組織炎アリテ、夫々慢性根端性骨炎、或ハ慢性瀰蔓性骨炎アルモノハ「レ」線像紋理ハ、口外撮影法ニテハ紋理亂レタルモノ 7 例。陰影アルモノ 8 例。紋理消失セルモノ 4 例ナリ。

口内撮影法ニテハ、紋理亂レタルモノ 8 例。陰影ヲ呈スルモノ 5 例。紋理消失セルモノ 4 例。整然タルモノ 2 例ナリ。之等慢性骨炎ノ中、慢性瀰蔓性骨炎 3 例ノ中、2 例ハ口外、口内撮影法ニテ紋理消失セリ。其他ノ慢性根端性骨炎ハ夫々紋理亂ルハカ、陰影ヲ呈スルカ、或ハ消失シテ表ハレタリ。此中、症例番號 3 左、24 左ノ根端肉芽組織ニ結締組織被包ナキモノモ、一定ノ「レ」線像ヲ示メスコトナク、紋理亂ルハカ、又ハ陰影ヲ呈セリ。

慢性根端性齒牙周圍組織炎ノ再燃シテ、急性ノ轉機ヲトレルモノ 3 例ノ中、1 例(症例番號 5 左)ハ口外撮影法ニテ紋理陰影ヲ呈シ、且ツ年輪狀ヲナシテ表ハレタリ。

由是觀之、齒槽突起ノ狀態ハ大體ニ於テ「レ」線像トヨク一致スルモノニシテ、齒牙周圍組織、齒槽突起ニモ炎症性變化ナキモノハ、紋理整然トシ、齒牙脱落シ齒槽突起骨梁ノ萎縮セルハ、紋理薄板狀ヲ示メスモノニシテ、尙ホ此中、纖維性骨炎ハ口内撮影法ニテハ、紋理亂レ或ハ陰影ヲ呈スルコトアリ。

次ニ、慢性根端性又ハ瀰蔓性骨炎アリテ、骨梁吸收サレタルモノハ、紋理亂ルハカ、或ハ陰影

ヲ呈シ、或ハ紋理消失シ、中ニモ慢性瀰蔓性骨炎ハ紋理消失シテ表ハルハコト多ク、齒根端肉芽組織ヲ圍ム結締組織被包ノ有無ニ關係セズ、同ジ慢性根端性骨炎ニテモ、如斯、或ルモノハ紋理亂レ或ルモノハ陰影ヲ呈シ、或ルモノハ消失シテ現ハレタルハ、之放射方向ノ影響ニヨルモノト思ハザルベカラズ。

就中、「レ」線像ニテ、特ニ紋理陰影ヲ呈シ或ハ紋理消失シ病變ハ周圍骨梁ト劃然タル境界アルガ如ク現ハレタル場合ニテモ、組織像ニテハ、之等慢性骨炎ハ齒根端又ハ齒牙周圍ニ亙リ瀰蔓性ニ齒槽骨ニ波及シ、細胞浸潤ハ血管ニ沿ヒテ著明ナルヲ示シ、可ナリ齒槽突起廣汎ニ亙ル炎症像ヲ認メタリ。

由是觀之、骨梁間血管ニ沿ヒテ波及スル骨炎症像ハ、「レ」線像ニテ現ハレザルモノニシテ、紋理ノ種々ナル像ヲ示スハ、最モ骨梁ノ吸收サレ、粗鬆トナルコトニ起因スルモノナリ。

齒槽突起ノ急性炎症ノ極ク初期ニテモ、「レ」線像ニ現ハルハヤ否ヤニ就キテハ余ノ實驗例中急性炎症ナキヲ以テ、之ヲ速斷スルコト能ハザレドモ、少數ノ例外ヲ除キ慢性骨炎ニテ骨梁ノ吸收セラレタルモノハミガ、種々ナル變化ヲ現ハシタルコトヨリ、Wild Gertrud ノ論ジタルガ如ク、余モ亦急性炎症ノ極ク初期ニテ、未ダ骨ニ吸收機轉無キモノニテハ、「レ」線像ニモ著シキ變化ハ現ハレザルモノナラント思考ス。興味深キハ、此慢性根端性齒牙周圍組織炎(骨炎)再燃シテ急性ノ轉機ヲトリタルモノ、1 例(症例番號 5 左側)ニ於テ齒槽突起ノ紋理陰影ヲ呈シ、然モ陰影ハ年輪狀ヲナセルハ、根端肉芽組織ヲ層狀ニ圍繞スル強キ結締組織ノ放射方向ノ良キ條件ニ惠マレタルニヨリ「レ」線影像ニ

モ年輪狀ヲナシテ、其層狀ヲ現ハシタルモノナリ。

次ニ、本研究第1報ニ於テ、上顎齒槽凹窩ノ境界線(底線)ハ明瞭ナル弧狀ノ透明線ヲ以テ現ハレ、時ニ細キ透明線ヲ、時ニ太キ透明線ヲ、時ニ太ク周圍トノ境界不明ナル線ヲ以テ現ハルモノナルコトヲ述べ、更ニ其肉眼の所見ヨリシテ、其總括的觀察ヲ行ヒタリ。

今之等ノモノト其組織像トヲ比較對照シ、以下之ヲ總括的ニ述ブレバ、

(1) 上顎竇粘膜ニ炎症性變化ナク、即チ竇底皮質ヲ成ス骨壁ノ肥厚増殖ナキモノハ、口外撮影法ニテハ細キ透明線 18 例、太ク周圍トノ境界不明ナルモノ 3 例、太キ透明 1 線例ニシテ、口内撮影法ニテハ、細キ透明線 12 例、太ク周圍トノ境界不明ナルモノ 8 例、太キ透明 2 線例ナリ。

(2) 慢性上顎竇炎アリテ、竇底皮質ヲ成ス骨壁ニ肥厚増殖アルモノ(但シ齒性上顎竇炎ヲ除ク)ノ底線ハ、口外撮影法ニテハ太ク周圍トノ境界不明ナルモノ 20 例、太キ透明線 4 例、細キ透明線 3 例ナリ。

口内撮影法ニテハ、太ク周圍トノ境界不明ナルモノ 12 例、太キ透明線 7 例、細キ透明線 5 例、不明ナルモノ 3 例ナリ。

(3) 慢性上顎竇炎アレドモ、竇底皮質ヲ成ス骨壁ニ肥厚増殖ナキモノハ、口外撮影法ニテハ細キ透明線 6 例、太キ透明線 2 例、太ク周圍トノ境界不明ナルモノ 1 例ナリ。口内撮影法ニテハ細キ透明線 5 例、太キ透明線 3 例、太ク周圍トノ境界不明ナルモノ 1 例ナリ。

(4) 次ニ、齒槽突起ニ慢性齒牙周圍組織炎(骨炎)アリテ、竇骨膜、粘膜ニ波及セル所謂

齒性上顎竇炎ノ底線ハ口外撮影法ニテハ太ク周圍トノ境界不明ナルモノ 4 例、太キ透明線 2 例、細キ透明線 2 例ナリ。

口内撮影法ニテハ、太ク周圍トノ境界不明ナルモノ 4 例、太キ透明線 1 例、細キ透明線 3 例ニシテ、太ク周圍トノ境界不明ナルモノ多シ。

由是觀之、竇底線ハ一義的ノモノニハ非ラザルモ、底線ノ細キ透明線トシテ現ハルハ、上顎竇ニ炎症性變化ナキ場合多ク、太キ透明線、又ハ太ク周圍トノ境界不明ニ現ハルハ、慢性上顎竇炎アリテ、骨膜ニハ結締組織増殖スルコト、竇底皮質ヲ成ス骨壁ノ肥厚増殖アルコト等ノ總體的ノ變化ニ起因スルモノナリ。此中、慢性上顎竇炎アリテモ、竇底皮質ヲ成ス骨壁ニ肥厚増殖ナキモノハ、細キ透明線ヲ示スコト多キニヨリ、竇底骨壁ノ肥厚ハ底線ノ太ク周圍トノ境界不明ニ現ハルコトニ對シ大ナル役割ヲナスモノノ如ク思惟セラル。

尙ホ、之等ノ底線ハ 1 乃至數ヶ所ニ於テ斷裂スルコトアリテ、余ハ本研究第1報ニ於テ、底線ノ斷裂ト稱セリ。

注目スベキハ、此底線ノ斷裂ハ竇底骨壁ノ吸收ノ有無ニ係ハラズ、齒性上顎竇炎ニ於テ最モ多ク見ラレ、8 例ノ中、7 例ハ口外、口内撮影法ニ於テ、或ハ其孰レカ一方ニ於テ之ヲ示セリ。

尙ホ此外竇底近クニ慢性齒牙周圍組織炎(骨炎)アレドモ、竇粘膜ニ達セザルモノ、或ハ之等病變ナクトモ、齒根端竇内ニ裸出スルカ、或ハ竇底ト甚ダ接近シ、竇底皮質ヲ成ス骨壁ノ甚ダ菲薄ナルモノハ、口外、口内撮影法ニテ斷裂ヲ示セリ。唯 1 例(症例番號 19 左)ハ竇底皮質ヲ成ス骨壁肥厚増殖シ、然モ骨ハ突起狀ヲナシテ入り込メルモノニ於テ、之ヲ見タルハ之撮影方向

ニ因ルモノト思惟サル。

要之。斯カル例外アレドモ。第1ニ齒槽突起骨炎ノ竇底骨壁ノ吸收サレルトサレザルトニ係ハラズ。竇粘膜ニ波及セル場合。次ニ竇底皮質ヲ成ス骨壁ノ甚ダ菲薄ナル場合ニ現ハルモノナルコトヲ確メ得タリ。

Euler(1929)ハ竇ニ竇底線ノ斷裂スルハ。竇底骨壁ノ缺損ヲ意味スルモノニ非ズシテ。齒根端ト竇トノ間ニ尙ホ薄キ骨層アルコトヲ現ハスモノナリト。余ハ斯カル場合ノ外竇底骨壁ノ吸收缺損アル場合ハ勿論。骨壁ノ吸收缺損ナクとも。骨炎症ノ竇底ニハーベルス氏管血管ニ沿ヒテ波及連絡スルモノニ於テ之ヲ示スモノナルコトヲ確メタリ。

以上。竇底線ノ細キ透明線トシテ現ハレ。且ツ斷裂スルガ如ク見ユルモノハ。大體ニ於テ竇底皮質ヲ成ス骨壁ノ極メテ菲薄ナルコトヲ現ハスモノニシテ。斯カル齒槽突起ニテハ齒根端部ノ炎症ハ容易ニ上顎竇底ニ進行シ得ルモノト思惟セラル、所ニシテ。殊ニ骨壁ニ齒槽突起骨髓ト竇底トヲ結ブハーベルス氏管ニ富メル場合特ニ然リ。

次ニ竇底線ノ太クシテ。周圍トノ境界不明ナルモノニシテ。齒槽突起紋理ノ變化竇底近クニ現ハレ。且ツ竇底線ノ斷裂ヲ伴フ場合ハ。齒槽突起骨炎ガ竇底骨壁ニ達シ竇底骨壁ヲ吸收シ。或ハハーベルス氏管血管ニ沿ヒテ上顎竇粘膜ニ波及シ。慢性上顎竇炎ヲ惹起シタルコトヲ示スモノニシテ。余ノ實驗症例ハ之ヲ證明セリ。

慢性上顎竇炎アリテ。圓形細胞ノ僅カニ竇底骨部ニ浸潤セルモノ。或ハ二次的ニ主トシテ竇底骨部ニ纖維性骨炎ヲ招來セルモノハ。「レ」線像底線ハ。孰レモ太キ透明線。或ハ太ク周圍トノ

境界不明ニ現ハレタルモノ多キモ。口内撮影法ニテハ細キ透明線ヲ示スモノアリテ。特別ナル「レ」線像ヲ示サズ。故ニ斯カル病理組織學上變化アルモノト。他ノ單ニ慢性上顎竇炎アリテ。竇底皮質ヲ成ス骨壁ノ肥厚増殖ノミアルモノト。竇底線ヲ以テ判別スルコト能ハズ。

次ニ。口外並ニ口内撮影法ニテ。造影劑竇内注入ニヨリ中間層ノ肥厚ヲ認メ得タルモノニ就キ。其組織像ヲ見ルニ誠ニ興味深シ。

組織學的ニ慢性上顎竇炎アルモノハ大多數87例ニ於テ多少ニ係ハラズ。「レ」線像中間層ノ肥厚ヲ認メ。他ノ少數例7例ハ中間層ノ肥厚ナシ。一方。上顎竇粘膜ニ炎症性變化ナキモノハ多クハ。中間層ノ肥厚ヲ認メズ。唯ダ少數ニ於テハ中間層ノ肥厚アリタリ。

同ジク。造影劑ヲ注入シ。口内撮影法ヲ行ヘルモノ僅カニ34例ナレドモ。之モ亦組織學的ニ慢性上顎竇炎アルモノハ。中間層ノ肥厚アルモノ16例。肥厚ナキモノ3例。不明ナルモノ3例ナリ。

上顎竇粘膜ニ炎症性變化ナキモノハ。中間層ノ肥厚アルモノ7例。肥厚ナキモノ5例ナリ。

要之。造影劑注入ニヨル中間層ノ肥厚ハ。多クノ場合上顎竇粘膜ノ炎症性肥厚ヲ示スモノナリ。然レドモ特ニ口内撮影法ニ於テ。多ク見ラレタル粘膜ニ炎症性變化ナキモノニ就テモ。中間層ノ肥厚ヲ見タルハ。之撮影方向ニ影響サレタル結果ナラン。

最後ニ。口内撮影法ニヨル齒根膜線「レ」線像ト其組織像トヲ比較スルニ。慢性根端性或ハ周緣性齒牙周圍組織炎即チ慢性根端性骨炎。慢性彌蔓性骨炎アルモノハ。大部分ニ於テ。齒根膜線斷裂セリ。

齒牙周圍組織並ニ齒槽突起ニ炎症性變化ナキモノハ、殆ンド大多數齒根膜線斷裂ヲ認メズ。此中、少數例(症例番號 11 左右, 28 右)ニ於テ、齒牙周圍組織ニ炎症性變化ナキモ、齒根端ノ竇底ト甚ダ接近シ、僅カニ薄キ纖維性トナレル骨壁ヲ以テ竇粘膜ト境セラレ、或ハ竇内ニ裸出シ、竇粘膜ヲ以テ被覆サレタルモノハ、口内撮影法紋理整然タルニ係ハラズ齒根膜線斷裂セリ。同じく症例番號 8 左右, 32 左モ齒牙周圍組織ニ變化ナク、齒根端竇内ニ裸出セルモ、「レ」線像紋理整然、且ツ齒根膜線ノ斷裂ナシ。之ハ撮影方向ニ因ルモノト思惟ス。

由是觀之、齒根膜線ノ斷裂ハ齒牙周圍組織炎(骨炎)ニ因ルカ、或ハ炎症性變化ナクトモ、齒根端ノ竇内ニ裸出スルカ、或ハ甚ダ接近スルコトヲ意味スルモノニシテ、之等ノ區別ハ齒槽突起紋理ノ狀態ニヨリ、明瞭ニ識別スルコトヲ得ベシ。

第七 章

口外撮影法ト口内撮影法 トノ比較

以上ノ實驗成績ニテ示スガ如ク、上顎齒槽突起及び上顎竇底ノ口外並ニ口内撮影法ニヨル「レ」線所見ハ、大體ニ於テ相似タレドモ、尙ホ兩者ヲ比較セバ稍々其所見ヲ異ニシ各々其特徵ヲ有ス。因リテ今此兩者ヲ比較スルハ、臨牀上甚ダ有意義ナリト信ズ。

齒槽突起ノ「レ」線像紋理ハ、口外、口内撮影法トモ其病理組織像ト一致シ、特ニ紋理整然タルモノ、薄板狀ヲナスモノハヨク其組織像ト一致スルモノナレドモ、絶對的ノモノニ非ズシテ、時ニ一致セザルコトヲ免レズ。

斯カル「レ」線像紋理ト組織像トノ不一致ハ、紋理ノ種々ナル像全般ヲ通ジテ、口外撮影法ニ於ケルヨリ、口内撮影法ニ於テ多シ。例之、症例番號 14 左側ハ組織學的ニハ齒槽突起ニ炎症性變化ナク、口外撮影法ニテハ紋理整然タルモ、口内撮影法ニテハ紋理消失シテ現ハレタルガ如シ。但シ纖維性骨炎アルモノ、口外撮影法ニテハ皆紋理薄板狀ナレドモ、口内撮影法ニテハ紋理亂レ、又ハ陰影ヲ呈セルハ、此部ノ消息ヲヨク現ハスモノト云フベシ。1929 年 Euler ハ齒槽突起病竈ノ位置及び大サハ、「レ」線像トハ多少誤差ヲ生ズルモノニシテ、「レ」線像ニヨル誤謬ハ口外撮影法ニ於ケルヨリ、口内撮影法ニ於テ甚ダシト。余モ亦略々之ニ左擔スルモノニテ、之恐ラク口内撮影法ノ場合ハ、口外撮影法ノ場合ニ比シ、撮影方向ニ影響サル、コト多キニヨルナルベシ。

次ニ竇底線ノ種々ナル像ハ口外、口内撮影法トモ大體ニ於テ竇粘膜ノ炎症性變化有無ヲ判讀シ得ルモノナレドモ、之等ハ決シテ、一義的ノモノニアラズ。今茲ニ之ヲ口外撮影法、口内撮影法トヲ比較スレバ、口内撮影法ニテハ、上顎竇粘膜ニ炎症性變化ナキモノニ於テモ、竇底線ノ太ク周圍トノ境界不明ニ現ハル、場合、口外撮影法ヨリ多シ。

之モ亦、口内撮影法ニテハ、口外撮影法ニ比シ其撮影方向ニ影響サル、コト大ナルニ因ルモノナリト思惟サル。

1933 年 Isaak Robinsohn ハ上顎竇底ノ消息ヲ窺知スルニハ、從來行ハル、口外撮影法ニヨル外、口内撮影法ヲ行フコトヲ推奨シ、病的ナル上顎竇粘膜ハ竇底線上ニ邊緣トシテ現ハレ、所謂齒性上顎竇炎ノ初發現象モ、該齒根端部ニ

相當シ。隆起狀ノ邊緣トシテ現ハルト云ヘリ。余ノ口内撮影法ニヨル實驗成績ニテハ、Robinsonノ云ヘル底線上ノ邊緣ハ、底線ノ太ク周圍トノ境界不明ナルモノトシテ現ハレ、之ハ前述ノ如ク決シテ一義的ノモノニ非ザルコトヲ確メタリ。

Robinsonハ口内撮影法ニテハ、病的ナル上顎竇粘膜ハ竇底線上ニ、邊緣トシテ現ハルト述ベタル後、尙ホ底線ガ年輪狀ヲナシテ現ハルコトアリテ、之ハ反復罹患セシ上顎竇炎ノ回数及ビ炎症ノ強サヲ現ハスモノナリト述ベタリ。

余ノ實驗成績ニテハ、「レ」線學的ニハ、即チ底線ハ太ク周圍トノ境界不明ニ現ハレタルモノアレドモ、明瞭ニ年輪狀ヲ示スモノナク、且ツ病理組織學的ニモ斯カル所見ヲ示ス症例ニ遭遇セザリキ。病的上顎竇粘膜ヲ口内撮影法ニテ、竇底線上邊緣トシテ、現ハスコトニ就キテハ、今後ノ研究ニ俟ツ所アラントス。

次ニ、竇底線ノ斷裂モ、口外、口内撮影法ニテ、齒槽突起ニ慢性齒牙周圍組織炎(骨炎)アリテ、竇底ニ波及スルモノ、或ハ竇底皮質ヲ成ス骨壁ノ菲薄ナル場合ニ現ハルハ點、兩者トモ大同小異ナレドモ、此中、口外撮影法ニテハ斷裂ヲ示ササルモノト雖モ、口内撮影法ニテハ之ヲ示スモノ稍々多ク、此點口内撮影法ハヨク此部ノ消息ヲ現ハスモノナリ。

造影劑注入ニヨル中間層ノ肥厚ニ就キテ、口外、口内撮影法トモ大同小異ニシテ、孰レモ竇粘膜ノ炎症性肥厚ノ有無ヲ現ハスモノナリ。然レドモ、之モ亦時ニ誤差アルコトヲ免ズシテ、特ニ口内撮影法ニ於テハ竇粘膜ニ炎症性變化ナキモノニ於テモ、中間層ノ肥厚ヲ見タルモノ、口外撮影法ニ比シ、其數多キヲ見タルハ、

之モ亦撮影方向ニ影響サレタル結果ナリト思惟ス。

最後ニ、齒根膜線ノ斷裂ハ、口内撮影法ニテハ、前記ノ如ク、特ニ竇底ト齒根端トノ位置的關係ヲ知悉スルヲ得テ此點、口外撮影法ヨリ優レリ。

以上ノ如ク、口外並ニ口内撮影法ニヨル「レ」線像ハ、總體的ニハ大同小異ナレドモ、各々其特徴アリテ長所短所アリテ、口内撮影法ハ齒牙ト竇底トノ間ノ消息ヲ口外撮影法ヨリ鋭敏ニ現ハスト雖モ、其判讀ハ困難ナリ。且ツ竇底線ノ斷裂ニ於ケルガ如ク、口外撮影法ニハ現ハレザルモノモ、口内撮影法ニテハ現ハルコトアルヲ以テ、臨牀上例ヘバ、齒性上顎竇炎ヲ疑フ場合、口外撮影法ノミニヨラズ、口内撮影法ヲモ併用シ、斷裂ノ有無ヲ檢シ、以テ正確ナル診斷ヲ下スベキモノナリト信ズ。然レドモ、之等「レ」線像ハ畢竟、此部位ニ於ケル病變ヲ決定スルニ重要ナル根據ヲ與フル補助方法ノ一ニ止マリ、絶對的ノモノニ非ラズ、故ニ「レ」線像ノミニ信賴シ直チニ該疾患ヲ診斷スル時ハ、思ハザル誤謬ニ陷ルコト無キニシモアラザルヲ以テ、斯カル場合ハ宜シク其臨牀的所見ヲモ併セ考慮セザルベカラズ。

以上、余ハ上顎齒槽突起及び上顎竇底ノ「レ」線像ト其組織像トヲ比較對照シタル結果、「レ」線像ハ決シテ一義的ノモノナラザルコト確實ナルモ、之等「レ」線ヨリ或ル程度ノ病變ヲ推察シ、之等相互ノ關係ニ就キ、究明シ得タルヲ以テ、臨牀上得ル所尠カラザルヲ信ズルモノナリ。

第八章

結 論

(1) 余ハ年齡 24 歳ヨリ 89 歳迄ノ間ノ屍體上顎骨 66 個ニ於テ上顎齒槽突起及ヒ上顎竇底ノ「レ」線學的並ニ病理組織學的檢索ヲ遂ゲ、其所見ヲ比較對照セリ。

(2) 上顎齒槽突起及ヒ上顎竇底ノ病理組織學的檢索ハ次ノ如シ。

(イ) 慢性根端性齒牙周圍組織炎アルモノハ、齒槽突起ニ慢性骨端性骨炎アリ。

慢性周緣性齒牙周圍組織炎アルモノハ、齒槽突起ニ慢性瀰蔓性骨炎アリ。

右ノ慢性骨炎アルモノ(19 例)ハ上顎竇粘膜ニ慢性炎症ヲ認ムルモノ多ク、其中、之等慢性齒牙周圍組織炎(骨炎)ハ齒根端齒牙周圍ニ於ケル肉芽組織ヲ圍ム結締組織纖維被包アレドモ、竇底骨壁ニ浸潤シ竇底骨壁ヲ吸收シ、或ハ竇底骨壁ヲ吸收セラルコトナキモ、ハーベルス氏管血管周圍ニ沿ヒテ竇粘膜ニ波及シ、齒性上顎竇炎ヲ示スモノ 8 例アリ。此場合ノ肉芽組織ヲ圍繞スル結締組織纖維被包ノ竇感染ニ對スル防禦機能ハ絶對的ノモノニアラズ。

(ロ) 齒牙全部脱落セル場合、悉ク齒槽突起骨梁ニ萎縮セリ。此場合竇底骨部竇粘膜ニ影響ヲ與ヘズ。

(ハ) 慢性上顎竇炎アル場合、竇底皮質ヲ成ス骨壁ハ、肥厚増殖アルモノ多ク、肥厚増殖無キモノ尠シ。骨壁ノ肥厚増殖ハ、骨膜炎ノ有無ニ係ハラズ之ヲ認ム。

慢性上顎竇炎ノ齒槽突起ニ波及スルコト甚ダ尠ク、且ツ其程度甚ダ輕度ニシテ、僅カニ竇底骨部ニ止マリ齒槽突起廣汎ニ亙リ、或ハ齒牙周圍

組織ニ炎症ヲ及ボシタルモノナシ。又少數例ニ於テハ、慢性上顎竇炎ニヨリ纖維性骨炎ヲ招來セリ。

(3) 病理組織像ト「レ」線像トヲ比較對照スルニ次ノ如キ結果ニ到達セリ。

(イ) 慢性根端性齒牙周圍組織炎(慢性根端性骨炎)、或ハ慢性周緣性齒牙周圍組織炎(慢性瀰蔓性骨炎)ハ、齒槽突起紋理ハ亂ル、カ、或ハ陰影ヲ呈スルカ、或ハ紋理全ク消失セリ。

(ロ) 齒牙脱落シ齒槽突起骨梁萎縮セルモノハ、齒槽突起紋理薄板狀ヲナセリ。

(ハ) 慢性上顎竇炎アリテ、竇底皮質ヲ成ス骨壁肥厚増殖セルモノハ竇底線ハ多クハ太ク周圍トノ境界不明ナリ。

(ニ) 慢性齒牙周圍組織炎(骨炎)ノ竇粘膜ニ波及セルモノハ、多クハ竇底線ハ太ク周圍トノ境界不明ニ現ハレ、口外、口内撮影法孰レカニ於テ斷裂ヲ示セリ。

(ホ) 慢性上顎竇炎ノ僅カニ、上顎竇底骨部ニ波及セルモノ、及ビ纖維性骨炎ハ「レ」線像ニテ殆ンド之ヲ判別シ得ズ。纖維性骨炎ハ、口内撮影法ニテ、紋理亂ル、カ、又ハ陰影ヲ呈スルコトアリ。

(4) 口外撮影法ト口内撮影法ニヨル「レ」線像ノ異同點ヲ舉グレバ次ノ如ク、「レ」線像ニヨル誤謬ハ口内撮影法ニ於テ多シ。即チ、

(イ) 齒槽突起紋理ノ變化ハ口外並ニ口内撮影法トモ、ヨク其組織像ト一致スレドモ、時ニ一致セザルコトアリテ、之ハ口内撮影法ニ於テ多シ。

(ロ) 竇底線ハ口外並ニ口内撮影法ニ於テ、略ニ相似タルモノ口内撮影法ニテハ、上顎竇正常ナルモノニテモ、底線太ク周圍トノ境界不明ニ

現ハルハコト多シ。

(ハ) 口内撮影法ニ於テハ、齒根膜線斷裂ニヨリテ上顎竇ト齒牙トノ位置の關係ヲ知ルコトヲ得。此點口外撮影法ヨリ優レリ。

(5) 上顎齒槽突起ト上顎竇底トノ間ノ「レ」線學的檢索ハ、口外撮影法ノ外、口内撮影法ヲ行フヲ可トス。

撰筆スルニ當リ御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ賜ハリタル
名古屋醫科大學耳鼻咽喉科學教室阿久根教授、大連醫院
耳鼻咽喉科塚本醫長ニ對シ衷心ヨリ感謝ノ意ヲ表ス

主 要 文 献

1) **Amersbach, K.:** Über die Beziehungen der Oto-Rhino-Laryngologie zur Zahnheilkunde. Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 44, 409, (1926). 2) **Axhausen, G.:** Zur Klassifikation und Behandlung der eitrigen Entzündungen am Kiefer. Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 47, 497, (1929). 3) **Berberich, J.:** Lehrbuch der Mund-und Rachenkrankheiten, 1932. 4) **Blumenfeld und Jaffe:** Pathologie der Oberluft-und Speisewege, 1931. 5) **Denker-Kahler:** Handbuch der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Bd. 2, 1926. 6) **Dmochowski, Z.:** Beitrag zur pathologischen Anatomie und Actiologie der entzündlichen Prozesse im Antrum Highmori, Arch. Ohr-usw. Heilk. 3, 255, (1895). 7) **Eggemann, W.:** Über das Vorkommen von Cholesterin-Krystallen bei Kieferhöhlenentzündung. Z. Hals-usw. Heilk. 5, 61, (1923). 8) **Euler-Meyer:** Pathohistologie der Zähne mit besonderer Berücksichtigung der Pathobiologie, der Zähne mit besonderer Berücksichtigung der Pathobiologie, 1927. 9) **Fraenkel, E.:** Beiträge zur Pathologie und Ätiologie der Nasennebenhöhlenerkrankungen. Virchows Archiv. Bd. 143, 42, (1896). 10) **Goerke, M.:** Bemerkungen zur pathologischen Anatomie der Nase und ihrer Nebenhöhlen, Arch. Ohr-usw. Heilk. 19, 371, (1909). 11) **Hajek, M.:** Pathologie und Therapie der entzündlichen Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase, 1909. 12) **Hirsch, In Scheff-**

Pichler: Handbuch der Zahnheilk. 3, 557. 13) **Hoepfel, W.:** Über das Verhalten der Kieferhöhlenschleimhaut bei Entzündungsprozesse des Parodontiums. Dtsch. Zahn-, Mund-und Kieferheilk. Bd. 4, 44, 116, (1937). 14) **Immenkamp, A.:** Die Bedeutung infizierter Oberkieferzysten für die Pathogenese von Antrumkrankungen mit einem Beitrag zur Frage der Regeneration des knöchernen Antrumbodens. Dtsch. Zahn-, Mund-und Kieferheilk. Bd. 2, 419, 1935. 15) **Jensen, W.:** Beiträge zur Bakteriologie und Histologie der Nasennebenhöhlen. Z. Hals-usw. Heilk. 32, 439, (1933). 16) **Krumbein, C.:** Zur Histopathologie der Kieferhöhlenschleimhaut. Z. Laryng. 14, 178, (1925). 17) **Manasse, P.:** Die pathologische Anatomie der Nebenhöhlenerkrankungen. Z. Hals-usw. Heilk. 4, 473, (1922). 18) **Meyer, W.:** Der Einfluss der radikalen Kieferhöhlenoperation auf die Vitalität der benachbarten Zähne. Dtsch. Zahn-, Mund-und Kieferheilk. Bd. 2, 434, (1935). 19) **Minder:** 50 Sektionsbefunde der Nase und deren Nebenhöhlen unter Berücksichtigung der Gesichtsschädelmasse. Arch. Ohr-usw. Heilk. 12, 328, (1902). 20) **Oppikofer, E.:** Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie der Nase und ihrer Nebenhöhlen. Arch. Ohr-usw. Heilk. 19, 28, (1907). 21) **Derselbe:** Mikroskopische Untersuchung der Schleimhaut von 165 chroni-

scher eiternden Nebenhöhlen der Nase nebst Beitrag zur Genese der Plattenepithelcarcinome der Nbenhöhlen. Arch. Ohr-usw. Heilk. 21, 422, (1909). 22) Kunge: Die entzündlichen Erkrankungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen in Henke-Labarsch. Handbuch der speziellen path. Anatomie und Histologie. 8. 1 (Berlin 1928). 23) Schmalogelow, E.: Über akute Osteomyelitis des Oberkiefers. Arch. Ohr-usw. Heilk. 5, 115, (1896). 24) Siegmund, H.: Die odontogen Ostitis des Kieferknochens. Beitr. Path. Anat. 83, 289, (1929). 25) Ateinhardt, G.: Die Gefäßversorgung des gesunden, kranken und zahnlosen Kiefers. Dtsch. Zahn-, Mund- und Kieferheilk. Bd. 2, 265, 329, 1935. 26) Uffenorde, W.: Die verschiedene Entzündungsformen der Nasenhöhlenschleimhaut und ihre Behandlung. Z. Ohrenheilk. 72, 133 und 192 (1915). 27) Derselbe: Pathologie und Therapie der serösen Nebenhöhlentzündung. Z. Laryng. 17, 1, (1928). 28) Wasowaki, T.: Chronische eittrige Entzündung der Kieferhöhle im Lichte der Zahlen und der klinischen Beobachtungen in Wilno. Msch. Ohrenheilk. Jg. 67, 153, (1933). 29) Wassmann, M.: Lehrbuch der praktischen Chirurgie des Mundes und des Kiefer. Bd. 1, 1935. 30) Weaki, O.: Röntgenologische-anatomische Studien aus dem Gebiete der Kieferpathologie. Vjschr. Zahnheilk. Jg. 37, 1, (1921). 31) Derselbe: Periodotitis oder Osteomyelitis. Zahnärztl. Rdsch. 37, 864, (1928). 32) Wilker, F.: Statistische Untersuchungen über die Entzündung der Nasennebenhöhlen an Hand von 2000 Sektionsfällen. Z. Laryng. 25, 404, (1934). 33) Zange:

Sinusitis maxillaris und Zähne. Vortrag auf der Versamml. d. Vereinigung südwestdeutscher Hals-, Nasen- und Ohrenärzte in Würzburg am 5. und 6. März. 1932, referiert in Zbl. Oto-Rhino-Laryng. 35, (1932). 34) 後藤修二: 慢性上顎竇炎粘膜ノ病理組織學の所見並ニ粘膜内細菌ニ就テ. 第1, 2, 3, 4編. 大日耳鼻. 第41卷, 1619, 1641, 1643, 1657頁. 35) 羽田野重: 上顎齒牙齒嚙ト上顎竇底トノ淋巴路連絡ノ存否ニ就テ. 並ニ齒嚙ト顎下及ヒ深部頸部淋巴腺トノ關係ニ就テ實驗的研究. 大日耳鼻. 第42卷, 1695頁, 昭和11年, 第43卷, 110頁, 昭和12年. 36) 堀江桂一: 慢性齒牙支持組織炎ノ「レントゲン」像ト病理組織の所見トノ關係ニ就テ. 其ノ1, 其ノ2, 齒科學報. 第41卷, 161頁, 258頁, 昭和11年. 37) 石井正: 鼻腔ト齒牙トノ臨牀的關係ニ就テ. 大日耳鼻. 第33卷, 137頁, 昭和2年. 38) 石井正: 上顎齒牙ノ位置異常ニ關スル研究. 大日耳鼻. 第33卷, 666頁, 昭和2年. 39) 海江田純: 炎症性副鼻腔膜ニ於ケル脂肪物質ノ研究. 第1, 2, 3編. 大日耳鼻. 第36卷, 145, 183, 190頁, 昭和5年. 40) 加藤錦士: 「オチエナ」患者ノ上顎竇粘膜ノ變化並ニ其組織内細菌ニ就テ. 大日耳鼻. 第40卷, 659頁, 昭和9年. 41) 衣川穠: 鼻腔粘膜ノ病理組織學の知見補遺. 大日耳鼻. 第34卷, 779頁, 昭和3年. 42) 香宗我部壽: 齒性上顎竇炎ノ成立ニ關スル諸説. 耳鼻科. 第4卷, 165頁, 昭和6年. 43) 宮城石山: 副鼻腔粘膜ニ沈着スル石灰ニ關スル研究. 福岡醫大誌. 第21卷, 498頁, 昭和3年. 44) 山田仲次郎: 齒性上顎竇蓄膿症ノ12例. 殊ニ其齒牙附近組織炎トノ關係. 齒科學報. 第36卷, 751頁, 昭和6年. 45) 山田仲次郎: 齒性上顎竇蓄膿症ノ15例. 殊ニ其齒牙及ヒ附近組織炎トノ關係ニ就テノ知見補遺. 日本齒界. 623頁, 昭和7年.

附・圖 說 明

第 1 圖 症例番號 6. 左側.

弱擴大. 齒牙周圍組織及ヒ竇粘膜ニ炎症性變化ヲ認メズ.

第 2 圖 同 上.

上顎竇粘膜ニ炎症性變化ナシ. 竇底皮質ヲ成ス骨

壁ニ骨増殖ナシ. 擴大 200 倍.

第 3 圖 症例番號 9. 右側.

弱擴大.

第 4 圖 同 上.

齒槽突起部骨梁ハ一般ニ萎縮シ. 其間. 脂肪細胞

ヲ以テ充タサル。擴大60倍。

第5圖 症例番號19。右側。

弱擴大。

第6圖 同 上。

竇底部ノ骨髓ハ纖維髓ナリ。骨髓ト竇底トヲ通ズルハーベルス氏管血管ニ沿ヒテ。圓形細胞浸潤シ。竇骨膜ニ波及ス。竇底皮質ヲ成ス骨壁ニハ肥厚増殖ナシ。上顎竇粘膜ハ浮腫狀ヲ呈シ。厚サ不同ニシテ多數ノ皺襞アリ。擴大60倍。

K.S. 竇粘膜。H.K. ハーベルス氏管。F.M. 纖維髓。

第7圖 症例番號33。左側。

弱擴大。

第8圖 同 上。

慢性根端性骨炎ハ急性ノ轉機ヲトリ。竇底皮質ヲ成ス骨壁ニ達シ。次デ竇底ニ通ズルハーベルス氏管血管周圍ニ沿ヒテ細胞浸潤シ。竇粘膜ニ波及セリ。擴大45倍。

R.I. 圓形細胞浸潤。

第9圖 同 上。

ハーベルス氏管血管周圍ニ沿ヒテ。圓形細胞浸潤竇粘膜ニ波及スルヲ示ス。擴大240倍。K.S. 竇粘膜。G. 血管。R.I. 圓形細胞浸潤。

第10圖 症例番號31。右側。

弱擴大。

第11圖 同 上。

慢性周緣性齒牙周圍組織炎ニヨリ。竇底皮質ヲ成ス骨壁ハ吸收サレ。其間多核白血球。圓形細胞浸潤シ竇粘膜ニ波及スルヲ示ス。擴大60倍。K.S. 竇粘膜。Z.I. 細胞浸潤。O.K. 破骨細胞。

第12圖 同 上。

竇底骨壁吸收サレ。其間多核白血球。圓形細胞浸潤シ竇粘膜ニ波及スルヲ示ス。擴大240倍。

K.S. 竇粘膜。Z.I. 細胞浸潤。O.K. 破骨細胞。

第13圖 症例番號23。左側。

弱擴大。

第14圖 同 上。

慢性根端性齒牙周圍組織炎ニヨリ竇底骨壁ハ吸收サレ。其間多核白血球。圓形細胞浸潤シ上顎竇粘膜ニ波及セリ。擴大45倍。K.S. 竇粘膜。Z.I. 細胞浸潤。G. 肉芽組織。

第15圖 同 上。

竇底皮質ヲ成ス骨壁吸收サレ。其間多核白血球。圓形細胞浸潤シ。走行亂レタル上顎竇骨膜。次デ竇粘膜ニ波及スルヲ示ス。K.S. 竇粘膜。Z.I. 細胞浸潤。P. 走行亂レタル骨膜。

第16圖 症例番號10。左側。

第17圖 同 上。

齒槽突起部骨梁ハ萎縮減少シ。其間著明ナル結締組織ノ増殖アリテ。纖維性骨炎ノ像ヲ示ス。擴大100倍。B.G. 結締組織ノ増殖。

第18圖 症例番號25。右側。

弱擴大。

第19圖 同 上。

竇底粘膜ノ上皮組織ハ剝脫崩壊シ。上皮下組織骨膜ニハ高度ナル多核白血球。圓形細胞ノ浸潤アリ。皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ。此部骨髓並ニハーベルス氏管ニハ圓形細胞瀰漫性ニ浸潤セリ。擴大60倍。R.T. 圓形細胞浸潤。K.S. 竇粘膜。

第20圖 症例番號19。左側。

弱擴大。

第21圖 同 上。

竇底皮質ヲ成ス骨壁ハ肥厚増殖シ。骨膜肥厚組織内ニ突起狀ヲナシテ入り込メリ。擴大60倍。P. 骨膜。

第22圖 症例番號3。右側。

弱擴大。

第23圖 同 上。

骨炎症ノ圓形細胞浸潤アリテ。周圍ハ劇然ト纖維髓ヲ以テ圍繞セラルヲ示ス。

R.I. 圓形細胞浸潤。F.M. 纖維髓。

角岡論文附圖

上顎齒槽突起及び上顎竇底ノ線學的並ニ病理組織學的研究(第二報)

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Dr. Saburo Tsunooka: Röntgenologische und patho-histologische Untersuchungen
über die Beziehungen zwischen dem Alveolarfortsatz und der
Oberkieferhöhle. (II. Mitteilung).

角岡論文附圖

上顎齒槽突起及上顎竇底ノ線學的並ニ病理組織學的研究(第二報)

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Dr. Saburo Tsunooka: Röntgenologische und patho-histologische Untersuchungen
über die Beziehungen zwischen dem Alveolarfortsatz und der
Oberkieferhöhle. (II. Mitteilung).

角岡論文附圖

上顎齒槽突起及び上顎竇底ノ組織學的並ニ病理組織學的研究(第二報)

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

Dr. Saburo Tsunooka: Röntgenologische und patho-histologische Untersuchungen
über die Beziehungen zwischen dem Alveolarfortsatz und der
Oberkieferhöhle. (II. Mitteilung).

角岡論文附圖

上顎齒槽突起及び上顎竇底ノ線學的並ニ病理組織學的研究(第二報)

Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.

Dr. Saburo Tsunooka: Röntgenologische und patho-histologische Untersuchungen
über die Beziehungen zwischen dem Alveolarfortsatz und der
Oberkieferhöhle. (II. Mitteilung).