實驗的動脈硬化症ニ於ケル聽器變化ニ就テ

(承 前)

Dr. Hideo Senoo: Über die Veränderungen des Gehörorgans bei experimentellen Arteriosklerosen.

名古屋醫科大學耳鼻咽喉科學教室 (主任 阿久根教授)

專攻科學生 妹 尾 日 出 生
セノ ヲ ヒ デ

第四編 「アドレナリン」及「カルチウム」併用ニヨル 聽器變化ノ病理組織學的研究

第 一 章

「カルチウム」ノ作用ニ就テ

「カルチウム」ガ炎症特ニ滲出性機轉ニ對シ抑制作用アルヲ Chiari 及 Januschke 氏が創見シテ以來、血中「カルチウム」量ノ低下ヲ來タセルト謂ハル、結核ニ對シ、其増加ヲ圖リナバ其豫後ニ對シ好影響ヲ齎シ、又結核病竈ノ石灰化ヲ促進スベシトノ思考ノ下ニ頻ニ應用セラル、ニ至レリ。Wells 氏ハ石灰沈着物ノ化學的分析ヲ行ヒ、舟岡氏ハ其「レントゲン」線ノ檢索ニヨツテ人體結核病竈内「カルチウム」鹽ハ骨及ビ齒牙ニ於ケルモノト等シク $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ナル正磷酸「カルチウム」鹽ナルコトヲ證セリ。最近 6 炭糖ノ磷酸「エステル」ハ Phosphatase ノ作用ヲ受ケテ容易ニ分解スルモノナルガ故ニ其注射ニヨリ結核病竈ノ石灰沈着ヲ促サントスルモノノ多ク、Kottmann, Doorenbos, Undritz

氏等ハ「グリコン酸カルシウム」ヲ用ヒ、舟岡氏等ハ「ヤトコニン」ヲ用ヒ其有效ナルコトヲ稱ヘタリ。然ルニ Hentenylen, Gaal, Denies, Minot, Astanin 氏等ハ石灰鹽類投與ニヨル「血中カルチウム」ニ關スル實驗成績ヨリ生體內ニ移入セラレタル「カルチウム」ハ數時間以内ニ體外ニ排泄セラル、ヲ認メタリ。

最近ハ結核ニ對シ「カルチウム」投與ハ幾分ノ良成績ヲ收メ、且ツ時ニ結核病竈ノ石灰化ヲ認ムルトナス追試者多ク、適量以上ノ投與ハ血液「カルチウム」量ヲ増加シテ、遂ニハ Alkalosis ヲ招キテ血液ノ性狀ハ勿論體質ノ變化モ合併ストノ説行ハル、ニ至レリ。

石灰ノ組織沈着ハ必ズ常ニ其細胞及ビ纖維ノ多少ノ退行變性ヲ前提トシ、又血液ニ石灰鹽増加

スル際出現スルモノニテ動脈硬化症ニ於テハ其動脈壁ノ退化變性ニ次ギ二次的ニ石灰沈着ヲ來タスハ論及スル迄モナシ。

Loeper, Lissaner, v. Hansemann, Bover 氏等ハ石灰ノ豊富ナル體內輸入ニヨリ著明ニ動脈硬化症ノ發現シ。石灰含有豊富ナル食物ヲ攝ル馬。牛。家兎ハ然ラザル動物即チ犬。猫ヨリ動脈硬化症ニ對シ大ナル素因ヲ有ストセリ。余モ亦「アドレナリン」ニヨリ動脈壁ニ病變ヲ起サシメ。加フルニ「カルチウム」ヲ應用スルコトニヨリ石灰沈着ヲ促進セシムルコトナキヤノ意圖ノ下ニ本實驗ヲ行ヘリ。

使用セル「カルチウムサンド」ハ葡萄糖ノ酸性成績體タル「グリコン酸カルチウム」ナリ。

第 二 章

實 驗 要 目

第一節 實驗材料及ビ實驗方法

2kg内外ノ家兎ヲ撰ビ。早朝空腹時ニ少量ノ豆腐粕ニ「カルチウムサンド」0.2gヲ混和シテ食べ終リテ後普通ニ食事ヲ與ヘ。同時ニ「アドレナリン」ヲ頸部皮下ニ 0.5cc 宛連續的ニ注射

セリ。

第二節 標本製作及ビ染色法

第1編ニ記述セルト同様ナレバ略ス。

第 三 章

實 驗 成 績

第一節 臨牀の經過

動物ハ孰レモ元氣ニ經過シ。「アドレナリン」ノ注射直後ヲ除ケバ。一般的ニ食欲。運動其他他覺的ニ病的ナルトコロナク。體重ハ一進一退アルモ絶對的ニハ増加ス。

廻轉後眼球震盪ハ生體固定時ニ於テ廻轉數ニモ繼續時間モ減少ヲ來タセリ。

第二節 病理解剖學の所見

第一項 肉眼的の所見

大動脈ニ於テ肉眼的ニ硬化症ヲ示スモノナク。聽器ニ於テ外耳ニ耳聾(2號)。或ハ外。中耳ニ膿性滲出物アリ。尚ホ皮下脂肪甚ダ豊富ナルモノアリキ(3號)。

今臨牀の經過及ビ大動脈ノ變化ノ有無ヲ表示スレバ次表ノ如シ。

第 11 表
(アドレナリン・カルチウム併用試験)

家 兔 番 號	性	試驗 期間	Adrenalin 注射總量	Kalcium 投與總量	體 重		固定 時法	迴 轉 後 眼 震				大動脈ノ 肉 眼 的 所 見
					試驗前	固定時		試 驗 前		固 定 時		
								右	左	右	左	
AK. 1	♀	174日	40.0cc (1回0.5宛)	14.4g (1回0.2g宛)	1800	2820	生體	15/12	17/11	6/5.5	10/6.5	正 常
2	♂	175	50.0	20.6	1950	2930	同上	13/ 9	13/ 8	11/ 8	7/ 7	同 上
3	♂	176	48.5	22.8	2100	2670	同上	13/ 5	20/13	5/ 5	9/ 7	同 上
4	♀	176	48.0	22.8	2050	2870	同上	30/22	17/10	27/20	9/ 7	同 上

第二項 組織學の所見

個々ノ家兎ノ所見ハ第12表ニ記録ス。

第12表 「アドレナリン」及「カルチウム」併用ニヨル家兎聽器ノ組織學的所見

動物番號・性		家 兎 A.K. 1 ♀	
外 聽 道	腔	表皮類廢物ナ有ス	
	被 膜	表層ニハ多核白血球及ビ少數ノ「エオジン」嗜好細胞散在性ニ存ス。皮下組織ニハ單核白血球。淋巴球及ビ「プラスマ」細胞ノ浸潤アリ	
	骨 壁	異常ナシ	
	鼓 膜	異常ナシ	
中 耳	鼓 室 腔	清 澄	
	粘 膜	部分的ニ粘膜下組織肥厚シテ少數ノ造結締細胞。「プラスマ」細胞存ス	
	骨 壁	正 常	
	圓 靱 帶	正 常	
	小聽骨及筋	兩者共ニ異常ナシ	
外. 中 耳 血 管		血管壁ニ異常ナシ	
内 耳	骨 性 迷 路		骨質内血管壁少シク濃染シ肥厚セルガ如シ
	膜 様 迷 路	淋巴腔	清 澄
		蝸 牛	聴毛細胞ハ總テ消失シ。コルチ氏弓ヲ認ムル能ハズ。他ノ支持細胞ト共ニ低丘狀ノ構造ナキ組織塊ト化シ。外溝細胞ハ形原質消失シテ空虚ノ感アリ。内溝細胞モ殆ンド湮滅シ一ニ核ハ遺殘ニヨリ辛ウジテ其存在ヲ知ルコトヲ得。隧道ハ僅カニ線跡ヲ留メ外腔道マエル氏腔ハ消失ス。基礎膜ハ構造不明其血管ナシ。其被覆細胞核僅カニ認メラル。コルチ膜ハ萎縮シテ細長トナリテコルチ弓上ニ癒着ス
		コルチ器	
		ラ氏膜	緊張ス
	靜 定 迷 路	螺旋靱帶・脈絡帶	脈絡帶上皮細胞ハ潤濁シテ構造分明ナラズ。上皮層ノ高サヲ減ジ血管ハ狹小或ハ消失ス。靱帶ハ著變ナシ
		淋巴腔	空 白
	聽 神 經	斑 痣	神經上皮ノ排列ハ細胞萎縮スルタメ不整トナリ。原形質ハ潤濁シ核共ニ崩壞セントスルモノアリ。纖毛及ビ耳石膜ハ融合シテ濃厚ナル無構造ノ層トナレリ
		聽 橋	神經上皮細胞ハ萎縮シテ上皮層ノ高サヲ減ジ細胞境界ハ不明。將ニ崩壞ニ瀕セルモノアリ「クブラ」ハ短小同質性トナリ濃染ス。基質及ビ上皮下ニハ淋巴腔ヲ作ル (Fig. 21)
		節細胞	細胞ハ萎縮シテ空隙ヲ繞ラシ原形質ハ潤濁シテ顆粒ヲ辨ジ得ズ。核ハ尙ホ構造認メラル
		神經纖維	染色ハワイゲルトパール 髓鞘染色法ニヨリ不良ニシテ髓鞘蜂窠ノ構造及ビ纖維ノ側縁銳利ナラザルモ大サハ平等ナリ
大 動 脈	前庭神經	節細胞	二三ノ細胞ハ收縮シ顆粒ハ核ノ周圍ニ集合シテ胞體周邊部ハ不鮮明トナレルモノアレド大多數ハ著變ヲ見ズ (Fig. 19)
		神經纖維	大部分ハ著變ナキモ少數ノ纖維ノ側縁不正トナリ或ハ暈ケテ崩壞セントス
	血 管		内聽道血管壁僅ニ肥厚ス
顔 面 神 經		著變ナシ	
大 動 脈		著變ナシ	

家 兎 A.K. 2 ♂	家 兎 A.K. 3 ♂
表皮類廢物ノ少量ヲ有ス	表皮類廢物及ビ雲絮物質ヲ少量存ス
皮下組織ニハ少量ノ細胞浸潤ヲ見ル	所々「エオジン」嗜好細胞游走シ、毛細管ニ血球ヲ入ル、モノアリ
異常ナシ	正 常
外聽道面ニ汚物ヲ附着ス	正 常
清 澄	空 虛
正 常	肥厚セズ。毛細管ニ血球ヲ充タスモノ存ス
正 常	異常ヲ認メズ
正 常	正 常
正 常	正 常
血管壁ニ異狀ヲ認メズ	變化ヲ見ズ
著變ナシ	著變ナシ
前庭道ニ雲絮樣物質アリ	空 白
聽毛細胞少シク潤濁シ核共ニ濃染ス。桿細胞、 <u>グイテル・ヘンゼン</u> <u>クラウザウス</u> 各細胞及ビ内外溝細胞ニ異常ナク、各腔道又正形 ヲ保持ス。基礎膜、其血管及ビ <u>コルチ</u> 膜ニモ異變ナシ (Fig. 22)	著變ヲ呈セズ。基礎膜血管亦正常
前庭面ニ雲絮樣物質ノ存スル外變化ナシ	正 常
正 常 (Fig.)	正 常
清 澄	清 澄
神經上皮細胞ノ稍々收縮シテ濃染スルモノアリ	著變ナシ
輕度ニ收縮シ周圍ニ空隙ヲ有スル上皮細胞アレド著變ナシ	著變ナシ
著變ナク僅カニ原形質潤濁スルモノアリ	四五ノ細胞ハ強ク收縮シテ周圍ニ空隙ニ作 リ胞體全體ガ染色不良ニシテ外廓モ明確ヲ 缺ケド核ハ内容ヨク認メラル
著變ナシ	著變ナシ
著變ヲ見ザルモ核周圍ニ異常ニ顆粒凝集スルモノアリ	中ニハ細胞ノ可ナリ縮小シテ基質トノ間ニ 空隙ヲ生ジ不正形トナリ、染色不良淡染シ テ且ツ顆粒ヲ認メ難キモノアリ
變化ナシ	著變ナシ
血管壁ニ異常ナシ	異常ヲ見ズ
正 常	不 明
中膜彈力纖維ノ走行稍々不整ナルモノアリ。筋細胞ハ萎縮 シ、核ハ濃染シテ、其周圍ニ透明帶ヲ作ル	著變ナシ

動物番號・性			家 兎 A.K. 4 ♀	
外 聽 道	腔		表皮頰廢物及ビ少量ノ膿性滲出物ナ有ス	
	被 膜		血管充血シ圓形細胞浸潤ヲ見ル	
	骨 壁		異常ナシ	
鼓 膜			ヨク緊張ス	
中 耳	鼓 室 腔		空 虚	
	粘 膜		正 常	
	骨 壁		正 常	
	圓 靱 帶		正 常	
	小聽骨及筋		正 常	
外、中耳血管			血管壁ニ肥厚ナシ	
内 樣 迷 路	骨性迷路		著變ナシ	
	膜 牛 樣 迷 路	淋巴腔	空 白	
		コ ル チ 器	聽毛細胞ハ全ク消失シ桿細胞ヲ始メ支持細胞ハ核ヲ散在性ニ有スル境界不明ナル低丘狀組織塊ニ融合シ、螺旋道ハ基礎廻轉ニ於テノミ存シ内溝細胞モ萎縮シテ高サヲ減ジ境界不明、核亂雜ニ存ス。基礎膜モ狭小トナリ同質性ニ「ヘマトキシリン・エオザン」染色ニテ紫藍色ニ染マリ鼓室道被覆細胞モ正ニ消失セントス。コルチ膜ハ萎縮シテ狭細小帶トナリ尖端ハコルチ弓ニ癒着ス。基礎膜血管消失ス	
		ラ氏膜	細胞ハ萎縮シテ核ハ濃染縮小シ膜ハ菲薄トナル	
		螺旋靱帶、脈絡帶	脈絡帶上皮層ハ萎縮ノタメ高サヲ減ジ細胞境界不明、核モ濃縮ス。血管ハ大部分消失シ或ハ痕跡ヲ留ムルノミ。靱帶異常ナシ	
		淋巴腔	空 白	
	靜 定 迷 路	聽 斑	神經上皮層ハ全體トシテ萎縮シ各細胞原形質ハ同質性トナリテ境界ナク核ハ染色不良又ハ縮小シ纖毛亦濃縮シテ無構造ナル膜樣組織トナル	
		聽 櫛	聽斑ト略々變化ヲ同ジウス	
	耳 神 經	端牛器節細胞	僅カニ縮收シ原形質極ク輕度ニ潤濁スレドモ核ハ鮮明ニシテ著變ナシ	
		神經纖維	全經過ヲ通ジ髓鞘ハ萎縮シテ幅ヲ失ヒ兩側縁不著明ニシテ劇然タラズ髓鞘蜂窠像モ崩壞セリ。殊ニ骨軸ヨリ末梢部ハ全ク髓鞘ヲ失ヒタリ (Fig. 28)	
		前庭神經節細胞	著變ナク顆粒ヨク認メラル	
		神經纖維	髓鞘ハ太サヲ減ジ染色亦不良。蟲喰狀ニ側縁不正ナルコロアリ	
	血 管			血管壁ニ肥厚ヲ見ズ
顔 面 神 經			不 明	
大 動 脈			著變ナシ	

第三項 組織學的所見總括

家兎4例ノ組織學的所見ヲ總括セバ次ノ如シ。

外聽道：孰レモ表皮類廢物又ハ汚物ヲ介在シ、或ハ少量ノ膿性滲出物存スルモノアリ（4號）。被膜ハ總テ圓形細胞浸潤ヲ蒙ムリ。又血管内ハ血球充實ス。

外聽道骨膜。骨質ニ異常ヲ來タサズ。

鼓膜：正常ニシテ炎症浸潤ヲ認メズ。

中耳：鼓室腔ハ空虚清澄ナリ。

粘膜ハ孰レモ病的所見ヲ示ササルモ、中ニ部分的ニ粘膜下組織肥厚シ、少許ノ造結締織細胞及ビ「プラスマ」細胞ノ游走セルトコロアリ。

骨膜：骨壁正常ナリ。

其他圓韌帶、小聽骨及ビ筋ニ異變ナク、外、中耳ノ血管壁ノ肥厚又硝子樣變性ヲ見ルモノナシ。

内耳：骨性迷路ハ骨膜、骨質共ニ異常ヲ見ズ。

正圓窓膜モ正常ナリ。

蝸牛殼内外淋巴腔ハ唯ダ2號前庭道ニ雲絮樣物質ヲ有スル外異變ナシ。

靜定迷路淋巴腔ハ清澄ナリ。

コルチ器：半數ハ聽毛細胞原形質溷濁シ、核濃染スル外著變ナケレ共（2,3號）。他半數ハ聽毛細胞ハ勿論支持細胞モ亦萎縮シテ無構造ナル低丘狀ノ組織塊ト化シ、墜道腔消失シ、内外螺旋溝細胞モ萎縮シテ辛ジテ核ノ遺存ニヨリ其存在ヲ認知スルノミニテ、基礎膜モ濃染菲薄トナリテ構造ヲ識別シ得ズ。鼓室道被覆細胞僅カニ存ス。螺旋血管孰レモ消失セリ。コルチ膜モ萎縮シテ細小トナリ。コルチ弓ニ癒着ス（1,4號）。而シテ4號ハ前庭膜ハ萎縮シ核ハ濃縮セリ。

脈絡帶：コルチ器萎縮セル1及4號ハ上皮層細胞萎縮ノ爲メ高サヲ減ジ、各細胞ノ境界ハ不明瞭トナリ、原形質ハ一様ニ溷濁シ、核ハ不正形ニテ染色不良、血管腔ハ消失或ハ扁平細小トナル。

螺旋韌帶：1號上方迴轉ノミ纖維亂散シ鬆粗トナル外他ハ總テ正常ナリ。

聽斑、聽櫛：1及4號ニ於テハ聽斑、聽櫛共ニ神經上皮層ハ萎縮シテ高サヲ減ジ、各細胞ハ境界不明瞭、核モ染色不良トナリ或ハ萎縮シテ不正形化シ、殊ニ聽櫛天頂部細胞核ハ濃染シテ構造明ナラズ、細胞間ニ間腔ヲ出來セリ。「クブラ」ハ短小、同質性ニ濃染シテ線狀ハ消失シ、聽斑纖毛及ビ耳石膜モ同質性ニ濃染萎縮シ上皮層ヲ蔽ヘリ。

螺旋神經節細胞：4例共大差ナク、少シク細胞收縮シテ基質トノ間ニ空隙ヲ生ジ、原形質ハ輕度ニ溷濁シテ構造ノ明視ハ不可能ナレ共核内容ハ鮮明ナリ。

他側摘出聽神經ノ「トルイデン・ブラウ」染色ニヨルニ節細胞ハ輕度ニ收縮シ、原形質ハ雲絮樣又ハ凝塊トナリテ境界鮮明ナラズ、核内容淡染シテ核小體膨大セルモノ（1號）、核ハ暗染シ核小體濃染スルモノ又胞體外廓不鮮明ナルモノアリ（4號）。3號ハ細胞收縮甚ダ輕度ナルモ原形質ハ量ケテ微細顆粒又ハ泡沫狀顆粒存シ核外廓モ不鮮明且ツ顆粒ニ充チ、核小體、内容モ不明瞭ナリ。

前庭節細胞：原形質ハ顆粒ヲ認メズ無構造ニシテ染色不良ナルモノアリ（3號）。他ハ顆粒ノ排列稍ニ不正ナルノミニテ著變ヲ見ズ。

之ヲ他側細節胞ノ「トルイデン・ブラウ」染色ニ由レルモノニ比スルニ孰レモ末梢ニ粗大ナル顆

粒ヲ排列シ。核構造モ明カナリ。唯ダ3號ニ於テ原形質ハ微細顆粒狀又同質性ニ染色ス。

蝸牛殻神經纖維：髓鞘ハ染色不同蜂窠狀構造ヲ明ニセズ。且ツ側縁ハ不鮮明ニテ整然タラズ。且ツ太サヲ減ゼルモノアリ(1及4號)。2及3號ハ著變ナシ。

前庭神經纖維：1及4號ニ於テ兩側縁不正トナリ疊ケテ正ニ崩壞セントスルガ如キ像ヲ呈ス。殊ニ4號ハ細小トナリ染色不良。側縁ハ蟲喰狀ヲ呈ス。

內聽道血管及ビ內耳血管：1號ニ於テ內聽道血管壁ノ少シク肥厚スルヲ見ル外。他ノモノニ變化ナシ。

顔面神經：著變ナシ。但シ3—4號ハ不明ナリ。

大動脈：著變ナケレドモ、2號ハ中膜彈力纖維ノ走行稍ミ不整ナルモノアリ。筋細胞ハ萎縮シ。核濃染シ。細胞周圍ニ透明層ヲ作ル。

以上ヲ總括スルニ實驗家兎4例共大動脈ニ變化ノ著シキモノナク。聽器ニ來タレル變化モ內耳殊ニコルチ器及ビ蝸牛殻神經成分ニ限局シ。半數ニ於テハ斯カル局所ノ病的所見モ惹起スルトナシ。而シテ「アドレナリン」ノ注射總量ハ1號ニ於テ小量ナル外ハ注射量ニ於テモ試驗日數ニ於テモ略ミ同一ナリ。

第五編 「バリウム」反復注射ニヨル聽器變化ノ 病理組織學的研究

第一章

「バリウム」ニ就キテ

硫酸「バリウム」ハ不溶解性ニテ。之ヲ粥狀トナシX線用造影劑トシテ應用セラルハ一般周知ニシテ論ズル迄モナシ。反之「可溶性バリウム」ハ猛毒性ニテ局所刺戟ノ外。一般ニ平滑筋ヲ冒シ。血行器ニ對シテハ作用「デギタリス」ニ類似シ。心臟及ビ血管壁ノ筋ヲ刺戟シテ血壓ヲ亢進セシメ。胃腸ノ筋肉ニ作用シテ痙攣性收縮ヲ惹起シ。中樞神經ニ働キテハ痙攣ヲ喚起シ。最後ニハ隨意筋ヲ障礙スルニ至ル。爲メニ急性中毒症狀トシテハ惡心嘔吐。下痢。眩暈搖蕩。痙攣。頸部絞痛感。耳鳴。視力障礙。心悸亢進。血壓上昇等ヲ來タシ。「アドレナリン」ト同様反復注射ニヨリ血管壁ニ硬化症ヲ合併スルハ今博

士等ニヨリテ實驗セラルハトコロナリ。

第二章

實驗要目

第一節 實驗材料及ビ方法

2kg内外ノ家兎ヲ撰ビ。鹽化「バリウム」ノ1%溶液ヲ作製シ。1回注射量トシテハ1—2.0ccヲ連續的ニ或ハ一二日ノ間隔ヲ置キ靜脈内ニ注射ス。其他ノ飼養方法ハ第1編ニ記述セルト全く同様ナリ。實驗頭數6。

第二節 標本製作及ビ染色

第1編ニ準ズ。

第三章

實驗成績

第一節 臨牀的經過

注射直後ニハ足ヲ後方ニ伸展シ、腹臥位ヲトリ、眼瞼ヲ閉ジテ呼吸淺表急速トナリ躊躇スレド半時間後ニハ恢復ス。尙ホ2—4號ハ180日餘ノ試験ノ後注射後特發的ニ不繼、跳躍シテ悶死シ、1號ハ1ヶ月足ラズシテ同様死ヲ遂グ。注射ハ可及的ニ長生セシムル爲メ動物元氣阻喪セル時ハ中止シ、元氣旺盛ニ恢復スルヲ待テタル爲メ、一般的ニ全經過ヲ通ジテ甚ダシキ羸瘦衰弱セシコトナクレドモ、試験永キニ亘リテ時

ニ少シク下痢ヲ伴ヘルモノアリ(1及5號)。又毛髮ハ艶ヲ失ヒ束ヲナシテ存ス。體重ハ絶對的ニ増加スルモノ、減量スルモノアリ。

廻轉後眼球震盪ニハ見ルベキ成績ヲ得ズ。斯クシテ生體固定ヲ遂行シ得タルモノ2例、他ハ悶死スル瞬間斷頭セルモノナリ。

第二節 病理解剖學の所見

第一項 肉眼的所見

外、中耳ニ變化ナク、大動脈ニハ6例ノ中2例、即チ3號ハ大動脈弓部ニ二三ヶ所ノ粟粒大ノ硬變部、4號ハ胸部大動脈ニ米粒大ノモノ硬變存シ、他ノ家兎ハ肉眼的ニハ變化ナシ。臨牀的ノ大略經過ハ第13表ノ如シ。

第 13 表
(Barium Chlorid 注射實驗)

家 兎 番 號	性	試驗 期間	注射 回数	注射 總量	體 重		固定法	廻 轉 後 眼 震				大 動 脈 ノ 肉 眼 的 所 見
					試驗前	終了時		試 驗 前		固 定 時		
								右	左	右	左	
B. 1	♀	26日	10	0.2	2160	2270	斷 頭	9/ 8	15/10	20/10	10/ 5	正 常
2	♀	183	100	1.78	3950	4330	同 上	9/7.5	9/ 8			同 上
3	♂	66	27	0.31	2250	2450	斃 死	13/ 8	13/ 9			大動脈弓部ニ粟粒大ノ硬變二三アリ
4	♂	182	72	1.31	2360	2800	斷 頭	11/10	9/ 8			胸部大動脈ニ米粒大ノ硬變部存ス
5	♂	25	20	0.2	2700	2820	生 體	14/9.2	20/14	15/ 9	15/ 8	正 常
6	♂	109	85	0.85	2640	3500	正 常	10/ 5	6/ 5	7/ 5	7/ 6	正 常

註。注射液ハ1%鹽化「バリウム」ニテ1回注射ハ初メ其1cc、後ニ2ccヲ用ヒ、初メヨリ2ccヲ用ヒタルモノアリ。
斷頭固定ノ固定時廻轉後眼震成績ハ死去前數日ノモノナリ。

第二項 組織學の所見

死後變化多キヲ以テ除外ス。

實驗家兎6例ノ中記録セルハ4例ニシテ他ハ

第14表 「バリウム」反復注射ニヨル家兎聽器ノ組織學的所見

動物番號・性		家 兎 B. 1 ♀	
外 聽 道	腔	空 虚	
	被 膜	變化ナシ	
	骨 壁	ハーベル氏管ニ赤血球ヲ充實スル外變化ナシ	
鼓 膜		正 常	
中 耳	鼓 室 腔	少量ノ血液ヲ有ス	
	粘 膜	異常ナシ	
	骨 壁	ハーベル氏管ニ赤血球ヲ充實ス	
	圓 靱 帶	正 常	
小聽骨及筋		正 常	
外、中耳血管		血管壁ノ肥厚セルモノナシ	
内 耳	骨性迷路	骨膜、骨質ニ異常ヲ呈スルモノナク、ハーベル氏管内血管ニ血液ヲ充ツ	
	淋巴腔	空 白	
	蝸牛器	内聽毛細胞ノ少許濁濁濃染スル外著變ナシ	
	ラ氏膜	正 常	
	螺旋靱帶、脈絡帶	正 常	
	淋巴腔	空 虚	
	前庭聽斑	著變ナシ	
	聽 櫛	神經上皮ノ排列亂レ各細胞ハ濃縮シテ間隙ヲ圍繞スルモノアリ「プラスマ」球ノ析出多シ	
	蝸牛節細胞	僅カニ收縮シテ胞體不正トナリ原形質ハ濁濁シテ核モ亦縮小シ同質性ニ濃染スルガ如キモ仔細ニ見レバ染色質、核小體尙ホ識別サル	
	神經纖維	ビルシヨースキー染色ニテハ著變ナシ	
	前庭節細胞	細胞縮小シ一體ニ濃染濁濁シ、核モ濃縮ス	
	神經纖維	ビルシヨースキー染色ニテ著變ナシ	
血 管		異常ナシ	
顔 面 神 經		ビルシヨースキー染色ニテ著變ナシ	
大 動 脈		變化ナシ	

家 兎 B. 2 ♀
血性膿性滲出物存ス
所々圓形細胞ノ浸潤アリ殊ニ皮下組織ニハ白血球細胞ノ集簇アリ。血管ハ血液ヲ充ツ。又出血セル所アリ
骨質内血管ニ血液ヲ入ル、外變化ナシ
圓形細胞浸潤ノタメ肥厚シ血管ハ血液ヲ入ル。鼓室面ニハ血液及ビ雲絮樣物質附着ス
血液及ビ膿性滲出物アリ。一部ハ新生結締組織化ス
圓形細胞浸潤ヲ被ムリ肥厚或ハ浮腫狀ヲ呈ス
骨膜ハ炎症浸潤ヲ受ケ肥厚ス
正 常
馬鐙骨筋束間ニ圓形細胞浸潤アリ。馬鐙骨々膜及ビ粘膜ハ圓形細胞浸潤アリ
血管壁ニ異變ナシ
骨質内毛細血管ニ血液ヲ充填ス。内聽道ニ出血及ビ圓形細胞浸潤アリ
基礎廻轉鼓室道壁ニ溢血アリ
内外聽毛細胞ハ潤濁シ内桿細胞ハ崩壊ス。外聽道ニ接スル <u>ヘンセン</u> 氏細胞ガ1個ダケ濃染ス。其他ノ支持細胞ニハ著變ヲ見ズ。内溝細胞ハ排列大イニ亂レ或モノハ上方ニ翻轉シ。其跡ハ空虚ナレド。核ニハ異常ヲ認メズ。腔道ニハ雲絮樣物質。「プラスマ」球アリ。基礎膜ハ著變ナシ
前庭面ニ淋巴球及ビ「プラスマ」球ノ析出アリ
正 常
空 白
上皮細胞ハ甚ダシク收縮シテ排列亂レ細胞間々隙ヲ生ジ。細胞ハ濃染ス
上皮細胞ハ基底ヨリ游離シテ排列ハ細胞濃縮ノタメ不整トナリ。原形質核共ニ濃縮シ表面ニハ「プラスマ」球ノ出現多シ
細胞ハ僅カニ縮小シ染色不良。原形質ハ潤濁ス。一二ノ細胞ハ濃染シ殊ニ核ハ過染度大ナリ
髓鞘ハ紡錘狀。連珠狀ニ膨大或ハ絞扼ス
一二ノ細胞濃染スルモノアレド著變ナシ
紡錘狀ニ髓鞘膨大スル所アレド輕度ナリ
血管壁ニ肥厚ヲ現ハサズ
髓鞘横斷面所見ニテ大イニ膨大セルモノアリ
中膜内層ノ數條ノ彈力纖維ハ膨脹弛緩シ或ハ斷裂シ纖維間ニ間隙ヲ作ル所アリ。或ハ相密接スル所アリ。此部ノ彈力纖維間ニハ「ヘマトキシリンエオジン」染色ニテ淡青色無構造ニ染マル筋細胞ノ變化。或ハ濃染スル筋細胞ヲ見ル。彈力纖維ハ粗波狀トナル他ノ部ニ於テハ Purpurin 石灰沈着證明法ニヨリ中膜ノ一部ニ深紅色沈着ヲ見タリ

動物番號・性		家 兎 B. 5 ♂	家 兎 B. 6 ♂
外 聽 道	腔	空 虛	血液及ビ少量膿性滲出物アリ
	被 膜	異常ナシ	溢血及ビ圓形細胞浸潤アリ
	骨 壁	異常ナシ	正 常
鼓 膜		ヨク緊張ス	正 常
中 耳	鼓 室 腔	空 白	馬鐙骨脚ノ兩脚間ニ漿液性滲出物ト共ニ脂肪顆粒ノ如キ顆粒ヲ含メル組織球樣細胞アリ
	粘 膜	正 常	粘膜ハ圓形細胞浸潤ヲ蒙ル
	骨 壁	正 常	異常ナシ
	圓 靱 帶	正 常	異常ナシ
	小聽骨及筋	正 常	小聽骨粘膜ハ炎症浸潤ヲ輕度ニ見ル
外. 中耳血管		血管壁ニ異常ヲ見ズ	血管壁ニ異常ナシ
内 耳	骨性迷路		著變ナシ
	膜 牛 樣 迷 路	淋巴腔	空 白
		コ ル チ 器	内外聽毛細胞ヲ初メ其他總テノ支持細胞ハ相融合シテ扁平ナル無構造ノ低丘狀ノ組織丘トナリ。内溝細胞モ萎縮シ。原形質稀薄。核偏在乃至消失ス。隧道ハ基礎迴轉ニ於テノミ辛ウジテ認めラル。基礎膜ハ濃染シ構造不明。鼓室道被覆細胞核ハ極ク細小トナリ正ニ消失セントス。コルチ膜ハ萎縮シテ線狀斑樣ヲ見ズ細小トナリコルチ弓ニ密着ス基礎膜血管消失ス
		ラ氏膜	細胞萎縮ス
		螺旋靱帶 脈絡帶	脈絡帶上皮細胞ハ萎縮シテ原形質空洞。境界不明。核ハ縮小濃染シ上皮層ハ低小トナル。血管壁ハ狭小トナル
		淋巴腔	清 澄
	迷 路	聽 斑	著變ナシ
		聽 櫛	著變ナシ
		聽 節細胞	輕度ニ收縮シ胞體空洞中ニハ一二濃染スルモノアリ (Fig. 25)
	神 經	神經纖維	髓鞘ハ染色良カラズ蜂窠像モ鮮明ヲ缺キ側緣亦銳利ナラザレ共變化ハ大ナラズ
		前庭神經節細胞	一二ノ細胞萎縮スルモノアレ共大多數ハ正常 (Fig. 26)
		神經纖維	蝸牛殼神經纖維ト同様ナリ
	血 管		血管壁ニ異常ナシ
顔 面 神 經		不 明	正 常
大 動 脈		異常ナシ	著變ナシ

第三項 組織學的所見總括

外聽道：半數例＝ハ腔内＝血液及ビ膿性滲出物、或ハ表皮頰廢物ヲ存ス（2, 6號）。

被膜＝ハ出血及ビ圓形浸潤認メラル、モノアリ（2, 6號）。

骨膜、骨質＝ハハーベル氏管内＝血球ヲ入ル、モノアリ（1, 2號）。

鼓膜：2號ハ圓形細胞浸潤ヲ蒙リテ肥厚シ、其他＝異常ナシ。

中耳：鼓室腔＝血液ヲ小量存スルモノ（1號）、之＝多量ノ濃液ヲ加ヘ且ツ又其一部ハ結構織ノ新生ヲ見ル＝至リ（2號）、6號ハ卵圓窓窩＝漿液性滲出物ヲ充填シテ馬鐙骨脚間腔マデ浸漬シ、原形質大ニテ顆粒ヲ含メルガ如キ組織球樣細胞介在ス。粘膜ノ圓形細胞浸潤ヲ蒙ムリテ甚ダシク浮腫狀＝肥厚セルモノ（2號）、輕度ノ圓形細胞浸潤ヲ見ルモノアリ（6號）。

中耳骨膜ハ2號＝於テ炎症ノ爲メ細胞浸潤アリテ肥厚ス。其他＝ハ變化ナク、骨質＝ハハーベル氏管内＝血球ヲ入レルモノ、ハ外變化ナシ。

圓韌帶＝ハ異常ナク、聽小骨及ビ筋ハ2號＝於テ馬鐙骨骨膜及ビ粘膜ハ圓形細胞浸潤アリテ肥厚シ、馬鐙骨筋内＝モ細胞浸潤ヲ見ル。

外、中耳血管：動脈壁＝異常アルモノナシ。

内耳：骨性迷路ハ骨膜、骨質共＝異變ナク、唯ダハーベル氏管＝血球ヲ入ル、モノアリ（1, 2號）。

蝸牛殻内外淋巴腔：基礎迴轉道壁＝少許ノ血球ノ附着セルモノアリ（2號）。

内聽道＝於テ淋巴球浸潤及ビ血管内血球充實セルモノアリ（2號）。

前庭内外淋巴腔ハ孰レモ清澄ナリ。

コルチ器：聽毛細胞輕度＝潤濁セル外、支持

細胞核ノ偏位スル程度ノ極メテ輕微ナル變化ノ存スルモノ（1, 2, 6號）。更＝コルチ器ハ高度＝萎縮シテ、聽毛細胞、支持細胞ハ相融合シ無構造ナル組織塊ト化シ、内外螺旋溝細胞モ萎縮シテ原形質ハ消失乃至縮小シ、核モ消失又ハ偏在シ、基礎膜ハ無構造濃染ス。壓道モ消失シ或ハ痕跡ヲ留メ、螺旋血管消失シ、コルチ膜ハ菲薄細小トナリコルチ弓上＝癒着ス（5號）。螺旋血管ハ他＝於テハヨク存ス。

前庭膜ハ沈降或ハ斷裂シ、コルチ弓＝癒着セルモノ（6號）、或ハ萎縮シテ細胞ハ濃染削瘦スルモノアリ（5號）。他ハ正常。

脈絡帶及ビ螺旋韌帶：脈絡帶上皮層ハ萎縮シテ高サヲ減ジ、各細胞ハ濃縮シテ構造不鮮明ナルモノアリ。血管腔ハ狹小ナル（5號）。他ハ正常。

螺旋韌帶ハ孰レモ變化ヲ見ズ。

聽斑、聽櫛：聽斑ノ變化ヲ見ザルモノハ3例ニシテ（1, 5, 6號）、神經上皮收縮シテ細胞内＝空隙ヲ作ルモノアリ（2號）。聽櫛＝於テモ2號ハ同様ナル變化アレド「クブラ」ハ全ク正常ナリ。他家兎ハ孰レモ著變ナシ。

螺旋神經節細胞：僅カ＝收縮潤濁シ、核モ同質性＝濃染スルモノアリ（1, 2號）。尙ホ核ノ構造鮮明ナルモノアリ（5, 6號）。

前庭神經節細胞：細胞稍＝收縮シ、原形質核共＝輕度＝濃染スルモノアレド（1號）。他ハ正常ナリ。

蝸牛殻神經纖維：2號ハ内聽道幹＝於テ紡錘狀或ハ念珠狀＝膨大シ、時＝ハ斷裂ス。5號ハ骨軸＝於テハ髓鞘染色不良ニシテ蜂巢狀構造ハ消失シ、髓鞘ノ太サモ減ジテ削瘦シ、側縁明確ナラズ。

他ノ家兎ハ正常ナリ。

前庭神經纖維：髓鞘ノ念珠狀ニ輕度ニ膨大セルモノアリ（2號）。又5號ハ髓鞘削瘦シテ染色不良ニ陥リ。蜂巢狀構造ハ鮮明ナラズ。

內耳血管（螺旋血管及ビ脈絡帶血管ヲ除ク）：孰レモ正常ナリ。

顔面神經：横斷面ノ髓鞘染色ニテ太サ不整ニ見ユルモノアリ（2號）。

大動脈：中膜ノ彈力纖維ノ走行ハ波狀ヲ失ヒテ直線狀トナリ。或ハ斷裂セル所アリ。筋細胞ハ萎縮濃染ス（2號）。尙ホ14表ニ記載セザリシ3號ノ大動脈ハ肉眼的ニハ變化ナカリシモ組織學的ニハ彈力纖維及ビ筋細胞ノ萎縮アリ。且又 purpurin 石灰沈着證明法ニヨリテ陽性ノ成

績ヲ示シタリ。

以上ヲ總括スルニ中耳ヨリ內聽道ニ至ル迄聽性炎症ノ進展ヲ見タルハ4例中唯ダノ1例ナリ。但シ固有蝸牛殼廻轉ニハ波及セズ。而シテ大動脈硬化症ヲ見タルハ2例（3及4號）ニシテ。其他組織學的ニ彈力纖維及ビ筋層ノ變化アリテ石灰沈着ヲ證セルモノアリキ（2號）。

3及4號ノ內耳ノ組織學的所見ハ死後或ハ機械的變化大ナリシ爲メ記述セザリシモ孰レモ病的變化ハ僅小ナルガ如ク。2號ニ於テハ之ヲ病的ト斷言スルヲ得ザル如キ程度ノ變化ナレド。肉眼的。組織學的ニモ大動脈正常ナリシ5號ニ於テコルチ器及ビ神經成分ニ高度ノ萎縮ヲ來タセリ。

第六編 鶏卵黃投與ニヨル聽器變化ノ 病理組織學的研究

第 一 章

鶏 卵 黃 ニ 就 キ テ

緒言ニモ述ベタルガ如ク。1909年 Ignatowski 氏ガ鶏卵黃ヲ牛乳ト混ジ家兎ヲ飼養シタルニ孰レモ大動脈ニ人類ニ於ケル硬化症ト最類似スル一定ノ變化ヲ得タリ。即チ初期ノモノニテハ大動脈上部內膜面ニ黃色圓形又ハ不正形ノ扁平隆起アリ。7ヶ月ヲ經テ死亡セルモノハ胸部大動脈ハ全ク屈曲不可能ナル程肥厚シ。其主要ナル變化ハ內膜ノ肥厚ニシテ內膜細胞増生シ且ツ肥大セリ。次デスツッキー氏ハ同ジク卵黃ニヨリ大動脈內膜ニ脂肪滴ヲ含ミ膨大セル細胞ヲ次ニ結締組織ノ増殖セルヲ觀察シ。更ニ氏ハ卵黃中ノ蛋白質及ビ其分解產物ニテ同様ナル試験ヲ行ヒテ陰性ニ終始セルコト。及 エッセルキン氏

ガ卵黃主成分タル「レチチン」ヲ以テ飼育センモ肝臟及ビ大動脈ハ共ニ陰性ノ成績ヲ示セル事實ニヨリ。卵黃ニ因スル上記ノ變化ハ必ずヤ第2成分タル「コレステリン」ニ由來ス可キヲ思ヒ。アニチュコフ及ハラトウ兩氏ハ毎日 0.5—0.8g ノ「純コレステリン」ヲ油ト共ニ與ヘテ家兎ヲ4—8週ニシテ肝臟實質ニ於テ球狀體乃至結晶ヲ證明シ。大動脈及ビ脾臟ニモ同様物質ノ沈着アリ。然カモ爾他各種ノ病變ニ先發スルヲ明確ニセリ。Ignatowski 氏ハ大動脈外ノ變化トシテ肝硬變。脾臟ノ肥大。實質性腎臟炎。副腎肥大ヲ觀察シ。今氏モ血管ノ「アテロマトーゼ」ノ外。心臟機能不全。肝臟ノ類脂肪沈着。

脾臟肥大。腎臟ノ動脈硬化性萎縮。副腎皮質ノ肥大及ビ類脂肪ノ過剩沈着。肺臟ノ動脈内膜及ビ毛細血管内被細胞ニ時トシテ輕キ脂肪沈着アリ。胃腸漿液膜下及ビ筋間結締織ニ脂肪沈着ヲ來タシ。卵巢ノ肥大セルヲ見タリ。

即チ卵黃ノ過剩投與ハ家兎ニ於テハ全身的「アテロマトーゼ」ヲ惹起スルモノニシテ。今鶏卵黃ノ成分ヲ列記セバ次ノ如シ。

水	分	51.0%	
蛋	白	質	16.1%
脂	肪	31.4%	
糖	質	0.5%	

蛋白質ハ主トシテ Vitellin ニシテ。脂肪ハ多量ノ Lecithin 及 Cholesterin ヲ含有シ。1個卵黃ノ Cholesterin 量ハ 0.4—0.5 g ニ該當シ。「コレステリン」ハ中性脂肪ノ存在ノ下ニ吸收佳良ナルヲ以テ卵黃ヲ攝食スル時ハ他ノ類脂肪ノ媒介ニヨリ「コレステリン」ノ吸收ハ一層促進セラルトイフ。尙ホ耳科方面ノ卵黃食試驗ハ中道氏ニヨリ企圖セラレ。外聽道。鼓膜。中耳。更ニ鼓室首部。蝸牛殼骨等ニモ脂肪浸潤ヲ來タシ。5ヶ月以上飼養ノモノニテハ内耳ニモ病變即チコルチ器。蝸牛殼神經成分ノ脂肪沈着及ビ退行性萎縮或ハ崩壊ヲ見タリ。此所見ハ甚ダ老人性難聴ノ病變ト類似シ。且ツ病因ニ至リテモ甚ダ軌ヲ等ウスル點多キヲ指摘セリ。

第 二 章

實 驗 要 目

第一節 實驗材料及ビ方法

家兎ハ 1.5kg 以上ヲ撰ビ。毎朝空腹時ニ卵黃1個ヲ少量ノ豆腐粕ニ混合シ與フレバ喜ンデ食シ。後普通ニ食セシム。斯クテ 125 日間ハ毎日

連續的ニ投與シ。其後生體固定ニ至ル迄一定時日ヲ放置セリ。

第二節 標本製作及ビ染色

第1編ニ準ズ。

第 三 章

實 驗 成 績

第一節 臨牀的經過

一般ニ時日經過ト共ニ體重ヲ増シテ。元氣食慾共ニ旺盛ナリシモ。約5ヶ月以上ヲ經テ恰カモ夏期ニ入ル頃ヨリ孰レモ少シク元氣ヲ喪失シ始メ。運動不活潑ノ傾アリ。毛髮光澤ヲ失ヒ或ハ耳翼ヲ垂レ。體重モ幾分遞減シ。實驗家兎6例中1例ハ斯クシテ斃死セリ。

試驗日數ハ 164—206 日ニテ斃死セルモノヲ除キ孰レモ生體固定ヲ施スヲ得タリ。

廻轉後眼球震盪ハ生體固定時ニナリテモ一定ノ成績ヲ得ズ。區々タリ。

第二節 病理解剖學的所見

第一項 肉眼の所見

生體固定ヲ行ヘルモノハ皮下脂肪甚ダ豐富ナリ。腎臟ニモ被膜下ニ脂肪沈着著シク。肝臟ハ小葉ノ像著明ナリ。尙ホ6號ハ眼球結膜部ニ白色ノ小ナル脂肪樣沈着斑無數ニ存ス。

外。中耳ハ4號ノ片側鼓室腔ニ膿樣物質アリ。他ハ正常。鼓膜ノ稍ニ萎縮性ニ見ユルモノアリ(3號)。

大動脈ハ生體固定ヲ行ヘルモノハ總テ5例共硬化症ヲ起シ。最モ輕度ナル3號ハ大動脈弓部ニ米粒大ノ不透明ナル内腔面ニ膨隆セル硬キモノヲ有シ。以下肋間動脈分岐部ニハ總テ白色ノ硬變斑アリ。腹部大動脈ニモ點狀ニ散在ス。殊ニ4, 5, 6 號ハ其硬變ノ程度ハ強度且ツ廣範ニテ孰

レモ大動脈弓部ハ全周ニ亙リ、腹部ニ下降スル
ニ從ヒ輕度トナルモ、5號ハ腹部、腸骨動脈ニ
至ルマデ殆ンド全周ヲ蔽ヒ、肺及ビ内頸動脈モ

所々ニ硬變ヲ生ゼリ。

以上ノ大略ヲ表示スレバ第 15 表ノ如シ。

第 15 表
(鶏卵黃投與實驗)

家兔 番號	性	試驗 期間	卵黃 投與 數	體 重		固定法	廻 轉 後 眼 震				大動脈ノ肉眼的所見
				試驗前	固定時		試 驗 前		固 定 時		
							右	左	右	左	
1	♀	164日	125ヶ	2250	2960	斃 死	13/10	20/14			不 明
2	♀	206	125	1550	2860	生 體	13/ 8	15/10	14/ 8	12/11	大動脈弓部ニハ非常ニ大ナル硬變斑ヲ作り、肋間動脈分岐部及ビ腸骨動脈分岐部ニモ斑點狀ニ存ス
3	♂	173	125	1500	2420	同 上	13/10	15/11	25/5.2	23/12	大動脈弓部ニ米粒大硬變部五六アリ、肋間動脈分岐部及ビ腹部ニハ點狀ニ存ス
4	♀	187	125	2000	2500	同 上	30/13	20/13	21/11.5	28/14	大動脈弓部ハ硬變全周ニ亙リ、腹部ニ至ル迄ハ大豆大ノ斑點及ビ點狀硬變無數ニ存ス
5	♀	204	125	1650	3170	同 上	10/ 8	15/ 7	4/ 4	25/10	大動脈起始部ヨリ腹部ニ至ル迄全周ニ亙リ一面ニ硬化ス。尙ホ肺、内頸動脈ニモ大ナル斑點狀硬變アリ
6	♀	202	125	1550	2390	同 上	17/15	20/13	34/20	38/21	硬變ハ大動脈弓部、胸部ヲ全ク被ヒ腹部ニ至ル迄斑點狀ニ澤山存シ、腸骨動脈分岐部ニハ又大ナルモノアリ

第二項 組織學の所見

生體固定ヲ行ヘル5例ノ個々ニ就キ詳述スレバ第 16 表ノ如シ。

第三項 組織學の所見總括

外聽道：腔内ニ汚物ヲ有スルモノアリ(3號)。又陳舊ナル膿性滲出物及ビ表皮様物質ヲ充埋スルモノアリ(4號)。

被膜ハ皮下組織ハ肥厚シ、圓形細胞浸潤強ク(4號)。或ハ「エोजン」嗜好細胞ノ游出及ビ小量ノ出血ヲ有スルモノアリ(3號)。

骨膜ハ一部炎症性浸潤ヲ蒙リテ肥厚セルモノアリ(4號)。

鼓膜：炎症性浸潤ヲ蒙リテ肥厚シ、穿孔セルモノアリ(4號)。他ハ正常ナリ。

中 耳：鼓室腔ニ古キ膿性滲出物及ビ角化様壞死物質介在ス(4—5號)。特異ナルハPseudo-xanthomzelle ノ存在ニシテ(4—5號)。殊ニ5號ハ馬鐙骨脚間腔及ビ卵圓窓窩ニ脂肪顆粒ヲ含有スルガ如キ Histiozyten 多數ニ集簇シ、之等ノ細胞ノ中心或ハ少シク偏在セル所ニ結締組織及ビ骨組織ノ新生シテ脚間腔ヲ填メ、此細胞聚落及ビ新生組織中ニハ針狀ノ「コレステリン」結晶無數ニ存ス。但シ4號ハ馬鐙骨脚ト其足板トノ隅角及ビ脚間腔上方ニ小量見ルノミナリ。粘膜ハ少數ノ圓形細胞浸潤アリテ僅カニ浮腫狀ヲ呈スルモノアリ(4,5號)。

骨膜及ビ骨質ハ岬部ニ於テ輕度ノ骨増殖ヲ見ルモノアリ(4號)。他ニハ著變ナシ。

第16表 聾耳實驗ニヨル家兎聽器ノ組織學的所見

動物番號・性		家 兎 卵黃. 2 ♀	家 兎 卵黃. 3 ♂
外 聽 道	腔	空 白	少量ノ表皮類廢物ヲ附ス
	被 膜	細胞浸潤ナシ	「エオジン」嗜好細胞ノ游出及ビ所々ニ少量ノ出血アリ
	骨 壁	正 常	正 常
鼓 膜		正 常	正 常
中 耳	鼓 室 腔	清 澄	空 白
	粘 膜	變化ヲ見ズ	異常ナシ
	骨 壁	異常ナシ	異常ナシ
	圓 靱 帶	異常ナシ	異常ナシ
	小聽骨及筋	異常ナシ	異常ナシ
外. 中 耳 血 管		血管壁ニ異常ナシ	血管壁ニ異常ナシ
内 耳	骨 性 迷 路	著變ナシ	著變ナシ
	淋 巴 腔	空 白	清 澄
	蝸 牛 腔	著變ナシ 基礎膜血管存ス (Fig. 42)	内外聽毛細胞ヲ始メ支持細胞ハ一丸ノ低丘狀無構造ナル組織ト化シ所々ニ核ヲ有ス。隧道ハ基礎廻轉ニ於テノミ存シ然モ扁平網狭トナリ内外溝細胞ハ萎縮シテ原形質ハ稀薄トナリ核ハ偏在ス。コルチ膜モ萎縮シテ第2廻轉以上ニ於テハ内溝細胞上ヨリコルチ弓上ニ至ル間癒着セリ。基礎膜モ萎縮濃染シテ其血管ハ存セズ
	コルチ器		
	ヲ氏膜	ヨク緊張ス	緊張スレド萎縮性ナリ
	螺旋靱帶・脈絡帶	正 常	脈絡帶上皮層ハ低クナリ細胞ハ「エオジン」ニ濃色潤濁シ境界不明基礎廻轉ニ於テハ特ニ血管腔ハ細小或ハ消失ス。靱帶ハ骨膜ニ近キ方稍々鬆粗トナル
	淋 巴 腔	空 白	空 白
	靜 定 迷 路	著變ヲ見ズ	神經上皮ハ萎縮シテ高サヲ減ジ各細胞ハ濃縮シ耳石膜ハ融合濃染シ上皮ヲ蔽フ (Fig. 27)
	聽 櫛	著變ヲ見ズ	神經上皮層細胞萎縮濃染ス
	蝸牛殻細胞	正 常	原形質ハ透明ナラズ構造不鮮明ナレドモ核ハ正常ナリ
	神經纖維	髓鞘ハ染色輕度ニ不良。爲ニ蜂窠像及ビ側縁モ不明瞭ナレド大ナル變化ヲ見ズ	髓鞘ハ輕度ニ萎縮シテ削瘦シテ染色少シク不良蜂窠像及ビ側縁ノ銳利ナラズ朦朧タルモノアリ (Fig. 28, 29)
	前庭神經細胞	無 變 化	無 變 化
耳 神 經	神經纖維	稍々膨大或ハ細小トナル纖維アリ	髓鞘染色ニヨリ蜂窠構造不明瞭ニシテ染色質濃染シ太サ稍々減少ス (Fig.)
	血 管	血管壁ニ異常ナシ	血管壁ニ肥厚スルモノナシ
顔 面 神 經		不 明	正 常
大 動 脈		内膜面ニ肥厚シ大小種々形モ區別ナル中ニハ定型的ノ造結締細胞アリ。彈力纖維ノ走行ハ甚ダシク亂雜ニシテ網狀トナル。中膜ノ筋細胞ハ萎縮シテ纖維間ノ透明ニ近ク薄層トナル所アリ中膜ノ彈力纖維ハ走行不規則又ハ斷切ス	内膜上ニ低丘狀ニ結締組織ノ増殖アリ。種々ノ造結締細胞アリ。結締組織ハ網眼狀ニ發育シ。此網眼ハ單ニ脂肪脫出ニヨルカ空隙トナルモノアリ。此増殖結締組織ノ表面ハ幼弱ナル定型的造結締細胞一二層被覆セリ。中膜ノ筋細胞ハ濃染シ萎縮ニ陥レルモノアリ。彈力纖維ハ肥厚部ニテハ僅カニ發育シ中膜ニテハ排列幾分疎トナル (Fig. 5, 7, 8)

動物番號・性		家 兎 卵黃. 4 ♀	
外 聽 道	腔	陳舊及ビ新鮮ナル膿性滲出物ヲ充盈シ角質ノ如キ汚物ヲ有ス	
	被 膜	表層及ビ皮下ハ圓形細胞主トシテ淋巴球ノ浸潤強ク肥厚ス	
	骨 壁	骨膜ノ一部炎症浸潤ヲ受ケ肥厚ス。骨質ハ正常ナリ	
鼓 膜		圓形細胞浸潤ヲ蒙リテ肥厚シ且ツ穿孔ス	
中 耳	鼓 室 腔	陳舊膿性滲出物ト角質樣汚物ヲ存ス。尙ホ馬鐙骨脚ト足板ト偶角部及ビ兩脚間頭ニ脂肪球ヲ含ムガ如キ「ヒスチオチーテン」ヲ見ル (Fig. 36, 37)	
	粘 膜	圓形細胞浸潤アリ肥厚ス	
	骨 壁	岬部骨壁ニ於テ幼弱ナル骨新生アリテ其表面ハ膿球附着ス	
	圓 靱 帶	正 常	
	小聽骨及筋	圍繞スル粘膜及ビ骨膜ニハ炎症浸潤アリテ肥厚ス。筋束間ニモ細胞浸潤ヲ見ル	
外、中耳血管		血管壁ノ肥厚ナシ	
内 耳	骨性迷路		著變ナシ
	膜 迷 路	淋巴腔	空 白
		蝸 牛 腔	コ ル チ 器
		ラ氏膜	緊 張 ス
		螺旋靱帶、脈絡帶	脈絡帶上皮細胞ハ削瘦シテ高サヲ減ジ原形質潤濁、核濃染ス。血管腔ハ下方廻轉ニテハ尙ホ保存セラル。靱帶ニハ變化ナシ (Fig.)
	靜 定 迷 路	淋巴腔	空 白
		聽 斑	神經上皮ノ排列稍々亂レ其高サ減ジテ各細胞ハ潤濁シ核濃染ス。表面ハ纖毛融合セル無構造ナル層ヲ以テ蔽ハル
		聽 櫛	神經上皮細胞縮小シ周圍ニ空隙ヲ生ズ
	耳 神 經	蝸牛殼節細胞	原形質潤濁シ外廓鮮カナラザルモノアレド核ハ異常ナク大多數ノ細胞ハ正常ナリ
		神經纖維	髓鞘ノ蜂窠構造ハ明瞭ナラズ且ツ髓鞘ノ太サモ少シク減ズレド大ナル變化ナシ
		節細胞	著變ナシ
		神經纖維	著變ナシ
	血 管		血管壁ニ異常ヲ認メズ
顔 面 神 經		著變ナシ	
大 動 脈		内膜ハ結締織ノ肥厚甚ダシク中膜ノ内膜接近層ノ彈力纖維及ビ筋細胞ハ輕度ニ萎縮ス「ブダシ」Ⅱ脂肪染色法ニテハ此肥厚部ハ一杯ニ脂肪ヲ證明シ中膜表層ニモ散在性ニ證明ス (Fig. 6, 9)	

家 兔 卵黄. 5 ♀
清 澄
皮下ニ輕度ノ圓形細胞浸潤ヲ見。淋巴間隙稍々擴大ス
異常ナシ
異常ナシ
卵圓窩高殊ニ馬鐙骨兩脚間ニ於テ非常ニ大ナル原形質ヲ有シ脂肪様顆粒ヲ含ミ小ナル核ヲ有スル組織球ノ群落アリ。此細胞ハ Van-Gison 染色ニテハ淡褐ニ染マル假性「キサントーム」細胞ニシテ此間ニ結締織及骨新生アリ。之等ノ組織ノ至ル所ニ「コレステリン」針狀結晶ヲ認メヌ所々ニ圓形細胞浸潤出血アリ (Fig. 38, 39)
極輕度ニ圓形細胞ノ浸潤ヲ見ル
異常ナシ
關節及ヒ其靱帶ニ異變ヲ見ズ
馬鐙骨脚間ニ上述ノ如キ假性「キサントーム」ヲ見ル
血管壁ノ肥厚セルモノナシ
著變ナシ
内聽道ニ組織球ノ浸潤アリ
コルチ器ハ低丘狀ノ組織塊トナリテ各細胞湮滅ス。從ツテ隧道モ全ク消失ス。內溝細胞ハ基礎廻轉ニ於テハ核ハ偏在スレド尙ホ健全ナリ。然レ共夫レ以上ノ廻轉コテハ萎縮シ或ハ消失ス。コルチ膜ハ萎縮濃染シ無構造細小トナリコルチ弓部ニ癒着セリ。基礎膜モ濃縮シテ鮮明ヲ缺キ其血管消失ス (Fig. 35)
切斷セラレコルチ器或ハ脈絡帶上ニ癒着スルモノ或ハコルチ弓ニ至ル迄片縁附着シテ後對側ニ架スルモノアリ
脈絡帶上皮細胞ハ萎縮シテ高サヲ減ジ各細胞ハ濃縮シテ境界不明。血管ハ消失セリ
空 白
著變ナシ
二三ノ神經上皮細胞收縮シテ不正形濃染スルモノアリ
細胞少シク收縮シ胞體ハ濃染セルモノアリ。ニッスル體孰レモ不規則ニ融合或ハ消失ス (Fig. 31)
髓鞘ハ殊ニ骨軸ヨリ末梢ニ於テ正ニ消失セントシ幅員ナキ網絲ノ如ク其染色モ稍々不平等ナリ (Fig. 33)
ニッスル體ノ少シク不規則ニ集簇ス (Fig. 32)
髓鞘ハ全ク網絲ノ如ク削瘦シ可染物質ノ分布モ良カラズ。走行蛇行狀ノモノアリ (Fig. 34)
内聽道血管壁少シク肥厚セルモノアリ
髓鞘ノ側縁ハ不鮮明ニシテ蜂巢像ハ崩壞シ可染物質ノ分布モ全ク不平等ナリ
内膜ハ全ク結締織化シ肥厚ス

動物番號・性			家 兔 卵 黃. 6 子	
外 聽 道	腔		空 白	
	被 膜		正 常	
	骨 壁		正 常	
鼓 膜			正 常	
中	鼓 室 腔		空 虛	
	粘 膜		肥厚セズ. 圓形細胞浸潤ナシ	
	骨 壁		異常ナシ	
耳	圓 韌 帶		異常ナシ	
	小聽骨及筋		異常ナシ	
外. 中 耳 血 管			血管壁ニ肥厚ヲ見ズ	
内	骨 性 迷 路		著變ナシ	
	膜 樣 迷 路	蝸 牛	淋巴腔	空 白
		蝸 牛	コ ル チ 器	内聽毛細胞ノ濁濁濃染スル外變 化ヲ見ズ. 基礎膜血管存ス (Fig. 43)
		ウ氏膜		正 常
		螺旋韌帶. 脈絡帶		異常ナシ
		靜 淋 巴 腔		空 白
		聽 斑		正 常
		聽 櫛		正 常
		聽 經	蝸 牛 殼 神 經	節細胞
	神 經 纖 維			骨軸ヨリ末梢部ニ於テ髓鞘可染物ノ分布等シカラズ蜂窠像モ不分明ナレドモ大多數ハ幅員モ正常ナリ
	前庭神經		節細胞	著變ナシ
	神 經 纖 維			髓鞘ノ太サ不正ニシテ或ハ削瘦シテ髓鞘ヲ失ハントシ. 又蜂窠像ヲ明視シ得ズ
血 管		血管壁ニ異常ナシ (Fig. 45)		
顔 面 神 經			不 明	
大 動 脈			内膜ノ結締組織増殖アリ	

圓韌帶: 正常。

小聽骨及ビ筋: 上記ノ如ク4—5號ニ於テハ馬鐙骨粘膜及ビ骨膜ニ輕度ノ圓形浸潤ヲ認メ. 馬鐙骨脚ニハ假性「キサントーム」ノ發生アリ(4, 5號)。

筋ハ萎縮シテ筋間結締組織ニハ脂肪顆粒ノ脱出セルガ如キ空胞多數ニ存ス。

外. 中耳血管: 管壁ニ異常アルモノナシ。

内 耳: 骨性迷路ニハ異常ナク. 正圓窓膜モ孰レモ正常ナリ. 内聽道腔ハ5號ニ於テ假性「キサントーム」細胞アリ. 蝸牛殻内外淋巴腔及ビ靜定迷路淋巴腔ハ清澄ナリ。

コルチ器: 聽毛細胞ノ濃濁セル外他ニ異常ナキハ2例(2及6號)ニシテ. 他ノ3例ハ聽毛細胞及ビ支持細胞ハ全ク萎縮シテ低丘狀ノ1組織ト化シ. 壁道ハ消失シ. 内外螺旋溝細胞ハ全ク縮小シテ核. 原形質ヲ失ハントシ. 基礎膜ハ濃染萎縮シテ無構造トナリ. 螺旋血管ハ消失ニ傾キ或ハ全ク湮滅シ. コルチ膜又萎縮シテ菲薄無構造トナリテコルチ弓ニ癒着ス(3, 4, 5號)。

前庭膜ハ緊張ス。

脈絡帶及ビ螺旋韌帶: 脈絡帶上皮層ハ萎縮シテ高サヲ減ジ. 各細胞ハ萎縮且ツ濃染シテ境界不明ナルモノアリ(3, 4, 5號). 血管ハ全ク消失セルモノ(3, 5號). 狹小トナレルモノアリ(4號). 他ハ正常ナリ。

韌帶ハ骨膜ニ接スル部稍ミ鬆粗トナレルモノアリ(3號)。

聽斑, 聽櫛: 神經上皮ハ高サヲ減ジテ各細胞ハ萎縮濃濁シテ. 核濃染シ. 細胞間ニ空隙ヲ作りテ排列稍ミ不整トナリ. 耳石膜ハ濃染シテ融合セルガ如ク層狀ヲ呈ス(4, 5號)。

螺旋節細胞: 原形質濃濁シテ不鮮明ナルモノ

アル外(3, 4, 5號)。細胞ノ變化ハ極メテ輕微ナリ。之ヲ他側摘出ノ「トルイデンプラウ」染色標本ニ於テ見ルニ。細胞收縮シ。核形不明瞭。原形質内ハ濃染シテ顆粒ハ明視可能ナラズ。核内容濃染セル爲メ不明瞭ナリ。又原形質中空胞ヲ有スルモノアリ(2, 4號)。少シク細胞收縮シ原形質ハ微細顆粒狀ト化シ。中ニ二三ノ凝集セル粗大顆粒ヲ有ス。中ニハ細胞ノ一部崩壊セルモノアリ。核ハ淡染シ染色質像ハ明白ニテ核小體ハ不正形ナリ。尙ホ原形質中ニ空胞ヲ生ズルモノヲ見ル(3號)。

以上ノ變化少シク増惡シ。原形質ノ境界多ク明確ナラズシテ崩壊ニ傾キ。或ハ空胞ヲ生ジ。核ハ不正形トナリ。内容ハ同質性ニ溶解シ暗染スルモノアリ(5, 6號)。

前庭節細胞：原形質濁濁シ。其外廓明瞭ヲ缺クモノアリ(3, 4號)。他ハ正常ナリ。

之ヲ「トルイデンプラウ」標本ニ見ルニ原形質内粗大顆粒不規則ニ偏在スルモノアリ(3號)。變化高度ニシテ多數ノ細胞ハ胞體ノ一部崩壊シ核ヲ失ヒ。或ハ朦朧トナリ。細胞ハ顆粒狀ニ崩壊シ。所謂影ノ如クニ變化セルモノアリ(4, 5號)。

又細胞内ニ空胞ヲ生ズルモノアリ(6號)。

蝸牛殻神經纖維：髓鞘ノ染色質ハ染色不良ニテ。側縁ハ銳利ナラズ。蜂巢構造モ明瞭ヲ缺ケ大ナル變化ナシ(2, 3, 4, 6號)。髓鞘萎縮シテ側縁不正。可染物質ノ分布不平等ニテ且ツ太サ

ハ甚ダシク細小トナリ削瘦セルモノアリ(5號)。

前庭神經纖維：少數纖維ノ膨大。絞窄セルモノアリ(2號)。髓鞘ハ萎縮シ染色質ノ分布モ等シカラズ。側縁ハ崩壊シ或ハ全ク髓鞘ヲ失ヒ1本ノ絹纖維ノ如キ狀ヲ呈スルモノアリ(5號)。又髓鞘ハ少シク削瘦シ。蜂巢構造明カナラザルモノアリ(6號)。

内聽道血管(螺旋血管及ヒ脈絡帶血管ヲ除ク)：5號ノ内聽道血管壁極ク輕度ニ肥厚セルモノアリ。

顔面神經：5號ニテハ髓鞘ハ太サ區々ニシテ削瘦シ。可染物質ノ分布平等ナラズ。側縁不鮮明。蜂巢構造亦鮮明ヲ缺ク。

大動脈：内膜ハ孰レモ結締組織ノ増殖アリ。彈力纖維ハ網狀ニ發育シ。此部ニ多量ノ脂肪球ヲ證明ス。

以上ヲ總括スルニ中耳ニ化膿炎症ヲ見ルモノノ2例ナレ共孰レモ内耳ニハ波及セズ。

殊ニ注目スベキハ Histiozyten ノ出現ニテ此細胞ハ一般ニ炎症ニ際シ觀察サルモノニシテ余ノ實驗ニ於テモ「バリウム」實驗家兎ニ1例之ヲ見タリ。然レドモ此鶏卵投與實驗ノ4及5號。殊ニ5號ニ於テハ明カニ Pseudoxanthom フ型リ。且ツ同時ニ結締組織ノ新生ヲ見。且又「コレステリン」ノ結晶存ス。大動脈硬化症ト内耳病變ノ關係ハ3, 4, 5號ハ兩者ノ程度相並行スレド2—6號。殊ニ6號ハ血管ノ變化大ナルニ關ハラズ。コルチ器ノ變化ハ輕度ニ過ギザリキ。

第七編 全 總 括

前述各實驗ノ組織學的所見ニ就キ再ビ重要ナル點ヲ總括セントス。

組織學的ニ檢索ヲ遂ゲタル動物ハ「アドレナリン」實驗ニテハ家兎 19 匹、海猿 14 匹、「ヴィガントール」實驗ニテハ家兎 5 匹、海猿 5 匹、「アドレナリン」及ビ「カルチウム」併用實驗ニ於テハ家兎 4 匹ニシテ鶏卵黃ヲ投與シ實驗ニ供セル家兎ハ 5 匹ナリ。

外聽道：腔内ニ膿性滲出物ヲ有スルモノハ「アドレナリン」實驗家兎 19 例中 10 例（以下家兎 A ナル符號ニテ現ハシ、「ヴィガントール」ハ V、「バリウム」ハ B、AV ハ「アドレナリン」及ビ「ヴィガントール」併用、AK ハ「アドレナリン」及ビ「カルチウム」併用實驗動物ナルヲ示ス）、海猿 A 14 例中 2 例、家兎 V 5 例中 3 例、家兎 AV 2 例中 1 例、家兎 AK 4 例中 1 例、家兎 B 4 例中 2 例、鶏卵黃投與實驗ニ於テハ 5 例中 1 例ナリ。

外聽道周壁ニ圓形細胞浸潤ヲ見ルモノ家兎 A 15 例、海猿 A 2 例、家兎 V 3 例、海猿 V 1 例、AV、AK 群ハ全部、Bニテハ 2 例ニ於テ之ヲ認メ、卵黃群ニテハ 2 例ニ存セリ。即チ大多數ニ於テ外聽道炎症ヲ惹起セルモ特ニ「アドレナリン」ヲ應用セルモノニ於テ甚シ。但シ海猿ニテハ孰レノ場合モ罹患セルモノ多カラズ。外聽道骨質ハ殆ンド全部ニ於テ異狀ナシ。唯ダ家兎 V 4 號及ビ海猿 A 12 號ニ於テハーベル氏管腔擴大シ纖維髓ヲ形成スレド其程度ハ極メテ輕微ナリ。

鼓膜：一般ニ強弱種々ナル波狀ヲ呈シ變化ナキモノ多數ヲ占ム。又圓形細胞浸潤ヲ被ムリ

肥厚セルモノ尠カラズ（家兎 A 9 例、海猿 A 2 例、家兎 V 2 例、B 1 例、卵黃 1 例）。

中耳腔：腔内清澄空虛ナルモノ多クレド膿性滲出物ヲ容ルモノアリ（家兎 A 5 例、家兎 V 2 例、B 1 例、卵黃 1 例）。尙ホ漿液性滲出物ヲ有シ、之ニ組織球樣細胞ヲ混ゼルモノアリ（B 1 號）。

中耳粘膜ノ圓形細胞浸潤ヲ蒙ムルモノ亦多シ（家兎 A 10 例、海猿 A 1 例、家兎 V 2 例、B 2 例、卵黃 2 例）。

特有ナルハ「ヴィガントール」ニヨル 2 例（家兎 V 3, 4 號）ニ於テ其上皮細胞ノ増殖甚シク數層トナリ肥厚ヲ呈スルコトナリ。此粘膜肥厚ハ他ノ實驗ニ於テハ認メラザルトコロナリ（Fig. 44）。

中耳骨壁ニハ殆ンド見ル可キ變化ナシ。

圓靱帶ニハ著變ナシ。

小聽骨及ビ筋ハ大多數ニ於テ變化ナキモ、時ニ骨膜、圓形細胞浸潤或ハ骨瘍ヲ形成セルモノアリ（家兎 V 4 號、家兎 A 8 及 30 號）。筋束間ニ細胞浸潤アリ（家兎 A 10 號、30 號、卵黃 2 號）。或ハ萎縮シテ横紋ノ像著明ナラザルモノアリ。（家兎 A 6, 26 號）。尙ホ卵黃投與實驗ノ 2 例（卵黃 4, 5 號）ニ於テ卵圓窓窩及ビ馬鐙骨脚ト足板ニテ圍繞セラル、間腔ニ假性「キサントーム」細胞ノ集簇シ、且ツ同時ニ新生結締織及ビ骨質ヲ認メ、此新生組織中ニハ針狀ノ「コレステリン」結晶ヲ存ス（Fig. 36, 37, 38, 39.）。

内耳：蝸牛殼骨質ハ大多數ニ於テハ健全ナルモ「アドレナリン」注射ノ長期ニ亙ルモノハ骨板層ノ構造不鮮明、染色不良、骨細胞核ハ

萎縮シ其周圍ニ透明層ヲ作ルモノアリ（家兎 A 26, 28, 30 號）。

正圓窓窩及ビ正圓窓膜：正圓窓窩＝異物ヲ有スルモノナク膜モ緊張スレド、少數ノ正圓窓窩ニ於テ膿性滲出物存シ且ツ正圓窓膜ノ炎症浸潤ヲ蒙レルモノアリ（家兎 A 10, 30 號、家兎 V 3 號）。

蝸牛殻導水管：2 例（家兎 A 10, 30 號）＝圓形細胞ノ游出アリ（家兎 A 10, 30 號）。

蝸牛殻内外淋腔：大多數ハ空虚ニシテ清澄ナレ共、少量ノ血球ヲ有スルモノアリ。殊ニ斷頭固定ノモノニ多シ（家兎 A 6、海狸 A 12, B 2 號）。又雲絮様物質ヲ有スルモノアリ（家兎 A 27 號、海狸 A 7, 12, 24, 28 號、家兎 V 9 號）。

内聽道：腔内ニ圓形細胞ノ游出ヲ認ムルモノアリ（家兎 A 10, 30 號、家兎 V 4 號、B 2 號）。卵黃 5 號ハ假性「キサムトーム」細胞ヲ存ス。

靜定淋腔：大多數ニ於テハ何等異物ヲ有セズ、時ニ雲絮様物質ヲ存スルモノアリ（家兎 V 4 號）。

コルチ器：唯ダ内、外聽毛細胞ノ極ク輕度ニ潤濁腫脹シ、境界稍ニ不明ニシテ殆ンド正常ナリト思惟セラルハモノ大多數ヲ占ム。變化稍ニ進ミテ聽毛細胞ハ漸ク萎縮シテ消失セントシ、支持細胞及ビ内外螺旋溝細胞ハ水腫様又ハ潤濁シテ膨大シ、核ハ偏位ヲ示ス。即チアレキサンダー氏ノ第 1 度ノ變化ニ屬スルモノアリ（家兎 A 2, 6, 13 號）。更ニ變化強度トナレバ基礎膜濃染シ固有層纖維ノ走行ノ鮮明トナリ、鼓室道被覆細胞ハ濃染萎縮ス（家兎 A 23, 24 號、家兎 V 9 號、海狸 V 1 號）。聽毛細胞ハ消失シ、支持細胞ハ高サヲ減ジ鑿道ハ狹小扁平トナリ各細胞境界不明瞭トナリ、又細胞體內ニ空胞ヲ生ズルニ至

ル。基礎膜ハ濃染シ、無構造トナル（家兎 A 27、海狸 A 27, 30, 57 號）。更ニ變化增強セバコルチ器ハ全ク一片ノ組織塊ト化シ、固有ノ形ヲ留メズ、コルチ膜ハ削瘦シテ基礎乳頭ニ癒着シ、ライスネル膜ハ斷裂スルモノ多シ（家兎 A 25, 26, 28, 29, 30 號、海狸 A 10, 38 號、A V 1, 4 號、B 5 號、卵黃 3, 4, 5 號）（Fig. 14, 15, 16, 20, 22, 30, 35）。

特ニ基礎膜螺旋血管ニ就キテ觀ルニ、コルチ器ノ正常ナルモノハ血管ハヨク保持セラルハモ管腔狹小トナリ（家兎 A 27 號、海狸 A 14, 27 號）或ハ消失セルモノアリ（家兎 A 25, 26, 28, 29, 30 號、海狸 A 10, 30, 38, 57 號、A V 1 號、A K 1, 4 號、B 5 號、卵黃 3, 4, 5 號）（Fig. 15, 40, 41）。之等管腔ノ變化ハコルチ器ノ萎縮ト並行スルノミナラズ、未ダコルチ器ガ高度ニ變化セザルニ先立チテ惹起セラルハガ如シ。

脈絡帶長時日ニ亙リ試験セルモノニ於テハ脈絡帶上皮層ハ萎縮シテ高サヲ減ジ、細胞ハ縮小濃染ス（家兎 A 25, 26, 27, 28, 29, 30 號、A V 1 號、A K 1, 4 號、B 5 號、卵黃 3, 4, 5 號）。此部ノ血管ノ狹小トナリ又ハ消失セルモノハ多ク脈絡帶ノ萎縮ニ平行ス（家兎 A 25, 26, 28, 29, 30 號、海狸 A 38, 57 號、A V 1 號、A K 1, 4 號、B 5 號、卵黃 3, 4, 5 號）。

螺旋靱帶：大多數ハ正常ナルモ長時日ニ亙リ試験セルモノニテ纖維ノ走行錯雜糝粗、水腫様トナリ、細胞成分ハ減ジ、其細胞ハ多種多形ヲ呈ス（家兎 A 26, 28, 29, 30 號、海狸 A 30 號、卵黃 4 號、A K 1 號）（Fig. 24 參照）。

ライスネル氏膜：緊張シ、或ハ弛緩シテ波狀ヲ呈セルモノ或ハ斷切セルモノアリ。コルチ器ノ高度萎縮ノモノニ於テハ緊張セルモノアレド

(Fig. 22, 30) 又切斷セラレテ螺旋樞。基礎乳頭、或ハ脈絡帶＝癒着セルモノアリ。又ハコルチ器＝至ルマデ癒着シテ後對側ヘ架橋セルモノアリ (家兎A 30號、卵黃5號)(Fig. 35)。

聽斑、聽樞：コルチ器ノ萎縮度ニ略々一致シテ神經上皮細胞ハ縮小、濃染シテ細胞間ニ間隙ヲ作り上皮細胞ノ排列ハ不整トナリ。纖毛、耳石膜、「クブラ」ハ全上皮ヲ蔽フ無構造ノ濃染スル膜様物トナリ (Fig. 27)。「クブラ」ハ短小トナリ其線狀模様ヲ消失ス(家兎A 26, 28, 29, 30號、AK 1, 4號、B 2號、卵黃4, 5號)(Fig. 21)。尙ホ神經上皮基質結締織中ニ大淋巴腔隙ヲ形成セルモノアリ (AV 1號)。

螺旋節細胞：螺旋節細胞ノ變化ハ略々コルチ器ノ夫レト一致シ。コルチ器ノ輕度ノ萎縮ヲ來タスヤ胞體ノ濁濁。縮小ヨリ進ミテ核ノ濃染。胞體ノ收縮ノ爲メ不正形トナリ。更ニ Piknotich トナリ。或ハ細胞ハ濃染シテ影ノ如キ觀ヲ呈ス。之ヲ他側「トルイデンプラウ」染色標本ニ見ルニニッスル體ハ初メ融合シテ粗大トナリ。更ニ變化進メバ微細顆粒狀又ハ雲絮様トナリ核小體ハ不正形化シ又ハ消失シ胞體ハ空胞ヲ生ジ或ハ顆粒狀ニ崩壞シ。或ハ影ノ如キ存在トナリ消失セントス。

前庭神經節細胞：大多數ニ異常ヲ認メズ。唯ダコルチ器ノ萎縮高度ナル動物ニ於テハ輕度ニ濁濁收縮スルモノアリ。

蝸牛殼神經纖維：其節細胞ノ變化ト略々一致シ。殊ニ骨軸内ニテハ髓鞘側縁ハ漸次整正ナラズ不正トナリ。Fragmentation ノ像ヲ示サントシ。更ニ蟲喰狀又ハ棍棒ヲ連ネタル觀ヲ呈スルニ至リ髓鞘ノ蜂窠狀構造。染色質ノ分布平等ナラズ。更ニ試験ヲ繼續セバ髓鞘ハ全ク消瘦シ

テ微細糸ノ如クナリ辛ウジテ其走行ヲ知ルニ過ギズ爲ニ纖維束ハ甚ダ鬆粗ニ陥ル (Fig. 17, 18, 23, 28, 33, 34)。

前庭神經纖維：大多數ハ正常ナレドモ輕度ニ退行性萎縮像ヲ示スモノアリ (家兎A 25, 26, 27, 28, 29, 30號、卵黃3號)(Fig. 29)。

内聽道血管：顯微鏡の検査ニヨリ聽器血管ニ硬變性變化ヲ見タルモノナシ。(Fig. 17, 34, 45)。

以上ヲ通覽スルニ内耳ニ萎縮ヲ來タセルモノハ一般ニ試験時日永ク。注射量大ナルモノナレドモ又例外ナキニ非ズコルチ器ノ全ク萎縮シテ固有ノ形ヲ留メザルハ「アドレナリン」ニテハ試験期日 164 日、注射總量 29 g ヲ超ユルモノニ。海狸ニテハ 1 例ハ試験期日 103 日、注射量 8.2 g。他ハ試験期間 24 日、注射量 2.75 g ノモノニ。AV ハ期間 113 日、「アドレナリン」量 27.5 g。「ヴィガントール」量 5.5 cc。AK ハ總テ同様ナル條件下ニ飼育セルガ試験期日 174 日、「アドレナリン」量 40 cc。「カルチウム」量 14.4 g 以上ノモノニ。B ハ最モ注射量。試験期間少キモノニ來タレリ。

大動脈ニ肉眼的ニ硬變ヲ來タセルモノハ家兎A 25 例中 4 例、家兎V 10 例中 1 例、B 6 例中 2 例、卵黃 5 例全部ニシテ。卵黃ハ殆ンド 5 例共同條件下ニ試験セシモ其變化ノ程度ニハ少シク差異アリ。他ノ物質ニ依ルモノニ於テハ使用セシ物品ノ總量換言セバ試験期日ノ長短ト必ズシモ並行セザルモノアリ。

又大動脈硬變ノ強弱ト試験物質量ノ多寡トモ必ズシモ並行セズ。且ツ内耳ノ萎縮ト動脈硬變度トモ正比例セズ。同時ニ硬度ヲ見ルモノニ於テ必ズシモ内耳ニ病變アルニ非ズ。而シテ兩型動

脈硬化症間ニ於ケル聽器所見ノ差異トシテハ次ノ2點即チ唯ダ「ヴィガントール」ニヨル中耳粘膜ノ増殖肥厚、卵黃ニヨル「假性キサムトール」ノ中耳腔發生ヲ除キテ擧グベキ點ナシ。

考 案

敘上ノ如ク余ハ家兎及ビ海獺＝「アドレナリン」、「ヴィガントール」、「アドレナリン」及「ヴィガントール」併用、「アドレナリン」及ビ「カルチウム」併用、「バリウム」及ビ鶏卵黃ヲ注射或ハ食餌トシテ投與シ動脈硬化症ヲ惹起セシメ、且ツ聽器殊ニ内耳ニ病的變化ヲ發生セシメ得タリ。

以下本實驗ヲ基礎トシテ動脈硬化症ト聽器ノ關係ニ就キ考察シテ聊カ非見ヲ述ベントス。

實驗的動脈硬化症ニ就テ：本實驗ノ目的ニ使用セラル、動物ハ通常家兎ニシテ、余ガ硬化症ヲ惹起スルコト比較的困難トセラル、海獺ヲ併用セル所以ハ唯ダ聽器ヲ彼我相對照シ且ツ海獺ニテハブライエル氏反應ノ觀察可能ナルガ爲ナリ。而シテ余ノ實驗ニ於テモ海獺ノ動脈ニハ何等ノ病變ヲ齎ラサズ満足ナル成績ヲ得タルハ總テ家兎ナリ。又家兎モ老朽、妊娠中ノモノハ本症ノ成立ニ好都合ナルハ一般ニ認容セラル、トコロニテ、個性ニヨリ大ナル逕庭アルモ看過スベカラズ。余ノ實驗ニ於テ「アドレナリン」型動脈硬化症ヲ惹起シ得タルモノハ「アドレナリン」注射ニヨルモノ家兎 30 例中 6 例 (Fig. 1 参照)、「ヴィガントール」ニヨルモノ 10 例中 1 例、「バリウム」ニヨルモノ 6 例中 2 例ニシテ、其發生ハ試驗日數或ハ注射又ハ投與總量ノ多寡ト並行セズ。例之「アドレナリン」注射 4 回 注射總量 1.8cc、生存日數 7 日ニシテ陽性ノ

成績ヲ獲タルモノアルニ不拘。注射總量 40cc、試驗日數 200 日ニ垂ントシテ尙ホ且ツ正常ナルモノアリ。人類動脈硬化症ニ於ケルト同ジク、家兎ニ於テモ個體ニヨリ其被ムル影響ニ大差アルヲ覺ユ。

卵黃投與實驗ニ在リテハ試驗日數 173—206 日、卵黃投與數 125 個ニシテ剖見セルモノハ總テ高度ノ動脈硬化症ノ發生ヲ見タリ (Fig. 5, 6 参照)。實驗的動脈硬化症ノ好發部位ハ先輩諸氏ノ報告ト同ジク大動脈弓部ヲ最多トシ上、下行大動脈ヨリ腸骨動脈ニ下降スルニ從ヒ漸次減弱シ。他ノ大、中血管ニハ變化ヲ呈セザリシモ、唯ダ卵黃投與家兎ノ 1 例ニ於テハ胸、腹大動脈ハ勿論、内頸、肺動脈ニ至ル迄明ラカニ黃白斑ノ硬變ヲ認ムルコトヲ得。其程度ハ大動脈弓部ニ粟粒大、大豆大ニ限局スルモノヨリ大動脈ハ胸部ト云ハズ腹部或ハ腸骨動脈ニ至ルマデ殆ンド其全周ノ大半ヲ覆ヒ。更ニ上述ノ如ク中動脈ニマデ波及セルガ、之ニヨリ「アドレナリン」及「コレステリン」兩型ヲ比較スルニ後者ハ強度且ツ廣範ニ出現シタレ共、之ヲ以テ直チニ其發生ノ難易、強弱ヲ云々スベカラザルハ贅言ヲ要セズ。

余ハ小動脈、細小血管ニ關シテハ、聽器ヲ除キ肉眼的ニモ顯微鏡學的ニモ特ニ留意スルコトナカリシヲ以テ其成否ヲ詳ニセズ。

兩動脈硬化症型ハ肉眼的の所見ニテモ組織學的ニモ頗ル趣キヲ異ニシ、「アドレナリン」型ニテハ該局所ハ扁平狀ニ内膜面ニ膨隆シ、硝子様半透明ニテ格子狀或ハ線條様ノ斑紋アリ、觸ルレバ彈力性ヲ失ヒ石板様ノ硬度ヲ呈シ、菲薄トナレル觀アリ。組織學的ニハ中膜彈力纖維ハ波狀走行喪失シ板狀ヲ呈シ、密集、斷裂シ、或ハ染色

不良、各纖維ノ膨脹弛緩筋細胞ノ Piknose 或ハ壞死等ノ變化ヲ示シ「ヘマトキシリン・エオジン」復染色ニヨリ濃藍色ノ石灰沈着ノ像ヲ呈シ。時ニ内腔面ハ崩壊シテ潰瘍ヲ形成シ内膜ノ代償的結締組織肥厚ヲ認メザリシモ唯ダ家兎 A14 號ニ於テ硬變部ノ一端ニ結締組織ノ増殖セルヲ見タリ (Fig. 2, 3, 4 参照)。卵黄ニヨル「コレステリン」型血管硬變部ハ明ラカニ扁平狀ニ内腔ニ膨隆セル帶黄白色斑ニシテ硬ク組織學的ニハ幼弱ナル結締組織ノ増生ニヨリ内腔内ニ膨隆セルヲ認メ。細胞ハ橢圓、類圓、紡錘、或ハ星芒狀ニシテ、原形質ハ「ヘマトキシリン・エオジン」ニヨリ微細且ツ淡染スル顆粒ヲ含有セル造結締組織細胞アリ。結締組織纖維ノ走行ハ亂雜ニテ蜂巢狀又ハ網眼狀ヲナシ。或ル網眼ハ單ナル空胞トナレリ (脂肪脱出?)。表層即チ内腔面ハ二三層ノ新結締組織纖維及ビ定型的造結締組織細胞ガ表面ヲ被覆シ。彈力纖維ハ僅カニ増殖ス。中膜ノ筋細胞ハ萎縮ニ陥リテ濃染シ。彈力纖維ハ鬆粗ニテ亂雜又ハ斷裂セル所アリ (Fig. 7, 8, 9 参照)。尙ホ Sudan III 脂肪染色ヲナセバ此肥厚部特ニ脂肪顆粒ヲ豊富ニ確認スルヲ得タリ。

人類動脈硬化症ノ出現部位ニ就キテ：血管硬化症ハ一律同時ニ全身動脈ニ發現スルトハ限ラズ。元來動脈硬化症ナル名稱ハ通常細小動脈及ビ毛細血管以外ノ罹患ヲ代表シ。即チ細小血管硬化症 (Arteriolosklerose) ニ對スル Arteriosklerose ナル意味ニシテ、老人性硬化症ハ之ニ屬シ。大、中動脈ヲ冒シ。血壓ハ普通或ハ中等度ニ亢進シ。且ツ原發性萎縮腎ニ對シ老人性萎縮腎ヲ合併ス。反之。細小動脈硬化症ハ主トシテ中年時代ニ來タリ。高血壓ト原發性萎縮腎ヲ發生ス。然レ共兩者ハ元々本質的ニハ同一ナ

ルモノ故。同時ニ發現シ高血壓ヲ見ルコトアリ。

臨牀的ニ Thoma 氏ハ本症ヲ中樞性及ビ末梢性ニ分類シ。前者ハ心臟、大動脈ヲ、後者ハ末梢中、小血管ヲ主位トス。腦、殊ニ腦底血管硬化症ハ屢々大動脈及ビ冠狀動脈ノ夫レト合併スルモ。高血壓ノ際見出サル、細小頭蓋内動脈硬化ハ腎臟血管ノ硬變ヲ隨伴スト云フ。Neubürger 氏ハ頭蓋内動脈硬化症及ビ高度ナル全身動脈石灰化ノ同時的罹病ハ稀有ニ屬シ。全動脈硬化症ノ 10% ニ過ギズトナス。腦動脈中最初ニ侵襲セルハ部分ハ内頸動脈ノ頭蓋底骨中ニ横ハル所及ビ椎骨動脈ニシテ、Därflersch 氏ニ從ヘバ前者ノ發病ハ組織學的ニハ既ニ 20 年代ニ、肉眼的ニハ 40 年後ニ認ムルコトヲ得ト云ヘリ。次ニ耳科領域ニ關係深キ腦底動脈ノ好發部位ハ内頸動脈殊ニ基底動脈ノ末梢ニ動脈ヲ分歧スル點。兩側椎骨動脈ノ相合致シテ基底動脈ヲ形成スル場所ニシテ。又基底動脈自ラモ他動脈ヨリハ容易ニ罹患スルコトアルハ臨牀上耳鳴ノ他症狀ニ先ズルコト、相俟チ。聽器疾患ノ病理上甚ダ注目ス可キコトナリ。

動脈硬化症ノ成立：動脈硬化症ノ病理的本態及ビ病因ニ對シテハ尙ホ現今未ダ一定ノ結論ニ達セズ。古來本症ハ消耗的疾病トシテ老年ニ起ルハ生理的現象ナリト説ク人アリ。

Marchand 氏ハ血管勞使ニ因ル血管ノ營養障礙ニ基因ストシ。Hück 氏ハ血管壁ノ進行性營養障礙ト定義シ。共ニ血管壁ノ營養障礙ナル點ニテハ其見解ヲ等シウス。斯クシテ營養障礙ニ因ル組織變化ハ多クノ場合血管内膜ヨリ始マル。血管壁ガ一定ノ機械的刺戟ヲ受クレバ。内膜ノ内外兩層界ニ位スル彈力境界線ノ黏合質ハ弛緩

シ。血漿。淋巴ノ通過ヲ困難ナラシメ。營養障礙及ビ酸化作用ノ減弱トナリ。血漿内類脂肪體就中「コレステリンエステル」ヲ停溜セシメ。後「コレステリン」ヲ游離結晶セシメ。他ノ類脂肪タル脂肪酸ハ石鹼ヲ作リテ遂ニ石灰化ス。斯クノ如キ變化ハ内 膜 深 部 ヨリ管腔面ニ進展シ。之等ノ反應トシテ結締織ハ増殖シ。内 膜 ハ肥厚ス。

Hüek 氏ニ依レバ黏合質ナルモノハ一種ノ原形質ヨリナル組織基質ニシテ。其上ニ彈力纖維又ハ其他結締織纖維が存在シ。其細胞原形質ト基質トハ往々ニ判然ス可カラズ。然モ基質ハ細胞原形質ノ如ク生活力ヲ有シ。從テ兩者ニハ密接ナル關係アリ。Münk 氏ハ細胞原形質ノ退行變性ハ血清ノ膠質化學的變化。例ヘバ「コレステリン」増加ト關係アリ。若シ或ル毒素ノ爲メ血清ニ化學的變化起レバ組織基質トノ間ニ物理的平衡ヲ失シ。延イテ細胞原形質ノ退行變性ヲ誘發ス。一方結締織ノ基質ハ膠質樣ノ性質ヲ有シ年月ヲ經レバ膠質ノ一般性質ニ準ジ Hysteresis ヲ現ハス。即チ老人現象ニシテ之ガ老人性或ハ消耗性動脈硬化症ヲ來タス一因ナリト稱ス。要スルニ動脈硬化症ノ發生ニハ器械的刺戟ト共ニ物理化學的機轉ガ大ナル意義ヲ有スルモノナリ。換言セバ血管ガ動脈硬變ヲ惹起スル爲メニハ血壓又ハ血流ノ如キ機械的刺戟ト血漿内ニ於ケル「コレステリン」ノ存在ヲ不可缺條件トス。

動脈硬化症ノ成因：歴史的ニ種々ノ學說アリ。

Virchow 氏ハ一種ノ炎症ニ因ル血管營養障礙ナリト炎症說ヲ稱ヘタレ共。現今ニ於テハ之ヲ否認スルモノ多ク。次イデ Thoma 氏ハ機械說

ヲ發表シ。生存中ニ起ル種々ノ影響。過勞。新陳代謝不調。血管營養障礙等ノ結果トシテ血管抵抗力ノ薄弱ヲ來タシ。爲メニ血行ノ血壓ハ血管腔ノ擴大トナリテ血行緩除ヲ來タシテ管腔ニ器械的刺戟ヲ與ヘ。其反應トシテ内 膜 肥 厚 シ血管腔狹小トナリ血壓ヲ高ムト説述シ。大イニ學者ノ共鳴ヲ得タリ。彼ノ說モ爾來幾多ノ誤謬ヲ指摘サレタレ共其原理ニ至リテハ硬化症ノ成立ヲ解説スルニ甚ダ有力タルヲ失ハズ。Aschoff 氏ハ血管生命說ヲ唱導シ。動脈ヲ彈力型(大動脈。頸動脈。腸骨動脈)及ビ筋肉型(末梢及ビ内臟動脈)ニ區明シ。彈力型ハ一生ヲ通ジ同一ノ造構ヲ有セズ。之ヲ上行期(35Lj.迄)。極期(45Lj.迄)及ビ下降期(45Lj.以上)ニ分チテ。各期ニ因リ内層ノ彈力層ニ相違アリ。下降期ニテハ其消耗ト結締織ノ代償性肥厚アルヲ述べ更ニ Atheromatose ニ就キ言及シ。Atheromatose ノ血管ニ來タルハ彈力型ニ限り。然カモ春機發動期迄ノ Atheromatose ハ食物脂肪供給ノ調節ニ因リ消退可能ナルモ。下降期ニ於テハ細胞ノ新陳代謝機能減退ノ爲メ調節不能ニ陥リテ血管ノ Atheromatose 即チ動脈硬化症ヲ形成ストイヘリ。

動脈硬化症ノ原因：本症ハ所謂老人病ノ筆頭ニ位スルモノニシテ其眞因ヲ知悉セントセバ當然老衰ナル現象ノ本質ヲ衝カザルベカラズ。然リト雖モ老衰ノ本態及ビ原因ハ今日尙ホ迷宮ニアリテ。生物個體ニ初メヨリ具備セラル、性質ナリヤ。或ハ外來害物作用ニ因リ誘發セラル、モノナリヤ。或ハ此兩者ニ相俟ツモノナリヤ其決定ハ頗ル困難ナリ。サレバ所謂老人病ガ眞正ナル疾病素因ニ歸スベキモノナリヤ。或ハ老人ニ至ル長年月ノ間ニ身體ニ作用シタル外因ニ基

因スルカノ識別モ亦難シト謂ハザルベカラズ。併シ、假令眞正素因＝歸一ス可キモノナリト雖モ、又外來害物作用モ大イニ與ツテ力アルコトモ否ミ得ザルベシ。

從ツテ動脈硬化症モ此範疇ヲ出ズシテ、原因トシテハ種々ノ内因、外因ヲ舉ゲルモ之ヲ以テ總テヲ盡シタリトハ斷言シ得ズ。

1. 年 齡。

高齢ニシテ尙キ且ツ動脈硬化症ヲ合併セザルコトアルハ臨牀上、剖見上屢々觀察セラル、トコロナルヲ以テ、年齡ノミニテ説明スルハ難事ナルモ、動脈硬化症成立ニ就キ大イニ意義アルハ上述ノ如シ。血管其者モ長年月ニ亘リ機能ヲ榮爲スレバ漸次消耗スルハ Aschoff 氏ノ血管生命説ヲ引用スル迄モナク了解セラル、トコロナリ。

一方老年性變化トシテ内分泌器官殊ニ睾丸、卵巢ノ機能低下ガ動脈硬化症ノ成立ニ對シ影響ヲ及ボスハ臨牀的ニモ觀察セラレ、實驗的ニモ村田氏外數氏ニ因リ去勢家兎ノ對照健康家兎ニ比シ容易ニ血管ニ變化ヲ惹起スルコトニ因リ實證セラル、トコロニテ、睾丸機能脱落ニ因ル體內酸化作用低下ガ脂肪新陳代謝障礙ヲ招致シ、血中ニ「コレステリン」含有量ヲ増加セシムル事實ハ Hypercholesteriämie ノ動脈硬化症患者ニ常ニ存在スルコト、照應シテ内分泌器官機能ノ失落ハ延イテ全身ノ平衡狀態ヲ破壊シ益々以テ老衰出現ニ拍車ヲ加フルト共ニ動脈硬化症成立ニ有利ニ作用ス可シ。

2. 動脈管壁ノ酷使。

身體ガ勞働作用ヲ答メバ血液ノ補給ヲ要シ、其充分ヲ期センガ爲メニハ血管ハ擴大又ハ收縮セザル可ラズ、之ガ生理的範圍ヲ超脱シテ過剩

ナル機能ヲ營行セントセバ器械的刺戟ト變ジテ動脈硬化症ノ誘因トナル。

斯クノ如キ血管收縮運動ハ肉體の勞働ノミナラズ、神經ノ作用ニ因リテモ血管ノ緊張ニ動搖ヲ來タシ、從ツテ勢カラザル影響ヲ及ボスモノニシテ、神經衰弱體質、興奮性體質、精神の勞働者ガ本症ニ罹患シ易キ傾向ハ雄辯ニ此事實ヲ裏書ス。斯カル意味ニ於テ血壓ノ亢進ハ血管ニ對スル過剩機能要求ノ雄タルモノニシテ Tendeloo 氏ハ血壓亢進及ビ反復セラル、血管ノ伸展擴大ハ硬化性變化形成ニ對スル最小抵抗點ト化スト云ヘリ。クロッツ氏ハ幼弱家兎ヲ毎日3分、180日間ニ亘リ逆サニ懸垂シ、大動脈ノ外、頸、上膊、鎖骨下動脈ニ悉ク強度ノ石灰化、擴張ヲ見、ハーベル氏ハ腹部大動脈ヲ壓迫シテ大動脈ニ同様ノ所見ヲ得ルニ成功セリ。之等ノ實驗ハ器械的血壓亢進作用ノ動脈硬化症ニ對スル關係ヲ説明スルニ餘リアリ。老年ニ至ル長年月ノ間ニハ喜怒哀樂ノ精神の動搖ハ申スニ及バズ、暴飲飽食、刺戟的飲食物、肉體の過勞、房事過度等人間生活自體ガ刺戟ノ連續ナリト斷定スルモ過言ニ非ズシテ、血管ノ勞作負擔ヲ増加スベキ機會ハ枚舉ニ遑ナシト謂ハザル可カラズ。

「アドレナリン」ノ顯著ナル作用ハ血管收縮ニ因ル血壓上昇ニアリ。從ツテ此反復注射ガ内分泌相互ノ化學的平衡關係ヲ打破スルト同時ニ血壓亢進ナル器械的作用ニヨリ直接動脈硬化症ヲ誘發シ易キ傾向ヲ帶ブルハ當然ナリ。副腎ノ機能亢進、例之腫瘍ノ際如何ナル全身的作用ヲナスヤ不明ナレ共、Biehl 及 Wichels 氏ハ兩側副腎 Paraganglion ノ場合定型的ノ動脈硬化症ヲ觀察シ、Schickel 及 Deramaal 氏ハ各高年ニ於テハ副腎ガ肥大スルヲ認め、殊ニ後者ハ

「アドレナリン」ノ異常分泌ハ交感神經ヲ刺激シ血壓ノ上昇ト血中「コレステリン」ノ増量ヲ來タシ本症ヲ惹起セシムトセリ。

3. 中 毒。

實驗的ニ「アドレナリン」ヲ始メ昇汞、¹「ヂキタリス葉」、²麥角、³甘汞、⁴沃度加里、⁵水銀、其他多數ノ物質ガ動脈硬化症樣變化ヲ來タス所以ニ就キテハ一方夫等ノ物質ガ新陳代謝ヲ阻害シ、或ハ血壓ヲ亢進セシムル外ニ直接血管壁ニ作用スルニ歸因スト認メラルハモノアリ。殊ニ鉛中毒患者ニ本症ノ頻發スルハ臨牀的ニ屢々遭遇スルトコロナリ。酒、煙草、茶、咖啡等ノ害ニ就キテハ闡明充分ナラズ。特ニ統計上之等嗜好者ニ本症患者ノ多數ナル事實ハ證明セラレザルモ、實驗的ニ酒精及「ニコチン」ニ因リ發生シ得ルコトヲ顧慮セバ全く無關係トハ斷言シ難ク、大量ノ「酒精」ハ甲状腺更ニ副腎、生殖腺、肝臟、腎臟ヲ侵シ老衰ノ原因トナル。Vitamin Dナル「ヴィガントール」ノ過剩投與ガ本症ヲ成立セシムルハ其真相ニ尚ホ不明ナル點多クレドモ、中毒ニヨリ「カルチウム」新陳代謝ヲ障礙シテ石灰ノ異常沈着ヲ來タスモ其原因ノ一ナランカ。

「チフス」、⁶「マラリヤ」、⁷「インフルエンザ」、⁸「ヂフテリア」其他ノ傳染病モ其細菌毒素ニヨリ血管壁ニ退行變性ヲ誘發シ、動脈硬化症ノ前提ヲナスト雖モ直接其成立ニ關與スルニアラズト云フ。微毒ハ從前ハ本病ノ有力ナル直接原因ト看做サレタルモ、之ハ微毒性動脈炎ヲ混同セル爲メニテ他ノ傳染病ノ場合ト同ジク間接ニ其成立ヲ助長スルニ止マルノ説有力ナリ。

4. 食 物。

本項ハ嚴密ナル意味ニ於テ中毒ノ條項ニ該當

スベケンモ特ニ1項ヲ設ケタリ。

家兎ニ獸肉ノ如キ蛋白質物質及ビ「コレステリン」ニ富メル食餌ヲ連續多量ニ與フレバ動脈硬化症ヲ惹起スルニ至ルハ屢言セル所ナリ。臨牀的ニモ肉食偏食家ニ本病ノ多キハ過度ノ肉食ニヨリ「アチドーシス」ノ狀態ヲ招キ、自家中毒狀態ニ陥ル爲メナラン。

5. 内分泌異常及ビ新陳代謝病。

甲状腺機能墮落ニ基ク粘液水腫ガ動脈硬化症ヲ早發スルハ普ク人ノ知ルトコロ。又糖尿病患者ニ本病ノ合併スルコト多キハ有力ニ内分泌器官ノ關與スル事實ヲ物語ルモノト言フ可ク、之等器官ノ化學的相互關聯ノ平衡狀態ニ波瀾ヲ惹起センカ、場合ニヨリテハ特ニ脂肪代謝障礙ヲ招來シ硬化症ノ罹病ニ甚ダシク有利ニ働ク可シ。

Hypercholesteriämieハ動脈硬化症成立ノ前提ト看做サレ、⁹卵巢、¹⁰睪丸、¹¹腦下垂體等ニ參與スルモノ、如ク、「アドレナリン」ハ一時的血液内糖分及ビ「コレステリン」ヲモ増加セシムト謂ハレ、Munk氏ハ動脈硬化症ノ際副腎皮質ノ増大セルヲ認メテ皮質ノ作用ニヨリ脂肪類ヲ増加シ本症ノ發生ヲ助長セシムト云ヘリ。老人病學ノ權威タル Arnold Lorand 氏ハ老衰現象ニ就キ述ベテ曰ク之ハ血腺殊ニ甲状腺、¹²生殖腺、¹³副腎、¹⁴腦下垂體ノ變化ニヨリ惹起サルハモノニシテ新陳代謝ト解毒ノ過程ヲ支配セル斯カル器官ノ變性ハ自家中毒ノ狀態ヲ惹起スルガ、老衰トハ結局一ツノ緩慢ナル慢性自己中毒ニ外ナラズ、此際腺ノ變性ガ一次的ニシテ組織ノ變化ガ二次的ナリ、即チ血腺ガ組織ヲ支配シ、組織ガ腺ヲ支配スルニ非ズ、例ヘバ之等器官ノ一ツ、甲状腺ヲ摘出セバ任意ニ動物ニ老衰症候ヲ起シ

得ルモノナリト。

6. 遺 傳。

本症が家系的＝頻發スル事實ハ雄辯＝遺傳ガ本症ノ重要ナル一因子タルコトヲ物語ルモノニシテ。興奮性素質ト云フガ如キ體質ヲ受繼グ＝非ザルカ。

以上ノ事實ヨリ考慮スル時余ノ實驗＝使用セル「アドレナリン」其他ノ物質ハ動脈硬化症ヲ惹起スル＝甚ダ有利＝作用スルモノナリ。

余ノ實驗＝ヨル聽器變化＝就テ

前章＝述ベタルガ如ク。「アドレナリン」。「ヴィガントール」。「カルチウム」。「バリウム」及ビ鶏卵黃ノ應用＝ヨリ試獸＝惹起セル聽器ノ主ナル病變ハ外耳及ビ中耳被膜ノ化膿性炎症。假性「キサトーム」發生並ニ内耳特ニ膜様迷路及ビ聽神經ノ變化。即チ螺旋節細胞。蝸牛殼神經纖維。コルチ器ノ退行性萎縮。コルチ膜ノ沈降。脈絡帶ノ萎縮變性。前庭ニテハ聽櫛。聽斑神經上皮ノ萎縮等ヲ數ヘ得ベシ。

「アドレナリン」型動脈硬化症ヲ惹起セル動物群ト「コレステリン」型動脈硬化症ヲ生ゼル動物群相互間ニ於ケル聽器所見ノ根本的相違ハ特定實驗ノ外。中耳ニ於ケル一二ノ點ヲ除キ之ヲ認ムルコト能ハザリキ。外耳及ビ中耳化膿炎症ガ特ニ「アドレナリン」。「ヴィガントール」ヲ應用セル動物ニ比較的多カリシモ。之ハ之等物質＝ヨリテ直接惹起セラレタルモノニ非ズシテ。其營養障礙＝ヨリ二次的＝細菌ノ感染ヲ容易ナラシメタルト思考セラレ。又鶏卵黃投與實驗ニ於テモ2例＝中耳化膿ヲ認タルヲ以テ動脈硬化症兩型間ノ絶對的差異ニハ數ヘ難シ。特ニ「アドレナリン」注射＝ヨリテ家兎ニ於テハ19例中15例＝中耳化膿ヲ惹起セルガ。之ハ

「アドレナリン」ノ一般の中毒＝ヨル營養障礙。殊ニ反復注射＝ヨリ繰返ヘサレタル體液中糖分ノ増加ハ恰カモ糖尿病ニ於ケルガ如キ關係ニテ細菌ノ侵襲ヲ容易ナラシムル＝非ザルカ。

「ヴィガントール」過剰投與＝ヨリテハ生體ニ Acidosis ヲ惹起シ。骨質ノ「カルチウム」ハ血中ニ移行シ。骨質ハ脱灰現象ヲ呈スルト共ニ他組織ニ「カルチウム」ノ沈着ヲ來タスモノニシテ。斯クシテ招來サレタル營養障礙ハ一般抵抗力ノ減弱ヲ招致シ。爲メニ化膿＝傾向シ易シトハ先人諸氏ノ幾多ノ業績ニ徴シテモ明カナリ。島野氏ハ白鼠＝就テ實驗シ。加答兒性或ハ化膿性外。中耳炎ノ多キヲ指摘スルト同時ニ外聽道表皮。中耳粘膜ノ肥厚及ビ骨質破壊。吸收。新生等所謂 Osteodystrophia fibrosa ノ所見ヲ得タリ。余モ亦中耳粘膜ニ於テ其上皮ノ甚ダシク増殖肥厚セルヲ認メタルガ之ハ他實驗ニ於テハ毫モ認メ得ザリシ所見ナリ。骨質ニ於テハ家兎5例。海狸5例ノ全顎顎骨ヲ通ジテ變化ナク。唯ダ1例ニ於テハハーベル氏管ノ擴大。纖維髓ノ出現ヲ認メタルモノアレド其變化ハ甚ダ輕微ナリキ。之ハ要スルニ試獸ノ年齢ニヨル違ヒナルベク。Schmidtman 氏ハ鼠ニテ實驗シ。成熟セルモノハ骨系統ニ變化ヲ來タサズ。幼弱ナルモノニ之ヲ見タリト述ベタルガ。余ガ場合ニ於テモ使用動物ハ既ニ成熟セルモノナル爲メ骨質ニ著變ヲ呈セザリシナラン。

尙ホ注目ニ値スルハ鶏卵黃投與家兎4及5號。殊ニ後者ニ於テ異色アルー所見ヲ鼓室腔内ニ觀察セリ (Fig. 36, 38 参照)。即チ蝨骨兩脚及ビ足板ニテ圍繞セラレタル間腔及ビ卵圓窩ノ蝨骨後方ニ於テ顆粒ト覺シキモノヲ抱有セル組織球形細胞ノ集積アリ (Fig. 37, 39 参照)。此細

胞ハ Van Gieson 染色ニテ淡褐黃色ニ着色シ。
 此細胞聚落ノ一部ニハ新生結締組織アリ。其中心
 ニ骨組織ヲ發生シ。斯カル新生組織内ニハ所々
 ニ脂肪結晶ニ似タル針狀ノ空隙ヲ生ズ。此針狀
 像ハ「コレステリン」ノ脱出セルモノニヨリ生
 ズ。4號ニ於テモ同様ナル部所ニ同様ナル所見
 フ呈スレド5號ニ比シ輕微ニシテ骨ノ新生ヲ見
 ズ。而シテ此組織球性細胞ハ實ニ脂肪ヲ攝取セ
 ル假性「キサントーム」細胞ニシテ。茲ニ結節
 フ形成シ。假性「キサントーム」ヲ生ジタルモ
 ノナリ。

家兎ニ「コレステリン」ヲ經口的ニ多量ニ與フ
 ル時ハ腸上皮ヨリ吸收セラレテ血中ニ現ハレ。
 全身の「コレステリンアトーゼ」ノ狀態ヲ呈
 シ。大動脈ノミナラズ肝。脾等造血器官其他諸
 臟器ニ「コレステリン」ノ沈着ヲ見ルニ至ル。
 而シテ「コレステリン」家兎ノ臟器所見ヲ通覽
 スルニ家兎ニモ個體の差異アリト雖モ。「コレ
 ステリン」ノ身體諸臟器ニ沈着スル模様及ビ程
 度ハ攝取スル「コレステリン」含量ニ比例スト
 云フ。耳鼻科領域ニ於テ脂肪問題ニ就キ研究セ
 ル中道氏ハ「ラノリン」。「バタ」。豚脂。腦質。
 卵黃其他脂肪物質ニ富ム食餌ヲ以テ家兎ヲ永ク
 飼育シ。其聽器ニ於ケル脂肪分布狀態ヲ検査
 シ。外聽道皮下結締組織及ビ骨質内結締組織ニ於ケ
 ル脂肪質ハ食餌ヲ續ケルト共ニ増量シ。鼓膜。
 鼓室粘膜及ビ正圓窓ノ結締組織纖維。成形細胞殊
 ニ上皮細胞。鼓室内ニテハ靱帶。橫紋筋殊ニ鐮
 骨輪狀靱帶及ビ馬鐮筋。其他内耳ニ脂肪物質ノ
 沈着スルヲ認メ。且ツ斯カル脂肪物質ノ沈着ス
 ル所ニハ脂肪顆粒ヲ多量ニ有スル組織球性細胞
 ノ出現スルヲ認メタリ。然レドモ余ノ5號ニ見
 ルガ如キ場所及ビ組織球ノ聚落模様ニ就キテハ

記載セズ。且ツ他ニ斯カル成績ヲ得タリトノ文
 献ナシ。

1915 年今氏ハ「ラノリン」ヲ以テ飼養セル家兎
 胃粘狀ニ顆粒狀又ハ結節狀ノ腺腫ノ發生スルヲ
 觀察シ。之ハ「リポイド」及ビ多數「キサント
 ラスマ性リポイド」含有細胞及ビ腺樣組織増殖
 ニ因リ生ゼルヲ以テ「ラノリン」腺腫ト判定セ
 リ。之ニ對シ梅原氏ハ腦粉末投與ニヨル實驗ニ
 於テ同様ナル結節腫瘤ノ發生ニ成功シ。之ヲ鏡
 檢スル時ハ孰レモ重屈折性脂肪質ノ高度ノ結締
 組織内沈着ヲ現ハシ。其沈着ハ粘膜下結締組織ニ於
 テ甚シク。之等部位ニ沈着セル類脂肪質ハ所謂
 組織球ニヨリ攝取セラレ。「キサントーム」細胞
 ニ比較スベキ狀態ヲ呈シ多數相集簇シテ結締組
 織内ニ存在ス。而シテ之等類脂肪沈着ノ結果粘膜
 下結締組織ハ受働的影響ヲ受ケテ甚ダシク増殖
 シ。更ニ粘膜全體ガ増殖スルニ至リ。之等結締
 組織内ニモ脂肪ヲ含メル「キサントーム」細胞ヲ
 認ム。故ニ粘膜ノ増殖ハ脂肪沈着セル爲メノ受
 働的現象ニ外ナラズ。又其脂肪沈着狀態ハ全ク
 「キサントマトーゼ」(「キサントーム」)ト云フ
 フ妥當トスト云ヘリ。アニチュコフ氏ハ「コレ
 ステオトーゼ」。「ニポイトーゼ」ヲ起セル動物
 皮膚ニ刺戟ヲ與フル時ハ皮下ニ重屈折性脂肪ヲ
 有スル組織球ガ集合シ遂ニハ假性「キサントー
 ム」細胞ニ變化セルヲ見タリ。而シテ更ニ「コ
 レステリン」ヲ與フル時ハ局所ノ刺戟ナクシテ
 モ惹起シ得ルモノニテ此 Pseudoxanthom ハ人
 眼瞼ノ Xanthom ニ類似スト云フ。此人工的
 皮膚「キサントーム」ニ就キテハアニチュコフ
 氏ノ外。Hosseli, 今, 川村, 梅原氏等ニヨリ同
 樣觀察セラルヘトコロニシテ現今ニ於テハ眞ノ
 腫瘍ニ非ズ梅原氏ノ所說ヲトリ假性「キサント

ーム」トノ見解行ハル、ガ如シ。余ノ場合ニ於テモ容積ハ甚ダ小ナリト云ヘドモ氏等ノ腫瘤ニ甚ダ酷似セルヲ以テ之ヲ假性「キサントーム」ト斷ジテ差支ヘナカル可シ。中道氏ニ從ヘバ馬鐙骨輪狀靱帶ハ脂肪沈着ノ好發部位ナルヲ以テ此附近ニ脂肪ヲ含有セル組織球ノ游出ハ不思議トセザルモ、如何ニシテ特ニ馬鐙骨脚間腔ヲ充填スルガ如キ多數ナル假性「キサントーム」細細ノ聚落ヲ見タルヤ其成立機轉ニ就キテハ甚ダ判定ノ歸趨ニ困惑ヲ感ゼザルヲ得ズ。5號ニ於テハ附近粘膜ニ二三ノ淋巴球ノ出現アリ、殊ニ4號ハ附近中耳粘膜ノ炎症明カナルヲ以テ炎症ノ爲メ出現セルヤ、或ハ又假性「キサントーム」ノ發生アリテ後炎症加ハレルモノナリヤ判斷ニ苦シムトコロナリ。尙ホ新生骨組織及ビ結締組織ハ附近骨膜ヨリ増殖セルツノ腫瘍ナリト信ズ。而シテ此腫瘍ガ果シテ「キサントーム」ト如何ナル關係ニアルヤ不明ナリト雖モ、或ハ梅原氏ノ云ヘルガ如ク眞ノ腫瘍ニ非ズ假性「キサントーム」發生ニヨル骨膜ノ受働的作用ニ因リ増殖發生セルニ非ザルカ。又假性「キサントーム」ノ馬鐙骨脚間及ビ卵圓窓窩ニ特發セルハ或ハ其血管分布ノ狀態ニ歸因スルニ非ザルヤ後日尙ホ攻究ス可キ問題ナラン。

以上ノ如ク、「アドレナリン」ヲ始メ「ヴィガントール」、「バリウム」ニヨル「アドリナリン」型動脈硬化症家兎群ト鶏卵黃ニヨル「コレステリン」型動脈硬化症家兎ノ外、中耳ニ於ケル組織學の所見ノ本質的相違ハ「ヴィガントール」ニヨル中耳粘膜ノ増殖肥厚ト、卵黃ニヨル假性「キサントーム」發生ニシテ其他ニハ一般的ニ相違點ヲ見出サズ。

次ギニ余ノ實驗ノ主要目的トセル内耳ニ於ケル

變化ハ「アドレナリン」其他ノ物質及ビ鶏卵黃投與ニヨリテモ兩者間ニ質的ニハ些カノ差異ヲ有セズ。孰レモ同一ニシテ唯ダ變化ノ強弱ヲ示スノミナリ。内耳ニ於ケル主ナル變化ハ膜様迷路ニ在リテ、骨質ニ於テハ「アドレナリン」實驗ノ長期ニ亘レルモノニ於テ骨板層ノ不明、染色不良、骨細胞ノ萎縮ヲ見ルニ過ギズ。他ニ著變ナシ。膜様迷路最モ輕度ナル變化ハ螺旋節細胞ノ收縮及ビ胞體ノ濁濁ヲ來タシ、ニッスル體ハ相融合シテ粗大ナル顆粒ヲ周邊ニ繞ラスモノ多ク、斯クシテ其排列ハ不整トナル。同時ニコルチ器ニ於テハ内、外聽毛細胞ハ膨脹濁濁シテ境界不明トナリ、其他ハ異常ナシ。更ニ變化進メバ螺旋節細胞ハ濁濁強ク、ニッスル體ハ粗大且ツ數ヲ減ジ、或ハ微細トナリテ平等ニ細胞原形質内ニ分布シ、核内容モ漸次鮮明ヲ缺クニ至リ。染色質ハ増加スル傾向アリテ核小體モ不正形ニ膨大スルモノ、如ク(Fig. 25)、内聽道蝸牛殼神經幹、骨軸内神經纖維及ビ節外「ノイロン」ハ漸ク側緣不正トナリ髓鞘ノ蜂巢狀構造稍々不明瞭トナル。コルチ器ハ聽毛細胞ノ變化ノ外、支持細胞ハ水腫狀ニ膨脹或ハ境界不正トナリ、或ハ空隙間ヲ作り、基礎膜ハ漸ク濃染ス。更ニ變化強度トナレバ聽毛細胞ハ消失シ、コルチ器ハ全體トシテ高サヲ減ジ、各部ニ於ケル變化モ強度ニナリ。最後ニハ螺旋節細胞ハニッスル體ヲ認メザルカ。或ハニッスル體ハ微細顆粒トナリ之ヲ「ツェロイデン」切片ノ標本ニヨリ觀察スルニ全ク原形質ハ收縮濃染シテ鮮明ナラズ、原形質内ニ空隙ヲ生ズルモノアリ、核内容モ全ク不明瞭。或ハ核溶解又ハ Piknotisch ノ狀態ニアリ(Fig. 12, 31)。蝸牛殼神經纖維ハ内聽道ニテハ結節狀又ハ棍棒狀ニ膨大、又ハ絞窄シ、

骨軸内ニテハ髓鞘ハ全ク萎縮消失シテ軸索ヲノミ殘存セルガ如ク微細狹小トナレリ (Fig. 17, 18, 23, 28, 33, 34)。節外「ノイロン」亦同ジ。コルチ器モ全ク低丘狀ノ一片ノ組織塊ト化シ。萎縮濃染セル基礎膜上ニ横ハル。コルチ膜ハ萎縮削瘦シテ萎縮セルコルチ器上ニ癒着シ。ライスネル膜ハ或ハ斷裂シ。螺旋節、又ハ脈絡帶上ニ癒着セルモノ、或ハ萎縮セルモ正常ニ緊張架橋セルモノアリ。脈絡帶ハコルチ器ノ變化ノ進行ト共ニ上皮層ハ萎縮變性シテ血管腔ハ漸次消失スルニ至ルモノナリ (Fig. 14, 15, 20, 22, 30, 35 参照)。

前庭器ノ變化ハ唯ダ初期ニ於テハ聽櫛、聽斑ニ認メラレ。其神經上皮細胞ハ少シク萎縮濃染シテ不正トナリ、相互間ニ間隙ヲ生ズルニ至リ。コルチ器全ク萎縮セル時ハ之等神經上皮ハ全ク萎縮シテ高ナヲ減ジ。各細胞ノ境界ハ甚ダ不鮮明且ツ其纖毛、耳石、或ハ「クブラ」ハ融合セルガ如ク (Fig. 21, 26)。「ヘマトキシリンエオジン」染色ニヨリ「ヘマトキシリン」ニ濃染シ夫々上皮層ノ上ニ癒着シ。「クブラ」ハ同質性ニ着色シ縮小ス。前庭節細胞ハコルチ器ノ高度ノ萎縮ヲ呈スルニ至リテ漸クニッスル體ノ粗大顆粒ノ出現ヲ見排列不正ヲ來タス程度ニテ (Fig. 26, 32 参照)。更ニ變化進ミテ原形質濃染濁濁シ内容ヲ明ラカニセザルモ核ハ尙ホ明視シ得ルモノ多シ (Fig. 13)。

前庭神經纖維ハ其末梢殊ニ聽櫛、聽斑基質部結構内ヲ走ル部分ニ於テ、時ニ蝸牛殼神經纖維ヨリ却ツテ明瞭ニ所謂蛇行シ連珠狀トナルモノアリ。或ハ髓鞘削瘦ス (Fig. 29)。更ニ變化進メバ神經末梢部ノ髓鞘ハ蝸牛殼神經ト同ジク漸ク削瘦シ。染色質ノ分布不平等且ツ蜂巢模様鮮

明ヲ缺クニ至ル。之ヲ要スルニ内耳ニ於ケル主變化ハ蝸牛殼神經成分ノ退行性萎縮ト。之ニ遅レテ發現セル前庭神經成分ノ變化ニアレド、後者ノ變化所見ハ前者ニ比シ常ニ輕度ナリ。而シテ之等内耳病變ガ中耳化膿症ニ續發セルモノニ非ラザルハ一二例ニ於テハ正圓窓膜ヨリ蝸牛殼導水管及ビ内聽道ニ極ク輕度ノ炎症進展ノ像ヲ示スモノアレ共、之等ハ基礎迴轉蝸牛迴轉ニ於テスラ炎症ノ波及ナク、且ツ漿液性滲出物モナク、又斯カル炎症ヲ見ザル殘餘ノ多數動物聽器ニ於テモ蝸牛殼神經成分ノ萎縮像ヲ示スヲ以テ内耳ニ於ケル叙上ノ變化ハ特發的ニ發生セルモノト斷ジ得。尙ホ高度ナル内耳變化ハ多ク家兎ニ觀察セラル、所ニシテ、一般ニ使用藥劑乃至食餌ノ量大ニシテ期間永キモノニ惹起セルガ、「アドレナリン」實驗ニ使用セル海獺57例中、内耳萎縮ヲ見タルモノ僅カニ2例(A 10, 38 號)ニシテ、家兎ニ比シ其數甚ダ僅少ニシテ、且ツ一方同一條件下ニ遙カニ長時日飼育シ、注射量多大ナル海獺ノ大部分ガ總テ聽器ニ著變ヲ呈セザルニ反シ、之等2例ガ甚ダ短時日ニ少注射量實驗ナルニ拘ハラズカ爾所見ヲ呈セル故ヲ以テ直チニ實驗ノ結果ナリト看做スニハ一抹ノ疑念ナキ能ハズ。殊ニブライエル氏反應ノ存否ノミヲ以テシテハ聽力ノ正常、聽器狀態ノ健否ヲ萬全ニ判定シ得ベカラザル場合アルヲ以テ或ハ試驗前既ニコルチ器ノ變化ヲ有セルニ非ザルカ。家兎及ビ海獺ノ「アドレナリン」ニ對スル致死量ハ靜脈内注射ニテハ體重1 kgニ對シ 0.1—0.2mgト稱セラル、モ、皮下注射ニ際シ同量注射ヲ行フニ家兎ニ於テハ其反應強ク、呼吸速迫シ靜止狀態ヲトルニ不拘、海獺ハ平氣ニテ食ヲ漁ル等反應弱シ。實驗ニ於テハ海獺ニハ 0.1

—0.5cc フ注射シ。家兎ニ比シ 1 kgニ對スル 1 回注射量ハ海狸ノ方多量ニシテ。又試驗期日 100日以上殊ニ海狸 2 號ノ如キハ 194 日ニ亙リ。注射總量 13 gニ及ビ。此分量ハ内耳ニ高度ナル萎縮ヲ來タセル家兎ノ注射量ノ $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ ニ相當セリ。之ニ因ツテ海狸ハ「アドレナリン」注射直後ノ反應ト云ヒ。又斯クノ如キ理由ヨリ推察シテ家兎ニ比シ「アドレナリン」ニ對スル感受性鈍弱且ツ抵抗力強大ト云ハザルベカラズ。偕テ斯ク聽器ニ見タル病的所見ハ如何ニシテ惹起サレ。將又動脈硬化症ト如何ナル關係ニアルカヲ知ラザル可カラザルモ。其前ニ人類動脈硬化症性聽器ニ就キ一言セン。

人類動脈硬化症性聽器所見：本病ニ就キ初メテ詳細ニ病理組織學的檢索ヲ遂ゲタル Alexander 氏ノ 66 歳ニテ舌癌ヲ以テ死亡セル 2 年來ノ難聴ヲ訴ヘタル患者ノ聽器所見ハ。膜様蝸牛殼ト聽神經ニ局限セラレ。コルチ氏器ノ萎縮。螺旋靱帶ノ粘液變性。螺旋節細胞ノ萎縮及ビ消失ニヨル空隙形成。神經纖維殊ニ螺旋板神經纖維（節外「ノイロン」）ノ萎縮消失ヲ報ジ。斯カル變化ノ原因トシテハ同時ニ發見サレタル腦底及ビ内聽道動脈ノ硬化症ニ歸シ。脈絡帶ハ動脈硬化症ノ早期變化ニ參與シ其毛細血管ハ消失スト云ヘリ。

Manasse 氏ハ生前進行性難聴ヲ伴ヘル 14 人ノ 24 顆顆骨ヲ檢シ。常ニ次ギノ 4 ヶ所

1. 蝸牛道
2. 螺旋節細胞
3. 骨軸内神經分枝
4. 聽神經幹

ノ感覺裝置ニ變化ヲ見出シ。コルチ器ノ萎縮。ライスネル膜ノ舉上或ハ沈下。螺旋靱帶ノ水腫

樣變性。脈絡帶下部ノ結締組織新生。外淋巴腔ノ骨新生。骨軸及ビ他ノ蝸牛部分ノ色素細胞聚落。螺旋節細胞萎縮及ビ數減少。骨軸内神經纖維ノ種々ノ程度ノ萎縮及ビ結締組織新生（神經周圍炎）。神經幹ノ萎縮及ビ神經炎或ハ其一部ノ結締組織新生ヲ觀察シ。此原因トシテ特ニ高齢ナルコト。殊ニ動脈硬化症ニ歸シ。他ニ全身の疾病例之。結核。癌。肉腫。腎臟炎。微毒等ヲ舉ゲタリ。

Wittmaack 氏ハ單純ナル老年性變化トシテ高度ナル退行變性ノ聽神經ニ出現スルヤ否ヲ健康ナル老犬ニテ調査シ。老年性現象トシテ聽神經及ビ神經節細胞ニ於ケル脂肪沈着ノ外何等價値アル病的所見ヲ發見セザリシニ。唯ダ 1 匹ノ老犬ニ於テ一側ノ著明ナル聽神經及ビ蝸牛道ノ退行性變化。即チ聽神經幹ハ間質ノ輕度ノ増殖。豐富ナル脂肪浸潤アリ。髓鞘ハ明カニ節片狀化シ。神經纖維ハ殊ニ骨軸内ニテ變性崩壞シ。神經節細胞ハ脂肪沈着ト共ニ屢ニ空隙ヲ生ジ。ニッスル體ハ一々指摘シ得テ核ハ正常。コルチ器ハ聽毛細胞。桿細胞ヲ除キ萎縮アリテ扁平化シ。コルチ膜ハコルチ弓ニ密着シテ螺旋溝ヲ完全ニ被覆シ其末端ニテ初メテ對向壁ニ斜ニ架張セリ。血管ハ骨軸及ビ脈絡帶ニテハ正常犬ト對照シテ明白ニ内被細胞ノ分化ヲ示シ。爲メニ血管腔ハ狹小トナレリト報告シ。同時ニ全身臟器ニ老年性現象トアラユル血管ノ強度硬直ヲ認メ。原因トシテ高年ニ現ハル組織變化ト血管ノ硬直及ビ夫レニ附隨スル循環障礙ヲ指摘セリ。

同様ニ Jaehne 氏ハ老人性難聴 25 個ノ顆顆骨ヲ檢シ。

1. 螺旋節細胞ノ一部消失及ビ代償的結締組織

増殖。

2. 骨軸及 Tractus foraminosus = 於ケル蝸牛殼神經纖維ノ萎縮及ビ結締組織増殖。殊ニ高度ナルハ基礎廻轉ノ螺旋節細胞及ビ節外「ノイロン」ニシテ。

之等ノ部位ニ於ケル所見ヲ Jaehne 氏ハ此疾病ノ主要局所及ビ初發點ナリトシ。原因トシテ同ジク動脈硬化症ヲ主唱セリ。

Habermann 及 Brühl 氏ハ全身的動脈硬化症ノ結果トシテ蝸牛殼神經終末部殊ニ節細胞ニ多少ノ退行性萎縮ノ變化ヲ觀察シ。Alayna Panse 柏原、大原、緒方、中村氏等大同小異ノ報告アリ。要スルニ動脈硬化症ニヨリ惹起サル、聽器障礙ハ末梢「ノイロン」ノ疾患ニアリ。此病的機轉ノ本態ハ感覺細胞、神經纖維、節細胞ノ神經成分ノ退行性變化ト結締組織ニヨル代償増殖ニアリトセラル。

老人性難聴患者ノ病理組織學的檢索ニ當リ。以上ノ諸氏ハ動脈硬化症ノ同時的罹患ヲ知り。其原因ヲ本症或ハ老人性消耗ニ歸セントスルモノナレ共。眞ニ老人性難聴病理ヲ究ムルニハ生理的年齡變化ヲ專ラトシ。他ニ夫レ以外ノ年齡的變化ヲ有セザル聽器ニ因ラザルベカラズ。斯カル方針ノ下ニ遂行セラレタル多クノ研究ノ歸スル所ノ成績ハ略シ上述ノ所見ト大同小異ナリキ。此中ニアリテ Otto Mayer 氏ハ老人性難聴ノ本態ハ基礎乳頭基礎膜ノ硬直ニアリトシ。之ニヨリ臨牀的症候ヲ組織學的ニ最モ合理的ニ説明セリ。即チ氏ハ 64—84 年ノ老人性難聴患者ニツキ調査シ特有ナルハ基礎膜ノ變化ニシテハ肥厚ヲ主トシ。膜ノ上下兩側ニハ細胞組織ニ由來スルト思考セラル。「ヘマトキシリン・エオジン」染色ニテ同質性ノ赤色ニ着染セル塊

ヲ附着シ。尙ホ石灰沈着ノ著シキ所ハ化骨狀態ヲ思ハシムルモノニシテ。斯カル基礎膜ノ硬直性ハ尖端廻轉ヨリ基礎廻轉ニ至ルニ從ヒ増強シ。基礎廻轉ニ於テハ完全ニ強直ニ陥リ。且ツ年ト共ニ高度ニナルト云ヒ。検査聽器 28 例中斯カル變化ト内耳他部及ビ聽神經ノ變化ヲ兼ネタルモノ 26 例。單純ニ基礎膜ノ變化ノミヲ證明セルモノ 2 例アリ。斯クテ氏ハ高音ヲ感受ス可キ基礎廻轉基礎膜ノ變化著シキハ臨牀的ニ老人性難聴ニ特有ナル症狀上音界ノ下降。高音聽取力低下ト全ク符合セルモノトシテ。基礎膜ノ硬直ヲ強調セリ。

レデレル氏モ同様ノ變化ヲ觀察シ。此所說ヲ支持スルニ至レリ。

以上ノ如ク動脈硬化症性聽器ニ於ケル所見ハ血管ニ就キテノ變化ヲ除キ。老人性難聴聽器所見ト大差ナシ。而シテ之等諸氏ノ記載ハ單ニ剖見ノ際偶ニ腦底或ハ内聽道血管硬化ト内耳病變ガ同時ニ存在セル故ヲ以テ後者ハ動脈硬化ニヨル給血不足ニ基因ス可シト推論セルニ過ギズシテ。其間直接ノ因果關係ノ存スルヤ否ヤニ就キテハ病理解剖的根據ヲ缺ク。

少ナクトモ我々ハ動脈硬化症性聽器ヲ云々スルニ於テハ内聽道動脈或ハ頭蓋底動脈ノ硬化ニヨリ二次的ニ内耳ノ營養障礙ヲ來タシ。爲メニ其退行性萎縮ヲ來タセルモノト考フルヲ至當トス。然ラバ局所的營養障礙ヲ惹起セシムル時果シテ内耳ニハ如何ナル病變ヲ惹起シ得ルモノナリヤヲ知ラザル可カラズ。

1911 年 Wittmaack 氏ハ猫ノ一側聽神經幹ヲ内聽道入口直前ニテ挫傷。切斷シ。試驗側蝸牛殼神經。螺旋節細胞及ビコルチ器ガ同時ニ完全ナル退行性變化ヲ呈シ。前庭神經ハ著變ナカリ

ント報ジタリシガ、Siebenmann 及 Brühl 氏ハ Wittmanek 氏ノ實驗成績ハ其際血管ヲ損傷セシ爲ナラントセリ。

Wittmanek 氏＝次ギ Knick 氏ハ海猿ニ於テ同様ノ實驗ヲ行ヒシガ、迷路ノ神經組織及ビ膜様部ノ變性的變化ハ聽神經ト共ニ血管ガ切斷サレ、其結果トシテ來タレル榮養障礙ニ歸ス可キモノナリトシ、Wittmanek 氏ト同ジク前庭神經ハワレル法則ニ從ヒテ、神經損傷ノミニテハ前庭神經節細胞及ビ其終末器官ニ變化ヲ呈セザルモノトナシ、唯ダ蝸牛殼神經ニ就テハ血管損傷ノ爲メ此關係ヲ明言シ得ザルモ恐ラクワレル法則ニ反シテ變性ヲ來タスモノナラント推論セリ、其後我國ニ於テモ本問題ニ關シ神尾、西田、貝田、細見氏等ノ實驗アリ、神尾氏ハ此神經切斷ニヨリ蝸牛殼神經及ビ終末器官、前庭神經、聽櫛、聽斑等ニ著明ナル變化ヲ認ムルモ同時ニ血管ヲ損傷スルガ故ニ之ヲ眞ニ神經切斷ニ因スルモノナリヤ、又ハ榮養障礙ニ歸ス可キモノナリヤ決定スル能ハズトシ、西田氏ハ海猿ノ聽神經幹ヲ切斷又ハ損傷セシメ、又ハ延髓ニ於ケル其第1終止核ヲ破壊シ、之ニ續發スル内耳變化ヲ檢索セル後、切斷試驗後早期ニ現ハル、變化ノ大部分ハ血管ノ損傷ニヨル榮養障礙ノ結果ナリトシ、損傷試驗ニ於テモ全く血管損傷ヲ免ル、コト能ハザルヲ以テ其内耳殊ニコルチ器ニ於ケル變化ハ寧ロ血行障礙ニ基因ス可キモノナリトシ、唯ダ延髓ニ於ケル聽結節及ビ腹神經核ノ破壊ニヨリテ初メテ蝸牛殼神經ノ單純ナル神經損傷ニ續發スル變性ヲ見得ルモノニシテ、之ヨリシテ蝸牛殼神經纖維及ビ螺旋節細胞ニ比較の速カニ萎縮乃至消失ヲ見、尙ホコルチ器ハ聽毛細胞ノミ比較の速カニ萎縮ニ陥ルモ全體トシテ其

形態ヲ保持シ、長キ經過ノ後ニ器官全體ニ變性萎縮ヲ來タスモノナリトシ、更ニ此際前庭神經ハ下行性變化ヲ認メタルモ總テ輕微ニシテ、又蝸牛殼神經ハワレル法則ニ從ハズトセリ。

細見氏ハ實驗ニ當リテ血管ヲ損傷スルコトナク聽神經ヲ切斷セリトナシ、其續發的變化トシテ蝸牛ノミナラズ前庭ニ於テモ速カニ末梢神經纖維、兩節細胞ノ退行性變性ヲ認メタルモ夫等終末裝置ハ孰レモ毫モ變化ヲ見ズトシ、更ニ聽神經ト同時ニ血管ヲ損傷セル際ニ於テハ蝸牛、前庭孰レニ於テモ其末梢神經纖維、節細胞ニ著明ナル退行性變性ヲ見ルノ外、更ニ夫等終末裝置即チコルチ器、聽櫛、聽斑ニ於テ著明ナル破壊ノ行ハレタルヲ認メ、之等終末裝置ノ變化ヲ血管損傷ニヨル榮養障礙ニ歸シ、之ニヨリ迷路動脈ノ損傷セラレザル限り内耳終末器官ハ聽神經ノ荒廢ニ無關係ニ存在シ得ベシトセリ。

高原氏ハ實驗的腦腫瘍ニ因ル聽器障礙ニ關シ研究シ、小腦橋隅角部腫瘍ヲ發生セシムルニ同側聽器殊ニ内耳ニ種々ノ障礙ヲ惹起セシメ得テ、此際聽器障礙ノ主因タル腫瘍ニ因ル聽神經系ノ損傷、蝸牛殼導水管ノ閉塞及ビ内耳血液還流障礙ニシテ腦腫瘍ニ因ル全身の榮養障礙ハ極メテ輕微ナリトシ、更ニ細見說ニ左袒シテ内聽道血管ノ損傷ナキ限り内耳終末器官ハ健全ニ保持セラルト述ベタリ。

河野氏ハ家兎椎骨動脈ニ石松子末ヲ注入シテ其栓塞ヲ惹起セシメ、内耳ノ給血ヲ絶タント企テ蝸牛殼神經及ビ終末裝置ニ退行性變性ヲ來タシ、同時ニライスネル膜、半月狀軟帶ノ萎縮、脈絡帶上皮ノ消失、基礎膜固有層ニ於ケル石灰沈着ヲ見、螺旋節、神經纖維及ビコルチ器ノ變化ハ同時性ナリトシ、前庭ニハ變化僅少ナルヲ

認メ、斯クノ如キ所見ハ老人性難聴々器所見ニ
 酷似スルヲ以テ老人性難聴ハ要スルニ聽器ニ於
 ケルアラユル榮養障礙ニヨリ惹起セラル、モノ
 フ含ムト結論セリ。

園田氏ハ家兎ノ兩側椎骨動脈ノ完全結紮ト同時
 ニ兩側總頸動脈ノ不全結紮、或ハ片側總頸動脈
 ノ完全結紮ヲ行ヒテ頭部ノ慢性給血不足ヲ來タ
 サシメテ内耳ノ檢索ヲ遂ゲ、蝸牛殼神經變化ハ
 前庭神經ヨリ強度ニ且ツ頻發シテ變性萎縮ヲ來
 タシ、就中螺旋節細胞及ビ節外神經纖維ニ變化
 ヲ初發シ、神經幹ノ變化ハ後發スルモノ、如ク、
 且ツ之等ノ變化ハ基礎廻轉ニ早期ニ現ハレ、コ
 ルチ器ノ變化ハ之等神經成分ノ變化ト照應シテ
 二次的ニ續發スト述べ、且ツ迷路骨ハ骨吸收機
 轉ニ因リ Osteoporose ノ狀態ヲ呈シタルハ恐
 ラク給血不足ニアル局所性榮養障礙ニ由來セル
 ナラント云ヘリ。

Politzer 氏ハ蝸牛殼神經及ビコルチ器ノ萎縮ハ
 基底及ビ内聽道動脈ノ狹窄、後頭蓋窩、莖稜窩
 或ハ聽神經核、又ハ根部領域ニ於ケル卒中性、
 腦質炎症機轉ノ結果トシテ齎ラサレ、又聾啞ノ
 聽小骨關節ノ硬直ノ際、局所ノ腫瘍ノ壓迫ニヨ
 リテ來ルコト多シト稱ス。

以上數氏ノ實驗成績ヲ通覽スルニ内聽道血管ヲ
 損傷又ハ切斷スルコトニヨリ惹起セラル、内耳
 變化ハ蝸牛殼神經成分及ビ膜様迷路ノ退行性萎
 縮ニ外ナラズ、Alexander 氏ヲ始メ幾多ノ先人
 ノ人類動脈硬化症ニ於ケル聽器所見ト大差アル
 ヲ見ズ、

次ニ中毒性難聴、或ハ高度ノ全身の榮養障礙ノ
 際觀察セラル、内耳ノ組織學的所見モ叙上ノ成
 績ト甚ダ類似スルハ普ク人ノ知ルトコロニシ
 テ、Wittmaack 氏ノ「キニーネ」、「サルチール

酸ナトリウム」ニヨル實驗以來等シク學界ノ承
 認セルトコロニシテ喋々縷言スルヲ要セズ、

故ニ余ノ内耳ニ於ケル實驗成績ガ動脈硬化症ニ
 ヨル二次的結果ナリヤ將又「アドレナリン」其
 他ニヨル中毒ノ結果ナリヤノ判定ニハ尙ホ考察
 ノ餘地アリ。

中村教授ハ「アドレナリン」ニヨル余ト同様ナ
 ル實驗ニ於テ大、中動脈ハ勿論聽器附近ノ血管
 ニモ硬化症ノ存在スルヲ觀察セラレタルモ、余
 ノ場合ハ其變化ハ大動脈ニ限局シ、一トシテ内
 聽道血管壁ニ變性ヲ遂ゲタルモノナシ。

中村教授ハ余ノ場合ヨリ試驗期日長キニ亘リタ
 ルヲ以テ余モ更ニ實驗ヲ續行シタランニハ或ハ
 聽器附近血管ニ硬變ヲ來タシ得タランモ、余ノ
 注射量ニ於テモ既ニ内耳ニハ高度ナル萎縮ヲ來
 タセルヲ知レリ。唯ダ茲ニ注目ス可キハ基礎膜
 ノ螺旋血管 (Vas Spirale) 及ビ脈絡帶血管ハ
コルチ器ノ變化ノ消長ト相並行シ、殊ニ螺旋血
 管ハコルチ器ノ高度ニ萎縮セル時ハ必ズ之ニ伴
 ヒテ消失スルノミナラズ、コルチ器ノ變化ニ
 先立テ管壁ニ變性ヲ來タシ、管腔ハ狹小或ハ
 消失ス (兎 A27, 海狸 A30, 兎 V4, V6 號)。
 即チ前記ノ家兎ハコルチ器ニ於テハ聽毛細胞ノ
 濁濁、腫脹ヲ見ルニ過ギズシテ輕度ナル變化ナ
 ルニ、螺旋血管ハ既ニ管腔狹小又ハ消失セリ
 (Fig. 40, 41)。鶏卵投與家兎 2 及 6 號ハ他ノ卵
 黃實驗家兎ト全ク條件ヲ等シクシ、夫等ガ全ク
 高度ノ内耳萎縮ヲ出現セルニ反シ、コルチ器ハ
 正常且ツ螺旋血管ニ異狀ナシ (Fig. 42, 43)。是
 ニ由ツテ之ヲ觀ルニコルチ器ノ變性萎縮ハ螺旋
 血管ノ狹窄消失ニヨル榮養障礙トシテ續發的ニ
 發生スルモノニ非ザルカ。此點ニ關シ幾多ノ文
 獻ヲ漁ルモ余ノ寡聞ナル一ツトシテ記載セルモ

ノヲ見出サズ。

尙ホ次＝留意ス可キハ螺旋血管ト基礎膜トノ關係ニテ。基礎乳頭。即チ聽毛細胞。支持細胞等ノ細胞成分＝著變ナキ場合＝モ基礎膜ガ石灰沈着ヲ見ルガ如ク「ヘマトキシリンエオジン」染色ニテハ紫藍色ニ濃染スルコトアリテ。此際螺旋血管腔ノ存否ヲ詳カニスルヲ得ズ。此基礎膜ノ濃着色ハ或ハ標本製作中ノ脱灰操作ノ如何ニ依存スルト考ヘラル、場合ナキニ非ザルモ。斯カル時其基礎膜ノ微細構造ノ所見ヲ判定スルハ容易ナラズ。故ニ基礎膜固有層纖維ハ硝子様ニ無構造トナリ。或ハ萎縮シテ濃染シ。鼓室道被覆細胞明カニ萎縮セル時（多クノ場合コルチ器ノ全萎縮ニ伴フ）ハ問題ナシトスルモ。單ニ基礎膜ニ限定セル上述ノ所見ヲ萎縮ナリト判定スル時ハ螺旋血管ノ消失ハ基礎膜ニ續發スル二次的變化ナリト考ヘザルヲ得ズ。然ル時ハ基礎膜ノ變化ヲ始メトシ。螺旋血管之ニ次ギ基礎乳頭ハ夫等變化ニ續發スト謂フヲ得。此基礎膜ノ所見ニ就キテハ尙ホ將來ノ攻究ニ俟タザル可カラズ。

Alexander氏ハ動脈硬化症ニ於テハ脈絡帶血管ニ早期ニ變化ヲ來タスト云ヘドモ余ノ實驗ニテハ之ヲ立證スルモノナク。又脈絡帶血管ハコルチ器ノ萎縮程度ノ消長ヲ共ニスルモノ多クレ共必ズシモ然ラザルモノアリ。即チ家兎A29號。海獺A10號ノ如キハコルチ器ノ變化ハ高度ナルニ脈絡帶血管ハヨク存シ。他ノ場合ニ於テハ脈絡帶血管ハ變性シテ管腔狹小トナレドモコルチ器ノ萎縮ハ更ニ強度ナリ。之ヨリ推察セバ脈絡帶血管ハ直接ニコルチ器ノ營養ニハ參與セザル可シ。

以上コルチ器ノ萎縮ハ螺旋血管ノ機能消失ニヨ

リ證明セラルト云ヘドモ。内耳ノ他部分ニ同時性ニ出現スル變化ヲ了解シ得ルガ如キ器質的血管病變ヲ内聽道或ハ其末梢ニ於テ發見スルコト能ハザリキ。

要スルニ余ノ各物質ニヨル實驗ニ於テ得タル聽器病變ハ腦底及ビ内聽道動脈硬化症ナキヲ以テ動脈硬化症ニ起因ストハ思考シ得ズ。

全身の營養障礙即チ癯瘦ノ場合神經系統ニ障礙ヲ來タスヤ否ヤニ就キテハ幾多ノ業績アリ。

Monti, Schaffer, Jaséw, Uspenski 氏等ハ饑餓ニ因ツテ神經細胞ノ變化セルヲ記述セシモ Jacobson 氏ハ家兎ノ體重 $\frac{1}{3}$ ニ減退セシムルモ脊髓ニ於テ變化ナシト述べ。單純ナル癯瘦ニヨリテハ神經細胞ニハ認ム可キ變化ヲ招來セズト結論セリ。聽器ニ就キテハ羽根。岡崎。廣戸氏等ノ研究アリ。岡崎氏ハ家兎ニ絕對的或ハ相對的饑餓ヲ強ヒ。初メノ體重ノ 20 % 以上ヲ減少セバ聽神經及ビ其終末裝置ニ變性萎縮ヲ認ムトセリ。余ノ實驗ニ於テ體重ノ減少ヲ見タルモノアレ共岡崎氏ノ說ヲ引用シテモ願慮スル要ナカラン。

斯ク觀ジ來タレバ余ノ實驗ノ聽器變化ハ中毒ノ結果ナリト結論セザルヲ得ズ。

諸種ノ藥物。瓦斯。金屬或ハ細菌毒素等ニヨリ聽器障礙ヲ見ル事實ハ臨牀的ニモ屢ニ經驗セラレトコロナルガ之ニ病理學的根據ヲ與ヘタルハ實ニ Wittmaack 氏ニシテ。氏ハ急及ビ慢性傳染病經過中ニ現ハル、聽器障礙ニ就キ研究シ。更ニ實驗的ニ犬ニ「キニーネ」ヲ與ヘテ其聽器ヲ檢セルニ。先ヅ最初ニ螺旋節細胞ノニコルチ器ニ變化ノ來ルヲ認メ。蝸牛殼神經及ビニコルチ器ノ變化ハ尙ホ輕度ニシテ。前庭神經ニハ甚ダ影響少ナキヲ述ベタリ。

爾後藥物ニヨル聽器中毒ニ就キテノ研究ハ相次
イデ現ハレー々枚舉スルニ違アラズ Blau, Ha-
ike, Alagna, 田中氏等ノ「キニーネ」, 「サルチ
ール酸ナトリウム」ニヨル追試, 「ニコチン」ニ
因リテハフューステーク, シュレーデル, 細谷,
福江諸氏其他, 「アルコール」ニテハ中村, 坂
口, 南谷氏等, 其他「クロ、ホルム」, 磷, 砒素
等ニヨリ實驗セラレタルモ, 其組織の所見ニ至
リテハ殆ンド Wittmaack 氏ノ實驗成績ト大同
小異ニシテ, 其病變ハ囊ニ述ベタル内聽道血管
損傷ニヨル局所の營養障礙ノ所見ト所見ヲ均シ
ウス。唯ダ彼ノ場合ト同ジク病變ガ蝸牛殼神經
成分ノ何所ニ初發スルヤニ就テ尙ホ異論アリ。
又其成立機轉ニ就テモ尙ホ定説ナク, Wittma-
ack 氏ヨリ以前ニ於テ Kirchner 氏ハ「キニー
ネ」, 「サルチール酸ナトリウム」ヲ經口の又ハ
皮下注射ニヨリ動物ニ與ヘテ聽器ノ病變ヲ來タ
サシメ, 其聽器障礙ノ本態ハ中, 内耳及ビ聽神
經ニ充血及ビ出血アリシヲ以テ内耳充血ニアリ
トシ, 此内耳充血説ニ共鳴スル人多カリシモ,
Wittmaack 氏ハ之等ノ充血, 出血ハ本症ノ本
質的原因ニ非ズ, 原因ハ「キニーネ」自身ガ直
接螺旋節細胞ヲ侵ス作用ニヨル外, 尙ホ内耳循
環障礙ニ歸ス可キモノナラントセリ。
近時 Seiferth 氏ハ「キニーネ」ノ急, 慢性中毒
ノ眼球震盪症ニ就キ調査シ, 中毒時末梢迷路ハ
健全ナルニ不拘, Lagenystagmus ノ異常アル
ヲ知り, 此機轉トシテ細小血管内被細胞ノ「キ
ニーネ」有毒量攝取ニヨリ血管ヲ障礙シ, 其血
液循環異常ハ腦髓ヲ刺戟スル故ニ前庭中樞ニ影
響ナキ能ハズ, 爲メニ Lagenystagmus ヲ惹
起セルトシ, 「キニーネ」ノ聽器及ビ靜定器ニ働
ク方向トシテ次ノ三ツヲ舉ゲタリ。

1. 中樞神經系統ノ中毒ニヨル聽力障礙。
2. 聽器ノ純粹末梢の障礙。
3. 「キニーネ」ノ異常體質ニヨル蝸牛殼及ビ
前庭ノ疾患。

一般ニ毒物ガ中樞神經系ニ作用スルニハ血管ノ
機能若クハ實質ニ變化ヲ及ボシ, 二次的ニ腦實
質ニ傷害ヲ加ヘルカ, 又ハ循環障礙ヲ伴ハズ直
接一次的ニ神經實質ヲ損傷スルカノ二ツナリト
稱セラル、ガ, 聽神經ニ就テハ Wittmaack 氏
ノ見解ハ之ニ倣ヒ又近來一般ニモ信憑セラル、
トコロナリ。

「アドレナリン」ノ致死量以下ヲ家兎皮下ニ反
復注射スル時ハ慢性中毒症ニ陥リ, 剖見セバ
肺, 腎, 肝等ニ出血, 炎症, 壞死ヲ, 更ニ胃腸,
膀胱等ヲ侵シ, 循環系ニハ著變アリ, 心臟肥
大, 心筋ノ纖維性炎症, 壞死, 動脈ニハ硬化症
ヲ來タシ, 神經系統ハ中樞及ビ節細胞ノ侵サル
ルハ既述ノ如シ。即チ聽器ニ病變ヲ見ルハ要ス
ルニ一般全身中毒現象ノ一部分ニ過ギザル可シ
ト判定セザルヲ得ザルモ, 之ガ「アドレナリン」
ノ純然タル毒性ガ直接聽神經ニ作用スルモノナ
リヤ, 將又其有スル血壓充進作用ガ大ナル破壊
ヲ營ムヤ其決定ハ甚ダ困難ナリ。

迷路内壓ガ蝸牛殼淋巴液分泌力及ビ腦内壓ノ
外, 血壓ニ關係スル事實ハ多數耳科學者ノ承認
スル所, ツァツ氏ハ犬ノ正副窓ニ壓力計ヲ取り
付ケ, 「アミールニトラート」ヲ吸入セシメテ迷
路内壓ノ血壓ト並行シテ下降スルヲ認メ, スタ
イン, ベネデー氏ハ高血壓ノ下降ノ際前庭部ノ
興奮性ノ減少スルヲ報ジ, Geog Kerekes 氏ハ
200mm 以上ノ患者ニ瀉血ヲ行ヒテ血壓ヲ低下
セシメ, 7 例中 4 例ニ骨傳導及ビ會話聽力ノ輕
快ヲ來タシ, 他方頸靜脈ノ壓迫ニヨリ頭部血壓

ヲ上昇セシメ管又ニヨル音ノ消失セル瞬間壓迫ヲ去レバ再び聽力ノ恢復ヲ見タリト云ヒ。以上ノ報告ヲ總合スルニ急激ナル血壓ノ上昇及ビ下降ガ聽力ニ影響アルハ明白ニシテ、從ツテ「アドレナリン」ノ反復注射ニ由來スル迷路内壓ノ動搖ガ延イテハ機能的ノミナラズ漸次内耳ノ組織的變化ヲ惹起シ、他方聽神經ヲ直接侵害スルト共ニ頻發スル血管收縮ニ歸セラル、一時的貧血、内分泌相互作用ノ失調ニヨル體液ノ變化、更ニ進ンデハ諸臟器ノ機能低下ハ相倚リ相助ケテ内耳ノ病的機轉ニ拍車ヲ加フルモノナラン。「ヴィガントール」及ビ「バリウム」ニヨル内耳ノ變化モ恐ラク「アドレナリン」ト同様一般中毒ノ一分象ニシテ大動脈硬化症トハ直接關係ナキハ事實ノ證明スルトコロナリ。

卵黃過剰投與ノ内耳障病ハ卵黃成分ノ孰レガ機轉ニ關與スルカハ明白ナラザレ共、「コレステリン」ノ存在ガ與ツテ大ナルハ疑ヲ挟ム餘地ナカル可ク、卵黃ニ限ラズ腦質、「バタ」、「ラノリン」等「コレステリン」ニ富メル物質ニテ家兎ヲ飼養セシムルニ、家兎ハ「コレステリン」ノ燃燒惡シキ爲メ容易ニ Hypercholesteriämie ノ状態ヲ現ハシ、身體各部ニ脂肪ノ沈着ヲ來タシ血液成分ノ變化、肝硬變、脾肥大、實質性腎臟炎、副腎肥大、大動脈「アテロマトーゼ」ヲ合併シ、此中最モ強ク侵サルハ肝臟及ビ血管ナリ。更ニ肉食獸ヨリモ草食獸ニ發來シ易キハ、前者ニアリテハ「コレステリン」ノ排泄佳良ナルガ爲ナルヲ想ヘバ「コレステリン」代謝ノ如何ニ重大ナル影響ヲ齎ラスカラ了解シ得ベシ。一般ニ老人、殊ニ高血壓、及ビ動脈硬化症患者ニ於テハ Hypercholesteriämie ヲ呈スルハウエストファー、マヤスニコフ氏等ノ多ク承

認スルトコロニシテ、Berberich 氏ハ脂肪新陳代謝ト耳ノ關係ニ就キ詳細ニ檢索シ、生理的老年性動脈硬化症、「アテロマトーゼ」又ハ老人性消耗等ニヨツテ起ルガ如キ所謂固有ノ老人性難聽ナルモノハ本來存在セズ、斯カル難聽ハ Hypercholesteriämie ナル物質代謝障病ノ結果ナルガ、Otto Moeyer 氏ノ所謂基礎膜硬直ハ該部ノ「コレステリン」ノ沈着大ナル爲メ其組織ノ伸展能力或ハ膨脹能力ヲ失フメナリト述べ、更ニ氏ハ Hypercholesteriämie ノ起ルハ内分泌、體質、又ハ他ノ内的原因ニヨルトシ、高血壓ト老人性難聽トハ共ニ之ニ基因ストセリ。

中道氏ハ脂肪食餌ヲ以テ家兎ヲ飼ヒ、外、中耳、コルチ器、蝸牛殼神經ニ脂肪浸潤ヲ認メ、コルチ器ノ萎縮セルヲ觀察シ、殊ニ脈絡帶毛細管ハ内耳ノ他部分ヨリ先ンジテ脂肪ノ沈着スルヲ知リ、内耳ノ所見ハ甚ダ老人性難聽變化ト酷似セルヲ述べ、脂肪質ガ組織細胞ニ浸潤シテ機能ニ障病ヲ與ヘ、抵抗力ヲ減弱セシムルト共ニ其含有スル化學的物質ハ或ハ血壓ヲ亢進セシメ、或ハ細胞ヲ刺戟スル等種々ノ作用ニ由來ス可シト説ケリ。

余モ氏ノ説ニ左袒スルモノニシテ、卵黃投與ニヨリ Hypercholesteriämie 其他ノ化學的刺戟ニヨリ諸器官ノ作用妨害サレ、一般新陳代謝ノ失調ヲ見ルニ至リ、Hypercholesteriämie ニ附隨スル血壓亢進モ亦無關心ニ在ル能ハズシテ、内耳ノ病變モ斯クノ如キ全身の中毒ノ一分象ナリト信ズ。

即チ余ノ場合ニテモ脂肪ハ聽神經ノミナラズ、脈絡帶、ヘンゼン氏細胞、中耳粘膜、聽小骨筋等ニ沈着シテ直接聽器ノ作用ヲ侵害スルノミナ

ラス、Hypercholesterämie ノ全身の障礙ニヨリ斯カル變化ヲ招來スルモノナル可シ。

Otto Mayer 氏ハ老人ニ現ハル、難聴ヲ次ノ如ク區別セリ。

1. 老人性難聴、即チ有アラユル人ニ來タリ、年齢其者ニヨリ惹起セラル、難聴ニテ、其病理解剖學的根據ハ基礎膜強直ナルハ既述ノ如シ。此變化ハ眼球硝子體ノ Sklerosierung ト一部分同定義ニシテ老視ガ惹起サル。

2. 老人病 (Atheromatose, Marasmus) ニヨリ惹起セラル、難聴。其解剖的の根據ハ迷路及ビ聽神經ノ退行變性ニアリ。

3. 年齢トハ無關係ニ存在スル疾病。之ニ屬セルモノハ種々ノ原因ニヨル漸次進行スル迷路及ビ聽神經ノ退行變性（進行性迷路性難聴及ビ骨性迷路ノ局所性疾患 Osteofibrosa ニテ、之ハ屢々 Labyrinthatrophie ト合併ス）。

此分類ニ從ヘバ余ノ卵黃ニヨル聽器所見ハ Atheromatose ニヨリ惹起セラル、老人性難聴々器ト原因。結果ヲ等シウスト云フ可シ。

以上説キ來タルガ如ク、余ハ余ノ實驗ニヨリ獲タル内耳ノ退行性變化ハ總テ中毒ニ基因スルト斷言スルニ躊躇セズ。然レ共茲ニ一ツノ重大ナル疑問アリ。即チ動脈硬化症ニヨル聽器病變ヲ云々センガ爲メニハ唯ダ該局所ノ血管硬變ヲ同時ニ合併スルヲ要スルヲ以テ、局所血管ノ變化ガ先行シテ二次的營養障礙ヲ來タス結果、内耳ノ變化ヲ招來セルモノニ就テハ異論ナキモ、既ニ動脈硬化症ノ原因論ノ條下ニテ論述セル如ク、動脈硬化症ハ體質的素因ノ外、長年月ニ亘リテ蒙ムレル外來乃至内の刺激ノ結果ナリト看做サル可キヲ以テ、之等ノ刺激ハ又同時ニ甚ダ鋭敏微妙ナル内耳ニモ影響ヲ來タシ得ル筈ナ

リ。斯クノ如ク動脈及ビ内耳ニ各獨立のニ然モ同時性ニ變化來タル場合ヲモ之ヲ動脈硬化症性内耳變化(難聴)ナル「カテゴリー」内ニ包含シ得ベキヤ否ヤ適確ナル定義ナキガ如シ。曩ニ述ベタルガ如ク、人類動脈硬化症ハ全身血管ノ同時ニ罹患スルニ非ズシテ最も多ク先ヅ大動脈ニ惹起セラレ、更ニ中血管ヨリ漸次細小血管ニ波及スルモノヲ普通トスル故。前記諸氏ノ人類動脈症性聽器症例ニ於テ腦底血管ノ硬化症ノ結果ナリト推定セラレタル内耳病變モ該局所血管ニ異常ヲ招來セザル以前、例ヘバ漸ク大動脈硬化症ヲ惹起セル際ニ既ニ出現セルヤモ保シ難ク Boeningshaus 氏ハ動脈硬化症前期ニ來タル内耳ノ變化ハ眞ノ萎縮ニ非ズ、神經炎ニシテ又「酒精」、「ニコチン」中毒、微毒等ニ際シテモ見ルト云ヘリ。

故ニ余ハ斯カル場合ハ各々獨立セル疾病ト判定スルヲ安全ト信ズ。

信憑スルニ足ル統計ヲ缺クヲ以テ結論ヲ下シ得ザルモ、單純ナル大動脈硬化症ガ二次的ニ營養障礙ヲ聽器マデ波及セシメ得ルヤ否ヤ、固ヨリ大動脈變化部位ノ廣狹、強弱ニヨリ差異アルベケレド、比較的高度硬變ノ際ニスラ上膊測定ニヨル血壓ハ増進セズ、唯ダ左心室肥大シテ血液循環ヲ良好ナラシムル事實ヨリ推思シテ恐ラク否定的ニ傾ク可ク、殊ニ胸部大動脈邊ニ散在性ニ硬變斑ヲ見ルニ過ギザルガ如キ場合ハ更ニ無影響ナル可シ。

之ヲ余ノ實驗ニ見ルニ、殊ニ卵黃6號ハ、上行、下行大動脈ハ全周ヲ圍繞シ更ニ腹部大動脈、腸骨動脈分岐部迄強度ニ硬變セルニ不拘、内耳ニハ螺旋節細胞及ビ神經纖維ニ僅カニ變化アルヤヲ疑ハシムル程度ニテ著明ナル病的所見ヲ呈セ

ズ（家兎 A 23, 卵 2, 6 號）。反之内耳ハ全ク萎縮高度ナルニ大動脈ハ正常ナルモノアリ（家兎 A 25, A 26, A 28, A 30 號）。是ニ由テ之ヲ觀レバ、斯カル内耳所見ハ硬化症以外ニ原因ヲ求ム可キモノニシテ、園田、奥島氏が大動脈硬化症ノ存在ノミヲ以テ直チニ内耳變化ガ夫レニ歸因スト斷ゼルハ些カ早計ニ失スルナラン。

要スルニ實驗的ニハ大動脈硬化症ト聽器變化ト同時ニ發生スルコトアルハ事實ナルモ兩者間ニ一定ノ並行セル關係ハ存在セズト信ズ。

以上ヲ總括スルニ、余ノ「アドレナリン」、「ヴィガントール」、「カルチウム」、「バリウム」及ビ

結

余ハ家兎及ビ海狸ニ於テ「アドレナリン」、「ヴィガントール」、「カルチウム」、「バリウム」ヲ應用シテ「アドレナリン」型動脈硬化症ヲ、鶏卵黃投與ニヨリ「コレステリン」型動脈硬化症ヲ惹起セシメントシ、家兎ニ於テ之ニ成功シ得タリ。而シテ血管ノ硬變ハ大動脈ニ殆ンド限局セルモノ多ク、内聽道血管ニハ異常ヲ見ズ。之等物質ニヨル動脈硬化症兩型ニ於ケル聽器病變ニハ差異ヲ認メズ。内耳ノ病變ハ退行性萎縮ニシテ、此原因ハ大動脈硬變ニ因ル二次的ノモノニ非ズシテ動脈及ビ聽器相互間ニハ從屬的關係ナク、各ニ特發的ニ惹起サルモノニシテ、内耳ノ變化ハ中毒ニヨリ惹起セラルモノト信ズ。即チ余ハ聽器ニ於テ次ノ如キ所見ヲ得タリ。

1. 「アドレナリン」、「ヴィガントール」、「カルチウム」、「バリウム」ノ應用ニヨリ家兎ノ外、中耳ノ化膿性炎症機轉ヲトルモノ多シ。又鶏卵黃投與實驗ニ於テモ尠カラザル率ニ於テ本症ニ罹患ス。

1. 「ヴィガントール」實驗ニヨリテ中耳粘

卵黃ニヨル内耳ノ變化ハ、大動脈硬化ヲ少數例ニ惹起セシメ得タルモ内聽道血管（恐ラクハ腦底血管ニモ）ニハ硬化症ヲ見ザリシヲ以テ動脈硬化症性病變ト解シ難ク、中毒性ナリト稱ス可ク、唯ダ一方ニ動脈硬化症ヲ招來シ得ルト共ニ他方ニ聽器ニ影響セルモノナリ。又老人性難聴ハ年齡的要約ノ外、長年月ニ亘ル種々ナル外的刺激或ハ中毒ノ總和ニヨルト了解シ得ベク偶々斯クノ如キ場合、内因的素質ヲ有スルモノニ於テ動脈硬變症ヲ併發セルモノアル可シ。

此意味ニ於テ余ノ實驗ハ老人性難聴ノ一端ヲ闡明セリト云フヲ得ベシ。

論

膜上皮ノ増殖肥厚セルモノアルヲ認メタリ。

1. 外、中耳ノ化膿性炎症ハ夫等物質ノ中毒ニヨル體力ノ低下ニ基因スル二次的結果ニシテ唯ダ「ヴィガントール」實驗ニテハ中耳粘膜ノ増殖肥厚モ此化膿機轉ニ參與セルナル可シ。

1. 鶏卵黃投與實驗ニ於テ 5 例中 2 例、殊ニ 1 例ニハ馬鐙骨脚間腔ニ著明ナル Pseudoxanthom ノ新生ヲ見タリ。

1. 此 Pseudoxanthom 中ニハ結締織及ビ骨組織ノ新生ヲ見、之等新生組織中ニハ「コレステリン」針狀結晶ヲ認ム。

1. 内耳ノ變化ハ螺旋神經節、神經纖維及ビコルチ器即チ蝸牛殼神經成分ノ退行性萎縮、脈絡帶及ビ其血管、ライスネル氏膜ノ沈降、斷裂ヲ主變トセリ。

1. 蝸牛殼神經ノ 3 成分ノ病變ハ同時性ニ現ハル、ガ如シ。

1. コルチ器ノ高度萎縮ニハ必ず螺旋血管ノ消失或ハ狭小ヲ伴ヒ、且ツコルチ器ノ變化高度ナラザルニ既ニ螺旋血管腔ノ狭小、或ハ消失ヲ

見ル。

1. 前庭ノ變化ハ一般ニ蝸牛ニ比シ輕微ニシテ、主ニ聽櫛、聽斑及ビ夫等基質結締組織中ノ前

庭神經末梢ノ退行性變化ナリ。

1. 内耳ノ萎縮ハ使用セル物質質ノ多寡ニ正比例セル場合多シ。

撰筆スルニ當リ御篤懇ナル御指導ト御校閲ヲ賜ハリシ恩師阿久根教授ニ對シ
衷心ヨリ謝意ヲ表スルト共ニ教員諸氏ノ御好意ヲ深謝ス。

主 要 文 獻

1) 伊藤幸藏：「コレステリン」投與ニ於ケル家兎ノ聽器病變ニ就テ。大日耳鼻。第37卷。2) 林春雄：「アドレナリン」ノ副作用及ビ使用時ノ注意。東京醫誌。第749-1774號。明治45年。3) 羽根喜一：榮養不及ニ因ル身體衰弱時ニ於ケル聽器組織學的變化ニ關セル實驗的研究。耳鼻臨牀。第10卷。(大正4年)。4) 花田清：頭蓋底骨折ノ實驗的研究。大日耳鼻。第36, 37卷。5) 西田文治：聽神經ノ損傷ニ因ル中樞變化。大日耳鼻。第29卷。6) 西田文治：聽神經終末器官ト同神經聽路トノ相對的及ビ續發的各變化ノ病理實驗。耳鼻臨牀。第15卷。(大正12年)。7) 西端讀一：耳迷路ト内分泌腺器並ニ自律神經トノ關係ニ關スル實驗的研究。大日耳鼻。第35卷, S. 161。8) 星野、廣川：前庭迷路生理學補遺。大日耳鼻。第29卷, S. 44。9) 皇島壽：特殊飼養ニ因ル實驗的肝硬變。日病理會誌。第11卷。10) 細見英：聽神經機能遮斷後ニ於ケル内耳ノ組織的變化ニ就テ。大日耳鼻。第35, 37卷。11) 細谷雄太：聽器ニ於ケル「ニコチン」中毒ノ實驗。大日耳鼻。第19卷。12) 細谷雄太：全身諸病ニ併發スル耳鼻咽喉科疾患。13) 岡崎健四郎：饑餓ニ因ル聽器ノ組織學的變化ニ就テノ實驗的研究。耳鼻臨牀。第20卷, 昭和2年。14) 岡野治三：高齢者ノ聽器病理ニ關スル知見補遺。大日耳鼻。第41卷, S. 1404。15) 岡林義一：耳迷路ト内分泌腺器並ニ植物神經トノ關係ニ就テノ實驗的研究。大日耳鼻。第41卷, S. 1391。16) 小野忠信：Vitamin B 缺乏症ノ聽器病理ニ關スル實驗的研究。大日耳鼻。第37卷, S. 1023。17) 小野忠信：Vitamin C 缺乏症ノ聽器病理ニ關スル實驗的研究。大日耳鼻。第35卷, S. 91。18) 奥島八郎：Vitamin D 製劑過剰投與ニ因ル聽器病理ノ實驗的

研究。大日耳鼻。第42卷, S. 1798。19) 大澤朗：人體聽器脂肪ノ系統的研究。大日耳鼻。第40卷。20) 緒方周一：老人性難聴ニ就テ。熊本醫會誌。第3卷。21) 渡邊淡水：聽器脂肪ノ研究。大日耳鼻。第28卷, S. 273。22) 川村麟也：生物體內ニ於ケル「コレステリン」新陳代謝ノ研究。北越醫會誌。第37卷。(大正10年)。23) 川村麟也：脂肪及ビ類脂肪。日病理會誌。第7卷。24) 上山通交：Adrenalin ニ因ル血管變化ニ及ボス Vitamin D ノ影響ニ就テ。長崎醫會誌。第12卷, S. 307。(昭和9年)。25) 河野敏之：内耳ノ循環障礙ニ關スル實驗的研究。京府醫大誌。第3卷, S. 409。26) 河野弘：「アドレナリン」注射ニ因ル中樞神經系ノ變化ニ就テ。慶應醫學。第9年, S. 2127。27) 片山正一：家兎ニ於ケル Vigantol 投與實驗。大日耳鼻。第36卷, S. 538。28) 鴨井楠矩：「デキタリス」飼養ニ依ル家兎ノ動脈硬化症及ビ真正萎縮腎ノ實驗的生成ニ就テ。東京醫會誌。第39卷, S. 601。29) 鹿沼政雄、片山泰吉：頭蓋内血行障礙ノ音響性耳鼓反射ニ及ボス影響ニ就テ。30) 貝田好美：聽神經損傷後ノ内耳ノ運命。Jap. J. of med. sci. XII. 21) 片瀬波：「アドレナリン」動脈硬化症ニ關スル實驗的研究。東京醫會誌。第28卷, 第3號。32) 神尾友修：聽神經切斷後ニ於ケル内耳變化。大日耳鼻。第18卷, S. 209。33) 吉井丑三郎：内分泌ト聽器トノ關係ニ就キテノ實驗的研究。大日耳鼻。第25卷。34) 吉井丑三郎：外傷ニ因ル聽器障礙ノ實驗的研究。大日耳鼻。第16卷, S. 119。35) 吉田瑤也：「アドレナリン」及「ピロカルピン」反射注射ノ前庭機能ニ及ボス影響ニ就テ。大日耳鼻。第33卷。36) 高楠了經：「アドレナリン」及「ピロカルピン」注射ニ因ル神經

細胞ノ變化。日新醫學。第11卷, S. 71, (大正13年)。
 37) 高原滋夫: 聽器ニ因ル聽器障礙ニ關スル實驗的研究。大日耳鼻。第42卷, S. 1829。 28) 田村利雄: 高血壓症ト動脈硬化症。 39) 武田勝馬: 「コレステリン」新陳代謝ト腦下垂體ノ關係ヲ論ジテ之ト他種分泌腺トノ相互關係ニ及ブ。北海醫會誌。8年, (昭和5年)。 40) 國田四郎: 老人性難聴ニ關スル實驗的研究。京府醫大誌。第13卷。 41) 國田四郎: 內耳諸組織ノ慢性循環器性營養障礙ニ因スル實驗的研究。大日耳鼻。第39卷, S. 554。 42) 角田隆: 人動脈硬化症ト實驗的家兎動脈硬化症ノ異常論。京府醫大誌。第102號, (大正12年)。 43) 中村登: 「オトスクレロゼ」ハ之ヲ動物體ニ惹起シ得ルカ。大日耳鼻。第20卷, S. 259。 44) 中村登: 種々ナル人工的處置ニヨリ血管壁ノ肥厚ヲ惹起セシメタル家兎ノ聽器組織の檢索。大日耳鼻。第23卷, S. 320。 45) 中村登: 耳硬化症ト動物實驗。耳鼻臨牀。第10卷。 46) 中村登: 血管硬化症ト聽器トノ關係ニ就テ。京都醫會誌。第15卷。 47) 中村博郷: 聽器脂肪物質ニ關スル實驗的研究。大日耳鼻。第41卷, S. 593。 48) 中道吉亮: 聽器脂肪問題ノ實驗的研究。日病理會誌。第11卷。 49) 中道吉亮: 聽器ノ脂肪問題。大日耳鼻。第26卷。 50) 中道吉亮: 老人性難聴ノ本質ヲ論ズ。大日耳鼻。第27卷。 51) 中院孝圓: 人工的「コレステオトーゼ」及ビ生體染色ニ於ケル知見補遺。北越醫會誌。第32卷。 52) 中馬優: 「ラノリン」飼養ニヨル家兎臟器ノ變化ニ關スル研究補遺。大阪醫會誌。第21卷。 53) 村田宮官, 片岡茂樹: 去勢ノ人工的食餌性動脈硬化ニ及ボス影響ニ就テ。日病理會誌。第7卷。 54) 梅原信正: 白米飼養ニ因スル家兎ノ肝臟變化及ビ大動脈內膜ノ「キサントマーゼ」ニ就テ。日病理會誌。第7卷。 55) 久保雅之吉: 日耳鼻全書。第3卷。 56) 工藤外三郎: 血管硬變。日病理會誌。第3卷。 57) 山口正道: 鳥類ニ於ケル「コレステリン」新陳代謝ニ就テ。北越醫會誌。第37卷, S. 118。 58) 山川強四郎: 亞砒酸ヲ以テ行ヘル聽器病理學的研究。大日耳鼻。第36卷, S. 511。 59) 山極勝三郎: 大動脈硬變ニ就テ。中外醫報。第907-930號。 60) 松井太郎: 頭部鬱血ニ因ル聽器病變ノ實驗的研究。大日耳鼻。第25卷。 61) 松田廉一: 偏食(蕎麥粉)飼育ニヨ

ル「ラッテ」聽器內耳ノ病理組織學的研究。愛知醫會誌。第40卷。 62) 福江威一: 「ニコチン」ノ聽器ニ及ボス影響ニ關スル知見補遺。京府醫大誌。第1卷。 63) 小林正平: 黃燐ノ家兎及ビ「ラッテ」ノ聽器ニ及ボス影響ニ就テノ實驗的研究。大日耳鼻。第36卷, S. 505。 64) 今裕: 動脈硬變症ノ動物試驗の方面。日病理會誌。第3卷, (大正8年)。 65) 今裕: 實驗的動脈硬變症ニ於ケル解剖的變化。日病理會誌。第3卷。 66) 今裕: 脂肪及ビ脂肪樣物質ヲ以テ飼養セラレタル動物ノ解剖的研究知見。日新醫學。第9年, 第9號。 67) 今裕: 再ビ卵黃及ビ肝臟粉末飼養試驗。日病理會誌。第5卷。 68) 今裕: 硬固結核組織ノ脂肪變性殊ニ動脈硬變症ト之トノ關係ニ就テ。日病理會誌。第4卷。 69) 小西備一: 家兎ニ於ケル經口の蔗糖投與ノ聽器ニ及ボス影響ニ就テノ實驗的研究。大日耳鼻。第42卷, S. 293。 70) 小山卓郎: 「タリウム」ノ聽器ニ及ボス影響ニ就テノ實驗的研究。大日耳鼻。第37卷。 71) 坂口博通: 酒精ノ聽器ニ及ボス障礙ニ就テノ實驗的研究。愛知醫會誌。第40卷。 72) 佐竹寧: 「グイタミン」B 缺乏症家兎聽器ノ病理組織學的研究。大日耳鼻。第41卷。 73) 佐藤敏二: 血壓ト耳鳴トノ關係。大日耳鼻。第21卷, S. 1078。 74) 齋藤虎二: 甲狀腺ト聽器。大日耳鼻。第37卷, S. 758。 75) 菊池晴二: 難聴者ノ聽器ニ於ケル病理研究。大日耳鼻。第15卷, S. 112。 76) 清野謙次, 東原一雄: 「アドレナリン」「エフェドリン」及「ミドリアチン」中毒ニ因ル實驗的動脈硬化症ニ就キテ。京都醫會誌。第15卷。 77) 宮本種美: 藥劑中毒ニ因ル聽器障礙ニ關スル實驗的研究。大日耳鼻。第37卷, S. 619。 78) 宮田篤郎: 老人性難聴ト診斷セラレタル患者3名ノ聽器標本供覽。大日耳鼻。第23卷, S. 310。 79) 水越傳一: 人工的ニ血液ヲ失ハシメタル家兎ノ聽器ニ於ケル組織學の所見。大日耳鼻。第22卷。 80) 下平軍平: 細菌毒素ノ聽器ニ及ボス實驗的研究補遺。 81) 島野貞次: Vitamin D 過剩症ノ研究。大日耳鼻。第41卷, S. 453。 82) 廣戸節三: 貧血ニ因ル聽器障礙ニ關スル實驗的研究。京府醫大誌。第16卷。 83) 鈴木保雄: 精馬「エキス」其他ノ藥物並ビニ細菌毒素ノ聽器ニ及ボス影響ニ關スル實驗的研究。京府醫大誌。第17卷。 84) 杉浦義信: Vitamin D 投與動物ノ病

理組織學的研究補遺。病理學紀要。第9卷。(昭和8年)。85) 杉沼崇夏：動脈硬化症ノ實驗的研究補遺。成醫會誌。第49卷。81) **Alagna**: Beitrag zur normalen u. pathologischen Histologie des Akusticus. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 59, (1909). 87) **Alexander**: Zur pathologische Histologie des Ohrlabyrinthes mit besonderer Berücksichtigung des Cortischen Organs. Arch. f. Ohrenheil. Bd. 56, s. 1, (1902). Labyrinthitis chronica ossificans. Monatschr. f. Ohrenheil. Bd. 40. 88) **Beront**: Herdförmige Veränderungen. in Stamme des N. cochlearis mit partiellen Schwund der Ganglienzellen bei akuter Ertaubung eines Tauberculosen. Monatschr. f. Ohrenheil. Bd. 40, s. 717, (1906). 89) **Berberich**: Beitrag zur Klinik u. Therapie d. Altersschwerhörigkeit. Zentralbl. f. Ohrenheil. Bd. 26. 90) **Biedel**: Innere Sekretion. 91) **Brühl**: Beiträge zur pathologischen Anatomie d. Gehörorgans. Zeitschr. f. Ohrenheil. Bd. 50, (1905). 92) **Dedek**: Die Arteriosklerose d. Ohrlabyrinthes. Monatschr. f. Ohr u. Lary-Rhin. 53 Jahr, (1919). 93) **Denker u. Kahler**: Handbuch d. Hals-Nasen-Ohrenheil. 99) **Démétrades**: Experimentell-pathologische Untersuchungen über die vasomotorischen Störungen des Gehörorgans. Monatschr. f. Ohrenheil. 59 Jahrg. (1925). 95) **Friedrich**: Die Arteriosklerose d. Zentralnervensystems. Handbuch d. Neurologie Bd. 9. 16) **Gustor**: Arteriosklerose d. Ohres. Handbuch von Denker u. Kahler Bd. 2. 97) **Habermann**: Nervenatrophie in d. Schnecke. Arch. f. Ohrenheil. Bd. 12. 98) **Hauke**: Experimentelle Untersuchungen zur Kenntniss d. Wirkung d. Natrium salicylicum u. Aspirins auf das Gehörorgan. Arch. f. Ohrenheil. Bd. 63. 99) **Ignatowski**: Über die Wirkung d. tierischen Eiweisses auf d. u. d. parenchymatösen Organe d. Kaninchen. Virchows Arch. Bd. 198, (1909). 100) **Jachme**: Die anatomischen Veränderung bei Altersschwerhörigkeit. Arch. f. Ohrenheil. Bd. 64, 65. 101) **Leicher**: Innere Sekretion u. Krankheiten des

Ohres usw. 102) **Lorand**: Das Altern, seine Ursachen und Behandlung. 103) **Nager**: Über postmortale histologische Artrfakte an N. acust. u. ihre Erklärung, ein Beitrag zur Lehre der Corpora amylacea. Zeitschr. f. Ohrenheil. Bd. 51, (1906). 104) **Nager u. Yoshii**: Zur Kenntniss der cadavösen Veränderung des inneres Ohres. Zeitschr. f. Ohrenheil. Bd. 60, (1910). 105) **Mauasse**: Über chronische, progressive labyrinthäre Taubheit. Zeitschr. f. Ohrenheil. Bd. 52. 106) **Mayer**: Das anatomische Substrat der Altersschwerhörigkeit. Arch. f. Ohr-nasen-kehl. Bd. 105. 107) **Ohara**: Veränderung des Gehörorgans bei Arteriosklerose. Zentralblatt f. Ohrenheil. Bd. 9, (1911). 108) **Politzer**: Über Anastomosen zwischen Gefässzirken des Mittelohres u. des Labyrinths. Arch. f. Ohrenh. Bd. 11. 109) **Rauch**: Zur Pathol. der Labyrinthatrophie. Klin. Beiträge zur Ohrenheil, (1919). 110) **Seiferth**: Über die Wirkung des Chinins auf d. Gehörorgans u. den Vestibularapparat, zugleich ein Beitrag zur experimentellen Lagenystagnus. Zeitschr. f. Hals- Nasen- Ohren. Bd. 37, (1935). 111) **Seligmann**: Die progressive nervöse schwerhörigkeit u. Edingers Theorie von Aufbrauchkrankh. des Nervensystem. Monatschr. f. Ohrenheil. Bd. 11, (1906). 112) **Shima**: Arbeiten aus d. Neuralgie Inst. an d. Wiener Univers. Heft. 14, (1904). 113) **Schwabach**: Anatomische Befunde an Taubstumm-labyrinthen. Zeitschr. f. Ohrenheil. Bd. 48, (1904). 114) **Stein**: Die Arteriosklerose des Gehörorgans. Handbuch der Neurologie des Ohres. Bd. 2. 115) **Voss**: Stoffwechselstörung und Ohr. 116) **Werner**: Die histologische Fixation des Innenohres. Zeitschr. f. Hals- Nasen- Ohren. Bd. 41, (1936). 117) **Wittmaack**: Die toxische Neuritis acustica u. die Beteiligung der zugehörigen Ganglien. Zeitschr. f. Ohrenheil. Bd. 47, (1904). Weitere Beiträge zur Kenntniss der degenerativen Neuritis u. Atrophie des Hörnerven. Zeitschr. f. Ohrenh. Bd. 53, (1907). Über die pathologisch-anato-

mischen Grundlagen des nichteitrigen Erkrankungsprocess des inneren Ohres u. des Hörnerven. Arch. f. Ohrenheil. Bd. 99, (1909). Über die Wirkung des Chinins im Gehörorgan. Passows Beiträge Bd. 12, (1919). Über sekundäre Degeneration im inneren Ohr nach Akustikusstamm-

verletzung. Zentralbl. f. Ohren. Bd. 9, Über experimentelle degenerative Neuritis des Hörnerven. Zeitschr. f. Ohrenheil. Bd. 55, 118) Zwischoch: Altersschwerhörigkeit u. Blutdrucksteigerung. Folia otolaryng. Januar, (1931).

附 圖 說 明

第 1 圖 「アドレナリン」型動脈硬化症ヲ惹起セル大動脈ヲ示ス(家兎 A14 號)。

第 2 圖 同上大動脈硬變部ノ組織の所見(「ワイゲルト」彈力纖維染色法) 内膜ハ其構造ニシテ一部缺損シ中膜彈力纖維ハ直線狀トナリ壞死ニ陥ル。

第 3 圖 同上 (「ヘマトキシリンエオジン」染色)。

第 4 圖 大動脈中膜ノ石灰沈着及ヒ動脈内膜缺損ヲ示ス(家兎 V10)。

第 5 圖 「コレステリン」型動脈硬化症ヲ惹起セル大動脈ヲ示ス(鶏卵黃 3 號)。

第 6 圖 同上(鶏卵黃 4 號)。

第 7 圖 「コレステリン」型動脈硬化症ノ組織的所見(「ワイゲルト」彈力纖維染色)。

内膜面ニハ幼弱ナル彈力纖維ノ増殖アリ(鶏卵黃 3 號)。

第 8 圖 同上 (「ヘマトキシリンエオジン」染色) 内膜ノ肥厚明カナリ。

第 9 圖 同上(同上)(鶏卵黃 4 號)。

第 10 圖 螺旋節細胞ノ殆ンド變化ナキヲ示ス。(海鯊 A50 號) (「トルイゲンブラウ」染色)。

第 11 圖 前庭節細胞ノ全ク正常ナルヲ示ス(同上)。

第 12 圖 螺旋節細胞ハ或ハ縮小シテ不正形トナリ胞體。核共ニ濃染シ或ハ胞體內ニ空胞ヲ生ジ又崩壞ス(家兎 A26 號。「トルイゲンブラウ」染色)。

第 13 圖 前庭節細胞ノニッスル體ハ融合シテ其境界不明。雲架狀ノ像ヲ示ス(家兎 A26 號「トルイゲンブラウ」染色)。

第 14 圖 コルチ器ノ萎縮ヲ示ス(家兎 A25 號)。

第 15 圖 同上コルチ器擴大圖。

基礎乳頭ノ各細胞ハ漸ク萎縮セントシ基礎膜ハ濃染シ。螺旋血管ハ既ニ消失ス。

第 16 圖 コルチ器ノ萎縮ヲ示ス(家兎 A26 號)。

第 17 圖 骨軸内蝸牛殼神經纖維ハ全ク萎縮シテ鬆粗トナル(家兎 A26 號 ワイゲルトパール 神經髓鞘染色)。

第 18 圖 同上擴大。

第 19 圖 前庭節細胞ニッスル體ノ粗大ニ融合セルヲ示セド變化ハ至ツテ輕度ナリ。(AK1 號。「トルイゲンブラウ」染色)。

第 20 圖 コルチ器ノ萎縮セルヲ示ス(AV1 號)。

第 21 圖 聽節上皮細胞ハ萎縮シテ排列稍々亂レ「クブラ」ハ短小融合ス(AK1 號)。

第 22 圖 コルチ器ノ萎縮ヲ示ス(AK2 號)。

第 23 圖 蝸牛殼神經纖維(骨軸内)ノ稍々萎縮セルヲ示ス(AK4 號 ワイゲルトパール 神經髓鞘染色)。

第 24 圖 螺旋韌帶骨膜近接部ノ纖維ハ膨脹シ「エオジン」嗜好色トナル(海鯊 V9)。

第 25 圖 螺旋節細胞ハ輕度ニ萎縮シ胞體潤澤シニッスル體ハ不規則ニ融合集散シ。或ハ胞體內ニ空胞ヲ生ズルモノアリ(B5 號) (「トルイゲンブラウ」染色)。

第 26 圖 前庭節細胞ニッスル體ハ粗大トナリテ偏在シ核染色體ハ亂雜ナル排列ヲトレド尙ホ核ノ變化ハ輕度ナリ。(B5 號「トルイゲンブラウ」染色)

第 27 圖 聽斑上皮細胞ハ萎縮シテ濃染シ。耳石膜ハ濃縮シテ上皮層ヲ蔽ヘリ(鶏卵黃 3 號)。

第 28 圖 蝸牛殼神經纖維ノ側度萎縮セルヲ示ス(鶏卵黃 3 號 ワイゲルトパール 髓鞘染色)。

第 29 圖 前庭神經纖維ノ少シク側度セルヲ示ス(同上)。

第 30 圖 コルチ器ノ萎縮セルヲ示ス(鶏卵黃 4 號)。

第 31 圖 螺旋節細胞ハ收縮シ胞體ハ濃染セルモ

妹尾論文附圖

實驗的動脈硬化症ニ於ケル聽器變化ニ就テ

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

妹尾論文附圖

實驗的動脈硬化症ニ於ケル聽器變化ニ就テ

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Dr. Hideo Senoo: Über die Veränderungen des Gehörorgans bei experimentellen Arteriosklerosen.

妹尾論文附圖

實驗的動脈硬化症ニ於ケル聽器變化ニ就テ

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

Dr. Hideo Senoo: Über die Veränderungen des Gehörorgans bei experimentellen Arteriosklerosen.

妹尾論文附圖

實驗的動脈硬化症ニ於ケル聽器變化ニ就テ

Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 24.

Dr. Hideo Senoo: Über die Veränderungen des Gehörorgans bei experimentellen Arteriosklerosen.

妹尾論文附圖

實驗的動脈硬化症ニ於ケル聽器變化ニ就テ

Fig. 25.

Fig. 26.

Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Dr. Hideo Senoo: Über die Veränderungen des Gehörorgans bei experimentellen Arteriosklerosen.

妹尾論文附圖

實驗的動脈硬化症ニ於ケル聽器變化ニ就テ

Fig. 31.

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 34.

Fig. 35.

Dr. Hideo Senoo: Über die Veränderungen des Gehörorgans bei experimentellen Arteriosklerosen.

妹尾論文附圖

實驗的動脈硬化症ニ於ケル聽器變化ニ就テ

Fig. 36.

Fig. 37.

Fig. 38.

Fig. 39.

Fig. 40.

Dr. Hideo Senoo: Über die Veränderungen des Gehörorgans bei experimentellen Arteriosklerosen.

妹尾論文附圖

實驗的動脈硬化症ニ於ケル聽器變化ニ就テ

Fig. 41.

Fig. 42.

Fig. 43.

Fig. 44.

Fig. 45.

Dr. Hideo Senoo: Über die Veränderungen des Gehörorgans bei experimentellen Arteriosklerosen.

ノアリ。ニッスル體何レモ不規則ニ融合或ハ消失ス
(鶏卵黃5號「トルイザンブラウ」染色)。

第32圖 前庭節細胞ニッスル體ノ稍不規則ニ集
簇セルヲ示ス(同上)。

第33圖 蝸牛殼神經纖維ノ削瘦萎縮セルヲ示ス
(同上、ライゲルトパール髓鞘染色)。

第34圖 前庭神經纖維ノ萎縮セルヲ示ス(同上)。

第35圖 コルチ器ノ萎縮セルヲ示ス(同上)。

第36圖 中耳腔ノ膿性滲出物及ビ馬鐙骨脚間腔
ノ假性「キサントーム」細胞ノ集簇及ビ其一部分ニ
結締組織ノ新生セルヲ示ス(鶏卵黃4號)。

第37圖 同上一部擴大。

假性「キサントーム」細胞及ビ新生結締組織及ビ血
管ヲ見ル。

第38圖 馬鐙骨脚內腔及ビ其附近ニ於ケル假性
「キサントーム」及ビ結締組織及ビ骨組織ノ新生ヲ示ス

(鶏卵黃5號) 馬鐙骨脚間腔中央及ビ足板ニ接セル
濃染セル所ハ即チ骨組織ノ新生ナリ。

第39圖 同上一部擴大圖。

右方腺體タル中ニ松葉狀ノ間隙ヲ示スハ「コレス
タリン」結晶ノ痕跡ナリ。

第40圖 コルチ器ノ變化ハ強度ナラザルモ螺旋
血管ハ既ニ消失ス(家兎A27號)。

第41圖 螺旋血管腔ノ消失セルヲ示ス(家兎V
號)。

第42圖 螺旋血管腔尙ホ狹小シナガラモ存在ス
(鶏卵黃2號)。

第43圖 同上(鶏卵黃6號)。

第44圖 中耳粘膜ノ肥厚及ビ細胞浸潤及ビ鼓室
炎膿性滲出物ヲ示ス(家兎V4號)。

第45圖 內聽道血管壁ノ正常ナルヲ示ス(鶏卵
黃6號)。

— 完 —

(原稿到着＝昭和12・11・11)