大木本和也
毛利 光宏
天津 睦郎
寺岡 優*

神戸大学医学部

耳鼻咽喉科学教室

*加西市民病院耳鼻咽喉科

気管外膜、軟骨膜および輪状靱帯の組織学的研究 —正常構造の検討—

気管は輪状軟骨下端からはじまり、下方では左右の主気管支に分岐する。気管浸潤は甲状腺癌、下咽頭癌、食道癌などで予後を左右する重要な因子の一つであり、これらの浸潤様式を知るには、気管の正常構造に関する明確な知識が必要である。

この研究は気管の正常構造を明らかにするために行った。5例の摘出標本から腫瘍浸潤がない部分の気管を切り出し、組織学的および免疫組織化学的に検討した。

従来より外膜と呼ばれている気管をとりまく疎な結合組織は、ヘマトキシリンエオジン染色で外側の疎な層と内側の密な層の2層に分かれていた。この層構造は輪状靱帯に近い部位では明瞭であったが、離れた部位では明瞭ではなかった。内側層の結合組織は、斜めに走行し輪状靱帯に移行した後粘膜下層に達していた。このような構造は気管の伸展性と屈曲性に寄与すると考えられた。

気管軟骨は軟骨膜で被われている。HE染色では、表層の線維芽細胞と成熟した軟骨細胞との間に楕円形あるいは紡錘形の細胞からなる未成熟な軟骨細胞の層が認められた。この層はエラスチカ・ワン・ギーソン染色で赤色に染色され、周囲との境界は明瞭であった。免疫組織化学的検討では、表層の線維芽細胞と未成熟な軟骨細胞の層にはコラーゲンIおよびIII型の広範な分布が認められた。しかし成熟した軟骨細胞の層にはほとんど認められなかった。これらのことから未成熟な軟骨細胞の層は軟骨膜に含まれるのが妥当であると考えた。

結論は以下のごとくであった。1. 気管外膜は、外側の疎な線維組織からなる層と内側の密な層の2層に分類された。2. 軟骨膜は、外側の線維層と内側の移行層の2層に分類された。3. 外膜内側層の線維束は輪状靱帯に移行し、気管の伸展性と屈曲性に寄与すると考えられた。

キーワード：気管外膜、軟骨膜、輪状靱帯、コラーゲン、組織学

はじめに

気管は軟骨部と膜様部からなる管で、中枢側は輪状軟骨につながり、末梢側は気管分岐部で左右の主気管支に分かれる。耳鼻咽喉科領域で気管に浸潤する腫瘍としては、甲状腺癌をはじめ下咽頭癌、食道癌、喉頭癌およびそれらのリンパ節転移などがある。かつては気道の再建が容易ではないために、これらの腫瘍の気管浸潤例に対し気管合併切除はあまり行われなかったが¹⁾、近年では積極的に気管を合併切除することにより、良好な成績が得られるようになってきている^{2)~7)}、しかもこれらの腫瘍においては気管浸潤の有無とその程度が予後に影響を与え

る因子の一つであることが報告されている^{8)~16)}。したがって、腫瘍の気管への浸潤様式を知ることは治療を行う上で重要なことと考えられる。

気管は、外側より外膜、軟骨膜、軟骨、粘膜の構造を有する(図1)。気管に関する組織学的研究は粘膜に関するものが多いのに対し、外膜、軟骨膜や輪状靱帯等の支持組織についての研究は比較的少ない^{17)~20)}。これらのうち軟骨膜の構造については軟骨層との境界に関していまだ定説がなく^{18)19)21)~29)}、さらに外膜の構造については、我々が渉猟した限りこれを詳細に検討した報告はみられない。腫瘍の気管浸潤様式を知るためには、まずこれら

図1 気管縦断面の模式図

気管外膜、軟骨膜、輪状靱帯の組織学的構造を明確にすることが必要であると思われる。そこで摘出標本をもとに、これらの正常組織像について検討した。

また近年、腫瘍浸潤に対する細胞外マトリックスの役割が注目されている。その1つであるコラーゲンは生体内に広く分布し、気管においても主要な構成成分である。腫瘍が気管軟骨に浸潤する際にはまず気管軟骨膜に接することになる。身体他部位の軟骨膜にはI型およびIII型コラーゲンの存在が報告されている³⁰⁾³¹⁾が、気管軟骨膜に関する報告はみられない。そこで今回この気管軟骨膜におけるI型およびIII型コラーゲンの局在についても免疫組織化学的に検討した。

材料と方法

1. 材料

喉頭または下咽頭癌で気管と甲状腺の合併切除を行った5症例の摘出標本から、正常気管とその上方で甲状腺が付着している部分の気管を甲状腺が剥がれないように切り出し材料とした。

2. 方法

材料を横断面および縦断面で切り出し、10%緩衝フォルマリン液で固定した。必要に応じて10%EDTAで脱灰した。これらをパラフィン包埋し4μmの厚さの薄切標本作製した。また10枚ごとに厚さ8μmの切片を作製した。薄切標本に対し、型のごとくヘマトキシリン・エオジン染色（以下、HE染色）、エラスチカ・ワンギーソン染色（以下、EV染色）および鍍銀染色（渡辺法）³²⁾を行い、膠原線維、弾性線維、細網線維を染色した。

免疫組織化学的検索は、Shandon-Lipshaw社のOmniTages Plusキットを使用しavidin-biotin-affinity法により行った。前処置として0.1%ペプシン溶液に37℃、2時間反応させた。脱パラフィン後、3% H_2O_2 液に30分浸透させ内因性ペルオキシダーゼを除去した後、phosphate buffered saline (PBS) で洗浄してブロッッキングを行った。抗I型コラーゲン抗体（ポリクローナル、カ

a

b

図2 気管外膜の組織像 (HE)

a: 輪状靱帯から遠い部位

外膜の層構造は明らかではない。

b: 輪状靱帯に近い部位

内側層と外側層の違いが明瞭である。

A: 外膜, I: 内側層, O: 外側層

ルテット社) および抗III型コラーゲン抗体 (同上) を一次抗体として、4℃で24時間反応させた。PBSで洗浄後、二次抗体と30分間反応させた。PBSで洗浄後、ペルオキシダーゼ標識ストレプトアビジンと30分間反応させた。さらにdiaminobenzidineで発色させ、PBSで反応停止後、ヘマトキシリンで核染色を行い光学顕微鏡下に観察した。陽性コントロールには皮膚および動脈を用い、陰性コントロールには一次抗体の代わりに正常ウサギ血清を用いて比較検討した。

結 果

1. 組織学的所見

甲状腺被膜と気管軟骨膜の間には、主に疎な線維組織からなる平均幅0.45mmの外膜が認められた。気管軟骨の表層には染色性と細胞形態からみて軟骨層 (C) とは

明らかに異なる2つの層構造が認められた。ここではその2つの層構造のうち表層で線維成分に富むものを線維層(F)、深層で軟骨層に移行している層を移行層(T)とした。また気管軟骨輪間の輪状靱帯では特徴的な線維の走行が認められた。以下各部位について詳述する。

1) 外膜

外膜は輪状靱帯から遠い部分と、近い部分とでは構造が異なっていた(図2)。

輪状靱帯から遠い部分では、比較的均一で疎な膠原線維と弾性線維が気管軟骨輪と平行に走行していた。外側がわずかに密であり、内側より血管が豊富で弾力線維が多かった(図2a)。これに対して輪状靱帯の近傍では、密な線維組織からなる内側層と、疎な線維組織からなる外側層の2層構造が認められ、両者の境界は明瞭であった(図2b)。また外膜内側層の密な線維組織は大部分が輪状靱帯に移行していたが、一部は気管の長軸方向と平行に走行していた。外側層では、血管が豊富で膠原線維の走行は不規則であり、かつ少量の弾性線維がびまん性に認められた。細網線維は外側及び内側層に認められた。また原疾患に対する手術操作で気管と甲状腺が鈍的に剥離された部分では外膜のほぼ中央で剥離されていた。

内側層および外側層の厚さを各々20カ所で測定した平均値は各々0.22, 0.23mmであり、ほぼ同じ厚さであった。

2) 軟骨膜

(1) 線維層

気管軟骨の最も表層にある線維層は、HE染色では線維芽細胞に類似した細胞が認められ、線維成分が豊富で強い好酸性が認められた。外膜及び移行層との境界は明瞭であった(図3a)。EV染色ではこの層は黄赤色に染色され、膠原線維とわずかな弾性線維が認められた(図3b)。鍍銀染色では、細網線維は認められなかった(図3c)。

(2) 移行層

線維層の内側の移行層は、HE染色では楕円形または紡錘形の未分化な軟骨細胞が、線維層に平行に配列した層として認められた。これらの軟骨細胞は、外側の線維層に近いほど未分化で、軟骨層に近いほど成熟した傾向を認めたが、移行層と軟骨層との境界では成熟段階に大きな変化があり、層の違いが明瞭に認められた。一方、染色性の点から両層境界部を検討すると、HE染色では軟骨層の好塩基性が移行層に近づくにしたがって弱くなる傾向を認め、両者の境界は明瞭でなかった(図3a)。しかしEV染色では、境界は比較的明瞭であった。すなわち、軟骨層は黒紫色に染色されたのに対し、移行層は弾性線維が認められず、膠原線維が豊富で赤色に染色さ

a

b

図4 輪状靱帯の組織像(EV)

a: 外膜内側層からの密な線維組織が対側の粘膜下組織に移行するように斜行している(→)。

b: 一部では隣接する上下の外膜内側層からの線維組織が交差している(→)。

れた(図3b)。鍍銀法では細網線維は認められなかった(図3c)。

甲状腺側の線維層と移行層の厚さを各々20カ所で測定した平均値は各々2.80, 3.45 cell layersであり、気管粘膜側の厚さを同様に測定した結果が各々2.15, 2.95 cell layersであったのに比べるとより厚い傾向があった。ここでは厚さを細胞が平均何層であるかで表した。

3) 輪状靱帯

多くの輪状靱帯では、外膜内側層から移行した密な弾性線維が隣接する気管輪の粘膜下組織に移行するように走行していた(図4a)。この線維以外の部位では比較的疎な結合組織からなっていた。一部の輪状靱帯では隣接する上下の軟骨輪の外膜内側層から気管粘膜下組織に向かってのびる線維束が交叉して密な線維組織が認められた(図4b)。

大 木 本 論 文 付 図

a : HE 染色
層構造の境界は明瞭ではない。

b : EV 染色
HE 染色より境界は明瞭である。

c : Ag 染色
線維層および移行層には，細網線維(→)は認められない。
F : 線維層，T : 移行層，C : 軟骨層。

図3 気管軟骨膜の組織像

図5 抗コラーゲンI型(a)およびIII型(b)抗体を用いた免疫組織化学染色
I型、III型ともに軟骨膜に広範な陽性像を認める。III型では移行層より線維層で反応が強い。軟骨層では陽性像は認められない。

2. 免疫組織化学的所見

抗I型コラーゲン抗体を用いた免疫染色では、線維層、移行層共に線状の陽性像を認めた(図5 a)。また輪状靱帯および外膜にも広い範囲で陽性像が認められた。

抗III型コラーゲン抗体を用いた免疫染色においても広い範囲に陽性像が認められた。しかし、I型コラーゲンとは異なり、その陽性像は、線維層、移行層共に一様な分布であり、線維層では移行層より強い反応が認められた(図5 b)。軟骨層にはI型及びIII型コラーゲンともに陽性像は認められなかった。

考 察

気管軟骨膜と甲状腺の間の結合組織は一般に外膜と呼ばれる¹⁷⁾³³⁾。外膜については、前述のように輪状靱帯の近傍では線維の密な内側層と疎な外側層の2層構造が認められた。輪状靱帯から遠い部位では疎な結合組織が一樣

に存在するのみで明瞭な2層構造を認めなかった。しかし手術時に気管から甲状腺が鈍的に剝離された部分で、外膜のほぼ中央で剝離されたという結果から、この際の剝離面は内側層と外側層の境界とみてよいと思われる。すなわち外膜は全体として、内側層と外側層の2層構造をなすものと考えられた。気管と甲状腺を鈍的に剝離した場合、ここでいう外側層は甲状腺側に含まれることから、この外側層は気管の一部とは考えにくいように思われた。

軟骨膜の構造については、先に述べたように軟骨層との境界をめぐる、すなわちここで言う移行層を軟骨膜に含めるか否かでいまだ定説がない。軟骨膜の層構造は、1層とするものから3層とするものまでの報告がみられる^{18)19)21)~29)}。

気管軟骨の最も表層にある線維層は、HE染色およびEV染色標本のどちらにおいても周囲との境界は明瞭であった。線維層を軟骨膜と考えるのは諸家の一致した意見であり、1層とするものはこの線維層のみを軟骨膜としている¹⁸⁾²¹⁾²²⁾。

しかし移行層が軟骨膜に含まれるかどうか、あるいは移行層が1層であるか2層であるかという点では意見が分かれている。線維層の内側にある移行層は未分化な軟骨細胞からなる。HE染色では軟骨層と移行層の境界は明瞭ではないが、EV染色においては両者の染色性が異なり、境界が明瞭であった。また両者の構成細胞は形態学的にも内側の軟骨層の細胞とは明らかに大きな違いが認められた。したがって移行層は軟骨層とは異なる1つの層としてみることができると考えた。

軟骨膜を3層とする報告^{26)~29)}は、この移行層をさらに細胞形態の違いから2層に分ける考え方であるが、今回の検討では移行層を2層に分けるべき細胞形態の違いは見出しえなかった。

また免疫組織化学的検討では、軟骨層にはI型およびIII型コラーゲンの分布は認められなかったが、線維層および移行層には両方とも豊富に分布していた。したがってコラーゲンの分布からは移行層は軟骨層と異なり、線維層と同じと言える。また臨床上、軟骨膜を軟骨から鋭的に薄利した場合移行層が様々な厚さで剝離されるとされる²⁴⁾。以上のことから移行層は線維層と同様に軟骨膜に含めるのが妥当であると考えた。このように我々は気管軟骨膜の組織像を、外層の線維層と内層の移行層の2層に分類した。

次に軟骨膜の厚さについては、石川ら²⁴⁾は耳介軟骨の報告で凹面と凸面とを比較し、凸面の方が厚い傾向があったと報告している。今回の気管軟骨においても同様の結果であり、凹面の粘膜側より凸側の甲状腺側の方が

厚い傾向にあった。

輪状靱帯における線維組織の方向性は非常に特徴があった。Dong-Hwan Shin ら²⁰⁾によると、外膜外側の膠原線維は気管壁と平行に走り、内側の線維は輪状靱帯に向かい気管内腔と垂直に走行するとしている。しかし今回の検討では、外膜内側層からの線維は軟骨輪間を斜めに走行しているものが多かった。気管の上方には喉頭があり、下方には気管支がある。喉頭および気管支は呼吸、発声、嚥下、咳嗽の際に動くので、これらを結ぶ気管にはある程度の伸展性が要求される。また頭部の動きに伴う屈曲性も必要である。この線維の特殊な方向性は気管に十分な伸展性と屈曲性を持たせうと考えられ、きわめて合目的な構造と思われた。またこの特徴的な線維の走向は同時に腫瘍の気管浸潤様式にも大きく影響するものと考えられる。

コラーゲンは現在までに19種のタイプが報告されており、生体蛋白質の約3分の1を占める主要な構成成分である。今回の検討でI型およびIII型コラーゲンは、線維層および移行層に広く分布することがわかった。これらの産生部位については、前駆体である procollagen が軟骨膜に認められるとする報告³⁰⁾³¹⁾がある。細網線維は軟骨膜にはほとんど認められず外膜には豊富に存在しており、外膜でのコラーゲンIII型の分布とよく一致していた。これは細網線維がコラーゲンIII型を主体とした微細な膠原線維であるとする報告¹⁷⁾に合致する結果であった。

結 論

気管外膜、軟骨膜および輪状靱帯について正常組織像を検討し、以下の結論を得た。

1. 外膜は内側層と外側層の2層に分類された。
2. 軟骨膜は、線維層と移行層の2層に分類するのが妥当であると考えられた。
3. 輪状靱帯では膠原線維および弾性線維が斜めに走行する特徴的な構造が認められ、気管の伸展性、屈曲性に寄与していると考えられた。
4. I型およびIII型コラーゲンは軟骨膜線維層と移行層共に広く分布していた。III型コラーゲンは移行層より線維層に強い局在を認めた。

参 考 文 献

- 1) Hirabayashi RN, Lindsay S: Carcinoma of the thyroid gland: statistical study of 390 patients. *J Clin Endocrinol* 21: 1596-1601, 1961.
- 2) Ishihara T, Kikuchi K, Ikeda T, Inoue H, Fukai S, et al: Resection of thyroid carcinoma infiltrating the trachea. *Thorax* 33: 378-386, 1978.
- 3) Tsumori T, Nakao K, Miyata M, Izukara M, Monden Y, et al: Clinicopathologic study of thyroid carcinoma infiltrating the trachea. *Cancer* 56: 2843-2848, 1985.
- 4) Ishihara T, Yamazaki S, Kobayashi K, Inoue H, Fukai S, et al: Resection of the trachea infiltrated by thyroid carcinoma. *Ann Surg* 195: 496-500, 1982.
- 5) Grillo HC, Zannini P: Resectional management of airway invasion by thyroid carcinoma. *Ann Thorac Surg* 42: 287-298, 1986.
- 6) Kazuyasu N, Masahiko M, Masaaki I, Yasumasa M, Masazumi M et al: Radical operation for thyroid carcinoma invading the trachea. *Arch Surg* 119: 1046-1049, 1984.
- 7) Sessions-DG: Recent advances in surgery of the larynx and trachea. *Head-Neck-Surg* 5: 42-52, 1982.
- 8) Lawson W, Som ML, Biller HF: Papillary adenocarcinoma of the thyroid invading the upper air passages. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 86: 751-755, 1977.
- 9) Edgar PB, Oscar MG: Treatment of locally invasive carcinoma of the thyroid: How radical? *Am J Surg* 140: 514-517, 1980.
- 10) McCaffrey TV, Lipton RJ: Thyroid carcinoma invading the upper aerodigestive system. *Laryngoscope* 100: 824-830, 1990.
- 11) Silliphant WM, Klingk GH, Levitin MS: Thyroid carcinoma and death: A clinicopathological study of 193 autopsies. *Cancer* 17: 513-525, 1964.
- 12) Tytor M, Olofsson J: Thyroid tumors invading the larynx and trachea. *J Otolaryngol* 15: 74-79, 1986.
- 13) Nomori H, Kobayashi K, Ishihara T, Torikata C, Hosoda Y, et al: Thyroid carcinoma infiltrating the trachea: clinical, histologic and morphometric analyses. *J Surg oncol* 44: 78-83, 1990.
- 14) Rockley-TJ, Powell-J, Robin-PE; Reid-AP: Post-laryngectomy stomal recurrence: tumour implantation or paratracheal lymphatic metastasis? *Clin-Otolaryngol* 16: 43-47, 1991.
- 15) Olofsson J, Nostrand AWP: Growth and spread of laryngeal and hypopharyngeal carcinoma with reflections on the effect of preoperative irradiation: 139 cases studied by whole organ serial sectioning. *Acta Otolaryngol Suppl* 308: 1-84, 1973.
- 16) 天満和男, 阿保七三朗, 北村道彦, 橋本正治, 泉 啓一, 他: 食道癌再発転移様式に関する考察 ―術後再発剖検例の検討―. *日胸外会誌* 42: 2193-2199, 1994.
- 17) 小野 譲: 気管食道科学 日本気管食道科学会編. 医学書院: 21-28頁, 1968.

- 18) Junqueira LC, Carneiro J, Contopoulos AN: Cartilage. Basic histology (2nd Ed), Lange Medical Publications: pp 111-118, 1977.
- 19) Williams PW, Warwick R: Osteology. Gray's Anatomy (36th Ed), ed. by Gray. Churchill Livingstone: pp 245-252, 1980.
- 20) Dong-Hwan shin, Engene JM, Hon Chi Suen, Hermes CG: Pathologic staging of papillary carcinoma of the thyroid with airway invasion based on the anatomic manner of extension to the trachea: A clinicopathologic study based on 22 patients who underwent thyroidectomy and airway resection. Hum Pathol 24: 866-870, 1993.
- 21) 溝口史郎: 図説組織学 (第1版). 金原出版: 57-73頁, 1983.
- 22) 藤田尚男, 藤田恒夫: 標準組織学総論 第2版. 医学書院: 141-145頁, 1981.
- 23) 廣瀬 勇: ウサギ軟骨膜の自家移植実験における軟骨形成. 歯科学報84: 81-107, 1984.
- 24) 石川浩三, 一色信彦: 軟骨膜の軟骨形成能に関する研究. 日形会誌 8: 419-434, 1988.
- 25) Aguado DL, Monserrat JR, Pinero BP, Banales ME, Gutierrez R, et al: Neochondrogenesis in the septal area after submucous cartilaginous resection. Acta Otolaryngol 112: 539-544, 1992.
- 26) 高戸 毅, 波利井清紀, 中塚貴志: 軟骨膜の軟骨形成能に関する研究 一第1報: 家兎耳介軟骨膜を用いた実験一. 日形会誌 6: 14-22, 1986.
- 27) Engvist O, Skoog V, pastacaldi P, Yormuk E, Juhlin R: The cartilaginous potential of the perichondrium in rabbit ear and rib: A comparative study in vivo and in vitro. Scand J Reconstr Surg 13: 275-280, 1979.
- 28) Engkvist O: Reconstruction of patellar articular cartilage with free autologous perichondrial grafts. Scand J Plast Reconstr Surg 13: 361-369, 1979.
- 29) Ohlsen L, Widenfalk B: The early development of articular cartilage after perichondrial grafting. Scand J Plast Reconstr Surg 17: 163-177, 1983.
- 30) Dominique LG, Frederic MG, Isabelle T, Jacky B, Pascale P et al: Localization of the expression of type I, II and III collagen genes in human normal and hypochondrogenesis cartilage canals. Histochemical J 26: 695-704, 1994.
- 31) Hamada K, Okawara Y, Fryer JN, Tomonaga A, Fukuda H, et al: The detection of the mRNAs of procollagen types I, II and III in human fetal fingers by in situ hybridization using digoxigenin-labelled oligonucleotide probes. Hisochem J 27: 309-317, 1995.
- 32) 渡辺恒彦: 常用染色法としての鍍銀法と脂肪染色について. 臨床病理 特 9: 80-85, 1959.
- 33) 小川和朗, 溝口史郎: 組織学 第2版. 分光堂: 68頁, 1993.

本論文の要旨の一部は, 第97回日本耳鼻咽喉科学会総会(福岡)ならびに第20回日本頭頸部腫瘍学会(福井)において口演した。

(1997年6月23日受稿 1997年9月4日受理)

別刷請求先 〒650 神戸市中央区楠町7-5-2

神戸大学医学部耳鼻咽喉科 大木本和也

Histological Study of the Tracheal Adventitia, Perichondrium and Annular Ligament

Kazuya Ohkimoto, M.D., Mitsuhiro Mouri, M.D., Mutsuo Amatsu, M.D.
and Masaru Teraoka, M.D.*

Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Kobe University, School of Medicine, Kobe

*Department of Otolaryngology, Kasai Municipal Hospital, Hyogo

The trachea begins at the lower border of the cricoid cartilage and passes down to bifurcate into the left and right mainstem bronchi. The presence of tracheal invasion is crucial factor influencing the prognosis for patients with cancers of the thyroid gland, hypopharynx, esophagus, etc. In order to understand the manner of invasion of the above tumors, precise knowledge of the normal tracheal structure is indispensable. This study was undertaken to clarify the normal microscopic structure of the trachea. Five normal tracheal specimens obtained at surgery were examined histologically and immunohistochemically. The loose connective tissue around the trachea, known as *adventitia*, was divided into a loose outer and a dense inner layer by hematoxylin and eosin (HE) staining. This two-layer pattern was clearly seen near the annular ligament but was obscured away from it. The connective

tissue of the inner layer ran obliquely to join the connective tissue of the annular ligament and ended in the submucosal layer. This arrangement of connective fibers seems to play a role in allowing the trachea to stretch and bend. Tracheal cartilage is covered with a dense fibrous membrane known as the *perichondrium*. Between the superficial fibrous membrane and mature cartilage cells lies zone of immature cartilage made up of oval or spindle cells, and the inclusion of this zone in the perichondrium has long been a subject of controversy. In our study, the zone was homogeneously stained red by the elastica van Gieson's stain and was clearly distinguished from other structures. Immunohistochemical staining revealed a wide distribution of type I and type III collagen on the fibrous membrane and the zone of immature cartilage cells, while mature cartilage cells did not show such collagen. Based on these findings, we conclude that the zone of immature cartilage cells belongs to the perichondrium, which thus contains two layers, an outer fibrous layer and an inner transitional layer of immature cartilage cells. Our conclusions are as follows: 1. Tracheal adventitia is divided into two layers, an outer loose and an inner dense fibrous layer. 2. Tracheal perichondrium also consists of two layers, an outer fibrous layer and an inner transitional layer. 3. The fibrous bundle originating from the adventitia joins the connective tissue of the annular ligament, probably in order to allow the trachea to stretch and bend.

Key words: tracheal adventitia, perichondrium, annular ligament, collagen, histology