佐藤 孝至

広島大学医学部
耳鼻咽喉科学教室甲状腺乳頭癌における MIB-1 標識率と
TUNEL 陽性率の意義に関する研究

甲状腺癌の80%以上を占める乳頭癌は、一般的には緩徐に増殖する予後良好な腫瘍として取り扱われている。

一般に乳頭癌は病理組織学的分化度と臨床病態、特に経過と予後との間には密接な関連性が見られるものの、同一組織型であってもその増殖態度は様々であり組織学的分化度に加えて、術後再発などの臨床経過や予後を推定する指標を持つことが、術後の follow up を行う上で重要であると考えられる。

本研究は、甲状腺乳頭癌40例のパラフィン包埋切片を用いて、癌細胞の増殖能を MIB-1 染色で、40例中28例においてアポトーシスを TUNEL 染色を用いて検討し、増殖動態と臨床経過および予後との関連について検討した。

病理組織学的分化度の高低と MIB-1 標識率の高低は、ほぼ一致していたが一部の高分化型乳頭癌の中には MIB-1 標識率の高い症例が存在し、再発例の MIB-1 標識率と非再発例の MIB-1 標識率の間に有意差を認めた。

一方、TUNEL 陽性率は病理組織学的分化度や術後再発との間に相関を認めなかった。

しかし、再発時に未分化転化を来した高分化型乳頭癌においては、初回手術時の TUNEL 陽性率が特に低く、follow up して行く上で、TUNEL 陽性率の著しい低値は重要な情報の1つである可能性が示唆された。以上より MIB-1 標識率は、術後の臨床経過および予後を推定する良き指標であると考えられた。

キーワード：甲状腺乳頭癌、分化度、MIB-1 標識率、TUNEL 陽性率、術後再発

はじめに

甲状腺癌の80%以上を占める乳頭癌は、一般的には緩徐に増殖する予後良好な腫瘍として取り扱われている。

しかしながら、高齢者の場合の術後成績は若年者に比較して劣り¹⁾²⁾³⁾、低分化癌や未分化癌への移行をはじめ悪性度が高い臨床的事実が指摘されている⁴⁾⁵⁾。

また甲状腺乳頭癌は同一組織型であっても術後再発や生命予後は様々であり、これらを推定する臨床的な予後因子として、病理組織学的な分化度や年齢、腫瘍の被膜外浸潤や腫瘍径などが知られており¹⁾²⁾³⁾⁵⁾、特に年齢と病理組織学的分化度と術後再発や生命予後との間に密接な関連が認められている。しかしながら、年齢と病理組織学的分化度だけでは術後再発や予後を予測出来ない症例が存在することも事実であり、術後再発や予後を推定する上で新たな指標を持つことが重要であると考えられ

る。

一方、腫瘍そのものの性質については、これまで甲状腺癌における癌細胞の増殖動態について、³H-thymidine によるオートラジオグラフィーを用いて検討され⁶⁾³H-thymidine の標識率の高低が、術後再発や加齢との間に明らかな相関関係があることが報告されている⁶⁾。すなわち³H-thymidine 標識率は術後再発を来した症例や40歳以上の症例で有意に高く、特に60歳以上の高齢者で高い傾向がある。

一方、甲状腺乳頭癌の増殖動態を理解する上では増殖能の高低のみならず、癌細胞のアポトーシスが関係することが最近示唆されている⁷⁾⁸⁾。

本研究は、術後再発などの臨床病態や予後を推定する新たな指標を検索する目的で、甲状腺切除標本より甲状腺乳頭癌の増殖能を抗 Ki-67 標識モノクローナル抗体：

佐藤論文付図(1)

(×200)

図3a 高分化型乳頭癌のMIB-1染色像
核がびまん性あるいは顆粒状に染色されているのがMIB-1標識細胞である。
MIB-1標識率：3.66%

(×200)

図3b 高分化型乳頭癌のTUNEL染色像
褐色に染まった陽性細胞の一部にapoptotic bodyを認める。
TUNEL陽性率：6.37%

(×200)

図4a 高分化型乳頭癌再発例のMIB-1染色像
図3aに提示した症例が内深頸リンパ節領域へ再発を来した。
MIB-1標識率：4.15%

(×200)

図4b 高分化型乳頭癌再発例のTUNEL染色像
TUNEL陽性率：0.99%

(×200)

図5a 高分化型乳頭癌：高標識例のMIB-1染色像
MIB-1標識率：7.67%

(×50)

図5b 高分化型乳頭癌のTUNEL染色像
この症例のMIB-1標識率は7.67%と高かった。
TUNEL陽性率：6.45%

(×400)

図6a 低分化型乳頭癌のMIB-1染色像
低分化型乳頭癌に特徴的な充実性の
索状構造を認める。
MIB-1標識率：15.33%

(×200)

図6b 低分化型乳頭癌のTUNEL染色像
TUNEL陽性率：1.28%

(×200)

図7a 未分化癌のMIB-1染色像
MIB-1標識率：21.57%

(×100)

図7b 未分化癌のTUNEL染色像
TUNEL陽性率：3.01%

図1 MIB-1 染色

図2 TUNEL 染色

MIB-1 を用いて標識率を評価検討し、また、アポトーシスを TdT-mediated dUTP-biotin nick end labeling (以下 TUNEL と略す) 染色を用いて TUNEL 陽性率を検討して、増殖動態と臨床病態および予後との関連について検討した。

対象と方法

1. 対象症例

1986年から1995年までの10年間に、当科で初回手術を施行した甲状腺乳頭癌症例40例を対象とした。このうち MIB-1 標識率と TUNEL 陽性率の両方が検討可能であったのが28例で、MIB-1 標識率については40例全例に検討可能であった。

病理組織学的分化度は40例中、高分化型乳頭癌が37例、低分化型乳頭癌が3例であった。また、対照群として、甲状腺未分化癌2例を用いた。

対象症例の性別は、男性9例、女性31例で、年齢は21～76歳に分布し平均で男性49.6±10.1歳、女性51.7±16.0歳、全体で50.2±15.1歳であった。

2. 方法

1) MIB-1 染色 (図1)

10%ホルマリン固定パラフィン包埋組織標本を3μmに薄切片しPLLスライドガラスに伸展させ、脱パラ後、0.01Mクエン酸緩衝液に浸漬し、マイクロウェーブ加熱処理(100°C, 5分×3回)による抗原賦活法を行った。その後、モノクローナル抗体 MIB-1 (Immunotech S.A. 社製)を用いて免疫組織化学的にストレプトアビジン、ビオチン (SAB) 法で検索した。すなわち10%ウザキ血清にて MIB-1 による非特異的反応をブロッキングし、100倍希釈のモノクローナル抗体: MIB-1 を1次抗体として30分間反応させた。2次抗体にはビオチン化抗マウス IgG を用い、更にペルオキシダーゼ標識ストレプトアビジンにて反応後、0.005%過酸化水素添加0.02%ジアミノベンチジン (DAB) 溶液にて発色後、ヘマトキシリンにて核染色を行い封入検鏡した。

MIB-1 染色の陽性コントロールには、同一切片上に含まれるリンパ濾胞の細胞を用い、陰性コントロールには

図 8 病理組織学的分化度と MIB-1 標識率の関係

図 9 術後再発と MIB-1 標識率との関係

1 次抗体を付加させなかった標本を用いた。

2) TUNEL 染色 (図 2)

MIB-1 染色と同様に、パラフィン切片を作製し、脱パラ後に Proteinase K (PK) で核蛋白を除去し、ついで内因性ペルオキシダーゼを 2% 過酸化水素にて不活性化した。そして、terminal deoxynucleotidyl transferase (以下 TdT と略す) buffer に浸漬した後に、TdT, biotinylated deoxyuridine transferase (ビオチン化 dUTP) を含む TdT buffer で覆い、60 分間 37℃ で反応させた。

次に TB buffer (300mM NaCl, 30mM クエン酸ナト

リウム) で反応を停止させ、以後は SAB 法の手法に従ってペルオキシダーゼ標識ストレプトアビジンを添加し、0.005% 過酸化水素添加 0.02% DAB 溶液で発色させたヘマトキシリンにて核染色し封入検鏡した。

また、TUNEL 染色の陽性コントロールとしては、生後 4 週のマウスに 600cGy 外照射を行い、4 時間後にネンブタール麻酔下に犠牲死させ、その胸腺細胞を用いた。

3) MIB-1 標識率 (Labelling index: LI) と TUNEL 陽性率の算定

MIB-1 標識率、TUNEL 陽性率ともに腫瘍細胞の核を 1000 個以上算定し、核が褐色に染色された細胞の割合を百分率で算定した。

なお、測定に際しては、腫瘍の辺縁部分を 3 視野以上、中心部分を 3 視野以上、計 6 視野以上を無作為に選択し、LI を算定するように留意した。

4) 統計学的検定

2 群間の検定は Mann-Whitney の U 検定を用いて検討し、3 群間の算定は分散分析を用いた。

結 果

1. MIB-1 染色

1) 代表的染色例

高分化型乳頭癌 (図 3a)

60 歳男性の高分化型乳頭癌で初回治療時の LI は 3.66% であった。8 年後に内深頸リンパ節領域に再発を来し頸部郭清を施行した。その再発時の LI は 4.15% であった。(図 4a)

高分化型乳頭癌: 高標識例 (図 5a)

56歳女性の高分化型乳頭癌で、主病巣とは別に峡部に腺内転移を認め、亜全摘を施行した症例で、LIは7.67%と約3～4%とされている高分化型乳頭癌の中では高い標識率を呈していた。

低分化型乳頭癌 (図6a)

76歳女性の低分化型乳頭癌で、腫瘍径が4cm以上であり浸潤傾向が強く、甲状腺全摘を施行した。この症例のLIは15.33%であった。

また、対照群である未分化癌のMIB-1染色像(図7a)ではLIは21.57%と乳頭癌よりも著しい高値を示した。

2) MIB-1 標識率の検討

MIB-1 標識率の平均値および標準偏差は、乳頭癌全体で $3.72 \pm 2.80\%$ 、高分化型乳頭癌が $3.20 \pm 2.82\%$ 、低分化型乳頭癌 $8.06 \pm 6.39\%$ と低分化型乳頭癌のLIが高い傾向にあったが統計学的有意差はなかった。一方、対照群である未分化癌を含めた分散分析においては、高分化型乳頭癌と低分化型乳頭癌と未分化癌の3者の間に有意差を認めた(図8)。

術後再発とLIとの関係を検討してみると、非再発例ではLIが $3.53 \pm 2.91\%$ 、再発例が $6.18 \pm 3.78\%$ と再発例のLIが有意に高かった(図9)。

2. TUNEL 染色

1) 代表的染色例

MIB-1 染色の代表的染色例として呈示したものと同じ症例のTUNEL染色像を示す。

60歳男性の高分化型乳頭癌症例の初回手術時のLIは6.37%(図3b)、再発時のLIが0.99%(図4b)であった。

56歳女性の高分化型乳頭癌症例のLIは6.45%であった(図5b)。

また、低分化型乳頭癌症例のLIは1.28%(図6b)、対照群である未分化癌のLIが3.01%であった(図7b)。

2) TUNEL 陽性率の検討

TUNEL 陽性率の平均値および標準偏差は、乳頭癌全体で $4.92 \pm 4.40\%$ 、高分化型乳頭癌が $5.25 \pm 4.50\%$ 、低分化型乳頭癌が $3.29 \pm 1.82\%$ と低分化型乳頭癌の方が低い傾向を示したが、両者の間には有意差は認められなかった。

また、術後再発とTUNEL 陽性率の関係については、非再発例と再発例の間に有意差を認めなかった。

考 察

甲状腺乳頭癌は発育速度が緩慢で予後良好な腫瘍として取り扱われている。

津森⁹⁾らは、気道に浸潤した甲状腺癌症例に対して臨床病理学的検討を行い、低分化型乳頭癌や未分化癌が気道浸潤を来し易いことを報告している。しかし一方で、高分化型乳頭癌でも気管などの周囲組織に浸潤を来したり術後早期に再発を来すなど病理組織学的分化度と臨床病態とが必ずしも一致しない症例が存在することも報告されており、近年、このような症例を病理組織学的に低分化構造がなくても、臨床的な低分化癌としてとらえるようになって来ている⁹⁾。

³H-thymidine は細胞周期のS期(DNA合成期)細胞に取り込まれるが、これをオートラジオグラフィーにて同定することにより腫瘍細胞における増殖能の指標とすることができる¹⁰⁾。

小池⁹⁾らは、甲状腺癌における癌細胞の増殖能を³H-thymidine によるオートラジオグラフィーを用いて検討し甲状腺癌における³H-thymidine 標識率の平均は約4%で、大腸癌の平均が24%¹¹⁾であるのと比較すると著しく低率であると報告している。

その一方で、甲状腺の高分化型乳頭癌の中にも標識率の高い症例、すなわち、増殖能の高い症例が存在することも指摘しており、³H-thymidine 標識率が臨床病態や予後を推定する良き指標であるとしている。

しかしながら³H-thymidine は、放射性同位元素であることや新鮮切除標本を用いるため臨床応用する上ではかなりの制約がある。

福岡¹²⁾は、細胞増殖能の指標の1つである、proliferating cell nuclear antigen (以下PCNAと略す)を用いて、甲状腺乳頭癌における増殖能を検討しているが、これによれば、甲状腺乳頭癌のPCNA陽性率は平均で約12%であり、乳癌における平均が約28%であるのと比較すると低値であることから考えて甲状腺乳頭癌の増殖が緩徐であることを反映しているとしている。しかしPCNAを標識する方法では、染色の際、固定時間の影響を受け易く、個々の陽性細胞の間で染色強度の不均一性のために、陽性率の定量的評価や施設間での比較検討に問題がある¹²⁾とされている。

この点、今回の検討に使用したMIB-1¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾はKi-67抗原を標識する抗体で、細胞周期上のG1, S, G2, M期の増殖期にある核を標識することができ、腫瘍の増殖能を定量的に評価可能で、また、この方法は抗原賦活が必須であるものの固定時間の影響を受けず、陽性細胞の分布が一定であり、染色強度の差が少ないため細胞増殖能の定量的評価に優れるとされている。

MIB-1 標識率により算定された、甲状腺乳頭癌の増殖能は、森木らの報告¹⁰⁾によれば、乳頭癌全体のLIが $3.99 \pm 2.51\%$ 、高分化型乳頭癌のLIが $3.03 \pm 1.84\%$ 、低

表 1 再発症例

症例	年齢(歳)	性	分化度	再発までの 期間(カ月)	経過	MIB-1 標識率 (%)	
						初回	再発時
1	60	男性	高分化	98	生存	3.66	4.15
2	38	男性	高分化	3	死亡	3.29	3.57
3	62	女性	高分化	6	生存	8.1	13.20
4	70	女性	高分化	24	死亡	8.18	21.57
5	56	女性	高分化	3	生存	7.67	9.17

分化型乳頭癌の LI が $9.49 \pm 3.83\%$ 、未分化癌の LI が $22.87 \pm 7.36\%$ と、病理組織学的分化度と良く相関している。

今回、著者の検討によっても、MIB-1 の LI は、高分化型乳頭癌 < 低分化型乳頭癌 < 未分化癌の順になり三者間に有意差を認めた。

一方、胃および大腸における高分化型腺癌の MIB-1 標識率は約 $33 \sim 58\%$ ¹⁷⁾¹⁸⁾、声帯の扁平上皮癌が約 41% ¹⁸⁾ と報告されており、これらと比較して甲状腺乳頭癌の MIB-1 標識率は著しく低く、この増殖能の低さが甲状腺癌の予後を良好にしている理由の 1 つと考えられる。

近年、甲状腺乳頭癌に関しては、腫瘍細胞のアポトーシスに関しても TUNEL 染色を用いた検討がなされている⁷⁾⁸⁾。葛島⁷⁾による甲状腺癌の原発巣における TUNEL 陽性率は、乳頭癌では $73.6 \pm 13.3\%$ 、未分化癌が $13.7 \pm 18.6\%$ と報告している。

また、内藤ら⁸⁾は、甲状腺乳頭癌の頸部転移リンパ節で TUNEL 陽性率を検討し、甲状腺乳頭癌の転移リンパ節における TUNEL 陽性率は $75.2 \pm 30.5\%$ と報告しており、甲状腺乳頭癌においては原発巣と転移リンパ節ともに極めて高率であるとしている。

一方、大腸癌における TUNEL 陽性率は、約 3% ¹⁹⁾ との報告がみられ、甲状腺乳頭癌の TUNEL 陽性率が他臓器の悪性腫瘍と比較しても極めて高率であり、甲状腺乳頭癌においてはアポトーシスに陥る癌細胞が多いと考えられ、このことも甲状腺乳頭癌が予後良好である理由の 1 つとしている⁸⁾。

しかし、著者が今回検討した結果では、甲状腺乳頭癌の TUNEL 陽性率は $4.92 \pm 4.40\%$ と低率であり、前述した葛島⁷⁾や内藤ら⁸⁾の結果とは大きくかけ離れた結果となった。この理由の 1 つには判定基準の違いが考えられる。

すなわち、著者は TUNEL 染色の陽性コントロールとして、生後 4 週のマウスに外照射後その胸腺細胞を用いているが、葛島や内藤らはヒト小腸粘膜絨毛上皮細胞を用いており、その絨毛先端部の上皮細胞にみられる核の濃染と凝集像を呈する細胞を強陽性とし、核の形態は保

持されているがアポトーシスに向かいつつあると考えられる細胞を陽性として判定している。

この TUNEL 陽性と判定している所見が、すべてアポトーシスを示唆する所見か否かについては検討の余地があると思われる。

内藤ら⁸⁾は甲状腺乳頭癌の TUNEL 強陽性率を $5.9 \pm 4.9\%$ と報告していて、これは自験例の TUNEL 陽性率と大差ない結果であり、著者の方法による TUNEL 陽性率は内藤らの方法による TUNEL 強陽性率に一致するのではないかと考えている。よって、甲状腺乳頭癌の TUNEL 陽性率は大腸癌よりは高い傾向にあるが著しく高率とは言えない。そこで、これらのことから考えると甲状腺乳頭癌の予後を良好にしている因子としては前述した腫瘍の増殖能の低さがより大きく関与し、アポトーシスの関与は少ないのではないかと考えられた。

甲状腺乳頭癌の増殖動態と予後との関連性についてみると、自験例における術後再発は、40 例中 5 例 (12.5%) で、これら 5 例中 2 例が未分化転化を来して死亡していた。一般的に、甲状腺乳頭癌の治療成績は 5 年生存率が 90% 以上¹⁹⁾²⁰⁾ で、術後再発は約 10% 前後¹⁹⁾²⁰⁾ とされており、それに比べると自験例における術後再発はやや高い傾向にあった。

術後再発を来した 5 例の組織型はいずれも高分化型乳頭癌であったが、今回検討した MIB-1 標識率は、非再発例に比較して再発例が有意に高いという結果を得ており、MIB-1 標識率の高低が術後再発の指標としても有用であることが判明した。

また MIB-1 標識率は初回手術時よりも再発時の方が高い傾向にあった (表 1)。

一方、一般的に予後不良とされる低分化型乳頭癌 3 例においては再発を来していないが、これはいずれも周囲組織への浸潤傾向が強く、また広汎な頸部リンパ節転移が認められたため、通常よりも拡大した手術、すなわち、頭頸部の扁平上皮癌に準じた根治的な手術が施行されたためと考えられる。

TUNEL 陽性率と術後再発との関係については一定の傾向は認められなかったが、再発時に未分化転化を来

した2例は、初回手術時の TUNEL 陽性率が1%未満と低かった。このことと未分化転化との関連性については症例数が少なく現段階では明確なことは言えないが、初回手術時の TUNEL 陽性率が著しく低い症例に関しては、MIB-1 標識率の高低と同様に重要な指標になり得るのではないかと考え、今後は症例数を増やして検討したいと考えている。

以上述べたごとく、今回著者が検討した甲状腺乳頭癌症例における MIB-1 標識率の高低が、術後再発および予後を推定する良き指標であると考えられた。

ま と め

1. 甲状腺乳頭癌40例に対して MIB-1 を用いた癌細胞の増殖能を免疫組織学的に検討し、また、対象症例40例のうち28例に TUNEL 染色を行い、DNA の断片化を検討した。

2. 甲状腺乳頭癌の予後を良好にしている因子としては癌細胞の増殖能の低さが大きく関与し、アポトーシスの関与が少ないことが示唆された。

3. 甲状腺癌における病理組織学的分化度と MIB-1 の LI の関係は、高分化型乳頭癌<低分化型乳頭癌<未分化癌の順に高く、分化度と LI が一致していたが、高分化型乳頭癌の中に低分化型乳頭癌を凌ぐような高標識群が存在していた。

4. 術後再発例と非再発例の MIB-1 標識率は再発例の方が有意に高く、MIB-1 標識率の高低が術後再発の1つの指標となることが判明した。

文 献

- 1) Cady B, Sedgwick CE, Meissner WA: Changing clinical, pathologic, therapeutic and survival patterns in differentiated thyroid carcinoma. *Ann Surg* 184: 541-553, 1976.
- 2) Hay ID, Grant CS, Taylor WF: Ipsilateral lobectomy versus bilateral lobar resection in papillary thyroid carcinoma. *Surgery* 102: 1088-1095, 1987.
- 3) Cady B, Rossi R: An expanded view of risk group definition in differentiated thyroid carcinoma. *Surgery* 104: 947-953, 1988.
- 4) 小池明彦, 成瀬隆吉: 甲状腺低分化癌. *KARKINOS* 4: 175-180, 1991.
- 5) 小池明彦: 甲状腺癌: 病態と治療. *愛知医大誌* 21: 489-497, 1993.
- 6) 小池明彦, 金光泰石, 河合庸仁, 荒川敏之, 生駒夏彦, 他: 甲状腺腫瘍細胞の増殖動態に関する研究. *愛知医大誌* 7: 210-214, 1979.
- 7) 葛島達也: 甲状腺乳頭癌の核 DNA はしばしば断片化している. *名市大医誌* 45: 381-391, 1994.
- 8) 内藤明広, 小林俊三, 岩瀬弘敬, 葛島達也, 伊藤和子, 他: 甲状腺腫瘍の細胞死: TUNEL 染色による転移リンパ節の検討. *内分泌外科* 13: 9-13, 1996.
- 9) 津森孝生, 中尾量保, 宮田正彦, 伊豆蔵正明, 森田実, 他: 気道浸潤甲状腺癌の臨床病理学的検討. *日外会誌* 86: 404-410, 1984.
- 10) 水平敏知: オートラジオグラフィー 肉眼から電顕まで. 医歯薬出版: 116-122頁, 1982.
- 11) Kanemitsu T, Koike A, Yamamoto S: Study of the cell proliferation kinetics in ulcerative colitis, adenomatous polyps, and cancer. *Cancer* 56: 1094-1098, 1985.
- 12) 福岡秀樹: 甲状腺腫瘍組織における増殖関連因子発現の解析. *名市大医誌* 44: 435-448, 1993.
- 13) Cattoretti G, Becker MHG, Key G: Monoclonal antibodies against recombinant parts of the Ki67 antigen (MIB1 and MIB2) detect proliferating cells in microwave processed formalin-fixed paraffin section. *J pathol* 168: 357-363, 1992.
- 14) 河野伊智郎, 覚道健一, 宇都宮洋才, 中村圭吾, 宮地条治, 他: 甲状腺4: MIB-1 標識率から見た甲状腺疾患の増殖能. *内分泌外科* 12: 95-99, 1995.
- 15) 浦野 誠, 岩田重信, 高須昭彦, 森 茂樹, 桜井一生, 他: 声帯前癌病変の免疫組織化学的検討-PCNA, MIB1 抗体を用いて-. *日耳鼻* 99: 395-401, 1996.
- 16) 森木利昭, 高橋 保, 植田庄介, 和田匡代, 一園美穂, 他: 甲状腺癌における細胞増殖能と P53 蛋白の発現. *癌の臨床* 42: 421-428, 1996.
- 17) Katoh R, Bray C, Suzuki K, Komiyama A, Hemmi A, et al: Growth Activity in Hyperplastic and Neoplastic Human Thyroid Determined by an Immunohistochemical Staining Procedure Using Monoclonal Antibody MIB-1. *Human Pathology* 26: 139-146, 1995.
- 18) Koike M: Significance of Spontaneous Apoptosis During Colorectal Tumorigenesis. *J Surg Oncol* 62: 97-108, 1996.
- 19) 小池明彦, 成瀬隆吉, 金光泰石, 日比野清康, 山本貞博, 他: 甲状腺癌の転移と治療上の問題点. *日癌治* 12: 133-138, 1977.
- 20) 小池明彦: 甲状腺癌に対する標準手術. *外科治療* 70: 693-699, 1994.

稿を終えるにあたりご指導とご校閲を賜りました夜陣紘治教授に深謝いたします。

また、終始懇切なるご指導いただいた工田昌也講師ならびに、本研究にご助力いただいた愛知県がんセンター消化器外科小池聖彦先生、愛知医科大学第一病理学講座鈴木美奈子助

手、図表の作成にあたりご協力いただいた辰野幸子殿に心から感謝の意を表します。

また本研究に際してご助言いただいた、愛知医科大学第一外科小池明彦名誉教授に厚く謝意を表します

本論文の要旨は第29回甲状腺外科検討会(1996年、福島)。

第98回日本耳鼻咽喉科学会(1997年、大阪)において発表した

(1998年2月2日受稿 1998年4月2日受理)

別刷請求先 〒734-0037 広島市南区霞1-2-3

広島大学医学部耳鼻咽喉科学教室 佐藤 孝至

Significance of MIB-1 Labeling Index and TUNEL Labeling Index in Papillary Carcinoma

Takashi Satoh, M.D.

Department of Otorhinolaryngology, Hiroshima University of Medicine, Hiroshima

Papillary carcinomas, which comprise more than 80% of all thyroid gland cancers, are generally regarded as slow-growing tumors with relatively good prognosis. Histologically and pathologically, there is a close relationship in papillary carcinoma between differentiation and the clinical picture, particularly progress and prognosis. However, tumors with the same degree of differentiation may have very different growth rates. Therefore, it is important that we have some clinical indicator, in addition to differentiation, for projecting clinical prognosis, including the likelihood of postoperative recurrence, and for planning follow-up care. In this study, we used paraffin embedded specimens obtained from 40 cases of papillary carcinoma and assessed the proliferative ability of the tumor with MIB-1 staining. Moreover, in 28 of the 40 cases we used TUNEL staining to study apoptosis in cancer cells, then correlated these two indicators with known information about the clinical pathology and prognosis. The degree of differentiation and intensity of the MIB-1 labeling index correlated almost exactly. Some well-differentiated papillary carcinomas stained heavily with MIB-1. In fact, in all cases of postoperative recurrence the carcinomas were well differentiated, and over half of those showed strong MIB-1 staining. The difference between the MIB-1 labeling index for recurring cancers and non-recurring cancers was statistically significant. In contrast, there was no correlation between the TUNEL labeling index and clinical pathology or postoperative recurrence. However, in cases of well differentiated papillary carcinoma with anaplastic reversion in the recurrence, the TUNEL labeling index was particularly low at the time of the first operation. This indicates that for the purpose of patient follow up, an extremely low TUNEL labeling index may be an important piece of information. We also believe that the MIB-1 labeling index is another indicator of potential postoperative recurrence.

Key words: papillary carcinoma, MIB-1 labeling index, TUNEL labeling index,
postoperative recurrence, differentiation.