文 献

- 1) **Manzulla, Alfred**: Folia biol. May-August (Nos 86-87-88-89): 355, 1938 abstr. Lancet 2: 111 (Nov. 19) 1938
- 2) **Tomlin, Eric**: Potassium Tellurite in the diagnosis of diphtheria, Brit. M. J. I.: 1273 (June 24) 1939
- 3) **Tombleson, J. B. L., and Campbell, R. M.**: The Immediate Tellurite Test in Diphtheria, Brit. M. J. I.: 1275 (June 24) 1939
- 4) **Wayne W. Fox, M. D., and Paul S. Rhoads, M. D.**: Experience with a rapid clinical Test for Diphtheria (Manzulla) The Journal of the American Medical Association: Vol 113 No. 8: 675, 1939 and Vol 113 No. 12: 1134, 1939
- 5) **M. Lisbonne**: Sur deux méthodes rapides de diagnostic de la diphtherie, La Presse Médicale 2: 171 (Nos 13-14) 1940
- 6) **黒川孝一**: テルル酸加里による咽頭デフテリアの診断法に就て, 耳鼻臨床, 第36巻, 第4号, 329頁

稿を終るに臨み恩師城所信五郎博士の御指導竝に御校閲を深謝す

(原稿到着=昭和 23.9.15)

YASUO NAKAGAMI, M.D.: EXPERIMENTAL STUDY ON THE MASKING EFFECT OF ONE PURE TONE ON ANOTHER.

純音の隠蔽作用に関する実験的研究

[前 篇]

東京帝国大学医学部附属医院分院 (主任 颯田教授)

医学士 中 神 保 男
ナカ ガミ ヤス オ

目 次

第一章 緒 言

第二章 実験装置並に方法

第一節 実験装置

第二節 豫備実験

第三節 実験方法

第三章 実験結果

第一部 告知点分散の傾向

第一節 告知点分散と実験誤差

第二節 告知点分散の個人差

第三節 告知点分散と第二音振動数との関係

第四節 告知点分散の場合に於ける各代表点の意味及び其定まり方

第一章 緒 言

一つの音を耳に聞かせる時他の音を感じる能力が低下する時、前者が後者に対して隠蔽作用を及ぼしたと称し、前者を隠蔽音(以下第1音と称す)、後者を被隠蔽音(以下第2音と称す)と云う。此現象に対しては1876年 M. Mayer が注目して以来、主として Bell 研究所に於ける Fletcher, Wegel & Lane による詳細な研究がある。著者は前者の結果に対して種々な疑問を懷き其実験的研究を行い、聊か異なつた見解に達したので之を報告する。

第二章 実験装置並に方法

第一節 実験装置

被験者として 両耳並に一般状態が正常で特

殊な音感乃至音楽教育を受けたことのない成人男子5名、時として6名を選び、廣さ約 $3 \times 3 \text{ m}^2$ 、高さ約4mの防音室を使用し、周囲の出来るだけ静寂な時間を選んで実験を行つた。強さ及び高さ一定なる第1音が種々なる高さに於ける第2音に及ぼす隠蔽作用の調査は約1時間に亘り、被験者には其間耳及び精神の疲労を防ぐために屢々休息が與えられた。実験中被験者の頭位は杵を以て固定され、被験者は防音室の一隅に位置して此対角線上に於ける他の一隅に位置された二つの Speaker の正面に向い、正面より発生する二つの音を両耳で同時に聞く様装置された。

音の発振源としては第1音に対し安藤式唸り発振器(8号 T. A. 型)を、第2音に対し Otoaudion を用いた。之等は防音室の隣室に配置され、それから導かれた電流は夫々別の Speaker に導かれる。発振源に要する電圧は夫々 24V, 130 V, 13V 及び 8 V, 200 V, 20 V であつて、これがためには常に十分に充電された容量の大きな蓄電池を用い、実験中屢々電圧を測定し必要あらば電池を更新して之が恒常に保たれる事を図つた。音源たる Speaker は何れも dynamic corn 式のものであつて頭位固定の杵からの距離は夫々 150 cm, 80 cm である。尙ほ Speaker は別々に電燈線より 50 への交流を導入して第1音、第2音の強さを共に増大せしむる事を図つた。

第二節 予備実験

第一項。I. D. と発振器出力との関係—安藤式唸り発振器より 300 へ、400 へ、800 へ、1200 へ及 2400 への交流を発生せしめ附属してゐる強さ目盛板の読み(I. D.)と出力電圧との関係を測定し之を図表に表わした。此出力電圧は時に多少の変動ある故実験の都度之に補正を加えた。

第二項。Otoaudion の振動数目盛と振動数と

の関係—第2音発振源として Otoaudion より実験中 60 へより 8000 へに亘る種々なる交流を発生せしめたが其振動数 f_2 は Otoaudion 附属の振動数目盛板の読みよりしては不明なので安藤式唸り発振器の與える種々なる振動数 f_1 に比較して之を定め、片対数図表を以て表わした。此図表に依つて実験中任意の振動数をもつた第2音を發振せしめ得るが、極めて小範囲に於ける振動数の変動は性能上免れないので第1音に対し同音倍音乃至和音関係にある第2音を發振せしむる場合には其都度図表に補正を行う必要があつた。

第三項。Otoaudion の強さ目盛板と其出力電圧との関係—之が測定には航空研究所佐藤氏の御厚意を煩わした。其結果は之を図表に示した。振動数に依る変化はないものと仮定した。

第四項。第1音の分析—実験に用いた第1音、第2音の内、第1音 200 へ、400 へ、800 へ、1200 へ及 2400 へに就き I. D.=70 の所で波形の分析を行つた。即被験者の位置に Microphon を置き之を増幅器を経て音響分析器に接続して撮影し、發振せられた音波が大体純音と看做し得る事を認めた。

第三節 実験方法

第一項。強さの測定並に記載法

A) 一定の I. D. に対する第1音の強さ I_1 の決定—唸り発振器の I. D. を一定にして第1音を發振せしめ其出力電圧 V を測定したる後第1音に等しい振動数に於て Otoaudion を發振せしめ之を通常唸り発振器に連結されてある Speaker に導き、Otoaudion の強さ目盛を上下より交互に5回合計10回廻轉調節して其振動数に対する可聴界限の読みを被験者の告知に基づいて決定する時は前節第三項に依り可聴界限に於ける Otoaudion の出力 V_0 が求められる。然る時は、Speaker 性能の差異は上述の逆連結に依り除去され、此 I. D. に於ける I_1 は純音の假定の下に $20 \log \frac{V}{V_0} \text{ db}$ として表わされる。唸り發

振器の I. D. を調節して直接に可聴界限を定める事は、目盛板が其処では既に用をなさなくなるため不可能であつた。

B) Otoaudion の任意の強さ目盛に対する第2音の強さ I_2 の決定—第二節第三項に基づいて算出される。即ち任意の強さ目盛に対応する Otoaudion の出力電圧 v 及び此振動数に対する可聴界限に対応する出力電圧 v_0 が知られる故第2音の強さも上と同様に $I_2 = 20 \log \frac{v}{v_0} \text{ db}$ として決定される。実際には此計算を迅速ならしめる爲、第二節第三項の結果と対数表とを統合した表を用いた。

第二項 実験操作

一定の強さを有する第1音 f_1 200~, 400~, 800~, 1200~, 及 2400~, が f_2 60~ より 8000~ に亘る第2音に及ぼす隠蔽作用が低音部より高音部の方向に順次調査された。此実験例は合計47例である。先ず第1音を發振して其出力を測定した後、之を断絶し、次いで所要の振動数を有する第2音を Otoaudion より發振せしめ此強さ目盛板を上下より交互に5回づゝ合計10回廻轉調節して被験者の告知に基づきこれが可聴界限目盛を決定したる後再び第1音を發振せしめ、此存在に於いて Otoaudion に同様の操作を行う。斯して第1音の存在に於て第2音の消失乃至出現した点を告知に基づき定め、此点における第2音の感覺 Level 上の強さを第1音の第2音に対する隠蔽作用の程度として表わすこととした。此際第2音を明かに聞える強さから弱めて行き聞えなくなる点を求める操作と、第2音を全然認知出来ない強さから漸次強めて行き聞えて来る点を求める操作とを交互に行う事となる。小幡に倣い前者を第一法、後者を第二法と称える。

第三章 實驗結果

第一部 告知点分散の傾向

第1音及び第2音を同時に聞かせつゝ、Otoaudion の強さ目盛を廻轉調節せしめる時は、一般に被験者は或る音の変化を認知するが、此凡てが第2音源の客観的な変化に基づくものなる事は一般には認知されない。之が爲め

実験に際し被験者に第2音の消失又は出現の点を告知する様指示して置いても、被験者は或る音の変化に基づき或は唸り、第2音或は之と高さの異なる第3音、更に或は第2音とも第3音とも判断不能乃至疑問の音の消失乃至出現の点を、或は第1音の清澄化純粹化乃至濁化複雑化の点を、或は判断不明の変化の起つた点の全部又は一部を告知する事となるために、実際には調査せんとする第2音の同一振動数に対して判断の規準の異なる数種の告知点群が定まるのが普通である。著者は此事実を告知点群的分散の傾向又は單に告知点分散の傾向と名付け、db にて表わした最大点群と最小点群との強さの差を分散幅と稱した。

第一節 告知点分散と實驗誤差

告知点分散は實驗誤差即ち Otoaudion の強さ目盛の調節誤差とは全く異なる。即ち後者に於ては其範圍内では告知の規準となるものが同一であるに反し、前者に於ては全く別種のものである。前者に於ては通常其變動範圍は約 2-3 db に止まるに反し、後者に於ては分散幅は通常遙に大きく、30-40 db 或はそれ以上にも及ぶ場合もある。即ち第一法及び第二法を交互に5回づゝ合計10回行つて得た点の全部を採用して之を db にて図示する時は同一振動数 f_2 に対する調査の結果は数種の点群の集合として現われ、同一群内に於ては變動は約 2-3 db に止まるのである。便宜上著者は實驗結果の図示に當つては各点群の代表点のみを選ぶ事としたが、之は實際は点としてではなく約 2-3 db の長さを有する線分として表わさるべきものである。分散を図示する場合には各代表点を点線を以て結合し見易からしむる様にした。此点線上には聴覺現象に於ける判断の異なつた相が並立してゐるものと考えられる。

第二節 告知点分散の個人差

実験例 47 例中調査振動数 f_2 全域に亘り著明な分散幅を示したものは 33 例、分散幅の狭いもの又は f_2 の所々にしか分散を示さなかつたもの 12 例であり、全く此傾向を有しなかつたものは僅かに 2 例を数えるのみであつた。然も実験が進んで被験者が音に慣れて来るに従い此傾向は増大するので、初め此傾向を示さなかつた実験例と雖も再度の実験により之を示して来るべき事が予想される。又恐らく被験者の心理的因子所謂心構えが大きな影響を有するものと如く、同一の被験者に於て、或る音の変化に氣付いて之を告知するも、他の変化には全然氣付かずして告知なく、又氣付いても変化が何時とはなしに起る爲に変化点を確然と告知し得ない場合がある。従つて当面の目的に必要な第 2 音の消失乃至出現の点が告知されないで他種の点が告知される場合も生ずるのである。時としては音の判断の誤認も勿論避け得られない。

第三節 告知点分散と第 2 音振動数との関係

告知点分散の傾向及び其幅は一般に第 1 音より低い第 2 音に対しては少いか或は殆どなく、第 2 音が第 1 音の高さに近づくに従つて増加し、第 1 音より高い第 2 音に対しては著しいが更に第 1 音と振動数に於て著しく掛け離れた第 2 音に対しては再び減少するのを通例とする。

第四節 告知点分散の場合に於ける各代表点の意味及び定まり方

告知点分散が起つた場合一般に最小点を i 点、中間点を m 点、中間点が一つ以上の場合とは小なるものより順次に $m_1, m_2, \dots, m_n$ 点、最大点を s 点と仮に名付ける時、之等各代表点の有する意味及び其定まり方は多種多様であつて凡ゆる場合に該当する説明は殆ど不可能であるが、大体の傾向に就き説明すれば次

の如くなる。

第一項. s 点——一般に第一法によつては s 点のみが決定され、他の諸点は第二法を俟つて初めて決定される事が多い。被験者の心構えの細心な場合には、第一法によつて s 点の外の諸点の全部又は其一部が決定される場合もある。

A) s 点は唸りの生ぜざる多くの場合、第一法に依れば第 2 音の消失した点として決定される。此場合第二法に依れば既に s 点以下の m 点（中間点が一つ以上の場合には通常 s 点に最も近い m_n 点）又は i 点に於て第 2 音の出現が告知され、既に s 点では第 2 音は著明であるのが通例である。図表に於ては此兩点間の幅があまり大きくない場合には兩点に共に $\bigcirc$ 印を附し、又は兩点の中間を撰んで $\bigcirc$ 印を附したが、幅が稍大きい場合には s 点に $\odot$ 、他の点に $\bigcirc$ 印を附した。従つて図表に於ては告知点分散の示されてゐない場合にも、 $\bigcirc$ 印の附してあるは此兩法を通じて得られた隠蔽作用の発現点である。

$\bigcirc$ 印を附した点に於て第 1 音を断絶する事により判断告知の規準となつてゐたものが必ずしも第 2 音ではなかつた事が認められる場合もあるが、客觀的事情が如何にあるうとも実験中被験者が現實に於て其点をば第 2 音消失乃至出現の点として判断告知し、著者の実験に於ては其告知以外に頼る所は無いから、斯かる点をも隠蔽作用発現の点と考えた。

第 2 音の告知が疑問的な場合には $\bigcirc$ 印に $?$ を附して示した。斯かる点に於ては隠蔽作用は発現してゐるのか否か疑問的である。更に $\bigcirc$ 印の附し得ざる場合に於ては隠蔽作用不明である。

B) 特殊な振動数に於ける第 2 音にあつては、第一法及び多くの第二法に依つて s 点が唸りの消失乃至出現の点として決定される場合が多い。斯かる点は図表に於て b 印で示さ

れる。此場合、s 点に近い m 点（中間点が一つ以上の時は通常 m_n 点）又は i 点が更に第 2 音其ものの消失乃至出現を示す場合、及び第 2 音其ものの消失乃至出現が全然告知されぬ場合に別けられる。

前の場合に於ては唸りの消失乃至出現点と隠蔽作用発現点とは明かに判断告知の規準が異なり別個に考えらるべきものであり、後の場合には唸りの消失乃至出現の告知あるに拘らず隠蔽作用其ものは不明である。

第二項. i 点—A) 告知点分散が著しくなく i 点の外に s 点が決定されるに過ぎない場合、i 点は主として第二法に依る第 2 音出現の点として決定される。此場合第 2 音出現の判断が確実な場合と疑問的な場合とある。確実な場合には此点は隠蔽作用発現の点であつて○印を以て示される。此際 s 点は○印又は◎印を附される。疑問的な場合には、1) 被験者には何か聞えて来るが実験装置より考えて多分第 2 音だろうと観念的に判断告知する場合、2) 本来の第 2 音が聞えてゐる様な聞えてゐない様な気がすると云う場合、3) 何か第 1 音の外に唸りが聞えるが、第 2 音が存在するために唸つてゐるのだらうとて第 2 音と告知する場合等多種多様な心理過程が存する事が被験者の告白により明かであるが、之等の点はいづれも隠蔽作用発現点以下にあるものと看做される。

B) 告知点分散が高度に存し、i 点の他に m 点 (m_n 点)、s 点も決定される場合、i 点は主として第二法にのみ依り極めて稀には第一法に依つても決定される。即第一法に依つては今まで聞いてゐた音が清澄或は純粹になつて來た点として、第二法に依つては第 1 音其ものの音色が濁濁して來た或は複雑になつて來た点として決定され図表に於て t 或は k を以

て示される。此現象は通常第 1 音より遙かに低い第 2 音に対しては認められず第 2 音が第 1 音の高さに近づくに従つて現われてくる。

第一法に於ては此点に達する以前に既に第 1 音の外に第 2 音が存すると云う認識はなくなつており、此点に至つて第 1 音其ものの音色が單純或は純粹になつたと判断されるのであり、第二法に於ては此点に至るもなほ第 1 音の外に第 2 音は勿論他の音が存在すると云う認識はなく只第 1 音其ものの音色が複雑になり乃至濁濁して來たと判断されるのであつて、斯かる i 点は隠蔽作用発現点以下に属してゐる点である。

第三項. m 点—s 点 i 点の中間に m 点（又は m_1, m_2, m_n 点）が定まる場合、1) 中間点が m 点のみの場合は、主として第二法により第 1 音の外に何等かの音の聞えて來た点として定まる事が多い。此音は一般に第 2 音とは異なつた第 3 音と判断される場合が多いが、第 2 音かも知れないと判断されることもある。前者の場合斯かる第 3 音は低い性質のものである事が多く第 1 音と第 2 音によつて生ずる和音乃至差音と推定されるが明かでない。後者の場合には、第 2 音の判断不確実であつて隠蔽作用発現点とは考えられない。2) 中間点として m 点の代りに m_1, m_2, m_n 等数種の点が決定される場合、それ等の有する意味は多種多様であつて一概に述べる事は出来ない。唸りの出現を意味し之に近い s 点に於て第 2 音が確實に出現する前触れとなる場合もあり、又既に確實に第 2 音の出現を意味する場合もある。又 m_1, m_2, m_n 等の各々が数種の異なつた結合音の出現を意味すると考えられる場合もあり、更に実験者にも被験者にも全然如何なる変化なるか判断出來ぬ場合もある。

throat, by examining the character of the pseudomembrane, days of sickness, and the effect of therapeutic serum injections. It was found that the percentage of positive reaction was high in thick and adherent pseudomembrane, and also in fresh cases (as high as 78.2 %); otherwise the percentage was lower. The percentage of positive reaction was very high before and on the day of injection of the therapeutic serum, though it lowered afterward. In other diseases than diphtheria, the percentage was very low.

AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE MASKING EFFECT OF A PURE TONE ON ANOTHER

by

Y. NAKAGAMI

From the Phonetic Department (Prof. C. Satta), Branch Hospital, University of Tokyo.

In regard to the findings of Fletcher, Wagel and Lane on this subject, a series of experiments were carried out with the following results. In a square sound-tight room of the dimension 3 meters by 3 and 4 m high, 5 or 6 subjects were seated in a corner facing straight toward a pair of loudspeakers of dynamic cone type, A and B, set up in the diagonally opposite corner of the room. Each of these loudspeakers was in connection with a beat frequency oscillator and an otoaudion, so that A generated masking tones and B those to be masked. Tones thus generated were first analysed by means of a tone-analyser and found practically pure.

In the procedure the source A for masking tones was maintained at various constant frequencies f_1 and intensities, while the source B for the tones to be masked was fixed each time at a certain frequency f_2 and varied in intensity upward (method of augmentation) or downward (method of attenuation) alternately.

The subjects were to attend to any change of the acoustic field produced by tones A and B. Every perceptible change was reported on the spot and its probable quality recorded in a chart. Only the critical intensity at which the tone B with its own distinct pitch became just perceptible or imperceptible in the presence of the tone A was decided as the point of masking and was plotted in the chart. Forty seven charts thus obtained were examined and the following conclusions were drawn:

(i) The masking effect of a pure tone A of a constant frequency f_1 maintained on a level about 60-80 db is generally most remarkable upon another tone B when the latter is of a frequency f_2 within a range as shown in the following table:

Pitch f_1 of the masking tone A	Pitch range f_2 of the tone B most effectively masked by tone A
200 cycles	150 - 1000 cycles
400	300 - 2000
800	700 - 4000
1200	1100 - 4000
2400	2100 - 6000

Masking effect of a tone on another of a definitely lower frequency or of much higher frequency was found slight, which result confirms in general the statement of Fletcher et al.

(ii) (a) When A and B are unisonant or in harmonic relation with each other, it is illogical to speak of a masking effect, because differential perception of B in the presence of A in such circumstances is generally impossible and no report as to the critical intensity of B was given by the examinee.

(b) When the two tones A. and B are approximately unisonant or in harmonic relation, it is generally difficult to perceive B in the presence of A and even if B is "spotted", it is only done without confidence. Of course there occurs a beat, but the perception of beat is utterly different from that of the tone B itself. The conclusion by the above mentioned authors that masking effect undergoes a sharp drop in such relation between the two tones A and B is not accepted by the present author.

(iii) Combination of the method of attenuation with that of augmentation proved preferable, as it provides the examinee with a preparatory opportunity for the distinct knowledge of the pitch of the tone B.

(iv) When a pure tone B is objectively co-existant with another pure tone A, it produces in perception one of the following phenomena:

(a) Tone B is perceived with a distinct pitch,

(b) tone B is perceived with an undefinable pitch, though differentiated from the tone A, and

(c) B is not perceived as an independent tone, but a certain alteration in quality of the tone A is felt as the result of the co-existence of the tone B.

These are not only subjectively different perceptions, but caused by objectively different conditions. The terms, "a single tone" and "two tones", which conceptions have been generally accepted without question, ought to be defined more strictly.

(v) Contrary to the expectation that the masking effect of a tone A will be found more or less active on various tones (Bs) over the whole continuous range of pitch, it was proved that the masking effect is not given as a simple continuous function of the intensity of A, frequencies of A and B. It was also realized that due weight should

be given to subjective or psychological factors, considering the circumstance that the experiment finally depends on the subjective experience of the examinee, who is incessantly subjected to the influence of sensation of harmony, dissonance, fusibility or distinction and further more psychological factors.

A CASE OF ESOPHAGEAL SYPHILIS.

by

H. KAWAHARA and G. YANAGINO.

From the Department of Otolaryngology (Chief: Prof. T. Goto),
Nagasaki University School of Medicine.

Patient: aged 52, farmer. He complained of dysphagia and slight pain irradiating to the back since 3 months. Dysphagia was so marked as to interfere with the taking of liquid food.

These symptoms resembled that of esophageal cancer, but there was esophagoscopically found at 25 cm. from the incisors a stricture and superficial ulceration, which bled easily and was covered with a thin layer of dirty pseudomembrane.

Removed specimen pieces of tissue showed thickened intima, infiltration of round and plasma cells and regeneration of the mucous membrane. Serologic test was strongly positive for syphilis. Antisyphilitic treatment meliorated the subjective and objective symptoms, but moderate stricture still persisted after 2 months.