- Cersuni*: J. physiol. Vol. 89, 1937. 6) 1949. 18) 船石: 日生理誌, 11, 1949. 19) *Stevens & Davis*: Hearing. New York John Wiley & Sons 1938. 7) 佐藤: 大日耳鼻, 46, 1940. 8) 玉尾: 岡山医学会誌, 1943. 9) *Stevens & Jones*: J. Acous. Soc. Amer. Vol. 10, 1939, 1940. 10) 渡辺, 中村, 林: 慶應医学, Vol. 22, 1942. 11) 船石: 女子医学研究, 19, 1949. 12) *Kellaway*: J. Neurophysiol. 7, 1944, 9, 1946. 13) *Stevens, Jones & Lurie*: J. Acous. Soc. Amer. Vol. 12, 1940. 14) *Galambos & Davis*: J. Neurophysiol. 6, 1943. 15) *Home & Guild, Lurie, Davis & Derbyshire*: Hearing. 1938. 16) *Stevens & Davis*: Hearing. 1938. 17) 横屋: 日生理誌, 11, 学11, 1948. 20) 岩間: 日生理誌, 10, 1948. 21) *Granit*: J. Neurophysiol. 11, 1948.

摺筆するに当り御指導御校閲を賜わった
恩師西端誠一教授並に終始御懇篤なる御指
導を賜わった生理学教室富田恒男助教授に
衷心より深謝致しますと同時に耳鼻咽喉科
教室講師窪田一胤博士及び賀川裕夫博士の
御援助に感謝の意を表します。

(原稿到着 = 昭和 25. 10. 14)

S. KATAGIRI, M.D.: EXPERIMENTAL STUDIES OF THE INFLUENCE OF ROTATION ON THE EAR

迴轉運動の聴器に及ぼす影響に関する 実験的研究 (前篇)

遠心迴轉直後に於ける聴器の病理組織学的研究

東北大学医学部耳鼻咽喉科教室 (主任 立木教授)

片 桐 主 一
カタギリ シュエ イチ

内 容

- I 緒 言
- II 実験動物及び実験方法
- III 実験成績概括
- IV 考 按
- V 結 論

I. 緒 言

感覚器に對する適刺激が生理的限界を超えた強さに於て作用する時は該感覚器は機能的にのみならず器質的にも障碍される事があるが、迴轉又は直線運動を適刺激として感受する前庭迷路に對しても超生理的刺激として與えられる場合には過度音響刺激の蝸牛迷路に對すると同様に前庭器感受部位に何等かの器質的變化を招來する可能性を否定する事は出来ない。前庭迷路に對する此種の實驗的研究は1909年

Wittmaack の海眞に就ての強力なる迴轉實驗を嚆矢とし de Kleyn, Magnus, Versteegh, Chilow, 長谷川等により試みられた。然し其目的は耳石機能を追求する事にあつた。従つて其際の遠心力は耳石膜を剝離し得る方向に働かなければならない。之等と異なる體腹背軸を中心とする迴轉實驗は至つて少い。即ち柴, 林, Jonason 等の研究があるに過ぎない。斯様な體長軸の方向に遠心力が作用する場合には耳石膜剝離實驗とは異なつた影響を迷路に及ぼす筈であり、殊に血液循環系及び腦壓に對する影響を無視する事は出来ない。此意味に於ける迴轉刺激に對する迷路の態度こそ本研究の對象である。

II. 實驗動物及び實驗方法

体重 2 kg 内外の健康成熟家兔で鼓膜正常且つ迷路機能に異常のないものを使用した。

迴轉には半径 1 m の電動式迴轉装置を用い迴轉軸より内耳迄の距離 1 m の所に家兎を背位に固定した。迴轉の起始は可及的短時間内に然も急激なる衝動を與える事なく所要速度に達する様に行われた。停止の際も亦同様である。尙迴轉方向はすべて右廻りである。遠心力の方向により 2 群に分ち、即ち I 群では其方向頭→尾、II 群では尾→頭とした。実験直後諸種迷路反射を速かに検査した後、生体固定法を行つた。固定液は Wittmaack 氏液、脱灰液は 5% 硝酸フォルマリンを用い、Celloidin に包埋し、15 μ の連続切片となし、Haematoxylin-Eosin 重染色及び Tolluidinblau 染色法を施した。

各群の試獣の實驗條件は第 1 表の通りである。

第 1 表

実験群	頻	迴轉数 (1分時)	迴轉時間 (秒)	法線加 速 度 (g)	例 数	試 獣 番 号
I	1	96	60	10	3	26, 33, 35
	2	120	60	15	3	14, 15, 27
	3	130	60	20	2	18, 19
II	1	96	30	10	1	37
	2	96	60	10	3	2, 4, 5
	3	120	30	15	3	6, 7, 9
	4	120	60	15	2	10, 11
	5	130	60	20	2	16, 17

III. 實驗成績概括

1. 外耳及び中耳

外、中耳に於ける主なる変化は出血である。全数 19 頭 38 耳中、外耳道出血は 34 耳、鼓膜内出血は 32 耳に見られ、又中耳内出血は 34 耳である。中耳出血の好発部位は殊に前庭窓附近で、其他蝸牛窓、中耳粘膜下又は稀には顔面神経管内等である。之等出血は II 群に頻多且つ著明であつた。尙中耳粘膜の浮腫（各群 2 耳）を認めた。

2. 内 耳

a. 蝸 牛 迷 路

内外淋巴腔：主な変化は迷路膜縁壁の形態異常、腔内の出血又は漿液性物質の滲漏現象である。形態異常としてはライスネル膜（以下「ラ」膜）の沈降、挙上、波状又は断裂及び第二鼓膜の変形等がある。「ラ」膜沈降各群 5 耳；挙上 II 群にのみ 8 耳；波状

I 群 1 耳、II 群 5 耳；断裂 I 群 3 耳、II 群 2 耳。「ラ」膜の緊張異常は II 群に多く、然も挙上は II 群にのみ見られ、沈降及び断裂は I 群に多い。

第二鼓膜の形態異常としては中耳側への膨出（I 群 1 耳、II 群 5 耳）、高度の内陷（I 群 4 耳、II 群 2 耳）を認めた。膨出例中 2 耳（15 号右耳、6 号左耳）は「ラ」膜の著明な沈降を、1 耳（16 号右耳）は其断裂を伴つた。又内陷例中 2 耳（33 号両耳）は「ラ」膜の波状を、14 号右耳は沈降、同左耳は断裂を示した。

次に内外淋巴腔に於ける出血乃至漿液性雲絮狀物質の滲漏現象に就て見るに I 群 10 耳、II 群 15 耳に認められた。之等の変化は外淋巴腔殊に基底迴轉鼓室階及び蝸牛導水管内に最も多く見られた。其他中央乃至尖端迴轉鼓室階或は前庭階に之等滲漏現象を示したものは II 群にのみ 8 耳ある。蝸牛管は一般に清澄であるが II 群 2 耳に軽微な滲漏物が見られた。

コルチ器：有毛乃至支柱細胞に概して軽微な変化を示したものがある。主なる所見は胞体及び核の腫大膨化乃至淡染、或は之に反し縮小濃染で時に胞体内に空胞を認めた。一般に膨化腫大は I 群に（6 耳）、縮小濃染は II 群に多い（17 耳）。

脈絡帯及び螺旋靱帯：脈絡帯の收縮又は腫大を示すものがある。即ち前者は各群 9 耳、後者は II 群にのみ 6 耳に認められた。螺旋靱帯に於ては結締組織鬆組となり所々に空隙形成を示すものがある。（I 群 4 耳、II 群 8 耳）。

螺旋神経節細胞：変化を示すもの少く且つ軽微である。胞体乃至核は收縮又は腫大し、又ニッスル小体も鮮明を欠くものがある。変化を示したものは I 群 6 耳、II 群 4 耳である。

b. 前 庭 迷 路

外淋巴槽：内腔はすべて清澄であるが内腔拡大を示すもの各群 2 耳あり、何れも鍍骨足板は中耳腔に膨出し又屢々前庭小囊を圧迫して内淋巴腔の狭窄を起している。其中 3 耳は「ラ」膜の著しい沈降を、他の 1 耳は其断裂を伴つた。之に対し外淋巴槽の狭窄は II 群の 1 耳に認められた。

前庭小囊：認められた変化は内淋巴腔の狭窄又は膜縁壁の断裂、平衡斑上皮並に耳石膜の変化等である。

内淋巴腔狭窄は球形嚢に於てはⅠ群1耳、Ⅱ群4耳に、卵形嚢に於てはⅠ群5耳、Ⅱ群6耳に認められ、又膜様壁断裂は各群1耳である。即ち内淋巴腔狭窄は一般に球形嚢より卵形嚢に多く見られた。

平衡斑の変化は主に感覚上皮細胞の収縮性変化で支柱細胞には異常を認めない。稍々著明な変化は球形嚢に於てはⅠ群7耳、Ⅱ群6耳に、又卵形嚢に於ては各群6耳である。

次に耳石膜の変化としては耳石の減少或は耳石膜の一部の剝離が見られ又屢々感覚毛の乱生を伴う場合がある。之等の変化は球形嚢ではⅠ群5耳、Ⅱ群14耳、卵形嚢ではⅠ群4耳、Ⅱ群12耳に見られた。

半規管及び膨大部後：主として膨大部内淋巴腔の狭窄、膨大部後感覚上皮の収縮像及びクブラの形態異常等が見られた。膨大部内淋巴腔狭窄は最も屢見られ、著明な場合には膜様壁強く内陷しクブラを圧迫して其変形を來したのものもある（Ⅰ群5耳、Ⅱ群7耳）。其他膨大部膜様壁の断裂（Ⅱ群1耳）、半規管脚部内淋巴腔の狭窄（Ⅰ群6耳、Ⅱ群8耳）、或は雲絮状滲漏物（Ⅰ群2耳、Ⅱ群4耳）等が認められた。

膨大部後感覚上皮の稍々著明な収縮像を示したものはⅠ群7耳、Ⅱ群4耳である。

クブラの形態異常は各群5耳あり、殊にⅠ群35号左耳前膨大部及びⅡ群10号右耳外膨大部に於てはクブラはその基底より離断し内淋巴腔内に遊離しているのが認められた。尙クブラの腫大膨化はⅠ群2耳、Ⅱ群3耳に見られた。

内淋巴管及び内淋巴嚢：内淋巴管には殆んど異常を認めない。内淋巴嚢は対照に比し著しく多量の細胞成分或は雲絮状滲漏物を含むものがある（Ⅰ群2耳、Ⅱ群3耳）。又上皮組織の浮腫を示すものもあつた（Ⅰ群2耳、Ⅱ群4耳）。

前庭神経節細胞：螺旋神経節細胞に比し更に其変化輕微であるが一部に胞体及び核の収縮像を認めた（Ⅰ群3耳、Ⅱ群2耳）。

IV. 考 按

本實驗に於て得た成績は（1）聴器内血液循環系の障害、特に出血、（2）内外淋巴腔及び迷路内可動性膜様組織の形態的變化及び（3）聴器末梢感覺組織及び神経諸要素の變化の3項に要約される。

1. 血液循環系障害（特に出血に就て）

既述の如く出血は外、中耳に著明なるに反し内耳に於ては輕微である。外、中耳出血は頭部鬱血を起す實驗群に於て著明であるが又貧血を來すべき1群にも見られた點は林の成績と同様である。尙外、中耳出血は血管に富む軟組織が硬固な骨組織に接する部位に好發し、從つて血管破綻性出血である。之に對し内耳血管は迷路骨質中に埋存し遠心力の直接的破壊作用を蒙り難く、又急激なる廻轉に際しての血液分布狀態が外、中耳と異なる事が内耳出血の輕微且つ稀なる因であらう。遠心廻轉による内耳出血はWittmaack, 三井等の言う如く瀝出性出血と看做すを妥當と考える。尙内外淋巴腔内の雲絮状滲漏物の存在も亦血液循環障碍に由來する變化と考へ度い。内耳内に於ける出血性變化乃至滲漏現象は血液循環障碍のみならず遠心力による腦脊髄液壓乃至腦壓の變動も亦之に關與するものと思われる。

2. 内外淋巴腔及び膜様組織の形態異常

蝸牛迷路に於ては「ラ」膜及び第二鼓膜に、前庭迷路に於ては小嚢乃至半規管膨大部膜様壁に、又時として鐙骨足板に形態異常を認め、又之に伴う内外淋巴腔の變形が見られたが之等の變化は何れも内外淋巴液壓の平衡破綻に因るものである。「ラ」膜の緊張異常の成因を内外淋巴液の流動による影響或は振盪の直接的作用に求める者（林、三井等）もあるが聴器内血液循環障碍も亦其成立に關係なしとは言われない。聴器の血液循環障碍に關する實驗に於て鬱血の際は「ラ」膜の擧上を（龍治）、又頸部動脈結紮の際は其洗降を（松浦）證明したと言う報告は實驗條件を異にするとは言へ參考にすべき所見である。次に第二鼓膜の變形に就て見るに同膜は蝸牛導水管開口部に近く存在し從つて腦脊髄液壓變動に由來する外淋巴液壓の影響を感受し易い位置にあると共に他方中耳よりする影響も受け易いものと考えられる。從つて同膜の形態變化は迷路液の過度な流動による内壓變化と共に腦脊髄液壓の變動に起因するものであらう。本實驗に於て膜膨出例に「ラ」膜洗降を伴うものがあるのは之等膜組織が淋巴液壓異常に影響される事を示すものである。尙前庭迷路に於て外淋巴腔擴大及び小嚢内腔狹窄例が同時に「ラ」膜の著しい洗降を伴つた所見は迷路外淋巴液壓異常

片 桐 論 文 附 圖

第 1 圖

第1図 第4号動物 左耳蝸牛迷路 ライスネル膜沈降著しく、蝸牛殻管狭窄す。脈絡帯は稍々収縮す。(10×8) [Zeis]

第 2 圖

第2図 第7号動物 右耳蝸牛迷路 ライスネル膜挙上し、蝸牛殻管稍々拡大す。脈絡帯血管は拡張を示す。(5×8)

第 3 圖

第3図 第15号動物 外側膨大部内淋巴腔狭窄し、クプラは著しく短縮し且つ側方に偏す(10×8)

第 4 圖

第4図 第14号動物 右耳外側膨大部 聴櫛感覚上皮の収縮像を示す。胞体の収縮、核の縮小、濃染を認め、クプラは著しく短縮す。(5×40)

片 桐 論 文 附 圖

第 5 圖

第5図 第2号動物 左耳正田囊 聴覚感
覚上皮に少々著明な収縮像を認め、胞体周囲
空隙形成著しく、耳石は減少す。(10×40)

第 6 圖

第6図 第55号動物 右耳外側膨大部
クアラは其基底より離断し、内淋巴腔内に
遊離す。感覚上皮に軽度の萎縮を見る。
(10×8)

第 7 圖

第7図 第65号動物 左耳前庭神経節細胞
胞体及び核の萎縮濃染又は膨化淡染を示
すものあり、ニハル小体減少又は消失す。
(10×40)

第 8 圖

第8図 第54号動物 右耳後膨大部 内
淋巴腔内に滲漏物多量にあり、聴櫛は崩壊し
てクアラの残骸を見る(10×8)

特に亢進を意味するものと言えよう。

3. 内耳感覚装置及び聴神経節細胞の變化

過度迴轉刺戟は内耳感覚装置及び聴神経節細胞に形態的變化を惹起し得る事を證明した。コルチ器も其影響を受け得る事は從來の報告にも見られる。即ち柴、三井等は蝸牛感覚装置の變化は前庭迷路のそれに比し著明であるとし、其因を受傷性の相違に歸した。之に反し Wittmaack は蝸牛迷路は前庭迷路に比し侵襲の度輕微であるとした。余の實驗に於ては一般に前庭迷路の變化は蝸牛迷路のそれに較べ比較的著明であつたと言える。即ち既述の如く平衡斑及び膨大部後感覚細胞並に耳石膜及びクプラに形態的變化が證明された。之等前庭迷路感覚装置の所見こそ本實驗の特徴である。其一部に感覚上皮に所謂壓縮像に一致する所見を認めたが内淋巴液壓亢進と関連を有するものと思う。耳石膜に對する影響は同膜剝離を目的とする迴轉實驗の場合と同列視し得ないのは當然であるが、耳石膜に對する遠心作用の影響と言う點で相通する所あり參考となすべきものと信ずる。即ち Wittmaack、長谷川等は耳石膜の剝離の可能なことを認めているが、平衡斑感覚上皮には著變を證明せずと言い、又 de Kleyn, Magnus は耳石膜は剝離される事なくとも耳石機能は一過性に障礙され得ると述べた。耳石膜剝離を目的とせぬ迴轉實驗に於ても耳石膜に或程度の變化を招來し得る事は柴、三井、林等の成績に於ても一致する所である。之等耳石膜の變化は耳石の比重大なる爲め遠心力の作用を受け易く過度の迷路震盪作用も加つて耳石の剝離飛散を來す結果發現するものであらう。次にクプラの形態的變化、殊に其基底よりの離斷は特異な所見である。此場合平衡斑感覚上皮には著變を認めない故其成因は循環障礙或は淋巴内壓の變動では説明されない。従つて遠心力の直接的作用によるものと思うべきであらう。長谷川はクプラの腫大を認め遠心力の直接作用によるものとした。Wittmaack, Chilow 等は遠心力はクプラに器質的障礙を起し得ないと述べているが柴、三井は膨大部後感覚上皮の變化と共にクプラの變形を認めた。膨大部後は迴轉運動の感受部位であるが適刺戟と雖も過度なる場合には機能的にのみならず器質的にも障礙され得る事を否定し得ない。蓋し膨大部後に見ら

れた變化は内外淋巴腔の形態異常と共に注目すべき所見である。

蝸牛及び前庭神経節細胞は何れも形態的變化を示す事があるが其程度及び頻度は末梢感覚装置の變化に比し一般に輕微であり然も節細胞に變化を示す場合はすべて其末梢感覚装置も亦侵されていると言う事實は延轉刺戟の初發侵襲部位は末梢感覚装置であることを意味するものである。

脈絡帯及び螺旋靱帶の變化

内淋巴液生成部位と看做される脈絡帯、及び螺旋靱帶は諸種聴器疾患に際し屢々病變を示す事は周知の事實である。殊に内淋巴液分泌乃至血液循環障礙に際し其影響を蒙り得べきは想像に難くない。本實驗に於てⅡ群に血管擴張と共に「ラ」膜の腫上を示すものを認めたが此所見は脈絡帯の内淋巴液生成機能に關連あるものとして注目すべきものと思う。

内淋巴嚢の變化

嚢内に對照標本に比しエオジンで赤染する等質様或は雲絮狀物質及び細胞成分を多量に認めたものがある。正常な場合に見られる細胞成分は組織球に屬し等様物質は一部之等細胞の喰喰作用に關係ありとされているが、本實驗に於て多量に證明されたのは病的現象と看做してもよいと思う。其成立には淋巴液壓の過度な變動が關係あるものと考えられる。

以上の如く強力なる遠心迴轉は遠心力の方向が體長軸に一致する場合に於ても聴器迷路に形態的變化を惹起し得る事を證明した。然も其變化は林、Jonason の反復又は長時間迴轉實驗の如き本質的な萎縮性退行性變化ではなく、主として内外淋巴腔乃至膜様組織の形態的變化を中心とした内耳感覚装置の形態異常であると言う事が出来る。

此場合の諸變化の成立機轉に關して考察するに遠心力により頭部に鬱血又は貧血を起すと共に更に腦脊髄液壓乃至腦壓の變動に伴う迷路内壓の變化を招來するものと考えられる。即ち聴器内血液循環障礙の結果並に遠心力の直接的作用も加わり、外、中耳に於ては破綻性出血が、又内耳に於ては滲出性出血或は漿液性物質の滲漏現象が起るのである。更に腦脊髄液壓乃至腦壓變動の影響は蝸牛導水管を経て直接的に、或は硬腦膜を介して内淋巴嚢に間接的に及

ぶ事が考えられる。即ち本實驗に於て認められた上記の諸形態的變化の成立機轉は遠心力による聽器内循環障礙及び迷路液の流動或は内耳膜様組織の震盪等の合成作用を主因とし更に迷路内壓の變動及び遠心力自身による物理的作用も加わつて發來するものとする可きであらう。

V. 結 論

迷路機能正常なる家兎に就て背腹軸を中心とする強力な遠心廻轉を行い聽器迷路に形態的變化を惹起し得る事を證明した。其主なる成績は次の通りである。

1. 外耳及び中耳に於ては主として出血が見られた。
2. 内耳に於ては出血性變化は輕微であつて主要なる所見は内外淋巴腔及び膜様組織の形態異常、即ち「ラ」膜、第二鼓膜、外淋巴槽、前庭小囊及び半規管膨大部内淋巴腔の變位變形、又は膜様壁斷裂等である。

3. 内耳感覺裝置に於ては感覺上皮細胞の胞體及び核の腫大又は收縮等が證明され、更に耳石膜及びクブラの變化を示したものが少くない。

4. 蝸牛及び前庭神經節細胞の變化は末梢感覺裝置に比し輕微であり、末梢感覺裝置は初發侵襲部位と考えられる。

5. 以上の諸變化は頭部鬱血を來すべき實驗群に於て一般に頻多且つ高度である。

6. 前庭迷路感覺裝置の障礙は蝸牛迷路のそれに比し一般に著明であつた。即ち廻轉刺激は前庭迷路に對する適刺激であるが、超生理的強さに於て作用する時は前庭迷路感覺裝置を障礙し得るものである。

7. 遠心廻轉による聽器障礙の成立機構は遠心力による聽器血液循環障礙及び迷路液の流動又は膜様組織の震盪等の合成作用を主因とし迷路内壓の變動及び遠心力自身の物理的作用も加わつて起るものと考えられる。

(原稿到着 = 昭和 25. 11. 11)

S. HAYASHI, M.D.: STATISTIC STUDY OF MASTOID CELL DEVELOPMENT IN CASES OF CHRONIC OTITIS MEDIA, AS OBSERVED IN X-RAY PICTURES.

慢性中耳炎の側頭骨含氣蜂巣の「レ」線像に依る統計的研究

東京・三樂病院耳鼻咽喉科 (医長 城所信五郎)

医学士 林 四 郎
ハヤシ シロウ

〔承 前〕

第4項 慢性中耳炎「レ」線像に於ける乳様蜂巣含氣度の左右比較

若し含氣蜂巣形成を障礙する外的因子なかりせば含氣蜂巣は概れ左右一致す可く、又其含氣度も下田の報告と大体一致す可きものと信ず。著者は慢性中耳炎に於ける乳様蜂巣含氣度を病類別、一側性、兩側性のものに分類して左右を比較考察せんとす。

〔A〕慢性固有鼓室化膿症に於ける 左右一致度 (データ省略)

両耳罹患せるもの一致 81.5%, 不一致 18.5%, 一

側のみ罹患せるもの一致 40%, 不一致 60% なり。
両者を綜合せるものは一致 50.4%, 不一致 49.6%。

〔B〕慢性上鼓室化膿症に於ける左右一致度 (データ省略)

両耳罹患せるもの一致 84.2%, 不一致 15.8%, 一側のみ罹患せるもの一致 54.6%, 不一致 45.4%, 両者を綜合せるものは一致 59.5%, 不一致 40.5%。

〔C〕眞珠症に於ける左右一致度 (データ省略)

両耳罹患せるもの一致 96.4%, 不一致 3.6%, 一