M. SATO, M.D.: OBSERVATIONS ON THE "GENERAL NYSTAGMUS"

全身性振盪 (General nystagmus) に就て

新潟大学医学部生理学教室 (主任 高木健太郎教授)

佐藤 素一
サ トウ モトイチ

第1章 緒 言

今迄種々なる方法で動物に眼球振盪 (以下眼振と記す) を解發させて、各方面より觀察した研究は枚舉に遑ないが、この眼振のリズムに一致した振盪現象が他にも存在するか否かを確認した研究は head-nystagmus¹⁾, auricular-nystagmus²⁾, levator-nystagmus³⁾, nictitans-nystagmus⁴⁾ 等であつて、頸部より下の部分については觸れていない。

私は一側迷路破壊後約 20 時間を経過した家兎の反對側前肢に、眼振の周期と同期的な律動的運動を認めたので、かゝる兎の反對側大腿伸筋の働作流を眼振と同時にオッシログラフに撮影してみたものは第1圖に示すものであるが、私は以下述べる方法でこれを追及し、詳細に身体各部の筋活動の状態を調べてみた。

第2章 實驗方法

實驗動物には専ら家兎を用いたが、暗黒色と純白色のものは反応の顯著でないところから之を除外し茶、褐、灰色等の着色家兎を好んで用い、腹位固定で實驗した。

E.M.G. は三段増幅で、同心型針電極又は 2 本の注射針電極を用いて誘導した。

眼振發現には、通常行われている溫度性眼振、藥物的 (Alcohol, Cocain による) 眼振、一側迷路破壊性眼振、Bechterew の代償性眼振をもつてし、この眼振と共に四肢、軀幹筋の働作流を同時にオッシログラフに撮影した。

(第1圖)

眼振(上)と右大腿伸筋の筋電図(下)
(時標 1 秒)

第3章 實驗成績

一般に眼振の現われている時には、全身的に不規則な筋活動の亢進が認められることが多い。

A. 溫度性眼振時の四肢筋の態度

通常行われている方法により溫度性眼振を起させて、同時に四肢筋を觀察すると、常に眼振と同期する活動を認めることは出来ないが、屢々同期する傾

(第2圖) 溫度性眼振時の筋電図

眼 振

左撓腕屈筋

時 標 1 秒

向をもつた spike 群を観察することが出来る (第2圖)。注入する水の温度を種々變えて試みたが、結果には大差なかつた。

B. 一側迷路破壊の場合

眼振を比較的長時間、しかも規則正しく持続させるために片側迷路を通常行われている手術的方法により破壊曠置して観察した。この場合破壊直後には肉眼的に四肢、軀幹に眼振と同期する振盪は認められないが、數時間経過して眼振が整調になると共に屢々四肢にも律動的運動が觀察されるようになって来る。しかし手術的侵襲やその他の原因によつて動物が屢々固定台上で暴れると、かゝる同期的な律動

性は亂れ、働作流の上でも不明となり不規則な大きい放電の連続になつてしまふ。そして暫く待つと又少しずつ同期する傾向のある spike 群が觀察出来る。しかし動物に對する些細な刺激でもすぐ同期性を失つて、働作流の上でも發見が困難となる。即ち手術直後はあまりよく觀察出来ないが、いくらか時間を経過すると暫くの間は條件がうまく行くなれば、同期的な全身性の振盪を認めうるが、之も漸次消失して行きまだ眼振や頭振が明瞭に認められるのに頸部以下の振盪は全く影を潜めるように思われる。この同期的な全身性振盪は甚だ微弱で、出現も短時間であつた (第3圖)。

(第3圖) 一側破壞性眼振時の筋電図

C. Bechterew の代償性眼振の場合

一側迷路を破壊して約1ヶ月後、他側の迷路を破壊して、所謂 Bechterew の代償性眼振を起させた場合には、全身性の振盪を極めて明瞭に認めることが出来た (第4圖)。圖のように檢べた全ての筋に明瞭に眼振と同期した活動電流を証明出来た。圖は術後6時間を経過した時のもので、術後2~3時間で撮影したものに比べて、却つて明瞭に現われており肉眼的にも眼振と同期して、四肢の伸展するのが認められた。そして眼振の rapid phase に一致して四肢は伸展位をとるのである。

E. M. G. でも判るように、屈筋伸筋共に rapid phase に一致して伸展することがこのことから理解出来る。又これ等を同時撮影しても伸、屈筋共に rapid phase に同期的であることが判るし (第5圖)、左右の伸筋を同時に撮影してみても、左右で同時的であることがわかる (第6圖)。

又四肢の spike 群と軀幹のそれを比較すると四肢に於けるものは眼振の rapid phase に一致する尖鋭なものであるが、軀幹のそれは slow phase にまで延長した持続的な傾向がある様に思える。

之等全身性振盪は以上述べた如く、殆ど大部分が rapid phase に一致しているが、唯頸部深層の M. longus atlantis に於ては趣を異にし左右で reciprocal な收縮を見る (第7圖)。之は水平眼振を起している眼の内外兩直筋と同様で (第8圖)、他の筋と異なるところである。しかし同じ部位でも浅層の頸筋は他の全身性のものと同様 synchronous である。

D. 植物神経毒の之等全身性振盪への影響

之等全身性振盪に對して植物神経毒である Adrenalin, Acetylcholin, Pilocarpin, Atropin を該振盪中皮下注射により與えてみたが、著明な變化はなかつた。

(第4圖) 代償性眼振の筋電図

右側

左側

(第5圖) 四肢の筋電図

(第6圖) 四肢の筋電図

(第7圖) 深頸筋 M. longus atlantis の筋電図

(第8圖) 眼振の筋電図

E. 脳剔除実験

- i) 両側大脳皮質を除去した場合
- ii) 迷路摘出側の脳皮質を除去した場合
- iii) 迷路摘出と反対側の脳皮質を除去した場合
- iv) 視丘迄両側大脳を全部除去した場合
- v) 片側の Corpora quadrigemina の前迄除去した場合

上記 i)~v) の脳剔除をした場合にも全身性振盪に対する影響は著明でなかった。

第4章 考 按

1. 全身性振盪の解發状態

兎の一侧迷路を破壊置した直後は、眼球も痙攣様のこまかい運動をしているのを見ることが出来るが、同時に全身性にもふるえとも振盪とも區別つかない不規則な運動の起つているのを認めることが出来る。

しかし時間が経過して、やがて震顫様の眼球運動も急緩2相のはつきりした普通我々のいう眼球振盪の状態となる。そして眼振のリズムがある程度緩やかになると時々眼振の相に一致して全身性にも振盪なる現象の解發を認めるようになる。これが強い場合には肉眼的にも明瞭に四肢の伸展するのが見受けられるが、この出現は割合に短時間なために見落されたり、發見が困難な場合が多い。

以上の事實から第1に振盪なる現象は從來考えられていたように局所的なものではなくて全身性のものであると考えたい。

呼吸運動も今迄ある限られた少數の筋群によつて

営まれていると思われていたが、最近の研究⁹⁾によると安静呼吸の時でさえ上肢、軀幹の大部分の筋肉が之に與ることが筋電圖から證明されたが、之もこの振盪現象とよく似ていると思われる。又吃逆も劇しい場合には全身性の cholectic な運動として觀察されることが報告されたが⁹⁾、之もこの事實と合致すると思われる。

2. 振盪發生より消失までの経過

先ず眼球について言えば、眼振發現當初は前にも述べたように、非常に振幅の小さい頻度の高い所謂震顫様の運動として解發される。之を眼振の第1期と假に名付けよう。ついで急速相と緩徐相のはつきりした眼振の整調期に移行する。之を眼振の第2期と名付ける。かくして數時間乃至數十時間経過すると整調な律動的運動を示していた眼振も漸次不規則となり振幅、振數も統一を缺き亂れて来る。そしてやがては消失する。之を第3期と假稱する(第9圖)。

この眼振の各時期を追つて全身性振盪を眺めると第1期には、軀幹、四肢から誘導される動作流はおおよそ律動性を缺き、全般的に大小種々の spike 群が見られる。しかし少數例に於ては大小種々の spike 群のうち大きな spike 群と小さな spike 群との並び方がある程度の調律をもつていると思われる場合があり、この數が震顫様眼振の數に一致している感なしとしない。

次で眼振第2期には屢々眼振の急速相に一致して軀幹、四肢の振盪を認める。この場合後者の振盪が著明なときは肉眼的にも四肢の伸展するのが認めら

れる。しかし著明に伸展する場合は少ないので、多くの場合動作流と眼振曲線を比較して観察するのでもない。

伸筋は屈筋に比べて通常強い大きな spike を出しているが、時には屈筋のみに spike を見る場合もある。

迷路破壊の方向によつて、左右の軀幹、四肢の振盪に差異は著明でないが、1, 2例に於て迷路摘出反対側に於て僅かに亢進していたかのように見えた。迷路摘出側が亢進していたと覺しきものは未だ経験してはいない。

この第2期に於て全身性振盪が出現しても恒に同じ大きさで現われているのではないようで、出現中に波があり、各例によつて時間的にもズレがあるが、ある時期を頂點として始めと終りに弱く山型をなしている。そしてこの頂點はごく短時間なために時には見落されたり、発見の困難な場合が多い。多くの場合術後2~4時間乃至6~7時間にその山があるようである。或る1例に於ては全身性振盪は術後4時間目位より明瞭となり、6時間でその頂點に達し、10時間位で消失した。

又この時期に於ても、外部からの刺激や動物が固定台上で暴れることによつても律動性を欠き、動作流は大きな spike 群の連続になつてしまう。しかしこういう状態の直後では却つて明瞭な同期性を現わすことが往々観察されたが、このメカニズムにつ

いては後で述べよう。

次で眼振第3期ではもはや全身性振盪は見出し得ない。たとえ軀幹、四肢から動作流が出ているにしろ、それは不規則で律動性は全くない。しかしこの時期には眼振もあり、又頭振の存在するものも認められた。

以上眼振と比較した場合の全身性振盪の経過は、出現時間も短時間であり、消失するの至つて早いことがわかる。

3. 眞のふるえと迷路破壊直後みられる

ふるえ様運動との區別

前述した迷路破壊直後觀察されるふるえの如き運動は、迷路破壊時のみならず、寒冷に曝すとか、手術的侵襲による諸因子によつても起ることがある。しかし後者の場合は、肉眼的にも出現時間が不規則であり、統一を欠いている。私はこの兩者を區別しようとして先ず家兎を固定台に縛着して室温10°C内外のところに放置し、自然にふるえの起るのを待ち然る後頭蓋を開放して、大脳前端部より漸次後方に切斷を入れた。かゝる場合その切斷が中脳前端に至るとふるえの止むのを觀察出來たので、その儘暫くの間放置しふるえの再び出現しないことを確めた上、通常の方法で迷路を破壊した。この場合もやはり術後に起る全身性のこまかい運動が見出されたのである。即ち通常固定台上に縛着して迷路破壊を行つた場合、術後惹起される全身性の運動は以上述べ

たものと總和とみることが出来るが、この両者は明らかに區別されるべきものであることが判つたのである。

更に付け加えるならば、上記脳破壊をした後に迷路を摘出した場合は、その後の同期性はかなり向上するのである。つまり先人の研究によれば、大脳皮質はある程度眼振に對して inhibitory に作用し、これのないものは眼振を促進せしめるといつているが、この事は全身性振盪にもあてはまる様に思える。しかし全身性振盪發現時に大脳皮質を除去した私の實驗では、出血等の因子の加わつたせいもあるうか、亢進してはいないようであつた。

4. 全身性振盪發現及び消失の部位による差

家兎について言えば、背胸部及び背腰部に於て著明で、次で前肢及び後肢の順に同期性を持ち、右左の差は明瞭ではなかつた。しかしこれらとても眼振や頭振に較ぶれば、極めて微弱で、活潑ではない。

又この發現部位と時間との關係は、同期性の強いところほど早く出現し、長時間続く。しかし發現當初は例えば迷路破壊によつて眼振を解放させた場合、殆ど全身的に同時に振盪が惹起されるよう各部位の間に發現時間の差異は明瞭でないように見える。

かくして發現した振盪は、前述したように條件がうまく行くなれば2—3時間は繼續するのである。強い場合には四肢を伸展し、趾間を擴ぎ、眼振の緩徐相のときは縮む。しかしそんなに強くない場合でも、四肢に手を觸れてみれば筋活動の状態を認知出来る。

消失するときには下肢の方から消え始め、次で上肢、軀幹となつて行くようである。

以上の順序はごく大ざつぱで、各實驗例によつて種々相違がある。又出現中と雖もそこに不規則性はかなりある。

これらの事實から考えると、中腦の一部に起つた興奮は、丁度 Epilepsie が皮質を蔓延すると同様に、中腦やその附近の網様体を蔓延するものと考えられる。しかし中樞内に於けるこの蔓延が極めて微弱であるために今迄も觀察されておきながら、特に注意をひかなかつたのではないだろうか。これについては實驗例のすべてに全身性振盪が明瞭に出現し得なかつたことから推定出来る。

次に迷路摘出後には全身性振盪があまり明瞭でなく、數時間経つてこれがつきりして來ることについては以下の様に考えてみたい。

即ち眼振から考えれば、手術直後が最も劇しく、かゝる時期に Rollbewegung が起るほど強いとされているのであるから、興奮が弱くて蔓延しなかつたと考えるのは不適當で、その時期に四肢、軀幹に振盪が見られないのは、外見上見えにくいのか又は存在しないとしか考えられない。こゝに至つて眼球、頸部、軀幹、四肢の夫々の中腦運動系に固有の「リズム」といつたものと存在を考えたくないのである。

こう考えると手術當初の頻度の高い振盪には四肢、軀幹といつたものは追従出來なく、この「固有リズム」はその系の中の最も遅いものが決定していると考えれば説明がつくと思う。

即ち數時間して四肢、軀幹の振盪はつきりして來たのは振盪の「リズム」が低下して來て軀幹、四肢の筋の「固有リズム」に近くなり、眼振による週期性の中樞興奮性の變化が筋の運動現象として認められるようになったものと考えたい。そして迷路破壊直後に見えにくいのは緊張があまり高まつているためにその反應が見えにくいと考えられる。

又麻酔の前後即ち麻酔の浅いときに全身性振盪が見えやすいのは、大脳の筋活動に對する抑制中樞が麻酔によつて除外されていると解したいし、暴れた後に同期しやすいのはその不應期に於て筋活動が適當なレベル迄降つたからだと解することが出来る。

5. 迷路の存否による全身性振盪

發現狀態の差

全身性振盪は、兩側迷路を異時破壊した場合に最も強く、一側迷路をとつた場合、溫度性眼振を起させた場合の順に出現が弱い。これについては以下の様に考えたい。

即ち迷路剝出と同時に腦内に全身的に發生した律動的興奮が次第に弱まつていくと考えることも出来るが、先ず振盪は迷路の存在によつて抑壓されていた興奮がその摘出と共に解放された所謂解放現象と考えて、これが減弱するのは他の抑壓機序が腦内に發生して來たためだろうと考えたい。

こう考えると迷路の存在というものは振盪を起さぬ様に抑壓しているものと考え、兩側迷路の存在している溫度性眼振時よりも、これのない所謂代償性眼振の場合の方が全身性にも振盪現象が現われやすいということが理解出来るように思える。しかし必ずしもすべての代償性眼振のときに、明瞭に全身性振盪が現われるとは限らなかつた。

且つ四肢に於ては、屈伸兩筋に同時に起るところから、振盪は中樞性の一種の痙攣と考えたい。そしてこれ等は痙攣の解明に役立つと信じている。

第5章 結 論

〔I〕眼振時に於ける全身の筋活動を働作流から調べてみた。

〔II〕眼振時に、四肢、軀幹に適当な筋緊張がある場合には、眼振のリズムに一致して週期的運動を見ることが出来る。

〔III〕筋電圖學的検査によつて四肢の運動は現在迄に調査した範圍に於ては、伸屈共に同期的であり、一種の痙攣と考えることが出来る。水平眼筋及び M. longus atlantis を除いて頸筋、眼筋も亦同時的に收縮している。

〔IV〕この出現は代償性振盪に於て最も明瞭である。

〔V〕大脳除去及び植物神經毒^ば之等全身性振盪に著明な影響を及ぼさない。

〔VI〕全身性振盪の解發は種々の侵襲によつて、全身性筋緊張が適當に高まつているときに眼振と同

期して週期的に筋緊張の中樞の興奮性が變化するためと考える。

文 献

- 1) *Flourens, P.*: Expériences sur le système nerveux. Paris. 1825.
- 2) *Bárány, B.*: Untersuchungen über den vom Vestibular-apparate des Ohres reflektorisch ausgelösten rhythmischen Nystagmus und seine Begleiterscheinungen. Mschr. Ohrenheilk. 1906, 40, 193.
- 3) 張元用: 瞬膜及び上眼筋拳筋の迷路性反射運動に就ての実験的研究, 耳鼻臨床, 31 卷, 1082, 昭 2.
- 4) 張元用: 同上.
- 5) 時実利彦: Electromyographic studies on the human respiratory muscles. Jap. Jou. of physi. Vol. 2, No. 3, Feb. 52.
- 6) 久留勝: 頑固な吃逆を伴う頸椎病変とその治療, 脳と神経, 4 卷 1 号, 11, 昭 27.
- 7) 広神伊藤: 大脳皮質の前庭性眼反射に及ぼす影響, 北越医誌, 39 卷, 460.

(原稿到着 = 昭和 28. 6. 29 日)

H. MIYAKE, M.D.: STUDIES ON THE SOCALLED INNER EAR DEAFNESS, ESPFCIALLY THE REFRACTIVE INDEX OF CEREBROSPINAL AND LABYRINTHINE FLUIDS

所謂内耳性難聴に関する研究 特に髄液と内耳液の屈折率について

第1編 所謂内耳性難聴者の髄液屈折率について

名古屋大学医学部耳鼻咽喉科学教室 (主任 後藤修二教授)

講 師 三 宅 弘
ミヤケ ヒロム

第1章 緒 言

内耳の生理及び病理に関する著しい進歩にも拘らず、又種々な疾患に内耳が屢々關與するにも拘らず、現在に至る迄内耳疾患の治療に關しては著明な進歩が見られない。それは内耳の解剖學的並に生理學的的特殊性によるものである。

扱て内耳疾患の内、私が今取り上げる所謂内耳性

難聴に關しては殊に多種多様の治療法が行われているが、そのことはとりも直さず本疾患治療の困難性を物語るものであつて實に耳鼻咽喉科學領域の難問の一つと云えよう。

此の所謂内耳性難聴の治療法としては、各種藥劑の注射療法、内服療法に加えて近來は直接的な手術的療法も行われ始めたが、主として歐米諸國に見ら