間に一時的増量を認めるも、血中アドレナリン様物質は術後6時間、24時間共に認むべき変化が見られない。之は体液性のものでなく、中枢性の刺激性血糖上昇を意味するものである。

又植物神経緊張状態の時間的変化を観察すると術後6時間に於ては一般に交換神経強度緊張状態にあり、48～72時間に於て適度緊張状態に安定することを得たと述べている。

又佐藤は神経性難聴67例に髄液内にビタミンB₁注入療法を実施し、その作用機轉を明らかにした。即ちビタミンB₁缺乏症に対する補給効果とは考えられず、ビタミンB₁の薬理作用によるもの就中その自律神経調整作用によるものと述べられている。

以上の事柄より私の研索に於て、該操作を加えた時、血液及び髄液焦性葡萄糖量に著明な変動を與えず、總てではないが、漸次正常値の方向に減少する傾向の認められたことは當然考えられることである。而して操作後に於ける血液及び髄液焦性葡萄糖量を検討すると、有意の差ではないが、平均値のみに於ては操作前より減少を示す。このことは先に佐

藤により検索された髄液内ビタミンB₁の傾向を裏から見たことになる。

第5章 結 論

1. 内耳性難聴に於て本操作によつて、血液焦性葡萄糖は4回返は減少して正常値に近付くが、5回、6回には増量し、其後再び急に減少して正常値に近付く。髄液にありては変動輕微であるが、正常値に近付くものが少くない。

2. 聾啞兒に於て本操作による變動は大体に内耳性難聴者と同じく、正常値に近付く傾向が認められ、髄液に於ては殆んど変化が見られない。

3. 治療の効果と髄液焦性葡萄糖との間には一定の関係が見られず、操作後に於ける血液及び髄液焦性葡萄糖量を検討すると、有意の差ではないが、平均値のみに於ては操作前より減少を示す。このことは先に佐藤により検索された髄液内ビタミンB₁の傾向と類似するものである。

(原稿到着＝昭和28.12.8日)

M. MORI, M.D.: NERVE DEAFNESS AND PYRUVIC ACID

焦性葡萄糖から見た聴器障碍

第4編 實驗的聴覚障碍時に於ける髄液焦性葡萄糖

名古屋大学医学部耳鼻咽喉科教室（主任 後藤修二教授）

専攻生 森 正 鶴 美
モリ マサズ ミ

目 次

第1章 緒 言

第2章 實驗材料並に實驗方法

第1節 實驗材料

第2節 實驗方法

第3章 實驗成績

第1節 正常動物について

第2節 撒曹注射動物について

第3節 音響作用動物について

第4節 B.C.G. 接種動物について

第4章 総括並に考按

第5章 結 論

第1章 緒 言

第1編に記載した様に所謂内耳性難聴の髄液内焦性葡萄糖はその平均値に於て正常者と殆んど差異がないが、その際發病後の経過期間並に原因によつて差異ある傾向を認めたのである。そこで實驗的に家兎に聴器障碍を惹起せしめ、その際の髄液焦性葡萄糖の消長について研索し、以て臨床的研究によつては明確にし得なかつた點を明らかにせんとした。

第2章 實驗材料並に實驗方法

第1節 實驗材料

試獸として体重 2kg 内外の白色雄性家兎を用い、耳鏡検査上外耳道清淨で鼓膜に異常のないものを用いた。

第2節 實驗方法

第1項 聴覚障碍方法について

聴覚障碍の方法としては下記の三つの方法を用いた。

(1) 薬剤中毒。10% 撒曹液を Pro. kg 0.7g の中等量を 15 日間連続腹腔内に注射した。

(2) 音響刺激。正常家兎に電気発振装置により高音、低音を夫々作用させた。高音は 1500 Cycle (約 100 Decibel)、低音は 300 Cycle (約 100 Decibel) を用い、前者は 1 日 13~14 時間毎日連続 2 週間作用せしめ、後者にあつては 1 日 14 時間前後毎日連続 2 ケ月間作用せしめた。

(3) B.C.G. 接種。B.C.G. Pro. kg 1mg, 2mg の 2 群に分けて実施した。即ち本学豫防医学教室より分譲を受けた菌株について 1cc に B.C.G. 生菌 10mg の割合に均等な浮遊液を無菌的操作の下に作製し、之れを腹部皮下に注射した。

第2項 家兎髄液採取方法について

試獸は之を腹臥位にして固定器上に置いて四肢を緊縛し、次いで頭部と後頭部と頸椎とを一直線として顔面長軸と頸椎とを直角となる位置迄屈曲させ之によつて外後頭結節及び第一頸椎間を可及的に拡大せしめ、然る後先端を鈍に切つた $\frac{1}{2}$ 注射針をツベルクリン用注射器に附したものを後頭下腔に刺入して靜かに髄液を所定量より稍々多い目の 0.7cc 程採取し、直ちに之れを測定した。

第3項 測定方法

第1編に述べた様に焦性葡萄糖定量に関する吉川氏の原法は検査材料 2cc を必要とするが、家兎の髄液採取に於ては、2cc 採取困難な上に血液の混入する恐れがあるので、私は 0.5cc を検査材料として測定に供した。定量方法は第1編に述べた方法に準ずるのであるが、稍々改良した。即ち 0.5cc の髄液に直ちに沃度醋酸曹達液 0.1cc を加えて u/12 硫酸 4.5cc 中に入れ、良く混和、所定の時間放置してか

ら Dinitrophenylhydrazin 液 0.2cc を加え、所定の如く処置して後醋酸エチル 2cc を以て 3 回之れを抽出、抽出後は又所定の如く行い、醋酸曹達液に抽出は 3 回に分けて之れを行ひ、第 1 回は 2cc、第 2、第 3 回は夫々 1cc ずつ使用して計 4cc に抽出、最後に 1cc の苛性曹達液を加え直に Stufenphotometer で比色、その吸光度に吉川氏の恒数を乗じて測定値を求めた。

第4項 測定方法の吟味

こゝに於て私の採用した方法の当否を決定するために次の豫備実験を行つた。吉川氏の原法により測定した値と、私の変法で測定した値を同一検査材料について検討すると表 19 の如き結果を得た。

即ち吉川氏の原法に準じて測定した私の測定誤差

表 19

例	吉川氏原法による測定値 mg/dl	私の変法による測定値 mg/dl	兩者之差
1	0.8671	0.8338	0.0334
2	0.9338	0.9338	0
3	0.8004	0.8671	0.0667
4	1.0331	1.0005	0.0325
5	0.8671	0.8671	0
6	0.8671	0.8004	0.0667
7	0.8671	1.0005	0.1334
8	0.8004	0.7337	0.0667
9	0.8004	0.8004	0
平均			0.046 ± 0.015

は第1編に記述された様に最大 0.12mg/dl、最小 0、平均 0.044 ± 0.008 mg/dl の値が得られ、吉川氏の原法による測定値と私の変法による測定値の誤差は最大 0.14mg/dl、最小 0、平均 0.046 ± 0.015 mg/dl となつて明らかに両者間に差異が見られない。従つて家兎髄液中の焦性葡萄糖測定には私の変法によつてもその変動を追究するに十分と信じられるので、私は 0.5cc 採取して定量することにした。

第3章 實驗成績

第1節 正常動物

正常家兎の髄液焦性葡萄糖量は表 20 の如く私の測定した 20 例に於て最大 1.51mg/dl、最小 1.13mg/dl、平均値 1.32 ± 0.021 mg/dl である。

第2節 撒曹注射動物

撒曹 Pro. kg 0.7g を毎日腹腔内に注射したものに於ては 4 日目毎に測定を行ひ、聴覚障碍が完全に

図 20 (焦性葡萄糖を焦酸と略す)

日	実験前	第1日	第2日	第3日	第4日	第5日
1	1.28	1.20	1.23	1.23	1.23	1.23
2	1.40	1.33	1.37	1.37	1.37	1.37
3	1.40	1.27	1.40	1.40	1.40	1.40
4	1.33	1.20	1.33	1.33	1.33	1.33
5	1.13	1.27	1.40	1.40	1.40	1.40

図 21 (焦性葡萄糖を焦酸と略す)

番	実験前	第1日	第2日	第3日	第4日	第5日
26	1.75	1.20			1.70	1.60
27	1.75	1.33			1.70	1.60
28	1.75	1.27			1.70	1.60
29	2.80	1.20		1.60	2.00	1.52
30	1.75	1.27			2.30	1.10
31	1.75	1.23			1.60	1.53
32	2.50	1.27	1.80		死	
33	2.80	1.40	1.67		2.10	1.52
34	2.50	1.33	1.63		2.40	1.23
35	2.50	1.44		1.73	2.20	1.47
36	2.70	1.40		1.67	2.25	1.60
37	2.20	1.27		1.40	2.30	1.20
平均		1.20	1.40	1.60	2.00	1.52

惹起されたと推定される 15 日で中止した。そして測定し得た値は表 21 に示す様である。

即ち実験 4 日目に於て最大 1.80mg/dl, 最小 1.63mg/dl, 平均値は 1.70 ± 0.062 mg/dl であり, 実験 8 日目に於ては最大 1.73mg/dl, 最小 1.40mg/dl, 平均値は 1.60 ± 0.083 mg/dl であり, 実験 2 週のものでは最大 1.60mg/dl, 最小 1.10mg/dl, 平均値は 1.44 ± 0.098 mg/dl である。これを実験前の値と比較すると実験 4 日目及び 8 日目に於ては夫々

$$\frac{Ma-Mb}{\sqrt{ma^2+mb^2}} = 5.5 \text{ 及び } 3.5 \text{ の値が得られ, 実験}$$

によつて明らかな増量が認められる。そして実験終

$$\text{了時の値は実験前に比較して } \frac{Ma-Mb}{\sqrt{ma^2+mb^2}} = 1.3$$

で大差ない迄に減少している。

而して撒費注射 3 月連続の 3 例の髄液焦性葡萄糖は何れも著明に増量し, 注射 7 日連続の 4 例でも矢張り明かに増量しているが, 3 日連続のものよりその程度が僅かに低い。又 2 週間連続注射の 10 例では明かに増量しているもの 6 例, 殆んど増加の認められないもの 1 例, 軽度減少しているもの 3

例である。

第 3 節 音響作用動物

第 1 項 高音作用動物

高音 1500 サイクル, 100 デシベルの音響を 1 回 13 時間刺戟直後に於けるものと, 毎日 13~14 時間, 連続 2 週間作用せしめて完全に聴覚障害を惹起せしめたものについて髄液焦性葡萄糖を測定すると表 22 に示す様である。

表 22 (焦性葡萄糖を焦酸と略す)

番	実験前	第1日	第2日	第3日	第4日	第5日
10	2.20	1.33			2.05	1.68
11	1.70	1.23			1.70	1.27
12	2.25	1.37			2.05	1.73
13	2.45	1.40			2.30	1.70
14	2.25	1.30			2.10	1.67
15			1.13			
16			1.37			
17			1.40			
18			1.33			
19			1.27			
20			1.33			
平均		1.32	1.31		1.66	1.66

即ち高音刺戟にあつては刺戟直後の第 1 日目では最大 1.40mg/dl, 最小 1.13mg/dl, 平均値は 1.31 ± 0.043 mg/dl であり, 2 週目に於ては最大 1.73mg/dl, 最小 1.27mg/dl, 平均値は 1.61 ± 0.096 mg/dl である。これを実験前の値と刺戟直後の第 1 日目の値とを比較すると $\frac{Ma-Mb}{\sqrt{ma^2+mb^2}} = 0.2$ であつて, 兩

者に差異を認めないが, 刺戟 2 週後の値と実験前の値とを比較すると $\frac{Ma-Mb}{\sqrt{ma^2+mb^2}} = 2.9$ であつて,

刺戟 2 週後に於ては髄液焦性葡萄糖量は増量している。

而して高音刺戟直後の第 1 日目に於ては全例に於て髄液焦性葡萄糖量に變動が認められず, 連続 2 週間刺戟の 5 例では明かに増量しているもの 4 例, 殆んど變化の認められないもの 1 例である。

第 2 項 低音作用動物

低音 300 サイクル, 100 デシベルの音響を毎日 14 時間前後, 連続 2 ヶ月間作用し聴覚障害を惹起したと推定される時期に後頭下穿刺によつて得た髄液中

表 23 (焦性葡萄糖を焦酸と略す)

番号	実験 操作前		実験後 操作後	
	体 重	焦酸 ^{mg} /dl	体 重	焦酸 ^{mg} /dl
21	2.70	1.43	2.95	1.46
22	2.85	1.51	2.90	1.67
23	2.05	1.47	2.20	1.40
24	2.20	1.37	2.25	1.33
25	2.20	失敗	2.25	1.13
平均				1.57 ±0.097

の焦性葡萄糖を測定すると表 23 の様な結果が得られた。

即ち低音にあつては2ヶ月間刺戟後に於て焦性葡萄糖量は最大 1.67mg/dl, 最小 1.13mg/dl, 平均値は 1.40 ± 0.097 mg/dl である。これを実験前の値と比較すると $\frac{Ma \sim Mb}{\sqrt{ma^2 + mb^2}} = 0.5$ で差異が見られない。

而して低音2ヶ月間刺戟後の5例で髄液焦性葡萄糖の少々増量しているもの1例, 他は殆んど増減が見られない。

第4章 B.G.G. 接種動物

第1項 B.C.G. Pro. kg. 1mg 接種動物

B.C.G. Pro. kg. 1mg 接種動物に於ては感作後2, 4, 6週について髄液中の焦性葡萄糖を測定した結果は表 24 の示す様である。

図 24 (焦性葡萄糖を焦酸と略す)

番号	感作後2週目	感作後4週目	感作後6週目
体 重	焦酸 ^{mg} /dl	体 重	焦酸 ^{mg} /dl
23	2.15	1.47	2.60
24	2.85	1.40	2.45
25	2.15	1.40	2.60
26		1.40	2.60
27		失敗	2.35
平均	1.55 ±0.149	1.57 ±0.110	1.42 ±0.05

即ち感作後2週目の値は最大 1.90mg/dl, 最小 1.40mg/dl, 平均値は 1.55 ± 0.149 mg/dl であり, 第4週目の値は最大 1.80mg/dl, 最小 1.27mg/dl, 平均値は 1.59 ± 0.11 mg/dl であり, 第6週目の値は最大 1.51mg/dl, 最小 1.33mg/dl, 平均値は 1.42 ± 0.05 mg/dl である。それを夫々正常家兎のそれと比

較すると $\frac{Ma \sim Mb}{\sqrt{ma^2 + mb^2}} = 1.6, 2.6$ 及び 2.2 となり,

B.C.G. 1mg 接種によつて髄液内に焦性葡萄糖の増量を認めるのであるが, 有意の差ではない。

而して B.C.G. Pro. kg. 1mg 接種後2週目の4例では明らかに増量しているもの1例, 殆んど変化のないもの2例, 4週目の5例では明らかに増量しているもの1例, 少々軽度の増加を認めるもの2例, 殆んど変化のないもの2例であり, 又6週目の5例では明らかに増量しているものなく, 少々軽度増量しているもの1例, 他の4例は正常値を示している。

第2項 B.C.G. Pro. kg. 2mg 接種動物

第1項で述べた様に Pro. kg. 1mg 接種では髄液焦性葡萄糖の増量する傾向が知られたが有意の差ではない。そこで更に B.C.G. Pro. kg. 2mg 接種を行つて, 感作後の髄液焦性葡萄糖の期間的變動を追究すると表 25 に示す様である。但し髄液採取は感作後1週間目, 4週間目, 並びに2ヶ月目に行つた。

図 25 (焦性葡萄糖を焦酸と略す)

番号	感作後1週間	感作後2週間	感作後2ヶ月
体 重	焦酸 ^{mg} /dl	体 重	焦酸 ^{mg} /dl
28	2.10	1.73	2.20
29	1.80	1.63	1.95
30	1.70	失敗	1.75
31	2.40	1.60	2.40
32	2.10	1.73	2.20
平均	1.57 ±0.097	1.52 ±0.049	1.77 ±0.030

即ち感作後1週目の値は最大 1.73mg/dl, 最小 1.33mg/dl, 平均値は 1.57 ± 0.097 mg/dl. 第4週目の最大 1.67mg/dl, 最小 1.40mg/dl, 平均値は 1.37 ± 0.030 mg/dl である。それを正常家兎の値と比較

すると夫々 $\frac{Ma \sim Mb}{\sqrt{ma^2 + mb^2}} = 2.9, 4.2$ 並びに 1.9 と

なり, 明らかに有意の差のある場合のあることを知つた。

而して B.C.G. Pro. kg. 2mg 接種後1週目の4例では明らかに増量しているもの3例, 殆んど変化のないもの1例, 4週目の5例では明らかに増量しているもの4例, 殆んど変化のないもの1例, これを1週間目の値と比較して増量しているもの2例, 減

少しているもの2例である。そして2ヶ月目の4例では總て正常値範囲内に減少している。

第4章 總括並に考察

1. 撒曹中毒時の焦性葡萄糖について。

撒曹中毒が聴器に及ぼす影響の研究に関しては一般にキーンネのそれと臨床上及び動物實驗上類似するので兩者併行して研究されているが、私は藥劑中毒の代表として撒曹のみを使用することにした。

撒曹中毒に於ける難聴、耳鳴及び眩暈等は臨床上屢々遭遇する所にて、耳科的方面に於ける該中毒の本態に關して、實驗病理學的に研究を試みたのは1881年 Kirchnen を以て嚆矢とし、以來相踵いで多數學者によりその實驗的研究及び臨床的研究が追補されている。

然るに該中毒時に當然内耳液及び髄液にも影響を及ぼすことは容易に想像されるのであるが、それに關する研究は殆んど見られず、我が教室に於ける小出、三島、三宅諸氏を初めとして一連の研究により、藥劑中毒時における髄液の物理化學的變化を生ずることを確認されたのであるが、私は神經機能と密接な關係のある焦性葡萄糖の消長を追究したのである。

即ち本實驗最初の4日目には各例とも増量し平均 $1.70 \pm 0.062 \text{ mg/dl}$ の値が得られ、8日目には平均 $1.60 \pm 0.083 \text{ mg/dl}$ で稍々減少の傾向が見られたが、1例を除く外全例に依然増量を示している。連續2週目は1例に増量が見られるのみで他は殆んど實驗前値に減少し平均 $1.44 \pm 0.098 \text{ mg/dl}$ の値である。言い換れば、焦性葡萄糖は中毒の初期に著明な増量があり、漸次減少の傾向を示し、正常値に近付くのである。

(2) 音響刺激による焦性葡萄糖の變動。

過度の音響により聴器が障碍を蒙る事は比較적으로早く注意され、これが臨床上に所謂職業性難聴として擧げられていることは周知の事項である。音響による聴器障碍に關する實驗的研究は St. v. Stein に依つて始められ、Wittmaack の研究以來多數の報告が見られ、これらの研究は内耳の組織學的變化に始終している。

而して音響と生機的關係に就ての研究は比較的に

少なく、高松及び岸により騒音下に於ける白鼠のビタミン B₁ 代謝に就て實驗的研究があり、音響とビタミン B₁ 代謝の密接な關係の存在することが指摘されている。

一方臨床方面に於いて一般にビタミン B₁ 缺乏による聴器障碍は夙に注目されていたが、河田が職業性難聴に對しビタミン B₁ 劑を應用し著効のあることを報告して以來諸氏により追補されて職業性難聴に對する豫防並に治療の一つとして是認されるに至つた。

そこで私はビタミン B₁ と密接な關係のある焦性葡萄糖の消長を追究せんとして試獸に高音、低音の2種を作用せしめて難聴を惹起しこの際の髄液焦性葡萄糖を測定したのである。

即ち高音刺激にあつては刺激直後の1日目は各家兎に變動なく、實驗終了時には1例を除く外總て増量し、平均 $1.61 \pm 0.096 \text{ mg/dl}$ の値が得られ明らかに増量していた。低音刺激にあつては1例のみ増量し、他は變動なく平均 $1.40 \pm 0.097 \text{ mg/dl}$ の値で實驗前値と差異が見られなかつた。即ち各種音響下に於ては新陳代謝に影響することは前述の如く先輩諸氏により研究されているが、私が高音並に低音の刺激により著明に聴力の低下したと思われる時期に髄液中の焦性葡萄糖を定量して、低音刺激と高音刺激とによつて差を認めたことは、音響の種類により新陳代謝に影響のし方が異なることを知り、高音刺激がその影響著明であることを知つたのである。

(3) B.C.G. 接種による焦性葡萄糖の變動。

B.C.G. 注射に際しては、抗原を1回は下其の他に注射する時は可成り所謂アレルギー性變化に類似する諸變化を具備するものである。

武田等の考えによれば初感染注射によつてもアレルギー反應像を掴む事が出来るが、一般に初感作でその像を掴む事が難いというのは初感染によるアレルギー反應が比較的微量に起るに過ぎないからであると云う。

結核アレルギー時に於ける聴器の病理組織學的の研究は我が教室に於て仲村及び路次により檢索され、又髄液及び内耳液の物理化學的方面の研究は三宅を初め教室の諸氏によりなされ、共に結核アレルギー時に於て變化を惹起することを指摘されて來て

いる。そこで私は結核アレルギー時に於ける髄液中の焦性葡萄糖の増減を追究したのである。

即ち Pro. kg. 1mg 接種家兎について2, 4, 6週の髄液焦性葡萄糖は何れも増量の傾向を示すが、4週に於て最大で、6週には減少の道を辿っている。Pro. kg. 2mg 接種家兎は感作後1週には1例を除く總て増量し、その平均値 $1.57 \pm 0.097 \text{mg/dl}$ の値を得、4週に於ては1週に比較して稍々増量、減少したもの共に2例があり、その平均値は $1.52 \pm 0.049 \text{mg/dl}$ となり、健康家兎のそれと比較すると共に増量するも4週目の方が著明な増量を示した。そして2ヶ月目に於ては各例共減少を示し、その平均値 $1.37 \pm 0.030 \text{mg/dl}$ の値が得られ、正常家兎の範囲内までに減少していた。

以上個体がアレルギー化された時の新陳代謝の状態を観察せんとし測定を実施した所、或る時期に髄液焦性葡萄糖の増量を認めることを知つたのである。

4. 焦性葡萄糖の聴器に及ぼす考察。

以上諸実験により、聴力障害と焦性葡萄糖量とは必ずしも一致しないが、難聴を起す各操作により時期的に明らかに新陳代謝に異常を起し、髄液焦性葡萄糖量の増大を見るものと思われる。而して各操作が直接聴器に病變を惹起することは論を俟ない事實であるが、焦性葡萄糖が比較的早期に一過性に髄液内に増量するため髄液を介して内耳液にも同傾向の變化が起ることは容易に想起され、それと相俟つて聴器の病理組織學的變化と一連の關係があるのでないかと思われる。

今各実験に於ける焦性葡萄糖の消長を比較すると藥物中毒最も著明にして、次いで B.C.G. Pro. kg. 2mg 接種、高音刺激、B.C.G. Por. kg. 1mg 接種、最も變動の少なかったのは低音刺激時であることを知つたのである。

5) 所謂内耳性難聴と聴器結核アレルギーについて。

先きに我が後藤教授は結核と神経性難聴との關係に着目され、結核患者の聴力をオーディオメーターで調査するに高音部の感受が明らかに低下することを指摘され、更に動物に結核アレルギーを惹起せしめて、そのブライエル氏反應を検するに明らかにブ

イエル氏反應は低下するものが少なくないし、組織學的にはコルチ氏器は下方廻轉に於て高度の退行變性を認め、上方廻轉に於ては輕度の變化を認め、内耳腔には漿液性炎症像を認められ、臨床的には270名中振動數2000以上の音に於て B.C.G. 注射前後の聴力に明らかに變化を認めたもの294耳を認められ、これらの事柄よりして結核アレルギーの聴器に及ぼす影響を想起され、更に原因不明の所謂内耳性難聴の多くが恐らく結核アレルギーによるものでないかと提唱されるに至つた。

私は B.C.G. 接種により髄液焦性葡萄糖が一過性に増量することを知つた。此の事はアレルギー性疾患と考えられるものに焦性葡萄糖が増量すると云うことに一致するもので、本實驗を眞のアレルギー性變化に比較すると輕度ではあるが、それに類似した變化を惹起し得たと考えられる。私は焦性葡萄糖の消長を追究することにより、聴器結核アレルギーの一端を窺わんとしたのであるが、これにより内耳の組織學的變化及び物理化學的變化と相俟つて内耳性難聴の結核アレルギー説を裏附けるものと信ずる。

6) 臨床實驗と動物實驗との比較。

臨床的研究を行つた所謂内耳性難聴の髄液焦性葡萄糖はその平均値に於て正常者と殆んど差異なく、僅かに發病の經過期間並に原因により差異ある傾向が見られた。而して各種實驗的聴覺障害を惹起した時、低音刺激の場合以外、髄液焦性葡萄糖の増量の輕度の差こそあれ何れも一樣に一過性に増量し、時日の経過と共に漸次減少の傾向が認められた。この事は臨床實驗の結果から發病歴の比較的新しい者に血液並に髄液焦性葡萄糖の増量が見られるのでないかと思われる傾向が認められた結果と相通ずるものと思われる。

臨床實驗によつて職業性難聴では血液焦性葡萄糖が増量している傾向を認めたのであるが、髄液中には増量を認めない。之に對して音響障害動物では髄液内に増量の傾向を認めた。この相違について見るに職業性難聴の患者の血液焦性葡萄糖量の増加の傾向は、髄液内に増加を認めなくとも、髄液にも或る程度の増量という事が考えられる。又職業性難聴の患者は發病後年月目を経ているので、この事から云つても臨床實驗からも、動物實驗からも髄液内の變

化が認められなくとも當然である。換言すれば髄液内焦性葡萄糖は職業性難聴では既往に増量があつても、経過と共に減少して正常値範囲に至つた時期に検査しているのでないかと云う事である。

一方原因不明の難聴はその血液焦性葡萄糖が増量している傾向を認めたのであるが、遠山はアレルギー性疾患と考えられるものに焦性葡萄糖が増量していることを指摘し、又藤中の家鴨血清にて感作せる家兎或は非感作家兎の内頸動脈に抗腎血清を注射し、アレルギー性病變を惹起せしめた時、尿脚氣反應は陽性になつたと述べている。以上の事柄より焦性葡萄糖の増量する原因としてアレルギー性疾患が挙げられる。そして原因不明の内耳性難聴はアレルギー性疾患と一連の關係を想像され、實驗的に結核アレルギーを起し、その時の焦性葡萄糖の變動を追究したのであるが、B.C.G. 注射によつて一過性に増量を認めた。

即ちこの事柄は結核アレルギー時に於ける聴器の病理組織學的研究、並に髄液及び内耳液の物理化學的方面の研究と相俟つて結核アレルギー説を裏付ける重要な一つの現象であると信ずる。

第5章 結 論

(1) 撒曹中毒時に焦性葡萄糖の變動は初期に著明な増量が見られ、漸次恢復の傾向を示し、聴力障碍と新陳代謝の状態とは必ずしも一致しない。

(2) 高音及び低音の刺激時に於ける焦性葡萄糖の變動を見ると、低音刺激と高音刺激によつて差を認めた。即ち音響の種類により新陳代謝のし方の異なるのを知り、高音刺激時がその影響著明である。

(3) B.C.G. 接種によつては接種後1週、4週共に著明に増量し、2ヶ月後にあつてはすでに健康の範囲内に減少を示す。

(4) 以上の實驗により一過性に新陳代謝に異常を起し、焦性葡萄糖の増量を見るものと思われるが、他の病理組織學的變化と相俟つて、聴覚機能に作用するものと思われる。そして各實驗により増量の程度は異なるも、藥物中毒時最も著明にて次いでB.C.G. Por. kg. 2mg 接種、高音刺激時、B.C.G. Pro. kg. 1mg 接種、最も變動の少なかつたものは低音刺激時である。

(5) 所謂内耳性難聴の焦性葡萄糖は發病後の経過期間並に原因によつて差異ある傾向を示したので、實驗的に家兎に聴覚障碍を惹起せしめて、その時の焦性葡萄糖の消長と臨床結果とを比較するに相一致するものであり、更に原因不明の内耳性難聴のあるものには結核アレルギー説を裏付ける重要な一つの現象のあることを述べたのである。

主要文獻

- 1) 吉川、福山：日生理誌，8巻，122，251頁，昭18.
- 2) 河田：耳喉，13巻，881頁，昭15.
- 3) 河田：診断治療，28巻，558頁，昭16.
- 4) 河田：耳喉，12巻，97，373頁，昭14.
- 5) 岸：日耳鼻，51巻，119，135頁，昭23.
- 6) 波多野：日耳鼻，50巻，241頁，昭22.
- 7) 佐藤：日耳鼻，34巻，328頁，昭7.
- 8) 佐藤：日耳鼻，35巻，961頁，昭8.
- 9) 大藤：日耳鼻，51巻，259頁，昭23.
- 10) 執行：日耳鼻，51巻，47頁，昭23.
- 11) 執行：日耳鼻，53巻，93～159頁，昭25.
- 12) 佐藤：未発表.
- 13) S. Platt u. G.D. Lu.: Quarterly Journal of Medicine 5巻，355頁，1936年.
- 14) E. Bueding u. H. Wortis: Journal of Biological Chemistry. 133頁，1940年.
- 15) 沢田：日臨床，7巻，306頁，昭24.
- 16) 沢田：臨床内科小兒科，3巻，16頁，昭23.
- 17) 藤井：生化学実験法，昭19.
- 18) 北村：日消化器病会誌，38巻，395頁，昭14.
- 19) 吉川：医学と生物学，2巻，330頁，昭17.
- 20) 遠山：日内会誌，38巻，90頁，昭24.
- 21) 塩川，浪久：日内会誌，38巻，90頁，昭24.
- 22) 茂手木：臨床内科小兒科，4巻，27頁，昭24.
- 23) 乾：名古屋医会誌，64巻，261頁，昭25.
- 24) 藤井：臨床内科小兒科，4巻，100頁，昭24.
- 25) 近藤：兒科誌，52巻，66頁，昭23.
- 26) 水島：医用統計学綱要，昭23.
- 27) 古屋：医学統計法，昭25.
- 28) 洲崎：東北医誌，19巻，193頁，昭11.
- 29) Kekes: Z. f. H. N. u. O. 18巻，44頁，1932年.
- 30) 大藤：大日耳鼻，47巻，1681頁，昭19.
- 31) Szasz: Z. f. H. N. u. O. 6巻，129頁.
- 32) 佐藤：日医事報，1192号，昭21.
- 33) 古森：パンピング療法，昭

26. 34) Grahe.: Z. f. H. N. u. O. 5 卷, 270 466 頁, 昭 11. 48) 武田: アレルギーと結核, 頁, 1924 年. 35) 後藤: 日耳鼻, 52 卷, 25 頁, 昭 18.
- 昭 24. 36) 後藤: 日耳鼻, 53 卷, 11 頁, 昭 25.
- 37) 後藤: 日耳鼻, 54 卷, 101 頁, 昭 26. 38) 後藤: 日耳鼻, 54 卷, 98 頁, 昭 26. 39) 後藤: 名古屋医誌, 64 卷, 43 頁, 昭 25. 40) 長沢: 耳鼻臨床, 31 卷, 135 頁, 昭 11. 41) 土井: 大日耳鼻, 49 卷, 211 頁, 昭 18. 42) 尾崎: 大日耳鼻, 41 卷, 1161 頁, 昭 10. 43) 吉田: 大日耳鼻, 36 卷, 1345 頁, 昭 6. 44) 岡崎: 耳鼻臨床, 21 卷, 867 頁, 昭 3. 45) 松浦: 岡山医誌, 47 卷, 279 頁, 昭 10. 46) 山本: 日耳鼻, 52 卷, 358 頁, 昭 24. 47) 河田: 大日耳鼻, 42 卷,
- (本論文の要旨は昭和 25 年 9 月 10 日日本耳鼻咽喉科学会東海地方会第 120 回例会及び昭和 26 年 11 月 25 日同会第 11 回大会に於て夫々発表した.)
- 本論文を撰筆するに當り, 終始御懇篤なる御指導を賜わり, 且つ御校閲を忝うした恩師名古屋大学後藤修二教授に心からなる感謝の意を表します.
- (原稿到着 = 昭和 28. 12. 8 日)

S. FUZIWARA, M.D.: STUDIES ON FREQUENCY RESOLVING
POWER OF THE COCHLEA

内耳の振動数分解能に関する研究 (1)

京都府立医科大学耳鼻咽喉科教室 (主任 中村文雄教授)

医学士 藤 原 茂 夫
フジ ウラ シゲ ヨ

目 次

- I 緒 言
- II 実験方法並に実験装置
- III 実験成績
1. 蝸牛殻の二部より誘導した蝸牛反応の位相差
 2. 正円窓より誘導した蝸牛反応
 3. 蝸牛殻の種々の部位より誘導した蝸牛反応
 4. 蝸牛殻部分的破壊後の蝸牛反応

I. 緒 言

内耳性難聴者の聴器の組織學的研究, 並に強大声の實驗動物聴器に及ぼす影響等の詳細な觀察により, 内耳基底膜は音の振動数に對して夫々特有の活動部位を有すると考えられている (Place Theory). 又音の振動数の傳達は蝸牛神経線維に就て夫々特定の領域があり, 閾値に相當する強さの音に對しては

定まつた振動数の音に對してのみ選擇的に反應する. 即ち内耳基底膜の一定の部位が刺激されると, 其の部位から出ている神経線維が衝撃を傳達することにより音の音調は中樞へ伝えられるといわれる. 一方主觀的音調分解能 (difference limen) が漸く程鋭敏である事も諸家の報告している所である. Bekésy¹⁾ は基底膜の共鳴曲線の幅廣い事を報告し, 從來の聴覺學說に鋭い批判を加えた. 振動数分解能が共鳴現象によるものとすれば聴覺理論は振動論の共鳴に歸納せられる. 一般に共鳴系に於ては「選擇」と「減衰」は相關連した性質であつて選擇性の鋭い系は減衰は小であり, 減衰の大きい系では選擇性は乏しい. 聴器は高度の選擇性と, 臨界減衰にも近い大きい減衰と, 相矛盾する二つの特性を持つている. 振動理論よりすれば, 若し減衰が臨界減衰に近づけば振動系はもはや振動数分解能がなくなる. 斯くて基底膜の選擇性を量的に解明する事は聴覺學說の根本