T TAKAHISA, M.D.: A EXPERIMENTAL STUDY. OF THE
INFLUENCE OF THE FENESTRATION TO THE
VESTIBULAR FUNCTION.

外淋巴腔開放の前庭迷路に及ぼす影響に関する
実験的研究（内耳開窓術のために）

山口医科大学耳鼻咽喉科教室（主任 本庶正一教授）

研究生 高 久 享
タカ ヒサ トオル

目 次

緒 言	第2章 実験成績
第1編 外淋巴腔開放における特発性眼振，頭位並に歩行に就て	第4編 外淋巴腔開放の前庭迷路に及ぼす影響と迷路の病理組織像の關係に就て
第1章 実験の材料と方法	第1章 外淋巴腔開放時の特発性眼振と迷路の病理組織像の關係に就て
第2章 実験成績	第2章 外淋巴腔開放後の特発性眼振と迷路の病理組織像の關係に就て
第2編 外淋巴腔開放後における廻転性後眼振に就て	第3章 外淋巴腔開放後の廻転性後眼振と迷路の病理組織像の關係に就て
第1章 実験の材料と方法	考 按
第2章 実験成績	結 論
第3編 外淋巴腔開放後における前庭迷路の病理組織学的観察に就て	
第1章 実験の材料と方法	

緒 言

耳硬化症の手術療法として1892年 Passow¹³⁾ は、内耳の骨包に開窓しその結果を報告した。以後 Barany¹³⁾, Jenkin¹³⁾, をへて Holmgren¹⁷⁾, Sourdill¹⁸⁾ に至り、内耳開窓術の手術手技は著しい進歩を示したが、1938年 Lempert¹⁴⁾ 15) 16) が米国において内耳開窓術の成績を発表するや、漸く開窓術は世界の耳鼻科医の著しい注目を集め、その後 Lempert 及び Shambaugh¹⁹⁾ の多くの研究や多数の耳鼻科医の追試により、現在のような内耳開窓術の手術法が完成され、特に耳硬化症の多い欧米では輝かしい成果が報告されている。

本邦においては柏戸⁷⁾, 堀口¹¹⁾, 本庶¹⁾, 橋本¹²⁾ 等の追試が報告された。しかしなお、内耳開窓術には多くの検討すべき問題が残され、特に Osteogenesis による開窓孔の閉鎖、術後の漿液性迷路炎は重要な問題として論ぜられている。特に術後性の迷

路炎に就ては高原⁸⁾の研究が見られる。

以上のように内耳開窓術は聴力増進のために創始されたものであるが、前庭機能に対していかなる影響を持つかは又興味ある問題である。しかしながら開窓術と前庭機能の關係に就て観察した報告は極めて少い。森田⁶⁾, 山岸¹⁰⁾, 山川⁹⁾等の実験的研究があるにすぎない。著者は内耳開窓術及び迷路外科手術の一資料として、水平半規管の外淋巴腔に開窓することにより、いかなる影響が前庭機能の上に認められるかを検討せんと企てた。

第1編 外淋巴腔開放後における特発性眼振頭位並に歩行に就て

第1章 実験の材料と方法

1. 実験材料

実験の材料は家兎41例である。体重2kg以上、耳鏡検査で外耳道並に鼓膜正常なもの、聴性瞳孔反応を検査して異常のないもの、廻転性後眼振は左右

差の少ない正常なものを選んだ。

2. 手術方法

実験家兎を固定台に腹位で固定し、嚴重に消毒の上局所麻酔下に先づ鼓室包を露出した。即ち皮切を耳介前部に加え、外耳道軟骨を軟部組織より剝離し、外耳道骨部の上縁を鼓膜弛緩部が充分視野に入るまで除去する。

鼓膜弛緩部を剝離し、骨部を歯科用のエンジンバーと小鋭匙にて注意深く除去すれば砧骨頭がうかがわれる。砧骨頭を目標として水平半規管の位置を確かめ該部に開窓する。開窓には双眼実体顕微鏡を用いて歯科用エンジンバーで、実験家兎の頭部を固く固定して体動を防ぎつゝ骨包を極力薄く削る、バーが外淋巴腔に達すると、痙攣的に眼球偏位がおこり外淋巴液の流出が始まるので、実際的には外淋巴腔開放後にその窓孔を拡大するのは容易でない。寧ろ骨包を削るときに広く削り、その後に広い開窓孔を作るがよい。外淋巴腔開放に成功すれば、創内にペニシリンの水溶液を注入して創を縫合し、外耳道よりガーゼタンポンを行う。術後10日間連日連続してペニシリン5万単位宛注射し極力手術創の感染を防禦した。

3. 観察方法

水平半規管の外淋巴腔開放と同時に痙攣的に眼球偏位が惹き起される。実験家兎は固定台に固定したまま早く頭位を正中位にもとし、直に眼球偏位の方向を、続いておこる外淋巴腔開放時の特発性眼振の方向ならびに持続時間を測定した。開放時の特発性眼振が終了すれば、実験家兎を固定台から放ち、開放後の頭位並に歩行を観察した。更に、翌日から開放後の特発性眼振を検し、その消失するまで連日観察した。

第2章 実験成績（第1表）

1. 外淋巴腔開放時の眼球偏位並に特発性眼振

迷路殻が開窓されると同時に外淋巴腔開放時の眼球偏位が現われる。偏位の持続時間は何れも10"乃至数10"で、偏位の方向は観察家兎41例中、健側24例、術側14例、偏位の現われないもの3例である。

眼球偏位は直ちに特発性眼振に移行する。偏位が健側であつた24例の特発性眼振の方向は、術側22

例、健側2例であり、偏位が術側であつた14例の特発性眼振の方向は、術側5例、健側9例である。

偏位の出現をみない3例の特発性眼振の方向は、いずれの例も術側で、特発性眼振の振幅が極めて大きい。即ち、「眼球偏位が健側にむかつたものは、特発性眼振の方向は術側にむかうものが多く、眼球偏位が術側にむかうものは、特発性眼振の方向は健側にむかうものが多い」。又眼球偏位の現われないものでは、特発性眼振の方向は術側の場合が多い。

開放時の特発性眼振の持続時間は、10"以内のもの15例、10"乃至1'のもの9例、1'乃至5'のもの11例、5'乃至30'のもの2例、それ以上の長時間のもの4例であり、開放時の特発性眼振の持続時間は5'以内のものが多い。開放時の特発性眼振の持続時間が1'以内の24例の中、特発性眼振の方向が術側21例、健側3例で大半は術側である。1'乃至5'の11例は、術側8例、健側3例で、術側の場合が多い。5'以上の6例では全例健側である。これを要約すれば、「開放時の特発性眼振の持続時間が5'以内のものでは、開放時の特発性眼振の方向は術側の場合が多く、5'以上の比較的長時間のものでは、開放時の特発性眼振の方向は総て健側である」。

2. 外淋巴腔開放後の特発性眼振

外淋巴腔開放時の特発性眼振と開放後の特発性眼振の相違は、開放時の特発性眼振は開放と同時に痙攣的な眼球偏位に始まり、しだいに方向の一定な特発性眼振に移り一定時間の後に消失する。このように手術による直接的刺激により惹き起される眼振は開放時の特発性眼振と呼ばれ、開放時の特発性眼振が消失の後に、時間の経過と共に、やがて方向の判定できない緩慢な特発性眼振の出現をみるが、これは開放後の特発性眼振と呼ばれる。稀に、開放時の特発性眼振が連続して、開放後の特発性眼振に移行する場合があるが、両者の眼振は到然と区別できる。

開放後の特発性眼振は、出現したもの24例、出現しないもの17例でその出現率は58.5%である。開放後の特発性眼振をみない17例の開放時の特発性眼振の方向は全例、いずれも術側である。開放後の特発性眼振がみられた24例の中、開放時の特発性眼振の方向が、術側13例、健側11例で方向が一定し

第 1 表

家兄 番号	開放時の眼球 偏位の方法	開放時の特異性 眼振の方法	開放時の特異性 眼振の持続時間	開放後の 特異性眼振の 持続期間	開放時の頭位	開放後の頭位	開放時の歩行	開放後の歩行
37	←	→	3分		正常位	正常位	健側	正常(2日)
36	→	→ ←	長時間	2日	正常位	正常位	健側	正常
40	→	←	長時間	4日	術側	術側	術側	術側
41	→	←	10秒	2日	術側	正常位	術側	正常(2日)
42	←	→	60秒	2日	正常位	正常位	正常	正常
62	→	← →	5分	5日	術側	術側	術側	術側
39	←	→	10秒		正常位	正常位	術側	正常(2日)
38	(一)	→	10秒		正常位	正常位	正常	正常
70	←	→	2分		正常位	正常位	正術	正常(2日)
74	←	→	2分 (30秒)		正常位	正常位	正常	正常
73	←	→	10秒		正常位	正常位	正常	正常
72	←	→	30秒	3日	正常位	術側(300)	健側	術側(300)
71	←	→	60秒		正常位	術側(300)	健側	歩行不能
69	←	→	10秒		正常位	術側(300)	正常	正常
68	←	→	20秒		正常位	正常位	正常	正常
67	←	→	60秒	4日	術側	術側	術側	術側
66	(一)	→	10秒		正常位	正常位	正常	正常
65	←	→	4分	2日	頭位右に振る	正常位	術側	正常(2日)
64	←	→		5日	術側	術側	術側	正常(300)
63	←	→	30秒		正常位	正常位	正常	正常
62	→	←	12時間	7日	術側	正常位(700)	術側	正常(700)
31	→	←	10秒	4日	術側	正常位(400)	術側	正常(400)
32	←	→	15秒	4日	正常位	正常位	正常	正常
33	→	→ ←	7分	3日	健側	正常位(700)	術側	正常(700)
35	→	→ ←	5分	7日	術側	術側	術側	正常(400)
24	→	← →	2分	2日	術側	術側	正常	正常
34	→	→ ←	2分	4日	正常位	術側(200)	正常	術側(200)
49	←	→	3分	5日	正常位	正常位	術側	正常(300)
14	←	→	10秒		正常位	正常位	正常	正常
16	←	→	10秒		健側	正常位	正常	正常
48	→	←	3分	2日	術側	正常位(500)	術側	正常
11	←	→	26秒		正常位	正常位	正常	正常
1	←	→	10秒	2日	正常位	正常位	健側	正常(300)
8	←	→ ←	30秒	4日	健側	正常位	歩行不能	術側
44	(一)	→	10秒		正常位	正常位	正常	正常
19	←	→	5秒		正常位	正常位	正常	正常
29	→	→	3分	3日	術側	術側	歩行不能	術側
54	→	←	15分	3日	術側	術側	健側	正常
55	←	→	10秒	2日	正常位	正常位	健側	正常
56	←	→	10秒		正常位	正常位	正常	正常
5	←	→	10秒		正常位	正常位	正常	正常

ないが、「開放時の特異性眼振が健側であつたものは開放後の特異性眼振は全例に発現し、術側であつたものは30例中13例に発現した」。

開放後の特異性眼振の発現例の持続期間は、2日8例、3日5例、4日6例、5日3例、7日2例で、「持続期間4日までのものは24例中19例でその大

半である」。

3. 外淋巴腔開放時並に開放後の頭位

外淋巴腔開放と同時に頭位を術側に属したもの12例、健側に属したもの4例、正常なもの25例である。頭位正常なもの25例の中、外淋巴腔開放時の特発性眼振の方向が、術側23例、健側2例である。頭位が術側に属した12例の中、開放時の特発性眼振の方向が、術側2例、健側10例で、術側2例はその後頭位を健側に変換した。頭位が健側に属した4例の中、開放時の特発性眼振の方向が、術側2例、健側2例で、健側の2例はその後頭位を術側に変換した。即ち、「頭位正常なものでは、開放時の特発性眼振の方向は術側のものが大半で、頭位が術側に属したものでは、開放時の特発性眼振の方向は健側にむかう傾向を見せ、頭位が健側に属したものでは、開放時の特発性眼振の方向には一定の傾向が見られなかつた」。

頭位を術側に属した12例の中、正常位に恢復したもの4例で、頭位が正常位に恢復するまでの期間は、5日2例、6日1例、7日1例で4例いずれも1週間以内で恢復した。頭位が健側に属した4例は1週間以内で全例正常位に恢復した。

4. 外淋巴腔開放時並に開放後の歩行

外淋巴腔開放時歩行正常なもの18例、術側に蹴るか、あるいは術側にむかつて同心円を描きながら歩行するか、所謂歩行術側13例、歩行健側7例、歩行が全く不能なもの2例である。歩行術側13例の中、外淋巴腔開放時の特発性眼振の方向が、術側6例、健側7例で、歩行と開放時の特発性眼振の間には一定の傾向が認められない。歩行健側7例の中、開放時の特発性眼振の方向が、術側4例、健側3例で、「歩行と開放時の特発性眼振の間には一定の相関性は認められない」。

「歩行術側例では、13例中10例が、正常歩行をとるようになり恢復し、恢復までの期間は、2日4例、3日1例、4日2例、5日1例、7日2例で平均4.6日である。歩行健側例では、7例中5例が歩行正常になり恢復し、恢復までの期間は2日5例で、2日まで全例恢復した。開放時歩行不能であつた2例では、1例は2日目に歩行術側となり、1例は翌日に

死亡した。

第2編 外淋巴腔開放後における迴轉性後眼振に就て

第1章 実験の材料と方法

1. 実験材料

実験家兎55例。耳鏡検査で鼓膜正常なもの、聴性瞳孔反応異常のないもの、迴轉性後眼振は左右の差が5°以内のもの、体重2kg以上のものを選択した。

2. 実験方法

前編の手術方法の項で述べた方法にて手術し、術後の特発性眼振消失後、迴轉性後眼振を観察した。

a) 実験装置

本庶式電動式等速度迴転台(第1図)を使用した。

第1図

本庶式電動式等速度迴転台

b) 観察方法

外淋巴腔開放を実施した家兎を固定台に腹位で固定し、体動を防ぐために充分に固定台に緊縛し、頭部を迴転台の中央におき、鼻脊接面と水平面がなす

角が45度になるように注意した。視性眼振を除くために、廻転中は黒い箱を頭部に被せて視覚を遮断し、廻転停止と共に早く箱を取り除き後眼振を観察した。

外淋巴腔開放後1週間は廻転刺激を加えると特異性眼振が現われて後眼振の測定が困難な場合が多いので、大半の例では1週間目から毎週毎に後眼振を測定し、特に術後の特異性眼振が比較的早く消失した24例に、外淋巴腔開放後2日目、4日目、6日目、8日目と後眼振を観察した。

廻転性後眼振の持続時間の生理的動揺範囲を決定するために、術前毎日1回各例ごとに5回以上廻転性後眼振の持続時間を測定し、最大値と最小値の間をもつて動揺範囲とした。

更に手術例の対照群として、手術を施さない、鼓膜正常な廻転性後眼振は左右差が5"以内の正常な家兎20例を選び、隔日に廻転性後眼振の持続時間を観察して第2表、第2図で示す通りの成績を得てこれを対照とした。この結果手術をしない正常家兎では、隔日に廻転性後眼振を実施すれば、後眼振の持続時間は第2図で示すようにやや低下の傾向を見

せて馴れの状態を認める。

第2章 実験成績

外淋巴腔開放後の廻転性後眼振の成績は第3表、第4表の通りで、これをグラフで示すと第3図、第5図の通りである。第3表は廻転性後眼振の馴れを避けるために各週毎に後眼振を観察した群の成績で、第4表は手術の影響の最も強いと思われる第1

第2図

正常家兎20例の廻転性後眼振の平均値

第2表

日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
術前	16" 18"	16" 14"	24" 26"	16" 15"	16" 20"	17" 23"	12" 13"	15" 18"	13" 11"	12" 15"	11" 13"	10" 8"	12" 13"	15" 20"	12" 12"	14" 15"	10" 9"	9" 10"	8" 9"	12" 15"
2日目	13" 23"	14" 14"	18" 24"	16" 17"	18" 18"	27" 23"	15" 15"	16" 12"	13" 10"	11" 10"	13" 11"	17" 12"	17" 17"	16" 11"	9" 18"	12" 10"	9" 10"	10" 8"	8" 7"	12" 7"
4日目	8" 8"	13" 14"	18" 10"	15" 14"	18" 19"	24" 23"	13" 14"	8" 10"	12" 11"	9" 11"	16" 12"	9" 9"	16" 16"	8" 9"	9" 14"	14" 12"	14" 13"	10" 14"	7" 7"	7" 8"
6日目	7" 7"	13" 12"	12" 10"	19" 14"	19" 21"	15" 22"	18" 15"			13" 10"	11" 9"	8" 8"	21" 21"	11" 11"	11" 14"	9" 7"	9" 9"	11" 10"	6" 7"	6" 6"
8日目	7" 11"	12" 15"	14" 13"	17" 14"	14" 13"	14" 18"	12" 10"	9" 15"	10" 11"		11" 12"		16" 15"	10" 8"	21" 14"	18" 18"	9" 8"	10" 8"	6" 7"	8" 9"
10日目	7" 9"	12" 14"	18" 16"	14" 16"	17" 12"	13" 15"	11" 12"			10" 14"	14" 10"	8" 8"	18" 17"	8" 8"	8" 12"	16" 12"	7" 10"	10" 10"	6" 7"	
12日目	8" 13"	15" 13"		15" 15"	16" 11"	12" 14"	11" 10"	14" 15"	13" 13"						11" 17"	12" 13"	10" 7"	11" 10"	6" 7"	
14日目		15" 12"	12" 12"	17" 14"						14" 14"	9" 8"	14" 14"								
16日目		12" 13"					12" 13"	12" 11"	9" 9"	10" 9"										
18日目									13" 9"	9" 9"	11" 10"									
20日目	10" 10"	16" 15"									12" 12"									

第 3 表

家 兔 番 号	廻 轉 方 向	生理的 振 幅 範 圍	術 前	才1週	才2週	才3週	才4週	才5週	才6週	才7週	才8週	才9週
1	↗	10°—20°	28°	12°	15°	15°	12°	16°	17°	17°	13°	12°
2	↗	13°—36°	16°	12°	15°	16°	9°	13°	17°	16°	14°	27°
4	↗	17°—9°	10°	15°	13°	13°	14°					
6	↗	16°—8°	10°		13°	3°						
7	↗	21°—13°	15°		10°	10°						
8	↗	24°—10°	21°		4°	5°						
9	↗	15°—7°	7°	0°	4°	7°	6°	7°	6°			
10	↗	12°—7°	7°	12°	8°	7°	7°	9°	7°			
11	↗	18°—12°	14°	3°	6°	5°	4°	6°	5°	4°	4°	6°
12	↗	20°—13°	14°	7°	7°	9°	7°	9°	9°	4°	5°	9°
13	↗	15°—10°	12°		5°	6°	4°	7°	9°	4°	4°	8°
14	↗	17°—11°	13°		16°	15°	7°	3°	6°	7°	10°	10°
15	↗	18°—11°	11°		4°	13°	2°	6°	7°	6°	7°	7°
16	↗	19°—10°	13°	5°	7°	11°	15°	7°	6°	6°	10°	7°
18	↗	12°—6°	8°	6°	6°	5°	8°	7°	19°	20°	17°	
21	↗	4°—6°	10°	9°	12°	11°	14°	13°	19°	17°	13°	10°
22	↗	18°—10°	15°	20°	11°	13°	7°	11°	11°	11°	4°	7°
25	↗	20°—11°	12°	2°	4°	5°	4°	9°	6°	8°		
26	↗	14°—10°	10°	8°	4°	4°	4°	4°	11°	7°		
28	↗	17°—8°	13°	3°	4°	4°	4°	4°				
34	↗	20°—8°	8°	6°	6°	11°	10°	15°	25°	27°		
44	↗	21°—10°	17°	21°	23°	20°	14°	19°	25°			
45	↗	13°—7°	9°	13°	8°	13°	15°					
48	↗	16°—10°	13°	12°	12°	12°	18°	15°	20°			
49	↗	17°—8°	8°	12°	12°	2°						
55	↗	12°—9°	12°	6°	10°	11°						
56	↗	12°—4°	12°	11°	10°	13°						
57	↗	16°—4°	13°	10°	10°	13°						
62	↗	17°—8°	13°	8°	8°	16°	7°	4°	4°		1°	
63	↗	15°—9°	6°	4°	4°	25°	4°	4°	4°		1°	
65	↗	14°—6°	9°	7°	8°	6°						
75	↗	15°—9°	10°	7°	8°	10°	10°					
76	↗	17°—7°	12°	11°	11°	8°	11°					
77	↗	14°—9°	15°	10°	9°	9°	15°	15°				
78	↗	15°—8°	9°	2°	2°	4°						
79	↗	15°—9°	9°	10°	14°	8°						
80	↗	19°—13°	13°	3°	7°	7°						
81	↗	20°—12°	15°	5°	15°	15°						
82	↗	13°—6°	10°		6°	6°						
83	↗	24°—10°	11°		20°	35°						
	↗	27°—18°	25°	8°	13°	5°						
	↗	29°—14°	20°	13°	5°	5°						
	↗	20°—8°	8°	8°	15°	15°						
	↗	18°—10°	10°	8°	8°	15°						
	↗	17°—8°	10°	10°	10°	10°						
	↗	21°—10°	12°	10°	10°	10°						
	↗	13°—6°	6°	8°	8°	10°						
	↗	15°—8°	8°	8°	8°	10°						
	↗	17°—9°	13°	13°	13°	11°						
	↗	13°—8°	13°	13°	13°	10°						
	↗	20°—8°	14°	14°	14°	8°						
	↗	21°—8°	16°	16°	16°	6°						
	↗	12°—7°	9°	3°	3°	3°						
	↗	14°—6°	12°	13°	13°	13°						
	↗	14°—8°	12°	17°	17°	13°						
	↗	16°—10°	12°	17°	17°	13°						
	↗	15°—10°	13°	3°	3°	3°						
	↗	17°—8°	12°	10°	10°	7°						
	↗	12°—7°	7°	8°	8°	21°						
	↗	13°—6°	8°	10°	10°	12°						
	↗	24°—8°	19°	8°	8°	10°						
	↗	25°—6°	13°	4°	5°	5°						
	↗	14°—7°	8°	8°	8°	8°						
	↗	10°—8°	8°	8°	8°	14°						
	↗	17°—10°	15°	13°	13°	13°						
	↗	19°—10°	10°	18°	15°	15°						
	↗	13°—8°	8°	5°	4°	4°						
	↗	14°—10°	12°	10°	10°	10°						
	↗	15°—7°	8°	5°	5°	5°						
	↗	13°—8°	10°	5°	5°	5°						
	↗	12°—6°	8°	9°	7°	7°						
	↗	15°—9°	10°	7°	5°	5°						
	↗	17°—6°	12°	4°	6°	6°						
	↗	15°—8°	9°	6°	6°	6°						
	↗	19°—6°	14°	7°	13°	13°						
	↗	28°—14°	16°	23°	20°	20°						

週を術後隔日に8日目まで
観察した群の成績である。
第3表を图示した第3図の
成績では、「開放後第1週
間目の後眼振の成績が最も
低下の傾向を示し、第4表
を图示した第5図の成績で
は、「開放後第4日目」が最
低値を示している」。これ
を対照群である正常家兎の
廻転性後眼振の成績と比較
すれば、その低下は著明で
ある。

更に第3表から各例ごと
に後眼振の成績を検討し、
その成績が生理的動揺範囲
以下に低下した例数を毎週
ごとに图示すれば第4図の
通りで、その低下率は、
「術側刺激の場合は第1週
が最も著明で32例中17例
53.1%、時日の経過に従い、
多少の低下例減少の傾向が
認められる」。「健側刺激の
場合は第1週第2週では術

第 4 表

家兎 番号	廻轉方向	動揺範囲	眼振持続時間				
			術前	術後第2日目	術後第4日目	術後第6日目	術後第8日目
20	→	7"~15"	7"	3"		2"	
21	→	8"~12"	8"	4"		7"	10"
22	→	10"~18"	13"	12"	11"	12"	18"
24	→	13"~17"	13"	19"	19"	20"	11"
25	→	8"~14"	9"	5"	8"	12"	16"
26	→	6"~17"	6"	4"	7"	9"	
29	→	8"~10"	10"	2"	0	2"	
31	→	10"~20"	10"	6"	0	7"	
32	→	10"~22"	10"	11"	11"		7"
33	→	10"~23"	12"	15"	15"		11"
34	→	8"~13"	11"	15"	6"		10"
35	→	8"~28"	15"	15"	22"		9"
39	→	18"~23"	18"	0	0	1"	
41	→	15"~29"	18"	7"	15"	5"	8"
42	→	8"~10"	10"	4"	6"	6"	6"
43	→	9"~13"	11"	4"	4"	5"	8"
62	→	10"~17"	13"	9"	9"	6"	8"
63	→	11"~18"	13"	6"	12"	7"	7"
64	→	12"~27"	14"	9"	15"	6"	15"
65	→	12"~17"	14"	3"	15"	7"	0
66	→	8"~20"	13"	17"	14"	0	0
67	→	9"~19"	15"	8"	7"	14"	0
68	→	16"~18"	15"	7"	10"	14"	12"
69	→	13"~16"	16"	12"	12"	12"	
	→	8"~15"	8"	11"	12"		
	→	8"~18"	11"	7"	7"		
	→	6"~15"	8"	7"	7"		
	→	6"~13"	8"	7"	7"		
	→	10"~18"	11"	8"	7"		
	→	10"~17"	14"	10"	10"		
	→	10"~23"	22"	12"	14"		
	→	12"~23"	21"	13"	18"		
	→	13"~28"	9"	13"	1"		
	→	9"~18"	12"	8"	3"		
	→	10"~20"	12"	15"	3"		
	→	11"~17"	12"	13"	19"		
	→	10"~19"	12"	10"	17"		
	→	9"~19"	14"	17"	0		
	→	10"~21"	12"	17"	6"		
	→	8"~16"	13"	7"	7"		
	→	12"~18"	12"	12"	9"		
	→	9"~15"	11"	10"	13"		
	→	10"~13"	16"	4"	8"		
	→	12"~14"	15"	5"	3"		
	→	9"~16"	12"	7"	3"		
	→	8"~13"	9"	7"	10"		
	→	9"~14"	9"	4"	11"		
	→	9"~15"	9"	5"	2"		

第 3 図

開放後の廻転性後眼振の持続時間の成績

第 5 図

開放後第1週の廻転性後眼振の持続時間の成績
(実験家兎24例の平均値)

第 4 図

開放後第 9 週迄の廻転性後眼振の成績

第 6 図

開放後第 1 週の廻転性後眼振の成績

側刺激の場合に比べて低下率は少ないが、時日の経過に従い術側刺激の場合の低下傾向に平行する。又第 4 表から生理的動揺範囲以下に低下した例数を図示すれば第 6 図の通りである。「低下率は、術側刺激では第 6 日目最も高く 16 例中 11 例 68.8%、健側刺激では術側刺激に比べてやや低下率が低い傾向が認められる」。

第 3 編 外淋巴腔開放における前庭迷路の病理組織学的観察に就て

第 1 章 実験の材料と方法

1. 実験材料

実験材料は家兎 59 例。体重 2kg 以上、耳鏡検査で鼓膜正常、聴性瞳孔反応正常、廻転性後眼振に異常のない正常家兎を選択した。

2. 実験方法

前編で述べたような方法で、家兎の 1 側の水平半規管に窓孔を設けて外淋巴腔開放を実施し、開放後の特発性眼振、頭位並に歩行、更に廻転性後眼振を観察してその後に生体固定を行った。固定法は山川氏固定液を使用し、固定後に硝酸にて脱灰ツエロイジンにて包埋した。

標本は水平断にて 15μ 乃至 20μ の間で連続切片を作製し、染色法はヘマトキシエン・エオジン重染色、マロリー氏染色を行い、グラム染色を加えて細菌存在の有無を検索した。

3. 観察方法

外淋巴腔開放を行った家兎の迷路の病理組織像を観察するにあたり、開放後の日数の経過により次のように分類した。開放後 3 日目までに固定した実験家兎群を A 群、4 日乃至 1 週間を B 群、1 週乃至 2 週間を C 群、2 週乃至 4 週間 D 群、4 週乃至 6 週間を E 群、6 週乃至 8 週間を F 群、8 週間以上を G 群とした。又迷路内の出血並に炎症所見の強弱は、高度卅、中等度卅、軽度十の符号で示した。

第 2 章 実験成績

A 群の病理組織学的所見（第 5 表）

A 群に属する実験家兎は 9 例。7 例が生体固定、2 例が断頭固定。断頭固定した No.70 は死後数時間経過して固定し、No.74 は生体固定中失敗し、やむなく断頭固定したものである。

中耳所見：多少の差異はあるが、中耳性には出血並に化膿所見が認められる。鍍骨脱臼は No.37 の 1 例で、脱臼による前庭被覆層の損傷は認められない。

迷路所見：「A 群における迷路内の主要所見は、出血あるいは化膿所見で漿液性炎症所見の認められる例は見られなかった」。

第 5 表 (A 群)

家 兎 番 号	生 体 日 数	中 耳 腔	耳 小 骨	蝸 牛 殻				前 庭				水 平 半 規 管				聴 障	ク ア ラ
				外 淋 巴 腔	内 淋 巴 腔	コルチ器	蝸牛腔	外 淋 巴 腔	内 淋 巴 腔	前庭斑	前庭神経	前庭部	内 淋 巴 腔	外 淋 巴 腔	聴 障		
36	2	生体固定	本血中化膿	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中		
37	2	生体固定	本血中化膿	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中		
41	3	生体固定	本血中化膿	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中		
47	2	生体固定	本血中化膿	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中		
70	2	断頭固定	本血中化膿	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中		
71	2	生体固定	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中		
72	2	生体固定	本血中化膿	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中		
73	2	生体固定	本血中化膿	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中		
74	2	断頭固定	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中	本血中		

水平半規管の外淋巴腔内の出血は全例に見られ、出血の強弱の程度は表示した通りである。内淋巴腔内に出血のみられる例は、No.36, No.37 の 2 例で、No.36 は水平半規管の内淋巴腔に（写真 3）、No.37 は前庭蝸牛殻の内淋巴腔腔にみられて、水平半規管の内淋巴腔には出血はみられない。No.37 は鍍骨脱臼があり、手術による副損傷と想像される。三半規管、前庭、蝸牛殻の外淋巴腔全域に強い出血所見のみられる例は No.36, No.37, No.41, No.47 の 4 例である。水平半規管、前庭の外淋巴腔に出血所見が見られる例は No.71, No.72 の 2 例で、出血は中等度である。開窓孔に近い水平半規管の外淋巴腔のみに出血所見が限られた例は No.70, No.73, No.74 の 3 例で出血は極めて軽度である。

迷路内に化膿所見をみた No.36, No.47 の 2 例は

同時に迷路内に多量の出血を伴った。膜様迷路は浮腫状で、迷路内の細胞浸潤は日数の経過が少ないためか比較的軽度である。浸潤細胞は主として多核白血球で外淋巴腔内に限られた。No.36 は外淋巴腔全域に多量の滲出物よりの無構造物質が見られたが、内淋巴腔内には水平半規管に少量の漿液性滲出物を認めたにすぎない。

コルチ氏器、前庭斑、聴櫛の変性は No.70, No.74 の 2 例で著しい融解像がみられるが、共に断頭固定で、膜様迷路の細胞剥脱、内淋巴腔内の無構造物等から死後変化による変性と想像され、本群では萎縮性変性所見を示した例はない。

水平半規管の開窓部位は未だ骨溝離縁からの新生骨の生成はなくて窓孔は開放されているが、No.36,

No.47 の化膿所見が見られた例は僅かではあるが既に肉芽組織の発生が認められる。

B 群の病理組織学的所見（第 6 表）

B 群に属する実験家兎 12 例。全例生体固定である。

中耳所見： 本群に属する実験家兎全例の中耳腔に出血並に化膿の所見がみられる。鍍骨脱臼は No.24, No.35 の 2 例に認められる。

迷路所見： A 群における実験家兎では迷路内に漿液性炎症の所見が認められた例は見られなかつたが、「B 群においては実験家兎 12 例中 7 例に迷路内に漿液性炎症の所見が見られる」。

強度の出血所見を示した例は No.20, No.24, No.27, No.35, No.64 の 5 例で、No.27 を除き出血

第 6 表 (B 群)

家 児 番 号	生 存 日 数	固 定 法	中 耳		蝸 牛 殻						前 庭			水 平 半 規 管				
			中 耳 腔	聴 小 骨	内 淋 巴 腔	外 淋 巴 腔		己 々 氏 器	蝸 牛 神 經	内 淋 巴 腔	外 淋 巴 腔	前 庭 神 經	前 庭 器 位	内 淋 巴 腔	外 淋 巴 腔	聴 小 骨	ク ラ ラ	
						外 腔	前 腔											
20	5	生体固定	充血性化膿性		出血性多量	膿塊性多量	膿塊性多量	萎縮性萎縮性		出血性多量	出血性多量	萎縮性萎縮性	膨大部開放	膨大部開放	膿塊性多量	膿塊性多量	萎縮性萎縮性	消失
24	7	生体固定	充血性化膿性		出血性多量	膿塊性多量	膿塊性多量	萎縮性萎縮性		出血性多量	出血性多量	萎縮性萎縮性	膨大部開放	膨大部開放	膿塊性多量	膿塊性多量	萎縮性萎縮性	消失
27	7	生体固定	充血性化膿性			出血性多量	膿塊性多量			出血性多量	出血性多量		脚部開放	脚部開放	膿塊性多量	膿塊性多量		
31	7	生体固定	充血性化膿性			出血性多量	膿塊性多量			出血性多量	出血性多量		脚部開放	脚部開放	膿塊性多量	膿塊性多量		
32	7	生体固定	充血性化膿性			出血性多量	膿塊性多量			出血性多量	出血性多量		脚部開放	脚部開放	膿塊性多量	膿塊性多量		
33	7	生体固定	充血性化膿性			出血性多量	膿塊性多量			出血性多量	出血性多量		脚部開放	脚部開放	膿塊性多量	膿塊性多量		
35	7	生体固定	化膿性		膿塊性多量	出血性多量	膿塊性多量	萎縮性萎縮性		出血性多量	出血性多量	萎縮性萎縮性	膨大部開放	膨大部開放	膿塊性多量	膿塊性多量	萎縮性萎縮性	消失
39	5	生体固定	充血性化膿性		出血性多量	膿塊性多量	膿塊性多量			出血性多量	出血性多量		脚部開放	脚部開放	膿塊性多量	膿塊性多量		
42	5	生体固定	充血性化膿性										脚部開放	脚部開放	膿塊性多量	膿塊性多量		
43	6	生体固定	充血性化膿性										脚部開放	脚部開放	膿塊性多量	膿塊性多量		
64	4	生体固定	充血性化膿性		出血性多量	膿塊性多量	膿塊性多量	萎縮性萎縮性		出血性多量	出血性多量	萎縮性萎縮性	膨大部開放	膨大部開放	膿塊性多量	膿塊性多量	萎縮性萎縮性	消失
66	5	生体固定	充血性化膿性										脚部開放	脚部開放	膿塊性多量	膿塊性多量		

所見は内外両淋巴腔全域に波及している。No.27 の No.66 の4例は、水平半規管の外淋巴腔内で開窓部
出血所見は外淋巴腔のみに限られている。その他の 位附近に限られている。
7例は、出血所見軽度で、No.32, No.33, No.43, 化膿所見は出血所見の強い、No.20, No.24, No.35,

迷路所見：「D群におけ

る病理組織像とC群の病理組織像との主要な相違は、炎症所見に多核白血球が少なく淋巴球が増加していることである」。D群も又漿液性炎症のみの所見が見られず、No.21の前庭外淋巴腔内に雲架状物が認められるが、断頭固定であり死後変化によるものと想像される。

No.65, No.18 の外淋巴腔内に比較的強い出血所見を認め、2例とも少数の多核白血球の浸潤がみられる(写真6). No.21, No.2 の

(写真6). No.21, No.2の
外淋巴腔内に極めて少量の
出血所見が認められる.

No.28 は迷路内に出血所見は殆んど見られないが、鐙骨脱臼のために前庭内に膿塊の侵入が認められる。

開窓部位は何れの例も窓孔の骨遊離縁から骨の新生がみられ、窓孔は肉芽組織で覆われているが骨新生のために窓孔の閉鎖が認められた例は見られない。

E 群の病理組織学的所見 (第 9 表)

E 群に属する実験家兎 11 例。No.49 は断頭固定，他の 10 例は生体固定である。

中耳所見：本群では中耳腔の化膿所見は一般に軽く、No.49は鐙骨脱臼が認められる。

迷路所見：「D群と病理
組織学的な所見の相違は、

[illegible]

炎症所見が見られる例の少ないこと、開窓部位の骨新生により窓孔の閉鎖例が認められることである。

出血所見が内外両淋巴腔内に全く認められない例は No.75, No.76, No.79 の3例で、勿論炎症所見は見られない。外淋巴腔内に少量の出血所見が見られた例は No.81, No.82, No.49 の3例で、No.49 は死後変化による迷路内の細胞の膨解像が認められる。No.7, No.77, No.78, No.80, No.83 の5例の外淋巴腔にかなり強い出血所見を認めたが(写真5)、一般に、蝸牛殻に出血所見が強く、血球は既に変形している(写真4)。

A群 B群並に C群においては、出血の程度と炎症の程度が相関関係を見せたが、「E群では強い出血例においても必ずしも炎症所見を伴わず」、No.83の水平半規管の外淋巴腔内に少数の多核白血球の滲出が見られるにすぎない。No.80のコルチ氏器、No.83のコルチ氏器、前庭斑、聴嚢に萎縮性変性が見られる。

開窓部位は、防窓孔の広く開放されているもの No.79, No.49 の2例で、結締組織が外淋巴腔に侵入して膜様半規管膜を内淋巴腔内方へ圧迫し内腔は著しく狭められている。他の9例は窓孔が狭く、骨新生のために窓孔は閉鎖されている。

F群の病理組織学的所見(第10表)

F群に属する実験家兎7例、全例生体固定である。

中耳所見：各例とも中耳腔には出血所見並に化膿所見がみられるが、炎症所見は一般に軽く肉芽の発生が認められる。No.14に蝸骨脱臼がある。

迷路所見：「F群における病理組織学的所見の特徴

は再び漿液性炎症のみの所見が多く見られることである」。漿液性炎症は B群では12例中7例において見られ、A群 C群 D群 E群では殆んど見られず、F群において再び7例中4例に見られる。

No.16, No.63は迷路内に出血所見が認められず、炎症所見も認められない。No.11, No.22の2例は外淋巴腔内に少量の出血所見が見られ、少量の雲架状物が外淋巴腔内に認められ、No.22は更に内淋巴腔内にも雲架状物が侵入している。No.6, No.14, No.62の3例は外淋巴腔内に中等度の出血所見が見られるが、いずれも蝸牛殻に強く前庭、三半規管内には少量である。No.6は外淋巴腔内に雲架状物と少数の淋巴球をみたが、No.14は外淋巴腔に少数の淋巴球が見られた。No.22はコルチ氏器、前庭斑、聴嚢に萎縮性変性像が認められるが、内淋巴腔外淋巴腔内いずれにも雲架状物が認められた。

開窓部位には骨新生が著明で結締組織は癒着化の傾向を見せる。No.6, No.14, No.16, No.62の4例は窓孔が開放され、他の例は窓孔の閉鎖が見られる。

第 10 表 (F群)

家兎番号	生存日数	固定法	中耳	蝸牛殻				前庭	内淋巴腔	外淋巴腔	前庭斑	聴嚢	水平半規管	内淋巴腔	外淋巴腔	聴嚢	クア
				内淋巴腔	外淋巴腔	腔前部	元々気管										
6	42	生体固定	化膿性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	+
11	54	生体固定	化膿性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	+
14	37	生体固定	化膿性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	+
16	42	生体固定	化膿性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	+
22	54	生体固定	化膿性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	+
62	56	生体固定	化膿性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	+
63	56	生体固定	化膿性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	出血性	+

G 群の病理組織学的所見

（第 11 表）

G 群に属する実験家兎は 8 例。No.8 は断頭固定。他は総て生体固定である。

中耳所見：No.50 には中耳腔に化膿所見がみられないが、他は全て強弱の差異はあるが化膿所見がみられる。

迷路所見：「F 群の病理組織像との相違点は少ない」。

No.1, No.48, No.50 の 3 例は出血並に炎症所見が認められない。但し、No.48 の前庭斑、聴嚢に萎縮性変性が認められるが、その原因に就ては判定が困難である。No.25, No.12 の外淋巴腔内に少量の出血所見がみられるが、No.25 は蝸牛殻に限局し、No.12 の外淋巴腔内には、出血と共に雲絮状物と少数の淋巴球が認められる。No.8, No.9, No.46 の 3 例の迷路内には、多量の出血所見がみられるが、No.8, No.46 は外淋巴腔内のみで、No.8 は水平半規管、No.46 は蝸牛殻の第 1 廻転に夥しい出血所見が見られ、No.9 は内淋巴腔外淋巴腔に亘り出血と共に漿液性滲出物が多量に認められ、特に内淋巴腔内に著しい（写真 8）。No.9 はコルチ氏器、前庭斑に萎縮性変性が認められるが、聴嚢には変性は認められない。

開窓部位は骨新生が著明で、No.1, No.12 の窓孔は開放されているが、他はいずれも新生骨により閉鎖されている。

第 4 編 外淋巴腔開放の前庭迷路に及ぼす影響 と迷路の病理組織像の關係に就て

第 1 章 外淋巴腔開放時の特発性眼振と迷路の病理組織像の關係に就て

外淋巴腔開放時の特発性眼振と迷路の病理組織像との間の關係を観察するために外淋巴腔開放時の特発性眼振を観察し観察後 1 週間以内で固定した。こ

第 11 表 (G 群)

実験 番号	生存 日数	固定 法	中 耳 腔	聴 小 骨	蝸 牛 殻				前 庭		庭		水 平 半 規 管		聴 嚢	フ ジ ラ	
					外 淋 巴 腔	内 淋 巴 腔	コ ル チ 氏 器	蝸 牛 殻	内 淋 巴 腔	外 淋 巴 腔	前 庭 斑	前 庭 神 経	内 淋 巴 腔	外 淋 巴 腔			
1	64	生体固定	化膿										蝸牛殻内入				
8	96	断頭固定	化膿	聴骨脱臼		出血			膨 解		出血	膨 解	脚部	前庭斑と内 淋巴腔内に 少量の出血	出血	膨 解	消 失
9	78	生体固定			聴骨脱臼	聴骨 脱落	聴骨 脱落	聴骨 脱落	聴骨 脱落	聴骨 脱落	聴骨 脱落	聴骨 脱落	脚部	前庭斑と内 淋巴腔内に 少量の出血	出血		
12	126	生体固定	化膿			出血	出血	出血	出血	出血	出血	出血	脚部	蝸牛殻内入	出血	出血	
25	18	生体固定	化膿			出血							脚部	前庭斑と内 淋巴腔内に 少量の出血			
46	57	生体固定	化膿			出血	出血	出血	出血	出血	出血	出血	膨大部	前庭斑と内 淋巴腔内に 少量の出血	出血		
48	78	生体固定	化膿										脚部	前庭斑と内 淋巴腔内に 少量の出血			
50	22	生体固定											脚部	前庭斑と内 淋巴腔内に 少量の出血			

れは開放時の迷路の病理組織像にできる限り近い像を観察するためである。観察家兎は 21 例で、開窓孔の位置、大きさ、出血と開放時の特発性眼振の相関關係に注意した（第 12 表）。

1. 開窓孔の位置と外淋巴腔開放時の特発性眼振

外淋巴腔開放時の開窓孔の位置に就ては水平半規管の膨大部、脚部、膨大部と脚部の移行部に大別される。膨大部に開窓 4 例、開放時の眼球偏位の方は共に術側にむかい、開放時の特発性眼振の方向は、健側 2 例、始め術側にむかい、後に健側に方向を換えたもの 2 例である。脚部に開窓 11 例でこの中開放時に眼球偏位の現われたもの 6 例で眼球偏位の方向はいずれも健側である。開放時の特発性眼振の方向は 11 例中 10 例が術側で、他の 1 例は始め術側で後に健側に方向を換えた。移行部に開窓 6 例で、眼球偏位の方向は術側 5 例健側 1 例である。開放時の特発性眼振の方向は始め術側後に健側に方向を換えたもの 4 例、始め健側後に術側に方向を換えたもの 2 例である。「即ち水平半規管の膨大部に窓孔をお

第 12 表

家兎番号	生後日数	向窓部位	開窓部位	内耳腔内の出血 有無	迷路内の出血 有無	開窓時の眼球偏位 方向	開窓後の眼球偏位 方向	開窓時の特異性 眼振	開窓後の特異性 眼振
20	5	移行部	大	+	++	→	→	1' 30"	
24	7	移行部	大	+	++	→	→	2'	
27	7	移行部	大	—	+	→	→	5'	
31	7	脚部	小	—	+	→	→	3'	
32	7	脚部	小	—	+	→	→	10"	
33	7	脚部	小	—	+	→	→	7'	
35	7	脚部	大	++	++	→	→	5'	
36	2	移行部	大	+	++	→	→	長時間	
37	2	脚部	大	—	++	→	→	3'	
39	5	脚部	小	—	+	→	→	10"	
41	3	脚部	小	—	+	→	→	2'	
42	5	脚部	小	—	+	→	→	1'	
43	6	脚部	小	—	+	→	→	10"	
47	2	移行部	大	—	++	→	→	3'	
44	4	移行部	小	++	++	→	→	長時間	
66	5	脚部	小	—	+	→	→	10"	
70	2	脚部	小	—	+	→	→	2'	
71	2	脚部	小	—	+	→	→	1'	
72	2	脚部	小	—	++	→	→	10"	
73	2	脚部	小	—	+	→	→	10"	
74	2	脚部	小	—	+	→	→	2'	

いた場合、開放時の眼球偏位方向は術側、開放時の特異性眼振方向は健側の傾向が見られ、脚部に窓孔をおいた場合、開放時の眼球偏位方向は健側、開放時の特異性眼振方向は術側の傾向がある。移行部に窓孔をおいた場合、開放時の眼球偏位方向は術側、開放時の特異性眼振方向は術側から後に健側、又は健側から後に術側に方向を換えて一定の傾向が見られない。

2. 開窓孔の大きさと外淋巴腔開放時の特異性眼振

「開窓孔の大きさと外淋巴腔開放時の眼球偏位並に特異性眼振の方向の間には一定の傾向はみられないが、開窓孔の大小と、外淋巴腔開放時の特異性眼振の持続時間の間には相関性が認められる。一般に開窓孔の大きいものは外淋巴腔内に出血が多く、開窓孔の小さいものは外淋巴腔内に出血が少ない傾向を持っているので、迷路内の出血がある程度関与していることは否定できない。」

開窓孔の大きいものは7例で、いずれも外淋巴腔内に多量の出血所見が見られ、3例では内淋巴腔内にも出血所見が見られる。この7例の開放時の特異性眼振の持続時間は1' 30"以上で、6例では5'以内、

他の1例は極めて長時間で、その後開放後の特異性眼振に移行した。開窓孔の小さいものは14例で、外淋巴腔内に多量の出血所見が見られたもの1例、中等度の出血所見が見られたもの2例、軽度の出血所見が見られたもの11例で、大半は外淋巴腔内に少量の出血所見が認められた。この14例の開放時の特異性眼振の持続時間は、10"以内6例、10"乃至30"2例、30"乃至1'2例、1'乃至2'2例、2'以上3例で、大半は2'以内である。即ち、「開窓孔の大きいものは迷路内の出血が多く、開放時の特異性眼振の持続時間は長い傾向がある。開窓孔の小さいものでは、迷路内の出血が少なく、開放時の特異性眼振の持続時間は短い傾向がある。」

第2章 外淋巴腔開放後の特異性眼振と迷路の病理組織像の関係に就て

外淋巴腔開放後の特異性眼振の方向は一定でないので、特異性眼振の持続期間と迷路の病理組織像の関係に就て注目した。開放後の特異性眼振と迷路の病理組織像の関係を観察するためには、できる限り開放後の特異性眼振の終つた日に近く固定した家兎を観察対照とした。観察家兎は25例である(第13表)。

1. 迷路内出血と外淋巴腔開放後の特異性眼振の持続期間

迷路内に炎症所見がみられずに出血所見のみが認められたものは観察家兎25例中10例で、いずれの例も外淋巴腔内に少量の出血所見が認められた。「これ等10例中6例では外淋巴腔開放後の特異性眼振は手術した日のみで、翌日の観察では既に特異性眼振は認められなかつた」。3例では開放後の特異性眼振の持続期間は開放後2日間、1例では開放後4日間観察された。

2. 漿液性迷路炎と外淋巴腔開放後の特異性眼振の持続期間

迷路内に漿液性炎症の所見のみがみられたものは、観察家兎25例中7例である。この7例の外淋巴腔開放後の特異性眼振の持続期間は、外淋巴腔開放を行つた日だけのもの2例、開放後3日間続いたもの2例、4日間3例で、「迷路内の出血群の特異性眼振よりその持続期間が長い傾向が認められる。」

第 13 表

家兎番号	生存日数	内リンパ腔				外リンパ腔				取除後経過 日数
		出血	膿瘍	化膿	化膿	出血	膿瘍	化膿	化膿	
20	5	+	++	+	++	++	++	++	++	5
24	5	+	++	+	++	++	++	++	++	2
27	7	+	++	+	++	++	++	++	++	4
31	7	-	+	-	+	+	+	-	-	4
32	7	-	+	-	+	+	+	-	-	4
33	7	-	+	-	+	+	+	-	-	3
35	7	++	++	++	++	++	++	++	++	7
36	2	+	+	-	++	+	+	+	+	2
37	2	-	-	-	+	-	-	-	-	
39	2	-	-	-	+	-	-	-	-	
41	3	-	-	-	+	-	-	-	-	2
42	5	-	-	-	+	+	+	-	-	3
43	6	-	-	-	+	+	+	-	-	
47	2	-	+	-	++	-	-	+	+	2
64	4	++	++	++	++	-	-	++	++	4
66	5	-	-	-	+	-	-	-	-	
70	2	-	-	-	+	-	-	-	-	
71	2	-	-	-	+	-	-	-	-	2
72	2	-	-	-	+	-	-	-	-	2
73	2	-	-	-	+	-	-	-	-	
74	2	-	-	-	+	-	-	-	-	
34	10	-	-	-	+	-	-	-	-	4
67	10	-	-	-	++	-	-	++	++	4
68	9	-	-	-	+	-	-	-	-	
69	10	-	-	++	++	-	-	++	++	38日死亡

3. 化膿性迷路炎と外淋巴腔開放後の特発性眼振の持続期間

迷路内に化膿性炎症の所見がみられたものは観察家兎 25 例中 8 例で、外淋巴腔開放後の特発性眼振の持続期間は、開放後 2 日間が 3 例、但しこの 3 例は特発性眼振の出現中に固定したもので実際の持続期間はより延長されていたものと推測される。開放後 4 日 2 例、この中 1 例も特発性眼振の出現中に固定されたものである。開放後 5 日 1 例、この例も又特発性眼振の出現中に固定された。開放後 7 日、10 日各 1 例がみられるが、共に特発性眼振の出現中に固定されたもので、特発性眼振の持続期間は実際にはこれよりも延長されていたものと思われる。即ち、「迷路内に化膿性炎症の所見がみられた例は、迷路内出血群、漿液性迷路炎群に比べて特発性眼振の持続期間はより長い傾向がある」。

第 3 章 外淋巴腔開放後の廻転性後眼振と迷路の病理組織像の関係に就て

外淋巴腔開放後の迷路内出血、漿液性迷路炎、化膿性迷路炎と廻転性後眼振の関係を検討するために

開放後廻転性後眼振を観察し、その後において固定して迷路の病理組織標本を得た実験家兎 59 例中迷路内出血の認められるもの 21 例、漿液性迷路炎の認められるもの 13 例、化膿性迷路炎の認められるもの 12 例合計 45 例に就てその病理組織学的所見と廻転性後眼振の関係を観察した。なお外淋巴腔開放後 1 ヶ月以上経過して固定した家兎の中には、迷路内に出血並に炎症所見の認められないものがあり、出血並に炎症所見は吸収されたものと想像されるが観察対照から一応除外した。漿液性迷路炎群、化膿性迷路炎群いずれも迷路内に出血を伴っているが炎症所見の存在を第一条件とした。

1. 迷路内出血と外淋巴腔開放後の廻転性後眼振

水平半規管を開窓して外淋巴腔開放を行った家兎の迷路の病理組織標本から、迷路内に漿液性炎症、化膿性炎症の見られない単に出血所見のみが認められる例を選別した。しかし開放後生存日数の比較的長期に亘る例の中には開放後化学療法を実施するのであるから、あるいは漿液性炎症や化膿性炎症を短期間経験し、固定時には既に治癒して出血所見のみが観察される例があるかも知れない。

迷路内の出血所見と廻転性後眼振の持続時間の関係を表示すれば第 14 表に示す通りで、これを図示すれば第 7 図の通りである。第 7 図によれば、「外淋巴腔開放後第 1 週までは廻転性後眼振の持続時間は術側刺激の場合かなり低下し、健側刺激の場合低下は極めて軽度である」。第 1 週以後はしだいに回復の傾向が見られる。

各例毎に廻転性後眼振の持続時間の成績を検討すれば、開放後第 1 週では術前観察した廻転性後眼振の生理的動揺範囲以下に低下した例は、術側刺激の場合 20 例中 9 例 45% の低下、健側刺激の場合 20 例中 7 例 35% の低下である。第 2 週では術側刺激の場合 9 例中 3 例 33% の低下、健側刺激の場合 9 例中 1 例 11% の低下である。第 4 週では術側刺激の場合 10 例中 5 例 50% の低下、健側刺激の場合 10 例中 5 例 50% の低下である。第 6 週では術側刺激の場合 10 例中 6 例 60% の低下、健側刺激の場合 10 例中 5 例 50% の低下を示す。

迷路内の出血の程度と廻転性後眼振の関係を観察するために、迷路内の出血を少量と多量に分けて第

第 14 表

家兎番号	37	41	70	73	74	66	26	34	68	2	77	78	80	81	82	7	49	62	46	8	25
生存日数	2	3	2	2	2	5	14	10	9	21	35	35	35	35	35	33	30	56	57	96	65
迷路内出血の所見	内リンパ腔	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前庭	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	後庭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	本環管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外リンパ腔	前庭	++	+	-	-	-	-	++	-	+	+	++	+	-	-	++	+	++	++	+	+
	後庭	+	+	-	-	-	-	++	-	+	+	+	+	-	-	+	+	++	++	+	+
	本環管	++	++	+	+	+	+	++	+	+	++	+	++	+	++	+	+	-	+	++	-
	本環管	++	++	+	+	+	+	++	+	+	++	+	++	+	++	+	+	-	+	++	-
廻轉性後眼振の持続時間	廻轉方向	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左	左
	生理的範囲	25°25' 15°13' 21°18' 12°9' 20°16' 15°13' 13°28' 20°19' 16°13' 17°16' 14°10' 17°14' 15°13' 12°15' 17°15' 18°20' 17°21' 12°14' 20°16' 15°17' 15°11'																			
	術前	12°10' 6°6' 9°12' 5°5' 9°6' 9°10' 8°8' 8°4' 9°8' 9°8' 7°8' 10°10' 7°8' 8°9' 8°8' 12°13' 8°10' 7°6' 7°6' 10°11' 7°7'																			
	術後	16°13' 8°8' 11°16' 6°7' 12°9' 12°11' 11°15' 13°15' 12°12' 10°10' 8°8' 15°10' 8°10' 8°10' 12°9' 14°14' 10°12' 9°12' 8°6' 12°13' 10°12'																			
	3日	8°7' 12°7' 6°19' 7°9' 10°8' 12°10' 9°15' 3°17' 7°7' 9°11'																			
	1週																				
	2週																				
	4週																				
	6週																				
	8週																				
	8週以上																				

第 7 図

迷路内出血群の廻轉性後眼振の持続時間の成績
(実験家兎 21 例の平均値)

第 8 図

頸路内出血群の廻轉性後眼振の持続時間の成績

14表において各例ごとに少量は+多量は++以上として表示した。外淋巴腔開放を行つて固定までの生存期間の短いものは一般に水平半規管内に出血が多いが、生存期間の長いものでは蝸牛殻内に出血の多い傾向がみられるが、いずれも迷路腔に開窓することから迷路内に出血をもたらしたのであるから、蝸牛殻、前庭、水平半規管内いずれか一ヶ所に出血が多量であれば迷路内出血多量として取り扱つた。迷路内出血少量なものの10例、多量なものの11例である。迷路内出血の程度と廻転性後眼振の持続時間の関係は第14表で示す通りでこれを多量なものの少量なものの平均値をとつて図示すれば第8図のようである。「これによれば迷路内の出血多量な群では、開放後3日目まで著明な低下がみられ、第1週でも未だ低下は著明で、第2週より恢復傾向が認められる。迷路内出血少量な群では、開放後3日目第1週間目の低下は、出血多量群に比べて著しく軽度であり、第2週、第3週では殆んど術前と同程度まで恢復の傾向が見られる。

2. 漿液性迷路炎と外淋巴腔開放後の廻転性後眼振

外淋巴腔開放を行つてその後廻転性後眼振の持続時間を観察し生体固定した実験家兎59例中、迷路内に漿液性炎症が認められた実験家兎は15例である。この中で證骨脱臼で前庭被膜層を破つた1例、及び漿液性炎症による滲出物が死後変化による無構造物が識別困難な1例は除外した。この結果本群における観察家兎は13例で、いずれの例も迷路内外淋巴腔内に滲出物が認められ、3例では内淋巴腔内にも滲出物が認められる。

内耳開窓術後の迷路内の漿液性炎症に関しては、早期型漿液性迷路炎と晩期型漿液性迷路炎があるといわれる。「この実験では外淋巴腔開放後3日目までに固定した9例の実験家兎の病理組織像では漿液性迷路炎の所見が見られた例はないが、4日乃至7日で固定した12例の中で7例に漿液性迷路炎の所見が認められた。第2週乃至第5週で固定した22例では漿液性炎症の所見がみられたものは僅か1例で、第6週以後に固定した15例の中で5例において漿液性迷路炎の所見が認められ、再び増加の傾向

がある」。開放後長期間観察して固定した例では、迷路内の漿液性炎症所見が何により惹き起こされたものか不明であるが、この観察では所謂早期のものも晩期のものも一括して漿液性迷路炎として観察した。

迷路内の滲出物の程度を、強度++、中等度+、軽度+で示し、各例における漿液性迷路炎の所見と廻転性後眼振の関係を表示すれば第15表の通りで、これを図示すれば第9図の通りである。即ち廻転性後眼振の持続時間は術側刺激の場合第1週が最も低下し、それ以後恢復の傾向が見られるが、術前に比べてその低下は著明である。健側刺激の場合は第1週第2週と徐々に低下してやがて術側刺激の低下線に接近する。これを「迷路内出血群に比べると低下傾向が著明に認められる」。

各例における廻転性後眼振の持続時間が術前予め測定した生理的動揺範囲以下に低下した例数は第1週では術側刺激の場合12例中8例、66.7%、健側刺激の場合12例中4例33.3%、第2週では術側刺激の場合6例中3例50%、健側刺激の場合6例中1例16.7%、第4週では術側刺激の場合6例中3例50%、健側刺激の場合6例中2例33.3%、第6週では術側刺激、健側刺激いずれの場合でも4例中2例50%である。しかしこれを迷路内出血群の廻転性後

第 15 表

家兎番号	27	31	32	33	39	42	43	21	6	11	14	22	17
生存日数	7	7	7	7	5	5	6	26	42	54	37	54	126
迷路内出血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
前庭被膜層破損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
廻転性後眼振の持続時間	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
術前	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
術後	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
廻転性後眼振の持続時間	18	19	10	13	17	18	15	7	23	28	15	12	14
健側	18	19	10	13	17	18	15	7	23	28	15	12	14
術前	18	19	10	13	17	18	15	7	23	28	15	12	14
術後	18	19	10	13	17	18	15	7	23	28	15	12	14
廻転性後眼振の持続時間	10	11	10	11	13	14	14	8	11	14	20	13	7
健側	10	11	10	11	13	14	14	8	11	14	20	13	7
術前	10	11	10	11	13	14	14	8	11	14	20	13	7
術後	10	11	10	11	13	14	14	8	11	14	20	13	7
廻転性後眼振の持続時間	0	0	5	6	6	5	6	7	14	12	7	15	18
健側	0	0	5	6	6	5	6	7	14	12	7	15	18
術前	0	0	5	6	6	5	6	7	14	12	7	15	18
術後	0	0	5	6	6	5	6	7	14	12	7	15	18
廻転性後眼振の持続時間	11	10	0	8	12	11	7	15	13	7	15	17	18
健側	11	10	0	8	12	11	7	15	13	7	15	17	18
術前	11	10	0	8	12	11	7	15	13	7	15	17	18
術後	11	10	0	8	12	11	7	15	13	7	15	17	18
廻転性後眼振の持続時間	6	7	14	12	15	27	14	6	7	14	12	15	27
健側	6	7	14	12	15	27	14	6	7	14	12	15	27
術前	6	7	14	12	15	27	14	6	7	14	12	15	27
術後	6	7	14	12	15	27	14	6	7	14	12	15	27
廻転性後眼振の持続時間	17	15	17	15	17	15	17	15	17	15	17	15	17
健側	17	15	17	15	17	15	17	15	17	15	17	15	17
術前	17	15	17	15	17	15	17	15	17	15	17	15	17
術後	17	15	17	15	17	15	17	15	17	15	17	15	17

第 9 図

漿液性迷路炎群の廻転性後眼振の持続時間の成績
(実験家兎 13 例の平均値)

眼振の成績に比べると統計的には術側刺激，健側刺激の場合いずれの低下例数も漿液性迷路炎群の方が多しとは云えない。

多量の滲出物が迷路内にみられた例は 13 中例 1 例にすぎないが，この 1 例の廻転性後眼振は術側健側両刺激いずれの場合も共に機能が廃絶した。滲出物が内外両淋巴腔内に認められたものは 3 例で，後眼振の持続時間はいずれも著しい低下が認められる。

3. 化膿性迷路炎と外淋巴腔開放後の廻転性後眼振

水平半規管に開窓孔を作製して外淋巴腔開放を行うことにより迷路内に化膿性炎症が認められたものは，観察家兎 59 例中 12 例で，「化膿所見の最も強い時期は外淋巴腔開放後第 1 週，第 2 週，第 3 週であり，この時期に固定した化膿性迷路炎を持つ家兎は，迷路内に多量の多核白血球の著しい滲出像が見られる。第 3 週以後に固定した家兎の迷路内に化膿性炎症がみられる例は少なく，又化膿性炎症所見も極めて軽微で少数の多核白血球の滲出が主要所見である」。

各例における迷路内の化膿所見と廻転性後眼振の持続時間の関係は第 16 表に示す通りで，これを図

第 16 表

家兎番号	36	47	20	24	35	64	67	69	18	28	83	65
生存日数	2	2	5	7	7	4	10	10	21	21	35	21
化膿性迷路炎の所見	術側 健側	術側 健側	術側 健側	術側 健側	術側 健側	術側 健側	術側 健側	術側 健側	術側 健側	術側 健側	術側 健側	術側 健側
術側	-	+	+	++	++	++	+	-	-	-	-	-
健側	-	++	+	++	++	++	++	-	-	-	-	-
術側	+	+	++	++	++	++	++	+	++	-	-	-
健側	+	+	++	++	++	++	++	+	++	++	+	+
術側	++	++	++	++	++	++	++	+	++	+	+	++
健側	++	++	++	++	++	++	++	+	++	+	+	++
廻転性後眼振の持続時間	21'35"	16'15"	15'12"	10'20"	18'15"	19'21"	18'14"	14'15"	12'12"	15'15"	14'28"	15'10"
術側	12'15"	8'12"	7'8"	10'18"	15'15"	14'12"	15'15"	9'9"	12'12"	9'9"	14'16"	13'12"
健側	3'10"	2'6"	3'4"	0'0"	8'7"	0'11"	4'3"	4'5"	6'11"	-	4'7"	-
術側	2'7"	2'7"	0'0"	8'3"	0'2"	2'10"	15'22"	3'10"	-	-	-	-
健側	1'5"	3'6"	2'16"	2'16"	3'5"	-	-	-	-	-	-	-
術側	0'0"	4'8"	15'28"	6'7"	-	-	-	-	-	-	-	-
健側	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
術側	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健側	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
術側	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健側	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第 10 図

化膿性迷路炎群の廻転性後眼振の持続時間の成績
(実験家兎 12 例の平均値)

示すれば第 10 図のようである。第 10 図によれば術側刺激，健側刺激，いずれの場合も共に著しく低下し，特に術側刺激の場合は術前平均 12'' であつた

ものが開放後3日目まで平均3"まで低下し、1週間目では平均2.4"まで低下、この後僅に恢復の傾向が見られる。

各例において術前予め測定した迴転性後眼振の生理的動揺範囲から術後の迴転性後眼振の成績を検討すれば、開放後3日目では、術側刺戟の場合は全例いずれも低下し機能廃絶に近いものが多い。健側刺戟の場合は10例中7例70%の低下が見られた。第1週では術側刺戟の場合全例低下し健側刺戟の場合8例中5例62.5%の低下例が見られ、第2週では術側刺戟の場合全例低下し、健側刺戟の場合5例中3例60%の低下例であり、第4週では術側刺戟の場合4例中3例75%、健側刺戟の場合4例中3例75%の低下例が認められる。即ち「外淋巴腔開放後化膿性迷路炎を伴えば、迴転性後眼振の成績は機能廃絶の状態となるか、あるいはその低下は極めて著しいかのいずれかである。」

総括並に考按

内耳開窓術における開窓孔の位置に関しては、この手術が今日 Lempert や Shambaugh によって輝かしい成功を収めるまでにたどつた長い苦難の歴史と共に、種々の変遷を重ね諸説を生んだ Lempert は1951年に開窓孔の Osteogenesis を防ぐにはと述べて、開窓孔の位置を外科的前庭穿窿部を選び、外淋巴腔の広い腔間が得られるので大きい窓孔が作製できると主張した。Shambaugh の方法は、Lempert の主張する窓孔の位置より少し後方で、水平半規管の膨大部のところである。本邦においては柏戸⁹⁾は Lempert の外科的前庭穿窿部の位置に批判を加え、顔面神経の損傷なしには大きい窓孔を作ることとはできないとして、水平半規管の前脚前端に開窓するように主張した。いずれにしても今日我が国では水平半規管の脚部か膨大部かいずれにか開窓孔の位置を求めている。このような位置に開窓して果して前庭機能にいかなる影響をあたえるであろうか。山川¹⁰⁾は22例の内耳開窓術をうけた患者に対して前庭機能の検査を行い、聴力良好群においては平衡機能には障害は認められなかった。一般に内耳の炎症に対しては、蝸牛殻の終末装置の抵抗

は弱く、前庭や三半規管の終末装置の抵抗は強いといわれるが、水平半規管に窓を作るような外科的侵襲を加え、その結果おこる内耳の淋巴液の流動障碍、迷路内の出血漿液性炎症、化膿性炎症が果して何の程度に前庭機能に影響を与えるであろうか。開窓術における前庭機能障碍は聴力の問題の蔭にかくれて注目をひかぬといふながら、なお重要な問題である。このような問題に就て、家兎の水平半規管に開窓して外淋巴腔を開放し、開放時の特発性眼振、開放後の特発性眼振、頭位、歩行並に迴転性後眼振の観察を行い、開窓孔の位置、大きさと外淋巴腔開放による特発性眼振の關係、迷路内の出血、漿液性炎症、化膿性炎症と外淋巴腔開放後の迴転性後眼振の關係を検討し、開窓術の前庭機能に及ぼす影響に就て観察した。

開窓孔の位置並に大きさと外淋巴腔開放時の特発性眼振の關係は、第4編において開窓孔の位置と外淋巴腔開放時の特発性眼振、開窓孔の大きさと外淋巴腔開放時の特発性眼振の項で詳述した。即ち「水平半規管の脚部に開窓した場合と膨大部に開窓した場合の外淋巴腔開放時の特発性眼振の方向は、脚部が術側、膨大部が健側の傾向を見せ、膨大部脚部の移行部に開窓した場合は外淋巴腔開放時の特発性眼振の方向は一定でない。」開窓孔の位置と外淋巴腔開放時の特発性眼振の方向の關係を、前庭生理にあてはめて発現因子を説明することは困難であるが、緒方¹¹⁾並に私は、先に水平半規管の外淋巴腔内と内淋巴腔内に開窓した場合の開窓時の特発性眼振に就て、外淋巴腔内に開窓した場合は術側、内淋巴腔内に開窓した場合は健側と報告した。膨大部に開窓孔をおいた場合は、恰も内淋巴腔に開窓した場合と同方向となり、迷路刺戟の極めて強いことが想像される。脚部に窓孔をおいた場合は、外淋巴腔開放時の特発性眼振の方向は術側の傾向を示すが、健側の場合に比べて夫々持続時間並に持続期間が短い傾向がみられる。この結果水平半規管の脚部に開窓した場合は、膨大部に開窓した場合に比べて外淋巴腔開放による迷路の刺戟性が軽度であることが推察される。開窓孔の位置に関しては、従来手術容易なる位置並に大なる窓孔を作るに便利な位置からのみ論ぜられ、その刺戟性より、これを論じた報告は見

られないが、迷路に対する刺激性に就ての観点に立てば脚部を選びたい。

開窓孔の大きさに就ては、Lempert¹⁴⁾ は前庭には幅約 2mm 長さ約 6mm の窓孔が容易に 作られると述べ、Shambaugh¹⁰⁾ は水平半規管の膨大部に幅 2mm 長さ 4mm の窓孔を作ると述べている。開窓孔の大きさに就ては、将来の窓孔縁からの Osteogenesis による窓の閉鎖を考へてできる限り大きくというのが理想である。動物実験による開窓孔の大小と、人類における開窓孔の大小の問題を比較検討することはできないが、ある程度の傾向が窺い知ることができるので次に述べる。即ち「開窓孔の大きい例では、一般に外淋巴腔開放時の特発性眼振の持続時間は長く、窓孔の小さい例では、持続時間は短い傾向が見られる」。窓孔の大きい例では外淋巴腔内に出血の多い場合が多く、迷路内の出血による影響も考えられるが、出血の少ない例においてもこの傾向は認められる。又術後 1 ヶ月以上経つて固定した例の中で、迷路内に出血並に炎症所見が見られず、前庭並に三半規管の終末装置に萎縮性変性の認められない例に、外淋巴腔開放後の迴転性後眼振の成績がしだいに低下したものがある。「これ等の例はいずれも極めて大きく窓孔が開放され、外淋巴腔内に結締組織が侵入して膜様半規管を著しく圧迫している像が見られた」。窓孔の大きさに就ては、余りに小さきに過ぎて窓孔の閉鎖を招いてはならないが、余り大きくて上述の弊害を招かないように注意を要する。

内耳開窓術における術後の特発性眼振に関しては、Higuet²⁰⁾ は術後の 2 日乃至 3 日健側にむかう特発性眼振が続く。外淋巴腔と内淋巴腔の液圧の変化によつて生ずると説明、術後の特発性後眼の発現は必ずしも迷路内の漿液性炎症の診断とはならず、寧ろ聴力低下を漿液性迷路炎の指標とすべきであると述べている。私の家兎における実験では、迷路内出血の少量な例では外淋巴腔開放後の特発性眼振の見られないものが多く、漿液性迷路炎が見られた例では外淋巴腔開放後の特発性眼振が数日間持続した。「漿液性迷路炎を伴つた場合は、特発性眼振が診断上の徴候となるように思われる」。

迷路を開窓した場合の前庭機能に及ぼす影響を観察するために、迴転性後眼振の持続時間に就て検討した。水平半規管に開窓して外淋巴腔開放を行い、その後長期間にわたり迴転性後眼振を観察した実験家兎 40 例の平均値は第 3 図で示す通りで、外淋巴腔開放後第 1 週が最も低下し、第 2 週以後恢復傾向がみられるが、術前に比べて低下はまぬかれない。外淋巴腔開放後第 1 週は特発性眼振が現われる場合が多いので、詳細に迴転性後眼振を観察できない例があるが、開放後隔日に迴転性後眼振を観察できた 26 例の平均値は第 5 図に示す通りで、「第 4 日が最も低下する。これは手術による迷路の傷害の最も強い時期と想像される」。即ち外淋巴腔開放後 4 日乃至 7 日で生体固定して迷路の病理組織標本を作製した実験家兎群は第 6 表に表示した B 群である。この標本を観察すると、外淋巴腔開放後 3 日目までに固定した A 群に比べ迷路内に炎症所見を持つた例が著しく増加する。A 群に属する実験家兎 9 例の中に迷路内に漿液性炎症が見られた例はないが、比較的軽度の化膿性炎症が見られるものは 2 例であるのに比べて、B 群に属する実験家兎 12 例では、迷路内に漿液性炎症が見られたもの 7 例、化膿性炎症が見られたもの 4 例で、大半が迷路内に漿液性炎症か又は化膿性炎症が観察される。このような外淋巴腔開放後の炎症所見が第 3 図、第 5 図に示される第 1 週、第 4 日の最低値を招く原因となるものと考えられる。

迴転性後眼振の成績は、これを長期に亘り実施すれば馴れのために後眼振の機能低下が来るといわれる。正常家兎 20 例に就て隔日に 20 日間迴転性後眼振の持続時間を観察し、その平均値をとりこれを図示すれば第 2 図のようで、軽度の低下が認められるが、外淋巴腔開放群の長期観察の平均値と比べると、開放群が第 2 週以後恢復の傾向を見せるとはいえその低下は開放群に著しい。

しかし外淋巴腔開放群の迴転性後眼振の平均値が、術前に比べ低下することは事実ではあるが、総ての例が低下するわけではない。各例毎に外淋巴腔開放後の迴転性後眼振の成績を検討する場合は、術前に予めその生理的動揺範囲を決定しておかねばならない。米田⁴⁾ は家兎における迴転性後眼振の生理

的動揺範圍を報告し、20' 10迴転では8"から37"即ち29'の動揺範圍があると述べている。家兎における迴転性後眼振の成績は、以上のように可なり大きい生理的動揺範圍があるので、術前の成績から術後僅に低下しても必ずしも外淋巴腔開放による低下とはいわれない場合がある。著者の実験では、術前に1日1回、5回以上迴転性後眼振の成績を観察して、その最大値と最小値の間を以て各例における生理的動揺範圍を決定し、術後迴転性後眼振の持続時間が生理的動揺範圍以下に落ちたもの、以上に充進したもの、範圍内にあるものを夫々低下例、充進例、不変例とした。「外淋巴腔開放後の迴転性後眼振の成績では低下例か又は不変例が多く、充進例は殆んど認められなかつた。」

外淋巴腔開放後の迴転性後眼振の成績が低下した例数を各週毎に図示すれば第4図に示す通りで、開放後隔日に図示すれば第6図の通りである、第4図によれば、各週における低下例数は、術側刺戟では第1週の53.1%から第9週の28.6%の間で、健側刺戟の場合第1週の25.1%から第9週の42.9%の間であり、約束数において外淋巴腔開放後の迴転性後眼振の成績は不変である。森田⁹⁾は多数の家兎に内耳開窓術を施して迴転性後眼振を観察し、術前と比べて殆んど変化を認めないのは3例にすぎず、大多数は低下すると述べているが、「私の観察では低下例は、森田氏の実験程多数ではない。」

外淋巴腔開放後における迴転性後眼振の低下の原因は、多くの因子が考えられて総てこの実験から解明することは困難であるが、手術による迷路内の出血、漿液性炎症、化膿性炎症を重要な因子と考えることは当然のことであろう。

迷路内の出血と迴転性後眼振の関係は第4編で詳細に述べた。その成績は第14表又は第7図で示す通りで、第7図によれば開窓後第1週が最も低下し、それ以後回復の傾向をみせるが軽度の低下はまぬがれない。又迷路内出血の程度と迴転性後眼振の関係は第14表、第8図で示したが、第8図によれば迷路内出血の多量なもの程低下の傾向が見られる。「しかし迷路内出血のみられる例総てが迴転性後眼振が低下するとは限らない。」第14表の成績に

よれば迷路出血群21例中10例は不変であり、11例に低下が見られた。低下した11例は外淋巴腔開放後比較的長期観察して固定した例が多い。このような例の中には、外淋巴腔開放後短期間迷路内に炎症を経験して種々の化学療法の結果治癒した後の所謂迷路内出血の所見を観察した場合も考えられる。第3編においてB群に属する12例の家兎の中に、7例は漿液性迷路炎、4例は化膿性迷路炎、僅か1例に迷路内に炎症所見の見られない純粋な出血例が見られた。このように「外淋巴腔開放後4日乃至7日で固定された例では大半が迷路内に炎症所見が認められる。」これは、迷路内出血群が、かなりの例においてその経過中に漿液性炎症を経験することが想像される。従つて迷路内出血群として観察した例の中には漿液性迷路炎を経験した例もあるわけである。

「外淋巴腔開放後2日乃至3日で固定した家兎の迷路内には漿液性炎症の所見が認められない。」即ち開放後3日以内では迷路内には未だ漿液性炎症が惹き起されないで、迷路内出血と迴転性後眼振の純粋な関係を検討することができる。第3編においてA群に属する実験家兎は9例で、いずれも外淋巴腔開放後2日乃至3日で固定したもので、迷路内に漿液性炎症の所見が見られた例はなく、7例において迷路内出血所見のみが認められる。7例の中2例は固定時まで特発性眼振が続いて迴転性後眼振が観察できないので除外し、観察例は5例である。この5例中3例は不変、2例は術側刺戟のみ低下したが、その低下度は2例とも生理的動揺範圍以下1'乃至2"で極めて僅少である。こゝにおいて第7図を再び観察すると、「迷路内出血群の迴転性後眼振の成績は外淋巴腔開放後第1週が最も低下の傾向が見られるが、しかしA群における迷路内出血例の迴転性後眼振の成績は必ずしも低下の傾向を示さないものであるから、後眼振低下の主要な因子が漿液性炎症にあることが推測される。」

迷路内出血の半規管並に前庭の終末装置に与える影響に就ては、迷路内出血が炎症を容易に伴うと思われるので観察することはできないが、迷路内出血群21例ではこのような終末装置に変性が見られた

例はない。

迷路内の漿液性炎症と迴転性後眼振の關係は第4編において述べた。外淋巴腔開放後迷路の病理組織標本を作製できた59例中に、迷路内に漿液性炎症の見られたものは13例である。迷路内の滲出物の程度と外淋巴腔開放後の迴転性後眼振の關係は第15表に示す通りで、迴転性後眼振の持続時間の平均値をとり、これを図示すれば第9図のようである。第9図によれば、「術側刺激の場合第1週が著明に低下し、その後恢復の傾向をみせるが極めて輕微で、第4週の觀察では未だ術前に比べるとかなりの低下である。健側刺激の場合もしだいに低下し、第4週において術側刺激の低下線と接近する」。これを第8図における迷路内の出血群の場合に比べるとより低下はしているが著しい低下ではない。

第3編において外淋巴腔開放後の日数により実験家兎の病理組織像を、A群、B群、C群、D群、E群、F群、G群と7群に分類したが、迷路内に漿液性炎症の多く認められる群はB群とF群である。B群はこれに属する実験家兎12例中7例、F群はこれに属する実験家兎7例中4例で、共に半数以上迷路内に漿液性炎症の所見が見られた。これに比してA群9例、E群11例中には全例漿液性炎症をおこした例は認められず、C群6例、D群5例、G群7例中には各1例宛漿液性炎症が認められたが極めて少数である。換言すれば、「迷路内に漿液性炎症の所見の見られる時期は、外淋巴腔開放後4日乃至7日又は7週乃至8週が多く、夫々早期型又は晩期型と呼ばれている漿液性迷路炎である」。

外淋巴腔開放後4日乃至7日で漿液性迷路炎をおこした7例の迴転性後眼振の成績を観察すると、2例は不変、4例は低下、1例は機能廢絶である。不変例と低下例の迷路内所見の相違は、炎症程度の強弱による場合が多い。機能廢絶した1例の迷路内の所見は、外淋巴腔内に夥しい漿液性滲出物が認められたが聴櫛の変性は見られなかった。外淋巴腔開放後第4週以後に固定した実験家兎の中で漿液性迷路炎の所見が認められたものは6例である。この6例の迴転性後眼振の成績は、各週毎の觀察においても手術によつて殆んど不変であつたもの3例、一時廢

絶状態で後に恢復が見られたもの2例、次第に低下し遂に廢絶状態になつたもの1例である。外淋巴腔開放後次第に低下し機能廢絶状態となつた1例は、半規管、前庭、コルチ氏器の終末装置に萎縮性変性が見られ、殆んど不変3例と、一時機能廢絶状態後に恢復の2例の迷路内所見の相違は、炎症所見の相違よりも出血所見の相違が認められた。これは外淋巴腔開放後迷路内出血の多量なものは、強い漿液性迷路炎をおこして後眼振機能は低下し、化学療法の結果次第に漿液性迷路炎が輕快すると共に後眼振機能が恢復して行くためであろう。又漿液性炎症があつても、外淋巴腔開放後の後眼振が殆んど不変である例は、炎症輕微なために後眼振機能に影響がなかつたものと思われる。このように漿液性迷路炎は前庭迷路の終末装置の変性のみられない限り、外淋巴腔開放後一時著しく後眼振機能が低下した例においてもやがて恢復の傾向が見られる。

迷路内の化膿性炎症と迴転性後眼振の關係は第4編において詳述した、即ち大多数の例は後眼振機能廢絶状態となり、迷路の終末装置に萎縮性変性をみる。Shambaugh¹⁹⁾は2100例の手術例の中で2例だけ化膿性迷路炎をおこし聴能も前庭機能も脱落した例があると述べているが、今日の進歩した化学療法を以てすれば化膿性炎症を防ぐに不可能ではない。私の動物実験では59例中12例に化膿性迷路炎が見られ、そのいずれの例も迷路内に極めて多量の出血所見が認められた。手術時における出血特に迷路内出血の防止が、化膿性迷路炎の予防に最も大きい因子であることが知られるので注意を要する。

結 論

内耳開窓術による前庭機能への影響を観察するために、家兎59例についてその水平半規管の種々の部位に開窓して外淋巴腔を開放し、開放時の特発性眼振、開放後の特発性眼振並に迴転性後眼振を観察し、その病理組織標本と對比して次のような結論を得た。

1. 水平半規管の膨大部に開窓した場合は、脚部に開窓した場合に比べて、外淋巴腔開放時における前庭迷路に対する刺激性がより強い傾向が見られるので、開放による迷路の刺激性をできる限り避ける

高久論文附图(I)

写真 1

水平半規管における開窓部位。
開窓後 10 日。(矢印に開窓部位)

写真 2

水平半規管における開窓部位。
開窓後 10 日。(矢印は開窓部位)

写真 3

前庭における内外両淋巴腔内の出血。
開窓後 2 日。

写真 4

鼓室階における出血。
開窓後 33 日。

高久論文附图(Ⅱ)

写真 5

水平半規管の外淋巴腔内における出血。
開窓後 35 日。

写真 6

水平半規管の内淋巴腔内における出血と浸潤。
開窓後 21 日。

写真 7

前庭外淋巴腔内における雲絮状物。
開窓後 7 日。

写真 8

水平半規管内淋巴腔内の漿液性滲出物。
開窓後 78 日。

ためには開窓部位は脚部が適当である。

2. 外淋巴腔開放にあたり窓孔の骨新生による閉鎖を防ぐには、できる限り大きい窓孔を作るのが理想であるが、窓孔の大なる場合は小なる場合に比べて、開放時の特発性眼振の持続時間は長く、又窓孔の余りに大きい例の中には、結締織が外淋巴腔内に広範囲に侵入して内淋巴腔を圧迫し、廻転性後眼振の機能低下を招く場合がある。

3. 廻転性後眼振の術後の低下は各個例別に観察すると開窓後4日目のが最も強い。この時期が手術侵襲による反応の最も強い時期と見做される。

4. 外淋巴腔開放後外淋巴腔内には出血漿液性炎症等の所見が認められた。漿液性炎症所見は術後4日乃至7日で固定した群と術後7週乃至8週で固定した群とに多く認められた。前者は早期型漿液性迷路炎に当り、後者は晩期型漿液性迷路炎に当る。

5. 術後3日までの例では迷路内出血所見が主であつて、漿液性炎症所見は認められ難い。

6. 外淋巴腔の開放によつて、外淋巴腔内出血又は炎症所見の強いものには、内淋巴腔内にも変化が認められた。

7. 化膿性迷路炎群では廻転性後眼振の機能廃絶例が多いが、後眼振の低下例数を迷路出血例、漿液性迷路炎例、化膿性迷路炎例に就て比較すると3者の間に統計的に差異は見られなかつた。

主 要 文 献

1) 本庶正一：内耳開窓術頭部外傷による聴器障害に対する効果 (シンポジウム), 日耳鼻, 56: 1022, 1953. 2) 本庶正一：内耳開窓術, 医学書院, 1953. 3) 本庶正一他：実験的内耳開窓術の術式, 耳鼻臨, 47: 765, 1954. 4) 本庶正一他：廻転性後眼振検査の一新法, 耳鼻臨, 47: 932, 1954. 5) 高久亭他：内耳開窓術の前庭機能に及ぼす影響, 耳鼻臨, 47: 942, 1954. 6) 森田俊男：内耳開窓術の実験的研究, 日耳鼻, 59: 869, 1956. 7) 柏戸貞一：内耳開窓術技法に就て (シンポジウム), 日耳鼻, 56: 1008, 1953. 8) 高原滋夫：内耳開窓術後の迷路炎の病理並に分類, 58: 224, 1955. 9) 山川吉重：迷路開窓術後の平衡

機能, 日耳鼻, 57: 555, 1954. 10) 山岸正弥：内耳開窓術に関する動物実験的研究, 日耳鼻, 58: 601, 1955. 11) 堀口申作：内耳開窓術その適応症に就て (シンポジウム), 日耳鼻, 56: 995, 1953. 12) 橋本泰彦：内耳開窓術手術が内耳に及ぼす影響に関する臨床的並に実験的批判 (シンポジウム), 日耳鼻, 56: 1016, 1953. 13) Passow, Barany, Jenkin: Referred from Beyer; Die Operationen am Ohr. 265, (1938) 14) Lempert: Symposium on fenestration of labyrinth; Lempertfenestra nov-ovalis operation for the restration of serviceable anaided hearing im patient with clinical otosclerosis, Arch. of Otol., 46: 478, (1947) 15) Lempert et al.: Osteogenesis following fenestration of the vestibular labyrinth of the rhesus monkey. Arch. of Otol., 46: 512, (1947) 16) Lempert: Perilymph; Its relation to the improvement of hearing which follow fenestration of the vestibular labyrinth in clinical osteosclerosis. Arch. of Otol., 50: 377, (1951) 17) Holmgren: Zur Chirurgie der Osteosclerose. Acta Oto-Laryng. 24: 271, 27: 338, (1939) 18) Sourdill: New technic in the surgical treatment of sever and progressive deafness from osteosclerosis. Bull. N.Y., Acad. Med., 13: 671, (1937) 19) Shambaugh: Fenestration opration for otosclerosis experiment indestgesions and krinical observations in 2100 operations over a period of ten years. Acta Oto-Laryng., Suppl, 79, (1949) 20) Higguet: Referred from Walter Schnetz: Chirurgische Behandlung von Schwerhoerigkeiten. Riegerschen Unive-rsitaetsbuchhandlung, Muenchen, 86, (1953)

摺筆にあたり、御指導を賜つた本庶教授に深い謝意を表すると共に、病理組織標本の観察に就て種々の御教示を戴いた長崎大学医学部松岡茂教授に深謝致します。

原稿到着 = 昭和 32. 3. 25 日