CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL STUDIES OF CHRONIC SUPPURATION OF THE TEMPORAL BONE ACCOMPANIED WITH SEVERE HEARING LOSS

By
K. YASUDA

Niho Oto-Rhino-Laryngological Institute, Yokohama
(Director: S. Niho, M.D.)

The author reports clinical and histopathological studies in seven cases with chronic suppuration of the temporal bone accompanied with severe hearing loss. The specimens examined were taken from each part the temporal bone at the radical or conservative radical operation (S. Niho) for osteomyelitis of temporal bone.

(1) In recent years, since the advent of chemo-antibiotic therapy, the findings of the ear drum of patients with chronic suppuration of the temporal bone are less significant compared with histopathological findings of the specimens taken from the temporal bone. Of most importance are X-ray findings of the temporal bone especially in infants.

(2) Among the many reported methods of X-ray study of the temporal bone, Stenver's position is the best, and films taken in this position revealed more or less manifest pathological changes in all of these seven cases.

(3) In prevention of chronic mastoiditis and petrositis it is necessary to eliminate disorders in the nose and throat, performing tonsillectomy and adenoidectomy even if the patients are only one or two years of age. It is also necessary to perform attico-mastoidectomy or conservative radical operation for osteomyelitis of temporal bone, even in infants.

(4) In such severe cases in young children, chronic pneumato-cellulitis, osteitis and osteomyelitis are observed histopathologically. However, in long standing cases especially these in whom more than twenty years had elapsed, chronic pneumato-cellulitis is very rare and chronic osteitis and osteomyelitis are demonstrated.

In the soft tissue, thickening of the epithelium, edematous swelling of subepithelial and periosteal layers, infiltration of polymorphnuclear leucocytes, histiocytes, plasma cells, round cells and sometimes eosinophile leucocytes, granulation tissue and its organization, etc. are observed.

As histopathological changes of the bony tissue removed at the operation of the temporal bone, the following findings are revealed: marked degeneration, for example, pycnosis or disappearance of the bone nuclei, indistinction or disappearance of bone lamellae, appearance of abnormal lamellae, chemical absorption of the bone (halisteresis), bone necrosis, absorption by osteoclasts (lacunar absorption), absorption by granulation tissue, widening of bone cavity, another type of porosis, widening of Haver's canaliculi and other bone canaliculi, increase of bone canaliculi in a broad sense and of the marrow tissue, osteoporosis, circulatory disturbance of fluid, edema and fibrosis in the bone canaliculi in a broad sense or in the marrow tissue, appearance of osteoblasts, bone proliferation and appearance of osteoid tissue, etc.

Summarizing the above mentioned findings, bony damages may disturb the healing of soft tissue, and circulatory disturbances of fluid in soft tissue may disturb the healing of the bone tissue.

(5) As a result of existence of these pathological changes around the labyrinth for a long time, development of osteoporosis of the bony capsule of the semicircular canals with eventual labyrinthitis has been demonstrated. In the author's opinion similar pathological processes may occur sometimes in the cochlear capsule and in such incidences circulatory disturbances of fluid or inflammatory changes may have some influence on the cochlear function, which may become gradually less active and conductive deafness may become mixed deafness.

Accordingly, for restoration of the cochlear function, it is of importance to eliminate such damaged bone tissue around the cochlea by performing the radical operation for osteomyelitis of temporal bone recommended by S. Niho.

慢性側頭骨炎による高度難聴者の臨床並びに 側頭骨の病理組織学的研究

横浜 仁保耳鼻咽喉科（指導者：医学博士 仁保正次）

医学士 安田 和 秀
ヤス タ カズ ヒデ

目 次

第1章 緒 言	言
第2章 症 例	例
第3章 総括並びに考按	
第4章 結 語	語

第1章 緒 言

近時化学抗生物質の進歩により、これ等の薬剤の無かつた当時の華やかな急性乳様突起炎の手術は殆ど無くなつてしまつた。しかしこの反面には、発熱、耳痛等の患者にとって耐え難い苦痛は隠蔽され、恰も臭いものに蓋式の治療が行われ、却つて聴力改善のための手術の時期を失っている感が深い。

外界よりの音のエネルギーの波は伝音系を経て内耳に入り、動力のエネルギーは化学エネルギーとなり、更に電気エネルギーに変化されて大脳に伝えられる。即ち聴覚に就いて最も重要なのは内耳であり、次が伝音機構である。近時伝音機構の研究の発達之余り、内耳が疎かにされている感が深い。

耳管を介して鼓室に感染が起り、側頭骨含気蜂窠炎となり、更に側頭骨炎、側頭骨骨髓炎となり、やがては含気蜂窠、側頭骨の炎症は慢性化し、鼓膜所見も穿孔し、あるいは無穿孔の儘で長期の経過を辿る。化学抗生物質の出現は、これ等の薬剤の無かつた時代には鼓膜に穿孔し排膿されたものも、無穿孔あるいは側頭骨の病変がそ

れ程改善されない中に穿孔が閉鎖し、鼓膜は慢性穿孔性とならなくても側頭骨の組織学的所見は慢性化してしまう。レ線学的にはこれを Masking effect と称している。

即ち鼓膜所見では治癒、中耳加答児、又は中耳炎残胎症、レ線所見では Masking effect、組織学的には慢性側頭骨炎と同一疾患で色々の立場から種々の診断が下される。更に後述の乳幼児では聴力の立場からストマイ難聴あるいは聾の診断も下される。

このストマイ難聴の診断は聴力に関しては死刑の宣告に等しく、他の総ての原因的疾患を鑑別除外してからでなくては下してはならない事は、後述の症例により自ら明らかであろう。

聴力の経過に就いては初め伝音系が侵され、その後急性増悪を繰り返す中に内耳も侵され、混合難聴となり、更に症例の如き高度難聴となる。

次に急性あるいは慢性側頭骨炎即ち乳様突起炎及び錐体炎の骨病理に就いては Scheibe²⁾, Neumann³⁾, Lange⁴⁾, Krainz⁵⁾, Tobeck⁷⁾, Richter⁹⁾, Eckert-Möbius⁶⁾, Mayer⁸⁾, 二階堂¹⁴⁾, 小田(醇)¹⁵⁾, 高原(高)¹⁶⁾, 猿渡¹⁸⁾, 仁保(正)¹⁷⁾ 19) 20) 21) 22) 27) 29) 30), 平野¹⁹⁾ 21), 仁保(三)²¹⁾ 24) 27) 46), 吉尾²⁶⁾ 47) 48) 50) 51), 井沢²⁸⁾, 永井²⁴⁾, 石川²⁵⁾ 26), 高畑⁴⁰⁾, 吉田⁴⁵⁾, 佐野⁶⁰⁾ 等枚挙に遑がない。しかしながら従来の骨病理を翻つて

みるに骨新生破壊が主に論ぜられ、骨組織そのものは等閑に附されてきたかの感が深い。而して斯かる変化も急性期を論ずる場合は未だよいが、変性、新生、破壊が数年、10 数年あるいはそれ以上も繰り返された慢性症を論ずるには極めて不十分である。

今近世病理解剖学³⁰⁾を開いて我々に必要な部分を簡単に拾ってみると、骨の消耗に際して起る組織的变化として、(1) 窩状吸収及び平滑萎縮、(2) 穿孔管(一名 Volkmann 管)、(3) 脱灰(Halisteresis)。急性骨炎、骨髓炎の項では骨質内の血液循環が障碍され、海綿質及び硬骨質の分子的崩壊のために骨傷状(Kariös)となる。慢性の経過をとる時には周囲骨膜に強い骨質の増生をきたし甚だ不正に肥厚する。又慢性線維性骨膜炎は骨膜が強い線維性の肥厚をきたし、骨形成性骨炎(Ostitis ossificans)及び骨硬化症(Osteosklerose)では骨髓は線維様となり所謂線維性骨髓炎性の変化をきたし、これが骨組織に移行するもので、同時に又従来の骨梁表面に造骨細胞が増生し骨新生をきたす。このために骨質は甚だしく緻密となり海綿骨が硬骨質と同様な観を呈し、Havers 管(以下ハ管)も骨質の新生により充塞され益々緻密となる。これを骨硬化 Osteosklerose と称し、高度なものを象牙質様変性(Eburnation)と称する。畸型性骨炎(Ostitis deformans)の項では骨質は不規則広汎性に吸収され、慢性骨髓炎の状態で骨様組織が増生し、石灰を含まない部分が多くなる。この場合の骨の吸収は窩状吸収、穿孔管の形成、石灰脱失による。組織的特徴は骨質の Mosaik-struktur で骨層板は不規則地図状の接合質によつて Mosaik 状をなす。又線維性骨炎は変化は骨内膜に始まり、骨質は吸収されて漸次結合質によつて置換され、僅少の骨梁を残して結合織性骨質を形成する。

しかしながら後述の組織的变化は更に複雑で、これ等の記載のみでは到底表わす事はできない。又斯かる変化が所謂慢性中耳炎で側頭骨の現われに事は全く記載されていない。

Eggston, Wolff の Histopathology of the E. N. T. を見ても変性としては Necrosis of bone, 骨破壊としては破骨細胞によるもの及び破骨細胞によらない化学的吸収(Halisteresis)、造骨細胞による新生、石灰の沈着、類骨組織の出現、これ等により元の形より更に添加が強くなり、含気蜂窠の少ない緻密形の乳様突起となる。即ち Halisteresis が極めて広義に解されているが、慢性側頭骨炎の骨病変の記載には極めて不十分であ

る。

そこで著者はヘマトキシリン・エオジン重染色(以下ヘ・エ重染色と略す)、ワンギーソン染色(以下ワ染色と略す)のみでは不十分で、決定不能の所見も多々あるが、その所見の儘を言葉に表わして以下の記載を行った。含気腔被覆組織の組成の決定も未だみない今日であるので御了承を請う次第である。以下その代表的なものに就いて述べて見度いと思う。

先ず従来の炎症の概念を炎症反応とすれば、炎症反応は血管を介して現れる。従つて骨組織の血管はハ管迄しかないから厳密な意味では骨炎はなく、その間質の軟部組織の炎症反応、殊に骨膜層、骨内膜層に骨新生破壊等が現われたものを骨炎と呼んでいる。

急性側頭骨炎あるいは骨髓炎においては含気腔被覆組織の骨膜層、ハ管の骨内膜層、骨髓腔の骨内膜層にこれ等の変化が現れる。これ等は元来が一連のものである。

仁保¹⁸⁾(1942)は急性側頭骨含気蜂窠炎をその程度により次のように分類した。即ち

- (1) 急性加答児性含気蜂窠被覆組織炎
- (2) 急性化膿性含気蜂窠被覆組織炎
- (3) 急性化膿性含気蜂窠炎
- (4) 急性限局性骨炎あるいは骨髓炎
- (5) 急性広汎性骨炎あるいは骨髓炎
- (6) 急性進行性壊死性骨炎あるいは骨髓炎

である。この(3)、(4)、(5)、(6)は骨膜層、骨内膜層の侵される部位及びその範囲により決定されるものである。

所が慢性症となると骨の營養、体液循環を司る腔は含気腔、骨髓腔、ハ管のみではない。大なるものは含気腔、骨髓腔、これ等の肉芽あるいは浮腫性の組織で充たされたもの、あるいは骨破壊腔である。中位のものはハ管が骨破壊により拡大されたもの、あるいは大なる含気腔、骨髓腔、これ等が骨増殖により縮小されたもの、あるいはこれ等の腔の突起を横に切れば中位の腔となる。この正常あるいは急性期では余り見られない所見が極めて多く見られる。これは本論文では骨小管とした。広義にはハ管を含めて病的骨組織の營養、炎症修復のための体液循環を司る小管を骨小管と総括した。これは組織標本上では以上のものそれぞれの区分が不可能であり、却つて誤謬の原因となるからである。従来の骨小管と少しく誤られ易いが、従来の骨小腔に附随する骨小管は骨細管と改名されている。

ハ管に就いても長年月間破壊新生が繰り返された慢性症においては、正常のものよりも遙かにその数が多い。元来扁平骨においては骨膜の血管より栄養を受けるから、ハ管も長管骨程には必要でない。しかし慢性症においては栄養を司る他に、骨病変の修復のための血行が必要であり、従つてその数が多い。しかし反対にハ管が新生骨で埋められて消失した所見も見られる。これは骨が緻密化し、それ程の血行が必要でなくなった所見である。

次に骨の変化の概略を述べよう。先にも述べたように骨の変化はその栄養を司る周囲あるいはその内部の軟部組織の血行障害、体液循環障害により起る変性が主である。即ち第1は染色性が変化して奇麗にエオジン染色されず、ヘマトキシリンにも染まるようになる。同時に核に濃縮、偏在、消失等の変化が起る。次は骨層板の紋理が不鮮明となり、あるいは消失する。これと共に骨小管、ハ管の内壁がヘマトキシリンに濃染する場合もある。又慢性症においては時代の古い骨に隣接して時代の新しい骨が存在し、その境界の接合線はヘマトキシリンに濃染する。これは多くは鋸歯状の線として現れる。新旧の差は変性の度合で判る。これの高度のものがMosaik-strukturである。

更に変性の甚だしい時は核は概ね濃縮、消失し、骨小腔は拡大し、骨層板の染まりが悪くなり、中間の部が却つてヘマトキシリンに染まり、異常紋理が現れる。更に甚だしい時は骨質は融解し、ヘマトキシリンに染まる線維様物質のみが残る。これを線維様化と命名した。骨が結合織により置換される Ostitis fibrosa とは異なるものである。

又核が消失し、骨小腔が拡大し、更に2-3の拡大した骨小腔が融合し、骨が孔だらけになる所見も見られる。この腔に血管、肉芽が侵入すれば Volkmann 管のようになるであろう。又その所見が慢性化すれば先に述べた骨小管の所見を呈する事もあり得ると考える。この所見を多孔質化と命名した。従つて Osteoporose とは異なるものである。

層板間あるいは時代の異なる新旧の骨の境の接合質が変化し、骨が極めて脆くなり、これ等が離れてばらばらになった所見が見られた。これは横浜医大病理の吉村教授に伺つたが、標本作成中の変化でない。即ち手術時に加えられた鑿、鋭匙の機械的刺戟により変化した接合質の部で離断せられたもので、これを脆弱化と命名した。この離断所見は新旧の骨組織間に著明である。

斯かる新生破壊の繰り返してある点よりして仁保¹⁹⁾ (1942) は側頭骨炎(所謂広義の中耳炎)を提唱し、慢性側頭骨炎に就いてもレ線学的にあるいは組織学的に日本耳鼻咽喉科学会総会、あるいは同関東地方会において10数回も述べた。

最近吉田⁴⁵⁾ は慢性中耳炎の骨病理に関する研究において、(1) 骨の Umbau は70例中全例に認められた。(2) 骨新生像は70例中69例に、骨破壊像は55例に認められた。(3) 骨の Lamelle, Kittlinie の変動に注意する事。(4) 骨病変の主体を為すのは骨新生像で、密のものが多く、Ostitis ossificans に該当すると述べている。

又最近重野⁴¹⁾ は慢性中耳炎と Pneumatisations-hemmung の関係に就いての組織学的研究と題して乳様洞周囲の蜂巣の組織学的研究を述べているが、これは含気腔学説に捉われ過ぎている。

以上の見地より以下症例に就いて記載して見度いと思う。

第2章 症 例

症 例 1

患者：岡○よ○。42才。♀。会社員

初診：昭和30年5月20日

主訴：両側高度難聴

既往歴、家族歴：特記すべき事項なし。

現病歴：両耳共に耳疾患に罹患した記憶はなく、又耳漏も一度も認めなかつたが、約20年前より左耳の難聴を覚えるようになり、その後左耳鳴(強くカーン、カーン)、頭重、肩凝りあり、頭重のひどい時は眩暈、嘔気を催した。某医を訪れ、左下甲介切除、左通気を1ヵ月受けたが効なく、鼓膜が混濁しているから諦めるより仕方がないと云われ、治療を中止したが、その後全く響となつてしまった。

右耳は10年前より漸次難聴をきたし、それと共に軽い耳鳴(カン、カン)が出現し、感冒毎に強さを増し、約1年前頃よりは約1米半離れると殆ど会話不能となつた。昨年10月頃より感冒を繰り返し、その度毎に難聴は高度となり、5月13日には右耳は閉塞したようになり、殆ど聞えなくなつたので、附近の某医を訪れ1週間通気を受けたが更に悪化し、1週間目には言語による意志疎通は全く不能となり、本院を紹介されたものである。(なおこの病歴は左手術後50日、右手術後35日目に会話が可能になつてから取つたものである)。

初診時耳科的所見：左鼓膜は弛緩部に穿孔の痕跡が

あり、その他は黄色を帯び肥厚混濁している。弛緩部に概以前の穿孔を思わせる陥凹が認められる。その他急性炎症症状は全く存在しない。右鼓膜は全段に肥厚しており、光沢を欠き、少しく黄色味を帯びている。しかし右鼓膜穿孔により滲出物の有無を検したが、滲出物は陰性、僅かに抵抗があつた。弛緩部には左側と同様に穿孔を思わせる陥凹がある。即ち左側は明らかに乳幼児期に慢性側頭骨炎に罹患し、その後所謂中耳加答児様の变化を繰り返し、その間内耳にも侵襲が加わつて、遂に殆ど聾となり、右耳は化膿性慢性側頭骨炎か、所謂中耳加答児より慢性側頭骨炎に移行したかどちらかであろうと考えられた。

Stenvers レ線写真所見： 左耳は典型的な危険性側頭骨を呈し、乳様突起は小さく、乳様突起部上陵は強く陥凹し、弓状隆起の頂上迄二段となつて、弓状隆起は突出している。これは内耳等が先にできてその後で發育する乳様突起が慢性乳様突起炎のために發育できないために起る現象で、所謂危険性側頭骨を想起させ又一方には乳幼児期に相当な側頭骨炎に罹患した事を示している。乳様突起部は骨髓炎様、錐体乳様洞周囲部、内耳道と上半規管の間、及び錐体尖も骨髓炎様である。

右耳も同様の危険性側頭骨で乳様突起上陵より弓状隆起の頂上までは階段状となつている。乳様突起尖端に蜂

窠の融解した部分が認められ、乳様突起より迷路周囲部にかけて不鮮明及び骨融解の交錯した所謂骨髓炎様の所見を呈している。

聴力検査所見： 耳の傍でどんな大きな声を出しても人間の言葉は聞えない。しかし右耳の方は音だけは少し聞えるらしい。

昭和30年5月24日左側頭骨炎根治手術＋迷路開窓術を行い、6月8日右保存的側頭骨炎根治手術を行った。

左耳手術所見： 型の如く外耳道上棘後方より鑿開を行うに、蜂窠は一部肉芽により充たされ、骨増殖のために海绵骨様を呈している部分もある。闊膈蜂窠、隅角螺窠の一部には肉眼的には被覆組織の浮腫と認められる、比較的良好なる蜂窠も認められた。最も甚だしかつたのは深部闊膈蜂窠より仁保・吉尾の後蜂窠列より後頭顆に達する病竈で、一部海绵骨様にも見えるが、明らかに嚢腫と認められる部分もあつた。該部を後頭顆まで搔爬するに、後頭部痛、肩凝り、頸部の運動障害は全く消失した。乳様洞、上鼓室は被覆組織は腫脹、粘液性滲汁を認めたが、鼓膜所見より疑われた仮性真珠腫は認められなかつた。乳様洞内壁より錐体乳様洞周囲部を搔爬した。所々に小蜂窠を有する海绵様罹患骨を搔爬し、三半規管を露出した。橋部を除去、耳小骨を除去し、更に外耳道前壁を除去し鼓室を搔爬した。鼓室被覆組織は浮腫性、肉芽状を呈し、粘液性膿の滲溜を認めた。耳管鼓室

開口部外側骨壁を除去し、更に Kopetzky-Almour 法で錐体尖に入つた。錐体尖も海绵様で、鋭匙で搔爬する際の抵抗は極めて軟らかく明らかに骨罹患を示していた。更に仁保・平野式により錐体尖を除去した。頭重、肩凝り等は非常によくなつたらしいが、聴力は余り変化がないので開窓術を施行した。水平半規管の前方膨大部の直ぐ後ろに開窓し、膜様迷路を露出した所、激しい眩暈発作を生じ、耳の傍で大声で嗚咽れば返事ができるようになった。Schambough 鉤により骨窓縁を拡大し、外淋巴腔を開放

図1 第1例術前オーディオグラム

し、耳後下部頸部皮膚より小皮膚弁を採取し、窓部を被覆し、更にセロファンを置いてガーゼを充填、耳後創は一期に縫合して術を了した。

右耳手術所見：左耳同様やはり危険性側頭骨であった。左耳に比べ全体に蜂窠被覆組織の炎症程度は軽いように思われたが、狭少な闊隔蜂窠は骨が軟らかく、乳様突起尖端では含気蜂窠被覆組織内の肉芽、齶膿及び骨の死骨様化が著明となっていた。深部闊隔蜂窠を鋭匙で搔爬していると海绵状の軟らかい骨が後頭顆まで続き、明らかに齶膿の認められる部分もあった。乳様洞及びその周辺では、骨は脆くなっており、小蜂窠に粘膜の浮腫が認められた。乳様突起天蓋、乳様洞天蓋は広範に硬脳膜を露出し、S 状静脈洞も同様に露出した。更に乳様洞迷路周囲部を水平半規管、後半規管を包む硬い奇麗な骨壁を露出するまで除去した。上鼓室から耳小骨連鎖にかけては、疑われた仮性真珠腫の形成はなく、肉眼的に左側に比べ比較的良好であつたのでこれを保存した。従つて橋部は耳小骨、鼓膜の機能の保全、外耳道の構造の保持のために保存し、外耳道後壁の外側半分を除去するに止めた。患者は約 2m 程離れた所より名前を呼ばれると返事をするようになったので、術創内にガーゼを充填して一期縫合を行った。

病理組織学的所見：手術時に側頭骨各部より採取した組織片を軟部と共にツエロイジン包埋、ヘ・エ重染色及びワ染色により検索した。

左 耳：

(1) 外耳道上棘：最も著明なのは骨の変化で、骨層板の紋理は殆ど消失し、通常の骨組織よりはヘマトキシリンをよく取り、骨の脆弱化が著明で、ばらばらになつた所見が見られる。骨小腔は拡大し殆どの核は消失している。次に著明なのは骨小管の拡張で骨内膜はやゝ肥厚し、ヘマトキシリンに濃染し、その中心には血管が見られ、その他内腔は浮腫性の組織がこれを充たし、Fibrosis が認められ、諸所に脂肪腫も見られる。細胞浸潤は殆ど認められず、鬱血は極めて軽度である。更に造骨細胞あるいは破骨細胞も認められず、全く治癒破壊機転に乏しい。

(2) 乳様洞の外側壁：骨変化はほぼ同様であるが拡大せる骨小管、骨髓腔、含気腔等は破壊吸収せられて肉芽により置換され、通常は小含気腔が再生されて来るが、本例には全くそれが認められず、骨内膜は線維性のヘマトキシリンに濃染する被膜となり、血管は拡張し、浮腫、Fibrosis の認められる組織がその空間を充たす。

一部に残存あるいは再生せられた脂肪腫があり、一部は殆ど癒痕化した部が見られる。(1)よりは全般にやゝ充血している。これが手術時海绵骨様として認められた組織と思われる。

(3) 乳様突起尖端：骨は一部冷も筋線維の如き紋理を現わし、一部には骨吸収が著明で、一部にはヘマトキシリンに濃染する線維性組織に類骨細胞を混じた骨膜組織より筋組織に移行している。

(4) 隅角蜂窠：変化は更に甚だしく骨は多孔質化を示している。一部線維性癒痕状となつた軟部組織の中に細長く立方状又は円柱上皮様の小含気腔が見られる。しかし含気蜂窠内の炎症性変化は極めて軽度である。一部に脂肪腫も見られる。全般に(1)、(2)より更に鬱血性である。

(5) 鱗部蜂窠：骨の変化は(4)とほぼ同様で、核は殆ど消失、多孔質化を示し、含気腔、拡大せる骨小管腔、骨髓腔には Fibrosis が強く、結合織で充填置換されている。この癒痕様線維性組織内の血管に鬱血の認められる部分もあるが、細胞浸潤等の炎症性変化は極めて乏しい。

(6) 乳様洞天蓋：骨変化は(2)、(4)とほぼ同様で一部に脂肪腫を認め、一部には全く死骨化した骨組織片も認める。骨破壊腔を血管、Fibrosis を示す結合織が充たしている所見も見られる。

(7) 闊隔蜂窠：骨組織は全くぼろぼろの孔だらけとなり、骨紋理が不鮮明化し、染色性が変化して通常よりヘマトキシリンをよく取り、骨小腔は拡大し、その腔内は既わ空虚で、濃縮せる核が偏在するものもある。軟部組織は概ね緊密な結合織で、骨内膜に相当する部分はヘマトキシリンに濃染し、内に拡張せる血管を有し、又脂肪腫に変化している部分もある。上皮細胞あるいは含気腔と考えられる所見は全く認められない。

斯かる所見が手術時に見られる海绵骨様組織で、通常同所見と見られる急性期の骨破壊の進んだもの、慢性期の破壊修復の繰り返されているものと少しく趣きを異にしている。

(8) 鼓室天蓋：この標本ではかなり大なる含気蜂窠を認め、その上皮細胞は円味を帯びて厚くなつており、1—数層に増殖肥厚している。含気腔内にはかなり細胞成分に富んだ滲出物を認める。被覆上皮組織は高度の浮腫を呈し概ね 10 数倍に肥厚しているが、急性炎症性変化は極めて軽度である。細胞浸潤は極めて軽度であるが、小円形細胞、形質細胞、組織球が見られる。骨膜層

はヘマトキシリンに濃染している。骨小管腔、あるいは骨破壊腔の所見は前とはほぼ同様であるが、骨質は極めて脆弱となり、手術時の変化と思われるがばらばらになっている。一部には極めて高度の脱灰が見られる。又一部には高度の死骨化が見られる。

(9) 外耳道後壁：骨の多孔質化が極めて強い。骨髄腔及び骨小管腔は浮腫性の結合組織により又は脂肪組織により充たされ血管腔の狭少が見られる。骨の一部は甚だしく脱灰化され線維様化して本来の骨の様相を全く失いつつあり、壊死骨に移行する部分が認められる。(6) とほぼ同様である。

(10) 外耳道底：含気蜂窠上皮細胞は立方形で背が高くなり、一部では上皮下に高度の円形細胞浸潤を認める。この上皮細胞は下鼓室の上皮細胞である。この部は鬱血、多形核白血球の浸潤がかなり見られ、急性炎症が甚だしい。含気腔内にはかなり細胞性分に富んだ滲出物が見られる。骨は甚だしい多孔質化を呈し、一部ではハ管を中心として比較的新しい骨が新生されその周囲は脱灰化され、一部は線維様化している。即ち世代の古い骨と比較的新しい骨とが交錯し、骨の新生破壊が繰り返されている事を示している。一部に外耳道皮膚を認めるが、かなり古い炎症性変化を認める。

(11) 外耳道前壁：骨の新生、破壊の変転は甚だしく、骨小管を中心としてあるいはハ管を中心として新生した骨は恰も病痕珠腫様の形をしてぼろぼろになっている。骨内膜層はやはり肥厚し、ヘマトキシリンに濃染し、内腔は浮腫及び Fibrosis が強く、一部は脂肪髄となつている。一部の血管には鬱血が見られる。

(12) 耳管外側骨壁：骨の変性は極めて高度で脱灰化は甚だしく、大部分の骨が線維様化している。骨は全く新生治癒機転に乏しい。

(13) 前蜂窠列 (Kopetzky-Almour 法)：骨の変化は比較的軽度で核の消失、紋理の不鮮明化を認めるが、前述のような高度の変化は認められない。

(14) 錐体尖 (仁保・平野法)：側頭葉を挙上して剔出した錐体尖を含む錐体前面骨である。変化は鼓室天蓋とはほぼ同様である。一部にかなり大きな赤色髄を有しているが又一部には脂肪髄も見られる。

(15) 解剖学的錐体尖：変化は鼓室天蓋、錐体尖 (仁保・平野法) と同様で、骨小管の拡大、鬆疎な結合組織による修復が著明である。

右 耳：

(1) 外耳道上棘：ばらばらになつた骨組織は紋理が

消失し、骨の染まりが非常に悪く、薄くヘマトキシリンをとつている。この所見はすでに左耳で述べた如くで、接合質が変化し、殊に時代の異なつた骨質を接合している部分が離断されている。骨小管は拡大しており、核は殆ど消失をきたし、一部残存せるものは骨小管附近に見られ、濃縮等の変化が認められる。骨小管腔には Fibrosis が認められる。この部には通常は骨髄腔は認められないのであるが、本耳では広義の骨小管の他に骨髄腔が大小とりまぜて非常に多く、脂肪髄が多い。赤色髄も認められる。ハ管も極めて数が増加している。これ等の骨内膜は肥厚しヘマトキシリンに濃染している。急性炎症症状は殆ど認められず、造骨細胞、破骨細胞も殆ど認められない。骨小管、ハ管内の血管は周囲の浮腫により圧迫され、血管内は赤血球に乏しい。

(2) 乳様洞の外側壁：骨の変化は(1)と大凡同様であるが、骨組織の線維様化している部分があり、更には脱灰化が著明で(1)より死骨化の程度が強くなつている。骨小管腔には浮腫が強く、Fibrosis と共に血管は高度に圧迫せられ、内腔には赤血球を殆ど認めない。骨髄腔もほぼ同様の所見を呈している。含気蜂窠被覆組織も高度の浮腫を呈し、鬱血、細胞浸潤は殆ど認められず、各所に淋巴管が嚢状に拡大している所見が見られる。厚さは通常の20~30倍で、上皮細胞も円味も帯び、背が高くなつて1~数層に増殖している。含気腔内には滲出物は認められない。通常の含気蜂窠炎では腔内の所見、上皮下層の変化が強いが、この関係が逆になつている。

(3) 乳様突起尖端：骨と骨髄腔が混じり、入り乱れており、骨組織はぼろぼろの多孔質化となり、極めて染色性が悪く紋理は認め難く、一部は骨が線維様となつており高度の脱灰化と考えられる。骨周辺の部分には細胞浸潤は極めて軽度である。

(4) 隅角蜂窠：骨組織の染色性は最もよく、ハ管内の血管、骨髄腔内の血管には鬱血を認め、骨髄腔内には骨様組織を認める部もある。一方には古い線維様化した骨、ぼろぼろに多孔質化した骨も見られる。骨の脆弱化と見做される離断所見は骨小管を中心として行われている傾向にある。

(5) S 状洞壁：骨の変化は(1)と同様で骨の紋理の不明瞭は標本全体に認められる。更に多孔質化している部分が混在し、核の消失が強い。骨髄腔は非常に多数に見られ、脂肪髄でその周辺の一部に器質化された部も見られる。赤色髄は認められない。

(6) 闊顎蜂窠: (3)と同様であるが程度がやゝ軽い。乳様突起尖端もこの部も骨髓腔, 殊に脂肪髓が極めて多く, 通常の含気蜂窠になるべき部分が骨髓腔となつていように見られる。

(7) 後頭顆: 該部は骨髓の存する部で赤色髓, 脂肪髓が多量に存在し, その中の骨組織は薄くぼやつとヘマトキシリンをとり, 骨の線維化が著しくなり, 骨質が離断されている部分もあり, 死骨化が最も強い部分である。患者の後頭部痛, 肩凝り, 頸部運動障碍等が十分に想像できる所見である。

術後経過: 左耳手術後絶対安静を取らしめた。手術後の処置は成るべく最小限に止め, 5日間は耳内, 耳後創に抗生剤を注入するに止め, 6日目に創内よりの滲出物が多くなるに及び, 耳後創のガーゼ片を毎日小量づゝ抜き去った。術後の聴力は自覚的には著変なく, 本人は耳内ガーゼのためかわからないと云っていた。左耳術後15日目に耳内より開窓部に当てゝいたセロファンを取り除き, 移植皮膚片の固着を確かめた。左耳を手術してからも安静につとめさせ, 18日間に及んだ。右耳は術後4日程は聴力が術直後の状態に保たれていたが, 5日目より滲出液のため急激に低下した。患者の不安(聞えるようになるかどうかの)は非常に強かつたが, その後創内よりの滲出液の少なくなるにつれ, 徐々に上昇して行つた。この間耳鳴と, 眩暈の両者に対して, 7%重曹

水 60cc にビタミン B₁ 100mg を加えた混合静注を40回行つた。右耳手術後33日目には約 4.5m 離れて少し大きな声を出すと返事をするようになり, 左耳は術後48日目に反対耳に Noise 70 をかけ約 1.5m で応答。右耳術後36日目にラジオを聞かせた所, 約 3m 離れ, 音量大にして音楽のリズム等が良く聞え, 女性アナウンサーの話がわかる。左耳術後61日目には創内の上皮化せる部分が緊張してき, 歩行も慣れたので退院せしめた。左耳術後87日目には頑固であつた耳鳴が非常に小さくなり聴力が更に上昇したと云つていた。術後半年目に来院した際には, 右耳は 2~3m からの普通の会話には殆ど不自由なく聴き取れ, 左耳は耳の正面からは話す声が聞えるので, 勤務できるようになつたと喜んでた。現在は術後2年になるが補聴器を使用せずに元の会社に勤務している(図2参照)。

第1例左耳総括: 本耳の鼓膜所見より診断すれば中耳炎残胎症, あるいは慢性中耳加答児であり, そんなに聞えない訳はないと云われる鼓膜である。オージオグラムより診断すれば高度の混合難聴, あるいは殆ど聾である。レ線より診断すれば慢性側頭骨骨髓炎である。その組織学的所見より診断すればレ線学的診断が正しい。鼓膜所見とオージオグラムのみでは神経難聴による聾で片付けられてしまう。

この高度難聴の発生を考察するにレ線で弓状隆起が錐体, 乳様突起部上陵の上に突出している。この所見は側

頭骨の発生学を考えれば直ちに了解される。即ち三半規管は内耳の一部であるから側頭骨より先に完成される。従つて乳幼児期にある程度以上の骨病変を伴つた所謂広義の中耳炎に罹患すると, 殊にそれが放置, 不適当な治療あるいはアデノイド増殖, 慢性副鼻腔炎等により経過が遷延すると, 鼓膜所見では治癒したように見えても骨病変は治癒に趣かず, その後の乳様突起部の發育は正常の發育を遂げ得ず, 従つて上半規管が上陵上に突出する所見を呈し, 手術学的には斜めな外耳道後壁,

図2 第1例術後約8ヶ月目(オージオグラム)

中頭蓋窩底の低下，S 状洞の前方位をとる。更に所謂中耳炎，中耳加答児を繰り返す中に次第に高度難聴となり，何時とはなしに蝸牛も侵されて本耳の如くになってしまう。

本耳の組織学的所見を総括するに最も著明なのは骨病変である。而も骨膜層あるいは骨内膜層より造骨細胞の活動による骨新生が全く見られない。又破骨細胞による骨破壊も殆ど見られない。而も骨の変性は甚だしく，正常の骨組織は全く見られない。即ち核の濃縮，偏在，消失，更には骨小腔の拡大，甚だしいのは2～3の骨小腔が融合し，勿論骨細管も破壊せられ一空洞をなしている所見も見られる。骨の染色性は比較的時代の新しい骨はエオジンをよくとり，古く変性の甚だしいものはヘマトキシリンをとり，異常な紋理が著明となり，死骨化の甚だしいものは両者の染色性が悪くなる。ワ染色でもほぼ同様である。斯かる時代，変性の種々雑多の階梯のものが入り乱れて存在している。即ち吉田の云う Anbau, Umbau, Abbau が行われた事を示している。

脱灰は石灰塩類が溶解して骨様組織となり，続いて固有組織の吸収崩壊をきたすもので，破骨細胞の形成を伴わない。

本耳の脱灰化は骨の染色は悪くなり，紋理は全く不鮮明となり，あるいは核の消失せる骨小腔が拡大し，更に周囲の骨細管も吸収せられ，更に2～3の骨小腔が融合し骨はぼろぼろになり，更に骨質が吸収せられると，甚だしい場合は骨は線維様化（附図10，外耳道前壁，附図11，耳管外側壁）する。又骨様組織化（附図8，外耳道後壁）する。

次に骨組織がばらばらになっている所見に就いて述べよう。これは横浜医大病理の吉村教授に伺つたら標本作製中に生じた所見ではない由である。従つて骨組織の離断は手術時，標本採取時の機械的刺戟に因るものと考えられる。

骨組織の離断部を詳細に見ると骨変性の甚だしい部位に多い。附図6，闊脚蜂窠の右方では変性の強い骨の中にハ管を中心として時代の新しい骨が生じ，両者の境界が明らかに離断されている。即ち時代の新しいものと古いものとの間の接合質は弱いようである。又附図10，外耳道前壁では概ね骨は脱灰化が強く，線維様化となり，中に4個のハ管を中心に新生骨塊があり，両者の境界が離断されている。

次に骨の栄養，体液循環を司る腔内を見るに，大なるものは骨髓腔となり，脂肪髄あるいは赤色髄を含んでい

る。中位のもの多くは中心に血管を有し，その周囲は浮腫を呈し，Fibrosis を見る。しかしながら炎症性細胞浸潤は極めて少ないか，あるいは全く認められない。中心の血管腔内には赤血球は少なく，周囲の浮腫により圧迫せられている所見である。小なるものは明らかにハ管の状態を呈している。しかしこの小管も以前にあつたハ管ではなく，長年月間に繰り返された治癒機転即ち骨増殖がその血管を中心として行われた事を示している。而も骨内膜層は通常のものよりヘマトキシリンに濃染し，血管周囲に同様に Fibrosis の認められるものもある。

これ等の間質に相当する腔の発生を考慮するに，第1に考えられるのは骨破壊腔が肉芽により修復せられて次第に斯かる所見を呈する場合である。第2は含気腔の炎症が高度で上皮細胞が壊滅された場合に斯かる所見を呈する場合がある。本耳の隅角蜂窠に認められたが，中心に小含気腔の上皮細胞に囲まれた小腔の存在する場合もある。第3は小骨髓腔が破壊されて斯かる所見を呈する場合がある。第4は従来称えられたものとは別の骨破壊型式で，骨小腔の拡大が甚だしく，2～3の骨小腔が周囲の骨細管と共に吸収せられて空洞を形成し，骨がぼろぼろになっている所見がある。この空洞に肉芽が侵入すればその終結の姿は斯かる所見を呈する事もあり得る。穿孔管（Volkmann 管）形成と類似している。

元来扁平骨には長管骨に比しハ管は少ない。これは骨髓腔，周囲骨膜より營養されよばいからである。本耳では斯かる小管腔は急性炎時に比して遙かに多い。これは長年月間破壊治癒が繰り返されるためには，通常の側頭骨より遙かに大量のエネルギーを必要とするためと考えられる。

次に含気蜂窠炎の所見では上鼓室にかなり大きいものが見られる。含気蜂窠被覆組織も急性炎症状に乏しく，浮腫を主としている。これはその鼓膜所見よりすれば上鼓室も治癒と考えられる所見であるが，本耳の如く骨病変が一度高度となつた後は含気腔被覆組織も完全な正常の状態には戻る事ができず，上皮細胞も又正常の内被細胞様扁平上皮に戻る事はできないで，背が高く，所により数層になっている。骨及び被覆組織にはある程度の関連性が存在している。

上鼓室を除いては隅角蜂窠に線維性癰痕状となつた組織の中に細長い残存小蜂窠が見られる。

即ち鼓室，上鼓室を除いては乳様突起，外耳道，錐体共に極めて遷延された慢性骨炎，骨髓炎の所見で治癒

機転、破壊機転に乏しく、真に癒るでもなく悪化して生命を危険に曝すでもなく長年月を経過し、その間に次第に伝音系、感音系も障碍せられて斯かる高度難聴となつてしまったものと考える。

第1例右耳総括：本耳も鼓膜所見より診断すれば慢性中耳加答児、オーディオグラムより診断すれば高度の混合難聴、レ線より診断すれば慢性側頭骨骨髓炎であり、その組織学的所見よりすればレ線学的診断が正しい。

鼓膜所見とオーディオグラムのみよりすれば高度の神経難聴で片付けられてしまう。

手術所見よりすれば術中あるいは神経難聴であつたのではないかと心配も強かつたが、肉眼的所見の割に骨がひどく脆弱であつた。

骨病変、軟部の病変は左耳とほぼ同様である。骨は脱灰化のために染色性が極めて悪く、核は消失しているものが多く、骨小腔の拡大、紋理の不鮮明、更に甚だしい時は骨小腔の融合による多孔質化、基質の融解による線維様化等が認められる。骨の接合質の変化により手術時の機械的刺戟によつて骨がばらばらになつている。骨の新しい時代と古い時代のものとの境が最も離断され易い。又層板がばらばらになつている所もある。

軟部組織では含気蜂窠炎の像は乳様洞の外側壁に見られたのみである。上皮は円味を帯びてやゝ背が高く、1～数層になつている。

上皮下には極めて厚い浮腫を主徴候とする層があり、骨膜層まで続いている。鬱血も細胞浸潤も殆ど認められず、稀に小円形細胞を見るのみである。これは土台の骨病変があまりにひど過ぎるがために、斯かる変化によつて骨病変との均衡を保つていてと考えられる。通常の慢性急性増悪の所見とは反対である。手術時に後方より見た上鼓室の所見もほぼ同様であつた点よりして、上鼓室、鼓室被覆組織もほぼ同様と考えられる。

その他の部には含気蜂窠は全く認められず、寧ろ通常含気蜂窠の存在している部は骨髓腔となつている。即ち斯かる骨病変の上には通常の含気蜂窠被覆組織は再生し得ず、又發育もできず、恰も上顎洞の如き治癒機転をとつている。ハ管も通常の骨組織を營養するためのものではなく、骨を修復するためにその数が極めて多くなつている。中間型の骨小管と総括した腔は左耳の所見とほぼ同様である。大型のものは総て骨髓、多くは脂肪髓を有している。

後頭頤の所見は興味深い。軟部は狭義の骨髓炎であり、その間に骨梁の骨が高度に変性し、又死骨化してい

る。而も骨増殖、あるいは高度の変性、及び死骨化した、個体に対して異物的存在の骨組織を破骨細胞により破壊して運び去ろうとする所見が見られない点である。期かる骨を手術により除去すると患者は肩凝り、首の張るのがよくなる。

本耳も左耳同様に含気蜂窠炎は治癒の傾向にあるが、高度の骨病変のために側頭骨病変は癒るでもなく、癒らぬでもなく遷延した経過をとり、その中に聴力は次第に低下してしまつた。

症 例 2

者患：大〇美〇子、7才、♀

初診：昭和30年2月8日

主訴：聾啞

家族歴：記載すべき事はない。

既往歴、現病歴：生後1年2カ月の時両側頭骨含気蜂窠炎に罹患し、その後も屢々耳漏を認め、その度毎に姑息的療法を行つていた。2才の時までは物音に反応を示していたが、漸次反応を示さなくなり、5才の時には全くの聾啞状態となつた。某大学病院等を転々としていたが、この鼓膜所見なら聞えぬ管がないと云われ、ストマイによるものだ云われ、又精神薄弱児であろうとも云われて、止むなく聾啞学校に進学せしめたものである。

初診時耳科的所見：両耳共に鼓膜には穿孔がないが、全体が肥厚しており、後上部においては弛緩部、緊張部共に浸潤、膨隆があり、殊に左耳においては著明であつた。光錐は消失しており、鼓室には相当の炎症性的変化の存在が想像されたが、発赤がないので現在は小康を保つていてと考えられていたらしい。

Stenvers レ線写真所見：右耳の乳様突起は尖端を含め一様に不鮮明である。乳様洞附近及び迷路周囲には小蜂窠群らしきものが認められるが、これ等も辺縁が不鮮明となつている。乳様突起天蓋の骨上陵は強く下降して鞍状となつており、突出した弓状隆起に移行して第1例同様に危険性側頭骨と考えられた。

左耳の隅角蜂窠部、S状洞周囲蜂窠部には骨融解竈があり、迷路周囲及び乳様突起尖端は不鮮明である。蝸牛殻の陰影はかなり明らかであるが、三半規管においては、辺縁がぼけており、はつきりとは確かめられない。錐体尖は蜂窠らしきものが認められず骨融解像を呈している。乳様突起上陵の鞍状化は右側と同様であり、両耳を比較すると左耳のレ線像の変化が強い。

聴力検査：気導検査では両耳共に全然反応を示さないが、両側乳様突起部に骨導端子を当てると、1000サイ

クル、2000 サイクルでは、60dB の最大値で頻りに眼を動かしたり変な声を出していた。笛の音や小石を詰めた空罐を振って音を出して検査したが、これには反応を示さなかった。

レ線上より骨病変の存在が考えられ、鼓膜所見との両者より左側が病変の程度も大と思われた。これ等を取り除く事が先決問題なので下記の如き手術を行った。

昭和30年2月15日左側頭骨炎根治手術及び三つの半規管の Labyrinthektomie, 昭和30年3月9日右保存的側頭骨炎根治手術及び水平半規管の Labyrinthektomie を行った。

左耳手術所見：耳後切開により入るに、乳様突起は極めて高度の慢性乳様突起炎急性増悪の所見を呈し、乳様洞、隅角蜂窠、闊膵蜂窠は高度の骨軟化、嚢腫、被覆組織の肉芽様肥厚を呈していた。上鼓室、鼓室もほぼ同様で、橋部は全く死骨様となっていた。錐体前蜂窠列も骨変化は極めて強く、骨軟化、一部嚢腫を呈していた。錐体後上、後蜂窠列も骨破壊は極めて高度であつた。側頭葉を挙上し、錐体前面を仁保・平野法により除去するに、乳様突起天蓋、鼓室天蓋は全く死骨化し、錐体尖上部も骨が脆くなつていた。水平半規管、後半規管はやゝ黄色を呈し、光沢悪く、初め水平半規管を切除するも眩暈は起らず、内腔も全く認められなかった。後半規管も同様であつた。上半規管も同様であるので、弓状隆起を除去、上方より鑿除した。約半分鑿除した所眩暈が起り、後内方の脚より内淋巴液の漏出を認めたので手術を中止した。

右耳手術所見：左耳に比べてやゝ急性増悪の所見が少なかった。即ち骨の変化はほぼ同様であるが、膿性嚢腫が少なく粘液性嚢腫、骨軟化、被覆組織の肥厚を主とするものであつた。上鼓室、橋部の所見がやゝよいので、鼓膜、耳小骨は保存し、錐体後上、後、後下蜂窠列は可及的に清掃した。唯水平半規管の前1/3の部に黒褐色の瘻孔を認めたので、水平半規管を Schichtweise に削除し、更に瘻孔を細小鋭匙で慎重に搔爬した。後方は半規管が欠除していたので、前方に進み、膨大部の少し手前で眩暈が起り、比較的奇麗な内腔を認めたので術を了した。

病理組織学的所見：手術時に採取した側頭骨各部よりの組織片を軟部と共にツエロイジン包埋し、ヘ・エ重染色、及びワ染色により検索した結果は下記の如くである。

左 耳：

(1) 乳様洞の外側壁：骨の変化は極めて強く、骨の

核は殆ど消失し、まならに存在するものも濃縮している。骨の紋理は不明となつている部分が多く、この骨組織に吸収が起つている。骨小管内には浮腫、Fibrosis があり血管の閉塞が見られる。管腔内よりの骨の吸収や新生は認められない。軟部組織よりの骨の吸収は諸所に認められ、又諸所の骨小管の骨壁には造骨細胞の並列があるが骨増殖は認められない。骨壁の周辺部においては変性の極めて強い部分もある。

(2) 乳様突起尖端：骨の核の消失が強く、紋理の錯綜も見られ、変性が著明であり、周囲の骨髓腔より吸収及び増殖が行われている。骨小管腔はいずれも浮腫及び Fibrosis があり、内腔は縮小し、周辺に対してはいつでも何の変化も及ぼしていない。骨髓腔は非常に多く見られ骨と入り組んでいるが、いづれも細胞成分が増加し、周辺には骨破壊、吸収あるいは造骨細胞の並列が見られ器質化された部分も見られる。又相当に線維性となつた結合組織も見られ明らかな骨髓炎の所見を呈している。更に軟部組織の中には高度に死骨化した遊離骨片も見られる。

(3) 隅角蜂窠：骨小管腔は不整形に拡大し Fibrosis も又著明となつている。これ等は骨破壊腔の治癒の途上にあるものと考えられる。骨髓腔においてはやはり結合組織の増殖及び細胞成分の増加が見られ、骨髓機能は失われつつある。骨は紋理が錯綜し、諸所に見られる接合線が乱れており、骨小管、骨髓腔よりの骨の新生像及び軟部結合組織よりの窩状吸収のため、更に複雑化している。骨の変性は相当に高度で、一部分ではあるが、骨が線維様化している所もある。一個所相当に大なる骨破壊腔の中に2～数層の円味を帯びた上皮細胞に囲まれた腔がある。これは含気腔の名残りであり、軟部は上皮下の血管に富める層、骨膜層等全く区別なく肥厚し、而もその中に2個の小骨髓腔ができています。興味深い所見である。

(4) 闊膵蜂窠：中央を占める骨組織は変性が強い。この骨組織は次第に吸収を蒙り、周辺より消失縮小され、接合線を境にして年代の新しい骨に変つて行き、更にこれが又変性に陥つて吸収され、新しい増殖骨に変わるという改造の繰り返しが続いている。最も時代の新しい骨においても核の消失が見られ、又濃縮している部分も見られる。これ等を取り巻く軟部組織は、完全な慢性含気蜂窠炎の像を呈し、1～数層の背の高くなつた上皮細胞、上皮下の浮腫、上皮下層の器質化、軽度の細胞浸潤、骨膜層の増殖、所により造骨細胞の並列を見る等の

所見を呈している。しかし第1例の如く骨組織がばらばらになったり、又多孔質化、線維様化等の所見はない。

(5) 外耳道前壁：骨細胞の増加と共に骨小管も幾分多い。本例の骨小管腔の大部分はハ管内壁より骨破壊が起り、管腔は拡大され、その内腔には結合組織細胞が増殖し、管壁はヘマトキシリンに濃染している。骨質も比較的ヘマトキシリンを余計に取っている部がある。骨小管腔あるいは骨髓腔内には造骨細胞の並列も見られ、管腔周囲には時代の新しい骨が見られる。この所見は骨破壊腔が血管を中心とする治癒機転により縮小せられ、内腔は結合組織による器質化が起つてきた事を示している。この世代の新しい骨はヘマトキシリンによく染まって管腔周辺にリング状をなしている。骨の吸収所見は見られず、骨はやゝ緻密化していると考えられる。

(6) 弓状隆起：骨は核が大部分消失し、僅かに一部分に濃縮せる核が存在している。この部分の骨壁には一層の造骨細胞の並列があり、その周辺軟部組織には結合組織が少しく認められる。骨の紋理は骨小管を中心にして割合規則正しいのであるが、骨小管腔内の Fibrosis の強いもの程乱れが強く、又骨小管を遠ざかるにつれて紋理も不明瞭となっている。骨の辺縁において窩状吸収が見られ、又鋸歯状をなした接合線が数条接近して走っている。軟部組織においては出血が強いが、これは手術時の出血と考えられる。

(7) 上半規管附近：この標本は側頭骨炎根治手術を完了後に先ず弓状隆起を除去、更に内外淋巴腔が開放されないで上半規管を層又層と上方より鑿除し、遂に上半規管を約半分鑿除し、その内側の脚から淋巴液の流出した時の標本である。

骨は非常に緻密で、紋理は不鮮明ではあるが僅かに認められる。核は消失したものもあるが、濃縮、偏在、又比較的よいものもある。しかしこの骨塊の周囲で肉芽の中にある小骨片は骨の変性は遙かに強く、死骨様となっているものが多い。含気蜂窠は周辺に小なるものが2個見られる。被覆組織は概ね肉芽様、癰瘍様となつてその中に背の高い2～3層の上皮細胞に囲まれた細長い腔をなしている。その他に6個の骨小管が見られる。その中1個はハ管と思われ、中心の血管には赤血球の充満が見られるが、その他のものは1～3個のハ管から骨融解により骨融解腔ができて慢性化し、Fibrosis が現れたものと考えられる。これ等の腔の周辺には造骨細胞の並列が見られる。その他に1個の一見含気腔と見られる所見がある。内腔は円形、骨腔はやゝ横に長いが、内腔の上

皮様に見える細胞は含気蜂窠の被覆上皮でない点より上半規管の内淋巴腔と考える。外淋巴腔は肉芽により充たされているが、一部附近の骨破壊腔に連絡している。肉芽組織には結合組織細胞、小円形細胞、組織球がかなり認められ、その他網状をなした線維性組織が見られる。含気蜂窠の上皮下の組織のようには癰瘍化していない。手術時にこの内淋巴腔が開放されて眩暈が起きたものと考えられる。なおこの内耳炎は水平半規管、後半規管の内腔が欠除していた点よりしても、相当に古いものと考えられる。

(8) 錐体尖(仁保・平野法)：過去における骨の吸収、増殖が強行われた事を物語り、紋理は種々に錯綜している部分が多く、これ等に断裂した多数の接合線が見られる。骨の核は消失しているものが多く、消失しないまでも濃縮している。この骨に軟部組織よりの窩状吸収が見られ、更に骨増殖による類骨組織の附加している所が随所に見られる。骨小管腔においては骨の増殖所見が見られ、やはり管腔の縮小が行われている。しかも新生骨においても、窩状吸収が現われている部分が僅かながら認められる。骨小管内の Fibrosis はやはり強く、血管は縮小しており、細胞浸潤も認められる。骨を取り囲む軟部組織の中には高度の死骨化した骨片が散在している部もある。組織片の中には2個の含気蜂窠が見られ、被覆上皮は円味を帯び、数層に増殖し、上皮下には強い細胞浸潤を認め、上皮下の組織層及び骨膜層の器質化が極めて強く、通常の10数倍に肥厚している。大なる骨髓腔にも結合組織による器質化が認められる。

右 耳：

(1) 外耳道上棘：骨の脆弱化は変性の強いものにおいて顕著であり、線維様となつてばらばらになっている所もある。しかし紋理が比較的明らかに規則的の所もあるが、やはり核は濃縮しており総じて変性の傾向が強い。骨壁の表面に一部造骨細胞も見受けられるがその周辺の骨の増殖は少ない。軟部組織は概ね骨髓腔であるが通常は骨髓組織が殆ど見られない部分である。この骨髓腔には浮腫があり表面には Fibrosis が軽度認められる。これは手術時外耳道上棘の直ぐ後に褐色の点が点々と見られた所見である。

(2) 乳様洞の外側壁：骨は比較的によく染色されているが比較的ヘマトキシリンをよく取っている。核の濃縮、消失、紋理の不鮮明、乱れを認め、含気蜂窠炎は比較的に軽い。上皮下層、骨膜層の器質化による肥厚を主に認める。

(3) 乳様突起尖端：標本の殆どの部分が骨髓組織で細胞成分はかなり増加しているようである。小骨片が周囲に見られるが、核の消失、紋理の不明瞭化等はあるが破壊、吸収、増殖等是不明である。

(4) 乳様洞：骨の変性は強く、染色性は極めて悪く、骨の核は消失が目立つ。核の濃縮乃至不整形、偏在するものも見られる。骨周囲軟部組織、即ち含気蜂窠や骨小管腔よりの骨の窩状吸収のみが行われている部分は少なく、一度吸収され、再び増殖が行われて、二度も三度も繰り返している所見である。斯かる骨の変化のために、骨質中には接合線の断裂した走行が数多く見られる。骨の核の消失している部分では骨組織の断裂が多く見られ、骨基質の脆弱性を表わしている。又多孔質化され紋理が不明瞭となっている部分も見られる。骨小管腔は一方において骨の窩状吸収が行われ、反対側においては骨の増殖が繰り返行われて、次第に吸収方向に位置の移動を行い、変形、不整形をなしている所見もある。骨小管腔内には Fibrosis の形成が強く、殆ど管腔内が埋められた所見である。更に浮腫も加わり、血管の圧迫が甚だしい。軟部組織、主に含気腔被覆組織においては、炎症性変化は比較的軽く、上皮下の組織の浮腫を主徴候とし、軽度の細胞浸潤も見られる。而して興味深い事は、土合の骨の変化の少ない所は比較的被覆組織の変化も軽く、陥凹部、骨の悪い所は肥厚が強い。内腔の滲出物は極めて僅かで、骨病変が治癒しないために骨膜層、上皮下の組織層の浮腫が取れず、含気蜂窠炎の治癒が遅延されている感が深い。

(5) 隅角蜂窠：骨の核の消失が著明であり、骨小腔の拡大が見られる。骨の紋理は不明瞭となっている部分が多く、吸収、新生等の所見は著明ではない。軟部組織には僅かに線維性結合組織が現れており、細胞浸潤が認められる。又軽度の浮腫もある。

(6) 闊膵蜂窠：標本の殆どが骨髓組織で、その中に死骨化した骨片が諸所に見られる。含気蜂窠の発育が悪く、線所見の正しい事がうかがわれる。

(7) 後蜂窠列(山下法)：骨組織は変化の比較的に軽いものと、離断されて死骨化した骨の二様がある。含気蜂窠も炎症性変化が比較的に軽く、殆ど治癒したと考えられるものと、一方には骨膜層、上皮下層が相当器質化され、中に小なる2〜3層の円味を帯びた上皮細胞に囲まれた小腔となつたものとの二様がある。骨小管内の Fibrosis、内壁に造骨細胞の並列を見るものもある。骨破壊、増殖も見られる。

(8) 後下蜂窠列(Kramm 法)：概ね骨の変化は中等度である。周囲のばらばらの小骨片には変化の強いものもある。軟部組織は概ね骨髓組織であるが、雲架様物質が析出され、細胞浸潤、巨大細胞も見られる。

術後経過：左耳術後4日目に左耳より約 1.5m 離れて、小石を詰めた空缶を上下に振つてガラガラと音を出した。初めは眼をあちこちに動かしていたが、何回も繰り返す中にアラアラという似たような音を出した。これに勢いを得て空缶を叩いてカンカンと音を出したが、これはわからないようである。5日目に笛のピーピーという音を出したらピーと答えたので聞えている事がはつきりした。6日目より創内の滲出物が多くなつてきて聞えなくなつたようである。側頭骨炎根治手術を行った耳では、やはり1週目位から聴力は目立って落ちるようである。そして約3週間〜1ヵ月位経て、創内の上皮が進むと共に徐々に上昇して行くのである。

術後の耳内及び耳後創内のガーゼ交換はなるべく行わない方がよい。できるだけ長くおいて自然の治癒機転に任せればよいのであるが、Drainage としてのガーゼ片は異物であるので創内の反応が強くなるもので、滲出物が多くなり、止むを得ず5〜7日目から抜き出して行くようにしている。この患者においては、6日目より耳後創からのガーゼを約 5cm 位づゝ取り去り、術後2週間目には耳後創は閉ちてしまつて、それ以後は耳内よりのガーゼ交換によつた。左耳術後22日目に右耳の手術を行った。術直後は眩暈のため聴力はわからなかつたが、翌日より単調な音(即ち前述のガラガラ、カンカン、ピー、手を叩いてボンボン)には約 1〜1.5m 位でよく聞えるようで、盛んに似た音を云つていた。右耳術後14日目よりラジオの音楽を大きくして耳許で聞かせるようにした。初めは戸惑つていたが、次第に調子を覚えて3日目よりリズムに合せて身体を振り出し、それがよくリズムに乗るようになった。左耳は術後42日目には完全上皮化し、右耳は術後30日目より通気加鼓膜マツサージを開始した。鼓膜の病的症状は全く消失し、光錐も現われてきた。その後オーヂ・チューブをつけて、簡単な言葉やラジオを聞かせるように努め、なるべく耳から実際の音を覚えさせるように努力した。左耳術後3ヵ月目には数字の1から7までの発音を覚え、ラジオではアナウンサーの男女の区別をするようになった。どうしても右耳の方が聴力がよいのでオーヂ・チューブは右の方に付けて聞き、術後1年目には「お父さん」「お母さん」「お兄さん」「お姉さん」を間違えて云う事は少なくなつ

図3 第2例術後約2年目 オーディオグラム

た。しかし眼から覚えた言葉は仲々抜け切れず、「美保子」「ハーイ」の言葉に対して「ピオコ」「ハエ」と云っていた。ラジオは普通の音量でよく聞え、プレーヤーでレコードを聞いたりするにも、オーヂ・チューブを付けるのを嫌がつてその儘で聞き、1年前とは見違えるようになった。左耳はオーヂ・チューブを使用して、ラジオを大きくすると聞えるようであるがはつきりしない。術後約2年目のオーディオグラムは図3の如くである。これまでに頻回の聴力検査を行つたが、オーディオメーターの純音に対してこの時初めて殆ど同じような音を声に出し、プー、ピー、ポー等と答え、音を確実に表現できるようになった。

第2例総括：7才の聾啞児。1年2カ月の時に両側急性側頭骨含気蜂窠炎に罹患し、これを慢性化させ、不幸にして化学抗生物質の時代のために、耳漏が止まれば治癒したとしている中に、慢性乳様突起炎、慢性錐体炎、慢性内耳炎となり、遂に聾啞児となつてしまった。

レ線所見でも両耳共に弓状隆起が突出し、乳様突起部上陵が凹んだ所見を呈している。これは第1例においても述べたように、側頭骨の中でも内耳は先にでき、その後含気蜂窠が発育すると共に乳様突起は発育する。本例も1年2カ月に慢性化させたために、その後蜂窠は正常なる発育を遂げられず、乳様部自体も発育できない。即ち外耳道では後壁は斜となり、頭蓋底は低位置をとり、S状洞も前方位をとり、所謂危険性側頭骨の所見を呈する。Wittmaarkの潜在性中耳炎ではなく、生後

の実際の側頭骨骨髓炎のために、正常な含気蜂窠の発育が阻碍された所見である。

更に左三半規管は影像がぼけていて手術により水平、後半規管内腔の欠除、上半規管の内方脚の中位で初めて内耳淋巴液の流出、眩暈を認めた。

手術においては、左は側頭骨炎根治手術、水平、後半規管鑿除及び上半規管部分鑿除術を行い、右は保存的側頭骨炎根治手術+水平半規管膿孔搔爬術を行つた。

後者の術式は、現在流行の耳硬化症に対する開窓術の術式を受け入れた耳内手術術式より、遙かに勝るものである。本手術では外耳道、鼓膜、耳小骨

連鎖のいつれにも手術的侵襲を加えてないからである。

組織学的所見では第1例よりは遙かに軽い。骨細胞の核の濃縮、偏在、消失、骨小腔の拡大、紋理の不鮮明化を示し、あるいは骨の破壊、吸収、増殖、即ち Anbau, Umbau, Abbau を繰り返した、時代の新しい骨、古い骨、これ等の接合線が色々の不定形な模様を現した所見が見られる。更に甚だしい部では骨小腔の拡大、融合による骨の多孔質化、又骨の接合質が変化し、脆弱となり、ばらばらになった所見も見られた。

しかし第1例に比し造骨細胞の出現、骨様組織の出現、破骨細胞の出現等の異物を運び去り、又修復せんとする機転は大部強い。だが急性期、亜急性期のものに比しては遙かに弱い。

広義の骨小管においては、第1例と同様に、浮腫、Fibrosis が見られるが、その中心の血管の貧血の度も弱い。寧ろ器質化の傾向を有している。狹義の骨髓炎の所見は、右闊扁桃蜂窠、左隅角蜂窠、左乳様突起尖端等に見られる。

含気蜂窠炎の所見は、左上半規管の附近、左闊扁桃蜂窠、左錐体尖、左乳様洞、左乳様洞の外側壁等に見られるが、炎症性変化は左錐体尖のものが最も強い。これは錐体蜂窠炎、錐体炎が今もなお狹義の中耳炎の合併症の如くに考えられている傾向があるが、興味深い所見である。

次に骨組織、その上の骨膜層、上皮下の組織、上皮層との変化の程度を述べよう。急性含気蜂窠炎にお

いては、仁保¹⁸⁾は含気蜂窠被覆組織加答兒、含気蜂窠被覆組織炎、急性含気蜂窠炎を分類した。又急性骨髓炎においては限局性急性骨髓炎、広汎性骨髓炎、進行性壊死性骨髓炎を分類した。慢性症においてはこれ等の治癒破壊機転が混在して、到底斯かる単純な分類は不可能である。しかし病的の骨の上には正常な骨膜層、上皮下層、上皮層は存在し得ない。又これ等の病変の相関関係は概ね平衡状態を保っている事が多いが、急性期のような訳には行かない。このようになって平衡関係の保たれた状態が慢性であり、その平衡関係の破れた場合が急性増悪である。本例においては第1例よりはこの平衡関係はよいが、やはり骨病変が含気蜂窠炎の治癒を妨げていると考えられる。

聾啞の發生に就いては、骨病変も相当な役目をしているように考えられるが、殆ど完全な聾となった直接的な原因は内耳炎にあるように考えられる。

本例に対して流行であったストマイによるものであろうとの医師の一言は、非常に大きな悪影響を及ぼすものである。広義の中耳炎、側頭骨炎を除外してからでなければ、仇や疎かに医師が口にすべき言葉ではない。

症 例 3

患者：上〇大〇郎。32才。♂。農

初診：昭和31年8月23日

主訴：聾及び両側耳漏

家族歴：特記すべき事はない。

既往歴、現病歴：4才の

時、麻疹後両側耳漏となり、附近に専門医がないので他科の医師の治療を受けていた。しかし耳漏が続き、6才の時に初めて専門医に通院加療を受けたという。難聴は次第に強くなっていったが、何とか話ができて小学校に入学した。小学校1年の頃、天長節等でよく立っていると、眩暈が起り嘔気がした。7才の時には扁桃摘出術を受けたが、その後難聴は高度となり、発音が不明瞭となつてしまった。耳漏も続いているので、転々として通院加療を受け12才まで行つた。だが耳漏は消

失しなかつた。13才の時、耳内よりの手術をしないと駄目だが未だ小さいから我慢できないだろう。大きくなつてからと言われたが、戦時中の事として手術の時期を失してしまつた。依然として両側耳漏は止まらず屢々急性増悪をきたし、抗生剤の注射、サルファ剤の服用等により、一時の間に合せ程度の治療を受け、両側の耳漏は自分で清掃していたという。20才頃にはどんな音も聞えなくなつて筆談するようになった。頭痛も強く、屢々臥床しなければならなかつた程である。しかし耳鳴には気付かない。眩暈は小学校在学中に比べて次第に回数が少なくなり、現在は年に3~4回位である。

初診時耳科的所見：右鼓膜緊張部は全穿孔を呈し、弛緩部は発赤腫脹している。全体は僅かに陥凹している。穿孔部より見られる鼓室内部粘膜は発赤腫脹が強いが、膿汁は認められず乾燥している。左鼓膜も同様に緊張部は全穿孔で、鼓室内部には濃厚な膿汁の潑溜があつて穿孔部より外耳道に流出しており、鼓室内粘膜は発赤腫脹が右耳に比べ更に著明である。この膿汁内には仮性真珠腫塊が見られ、穿孔部辺縁にも附着しており仮性真珠腫生慢性側頭骨炎である。

Stenvers レ線写真所見：右耳は乳様蜂窠は骨髓炎様となり、闊峯蜂窠には大なる骨融解電が見られる。含気蜂窠像は全く認められない。上半規管は認められるが、水平、後半規管部はぼやけて、乳様洞、隅角蜂窠に続いており辺縁が不明である。錐体尖は内耳道が僅かに現

図 4 第4例術前 オーディオグラム

れている以外は一様に不鮮明となつていて硬い感じである。左耳においては、乳様蜂窠は乳様突起先端を含め、上陵まで全体が一様に不鮮明となつており、側頭鱗部蜂窠も同様である。右耳同様に上半規管は認められるが、水平半規管、後半規管は辺縁が不明で、この陰影は上半規管の側方に続き、乳様洞より乳様蜂窠内に移行している。錐体尖は右耳同様に不鮮明となつており、更に一層不鮮明の度が強い。

聴力検査所見：図4の如く125, 250, 500 サイクルの骨導のみである。耳の傍でどんなに大きな声を出しても全然わからないし、傍を通る電車の音も少しも聞えない。たゞ本人はアクセントのない奇妙な応答をするだけである。漸く意味がわかる程度で主に単語を話す。

遮眼書字法検査：図5に示す如く変化はないようであるが、両耳共に内耳性変化が強い一見通常のものとなりがらないのではなからうか。

昭和31年8月30日左側頭骨炎根治手術＋水平半規管部分切除術を行い、9月25日右側頭骨炎根治手術＋水平半規管部分切除術を行った。

図5 術前遮眼書字法
(左 遮眼時)

上羽大次郎

左耳手術所見：耳後切開により外耳道上棘後方より鑿開を行った所、骨は緻密となつており非常に硬く通常の含気蜂窠は少しも認められなかった。僅かに隅角蜂窠、乳様突起先端の部分において、死骨化した海綿状の骨組織及び癰腫が認められた。乳様洞は殆ど緻密な骨組織により充たされて、その所在が不明のため、Stacke 法により乳洞入口部を決め、外耳道後壁に先に整形を行つて指南をつけた後少しづつ削つて行つた。しかし洞らしきものは存在しなかった。鼓室

所見としては鼓膜は殆ど全欠損の状態であり、鼓室内には仮性真珠腫塊が充満しており、その中に槌骨は小頭のみ存在しており、砧骨は不明、鐙骨は消失していた。鼓室壁は厚い肉芽組織で被われており、上皮化している部分もあった。外耳道前壁は正常の数倍にも厚く硬くなつて、耳管外側壁より前蜂窠列は死骨様海綿状化し錐

体尖に続いて、次いで乳様洞の部分の増殖骨を注意深く鑿除したが、これは骨性迷路より腫瘍状に増殖していたものである。錐体後上、後蜂窠列は隅角蜂窠より死骨様となつて続いて、仁保・平野法により錐体前面骨を除去し、更に錐体尖を除去したが、非常に硬く除去に困難を感じた。斯くて側頭骨炎根治手術を終えたが、聴力は全然なく、よつて水平半規管部に開窓術を行つた。水平半規管部の骨は極めて厚く、恰も腫瘍の如くに隆起して、2～3mm 削つて漸く膜様迷路を露出した所、眩暈発作を生じた。膜様迷路は黄色を呈しており、Schambough 鉤により骨窓縁を拡大して、更に外淋腔を開放、更に一部膜様半規管を搔爬除去して、前後の半規管内腔よりの内外淋液の流出をよくした。次に耳後下部頸部皮膚より小皮膚弁を採取して、窓部を被覆した。術直後には人の声、笛の音（ビー、ビー）が響くようになった。

右耳手術所見：耳後切開により入るに、左耳同様骨は高度に緻密となり、蜂窠らしきものは存在しない。この緻密骨を鑿開して乳様洞に入つたが、通常の場合に比較して非常に狭くなつていた。僅かに隅角蜂窠の部分が海綿状となり、死骨様化していた。上鼓室は骨増殖が強く、更に肉芽組織が埋めており、癰腫が認められた。槌骨、砧骨は骨性に癒着して全然動かず、一緒に除去した。しかし予期していた仮性真珠腫は見当らなかった。鼓室壁における肉芽組織は厚くなつており、癰腫化していた。外耳道前壁はやはり左耳同様に数倍に厚くなつており、続いて耳管周囲蜂窠、錐体蜂窠は海綿状となり、死骨化していた。仁保・平野法による錐体前面骨も同様であつた。錐体尖を除去後、仁保式鐙骨截除鉗子にて鐙骨小頭を切断除去した。聴力はやはりないので、水平半規管の開窓を行つた。やはり迷路骨壁は厚く、膜様迷路は黄色を呈していた。この際の眩暈は左耳手術の際のものより更に強く、頻回の嘔吐を繰り返した。Schambough 鉤により膜様半規管を一部除去し、前後の半規管内腔よりの内外淋液の流出をよくした。次に小皮膚弁による開窓部の被覆等を左耳と同様に行つた。術直後には20年振りに笛の音も初めてビーと聞えるようになり、人間の声は意味はわからないが、音が聞えるようになった。

病理組織学的所見：手術時に採取した側頭骨各部よりの組織片を軟部と共にツエロイジン包埋し、ヘーエ重染色及びワ染色により検索した。

左 耳：

(1) 外耳道上棘：骨の変性が極めて強く見られる。

骨の核は概ね消失しており、広義の骨小管附近に見られるものは濃縮、偏在等の変化を呈している。骨小腔の拡大しているものも多く認められる。紋理は不明瞭となり、一部の骨は線維様化している。又時代の割合新しい骨と古い骨が入り混っている部分も見られる。又接合質の変化により脆弱化し、骨がばらばらになった所見も見られる。これ等の骨の周囲よりの窩状吸収は少ない。又骨新生像は少しも認められない。この骨において最も著明なのは骨小管の増加と、その内外の変化である。骨小管の骨内膜層に相当する部分は、ヘマトキシリンに濃染して肥厚している。この内部には浮腫、Fibrosisが見られ、瘢痕状となった結合織も所々に現われ、血管の圧迫が殊に強くなっている。又中には骨小管内腔が殆ど新しい時代の骨で埋められている部分もある。ハ管においては、軟部組織は概ね厚い瘢痕性結合織であり、血管を取り巻いて血管腔内は空虚のことが多い。骨小管に限らず、骨髓腔においても器質化した結合織が見られ、瘢痕状の厚い細長い結合織の存在しているものもある。骨小管腔乃至は骨髓腔よりの骨新生は過去には相当強かったのであるが、現在は認められない。却って管腔の周囲における比較的年代の新しい骨（勿論変性が強い）において、管壁よりの脱灰化が著明に見られる。軟部組織における細胞浸潤は認められない。

(2) 乳様突起尖端：骨の核は消失しており、紋理の不鮮明となつている所が多く、骨壁はヘマトキシリンに染まつている。最も特徴のある点は、軟部組織は総て骨髓組織で脂肪髄であり、骨梁には骨小管は極めて少ない。これは長期間の病変のために含気蜂窠は發育できず、止むなく脂肪髄組織が腔を充たしている所見である。骨組織における吸収、増殖所見は全然なく、又細胞浸潤等の炎症性変化も見られない。

(3) 隅角蜂窠：古い骨組織においては、核は濃縮しており、紋理も不鮮明となつているが、鋸歯状に断裂した接合線が骨質中に多数見られる。ハ管よりの骨の破壊治癒機転はあまり見られないが、軟部組織、主として骨髓腔、及び骨小管腔を中心とした骨の増殖が強く、数条の接合線を境にして過去に破壊治癒機転が高度に行われてきた事を示している。この管腔内からも再び窩状吸収の起つている部分が認められる。骨髓腔、骨小管腔等の軟部組織には浮腫が認められ、僅かに Fibrosis もある。腔内には拡張した血管、淋巴管が多く見られ、血管腔は空虚となつている。骨髓腔内には一ヶ所瘢痕性の厚い結合織による器質化が見られる。しかし炎症性細胞浸

潤、造骨細胞、破骨細胞等は見られない。

(4) 隅角蜂窠天蓋：脆弱化してばらばらに離断された骨組織は核の消失が著明であり、変性のために骨層板の部分染色されず、層板間がヘマトキシリンを取り、却って通常とは別個の紋理が鮮明となつている部分が多い。又骨小管を遠ざかるに従い骨の脱灰化も著明となつており、変性の種々雑多の階程の骨組織が混在している。不整形に拡大した骨小管腔には、浮腫、Fibrosisが見られるが、細胞浸潤は認められない。ハ管より増殖した骨組織もその接合部より離断され、変性に陥つている。骨小管腔、骨髓腔、ハ管よりの骨の増殖乃至は吸収等の変化は、(3)と同様に全然見られない。骨髓腔は主に脂肪髄であり、所々に器質化した結合織が見られる。

(5) 鱗部蜂窠：濃縮せる核の偏在乃至は消失し紋理の不鮮明な骨組織は、離断が著明で、概ねハ管を中心としているようである。ハ管はその数を増加しており、管腔内は収縮しており、その血管腔内は赤血球に乏しい。このハ管腔内が消失しているものも見られる。骨に接して結合織の厚い層が見られるが、細胞浸潤は認められない。これに接する骨組織にやゝ多孔質化が見られる。

(6) 乳様洞：骨の変性の最も高度の所見を呈し、脆弱化による離断は一層著明となり、不整形に拡大した骨小管、ハ管及び含気蜂窠を中心として、又そのような規則性もなくばらばらになつている。この小骨片を見ると、核の濃縮、消失があり、紋理の不鮮明なもの、骨小腔の拡大、更には多孔質化、脱灰化が進み線維様化した部分もある。これは不整形に拡大している骨小管腔より修復機転が旺んに起つたのであるが、到底古い変性の強い骨組織は修復され得ず、更に頻回の急性増悪により新生骨も次第に変性に陥つていったものである。ハ管内腔には浮腫があり、ハ管よりの骨の修復作用は殆ど認められない。不整形に拡大した骨小管腔内には浮腫が強く見られ、Fibrosisも多く、血管は狭少となつている。この部には通常ならば含気蜂窠が多いのであるが、標本には僅かに1つ認められる。その大なる含気蜂窠は上皮層には変化があまり認められないが、上皮下層には浮腫が強く、一部に肉芽組織が増殖している所見である。細胞浸潤は認められず造骨、破骨細胞も又ない。

(7) 骨性迷路より増殖せる骨：(6)と同様に骨の離断所見は著しく、ばらばらになつている。骨の変性も極めて高度である。多孔質化、線維様化、又接合質の変化により脆弱化し、ばらばらになり、本来の緻密な骨性内耳の骨とは似ても似つかぬものとなつている。軟部組織

においては脂肪髄が見られ、その辺縁は浮腫の強い結合組織により骨と接している。1ヶ所重層扁平上皮が管状をなして、比較的古い結合組織の中に見られる部があるが、これは仮性真珠腫の進展と考えられる。又不整形に拡大した骨小管腔も多くなっており、腔内には浮腫が強い。

(8) 上鼓室の外側：やはり骨の離断は著しく、骨の核の消失、濃縮、紋理の不鮮明は時代の古いもの程著しい。この骨の離断縁にはヘマトキシリンに濃染する接合線が見られる事が多い。概ね離断が接合部に行われている事を示している。含気蜂窠被覆組織に接し、又取り囲まれている小骨片群は、更に死骨化が著明でヘマトキシリンに濃染しており、多孔質化の所もある。この含気蜂窠被覆組織の上皮は1～数層に増殖し、肥厚しており、上皮直下には細胞浸潤が軽度に見られる。上皮下層は浮腫が強く、10数倍に肥厚し、更に癰瘍性の結合組織に移行している。内部には脂肪髄に変化して行く過程も見られる。これは第2例の左耳隅角蜂窠の所見に類似している。骨小管内においても脂肪髄と見られる変化がある。含気腔内には炎症性滲出物が見られる。ハ管、骨小管の変化は(7)と同様である。

(9) 後、後上蜂窠列：骨は大部分の核が消失をきたしており、紋理も不鮮明となつている。更に骨が脆弱化しばらばらになった所見が見られる。骨小管はその数がやゝ増加し、不整形の拡大が見られる。骨小管腔内には浮腫が強く、肉芽組織の侵入している部分もある。ハ管腔内軟部組織は収縮しているものと、浮腫をきたしているものがあり、その血管腔は空虚となつているものが多い。腔内の Fibrosis はあまり著明ではない。骨髓腔は主に脂肪髄であり、辺縁の骨との境界部には鬆疎な結合組織が存在している。ハ管腔、骨小管腔、骨髓腔からの骨の修復機転はいづれも認められない。

(10) 鼓室天蓋：脆弱化した骨組織はやはり骨の離断が著明である。ハ管、骨小管を中心にして骨はばらばらになつている。ハ管を中心にして、比較的紋理の明瞭なものもあり、又骨の脱灰が強く多孔質をきたしているもの、骨がやゝ線維様となつているもの等があるが、(8)に比べると変化の割合がやゝ少ないようである。ハ管腔、骨小管腔は概ね減少となつており、管腔内の浮腫が強く、Fibrosis も多い。軟部組織の大部分は脂肪髄であり、赤色髄が僅かながら見られる。これ等軟部組織には急性炎症性変化が見られず、造骨、破骨細胞も又見られない。

(11) 外耳道前壁：骨組織の核は大部分が消失してお

り、骨小腔も拡大している。更に2～3の骨小腔の融合している部分も見られ、多孔質化が著明である。紋理は不鮮明となり、全体として脱灰が強く起つている。核が消失している所では、ヘマトキシリンに染色された骨細胞膜が収縮して骨小腔から遊離している所見が多い。広義の骨小管腔内軟部組織は収縮しており、骨内膜層はヘマトキシリンに濃染している。このやゝ収縮した軟部組織内には Fibrosis を認める。管腔内血管腔には赤血球は乏しく、骨に対する修復機転は殆ど行われていない。勿論造骨細胞、破骨細胞も見られない。

(12) 槌骨小頭：手術時に槌骨小頭と共に除去した上鼓室内肉芽組織である。肉芽組織は厚く、一方においては癰瘍状となつており、内部には数個の管状をなして仮性真珠腫が侵入しているのが認められる。この重層扁平上皮は数層となつていて、その上皮下には高度の細胞浸潤が見られる。細胞浸潤は主に円形細胞、組織球、好酸球等である。又外耳道皮膚が肉芽組織と共に見られる。骨病変は極めて高度で、周囲より管状に破壊せられた腔が見られ、内膜はヘマトキシリンに濃染肥厚し、内腔は浮腫、血管の拡張、一部はすでに脂肪髄に変化した所見も見られる。血管腔内は貧血を示している。即ち以前には相当の骨破壊腔だったものが、急性炎症状の消退と共に斯かる組織で一応平衡状態を保っている所見である。骨は殆どの核は消失し、比較的ヘマトキシリンを多くとり、紋理の不鮮明、新しい時代の骨と古い時代の骨との間の接合線が見られ、殆ど死骨化している所見である。斯かる所見では耳小骨連鎖としての役目は到底果せず、却つて個体にとっては異物的存在となつている。

(13) 錐体尖(仁保・平野法)：骨はやはり同様にばらばらになつている。骨の変化は(10)とほぼ同様である。不整形に拡大した骨小管腔には Fibrosis があり、又脂肪髄となつている所もある。

(14) 解剖学的錐体尖：骨の変化は更に強くなり、ばらばらになった骨の核は消失しているものが多く、濃縮しているものもあり、骨質は骨層板に相当する部分が染色せられず、木の年輪の如き異常紋理が著明となり、骨層板の中間部は却つてヘマトキシリンを余計にとつている。この脱灰化が更に高度になると骨層板は離れて、ばらばらの玉葱のようになってしまう。更に進むと骨の1つの層は線維のようになってしまった所見も見られる。骨小管腔は浮腫が高度で、血管の圧迫が強く見られる。ハ管、骨小管の周辺の骨には脱灰の起つている部分が多い。軟部組織では脂肪髄も多くなっている。骨組織の変

性は高度となつているのに修復機能は少しも認められない。

右 耳:

(1) 外耳道上棘: 骨の核は大部分濃縮し、紋理は不鮮明となつている。一部には脆弱化しばらばらになり、あるいは骨小腔の拡大、融合により多孔質化された部分もある。骨は骨小管の増加及び管腔の拡大が著明となつている。切り方によつても異なるが、こゝには楕円形、円形のものが多く見られる。骨内膜層はヘマトキシリンに濃染しており、骨小管腔内には厚い結合組織が血管を取り巻き、一部には癰疽状となつたものが充満しているものもあり、又浮腫、軽度の Fibrosis を示すものもある。造骨、破骨細胞、細胞浸潤等は見られない。この骨小管の周囲には、小骨片に脱灰の起つているものがある。骨髓腔は概ね赤色髄であるが、細胞成分が多くなつており、肉芽組織が増殖している。

(2) 乳様洞の外側壁: この部は通常は含気蜂窠が多数に存在する部であるが、この標本では含気蜂窠に相当する部分は、総て骨小管腔を充たす浮腫に軽度の線維組織を含み、所々に小脂肪髄を認め、将来は脂肪髄腔に発展しようとする組織で置換されている。骨内膜は肥厚し、ヘマトキシリンに濃染している。骨の変性は極めて強く、核は濃縮乃至は消失し、全体として比較的ヘマトキシリンに濃染している。骨の脆弱化によるばらばらの所見、骨小腔の拡大、融合による多孔質化、又ハ管を中心として玉葱の如くに輪をなしてばらばらになつている所見等が見られる。ハ管、骨小管腔内はいつも浮腫が高度であり、Fibrosis が認められる。又管腔内血管腔はいつも狭少となつている。骨小管腔より吸収像が見られる所もあるがこれは少なく、増殖像は見当らない。細胞浸潤等の炎症性変化もない。

(3) 乳様突起尖端: 脆弱化した骨組織であり、骨の離断はやはり高度である。しかし乳様洞に比べるとやや軽い。この骨組織もやはり変性の強い所と弱い所とあり、周辺における遊離骨片程脱灰が強くなつている。又染色性も悪く、ヘマトキシリンを薄くとつている。筋肉組織の附着する部位においても変性は強くなつており、脱灰が見られる。他の部位においても核は殆ど消失しており、紋理が不鮮明になつているものが多い。骨組織内にはハ管及び骨髓腔が主に見られ、骨小管は少ない。ハ管は変性の強い骨組織のもの程、管腔内軟部組織の収縮が強く、管腔内血管は閉塞している。骨髓腔は脂肪髄で器質化した結合組織も僅かに見られる。しかし細胞浸潤は

殆ど認められない。

(4) 隅角蜂窠: 骨組織は核の消失又は濃縮、紋理の不鮮明となつている所が多く、骨組織内にはやゝヘマトキシリンに濃染する接合線が断裂しているのが多く見られる。周囲のハ管、骨小管、骨髓腔の骨内膜層の部分はヘマトキシリンに濃染しており、骨破壊腔に骨の増殖が行われている部分もある。斯かる新生骨は比較的エオジンを余計に取り、骨質はやゝ緻密になつている。しかし軟部組織には造骨細胞は存在しない。骨小管は幾分増加しており、この腔内軟部組織には浮腫が強く、Fibrosis が僅かに認められる。更に骨小管腔がすでに脂肪髄となり、小骨髓腔となつているものも見られる。骨小管よりの骨の吸収は明らかでない。別な部分にかなり大きな肉芽組織が認められる。外骨膜層、結合組織の高度に肥厚した所見である。

(5) 乳様洞: 骨の新生、変性が高度に繰り返された所見で、骨の紋理が減茶減茶になり、又骨の脆弱化が強く、骨の離断所見が著明となつている。核の消失したものは少なく、多くは骨小腔は拡大し核が濃縮しているが、紋理は不鮮明となり更に脱灰化が見られるものが多い。殊に軟部組織に囲まれている小骨片はその傾向が強い。軟部組織では骨小管腔が増加しハ管も増加している。この腔内における浮腫、Fibrosis は乳様洞の外側壁とはほぼ同様である。1個の大なる破壊腔内の軽度の細胞浸潤、浮腫、軽度の Fibrosis を示す軟部組織の中に一見含気腔と見られる数個の小腔があるが、これ等はその内容より見ると骨髓腔に発展途上のものであり、斯かる軟部組織からは骨髓腔が発生して来る事が明らかとなつた。

(6) 闊闊蜂窠: 骨の脆弱化はやはり高度で、骨の離断が強く、小骨片に分離している。このばらばらになつた骨は変性が高度で、染色性が悪くなり、ヘマトキシリンに薄く染まつている。核の濃縮乃至は消失も著しくなつている。骨小管周辺に見られる比較的時代の新しい骨は、周辺がヘマトキシリンに染まつている1層の接合線により、周囲の古い骨組織と分れているが、これも強度の所では脱灰化している。骨小管腔はいつも高度の浮腫により血管は圧迫されており、淋巴管の拡張が見られる。この軟部組織には細胞浸潤は認められず、又治療機能も全然見られない。

(7) 上鼓室の新生骨: 骨、骨小管腔、骨髓腔及び比較的硬くなつた結合組織の入り混つた所見である。骨の離断所見が強く、小骨片に分れ、骨の核は大部分が消失し、紋理は不鮮明となり高度のものは死骨化している。

骨質の線維様となっているもの、脱灰の著明なものの等変性は強く、殊に周辺の軟部組織内のものが高度のようである。骨組織内にはハ管が多く見られる。ハ管内には浮腫が強く、Fibrosis も僅かながら認められる。骨髓腔も多く見られ、赤色髄の所も脂肪髄の所もあり、肉芽組織の形成されている所もある。又骨の周囲には手術時の出血が認められる。

(8) 槌骨：手術時に砧骨や上鼓室内増殖骨組織と共に、骨性に癒着していたものである。槌骨小頭は槌骨柄に比べ、Osteoporose の状態が著しい。変性の強い骨組織には、骨小管が周囲の骨破壊により著しく拡大されており、腔内には浮腫、Fibrosis が強く、又細胞浸潤が認められる。血管は縮小しているもの、拡張しているもの等種々であるが、拡張しているものは概ね腔内に血球の充満しているのが見られる。この骨小管腔より骨の新生の見られる部分もあるが僅かである。槌骨柄においてもやはり同様の所見であり、槌骨小頭に比べるとやゝハ管が多いようである。ハ管腔内の血管腔は閉塞しているものゝ如くである。槌骨柄の骨小管腔には細胞浸潤は認められない。耳小骨連鎖としての役目は恐らく果さず、却つて異物的存在となつて伝音には邪魔になつていたように思われる。

(9) 砧骨：ばらばらになつた骨組織は変性の程度の種々の小骨片の集りであり、全く強度の Osteoporose の状態を呈している。骨小管、骨髓腔周辺のものは、核の濃縮、紋理の不鮮明となつているものが大部分であるが、その他のものは染まりが悪く、骨の脱灰や線維様化をきたし変性が高度である。ハ管腔は結合組織の増殖が強く、血管の閉塞は高度である。骨小管、骨髓腔は多くは管腔の拡大が見られる。大型のものゝ血管は拡張し、血管腔内には大抵赤血球が充満しており、その周囲には細胞浸潤が軽度で認められる。骨髓腔は脂肪髄であり、器質化している部分も見られる。

(10) 骨性耳管：骨組織は時代の新しいもの、古いものすべて変性が高度で死骨化している。核は殆ど消失し、紋理は不鮮明となり骨質は染まりが悪くなつていく。紋理のやゝはつきりしているものもあるが、これは層板が脱灰のために染まりが悪くなつて、恰も紋理の如く見えるのである。骨はハ管、骨小管を中心として離断が強く、ばらばらになつていく。このハ管、骨小管内の浮腫はいつでも高度であり、Fibrosis も認められる。一部のハ管、骨小管内には厚い結合組織が形成されているものがあり、いつでも血管の圧迫が強い。しかし細胞浸

潤は認められない。又この部分では骨髓腔は認められない。

(11) 解剖学的錐体尖：骨の核の濃縮、紋理の不鮮明等が見られるが、骨性耳管の部より変性の程度が軽い。骨の周囲の軟部組織の大きなものは殆どが骨髓腔であり、脂肪髄、赤色髄が見られる。ハ管腔には浮腫が高度であり、骨小管腔には Fibrosis、浮腫が認められる。これ等の軟部組織よりの治癒機転は殆ど認められない。

術後経過：左耳手術後、術前には存在しなかつた耳鳴が「ジー」と時々聞えた。この耳鳴は7%重曹水60cc + ビタミン B₁ 100mg 静注後は「ゴー」と変化し、間もなく消失した。この耳鳴は断続しながら約10日間続いた。術後約2週間はガーゼ交換時創内に抗生剤を注入する際に色々耳の中で音がし、又他の音は響くようであると答えていた。少し動かすと眩暈があり、屢々嘔吐したが、経過と共に次第に回数は減少していた。術後2週以後、創内の滲出液が多いので、術後18日目には抗生剤の創内使用を中止した。術後20日目に色々な音を聞かせたが、やはり響くけれども音にはならないとの事であつた。左耳術後25日目に右耳を手術した。第1例同様に続いて絶対安静を保たせたが、それでも屢々眩暈、嘔吐があり、その程度は左耳の時より強かつた。しかし聴力は左耳に比べるとかなり良く、創内にはガーゼが充填されているのに、術後6日目頃まで、意味はわからないが人間の大声は聞えていた。これ以後は創内の滲出液のため、聴力は低下してしまつた。右耳手術後17日目繃帯交換時に遮眼の上、右耳の横で手を叩いた所、自分で手を打つ真似する。左耳の横で鑼子2本を互にぶつける音を聞かせた所がカチカチと答えた。この頃から再び聴力が徐々に出てきたようである。左耳手術後47日目(右耳術後22日目)にラジオを、音量を一番大きくして耳の傍で聞かせた。所が両耳共に聞え、左耳より右耳の方が少し良いようだと言えた。意味はわからないが、音の高低はわかるという。ラジオが聞えるので非常に嬉しいと云つていた。手を当てると更に良くわかるが、これは振動が入るので当然と思われる。この時から病室の裏15m位の所の電車の音が聞えるようになり、見えないのに進行方向を指さすようになった。

左耳術後68日間(右耳術後43日間)は絶対安静を取り、7%重曹水+ビタミン B₁ 100mg 静注は78回行つた。初めて起床した時に次の如く云つていた。手術前に音が何も入らなかつたのに、今では色々な音が入る。即ちラジオではドンドン(太鼓の音)、プーアー(ラッパ

図 6 第3例術後4カ月目 オージオグラム

の音), その他にはゴウゴウ (電車の音), ビービー (笛の音) と聞える。又手術前は頭が鉛の如く重かったが, 今は非常に軽いと云っている。この時に左耳より約 20cm 離れて, 小石を空罐に詰めて振った所バチバチと答えていた。左耳術後 88 日目 (右耳 63 日目) にはやはり右耳の方からの聞えがよいと云っていた。術後 60 日目頃には 両耳共に完全に 上皮化完了した。左耳術後 97 日目より骨導補聴器を付けたが, これで聞くと少し大きな音なら大体それらしい意味の事を答える。それで骨導補聴器をつけて, 単語の発音を練習させる事に努めた。術後 4 カ月目のオージオグラムは図 6 又遮眼書字法は図 7 の如くである。

術後半年目の遠隔成績では, ラジオは単純な音なら普通の音でわかる。又発音はよくなっていると。家人の話では耳洗をした後などは非常に聴力がよいようである。しかし普通の会話はまだ無理だとの事であった。

第3例総括: 幼児期に所謂中耳炎に罹患し, それを慢性化させたために小学校 1 年の頃より高度難聴となり, 言語の特殊教育を受けなかったために, 我々には到底聴取できないような言語となつてしまった。左側は仮性真珠腫を生じたが, 右側は仮性真珠腫性ではなかった。レ線では典型的慢性側頭骨炎の像を呈していた。オージオグラムでは骨導は全く引つ掛からず, 僅かに低音部の骨導のみであった。人の声は耳の傍でどんな大きな声を出しても声も聴取できない。

この両耳に対して両側々頭骨炎根治手術及び水平半規

図 7 第3例術後遮眼書字法 (左 遮眼時)

上 大 次 郎

管部分切除術を施行した。両側共に仮性真珠腫の存在を想像していたが, 左側には認めたが, 右側には認めなかった。

耳小骨連鎖は両側共に高度に骨性に癒着していた。両側共に乳様洞, 上鼓室の骨増殖は甚だしく, 殊に左側では何処が乳様洞か判らない位であった。水平半規管よりの骨増殖が最も甚だしかった。鼓室の肉芽は肉芽と云うよりは寧ろ癰痕の感が強く, 強硬という感じの部分が多かった。前蜂窠列は軟らかい罹患骨が続き, 又脆弱の感が強かった。

術後聴力は側頭骨炎根治手術で側頭骨内病竈が清掃されただけでは改善されず, 両耳共に黄色を呈した水平半規管の部分切除術を施行して, 内外淋巴液が漏出すると, 両耳共 20 年振りに笛のビーと人の声の音だけが少しく判るようになった。術後創内の滲出液の増加する時期は聴力は落ちるが, 上皮化と共に上昇し, 術後オージオグラムは図 6 である。術後半年目の問合せに対しては, ラジオは単純な音なら普通の大きさで判る。言語の発音は大分良くなったが, 普通の会話は未だ無理との事であった。

組織学的所見は骨の変化は極めて強く, はゞ第1例に匹敵する。骨の核は概ね消失又は濃縮, 偏在し, 骨小腔の拡大融合しているものもある。骨の紋理は不鮮明となり, あるいは骨層板の部が染まりが悪くなり, その中間

部がヘマトキシリンをとり、却つて異常な層板の紋理が見られる所もある。更に接合質の変化により脆弱化し骨がばらばらになった所見も見られる。又骨の新生破壊が長年月繰り返されたために、含気蜂窠が発育すべき部分に、時代の新しい骨、古い骨、いろいろの時代の骨が存在し、極めて複雑な構造を呈している。

次に本例では主に脂肪髄ではあるが、骨髓組織が非常に多い。即ち乳幼児期に相当程度以上の側頭骨骨髓炎になった場合には、通常の含気蜂窠の発育はできない。而もこのような骨病変の高度の場合には、全体が緻密骨で修復される事はなく、骨髓腔、あるいはそれに類似の広義の骨小管を埋めている如き組織で病的骨組織の間隙は埋められて、軟部組織と骨部との均衡を保とうとしている。しかしこの程度の骨病変は到底自力によつて破壊吸収して、これを新生骨で置換する事は不可能であり、又骨病変は軟部組織の治癒を妨げ、広義の骨小管内腔には浮腫、Fibrosisを認め、血管を圧迫し体液循環を障碍し、益々治癒を遷延せしめている。

斯かる変化は隅角蜂窠天蓋、鼓室天蓋、錐体尖前面骨においても同様で、従来の骨内板を出せば手術を終りとする事は誤りであり、骨の変化が悪ければ硬脳膜を露出して骨内板も除去する側頭骨炎根治手術が合理的な事が、組織学的にも証明された訳である。

耳小骨連鎖の骨病変も極めて高度で、周囲より管状に破壊せられた腔が見られ、内腔は浮腫、血管の拡張、一部にはすでに脂肪髄に変化した所も見られる。耳小骨は元来硬固の骨組織で、ハ管、骨髓腔がこのように認められる事はない。左側は槌骨小頭のみで周囲肉芽組織に仮性真珠腫が侵入し、右側は槌骨、砧骨共にOsteoporoseを呈している。斯かる耳小骨は治癒の妨げ、又伝音の妨げはしているが、伝音の役目は全くしていない。Myringoplasty, Tympanoplasty, Myringostapediopexieの際は注意を要する所見である。

左側水平半規管より増殖した骨、その膜様迷路壁を探索した所見を述べよう。元来骨性内耳の骨は極めて緻密硬固の上等の骨である。この骨が孔だらけになっている。その腔は浮腫を主とした軟部組織で埋められ、一部は骨髓腔となり、更に仮性真珠腫の侵入も認められる。これは骨破壊腔に血管、肉芽が侵入し、斯かる所見を呈したもので、通常の營養を司るハ管が骨破壊によつて拡大したものとは趣きを異にしている。内部の膜様半規管は黄色を呈し、明らかに斯かる骨小管腔を介しての慢性内耳炎の発生もあり得る事が証明された。斯かる変化は

蝸牛においても想像せられ、斯かる骨病変、慢性半規管炎が除去されれば蝸牛が減荷せられ、ある程度その機能が回復し得る場合の存在する事は想像に難くない。この事は第2例においても同様に考えられる。

症 例 4

患者：平○高○、1年7カ月、8

初診：昭和30年10月8日

主訴：右耳漏（壺型）

家族歴：特記すべき事はない。

既往歴、現病歴：生後4～5カ月目位より襖の開閉に気付いたり、一寸した物音に振り向いたりしていた。半年目位から、わけのわからない事を云つていたが、物音には敏感で動作に現れていた。生後1年2カ月目に麻疹に罹患したが、その後より屢々38～39°Cに発熱し、耳漏があつた。しかし大体1日位であつたのでその儘経過した。この頃より難聴が現れたようだが、麻疹の時に受けたストマイ注射のためだろう。又この鼓膜なら聞えない訳がないと云われていて両親も大して気に止めなかつた。生後1年6カ月目に夜だけ38～39°Cに発熱し、5日間続いた。約20日間感冒と云われて治療を続けている中に、右耳漏に気が付き来院した。

初診時耳科的所見：右耳鼓膜緊張部、弛緩部共に膨隆肥厚し、幾分発赤があり、後上部には穿孔があるように思われる。左耳の鼓膜は発赤腫脹が強い。又両側扁桃肥大及びアデノイド増殖症が見られた。

経過：右急性穿孔性側頭骨含気蜂窠炎及び左急性側頭骨含気蜂窠炎の診断の下に、左耳鼓膜穿刺により粘液膿性の滲膿を認めたので、鼓膜切開を行い、加療により急性炎症は消退したが、両鼓膜の肥厚混濁は消失せず光沢を欠いていた。通院中には扁桃炎による発熱により、2～3度急性増悪症状（耳漏）を繰り返した。その後経過を観察していたが、聴力は殆どないようで、発語は奇妙な声を出すだけである。以前の如く物音に振り向く事もない。試みに聴力検査を行つてみた所、1000サイクル、2000サイクルでは気導で最高音を出すと思つて眼を動かす程度である。しかし当時は両親に壺型の恐ろしさが全く判らず、積極的に治療する気もなく、耳漏を止めればそれで良く、その中に聞えて来るだろう。又ストマイなら止むを得ない位でいた。その後扁桃炎による発熱を屢々繰り返し、両鼓膜は陥凹が次第に強くなり、光線は依然として認められなかつた。翌年の昭和31年9月に祖父と母親が漸く壺型者の恐ろしさに気が付き、今度は積極的に何とかして呉れと依頼してきた。そこで側頭骨

の状態を知るためレ線撮影を行った。

Stenvers レ線写真所見：左耳は乳様洞、後半規管周囲より发育せる蜂窠は、ある程度まで発達しているが、その小蜂窠群は辺縁がぼけている。乳様突起尖端、S 状洞周囲部は不鮮明となっており、骨融解竈も認められ、骨髓炎様である。乳様突起上陵はやゝ陥凹しており、乳様蜂窠の发育が阻碍されていると考えられる所見である。上半規管、後半規管は陰影がはっきり認められる。錐体尖はやゝ不鮮明となっているが、蝸牛殻の陰影は概ね認められる。右耳は乳様洞、後半規管周囲より发育せる蜂窠は左耳より大きく、鱗部蜂窠にも及んでいる。而もこれ等小蜂窠群は辺縁の割合はつきりしているもの、不鮮明なものが混在しており、左耳同様に一部に骨融解竈が見られる。乳様突起部上陵は不鮮明となっている。水平半規管、後半規管、蝸牛殻は陰影がはっきりしており、錐体尖はやゝ不鮮明である。

レ線写真より側頭骨炎の存在が明らかとなったが、先ず誘因を除くべく、両側扁桃摘出術及びアデノトミーを行った。翌日の鼓膜所見は右耳は緊張部に陥凹があり、後上部は混濁している。左耳は緊張部がやゝ陥凹しているがやゝ色調が良くなつてきている。しかしそれ以上には鼓膜は回復せず、レ線所見より病竈を取るべきであると考え、両耳手術を行った。

昭和31年9月25日左保存的側頭骨炎根治手術、10月6日右保存的側頭骨炎根治手術を行った。

左耳手術所見：型の如く耳後切開より入るに、乳様突起部表在性蜂窠は、その配列が乱れており、骨はやゝ脆く海绵状となつている。含気蜂窠被覆組織はやゝ浮腫状に肥厚して所により粘液性膿を含んでいる。乳様突起尖端は炎症に侵されて海绵様になったものか、又は蜂窠が未だ发育しないで骨髓組織を含み海绵様を呈しているものか不明であつた。S 状洞後部蜂窠及び闊膵蜂窠の一部は死骨様となつていた。錐体乳様洞周囲部の変化は強く、殊に上半規管附近より錐体後蜂窠列、後上蜂窠列は最も死骨化が強い。これ等を及ぶ限り搔爬した。上半規管の中の弧形下道にはなお病変を認めたが、森田-Frenckner 法は行わなかつた。上鼓室を清掃して、鼓膜、耳小骨は可及的に保存した。

右耳手術所見：表在性蜂窠は骨組織が柔らかく、海绵状となつており、蜂窠の配列が乱れている。乳様洞附近の蜂窠は肉眼的所見は比較的良く、被覆組織の浮腫を認めるのみであるが、骨の脆弱化は相当にあり、鋭匙でばらばら搔爬された。乳様突起尖端は海绵状となり、死

骨化している。闊膵蜂窠もやはり一部の骨が脆弱化し、死骨化しており、この部より深部闊膵蜂窠を経て後頭頸に到るまで、海绵状の骨が続いており、死骨化が見られる。又この部を搔爬していた所、後下蜂窠列が意外に大きく、内耳道の下まで死骨化した骨が続いていた。頬骨蜂窠の部は大分大きい、その内容は健康な蜂窠ではなく、海绵状の骨の中に小蜂窠が点在し、骨は脆くなつていた。この部を搔爬し、左耳同様に上鼓室を清掃し、保存的に術を了した。

病理組織学的所見：手術時に側頭骨各部より採取した組織片を軟部と共にツエロイジン包埋し、ヘ・エ重染色、ワ染色により検索した。

左 耳：

(1) 外耳道上棘：骨は比較的变化の少ないものと、新生破壊が繰り返され変化の強いものがある。しかし概ね骨は核の大部分が消失しており、紋理の不明なものが多い。殊に小骨片においては骨組織の染まりが悪くなつており、更に骨質が線維様になつているものが混在している。又骨小腔が融合したり、拡大したりして多孔質化の所見を呈している部分もある。更に一部の骨は脆弱化しており、骨の断裂が多くなつているが、これは変性の強い骨に見られる。ハ管、骨小管にはいずれも浮腫及び Fibrosis が認められる。含気蜂窠はかなり見られ、上皮細胞は概ね一層で僅かに肥厚しており、上皮層は浮腫性に10数倍に肥厚し、骨膜層が僅かに肥厚しているもの、あるいはその変化が少しく強く膿性滲出物を有するもの、あるいは肉芽組織様の变化を認めるもの等種々の階梯のものが見られる。造骨細胞の認められる部分もある。

(2) 乳様洞の外側壁：骨は比較的紋理の明らかなものから、不鮮明となつているもの、高度の所では線維様となつているもの迄種々混在している。核は大部分が濃縮しており、変性の強い骨では概ね消失し、又骨小腔が拡大しているものが多い。この変性の強い骨組織は変性の弱い部分に比べ、やゝヘマトキシリンを余計に取つてゐるが、全体としての染色性は低下している。ハ管、骨小腔内には浮腫が強く、Fibrosis が見られる。含気蜂窠上皮組織は僅かに肥厚しているもの、相当に肥厚増殖しているもの等種々の階梯のものが見られる。上皮層には概ね強い浮腫が認められる。この部には細胞浸潤の認められる所がある。含気腔内には膿性滲出物がある。又上皮層が数倍に増殖肥厚し、上皮は肉芽組織様になつている所もあり、骨内膜層に造骨細胞の並列が見

られる部分もある。

(3) 乳様突起尖端: 手術の際には蜂窠は發育していないで骨髓組織を含む海綿様罹患骨と思われたが、組織学的検索では含気蜂窠組織が認められた。即ち含気蜂窠被覆上皮は肥厚増殖しており、又上皮細胞は立方状となり、上皮下層には浮腫が強く、細胞浸潤を認め、上皮層の肥厚増殖の強い部分では肉芽組織様になっている。又一部においては結合組織の増殖が多くなっている。含気腔内には炎症性滲出物が認められた。骨組織は核の消失が目立ち、且つ骨小腔の拡大が多くなっており、紋理は不鮮明となつていくものが多い。一部の骨は比較的良好、紋理の不鮮明、核の濃縮、消失、骨小腔の拡大等を示すのみで、エオジンに淡染しているが、一部の骨は破壊が甚だしく、大小の孔だらけとなり、Osteoporoseを呈している部もある。斯かる腔はハ管の骨破壊により拡大したと考えられるものもあるが、骨小腔が拡大融合し、それに肉芽が侵入したと考えられるものもある。大なるものは骨破壊腔を形成し、内腔には浮腫、Fibrosisを認める。血管腔内は貧血を示し、細胞浸潤等の急性炎症症状はすでに極めて軽度となつていく。

第1例、第3例の極めて初期の症状と考えられる。即ち含気蜂窠炎は軽度の部もあるが、かなり高度の部もあり、骨炎も同様の所見である。しかし未だ新生骨に乏しく、従つて Umbau に乏しい。

(4) S状洞後部蜂窠: この標本は骨と骨髓組織より成り、含気蜂窠はこの部には未だ發育していない。骨髓組織は脂肪髓、赤色髓より成り、概ね細胞成分が増加し、一部には器質化が見られる。骨は一樣に紋理不鮮明となり、核の消失せる部分が多い。一部の骨小腔の拡大、ハ管の拡大、周囲よりの窩状吸収、その反対側には造骨細胞の並列を見、Osteoporoseの初期の所見を呈している部分もある。即ち狭義の骨髓炎の所見を呈している。即ち斯かる所見と鼓膜所見を対比する時は、化学抗生物質の害の甚大なのに一驚する次第である。

(5) 闊門蜂窠: 骨組織は紋理が不鮮明となり、核の濃縮乃至は消失をきたしており、その間に不規則に断裂した接合線が多い。この骨組織に、更に新生骨が附加している所見が見られ、更に軟部組織より窩状吸収がこの新生骨に起つていく所見がある。窩状吸収の部位に類骨組織の現われている所もある。これに接する含気蜂窠被覆上皮は数層に増殖しており、上皮下には浮腫が強く見られ、細胞浸潤もやゝ多くなっている。上皮下層には肉芽組織の増殖の見られる部分もある。含気腔内には出血

が強いが、これは手術時のものである。この標本においては広義の骨小管が1ヶ所認められるだけで、この部においては骨の新生により腔は縮小しており、腔内には浮腫が見られる。骨組織内よりの破壊吸収は少なく、周囲骨壁よりの吸収破壊が著明で、一部には骨新生、類骨組織を認め、含気腔被覆組織の変化も強く、従来称えられた急性乳様突起炎の組織学的所見である。而して元来側頭骨の骨組織にはハ管はそれ程多くはない。

第1例、第2例、第3例に見られる広義の骨小管は病的骨に対抗して、あるいはこれを修復せんがためにできた腔で、本来骨の營養を司るハ管とは少しく趣きを異にしている。含気蜂窠隔壁に両側の被覆組織骨膜層より營養されるから健康であればハ管はそう沢山ある必要はない。即ち長年月の間の Umbau の結果できた所見である。

(6) 後、後上蜂窠列(山下法): 骨組織は染まりが悪くなつており、ヘマトキシリンを薄く取つて、全体として死骨化の傾向があり、又肉芽組織の中に死骨化した小骨片を認め、又器質化した骨髓組織に接して死骨化した小骨片を認める部分もある。核は大部分が消失し、骨小腔は拡大し、紋理は全く不鮮明となつていく。骨組織の周囲には窩状吸収が著明に認められ、造骨細胞も少しは見られるが、破壊機転の方が著明である。骨小管腔は以前の骨増殖のために縮小しており、腔内には浮腫が強い。含気蜂窠は上皮が肥厚し、数層に増殖している。上皮下には浮腫、細胞浸潤が多くなり、一部には肉芽組織が認められる。

右 耳:

(1) 外耳道上棘: 核は大部分の消失をきたし、紋理が不鮮明の所及び錯綜の著しい部分と、核が濃縮しているが、紋理の割合に認められる緻密化している部分とが混在している。後者の骨壁には造骨細胞の並列が多く、骨の増殖所見が認められる。骨小管は不整形に拡大しており、骨破壊腔の急性炎症症状が消退し、次第に修復されて行く所見で、腔内には浮腫が著明で Fibrosis が強い。又器質化も見られる。ハ管はいづれも浮腫のために血管の圧迫が強い。骨の吸収所見は著明ではないようである。周囲の小骨片においては変性はやゝ強くなつており、紋理が不鮮明となり、ヘマトキシリンを余計に取り、更に骨組織の断裂が認められる。左耳においては含気蜂窠が認められたが、右耳においては全く見られない。これは炎症により破壊せられたものであろう。

(2) 乳様突起尖端: 造骨細胞が更に多く見られる。

即ち骨壁には1～数層の造骨細胞の並列があり、ハ管、骨小管内にも多く認められる。この部分において新生骨も見られるが、この所見は造骨細胞に比しては少ないようである。造骨細胞に取り囲まれている骨は核の濃縮が見られるが、紋理の鮮明なもの、不鮮明となっているもの、骨の染まりが悪くなっているもの等種々である。これ以外の部位においては骨の変性は高度となっている。又筋組織に附着している部分の骨組織は、骨質が恰も筋線維の如き様相を呈している。含気蜂窠被覆上皮は数倍に増殖し、上皮下には細胞浸潤が強く、結合織が増殖している。造骨細胞の存在する部分の軟部組織には、浮腫、結合織の増殖が見られ、更にこれが骨髓、主に脂肪髓に移行している。要するに高度の骨変性を伴った含気蜂窠炎、骨髓炎の所見であるが、左耳手術後11日間抗生剤療法を行って後の所見であり、斯かる高度の骨病変を伴った側頭骨に対しては、扁桃剔除、アデノトミー、化学抗生物質療法がいかに無力かを示す所見で、聴力保持のためには早期の保存的側頭骨炎根治手術がいかに大切かを如実に物語っている。

(3) 鱗部蜂窠：古い骨組織はヘマトキシリンを薄くとり、骨の紋理は不鮮明となり、核の消失が目立っている。又骨小腔も拡大している。この骨組織には骨小管腔及び周囲の骨壁より骨の新生が行われている。即ち軟部組織には1～数層の造骨細胞の並列が見られる所があり、その部分に骨の新生が認められる。又破骨細胞も別な部分に見られる。広義の骨小管腔内はすでに器質化されたものが多く、又浮腫が認められるものもある。辺縁には細胞浸潤が軽度で存する。又肉芽組織様になっている部分もある。含気蜂窠は小なるもの2個と大なるもの1個が見られるが、その被覆上皮はやゝ肥厚し、上皮下組織には浮腫が強い部分、あるいは一部上皮下組織がすでに器質化された部分、内腔に滲出物を認める部分がある。

(4) 後頭顆に達する病竈：骨組織は、変性の種々の階梯の小骨片に分れている。骨の核は消失し、紋理は不鮮明となっているものが多いが、肉芽組織内の小骨片は変性が殊に強く、ヘマトキシリンに濃染しており、骨基質は不規則な濃淡の模様を画き、周辺の肉芽組織よりの窩状吸収により鋸歯状の骨壁を形成している。しかし又別の骨片においては骨壁に造骨細胞が見られ、骨の新生されている部分もあるが少ない。骨の周辺軟部組織は主に赤色髓であるが細胞成分が増加し、一部分に肉芽組織が見られる。

(5) 頬骨蜂窠：骨の変化は極めて高度で、核の濃縮

乃至は消失、骨小腔の拡大、多孔質化、紋理の不鮮明な骨組織に破壊が起り又骨の新生が何回にも起った事を示している。骨組織内には不規則に断裂した接合線が認められ、骨壁には類骨組織の形成が見られる。又時代の新しい骨との境にも類骨組織が現われている。ハ管及び骨小管よりも骨の新生が認められ、管腔は縮小している。管腔内には浮腫が強いが細胞浸潤はない。軟部組織の含気蜂窠は、上皮は数層に肥厚増殖している。上皮下には浮腫が極めて著明である。この上皮下層が肉芽組織様になっている部分があるが、細胞浸潤は軽度である。

術後経過：左耳手術直後鼓膜は陥凹がとれ、肥厚もやゝ減少し光錐が現れた。当時アリナミンが神経性難聴に用いられ始めたので、術後2日目より毎日5mgずつ180mg使用した。最初繃帯をしていたせいか、術後の聴力は判然としなかったが、術後6日目にトラックが通った時に振り向いて、その方向を見るようになった。左耳手術後11日目に右耳手術を行った。左耳同様に鼓膜の陥凹が消失し、光錐が出現した。右耳手術後5日目からは、電車が通ると何も見えないのに指さして、あつちへ行つた、こつちへ行つたと方向を示すようになり、14日目にはラジオを聞きたいと駄々をこね、耳を傍に持つて行き聞く事が屢々となつた。右耳手術後17日目に約1m離れて普通の声でお早ようと声を掛けるとすぐ振り向き、再び同様な事を間を置いて行くと、同様に振り返る。左耳は術後30日目に繃帯を除去した所、腕時計を耳に当てゝいる。而も回診時にはブザーが鳴るが、これが鳴ると、腕時計と両方を指さして同じだという。試みに夜小さくノックしたが、振り向かずにはドアの方を指で教える。左耳手術後35日目に初めて口の中でぶつぶつ云い出した。術後47日目紙芝居の柏子木の音がすると、全然見えないのにそちらの方を、反対で聞えるとその方向を向く。又眠覚し時計を耳の傍からだんだん遠ざけると、耳をその方に持つて行き、後ろに持つて行くと振り向く。左耳術後50日目より1日中意味のわからない事を云っていた(プー、バー)。その後も大体同様に経過し、約2年後には戸を閉める音で振り向いたり、後ろ向きから大声を出すや振り返ったりする状態であるが、意味のわかるような言葉は話さない。鼓膜は術前の状態より遙かに改善され、僅かに混濁を見るが光錐もあり、非常によい所見であるが、聴力検査ができないので、数字で表わす事はできない。言語の世界には未だ戻らないが、しかし残聴は相当にあるように思われるので、更に今後の経過を観察し、側頭骨炎根治手術、内耳

手術、あるいはローゼンテックニクによる耳小骨連鎖の修復を行う考えである。

第4例総括：2年6カ月の幼児・1年2カ月の時に麻疹に罹患し、その際に所謂両側急性中耳炎に罹患したらしい。その後時々38～39°Cの発熱、耳漏があつた。その頃より難聴が現れたらしいが、麻疹時に受けたストマイ注射のためだろう。又この鼓膜ならば聞えない訳はないと云われてあまり気にも止めなかつた。1年6カ月の時再び38～39°Cの弛張熱が現われ、20日間感冒として治療を受けたがよくならず、耳漏に気付いて来院した。その際は既に音に反応しなくなっていたが、正確な検査もできず、両親も難聴、嚔の恐ろしさに気付かず、その中に話すようになるだろう位でいた。

2年6カ月になつても全く音に反応せず、勿論言語の修得も皆無のために今回は手術をしてでも何とかならぬものかと来院した。

鼓膜は所謂中耳炎残胎症あるいは慢性中耳加答児であり、レ線では両側慢性側頭骨炎であつた。

本例に対して先ず両側口蓋扁桃摘出並びにアデノトミニーを施行し、先ず耳管よりの再感染を防禦し、次に保存的側頭骨炎根治手術により乳様洞より入口部、上鼓室を経て鼓室に流下する膿汁を止めた。

斯くて鼓室、前蜂窠列、前下蜂窠列及び錐体尖に対して化学抗生物質療法を行った。

組織学的所見を要約すれば高度の慢性含気蜂窠炎、骨炎、骨髄炎である。含気蜂窠被覆上皮は背が高くなり、増殖し、上皮下の組織層には浮腫、細胞浸潤を認め、あるいは既に器質化されている部分もある。鬱血、充血を認める時期は遙かに通り過ぎている。骨膜層も肥厚している。所により造骨細胞の並列を見、又類骨組織を認める部分もある。又変性、死骨化した骨組織を運び去るための破骨細胞による窩状吸収も見られる。

骨組織は核の濃縮はあるが、未だ層板の紋理も比較的判り、染色性が変化してヘマトキシリンのとり方が僅かに多い比較的变化の少ないものから、核は消失し殆ど染色されない高度の死骨化した骨組織、あるいは変性し紋理の全く不鮮明のもの、更に骨層板の部が染まりが悪くなり、その中間帯は却つてヘマトキシリンを余計にとり異常紋理を示すもの、骨小腔が拡大し、融合し、多孔質化したもの、あるいは骨基質が融解し、線維様化したもの等種々の階段の変化が見られる。

しかし第1例、第3例に見られた破壊、新生を繰り返し、時代の新しい骨と古い時代の骨が錯綜して存在し、

正常な側頭骨とは全く別個の構造となり、即ち吉田の謂う Umbau の高度の所見を呈し、更に接合質が変化して骨は脆くなり、ばらばらになつた所見は極めて少ない。又骨破壊腔、骨小腔の Fibrosis も第1、第3例より遙かに少なく、これ等の腔内の脂肪髓の出現も遙かに少ない。

即ち斯かる所見が幸いに髄膜炎、敗血症等により生命を落さずに3～5年と経過すれば第1例、第3例の如く、骨の変化と軟部の変化との均衡がとれて、却つて骨病変を修復するだけの氣力がなくなり、即ち細胞浸潤、造骨細胞の出現、破骨細胞の出現等はなくなり、浮腫、Fibrosis、貧血が現れ、骨も修復されず、病的骨は又軟部の治癒を妨げ、癒るでもなく、癒らぬでもない所見を呈するものと考える。

症 例 5

患者：宮○加○○・2年6カ月・♀

初診：昭和31年5月1日

主訴：嚔

族家歴：特に記す事はない。

既往歴、現病歴：出生時は仮死状態であつたとの事である。生後2カ月目より先天性股関節脱臼で加療を行っていた。生後半年目位には片言を話し、時計の音や雑音にもよく目を覚したという。キブスをかけた頃（生後6カ月の終り頃）百日咳に罹患し、40°Cに発熱した。耳の熱ではないかと云われて耳鼻科に受診したという。その後、生後8カ月目頃より音がしても全然反応しなくなり、頭も後ろに反るようになり、小児麻痺の諸検査を受けたりしたが、その方は異常がないとの事であつた。生後1年目にビタミンB₁の注射を40本行つたが変化なく、転々として診察を受けたが、異常がないとか、2、3年後でなければわからないとか、あるいはストマイによるものだろうと云われたが、諦めきれず来院した。

初診時耳科的所見：右耳の鼓膜緊張部は浸潤肥厚が著明であり、やゝ陥凹している。後上部は肥厚しており、発赤が強い。左耳は後上部より外耳道にかけて骨性膨隆が強く、槌骨柄より後上部の骨性膨隆にかけて鼓膜の肥厚膨隆が著明である。鼓膜の前下部は浸潤肥厚しているが、黄色に内腔の滲出物潑溜が透視される。鼓膜全体としては陥凹している。左鼓膜穿刺にて抵抗があり、粘液膿性の潑溜を証明した。メチレンブラウによる単染色を行つたが、白血球と、剝離した上皮細胞を認めるのみであつた。右鼓膜穿刺では鼓膜の抵抗が更に強く、血性膿性の潑溜液を多量に証明した。取り敢えず両側鼓膜

切開を行った。鼻内所見では両下甲介の腫脹が強く、発赤あり水様性鼻汁が多い。常に口をあいており、又流涙も非常に多かった。アデノイド増殖所見があり、咽頭扁桃もかなり肥大している。

Stenvers レ線写真所見：右耳は乳様洞周辺に骨融解竈が認められる。乳様蜂窠は全体に不鮮明となっている。乳様突起先端も同様である。乳様突起上陵はやゝ陥凹しており、従つて弓状隆起は高くなっている。上半規管、後半規管は不鮮明ではあるが認められる。左耳も大体同様であるが、乳様突起上陵の陥凹は右耳に比べると少なく、弓状隆起も高くない。

レ線写真所見より慢性側頭骨炎が証明され、鼓膜所見、鼓膜穿刺所見よりこれが回復は手術以外には望めないので初診後6日目に入院した。

昭和31年5月7日両側扁桃摘出術及びアデノトミーを行い、更に右保存的側頭骨炎根治手術を行った。同年5月21日に左保存的側頭骨炎根治手術を行った。

右耳手術所見：耳後切開により入った所、外耳道上棘より後方乳様部の骨表面には骨小管の拡大が見られ、且つ褐色に変色していた。外耳道上棘直下で乳様洞の外側にある蜂窠には黄色を呈した漿液性粘液性膿が充満していた。乳様洞も同様となり、含気蜂窠被覆組織は浮腫性に腫脹一部分は黒褐色となっていた。S状洞は強く前方に突出し、乳様突起部天蓋硬脳膜も低くなつており、典型的な危険性側頭骨で、レ線写真で推定した通りであった。乳様洞より上鼓室にかけても漿液性粘液性膿が充満しており、隅角蜂窠にかけて骨は海綿状死骨化が強く、蜂窠の隔壁はぼろぼろである。乳様突起先端は蜂窠の発育が悪く、殆ど蜂窠らしきものは見られず、海綿状となり死骨化していた。頬骨蜂窠を搔爬し、迷路周囲部を特に慎重に搔爬した。弧形下道は黒褐色に変色しており、森田・Frenckner 法により搔爬を行った。上鼓室で耳小骨の周辺には肉芽組織の形成があり、粘液性膿が充満していた。これ等を除去して術を了した。

左耳手術所見：外耳道上棘より後方乳様部には骨小管の拡大が著明であり、更に後方の骨壁は菲薄となり、青く透けている所見であつた。骨の鑿開を行うに、表在性蜂窠の骨組織は死骨化して軟らかく、一部は褐色となっていた。透けて青色を呈した部分である。且つ蜂窠内には粘稠膿が充満しており、乳様洞にも同様の所見が続いていた。隅角蜂窠の発育は良好であるが、死骨様となり、闊膵蜂窠は発育が不良で海綿状となり、乳様突起先端も同様に蜂窠の発育が悪く、更に死骨化が著しい。外

耳道上部蜂窠、頬骨蜂窠は発育は良いが、やはり骨組織は死骨化し、粘稠膿及び肉芽組織が充満しており、濃厚膿汁も随所に見られた。迷路周囲蜂窠、殊に後、後上蜂窠列は死骨化を呈し、十分に搔爬した。弧形下道は右耳同様に黒色に変色していた。上鼓室は粘稠膿及び肉芽組織更に死骨化の強い骨組織で埋まつており、これ等をできる限り除去、砧骨を露出して術を了した。

病理組織学的所見：手術時に採取した側頭骨各部を骨軟部共にツエロイジン包埋、ヘーネ重染色及びワ染色により検索した。

右 耳：

(1) 外耳道上棘：かなり大きな含気蜂窠が1ヶ所認められる。この上皮は数層に増殖しており、上皮直下には高度の細胞浸潤竈が3ヶ所あり、更に多形核白血球、円形細胞、形質細胞、好酸球、組織球等が出現している。而も上皮下層の浮腫、Fibrosis が強い。上皮下層の血管周囲にも細胞浸潤が強く、又鬱血が見られる。含気腔内には剝脱した上皮細胞、白血球を含む滲出物を認める。骨組織は核の濃縮、消失し、紋理は全く不鮮明となっている部分が多い。一部には骨小腔が拡大している。この等の骨組織は骨と軟部組織が交錯し、軽度のOsteoporoseを呈している。軟部組織は炎症により細胞が増加、細胞浸潤、所により器質化、骨髓腔よりの窩状吸収が見られる。骨髓腔には赤色髄、脂肪髄が見られ、又明らかに骨破壊腔が修復される途上のもの、又ハ管が骨破壊により拡大され、その中に細胞浸潤、Fibrosis、周囲の造骨細胞の並列を見るもの等種々の所見である。明らかに含気蜂窠炎、骨炎、骨髓炎の混在した所見である。これが手術時に外耳道上棘附近に認められた褐色の小孔の組織学的所見である。

(2) 乳様突起先端：骨組織と軟部は骨髓組織より成り、含気蜂窠は認められない。骨は核の消失が多くなり、紋理の不鮮明な古い骨組織が大部分である。骨小管腔、骨髓腔の骨内膜層に当る部分には造骨細胞の並列があり、周囲に骨新生が認められる。骨小管腔内は主に肉芽組織であり、骨新生の一方においては吸収所見も見られる。小骨片殊に肉芽組織内にあるものは変性が更に強くなっている。骨髓腔では脂肪髄、赤色髄共に認められ、浮腫、細胞増加、更に肉芽組織、骨壁には窩状吸収、造骨細胞の並列も認められ、骨髓炎の所見である。骨組織の筋組織に移行する部分では骨組織が恰も筋組織の如き所見を呈している。

(3) 隅角蜂窠：やはり骨組織と軟部は骨髓組織が主

である。骨は核の消失が多く、骨小腔の拡大しているものも多い。紋理は不鮮明となり小骨片のものは染まりも悪くなっている。ハ管あるいは骨小管においては一度吸収が起り、後に増殖により管腔が縮小された所見を呈する。新旧の骨の境の接合線はヘマトキシリンに濃染している。管腔内には浮腫が強く、所々に造骨細胞も見られる。骨の周囲を占める骨髓腔は脂肪髄及び赤色髄で、細胞はやゝ増加しており、辺縁に造骨細胞が僅かに認められる。且つ骨の新生所見に僅かであり骨壁よりの吸収像も著明ではない。この骨髓腔は通常ならば含気腔となるべき部分であるが、恐らく頻回の急性増悪により含気蜂窠として發育できず、斯かる骨髓腔になったものと思われる。骨に接して肉芽組織が見られ、骨髓腔内には器質化を認める部分もある。

(4) S 状洞壁： 骨の核の消失しているものが多い、骨小腔の拡大しているものがあり、骨が多孔質状となっているものが辺縁に近く見られる。又紋理は大部分が不鮮明となり、一部に錯綜が著しい。骨小管、骨髓腔周辺には骨の新生が見られ、中には管腔が骨に埋められて消失している所見も2～3ある。骨小管腔、骨破壊腔は器質化されたものが多い。即ち炎症はハ管を通り頭蓋腔内に入り、ハ管周囲を破壊拡大し、それが骨小管腔となり、骨破壊腔となり、あるいは骨髓腔を破壊して同様の所見を呈し、炎症は硬脳膜で喰い止められ、その後次第に修復が進み、このような所見を呈しているものである。骨髓腔は主に赤色髄であり、肉芽組織が屢々認められる。又骨壁に近く器質化も強い。

(5) 鱗部蜂窠： 骨の核の消失、紋理の不鮮明は更に著明で骨質は染まりが悪くなっている部分が多い。骨質には数条の鋸歯状の接合線の走行を認める。骨の吸収により拡大した骨小管の内腔には肉芽組織が増殖しており、この骨内膜層に当る部分は1層の造骨細胞の並列があり、これに接して類骨組織も僅かに認められる。而もこれが更に肉芽組織により吸収されつゝある所見も見られる。含気蜂窠被覆上皮は核がやゝ円味を帯び数層に肥厚増殖している。上皮下層には浮腫があり細胞浸潤が強くなっている。含気腔内には手術時における出血が見られる。

(6) 乳様洞： 軟部組織に囲まれた骨の変性は高度である。核の濃縮、消失、紋理の不鮮明、不規則な鋸歯状の接合線の見られる骨組織は染まりが悪くなっており、周囲より僅かながら吸収が行われている。又骨片が全く死骨化してしまったものもある。やゝ拡大した広義の骨

小管より骨の増殖が行われた形跡があるが、骨組織が全体として変性に陥っていると考えられる。含気蜂窠被覆上皮は数倍に肥厚増殖し、上皮下には細胞浸潤が高度となっており、浮腫が認められる。又肉芽組織となつていものがあり、その部に小円形細胞が一聚落を形成している所見も見られる。

(7) 小脳部骨内板： 此の部分は通常は緻密な骨であるが、この骨では孔だらけである。骨破壊により拡大したハ管、骨小管、骨髓腔等が多数見られる。これ等の管腔に近い部分では骨の核は濃縮しており、その他の部分では消失しているものが多い。紋理は不鮮明となつてい所が多く、一部に破壊新生の繰り返しの物語る異常紋理も認められる。骨小管、骨髓腔の表面には造骨細胞も見られるが、骨の新生は著明ではない。骨小管腔には浮腫、Fibrosis が見られる。骨髓腔には細胞成分の増加、細胞浸潤、器質化等の炎症性変化を認める。又肉芽組織の部分では変性した骨に吸収が行われている。

(8) 頰骨蜂窠： 核の消失、濃縮し、紋理が不鮮明となり、ヘマトキシリンに淡染する変性の強い骨組織は、周囲軟部組織により頻回に破壊を受け、更に増殖を繰り返す、辺縁には接合線を境にして時代の新しい骨となつており、このような接合線が数条見られる。而も骨は全体として死骨化し、軟部組織より吸収が行われている。軟部は含気蜂窠組織で、上皮は背が高くなり、核は円くなり、数層に増殖している。上皮直下には細胞浸潤が強く、上皮下層は極端に厚く全く肉芽組織と化している。

(9) 上鼓室： 核は濃縮乃至は消失し、紋理の不鮮明な古い変性の強い骨組織が中心をなし、これに接合線を境にして次第に時代の新しい骨が周りを取り囲んでいる所見である。軟部組織は含気蜂窠被覆組織で、上皮直下の炎症症状は最も強くなつており、高度の浮腫が上皮下層に見られる。即ち慢性乳様突起炎急性増悪の所見である。

左 耳：

(1) 外耳道上棘： 著しく拡大した広義の骨小管腔、含気蜂窠組織により吸収を蒙っている骨組織は、紋理は不鮮明となつてい所が多く、一部の骨においては核も消失しており、骨小腔の拡大が認められる。殊に小骨片においては更に変性が強くなつており、死骨化している。骨壁に近づくに従い鋸歯状の接合線が多数現われており、過去の骨の破壊増殖が相当強かつたものと思われる。又骨壁には造骨細胞の並列も見られる。骨の吸収所見は殆ど見られない。ハ管は極めて少ないが、いづれも

周囲の骨増殖により縮小されているものが多い。骨小管腔には浮腫が強く、辺縁には肉芽組織が見られる。軟部組織は右耳では骨髓組織が多く認められたが、本側には全く認められない。その殆どは浮腫を主とする上皮下の組織で、中に数個の含気蜂窠が見られ、上皮細胞は背が高くなり、増殖し、周囲に細胞浸潤を認めるものもあり、又周囲が一部器質化されている部分もある。最も特異な点の一部の上皮下にコレステリンの結晶を中心にした肉芽組織ができていて点である。異物型巨細胞がこの結晶の周りに多数見られ、組織球、形質細胞、多形核白血球が認められる。

(2) 乳様洞の外側壁：骨の変性は著明で、ヘマトキシリンにやや濃く染まり、核は濃縮し、紋理は不鮮明となり、骨壁に併行している接合線が、辺縁に近く多数見られる。これは破壊増殖の繰り返された事を示す新旧の骨の境界線である。ハ管は見られない。この骨組織を取り囲む含気蜂窠組織は、上皮が数層に増殖し、上皮層直下には細胞浸潤が見られ、上皮下層は殆ど器質化され、又肉芽組織となり、骨の吸収が軽度に行われている。

(3) 乳様突起先端：骨組織は核が消失し、紋理は不鮮明となり、ヘマトキシリンに淡染しており、全体として死骨化している。この骨組織には周囲の肉芽組織による吸収が僅かながら見られる。最も特異な点は軟部組織の変化で、含気蜂窠の上皮が1～数層の立方上皮となり、上皮下には(1)と同様にコレステリンの結晶を中心とした肉芽組織が見られる。やはり異物型巨細胞がこの結晶の周りに多数見られ、組織球、形質細胞、多形核白血球が認められる。

(4) 隅角蜂窠：骨は同様に核は消失し、紋理は不鮮明となり、鋸歯状になった断裂した接合線が骨質内に多数見られる。骨はヘマトキシリンに淡染しており、全体として死骨様になっている。骨の破壊吸収の認められる部分も僅かであるが見られる。含気蜂窠上皮組織は核がやや円味を帯びており、肥厚している。軟部組織の器質化が極めて強く、上皮下は肉芽組織様になり、炎症性細胞浸潤も多くなっている。

(5) S状洞壁：この標本では含気蜂窠が非常に少ない。そのあるものは上皮細胞が立方状となり、上皮下の浮腫を主徴候とし、骨膜層には造骨細胞の並列を見、あるいは上皮下の層は器質化され、所により肉芽、あるいは破骨細胞による著明な骨吸収が認められる。骨の核は濃縮乃至は消失している部分もあるが、割合よいものもある。骨の紋理は不鮮明な所が多くなり又不規則に錯

綜している部分もある。周囲に見られる小骨片は変性が更に強くなり、死骨化している。拡大した骨小管腔を含む軟部組織の骨内膜層に当る部分はヘマトキシリンにやや染まり、造骨細胞の並列しているものが多い。骨壁においては、骨の増殖の行われている部分、吸収の行われている部分が混在している形である。而も骨は全体として変性は強くなっている。骨小管腔内には血管の拡張が見られるが、概ね腔内は空虚であり、又周囲には浮腫が認められ、細胞浸潤も僅かに見られる。

(6) 鱗部蜂窠：この標本は殆ど骨組織のみで含気蜂窠の所見は全くない。骨の核の消失が多くなり、紋理は不鮮明となつて全体として変性が強くなっている。僅かに認められる紋理は通常とは全く逆な染まり方になっている。小骨片においては、ヘマトキシリンに淡染し、全く死骨化してしまつてしまっているものもある。この部分では骨の断裂も著しくなっている。この小骨片の周囲には鬆疎な結合組織が見られるが、吸収又は増殖等の機転は見られない。ハ管は内腔が収縮しており、浮腫が僅かに認められる。骨壁には肉芽組織が所々に認められ、この部分に骨の吸収所見が見られる。

(7) 乳様洞天蓋：骨組織の核は概ね消失し、骨小腔の拡大している所見が多い。紋理は不鮮明となり、骨はヘマトキシリンに淡染して死骨化している部分が多い。ハ管、骨小管腔には時代の新しい骨が管腔を半ば埋めているが、この骨も変性が高度となつている。骨小管腔内は浮腫が強くなっている。軟部組織は鬆疎な結合組織が大部分で、脂肪髄も僅かに認められる。この部に血管の拡張している所もある。軟部組織の細胞浸潤は軽度となつており、骨の吸収が僅かに認められる。斯かる骨組織が硬脳膜に接して存在する時は、硬脳膜は肥厚して病気の頭蓋内進展を防禦している。

(8) 闊轔蜂窠：骨の核の大部分は濃縮しており、一部には消失しているものがある。古い、紋理の不鮮明な骨組織の周囲に接合線を境にして時代の新しい骨が何回となく増殖しており、従つて鋸歯状の接合線が多くなっている。而も骨は全体としてヘマトキシリンに淡染しており、変性は高度となつている。骨の周囲の軟部組織からは、骨の窩状吸収が僅かながら認められる部分がある。軟部組織の変化は(1)、(3)と同様に特異である。肥厚増殖した上皮層があり、その下にかなり厚い肉芽の層があり、その下にコレステリンの結晶を中心にして厚い肉芽組織の形成が著明であり、細胞浸潤が強い。

(9) 頬骨蜂窠：骨組織はヘマトキシリンにやゝ濃染しており、ハ管、骨小管を中心にして、又骨壁に併行する如く多数の接合線の走行が見られる。接合線は又他の接合線により切断され、鋸歯状をなしているものが多い。骨の核は濃縮しているものもあるが、消失している所が多く、核の消失した骨小腔が拡大して多孔質化している所も見られる。骨の紋理は古い骨組織になるに従い、不鮮明となつていく。ハ管、骨小管の内腔には浮腫が強く、Fibrosis の形成があり、骨壁より骨の吸収の見られる部分、頬骨組織の形成が認められる部分がある。又管腔内の高度の浮腫のため、血管が圧迫されている所も見られる。含気蜂窠被覆上皮は、核が円くなり、数層に肥厚増殖しており、上皮層には浮腫、細胞浸潤が認められる。又 (1), (3), (8) と同様にコレステリンの結晶を中心とした厚い肉芽組織の形成されているものがあり、鬱血、細胞浸潤が強い。

(10) 後蜂窠列 (山下法)：骨の核は殆どが消失しており、紋理は不鮮明となり、骨組織はヘマトキシリンにやゝ濃染している。骨組織内には鋸歯状の接合線が多数見られ、過去の破壊治癒機転を物語っている。変性の高度のものは紋理も核も消失してしまつて単一の組織になつていく。僅かに存在するハ管腔内には浮腫が著明である。骨の周辺には肉芽組織が認められるが、この部分よりの骨の吸収所は見られない。(1), (3), (8), (9) と同様にコレステリンの結晶を中心とした厚い肉芽組織塊も認められる。

(11) 上鼓室：核は濃縮乃至は消失し、紋理の不鮮明な骨組織内には多数の鋸歯状の接合線の走行が、骨小管を中心にして、又骨壁に併行して見られる。ハ管、骨小管腔には浮腫と共に Fibrosis が強くなつており、管壁には新生骨が附加している所見があり、その反対側には窩状吸収の行われている部分が見られる。含気蜂窠の上皮は数層に増殖肥厚しており、上皮層には又浮腫も強くなつており、この部に拡張した血管も認められる。

術後経過：右耳術後は毎日耳内及び耳後創に抗生剤を注入した。又鼻内にも同様に噴霧し、併せて術後咽頭処置を行った。術後の食欲減退と出血のため、3回ビタミン B₁ C 加ブドウ糖の皮下注射を行った。術後の鼓膜所見の改善は著しく、右後上部の肥厚、腫脹は減退し、鼓膜はやゝ薄くなり、色調が良くなつた。しかし術後の聴力は機嫌の悪いのか判然としなかつた。右耳

術後 14 日目に左耳の手術を行った。右耳と同様に抗生剤の注入、ガーゼ交換を行った。術後の鼓膜の改善はやはり著しく、後上部の骨性膨隆は減少し、緊張部の浸潤、肥厚が減じてきた。右耳術後 24 日目にオーディオメーターで、気導音、骨導音を入れて見た。気導音ではいずれも反応しなかつたが、骨導音では両耳共に 3000 サイクルを除く全サイクルで、40～50db の音を入ると泣き出した。又この音を小さくすると泣き止む事が判つた。術前にはオーディオメーターで音を入れても反応はなかつたのであるから、聴力が改善されていると考えられた。右耳は術後 24 日目より通気加鼓膜マッサージを行い、左耳は術後 20 日目より同様の治療を行った。術後創は順調に経過し、退院前には両鼓膜共に光錐が現われた。右耳術後 38 日目 (左耳術後 24 日目) に退院したが、その日家に帰つてから柱時計の音が 6 時以後を告げると、3 つ目の音がする頃からじつと時計を見詰めるようになった。又手術前は元氣のない子であつたが、手術後は非常に元氣がよくなつて一時もじつとしていなくなつた。又整形外科にて先天性股関節脱臼はよく入っているのに歩かない訳はないと云われていたが、退院少し前には膝を立てゝ這うようになり、退院後間もなく摺り歩きをするようになり、見違えるように発育が良くなつた。退院後 1 カ月位からラジオの音を少し大きくすると、きよろきよろして音を探す動作が多くなつた。又約 3m 離れて大きな声で〇〇ちゃんと云うと泣き止んで振り向く。退院後約 2 ヶ月目に仏壇のチン、チンという鐘の音がわかるようになった。約 3 ヶ月目より食卓台に汁器を並べる音を立てると、遊んでいて見えない筈なのにすぐ食卓台の方を向き近づいて来る。術後約 2 年目には約 3m から手を叩くと、振り向いて音を確かめる。家人は以前に比べると、音に対しては非常に敏感であると云つていたが、未だ言葉の世界には戻つてこない。両鼓膜は術前の陥凹が消失し、色調は非常に良くなり、光錐が認められ、鼓膜としては正常に近い状態である。この時の聴力検査は泣き出してしまい、不成功であつた。先天性股関節脱臼による歩行困難も、2 年後には少し跛であるが一人で歩行できるようになつた。

第 5 例総括：先天性股関節脱臼を持って生まれた氣の毒な幼児である。生後半年で百日咳に罹患し、その際に広義の中耳炎に罹患した。生後 8 カ月頃より音に対して全く反応しなくなつてしまつた。その後転々として治療を受けたが、異常がないとか、2～3 年後でなければ判らない。又は百日咳の際に注射したストマイのためだ

ろうと云われていた。又先天性股関節脱臼の方も、入っていると云われながら掴まり歩きもできなかった。

耳鼻科的には両側鼓室に膿瘍を認め、慢性鼻炎、アデノイド増殖症、その他に流涙を認めた。小児科的には精神薄弱児ではないか、小児麻痺ではないかと云われ、腰椎穿刺を受けたが、全く不明であった。

線的には両側慢性側頭骨炎が認められた。

本例に対し両側口蓋扁桃摘出、アデノトミーを施行し、先ず耳管からの再感染の原因を除き、耳管を開通せしめ、両側保存的側頭骨炎根治手術を施行し、乳様洞入口部より上鼓室を経て耳小骨連鎖、鼓室に流下する膿汁を止め、鼓室、前蜂窠列、前下蜂窠列、錐体尖に対して化学抗生物質療法を行った。

組織学的所見は、右耳の骨組織は核の膿縮、消失、あるいは骨小腔の拡大、更にこれ等が融合し、多孔質化を示している。骨質は変性し、層板の紋理が不鮮明となり、あるいは全体として染まりが悪くなり、更に高度のものは死骨化している部分もある。又以前に破壊、増殖を繰り返した所見として、新旧の骨組織が鋸歯状のヘマトキシリンに染まる接合線を境として存在している所見が多数に見られる。

造骨細胞の並列、類骨組織の出現、窩状吸収等も見られる。

軟部組織では含気蜂窠炎は上鼓室、乳様洞で最も強く、上皮の肥厚増殖、上皮下の細胞浸潤、浮腫、あるいは器質化が認められる。しかし Fibrosis は未だ著明ではない。又本例においては狭義の骨髄炎の所見が非常に多く見られる。即ち細胞成分の増加、細胞浸潤、骨髄組織の器質化、周囲骨壁における造骨細胞の並列、窩状吸収等が見られる。

要するに高度の慢性含気蜂窠炎急性増悪、慢性骨炎骨髄炎の所見で、広義の急性側頭骨骨髄炎を惹起し、更に耳管を介しての再感染が繰り返されるために、常に急性増悪が繰り返されている所見である。

左耳は右耳に比し骨病変は余り変りはないが、最も特異な点は外耳道上棘、乳様突起尖端、闊闊蜂窠、頬骨蜂窠、後蜂窠列で、肥厚増殖した上皮層下に薄い結合組織の層があり、その下にコレステリンの結晶が多数に存在し、その塊を中心にして厚い肉芽組織がこれを取り囲んでいる。異物型巨大細胞がこの結晶の周囲に多数に現われ、組織球、形質細胞、多形核白血球が認められる。

次に全体として右耳に比し、骨髄組織が少ない点、肉芽組織、器質化による結合組織が非常に多い点、浮腫、

Fibrosis が余り見られない点が異なっている。

コレステリン結晶の出現に就いては Handschüller-Christian 病も考慮されるが、これだけの検索では断言する事はできないが、極めて稀に斯かる所見を呈する事もある事は否めない事実である。

本例は斯かる所見を呈した骨病変が除去されると、先ず患児は食欲が進み、元気になり、精神薄弱児ではないかと云われた児が見違えるようになり、先天性股関節脱臼で掴まり歩きのできなかったのが、間もなく掴まり歩きができるようになった。聴力は言語の世界には戻れないが、物音に対する聴力は非常に良くなった。

症 例 6

患者：岩〇 〇・4年6カ月・8

初診：昭和31年5月8日

主訴：聾 啞

家族歴：特に記す事はない。

既往歴、現病歴：生後1年半目より、ウマウマ、モウモウ（牛）、トト（魚）、ボー（僕）等と言い、生後2年位でチャーチャン（お母さん）、妹をマチ、マチ（真知子）と呼んでいた。その間生後1年10カ月目に百日咳に罹患し、ストマイ3本（量不明）の注射を受けたという。百日咳治癒後も変りがないように見えたが、生後2年半頃より云う事は言つても物音に次第に反応しなくなつた。それと共に次第に言葉を忘れて行つた。専門医より異常はないと云われたが、生後3年2ヶ月目に某大学病院でストマイによるものだろうと診断され、ビタミン注射を3ヶ月間行つた。しかしこの頃には全然言葉を発しなくなつた。生後4年5カ月目にアデノトミーを行つたという。更にその1カ月後には望みはない、駄目だろうとの事で、アリナミンでも気休めに服用して見たらと云われた。

初診時耳科的所見：右鼓膜は陥凹が強く、緊張部及び後上部は浸潤肥厚していると思われる。弛緩部は浸潤肥厚している。鼓膜穿刺を行つた所、抵抗があるが滲出液は認めない。左耳は後上部が僅かに陥凹しており、全体として浸潤肥厚している。他に扁桃肥大があり、アデノイド増殖症も一度手術を受けているがまだ存在している。

Stenvers 線写真所見：右耳は乳様蜂窠が乳様突起尖端まで發育しているが、一部は不鮮明となり、一部は骨髄炎様になつている。殊に乳様洞周辺部は更に不鮮明化が著明となつている。乳様突起上縁はやゝ陥凹している。後半規管の部分は辺縁が明かではないが、上半規

管、蝸牛殻の陰影はよく認められる。錐体尖は僅かに不鮮明化している。左耳の乳様蜂窠の發育は右耳と同様である。乳様突起尖端にはかなり大きな蜂窠が認められるが、辺縁はいずれも不鮮明化している。一部には骨髓炎様となっている部分も認められる。乳様洞周辺部には小蜂窠群があり、後半規管、水平半規管附近は不鮮明化が強い。上半規管は認められるが、弓状隆起は高く突出し、乳様突起上陵は陥凹が強い。錐体尖はやゝ不鮮明化している。

聴力検査を行つたがはっきりしない。しかしどうも残聴はあるように思われる。而も鼓膜所見、レ線写真から慢性側頭骨炎が存在しており、ストマイで片附けてしまう前に手術による罹患骨の除去こそ先決問題である。よつて下記の如く手術を行つた。

昭和31年5月14日両側扁桃摘出及びアデノトミー後、右保存的側頭骨炎根治手術、5月28日左保存的側頭骨炎根治手術を行つた。

右耳手術所見：表在性蜂窠はやゝ大きく、發育は良好である。蜂窠の隔壁は柔らかく、脆弱となっているが、蜂窠内には炎症性滲出物は存在しない。しかし乳様洞に近づくに従い、海綿状となり死骨化が著明となつてゐる。闊隔蜂窠も海綿状となり、骨は脆弱化し、粘液膿性の滲出物が認められた。後頭顆に達する病竈は後頭顆まで殊に死骨化が著明で、膿性滲出物が多量に存在していた。後蜂窠列、後上蜂窠列の部分では海綿状死骨化した部分を除去後、割合硬い骨組織の下に更に罹患した小蜂窠群が認められた。後半規管、水平半規管の周囲には粘液膿性滲出液が認められ、死骨化した骨組織があり、迷路周囲部を奇麗に搔爬し、骨性三半規管を露出した。上鼓室は被覆組織が浮腫性を呈していたが、耳小骨は肉眼的には異常がないので術を了した。

左耳手術所見：表在性乳様蜂窠は右耳と同様に割合に發育がよく、大きい。しかし蜂窠内軟部組織はやゝ浮腫状となり、乳様洞周囲部は海綿状となり、骨は脆弱となつて死骨化している部分が見られる。乳様突起尖端には大蜂窠が認められたが、蜂窠隔壁は脆くなり、軟部組織の浮腫が著明である。闊隔蜂窠は深部にかへ海綿状死骨化していた。頬骨蜂窠、乳様洞は骨が柔らかく脆弱となり、且つ膿性滲出物を認めた。迷路周囲部、後蜂窠列を清掃し、骨性迷路を露出し、上鼓室を搔爬清掃して術を了した。

病理組織学的所見：手術時に採取した側頭骨各部を骨軟部共にツエロイジン包埋、ヘ・エ重染色、及びワ染

色により検索した。

右 耳：

(1) 外耳道上棘：骨組織の核は概ね消失し、所々に濃縮している部分が認められる。骨小腔の拡大が多数見られ、又紋理は大部分が不鮮明となつてゐる。又新旧の時代の異なつた骨が隣接して存在し、その接合線が離断した所見も見られる。小骨片においては、更に変性が強くなつてゐる。ハ管、骨小管腔には Fibrosis が著明となつており、不整形に拡大した骨小管においては、血管腔は拡張しているが腔内は空虚となつてゐるものが多い。斯かる不整形に拡大した骨小管の管壁には造骨細胞の並列が見られ、骨の新生が周囲に起つてゐる。又変性の強い骨組織においては、骨小管が半ば時代の新しい骨により埋められてゐる所見もあるが、この時代の新しい骨も又変性に陥つてゐる。他の部分の骨小管や含気蜂窠の骨壁からは骨の吸収が起つており、全体として見ると骨の増殖所見より吸収の方が優つてゐる。含気蜂窠被覆上皮は肥厚しており、上皮下には浮腫が見られ、一部には肉芽組織様となつてゐる部分が認められる。結合織の多い部分では骨の吸収も強い傾向にある。含気腔内には変性、壊死に陥つた少量の細胞を含む滲出物が見られる。骨髓組織は全く認められないが、骨小管内の軟部組織には一部脂肪髓に変化しようとする所見が見られる。

(2) 乳様洞の外側壁：含気蜂窠被覆上皮は大部分が肥厚しており、一部には数層に増殖している部分が見られる。上皮下層は厚い結合織となつてゐる所、浮腫の著明な所もあるが、又肉芽組織様になつてゐる所見も多い。この骨壁には窩状吸収が多数見られる。上皮下層にはやゝ拡張した血管があり、細胞浸潤が中等度に見られ、含気腔内には出血、及び炎症性滲出物が認められる。古い骨組織においては核は消失し、骨の以前の破壊吸収を示して紋理は錯綜しており、又不鮮明となつてゐる所も多い。骨小腔の拡大も認められる。接合線を境にして時代の新しい骨が附加している所にも窩状吸収が顯著である。

(3) 乳様突起尖端：骨組織は核が大部分消失しており、且つ骨小腔は拡大しており、紋理は不鮮明となつてゐる。又一部の紋理は錯綜している。又骨小腔の拡大融合による多孔質化を認める部分もあり、更には線維様化している部分もある。ハ管内軟部組織は概ね収縮しており、骨内膜の部分はヘマトキシリンに濃染する帯状となつてゐるものが多い。広義の骨小管においては管腔内は浮腫が強い。又 Fibrosis の著しい部分もある。骨内膜

層の濃染はハ管同様である。一部には造骨細胞の並列している部分も見られ、骨新生の行われている所見が認められる。含気蜂窠は上皮が肥厚し、上皮下には浮腫が見られる。又上皮下層は肉芽組織となっている部分も多い。この骨壁には骨の吸収所見が多く見られる。含気腔内には炎症性滲出物が多量に認められる。骨髓腔では脂肪髄が僅かながら存在している。

(4) 隅角蜂窠：骨は核が濃縮乃至は消失しており、骨小腔の拡大している所があり、紋理は不鮮明となっている。一部においては変性は更に強くなり、骨は染まりが悪くなり、多孔質化が著明となっている。ハ管、骨小管においては軟部組織はやゝ収縮している所が多い。この骨小管内には肉芽組織が見られ、変性した骨組織に窩状吸収が行われている。又他の部分には造骨細胞が僅かながら認められる所がある。含気蜂窠は上皮が肥厚し、上皮下には浮腫が強くなっている。一部に僅かながら肉芽組織が見られる。含気蜂窠の骨壁には、鋸歯状の接合線を境にして時代の新しい骨組織が認められるが、これ等においても又吸収が起っている。骨髓組織は認められない。

(5) S 状窩後部蜂窠：核は濃縮乃至は消失しており、所々に骨小腔も拡大している。紋理は不鮮明の所が多く、鋸歯状の接合線が新統している変性骨で、この周辺には肥厚した肉芽組織が認められる。この軟部組織より僅かに骨の破壊吸収が行われている所見が見られる。含気蜂窠、骨髓組織は全く認められない。

(6) 上鼓室の外側壁：大部分の骨は核の消失が顕著で、紋理は不鮮明となり、骨小腔もやゝ拡大しているものが多い。(5)と同様に断裂した鋸歯状の接合線が多数認められる。小骨片においては変性の程度は更に強くなっている。これ等の骨に接合線を境にして時代の新しい骨が見られるが、やはり核は消失し、紋理もやゝ不鮮明化している。軟部組織に接する骨壁には造骨細胞の並列が見られ、新生骨が僅かながら認められる。含気蜂窠の上皮は軽度の肥厚増殖を認めるが、上皮下の組織、骨膜層は概ね器質化されたものが多い。ハ管は内腔に浮腫の認められるもの、半ば増殖骨により埋められているもの等が少数認められる。

(7) 闊角蜂窠：骨は核の濃縮乃至は消失しているもの多く、紋理は錯綜し又不鮮明となっている。この骨組織内には異常にヘマトキシリンに濃染した接合線も多数現われている。又骨が多孔質化している所見も僅かながら認められる。骨小管及び蜂窠の骨壁からは、骨の窩

状吸収及びそれに伴って造骨細胞の並列が見られる類骨組織及び新生骨が附加している所見が認められる。骨小管腔には浮腫が強くなっているが、細胞浸潤は殆どない。含気蜂窠上皮組織は1～数層に増殖肥厚しており、上皮下には浮腫、結合組織の増殖している所見が軽度に認められる。又肉芽組織となっている部分もある。

(8) 後下蜂窠列 (Kramm 法)：骨は核の消失、紋理の不鮮明化、染色性の変化を示す変性の強いもの、核が濃縮しており、紋理の錯綜しているもの、又不鮮明のもの、核は消失しており、紋理が通常と逆に染まっているもの等、種々の変性の度合を示す小骨片に分れている。ハ管は内腔に浮腫の認められるもの、内腔の収縮しているもの等があり、造骨細胞の見える部分もある。軟部組織からは主に窩状吸収が行われているが、反対側に造骨細胞を伴う骨の新生が僅かながら認められる。軟部の上皮下層には浮腫が強くなり、一部は肉芽組織となっており、上皮は数層に増殖している。骨髓腔は極めて多いが、骨髓組織の特有の構造は失われ、浮腫の中に骨髓性の円形の細胞が点在する所見を呈するものが多い。又器質化している部分もあり、この中に存在する小骨片は全く死骨化している。

(9) 後頭顆：骨は核が消失し、紋理は不鮮明となり、変性が強い。小骨片のもの程死骨化しており、ばらばらになっている。この周辺に肉芽組織及び骨髄組織があり、僅かながらこの変性骨に吸収が見られるが、骨の新生はない。別の部分においては軟骨組織が見られる。即ち入り組んだ骨髓腔の見える骨組織に接して、軟骨細胞と共に軟骨組織が存在している。この軟骨内にハ管を中心にして骨組織に変化しつつある部分が認められ、骨髓腔に接する軟部組織の部分でも骨に変化している部分がある。即ち軟骨性化骨がなお認められる。骨髓腔は主に赤色髄であるが、正常の骨髓組織の構造は全くなく、浮腫、器質化が認められる。

(10) 頬骨蜂窠：骨細胞が今までの標本に比べるとやや多くなっており、核は大部分が濃縮しており、消失しているものは少ない。紋理は不鮮明な所が多く、一部分は錯綜しており、且つ骨は緻密化している。この骨組織には広義の骨小管がやゝ多く認められた。この骨小管腔内には1～2～3個の血管があり、周囲は概ね器質化されており、Fibrosis も認められる。これ等はハ管が骨破壊により拡大されて、内腔に器質化が起きたものと考えられるものが多い。管壁には造骨細胞が並列しており、周囲には骨の新生が僅かながら認められる。小なるハ管

腔内には浮腫が主に見られる。含気蜂窠被覆上皮は肥厚し、一部において増殖した所見がある。上皮下層は軽度浮腫が見られ、細胞浸潤が僅かに存在し、肉芽組織形成の部分では細胞浸潤は高度となつている。この骨壁には造骨細胞の並列している所があり、接合線を境にして新生骨が附加している。

(11) 後蜂窠列(山下法): 中心をなす古い骨組織は核の大部分が消失し、紋理は不鮮明となり染まりが悪くなっている。これに接合線を境にして時代の新しい骨が何回となく附加されており、紋理は錯綜しているが、これ等の骨も変性に陥り、軟部組織よりの窩状吸収が随所に見られる。含気蜂窠上皮組織はやゝ肥厚しており、上皮下の浮腫が著明である。一部には肉芽組織となつている所があり、この部に取り囲まれた骨組織は変性も更に著明である。僅かに存在する骨髓腔は主に赤色髄であり、周辺には器質化している部分がある。

左 耳:

(1) 外耳道上棘: 核の大部分の消失、紋理の不鮮明化している骨組織は、一部は骨小腔が融合し、拡大して多孔質化している部分があり、又染まりが悪くなりばらばらになつているもの、線維様化しているものがある。骨小管腔には時代の新しい骨が附加しており、半ば骨小管を埋めている所見である。両者の時代の異なる骨組織の接合部は殊に離断が甚だしい。ハ管も同様に時代の新しい骨組織により埋められている所見で、中には埋め尽されたものもある。骨小管腔には浮腫及び Fibrosis が強くなり、中心の血管は圧迫されているが細胞浸潤は認められない。又造骨細胞の並列も見られない。器質化した骨髓が見られ肉芽組織が混じっている赤色髄である。含気蜂窠被覆上皮はやゝ肥厚しており、上皮下層の浮腫は軽度である。又細胞浸潤は殆ど認められない。上皮下層の一部には結合組織が多くなり、器質化された肉芽組織が見られる。含気蜂窠の骨壁には造骨細胞の並列している部分があるが骨新生の行われている部分は少なく、一方には含気腔内壁及び骨小管内壁より窩状吸収が行われ、その後肉芽組織が侵入していつている所見が見られる。含気腔内には古い炎症性滲出物が認められる。

(2) 乳様洞の外側壁: 核の消失が著明であり紋理の不鮮明な骨組織は染まりが悪く、ヘマトキシリンをやゝ余計に取り、変性の強い部分では骨の脆弱化を示してばらばらになり、又線維様になつている所もある。又骨小腔が拡大している部分も認められる。ハ管、骨小管腔には時代の新しい骨が附加している所見が多くなつてい

る。管腔内には結合組織が多いが、Fibrosis の著明な部分もある。含気蜂窠の上皮は肥厚しており、一部には増殖している所がある。上皮下には浮腫が強く見られ、Fibrosis があり、軽度に細胞浸潤が認められる。又一部には上皮が肥厚増殖し、上皮下の組織は全く肉芽状の所も見られる。この蜂窠の骨壁には主に窩状吸収が見られ、骨の新生像は弱い。骨髓組織は殆ど認められない。

(3) 乳様突起尖端: 骨の核の濃縮している所もあるが大部分は消失し、且つ骨小腔は拡大しており多孔質化をきたしている。紋理は錯綜している部分も見られるが多くは不鮮明化している。ハ管腔、骨小管腔にはいずれも浮腫が強くなつており Fibrosis がやゝ多く認められる。管壁には骨の破壊吸収機転は認められない。斯かる機転は含気蜂窠の骨壁に認められる。上皮は肥厚しており、上皮下層には軽度の浮腫があり細胞浸潤が認められ、この骨壁に窩状吸収の像が散見される。これと反対側の筋肉組織附着部には造骨細胞の並列があり骨新生が認められ又部位によっては窩状吸収が起り、骨の表面は全く粗糙となつている。

(4) 隅角蜂窠: 核は濃縮或は消失し、紋理の不鮮明な所が多くなつており一部に於てばらばらになつた骨組織は全体として染まりが悪くなっている。ハ管を中心とした時代の新しい骨も変性に陥っている。又脱灰化の見える部分もある。含気蜂窠の上皮はやゝ厚くなり、上皮下層には浮腫を認め、軽度の細胞浸潤の認められる部分がある。この骨壁には造骨細胞の並列が見られるが、骨の新生所見は少なく、又破壊吸収の所見も殆ど認められない。

(5) 鱗部蜂窠: 更に骨の変性は著明となり、古い骨組織は核が殆ど消失し、紋理も不鮮明となり、骨質は無構造化している。割合に時代の新しいと思われる骨組織もやはり変性が強い。骨壁には造骨細胞が僅かに認められるが、骨の新生像は認められない。含気蜂窠の上皮はやゝ肥厚しており、上皮下層の浮腫が著明となり細胞浸潤が軽度に認められる。含気腔内には手術時の出血及び脱落した上皮細胞が認められる。この含気蜂窠の骨壁には骨の吸収像が僅かに見られる。

(6) 乳様洞: 骨の核は大部分が濃縮しており、消失している部分もある。紋理はやゝ認められる所もあるが殆どは不鮮明となり、且つ骨は脆弱化しており離断されている所が多くなっている。広義の骨小管腔には結合組織が多く血管の圧迫は著明である。骨小腔の拡大による多孔質化も認められ、ハ管を中心とした時代の新しい骨が

同様に変性し、その接合線で離断されている所見も見られる。含気蜂窠上皮組織は肥厚しているが、上皮下層には浮腫が軽度であり細胞浸潤も殆ど認められない。又一部には器質化が見られる。骨の変性の著しい部分に於ては、骨壁より窩状吸収が見られるが多くない。又造骨細胞の並列は見られない。なお含気腔内には手術時の出血が認められる。

(7) 深部闊窩蜂窠：骨の変化は極めて高度で核は殆ど消失し、あるいは骨小腔の拡大が著明に見られ、紋理は不鮮明となつてゐる。高度の所では無構造化している。又軟部組織に取り囲まれた小骨片に於てはヘマトキシリンに淡染するのみで死骨化が著明である。へ管腔内軟部組織は収縮しており、骨小管腔内には浮腫が強い。一部の骨小管内には肉芽組織が見られ、辺縁には造骨細胞の並列が見られるが、骨新生は認められない。又この辺縁には骨髓組織があり器質化が認められる。含気蜂窠上皮組織はやゝ肥厚し、上皮下には肉芽組織の形成が強く、含気腔内には比較的新しい滲出物が認められる。含気蜂窠の骨壁には骨の新生は見られず、又破壊吸収等の所見も認められない。

(8) 後蜂窠列（山下法）：骨の変化は極めて高度で核は殆ど消失し、紋理は不鮮明となつており、あるいは骨層板の部の染色が悪く、中間がヘマトキシリンに却つて濃染する異常紋理を認め、あるいは該部が脆弱化して骨組織がばらばらになつてゐる。骨小管腔周辺に時代の新しい骨組織が見られるが、骨全体はヘマトキシリンを薄くとり変性は著明となつてゐる。骨小管腔には浮腫が強い。又上皮下層にも同様に浮腫が強くなつてゐるが細胞浸潤は殆ど見られない。造骨細胞は僅かに存在するが骨新生の所見に乏しい。破壊吸収の所見は見当らない。

(9) 頬骨蜂窠：骨の核は大部分が消失しており濃縮している部分が散在している。紋理は不鮮明となつてゐるが骨の変性は最も軽く、エオジンをとつてゐる。他の部位ではエオジンの染色性が減退し、通常とは逆にヘマトキシリンに淡染している部分が殆どである。へ管腔、骨小管腔には時代の新しい骨が附加している。この骨小管腔内軟部組織には浮腫が多く認められ、又結合組織の増殖の強いものがあり Fibrosis も見られる。辺縁には造骨細胞の並列の見られるものがあり骨の新生も認められる。含気蜂窠被覆上皮はやゝ肥厚し、上皮下には概ね浮腫が著明で一部に肉芽組織となつてゐる所も見られる。この骨壁には造骨細胞の並列が見られ骨新生があるが、又一方においては窩状吸収も認められる。

術後経過：右耳手術後創内及び耳後創に抗生剤注入を行つた。術後の経過は良好であつた。手術後5日目に初めて手を叩いて母親を呼んだ。この様な事は生まれて初めてする仕草であつた。9日目からは注射の時にイタイ、イタイと声を出す様になつた。以前はたゞワア、ワアだけであつた。ガラガラ、カンカン等の音を後ろから聞かせると一生懸命に眼を動かして音の方向を探していた。右耳術後14日目に左耳を手術した。術後12回7%重曹水+ビタミン B₁ 10mg の静注を行つた。右耳手術後22日目より通気加鼓膜マッサージを行つた。術後24日目に飛行機の絵を見せるとブーンと声を出す様になつた。次第に快活となり、他人の泣き真似をしてアーン、アーンと泣いて見せたりした。右耳手術後29日目にラジオの音楽を、音量をやゝ大きくして約1m位離れた所より聞かせた所、すぐリズムに乗つて手を振る様になつた。左耳手術後20日目より左耳通気加鼓膜マッサージを行つた。この頃約3m位離れて後ろより笛を吹くと、両耳に指を当てゝうるさいという身振りをする様になつた。右耳手術後70日目頃より訳のわからない言葉をぶつぶつ言い出した。ハイとかイタイ等はかなりはつきり言うのであるが、他の言葉は理解できない。又虎やライオン等の猛獣の絵を見せると、頻りにその鳴き声を真似してウオー等と言つてゐる。更にその後1ヶ月位経つと約4~5m離れて名前を呼ぶと振り返り、食事の時にはゴハンと云うとわかる様になつた。

術後1年8ヶ月目来院時の聴力検査では250~3000サイクルの間は、気導音では60~70db位の所らしい。この部位でしきりに眼を動かし、何か言つてゐる。然しはつきりとは測定できない。未だ言語の世界に入る所までは行かないが、単純な音ならわかるという。

第6例総括：4年6カ月の男子。生後1年10カ月目に百日咳に罹患し、生後2年半頃より物音に反応しなくなつてしまつた。生後3年2カ月に某大学病院にてストマイ聾啞だろうと診断された。その鼓膜所見は両側共所謂広義の中耳加答児、あるいは右側は癒着性中耳炎等と診断される鼓膜である。レ線的には両側共に慢性側頭骨炎が証明された。

本例に対して耳管の開通、耳管よりの再感染予防のため先ず両側扁桃摘出、アデノトミーを施行し、即日右保存的側頭骨炎根治手術を施行した。

組織学的所見は骨の核は概ね濃縮、消失し、その層板の紋理は不鮮明となり、あるいは骨層板の染色性変化のために異常紋理を示し、骨破壊新生のために新旧の時代

を異にする骨組織が隣接して存在し、さらに骨が脆弱化して両者の接合線が離断され、さらに甚だしい所は骨がばらばらになった所見を呈する部位も認められる。血管、広義の骨小管においては浮腫、Fibrosis、あるいは器質化が認められ、これ等による血管の圧迫が認められる。骨髓腔は特殊の部位を除いては極めて少ない。即ち乳芽突起尖端、闊闊蜂窠、後下蜂窠列、後蜂窠列、後頭顆に達する病竈等である。これ等は概ね炎症に冒されている。

含気蜂窠は上皮が肥厚増殖し、上皮下には浮腫、細胞浸潤が見られ、又上皮下の組織層における肉芽組織の発生、器質化が認められる。含気腔内には変性壊死に陥った細胞成分を含む古い滲出物が各所に見られる。

含気腔内壁の骨、広義の骨小管の骨壁内面には各所に骨新生及び破壊が見られる。即ち慢性含気蜂窠炎、骨炎、骨髓炎の所見である。

2週間後に保存的側頭骨炎根治手術を行った左耳は、右耳に比して細胞浸潤等の急性増悪所見は少ないが、骨病変は強く、骨の染色性が悪く、エオジンをとらずに却ってヘマトキシリンに染染する所見を呈する部分が多く、骨小腔の拡大融合による多孔質化、更に高度となり線維様化している部分も認められる。又接合質が変化し、殊に新旧の時代の異なる骨組織の間の接合質が変化して脆弱化され、骨のばらばらになる所見が右耳より甚だしい。骨の新生破壊の所見も右耳よりは著明である。

以上より本例を要約するに1年10カ月の時に百日咳に罹患し、その後化学抗生物質があるがために広義の中耳炎、慢性側頭骨炎に罹患し、遂に聾啞としてしまった。斯かる症例は第2例、第5例と同じく化学抗生物質が現在程発達していなければ、耳漏が出るからこのようにはならなかったであろう。

本例に対するストマイ難聴の診断は更に積極的な診断の後にレ線検査、鼓膜穿刺等の後に決定せらるべきもので、化学抗生物質の発達した今日では鼓膜所見のみで斯かる重大事を決定されては患者がたまらない。軽卒の謗りを免れない。

原因的治療として扁桃摘出、アデノトミー後に強力な化学抗生物質療法が、慢性側頭骨炎、慢性乳様突起炎にどの程度の効果を挙げ得るかの問題も右耳の組織学的所見で自ら明らかである。

要は早期の乳様突起鑿開術、上鼓室乳様突起鑿開術、保存的側頭骨炎根治手術のみが斯かる症例を救い得る唯一の道である。

本例も言語の世界には戻れないが、音に対しては相当の感覚を回復した。

症 例 7

患者： 福〇年〇・2年5カ月・8

初診： 昭和31年3月19日

主訴： 聾 啞

家族歴： 特に記す事はない。

既往歴、現病歴： 安産で生後發育は順調であつた。生後7カ月目に健康優良児として表彰された。襖、障子の開閉に目を覚し、鳴物類の玩具で盛んに遊んでいた。生後8カ月目麻疹に罹患し、40°Cに発熱、かなり衰弱したが、発熱は4〜5日続いた後に下熟し常態に復した。この後も変りがなかつたし、耳の事も気にしなかつた。生後1年目に玩具のピストルが目前で相当に強い音を立てたが眠っていたので、驚いて専門医を転々としたが、何れも耳に異常はないと言われた。生後1年10カ月頃より、ウマ、ウマ、バー、バーと云う事を言っていた。しかし音には全然反応しない。又現在までに耳漏に気付いた事もない。某大学病院を訪れたが、アデノイド増殖症はあるが、それを切除しても聞えるかどうかは判らない。精密検査は5〜6才にならないと出来ないと言われた。

初診時耳科的所見： 右鼓膜は緊張部が肥厚し、黄色を呈しており、やゝ発赤を認める。弛緩部は陥凹しており、光錐は消失している。左鼓膜はやはり全体が肥厚しており、更に発赤を認める。後上部は膨隆肥厚がやゝ強く、黄色を呈している。光錐は右耳と同様に消失している。両側鼓膜穿刺を行った所、抵抗が相当に強く、粘液性膿を両耳に認めた。この膿は主に白血球であり、双球菌が僅かに認められたので、直ちに両耳共に鼓膜切開を行った。

Stenvers レ線写真所見： 右耳の乳様蜂窠は不鮮明となり、乳様洞周辺、闊闊蜂窠、S状洞周辺には骨融解竈が認められ、全体として骨髓炎様である。乳様突起上陵はやゝ陥凹し、弓状隆起は突出している。上、後半規管、蝸牛殻の陰影は認められる。錐体尖は僅かに不鮮明となつている。左耳の乳様蜂窠は不鮮明と骨融解の入り混った骨髓炎様を呈し、乳様洞周辺は不鮮明となつている。乳様突起上陵の陥凹は認められない。上、後半規管、蝸牛殻の陰影ははつきりしている。錐体尖はやはり不鮮明化している。

聴力検査を行ったが、具体的に記載する事は不可能であるが、骨導低音部では何か感ずるようである。しかし

鼓膜所見、鼓膜穿刺所見、レ線写真より慢性側頭骨炎である事は間違いなく、既往歴よりしてこれが内耳にも作用を及ぼして、そのために混合性難聴が高度となつていると考えられた。

昭和31年3月20日左保存的側頭骨炎根治手術、同年4月3日右保存的側頭骨炎根治手術を行った。

左耳手術所見：耳後切開より入るに、表在性蜂窠は發育が良好であるが、含気蜂窠被覆組織は腫脹し、粘液膿性滲腫が蜂窠内に充満している部分が多い。蜂窠隔壁は脆弱となつており、乳様洞、鱗部蜂窠、隅角蜂窠には滲腫が更に著明で、殆ど全蜂窠を充たしていた。乳様突起尖端、闊隔蜂窠も同様で、一部に死骨化した骨組織が認められた。乳様突起上陵骨内板も脆弱化しており、これを広汎に除去、硬脳膜を露出し、更に錐体乳様洞周囲蜂窠を清掃した。この部には死骨化した骨組織が多く、三半規管を奇麗に出すまで搔爬を行った。頬骨蜂窠、上鼓室を搔爬し、砧骨短脚周辺を清掃して術を了した。

右耳手術所見：表在性蜂窠は發育良好であつた。しかしやはり左耳と同様に含気蜂窠被覆組織は腫脹し、所々に粘液性膿が見られ、乳様洞の外側壁より乳様洞、上鼓室にかけては粘液膿性の滲腫が著しく、左耳術後2週間化学抗生物質療法を行ったのであるが、その限界をうかがわせた。闊隔蜂窠、隅角蜂窠では死骨化している骨組織が多く、乳様突起尖端では粘液性膿と死骨化した骨組織が入り混っている所見であつた。迷路周囲蜂窠、更に弧形下道を搔爬した。前上蜂窠列（Voss法）は大蜂窠を形成しており、被覆組織の腫脹、滲腫が認められた。これも搔爬し、清掃した。術後、創内に抗生物質溶液を注入した所、強い温度性眼振が起つた。

病理組織学的所見：手術時に採取した側頭骨各部を骨軟部共にツエロイジン包埋、ヘーエ重染色、及びワ染色により検索した。

左 耳：

(1) 外耳道上棘：骨の核は大部分がやゝ濃縮しており、一部分に消失している所が見られる。又紋理は錯綜し、あるいは不鮮明となつている。軟部組織に取り囲まれた小骨片においては、核は殆ど消失しており、紋理は不鮮明化が著明でヘマトキシリンに薄く染まつており、死骨化している。僅かに認められるハ管腔内には浮腫がやゝ強い。骨壁にはやはり造骨細胞が見られ、時代の新しい骨により埋められて管腔の縮小しているものがある。含気蜂窠被覆上皮は数～10数層に肥厚増殖しており、上皮下には浮腫、細胞浸潤が著明である。又肉芽組

織を形成している部分も多い。含気腔内には炎症性滲出物及び手術時の出血が多量に認められる。脂肪髓、赤色髓には細胞成分の増加、細胞浸潤が認められ、骨髓腔の周辺部には骨内膜の肥厚、器質化が認められる。これ等の軟部組織の骨膜層、骨内膜層に当る部分には造骨細胞の並列が見られ、骨の増殖所見が僅かに認められる。即ち慢性含気蜂窠炎、慢性骨炎、骨髓炎急性増悪の所見である。

(2) 乳様洞の外側壁：骨組織は紋理が不鮮明となり、核は濃縮しており、消失しているものも多い。又骨小腔の拡大も認められる。又骨はやゝ脆弱化しており、断裂が見られる。この古い骨組織にヘマトキシリンに濃染する接合線を境にして時代の新しい骨が附加されているが、この骨も再び吸収を蒙っている所が見られる。小骨片においては脱灰化している所、線維様化している所等一般に高度の骨病変を起しており、これ等が肉芽組織により吸収されている所が認められる。ハ管は骨の増殖により概ね管腔は縮小しており、中には埋め尽されているものもある。含気蜂窠上皮組織は数倍に増殖肥厚しており、上皮直下には細胞浸潤が強い。細胞浸潤は多形核白血球、円形細胞、組織球、形質細胞等が認められる。上皮下層の一部には浮腫性の所もあるが、大部分は結合組織乃至は肉芽組織であり、骨の吸収所見が主に見られる。含気腔内には炎症性滲出物及び手術時の出血が認められる。

(3) 乳様突起尖端：骨の核は大部分消失し、紋理は一部分が不鮮明となり、又錯綜している部分が多い。軟部は含気腔被覆組織の肉芽で置換されたものと、器質化された骨髓組織である。この部分には骨の窩状吸収の所見が多く認められる。骨壁には造骨細胞が僅かに認められるが、骨新生は殆ど見られない。器質化した骨髓組織は大部分が赤色髓である。ハ管はやゝ収縮しており、内腔には肉芽組織の形成が認められる。慢性含気蜂窠炎、骨炎、骨髓炎で、肉芽形成の傾向が極めて強い。

(4) 隅角蜂窠：古い骨組織は骨が濃縮乃至は消失しており、紋理は殆ど不鮮明となつている。又紋理の錯綜が強い部分もある。これ等の古い骨組織内のハ管、骨小管のあるものは、時代の新しい骨組織により埋められて内腔は縮小しており、腔内軟部組織は肉芽組織となつている。又 Fibrosis も認められる。骨小管のあるものは肉芽組織で埋められ、中心に細小血管が認められる。その管壁には造骨細胞の並列が見られるが、骨の新生像はなく、主に吸収像が認められる。含気蜂窠被覆上皮は

2~3層に増殖肥厚しており、含気腔内滲出物が充満している。上皮下層にはやゝ細胞浸潤があり、結合組織が強く増殖し、一部には肉芽組織となつている。固有層に当る部分では Fibrosis が強く、骨壁には窩状吸収が著しい。骨壁には又造骨細胞の並列している所があるが、骨の新生所見は少ない。脂肪髄、赤色髄の両者が形成する骨髓腔の骨壁でも同様であり、器質化している部分が多くなつている。この部は主に慢性骨炎、骨髓炎の所見である。

(5) S 状洞壁：骨の核は濃縮しており、消失している部分も多く、骨小腔の拡大が認められる。紋理は不鮮明となり、接合線の部分で離断している所見がある。ハ管、骨小管には時代の新しい骨が認められ、管壁には造骨細胞の並列している所があり、類骨組織が見られる部分がある。中には時代の新しい骨により埋め尽されている所もある。管腔内軟部組織は浮腫性のものもあるが、肉芽組織となつているものが多く認められる。赤色髄、脂肪髄の両者により形成される骨髓腔はやゝ細胞成分が多く、器質化している所が認められる。骨壁には造骨細胞の並列があり、骨の新生像が認められるが、他方肉芽組織による骨の窩状吸収も多くなつている。

(6) 鱗部蜂窠：骨の核は消失している部分が多くなり、紋理は錯綜乃至は不鮮明化している。一部分では骨小腔が拡大し、多孔質化している所見も見られる。斯かる部位では紋理は殆ど認められなくなつている。含気蜂窠被覆上皮は数~10数層に増殖肥厚しており、上皮下には細胞浸潤が多く、浮腫及び肉芽組織の増殖が著明であり、又 Fibrosis も認められる。骨膜層の肥厚も著明である。骨壁には造骨細胞が僅かに存在しているが、骨の新生像は殆ど認められない。肉芽組織による骨の吸収像が多くなつている。

(7) 乳様洞の天蓋：核が消失している部分が多く、紋理が不鮮明となり、又は錯綜している骨組織に、ハ管、骨小管を中心にして時代の新しい骨ができており、その境界にはヘマトキシリンに濃染する接合線が認められる。古い骨組織の中にはこの鋸歯状をなす接合線が途切れながら多数見られ、而も幅の広いものもあり、過去の骨吸収新生の機転の激しさを物語っている。而も時代の最も新しい骨組織でも軟部組織より窩状吸収が起つている。ハ管腔、骨小管腔内の軟部組織は主に肉芽組織となつているが、管壁には造骨細胞の並列が見られるものがあり、類骨組織により管腔がやゝ縮小しているものがある。含気蜂窠被覆上皮は数層に増殖肥厚しており、上皮

下の細胞浸潤も強い。この部には浮腫他に結合組織の増殖、Fibrosis が多く、一部には肉芽組織の形成が見られる。殊に Fibrosis は著明であり、骨膜層も高度に肥厚し、造骨細胞の並列が見られる。この骨壁には新生骨及び類骨組織の形成が認められるが、一方において窩状吸収も多い。骨髓腔は主に赤色髄であり、この骨壁の所見も同様である。

(8) 外耳道上壁：骨組織は脆弱化しており、接合線の部分で離断し、変性の程度の種々な小骨片に分れている。即ちハ管、骨小管の周辺に見られる増殖骨、核の消失が見られ、紋理の錯綜した骨、骨小腔が拡大して多孔質化を来し、紋理の不明となつている骨、更に変性が著しく、脱灰化している骨、線維様化している骨、染色性が低下し、ヘマトキシリンに薄く染まつている骨組織である。ハ管、骨小管腔内は既に肉芽組織であり、内腔が器質化している所見も見られる。又時代の新しい骨組織により埋められているものもある。含気蜂窠上皮は数層に肥厚増殖し、上皮下層は浮腫が強くなつており、結合組織の多い部分や、肉芽組織となつている所がある。何れも細胞浸潤が強く、血管がやゝ拡張している。上皮下層の一部分には骨髓組織に変化している部分も認められる。斯かる骨壁には造骨細胞が認められ、骨の新生所見と、所々に肉芽組織による吸収所見とが入り混つている。慢性含気蜂窠炎、慢性骨炎の所見であるが、骨の変化は極めて強い。

(9) 頬骨蜂窠：外耳道上壁と同様に骨は脆弱化しており、接合線の部分で骨は離断されている。古い骨組織においては核が消失し、骨小腔が拡大して多孔質化をきたしている部分が見られ、紋理が不鮮明となつているが、錯綜している部分も多い。周囲の小骨片においては強い脱灰及び死骨化の認められるものがある。ハ管腔には時代の新しい骨が見られるが、古い骨組織とは接合線の部分で離断されている。管腔内には Fibrosis が認められる。広義の骨小管腔には浮腫が強く、一部には Fibrosis が認められる。管壁には骨新生の部分に僅かにあり、骨の吸収像は殆ど認められない。含気蜂窠被覆上皮は数層に肥厚増殖し、上皮下には結合組織の増殖があり、細胞浸潤が高度である。骨壁には造骨細胞が認められ、骨の新生像があるが、一方死骨化せる小骨片においては骨の吸収が認められる。

右 耳：

(1) 乳様突起尖端：骨の核は濃縮している部分が多く、紋理は錯綜乃至は不鮮明となつており、軟部組織よ

り一方において窩状吸収が起り、他方にてヘマトキシリンに濃染する接合線を境にして骨の増殖している所見が認められる。筋肉組織附着部においては造骨細胞の並列が見られ、類骨組織も形成されている。広義の骨小管腔、あるいは骨破壊腔は肉芽組織となっており、造骨細胞が見られるが、骨新生は殆ど認められない。含気蜂巢上皮は2~3層に増殖しており、上皮下組織は浮腫が多い。細胞浸潤は軽度であるが、肉芽組織となつている部分もある。含気腔内には炎症性滲出物が認められる。骨髓腔にも浮腫が強く周辺には器質化している部分が見られる。

(2) 隅角蜂巢：骨の変化は比較的軽度ではあるが、核は消失しているものが多く、一部のものは濃縮している。紋理は錯綜し、骨内には多数の鋸歯状の接合線が見られる。一部の所ではハ管周辺を除いて紋理が全く不鮮明となつている。ハ管はヘマトキシリンに濃染する接合線を境とした時代の新しい骨により埋められており、管腔は縮小している。骨小管腔には斯かる骨の形成は殆ど認められない。管腔内軟部組織は器質化した肉芽組織である。含気蜂巢上皮は2~3層に増殖肥厚しており、上皮下層は浮腫が強く、細胞浸潤が著しい。又上皮下層が脂肪髄に変化している部分が認められる。骨壁には造骨細胞が並列しており、窩状吸収された骨壁に骨新生が行われているが、又窩状吸収像のみの所もある。骨髓腔には一部に器質化している部分があり、骨壁の部分の変化もやはり同様の所見を呈している。

(3) S状洞壁よりS状洞後部蜂巢：骨の核は大部分が濃縮しており、一部は消失している部分があり、骨小管腔の拡大はかなり著明である。紋理は錯綜し、又異常紋理が現われ、一部分は不鮮明となつている。ハ管、骨小管腔内においては浮腫が多く、Fibrosisが認められる。この骨壁には造骨細胞が見られる所があるが、骨の増殖は著明ではない。筋肉組織の附着する部分では骨の窩状吸収が主に認められる。周辺の軟部組織は主に骨髓腔であり、骨の吸収像が多い。一部には器質化された部分がある。

(4) 鱗部蜂巢：骨組織は何回となく破壊増殖が行われてきた事を示しており、骨質内にはヘマトキシリンに濃染する接合線が多数に見られる。古い骨組織程核の濃縮乃至は消失が認められ、紋理も不鮮明となつている。この骨組織には周囲の骨壁に沿って次第に時代の新しい骨が加わり、一方においては窩状吸収も起っている。ハ管は骨新生により縮小しており、管腔内にはFibrosis

がやや著明である。含気蜂巢上皮は2~3層に増殖肥厚しており、上皮下の部分には浮腫がやや多く、肉芽組織となつている部分もある。この部分の血管は拡張しており、軽度の細胞浸潤が認められる。含気腔内には変性した炎症性滲出物を認める。

(5) 深部闊頭蜂巢：核は殆ど消失しており、紋理も不鮮明となつている骨組織には、接合線を境にして時代の新しい骨が附加している。一部の骨には骨小管腔の拡大による多孔質化が認められる。又この骨組織には軟部組織より吸収が行われている。軟部組織はすべて骨髓組織で、細胞成分が増加し、骨壁に近い部分では器質化している。骨壁には造骨細胞の並列が僅かに認められるが、骨の新生は殆ど認められない。

(6) 後下蜂巢列：骨の核は消失し、紋理は不鮮明となつている。部分的にヘマトキシリンに濃染する接合線が認められるが僅かである。標本にはハ管、骨小管等は認められない。軟部組織は主として赤色髄であり、骨壁には造骨細胞が僅かに認められるが、骨の新生所見は認められず、却つて窩状吸収像が多い。これは殊にばらばらになった死骨化した小骨片において著しい。

(7) 後、後上蜂巢列：核の消失は殊に小骨片に著しく、その部分においては骨小管腔もやや拡大している。紋理は錯綜しており、骨内にはヘマトキシリンに濃染する接合線が多数に見られる。殊に骨壁や骨小管附近に鋸歯状をなし、又幅の広くなつているものもある。骨質内には高度に脱灰化している部分が斑紋状をなして散在し、この部位の骨の核は消失している。骨小管腔にはFibrosisが認められ、ヘマトキシリンに濃染する接合線を境にして類骨組織が附加されている。含気蜂巢上皮は何れも肥厚しており、上皮下層は軽いものは浮腫を呈しているが、炎症の強いものは肉芽組織となつている。この上皮下層の一部には脂肪髄となつている部分も見られる。骨壁には造骨細胞の並列が見られ、骨の新生が認められるが、窩状吸収も認められる。軟部組織に取り囲まれている死骨化した小骨片においては殊に吸収は著明である。含気腔内は殆ど手術時の出血である。

術後経過：左耳手術直後鼓膜の発赤は消失し、後上部の腫脹が消退し、鼓膜の肥厚が減少して光錐が僅かながら現われた。第2例より使用した笛や小石を詰めた空罐を使つて色々音を出した所、眼を動かし、首を動かしてアー、アーと云つていた。この年令が一番手に負えない年頃でもあり、殊に可愛がられていたため術後の安静は思うに任せず、寝かせておくのに苦心した。術後療

法は今までの症例に記した如くに行つた。左耳術後14日目に右耳の手術を行つた。術後抗生剤の注入を行つた所、温度性眼振が著明で、内耳はまだ機能のある事がはつきりした。術後一旦回復した鼓膜は日を追うに従い、再び肥厚をきたし、時々発赤も現れた。これは安静を守れず、ガーゼを自分で取り出して、指を入れたりしたためと思われる。このため経過が長引き、再び回復するのに手間取つた。左耳術後33日目より通気加鼓膜マッサージを行い、右耳は術後30日目より行つた。この頃漸く両耳共に鼓膜に再び光錐が現われた。又手を叩くと約1m位で振り向く事が多くなつた。左耳手術後41日目オーディオメーターにより純音を入れて見た。気導では反応しないが、骨導は2000～4000サイクルで、45db位より泣き出す。左耳術後48日目に飛行機(遠方を5台)の爆音が聞えたように指さして見ろという。5m位離れて大声で呼ぶと振り返り、術後50日目再聴検の際には気導では全サイクルにわたり、最大閾値で眼を盛んに動かす。骨導では前回と同様に泣き出した。片言を少し言う事があり、鼓膜も後上部の腫張が消失し、肥厚も消失、光錐がかなりはつきり認められ、やゝ混濁が残るのみとなつた。術後約5ヶ月目感冒後に来院した時に、左鼓膜が肥厚著明で光錐消失し、鼓膜穿刺により粘液血性滲出液を認めた。しかし鼓膜切開は行わず極力保存的に治療を行つた。この時の聴力検査では気導音は500～2000サイクルでは最大閾値で聞えるようで、しきりに眼を動かし、骨導でも最大閾値で同様であつた。両耳鼓膜マッサージを約2ヵ月半行い、又アリナミン220mgを使用してみた。飛行機の爆音は聞えるようで、先に教えたり、片言らしい事は云っているが、どうしても言葉の世界に入る事はできなかった。

第7例総括：2年5カ月の男児、生後8ヶ月目に麻疹に罹患した。生後7ヵ月目位までは物音に敏感であつたが、1年目には全く反応しない事に気付いた。某大病院を訪れたが5～6才にならないと精密検査は不可能と云われた。

鼓膜は両側共に肥厚し、僅かに発赤し、何物かの存在を思わせる鼓膜であつた。鼓膜穿刺により粘液性膿の溜溜を証明した。レ線撮影により両側々頭骨炎が証明された。

組織学的には骨の核は濃縮あるいは消失し、更に骨小腔の拡大している部分もある。骨層板の紋理は概ね不鮮明となり、あるいは骨層板の部が染色性が悪くなり、中間部が却つてヘマトキシリンをとり、異常紋理を呈して

いる部もある。又死骨化して薄くヘマトキシリンに淡染している部分、又高度に変性し線維様化を示している部分もある。あるいは以前に破壊、新生を示す時代の異なつた骨が相接して存在し、その間の鋸歯状の接合線がヘマトキシリンに比較的濃染している部分もある。又これ等の接合線の部分が変性し、脆弱化し骨がばらばらになつてい

る部分もある。ハ管腔内には浮腫、Fibrosisを認め、又肉芽で埋められているもの、新生骨で埋められているものもある。これより大なる骨小管腔、骨破壊腔も同様な所見である。

含気腔被覆上皮は数層あるいはそれ以上に肥厚増殖しており、上皮下には浮腫、細胞浸潤、肉芽増殖等を示し、骨膜層にも肥厚が認められる。

これ等の軟部組織と骨組織の境には造骨細胞の並列、類骨組織、新生骨を認める部分もあり、他方には骨吸収の所見が認められる部分もある。

骨髓組織は外耳道上棘、乳様突起尖端、S状洞壁、乳様洞天蓋等に認められ、脂肪髄は少なく、赤色髄が多いが、何れも炎症性変化を蒙り、器質化されている部分もある。骨内膜層の肥厚、周辺の骨増殖、破壊を認める部分もある。

右耳もほぼ同様の所見であるが、骨病変は更に強い。

以上を要約するに組織学的には高度の慢性含気蜂窠炎急性増悪、慢性骨炎及び狭義の慢性骨髓炎である。

鼓膜所見はアデノイドを有する幼児によく見られる鼓膜であり、中耳加答児、軽度の中耳炎と診断される。レ線所見でも含気抑制と考える人もいる。しかし実際にはその組織学的所見が示す如く慢性含気蜂窠炎急性増悪、慢性骨炎、慢性骨髓炎である。

斯かる所見を両側々頭骨に所有している時は先ず第1に生命の危険を除く事である。第2は聾啞児にしない事、第3は鼓膜に慢性化の所見を作らない事である。精密検査のできる5～6才を待つては、この3つの治療の目的は何れも達せられない。

本例の両耳に対し保存的側頭骨炎根治手術を施行した。しかし患児は最も理解の悪い年令であり、両親が判らぬために術後の安静が保せず、苦心したが、一応は光錐、光沢のある鼓膜にし、言語修得には不足であるが、音に対する聴力は十分出た。しかし5ヵ月後に感冒後に再来院した時は再び鼓室に膿を認めた。その後通気療法を行つたが、言語修得可能な聴力は得られなかつた。

第3章 総括並びに考按

以上7例に就いて次の諸項目に就き考按する。

(1) 鼓膜所見を総括するに鼓膜所見が正常なものは1例もない。所謂慢性穿孔性中耳炎は第3例のみで、その鼓膜は両側緊張部の全穿孔である。

第1例は両側共に弛緩部穿孔の痕跡があり、緊張部は光沢を欠き、少しく黄色味を帯び、所謂中耳加答児として鼓膜穿孔、耳管通気をする鼓膜である。しかし本例右耳は通気をしながら聾になつてしまった。

第2例は化学抗生物質療法により耳漏が止まれば所謂中耳炎が癒つたとして、斯かる不完全な治療を繰り返された鼓膜である。即ち masking effect の最悪の症例である。

第4例も masking effect の悪い症例で、両親さえ了解すれば更に早期に手術できた症例である。

第5例も鼓膜緊張部の浸潤、肥厚、後上部発赤、鼓膜穿孔で多量の血性膿を証明されている。即ち第2例とはほぼ同様である。

第6例は右側は陥凹が強く、緊張部癒着、後上部浸潤肥厚、左側は浸潤肥厚、後上部は僅かに陥凹している。

第7例は右側は肥厚、発赤、後上部膨隆肥厚、緊張部や黄色を呈し、左側もほぼ同様である。

以上より考按するに第3例を除き、鼓膜所見とその聴力損失には大なる差異がある。

化学抗生物質の無かつた時代には斯かる側頭骨の病変を有し、鼓膜所見がこのような場合は閉鎖性錐体炎、あるいは乳様突起の病変が肉芽増殖により閉鎖性となつて膿腫を伴い急性増悪した等と称した。殆どの症例に発熱、疼痛、その他の症状を伴つた。従つて鼓膜切開を受けたり、乳様突起整開術を受けたり、錐体手術を受けたりした。

即ち聾啞になつてみれば、却つて抗生物質等がない時代ならば、耳漏が出るからあるいは明示型の乳様突起炎、錐体炎となり、生命の危険な症状を現すから、早期に手術を受けて、このように聾あるいは高度難聴とはならなかつたかも知れない。

要は抗生物質出現後は鼓膜所見で発赤等の急性期の症状よりは寧ろ浸潤、無光沢、光錐消失、陥凹、膨隆等の症状が大切であり、殊に軽卒なストマイ難聴の診断を受けた場合等には鼓膜穿孔、レ線検査、殊に Stenvers 法の所見が大切である。

Masking effect なる言葉は疼痛、発熱等の苦痛を隠蔽し、鼓膜所見、組織学的所見では急性増悪を減じ、病

気を固めるもので、病竈を摘出する手術と混同してはならない。殊にこれ等の総てを棚上げして、ストマイ難聴の診断を下すにおいては軽卒も甚だしい。

(2) 推定発病年月日より手術迄の期間は第1例左耳20年、右耳10年、第2例5年10ヵ月、第3例28年、第4例1年5ヵ月、第5例2年、第6例2年半、第7例1年9ヵ月である。

即ち第1例は所謂滲出性中耳加答児を繰り返す中に、長年月の間には内耳も罹患し高度難聴となる型である。第3例は最も本邦に多い型で、耳漏が頻回の急性増悪により出たり止まつたりを繰り返す中に、初めは伝音型難聴が次第に混合型となり、而も長年月の間専門医の治療を受けながら殆ど聾となつてしまふ。即ち生命の危険を除くための手術は薬物の発達した今日では遅くてもよいが、一度慢性となつて 30db 以下になつた場合は、それが聴力即ち機能の保持回復を目的とする手術の場合には、一側でもよいから一日も早く行うべきである。即ち虫歯に譬えれば早期に根管が侵されぬ中にインレーで治療し得る時期に治療しておく事が大切である。

第2例はその経過の中途に不幸にしてストマイ難聴、聾が多発した。そのためにストマイ聾にされてしまつた。しかし手術及び組織学的に前述の所見が証明され、術後前述の如き聴力改善が証明された事はストマイ聾でなかつた事を明らかにしている。

第4例以下も同様である。

期かる症例を見ると麻疹あるいは百日咳の時の広義の中耳炎、側頭骨炎を手術をしないで薬剤で納めた事は非常な不幸を招いた。乳幼児期でも適時の上鼓室、乳様突起整開術、あるいは保存的側頭骨炎根治手術がいかに大切かが判る。要は抗生物質による鼓膜所見の好転に欺されない事が大切である。

(3) レ線所見：仁保、高畑、岩武³⁰⁾(1952)は日本耳鼻咽喉科学同総会において慢性側頭骨炎(広義の慢性中耳炎)の Stenvers 法レ線所見に就いて述べ、その所見と組織学的所見を説明し、Verschleierung, Osteomyelitisch, Einschmelzungsherd, Sklerosierung の4に分類した。

又従来称えられた所謂慢性中耳炎の際の含気化抑制は、組織学的に証明せられた慢性骨髓炎が続行するがために含気蜂窠の発育及び再生が阻碍されて起るもので、従来は慢性骨炎骨髓炎が等閑に附されていたと述べた。

高畑³⁰⁾(1953)は所謂慢性中耳炎の104例の Stenvers 法レ線像に就いて記載し、全例に病変の存在を認めた。

翻つて本症例に就いて総括するに第1例左耳は全体に骨髓炎様、右耳も骨髓炎様。第2例左耳は錐体尖、S状洞周囲骨触解、迷路周囲、乳様突起尖端不鮮明、三半規管不鮮明。右耳は全体に不鮮明。第3例左耳は全体に不鮮明、水平、後半規管不鮮明。右耳は乳様突起部骨髓炎様、闊膵蜂窠骨触解、錐体尖不鮮明、水平、後半規管不鮮明。第4例左耳は全体に不鮮明、乳様突起一部骨髓炎様。右耳もほぼ同様。第5例右耳は乳様洞附近に骨融解、全体に不鮮明。左耳は全体に骨髓炎様。第6例右耳は乳様突起部不鮮明、一部骨髓炎様、錐体尖僅かに不鮮明。左耳は乳様突起部不鮮明、一部骨髓炎様、錐体尖やや不鮮明。第7例左耳は全体に骨髓炎様。右耳乳様突起部骨髓炎様、錐体尖僅かに不鮮明。

而して第1例、第3例と他の幼児のレ線写真とを対比するに、長年月を経過したものは硬い感じが強く、幼児では軟らかい感がする。

次に弓状隆起が高く、乳様突起部上陵が陥凹している所見、即ち手術時に遭遇する危険性側頭骨の所見は第1、2例両耳に、又軽度のものでは第4例左耳、第5例右耳、第6例左耳、第7例右耳に認めた。斯かる乳様突起は全体の大いさも小さい。

斯かる所見は慢性骨炎、骨髓炎の急性時あるいは慢性急性増悪時に含気蜂窠被覆上皮は脱落消失し、軽い時は再生するが、重症の時は一部しか再生せず、又その後も慢性骨炎、骨髓炎上では通常含気蜂窠の発育も遂げられず、乳様突起自身も通常の発育が遂げられない。

先天的に含気型、混合型、緻密型もあるが、斯かる重症例においては先天的成分よりは慢性骨炎骨髓炎の演ずる役割りは遙かに大きい。

乳様突起自体の発育が悪ければ、手術時に外耳道後壁は斜めとなり、S状洞は前方位をとり、中頭蓋窩底は低位をとるのは当然である。脳、内耳等は先に発育を遂げるが、乳様突起等は顔面頭蓋と共に成長する。その成長が慢性骨炎、骨髓炎のために阻害される。従来耳鼻科では含気腔学説が余りにも重要視されて、斯かる見地に立つての観察が余りなされなかつた。

(4) 手術々式：所謂中耳炎、側頭骨含気蜂窠炎の発生は、耳管より起炎菌あるいは起炎物が鼓室に入る事による。従つて乳幼児においてはその原因の大部分をなすアデノイド切除、扁桃摘出、及び副鼻腔炎の治療が大切である。即ち第4、5、6例に行つた。第4例は2年6ヶ月で扁桃摘出、アデノイド切除を行つた。この手術は乳幼児では耳を慢性化させないために最も大切な原因的治

療で、生後10ヵ月位から行う事ができる。アデノイド切除のみでもよい場合もあるが、両者を併用すれば更によい。所謂急性中耳炎に対して化学抗生物質療法を行う際に、経過が遷延し、鼓膜に肥厚が現れ、なかなか光沢の回復してこない場合、あるいは頻回に繰り返す場合には、扁桃、アデノイドに病気があれば、これ等を除去すると良い場合が沢山ある。

次に行うべき手術は上鼓室乳様突起整開術である。錐体前上、後上、後、後下蜂窠列、あるいは後頭顆に達する病竈があれば保存的側頭骨炎根治手術が良い。この手術は浅在性側頭骨病竈及び伝音系を保存して除去し得る錐体病竈を除去し、その結果としては乳様洞、上鼓室を経て耳小骨連鎖に降りかゝる膿汁を止め、鼓室、前下、前蜂窠列、錐体尖に対して化学抗生物質療法を行い、鼓室即ち鼓膜、耳小骨連鎖の病変の慢性化を防ぎ、あるいは慢性化した所見を固めるのに最も重要な手術である。

又この手術は内耳、主に蝸牛殻に対しては、後下蜂窠列が広く内方に蝸牛殻の下面に拡大している時があるので、この場合は蝸牛殻の減荷にもなる。三半規管に対しての減荷手術はこの手術で概ねその目的が達せられる。この手術を施行したのは第1例右耳、第2例右耳（水平半規管切除術を併用）、第4、5、6、7例の両耳である。

而して鼓膜の混濁、石灰沈着、瘢痕等の恢復不能の所見は止むを得ないが、概ね光錐、あるいは光反射のある、浸潤肥厚のない鼓膜とする事ができた。

これ等の症例は主に未だ年令も少なく、正確な聴力検査も不可能であるので、一応鼓膜、耳小骨連鎖を修復し、鼓膜所見の慢性化を防ぎ、経過観察中であり、将来側頭骨炎根治手術に直す可能性を保留してある。

第1例左耳、第2例左耳、第3例両耳に対しては側頭骨炎根治手術及び内耳手術を行つた。斯かる側頭骨内の骨病変を徹底的に除くには側頭骨炎根治手術が最もよい事は明らかである。しかし内耳内に病変のある場合は更に斯かる手術の組合せが必要である。

1957年ワシントンにおける第6回国際耳鼻科学会において仁保、安田¹²⁾は斯かる際の内耳手術を下記の如く分類して報告した。

i) 迷路周囲部の罹患骨除去

ii) 開窓術

A) 膜様迷路の露出

B) 外淋巴腔の開放

iii) 部分的半規管切除術

A) 半規管内の肉芽組織を健康部に至るまで除去

B) 卵形嚢に至るまでの肉芽組織の除去

C) 慢性炎症による半規管内腔の消失

a) 死骨化骨組織

b) 緻密骨組織

即ち第1例は開窓術，第2例は部分切除術，第3例も部分切除術を施行した。

(5) 組織学的所見：

(a) 含気蜂窠炎：20年を経過した第1例左耳においては隅角蜂窠に立方状又は円柱上皮様の小含気腔が1個認められたのみである。10年を経過した右耳においては乳様洞の外側壁に上皮は1～数層に増殖し，上皮下には浮腫を認める含気蜂窠を認めたのみである。

28年を経過した第3例左耳においても乳様洞の上皮下に浮腫，肉芽組織を認める含気蜂窠を認め，その他上鼓室の外側に含気蜂窠を認めた。28年を経過した右耳においては乳様洞においてさえ全く含気腔被覆上皮は認めなかった。

5年10ヵ月を経過した第2例左耳においては隅角蜂窠に含気蜂窠の名残りとして2～3層の肥厚した上皮に囲まれた小腔を認めるのみであり，闊肭蜂窠，錐体尖に慢性含気蜂窠炎急性増悪を認めた。右耳においては乳様洞，乳様洞の外側壁，及び後蜂窠列迷路周囲部に認めた。

1年5ヵ月の第4例，2年の第5例，2年半の第6例，1年9ヵ月の第7例では含気蜂窠のあるべき部分には程度の差こそあれ，殆どの部に慢性含気蜂窠炎あるいはその急性増悪の所見を認めた。

即ち幼時期には相当高度でも慢性含気蜂窠炎，慢性骨炎，骨髓炎の所見であるが，その後鼓膜所見が滲出性中耳加答兒，慢性穿孔性中耳炎であつても骨炎・骨髓炎が持続する時は上皮細胞は消失し，含気蜂窠炎の所見は消失する事もある事が判明した。

斯かる含気蜂窠は上皮は背が高くなり，立方上皮となり，2～数層に増殖し，上皮下の組織は浮腫を主徴候とし，急性増悪時には円形細胞，多形核白血球，形質細胞，組織球等の細胞浸潤が現れ，稀に好酸球の現れる事もある。その他結合組織細胞，Fibrosisが現れる。又上皮下の組織層が肉芽組織となり，あるいは器質化されている場合もある。

骨膜層は肥厚し，上皮下の層との区別が明らかに判る時もあるが，不明瞭の場合もある。

この両者から成る浮腫性，Fibrosisを示す組織には脂肪腫が現れる事がある。

骨膜層と骨との境は造骨細胞の並列，破骨細胞の出現等骨の破壊，吸収，増殖等の変化の現れる部である。

而して最も大切な事は病的骨の上には正常な含気蜂窠被覆組織は存在し得ない事である。

第5例左耳の外耳道上棘附近，乳様突起尖端，闊肭蜂窠，頬骨蜂窠，後蜂窠列に現れたコレステリンの結晶に就いては，斯かる症例は極めて稀であるために，更に症例を重ねる迄は決論を下す事は避け度い。しかし本例が精薄兒の疑いの診断を受けたり，術前迄は鼻汁過多，流涙，先天性股関節脱臼で整形外科ではうまく入っているから歩けない訳はないと云われても，摺まり歩きもできなかったりした事を考える時は，Hand Schüller Christian 病と関係があるかも知れない。

(b) 骨組織：20年，10年，28年を経過した第1，3例においては骨の変性が極めて強く，核の消失，紋理不鮮明，異常紋理の出現，又染色性が変化してヘマトキシリンを多くとり，あるいは染色性が極めて悪く，死骨化が見られ，又骨小腔が拡大し，あるいは融合して多孔質化が見られる。又骨基質が溶解して線維様化を示している。接合質の変化も極めて強く，骨の脆弱化も著明である。

広義の骨小管は極めて多く，従つて Osteoporose を示す部が多い。骨髓腔も非常に多い。骨髓組織は概ね脂肪腫である。ハ管，骨小管，骨髓腔の骨内膜は肥厚し，ヘマトキシリンを多くとつている。ハ管，骨小管の中央には多くは血管があり，周囲は浮腫性あるいは器質化された結合組織で，多くは Fibrosis を伴い，中心の血管が圧迫された所見を呈している。

いかに側頭骨に先天性の含気型，混合型，緻密型があるとしても，斯かる変化をきたす事はない。

即ち側頭骨の病変は慢性化し，頻回の急性増悪のために含気蜂窠は消失し，骨の破壊新生を繰り返した所見である。仁保等は斯かる所見を約10年間，破壊新生の繰り返しが慢性側頭骨炎の組織学的所見である事を数回に渉り，日耳鼻総会，あるいは関東地方会において述べた。最近吉田⁴⁵⁾はこれを Anbau, Umbau, Abbau なる表現で発表した。

斯かる骨組織の新生破壊を繰り返すための体液循環を司るのが，極めて多数に見られる広義の骨小管，骨髓腔である。

而して斯かる高度難聴者ではなく，60～70db 位迄の慢性側頭骨炎では肉芽増殖，骨新生，類骨組織，骨吸収等の修復機転が遙かに多く見られる。この2例では斯か

る機転が殆ど見られない。真に癒るでもなく癒らぬでもなく、骨病変は軟部の治癒を遷延せしめ、軟部の体液循環障碍は又骨病変の治癒を遷延せしめている。

通常の慢性側頭骨炎では、急性増悪部を除けば軟部組織と骨病変は概ね平衡が保たれている。又これが慢性化であり、即ち病的骨の上には正常な含気蜂窠被覆組織が存在する事はなく、骨膜層は肥厚し、上皮下の層は腫脹し、上皮細胞は背が高くなっている。即ち一度慢性化した場合は通常の含気蜂窠の發育は阻碍される。

本例では骨の体液循環の面では骨小管、骨髓腔の骨内膜層が、消失した含気蜂窠被覆組織の骨膜層の役目をしている。而して浮腫、Fibrosis あるいは器質化組織は次第に骨髓組織主に脂肪髓と化している。即ち通常では脂肪髓等の見られない所に見られるのは斯かる機序による。

5年10カ月の第2例においては第1例、第3例より骨の染色性がよく、多孔質化、線維様化、脆弱化等の高度の変性所見は、その程度が軽い。しかし骨の死骨化、骨増殖、骨吸収等の所見は強い。

1年5カ月の第4例、2年の第5例、2年半の第6例、1年9カ月の第7例等の慢性含気蜂窠炎あるいはその急性増悪所見は強く、又肉芽の増殖、造骨細胞の並列、骨新生、あるいは窩状吸収等を認めるが、骨の染色性、骨層板紋理の変化、多孔質化、脆弱化等の変化は第1,3例に比して弱い。又骨小管、骨髓腔におけるFibrosisも亦弱い。骨髓組織は第1,3例では殆ど脂肪髓であるが、これ等の症例では赤色髓がかなり認められる。これは年令の相違、時代の相違と考えられる。

(6) 内耳と骨病変：第2例左耳上半規管附近の標本は膜様半規管を含み、内淋腔は空虚であるが、外淋腔は肉芽組織で充たされ、一部附近の骨破壊腔に連なっている。その他、この骨性内耳には1個のへ管と認められるもの、5個の骨破壊腔の慢性化によつてできた骨小管が認められる。

即ち骨性内耳の如き緻密骨も、斯かる長期の急性増悪の反覆された炎症の際はOsteoporose 状をなし、即ち炎症に侵された外淋腔は側頭骨炎、含気蜂窠炎と交通するに到る事もある。

本耳の水平、後半規管は鑿除したが、管腔も認められず、眩暈もなかった。上半規管の上半部も同様であつた。斯かる所見は、内腔が新生骨で埋められた所見である。

このように内外淋腔が開放せられれば、蝸牛殻はそ

の重圧から開放せられ、その残存機能がある程度回復し得る事は想像に難くない。その後は絶対安静を保たせて、化学抗生物質を使用し、開放せられた内耳の再感染を防げばよい。

第3例左耳の水平半規管隆起部に増殖した骨は脆弱化が甚だしく、変性も極めて高度で本来の緻密な骨性内耳の骨組織とは似ても似つかぬものとなつている。不整形に拡大した骨小管腔も多くなつており、腔内には浮腫が強い。

この組織の下の方膜様水平半規管は黄色を呈していた。恐らく組織学的には前者と似たようなものであろう。これを除去して内外淋腔を漏出せしめ皮膚弁を置いた所が人の声、笛の音が響くようになった。

即ち斯かる炎症に侵された骨、炎症に侵された限局性の内耳炎を除去すれば、その重圧から開放されて、残存した蝸牛殻の機能がある程度回復し得る事が証明された。

この問題に就いては仁保、安田^{12) 43)} (1956, 1958) は既に第6回国際耳鼻科学会その他で発表した。

仁保⁴⁷⁾ (1942) は、海狸の実験において急性炎症が高度の時は両門窓よりの内耳感染が多く、中等度の時は広義の骨小管よりの感染も考慮すべきであり、又蝸牛の尖端、三半規管の一部等にかかる事のある限局性漿液性内耳炎においては、広義の骨小管よりの感染も考慮すべき事を提唱した。

斯かる慢性症においては緻密な内耳骨壁も亦Osteoporose 様の变化を現す事もある事が証明された。

著者⁴⁹⁾ (1956) は斯かる炎症が水平半規管内に波及し、更に卵形囊を侵した症例の手術時に搔爬した内耳内の肉芽組織の組織学的所見を関東地方会28回大会で発表した。

蝸牛殻においては斯かる瘻孔は生体においては発表されていないが、死後の組織学的検索においてはEggston, Wolff⁵¹⁾ (1947) にも記載されている。

即ち斯かる骨組織が第1,3例の如く長年月の間蝸牛殻に隣接して存在する時は、内耳骨壁にも斯かる変化を現す事もあり得る事は想像に難くない。

Young¹⁰⁾ (1952) はある種の金属を正常側頭骨の卵円窓に注入して、ある圧をかけて外淋腔と内耳周囲との淋巴管の交通の存在する事を証明した。

翻つて内耳を灌流する血管は佐藤⁵¹⁾ によれば内耳道孔より聴神経、顔面神経と共にこれ等に沿つて入る蝸牛殻⁵²⁾ の所謂迷路動脈で、これより概ね4分枝して蝸牛殻

に向かう固有蝸牛殻動脈の各枝、前庭、三半規管に向かう前庭動脈の各枝となつて夫々各部に固有の毛細管網を形成した後、漸時集つて内耳を去るものゝようであると、所が氏の中耳（主として鼓室）を灌流する動脈は大部分は外頸動脈に属するが、内頸動脈よりも頸鼓動脈、深小岩様動脈を受けていると。

このように発生が全く異なるために両者の血流も全く異なる。しかし著者の得た慢性症の所見では勿論、Young によれば正常者においても淋巴の交流はあるものゝようである。即ち著者の得た広義の骨小管内の体液循環障害は蝸牛の骨内膜に変化を及ぼし得る事が了解される。

仁保、安田¹³⁾ (1958) によれば側頭骨炎根治手術により斯かる蝸牛周囲の骨病変を清掃した9症例の1年後の聴力増進の平均は、図8の如くである。

図8 再手術例、術後1年以上の
オーディオグラム

再手術例 9例平均

気導 骨導
術前 ————]
術後 ———— >

側頭骨炎根治手術後1年以上

即ち所謂中耳根治手術で蝸牛殻を取り囲む骨病変の存在する時の聴力平均は会話域では気導 61db、骨導では 15db で、側頭骨炎根治手術後の平均は気導 45db、骨導 53db である。即ちこの差は以上の組織学的所見によるものである。

しかし従来考えられた卵円窓、正円窓よりの内耳炎の発生を茲に否定するものではない事を附記する。

(7) 耳小骨：第3例において検索したので概要を述べる。左耳は槌骨は小頭のみ仮性真珠腫の中に存在し、砧骨は不明、鐙骨も消失していた。槌骨小頭は骨病変は極めて高度で、一言にして述べれば Osteoporose を呈し、骨は殆ど死骨化している。

右耳は上鼓室は骨増殖が強く、狹隘となり、肉芽組織に埋められており、槌骨、砧骨は周囲と骨性に癒着して全然動かなかつた。組織学的には槌骨、砧骨共に一言にして述べれば Osteoporose を示し、骨の変性は極めて高度である。

斯かる所見は Myringoplasty, Tympanoplasty, Myringostapediopexie 等の際には極めて重要な事である。

第4章 結 語

(1) 7例の慢性側頭骨炎による高度難聴者の臨床的並びに組織学的検索を行った。

(2) 鼓膜所見、鼓室所見は化学抗生物質の発達した今日では、急性あるいは急性増悪所見に乏しく、病気の実態である組織学的所見に比して余りにも輕微に過ぎる。

斯かる高度難聴者においては鼓室穿刺所見を参考にし、レ線所見を重要視すべき事を提唱する。

(3) 乳幼児期の正確な検査の不可能な時期の診断が最も大切であり、ストマイ難聴の診断は輕卒に下してはならない。

(4) レ線所見では全例に変化を認めた。その撮影法は Stenvers 法、あるいはその変法がよい。その際の判定においても Masking effect なる言葉は鼓膜所見、一般症状はよくなつたが、組織学的には未だ治癒してない事を意味しているから、これに迷わされてはならない。

Pneumatisations-Hemmung は先天的の場合もあるが、慢性骨炎骨髓炎のために含気蜂窠が発育できない場合が多く、又乳様突起自身も正常の発育ができない場合があるから注意すべきである。

(5) 手術々式：乳幼児期に所謂中耳炎を、組織学的に慢性化させない事が最も大切であるから、その原因の大きな部分をなす扁桃の摘出、アデノイド切除術を、所謂中耳炎が薬剤療法で遷延し、鼓膜の肥厚浸潤の消失の遅い時には1才、2才等の乳幼児期にも積極的に行い、鼻腔内に化学抗生物質を使用して、耳管からの

再感染を減少させねばならない。

次に重要な事は乳幼児期の上鼓室乳様突起鑿開術、保存的側頭骨炎根治手術を早期に行う事である。即ち生命の危険を除く目的であれば遅くてもよいが、機能即ち聴力改善を目的とする場合は可及的早期がよい。化学抗生物質の進歩により恰も乳様突起炎が減少、あるいは殆ど消失したかの錯覚が耳鼻科医を支配しているが、組織学的慢性乳様突起炎は恐らくは減少していないであろう。

側頭骨の全病竈を除去し、蝸牛殻を骨病変の重圧から救うためには側頭骨炎根治手術が最もよい。しかし幼児では伝音系除去の聴力に対する害と、蝸牛殻を取り囲む骨病変の害との比較が極めて困難なために保存的側頭骨炎根治手術で待機している症例が半数にある。

三半規管の内耳瘻孔、慢性限局性内耳炎は積極的に手術により除去すべきである。これにより聴力の改善を見ることが多い。

(6) 組織学的所見：乳幼児期においては慢性含気蜂窠炎、骨炎骨髄炎であるが、長年月経過したものは慢性骨炎、骨髄炎であり、含気蜂窠炎の所見は鼓室、乳様洞の附近に見られるのみである。

骨は高度の変性を示し、核の濃縮、消失、紋理の不鮮明、異常紋理の出現、多孔質化、線維様化、脆弱化、Osteoporose等の極めて高度の変化を示し、軟部組織即ち広義の骨小管には浮腫、Fibrosis、その中心の血管を圧迫等の体液循環障害を示す。骨小管、骨破壊腔には脂肪髓が現れる。

全体としては寧ろ修復のための急性炎症所見に乏しく、骨新生、吸収所見に乏しく、真に癒るでもなく、癒らぬでもなく、次第に高度難聴となつてしまった所見である。

(7) 内耳と骨病変：前述の骨小管、骨破壊腔は膜様迷路と連絡する場合がある。即ち斯かる体液循環障害は三半規管に悪影響を及ぼす。蝸牛殻にも悪影響を及ぼすであろう。

斯かる内耳に隣接する骨病変を除去すれば、内耳の残存機能はある程度改善される。

(8) 耳小骨にも組織学的にOsteoporoseが証明された。この所見はMyringoplasty, Tympanoplasty, Myringostapediopexieに際し重要である。

文 献

1) *Eggston and Wolff*: Histopathology of the E. N.T.; 1947. 2) *Scheibe*: Aetiologie u. Pathologie

des Empyems im Verlaufe der Mittelohreiterung; Zeitschr. f.o. Bd. 48, S. 1, 1904. 3) *Neumann*: Zur Pathologie und Klinik der akuten Mastoiditis; Zeitschr. f. H.N.O. Bd. 20, S. 155, 1928. 4) *Lange*: Die Pathologische Anatomie der Mastoiditis; Zeitschr. f. H.N.O. Bd. 20, S. 1, 1928. 5) *Krainz*: (i) Ueber die Auskleidung der lufthaltigen Warzenzellen usw.; Zeitschr. f. H.N.O. Bd. 8, S. 46, 1924. (ii) Untersuchungen über die Mastoiditis; Zeitschr. f. H.N.O. Bd. 13, S. 361, 1926. 6) *Eckert-Möbius*: Mikroskopische Untersuchungstechnik und Histologie des Gehörorgans; Denker-Kahler's Handbuch, Bd. 6, S. 211, 1926. 7) *Toback*: (i) Pathologie und Klinik der Pyramidenzellenerkrankungen; 1939. (ii) Anatomische Untersuchungen über die Pneumatisation und die Wegleitung zu Spitze; Zeitschr. f. H.N.O. Bd. 37, S. 152, 1935. 8) *Mayer*: Pyramidenzellenerkrankung; Zeitschr. f. H.N.O. Bd. 42, S. 1, 1937. 9) *Richter*: (i) Beiträge zur Pathologischen Anatomie des Ohres; I~IV Archiv. f.O. Bd. 139~142, 1935~1937. (ii) Die entzündlichen Erkrankungen des Mittelohres; 1953. (iii) Die Verhüllung lebensgefährlichen otitischer Komplikationen; H.N.O. Heft. 4, 1954. 10) *M. Wharton, Young*: Mercury as a Casting and a Contrast Medium; Science. Aug. 22, Vol. 116, No.3008, p.207, 1952. 11) *Kelemen*: (i) Osteomyelitis of the Temporal Bone; Otolaryngology. Vol. 11, Chapt. 20, p. 1, 1955, 1957. (ii) Collateral Infection of the Temporal Bone in Fulminating Osteomyelitis of the Frontal; Laryngoscope, 54, 76, p. 1, Feb. 1944. 12) *S. Niho, M. Niho, Furuya, Yasuda and Kudo*: Radical Surgery on the Temporal Bone and Labyrinth Operation for Hearing Improvement; A.M.A. Arch of Otolaryngol. Vol. 67, p. 156, Feb. 1958. 13) *S. Niho, M. Niho, Yoshio, Iwatake, Takahata*: Petrositis and Osteomyelitis Temporalis; Yokohama Medical Bull. Vol. 5, No. 2, p. 125, 1954. 14) 二階堂：急性乳嚢突起炎における骨病変に就て；日耳鼻，44，2，p. 305，1938. 15) 小田（醇）：耳性化膿性軟脳膜炎における錐体尖の病理とその意義；日耳鼻，44，3，p. 701，1938. 16) 高原（高）：(i) 錐体炎；日耳鼻全書，1，3，p. 129，

安田論文 附図 (I)

附図 1 Stenvers レ線像健康例 対照

附図 2 第1例 左耳
骨髓炎様、典型的な危険性側頭骨の像。

附図 3 第1例 左 外耳道上棘 (×100)
紋理の不鮮明、核の消失、骨小管の拡張、管腔内の
Fibrosis, 結合織。

附図 4 第1例 左 乳様突起尖端
上半部の骨の核の消失、紋理の不鮮明。中央部はヘ
マトキシリンに濃染する線維性組織に類骨細胞。下
半部は軟部組織。

附図 5 第1例 左 隅角蜂窠
斜めに走る小含気腔及び周囲軟部組織の癢痕化。

附図 6 第1例 左 隅角蜂窠
変性の強い骨の右方にハ管を中心とする時代の新しい骨。脂肪髄、赤色髄の増加。骨の脆弱化を示す接
合質の離断。

安田論文附图(Ⅰ)

附図 7 第1例 左 鼓室天盖 (×100)
骨小管腔の Fibrosis, 骨の脆弱化を示す接合質の部分での骨の離断。

附図 8 第1例 左 外耳道後壁
骨の脱灰・骨内膜がヘマトキシリンに濃染。

附図 9 第1例 左 外耳道底
ハ管を中心とする比較的新しい骨及びその周囲の骨の多孔質化。

附図 10 第1例 左 外耳道前壁
骨の多孔質化一部線維様化・ハ管を中心とする時代の新しい骨及びその古い骨との間の離断。

附図 11 第1例 左 耳管外側骨壁
骨の線維様化。

附図 12 第1例 左 頬骨尖 (仁保・平野法)
骨の離断・骨小管内の Fibrosis, 骨内膜の濃染。

安 田 論 文 附 図 (Ⅲ)

附図 13 第1例 右耳
骨髓炎様。危険性側頭骨の像

附図 14 第1例 右 外耳道上棘 (×100)
骨の脆弱化著明。ハ管、骨小管を中心とした時代の新しい骨。骨髓腔内の Fibrosis, 結合織。

附図 15 第1例 右 乳様洞の外側壁
骨の多孔質化。骨内膜の濃染。

附図 16 第1例 右 乳様突起尖端
骨の多孔質化。脂肪髄、赤色髄。

附図 17 第1例 右 S 状洞壁
骨の多孔質化。脂肪髄の一部器質化。骨の離断所見。

附図 18 第1例 右 後頭顆
狭義の骨髓炎。骨の変性強く死骨化。

附図 19 第2例 左耳

錐体尖, S 状洞周囲骨融解. 迷路周囲, 乳様突起尖端不鮮明. 三半規管部不鮮明化. 危険性側頭骨の像.

附図 20 第2例 左 乳様洞の外側壁 (×100)

核の消失乃至は濃縮. 異常紋理の出現. 骨の吸収像.

附図 21 第2例 左 乳様突起尖端

紋理の錯綜. 骨髓腔より骨の吸収. 骨髓炎.

附図 22 第2例 左 颞闊蜂巢

紋理の不鮮明. 核の消失多し. 鋸歯状の接合線の多数の走行. 窩状吸収. 右方に肉芽組織.

附図 23 第2例 左 上半規管附近

異常紋理の出現. 骨小管腔内の Fibrosis, 結合組織, 周辺に造骨細胞の並列.

附図 24 第2例 左 錐体尖 (仁保・平野法)

紋理の錯綜. ハ管, 骨小管腔の骨新生による縮小且つ再び窩状吸収. 管腔内の Fibrosis.

安田論文附図(V)

附図 25 第2例 右耳
不鮮明。危険性側頭骨の像。

附図 26 第2例 右 乳様洞の外側壁
紋理の錯綜。異常紋理の出現。窩状吸収。

附図 27 第2例 右 乳様洞
骨の頻回の破壊増殖。骨小管腔内の浮腫, Fibrosis.

附図 28 第2例 右 幽窩蜂窠
骨小腔の拡大, 核の消失。紋理不鮮明。

附図 29 第2例 右 後蜂窠列 (山下法)
紋理錯綜。骨の変性強い。含気腔は2~3層の円味
を帯びた上皮細胞に囲まれた小腔, 周辺に類骨組
織。

附図 30 第2例 右 後下蜂窠列 (Kramm 法)
骨髓腔よりの骨の吸収。骨髓腔内の雲絮状物質, 細胞浸潤。

安田論文附図(Ⅵ)

附図 31 第3例 左耳
不鮮明。水平，後半規管不鮮明。

附図 32 第3例 左 乳様突起尖端
核の消失，紋理の不鮮明。脂肪髓。

附図 33 第3例 左 隅角蜂窠
骨髓腔よりの頻回の骨破壊増殖による鋸歯状の接合線が多数。管腔内の浮腫，空虚な血管腔，拡張した淋巴管。

附図 34 第3例 左 乳様洞
骨の脆弱化による離断，多孔質化，脱灰化。右方の軟部組織より骨吸収，軟部の浮腫，Fibrosis。

附図 35 第3例 左 骨性迷路より増殖せる骨
骨の脆弱化，多孔質化。軟部組織は浮腫の強い結合線。

附図 36 第3例 左 上鼓室の外側
骨の脆弱化，離断縁にヘマトキシリンに濃染する接合線。ハ管腔，骨小管腔内の Fibrosis，結合線。

安 田 論 文 附 図 (Ⅶ)

附図 37 第3例 左 後，後上蜂窠列 (×100)
骨の脆弱化，骨小管腔内の浮腫，結合織．右方には
2個の脂肪髓あり，辺縁に鬆疎な結合織．

附図 38 第3例 左 鼓室天盖
骨の離断著明．ハ管，骨小管を中心としてばらばら．管腔の浮腫，Fibrosis．一部に異常紋理．

附図 39 第3例 左 外耳道前壁
骨の多孔質化，脱灰．広義の骨小管内軟部組織の收縮，骨内膜層のヘマトキシリンに濃染．

附図 40 第3例 左 槌骨小頭
管状の骨破壊腔及び骨内膜層の濃染，管腔内の浮腫，一部脂肪髓えの変化，窩状吸収．

附図 41 第3例 左 錐体尖 (仁保・平野法)
骨の脆弱化，一部に脱灰化．骨小管腔の Fibrosis，結合織．

附図 42 第3例 左 解剖学的錐体尖
骨の脆弱化，核の偏在，消失．異常紋理．ハ管，骨小管腔の浮腫．

附図 43 第3例 右耳
乳様突起部骨髓炎様。闊頭蜂巢骨融解竈。水平，後半規管部不鮮明化。

附図 44 第3例 右 乳様洞の外側壁(×100)
骨の脆弱化，変性。ハ管，骨小管腔内の浮腫，結合

附図 45 第3例 右 乳様突起尖端
骨髓腔内の器質化。

附図 46 第3例 右 槌骨小頭
骨の脆弱化。Osteoporose. 骨小管腔内の浮腫，Fibrosis，軽度の細胞浸潤。軽度の骨新生。

附図 47 第3例 右砧骨
ばらばらの骨組織，Osteoporose. 脂肪髄。

附図 48 第3例 右 解剖学的錐体尖
骨の変性は中等度。軟部は骨髓腔，腔内周辺に結合

安田論文附図(X)

附図 49 第4例 左耳
不鮮明。一部骨髓炎様。軽度の危険性側頭骨の像。

附図 50 第4例 左 乳様突起尖端 (×100)
骨小腔の拡大，軽度の Osteoporose. 管腔内の浮腫，Fibrosis.

附図 51 第4例 左 闊窩蜂窠
接合線を境にして新生骨の附加，更に再び窩状吸収
が起り頰骨組織。慢性含気蜂窠炎。

附図 52 第4例 右耳
不鮮明。一部骨髓炎様。

附図 53 第4例 右 後頭顱に達する病竈
下及び右方の骨片の死骨化。

附図 54 第4例 右 頰骨蜂窠
慢性含気蜂窠炎。慢性骨炎。

安田論文 附図 (X)

附図 55 第5例 右耳

不鮮明。乳様洞附近に骨融解竈。軽度の危険性側頭骨の像。

附図 56 第5例 右 乳様洞 (×100)

骨の変性強い。軟部は肉芽組織。窩状吸収。上皮の肥厚増殖，上皮下の円形細胞浸潤。含気腔内の炎症性滲出物。

附図 57 第5例 右 小脳部骨内板

ハ管腔内の浮腫，骨増殖による縮小。骨髓組織よりの骨の吸収。左上方に僅かな骨の増殖。

附図 58 第5例 右 顔骨蜂巢

接合線を境として時代の新しい骨の附加，再び窩状吸収。骨を取り囲む肉芽組織。

附図 59 第5例 左耳
骨髓炎様。

附図 60 第5例 左 乳様突起尖端

コレステリンの結晶を中心にした肉芽組織。異物型巨細胞が多数見られ，組織球，形質細胞，多形核白血球。

安 田 論 文 附 図 (XI)

附図 61 第6例 右耳
不鮮明。一部骨髓炎様。

附図 62 第6例 右 乳様洞の外側壁 (×100)
軟部組織よりの骨の高状吸収。上方に時代の異なる骨。

附図 63 第6例 右 後頭顆
遺残軟骨組織の化骨。

附図 64 第6例 右 頰骨蜂窠 (×60)
緻密化した骨及び骨小管腔内の結合織、一部肉芽組織、骨壁に造骨細胞の並列。含気蜂窠上皮下の細胞浸潤及び浮腫。

附図 65 第6例 左耳
不鮮明。一鄂骨髓炎様。軽度の危険性側頭骨の像。

附図 66 左 後蜂窠列 (×100)
時代の新しい骨の変性。骨小管内の浮腫。

安田論文附図(Ⅻ)

附図 67 第7例 左耳
骨髓炎様。

附図 68 第7例 左乳様洞の外側壁(×100)
骨はやゝ脆弱化，接合線を境とする時代の新しい骨の附加。含気蜂窠の上皮の肥厚増殖，上皮下の肉芽組織及び細胞浸潤。

附図 69 第7例 左外耳道上壁
含気蜂窠の上皮は数層に肥厚増殖，上皮下の細胞浸潤，結合織→肉芽組織。接合線の部分で離断した骨組織は脱灰化。

附図 70 第7例 右耳
骨髓炎様。軽度の危険性洞頭骨の像。

附図 71 第7例 右後下蜂窠列(Kramm 法)
狭義の骨髓炎。

附図 72 第7例 右後，後上蜂窠列(山下法)
時代の古い骨の高度の脱灰。上皮下の浮腫，一部脂肪髄えの変化。骨小管の浮腫，血管の圧迫。

1953. (ii) 錐体尖炎, 特にその臨床; 日耳鼻第51回宿題報告, 別刷, 1950. (iii) 錐体尖に関する諸問題; 耳喉, 21, 12, p. 538, 1949. 17) 仁保(正): 寒冷の中耳炎に及ぼす影響; 日耳鼻, (i) 47, 9, p. 1142, 1941. (ii) 47, 11, p. 1420, 1941. (iii) 48, 5, p. 540, 1942. (iv) 48, 5, p. 582, 1942. (v) 48, 6, p. 631, 1942. (vi) 48, 6, p. 646, 1942. 18) 猿渡, 仁保(正): 側頭骨炎(所謂広義の中耳炎)の分類に就ての一新提唱; 日耳鼻, 48, 8, p. 910, 1942. 19) 仁保(正), 平野, 小笠原: 錐体炎症例追加; 日耳鼻, 48, 6, p. 690, 1942. 20) 仁保(正), 手塚, 佐田: 錐体炎症例追加(その三) 定型的錐体炎の1例; 耳鼻臨, 38, 6, p. 387, 1943. 21) 仁保(正), 平野, 仁保(三): 錐体炎に就て; 耳喉, 21, 12, p. 493, 1949. 22) 仁保(正), 仁保(三), 望月: 錐体炎に就て; (i) 耳喉, 20, 5, p. 198, 1948. (ii) 耳喉, 21, 1, p. 9, 1949. 23) 井沢, 永井, 仁保(正): 興味ある経過を辿つたムーゴズ菌側頭骨炎の1例; 耳喉, 22, 10, p. 413, 1950. 24) 仁保(三), 永井: 側頭骨炎(所謂中耳炎)に際する骨病変の発生機序に就いて; 耳喉, 22, 11, p. 459, 1950. 25) 石川, 仁保(正): 側頭骨炎根治手術に因り初めて治癒した慢性錐体炎の1例; 耳喉, 23, 2, p. 50, 1951. 26) 仁保(正), 吉尾, 石川: コベツキー・アルム・ア氏法の際に生じた大なる錐体尖骨破片の除去について; 耳喉, 23, p. 101, 1951. 27) 仁保(三), 仁保(正): 耳性化膿性脳膜炎の4例, 殊に側頭骨の病理組織学的所見に就て; 耳喉, 21, 11, p. 473, 1949. 28) 仁保(正), 仁保(三), 吉尾, 永井, 高畑, 岩武: 錐体炎に就て; 横浜医学, 4, 3~4, p. 593, 1953. 29) 仁保(正), 岩武, 高畑: 錐体炎及び側頭骨炎に就て; 日耳鼻, 56, 11, p. 952, 1953. 30) 今: 近世病理解剖学, p. 278, 1941. 31) 佐藤(保): 耳鼻咽喉科領域における微細血管分布の研究, II 中耳における所見; 成医会雑誌, 66. 32) 鍋谷: 日耳鼻, (i) 28, p. 141, 1922. (ii) 31, p. 296, 1925. (iii) 32, p. 353, 1926. 33) 手塚: 従来の側頭骨, 頭蓋骨々髄炎の1例に就て; 耳喉, 22, 1, p. 9, 1950. 34) 手塚: 所謂中耳炎(側頭骨炎)に対する化学療法の限界; 耳喉, 24, 5, p. 206, 1952. 35) 仁保(正), 高畑, 岩武: 所謂慢性中耳炎のシュテンベルス氏法レ線像に就て; 日耳鼻, 55, 4, p. 239, 1952. 36) 高畑: 所謂慢性中耳炎

のシュテンベルス氏法レ線像に就て; 耳喉, 25, 9, p. 437, 1953. 37) 土田: 所謂先天性潜在性中耳炎に就て; 耳鼻臨, 44, 6, p. 201, 1951. 38) 土田, 寺山, 野中: 側頭蜂窠と骨髄との関係; 耳喉, 24, 9, p. 381, 1952. 39) 仁保(正), 高畑, 岩武: 慢性穿孔性中耳炎(側頭骨炎)に因る高度難聴者の治療に就て; 耳喉, 24, 13, p. 729, 1952. 40) 高畑: 保存的側頭骨炎根治手術により速に治癒した電撃性側頭骨炎の1例; 耳喉, 25, 1, p. 24, 1953. 41) 重野: 慢性中耳炎とPn-Hemmungの関係に就ての組織学的研究; 日耳鼻, 58, 5, p. 469, 1955. 42) 仁保(正), 安田: 急性内耳炎の手術的療法; 耳喉, 28, 3, p. 184, 1956. 43) 仁保(正), 安田: 慢性限局性内耳炎の手術的療法(附, 保存的側頭骨炎根治手術); 耳喉, 28, 3, p. 181, 1956. 44) 仁保(正), 安田: 慢性側頭骨炎の聴力改善手術; 耳喉, 28, 3, p. 155, 1956. 45) 吉田(正): 慢性中耳炎の骨病理に関する研究; 日耳鼻, 60, 5, p. 582, 1957. 46) 仁保(三): 慢性側頭骨炎に対する錐体手術100例の経緯; 耳喉, 25, 5, p. 213, 1953. 47) 吉尾: 乳様突起闊隔蜂窠より後頭顱に達する病巣に就いて; 耳喉, 22, 4, p. 142, 1950. 48) 吉尾: 電撃性中耳炎における乳様突起部及錐体組織像について; 耳喉, 23, 4, p. 141, 1951. 49) 安田: 慢性側頭骨炎による高度難聴者の1手術例; 日耳鼻, 60, 7, p. 1004, 1956. 50) 佐野, 吉尾, 石川: 錐体手術(急・慢性症)30例の臨床, 組織学的所見; 日耳鼻, 55, 6, p. 454, 1952. 51) 吉尾: 所謂中耳根治手術後の錐体手術9例の観察; 金大松田教授開講20週年記念論文集.

御校閲をいただいた平野新治教授並びに組織標本につき御援助をいただいた横浜医大病理吉村教授に深甚の謝意を表すると共に, 終始御指導御鞭撻をいただいた恩師仁保(正), 仁保(三)両博士に衷心より感謝致します.

本論文の要旨は日耳鼻関東地方会第29回大会, 第340回例会, 第342回例会, 第59回日本耳鼻咽喉科学会総会において発表した.

(原稿到着=昭和33.9.25日一急載)