STUDIES ON THE ANAEROBIC BACTERIA I N THE
CHRONIC PARANASAL SINUSITIS

Part 2. Clinical Studies

By

S. NAKAGAWA

*From the Oto-Rhino-Laryngological Department, Tokyo-Teishin Hospital
(Director: Dr. R. Osawa, Prof. M. Magara)*

The results of clinical observation of the cases with anaerobes were summarized as follows;

1) In cases the pus which retained in maxillary sinus were acid in reaction, purulent and foul-smelling, incidence of the isolation of the anaerobes was extremely high. On the other hand, in the cases mucus was retained, the incidence was only 7.6%.

2) The incidence was much more higher in the cases with unilateral involvement than those with bilateral paranasal sinusitis.

3) There was a tendency to show the evidence of some kind of previous dental diseases in the cases from which anaerobes were isolated.

4) In the majority of the cases, the nasal cavity proper belonged to so called "purulent form".

5) The relief of the anaerobes was not observed, even if chemotherapies were given for paranasal sinusitis.

Bacteriologically, recrudescence during the chemotherapy, is probably mainly due to the aerobes.

慢性副鼻腔炎の偏性嫌気性菌に関する研究

第2編 臨床的研究

東京逓信病院耳鼻咽喉科（部長：大沢林之助博士）

中 川 惣 一
ナカ ガワ ソウ イチ

目 次

第1章 緒 言	第1項 嫌気性菌検出例の自覚症
第2章 上顎洞滲溜液と細菌との関係に関する実験	第2項 副鼻腔炎罹患側と嫌気性菌
第1節 実験方法	第3項 嫌気性菌検出例の固有鼻腔所見
第2節 実験成績	第3節 小 括
第1項 滲溜液性状と細菌との関係	第4章 歯牙と嫌気性菌との関係に就いての実験
第2項 滲溜液臭気と嫌気性菌	第1節 実験方法
第3項 滲溜液 pH と嫌気性菌	第2節 実験成績
第4項 滲溜液色調と嫌気性菌	第1項 歯牙所見と嫌気性菌
第3節 小 括	第2項 歯牙レ線所見と上顎洞との関係
第3章 自・他覚所見と嫌気性菌との関係に就いての観察	第3節 小 括
第1節 実験方法	第5章 化学療法による嫌気性菌の交代菌現象に関する実験
第2節 実験成績	第1節 実験方法
	第2節 実験成績

第6章 総括及び考按

第1節 上顎洞滲溜液に就いて

第2節 嫌気性菌と副鼻腔炎の臨床像に就いて

第3節 歯牙・嫌気性菌・上顎洞との関係に就いて

第7章 結 論

第1章 緒 言

私は第一編の研究において、慢性副鼻腔炎の上顎洞滲溜液内偏性嫌気性菌は強い自然病原性を持つと考えられること、全検査例の約1/3に検出されたこと、しかもこれ等の中には抗生物質、サルファ剤等に対して、かなりの低感性を示す菌株も存在すること、生体内においても感性低下の起る可能性を否定し得ないこと、及び嫌気性菌は洞粘膜内にも生存している事、更に又、V菌(仮称)の興味ある性状等から上顎洞内はかなりの低酸素分圧の還境下にある場合が少くない事等を知り得たが、斯様な成績からすると、嫌気性菌という細菌的な側からみて、種々論議されている慢性副鼻腔炎の臨床像に、何等かの特殊性も認め得ないだろうか。

あるいは又、本菌群の存在を臨床上、大略想像し得る目安が何もないだろうか？

更に又、臨床上、慢性副鼻腔炎として取扱われる症例は夫れが一次的にせよ、二次的にもせよ、細菌感染で顕現されるものであると考えられている以上、化学療法は姑息的療法として現在最上のものであるから斯様な症例に本療法を試みた場合、好気性菌に認められる交代菌現象という事が、全く代謝過程を異にする偏性嫌気性菌の場合にも生存環境の変化に伴い起り得る現象であろうか？

私は以上の三点を究明したいと考え、大沢林之助博士真柄正直教授の御指導の下に本研究に着手し些かの知見を得たのでここに報告し御批判を仰ぎたいと思う。

第2章 上顎洞滲溜液と細菌との関係に関する実験

緒言に述べた立場から、化学療法を行う場合、臨床上先ず施行される上顎洞の試験穿刺、排膿、洗滌という事実に着目し、同時に細菌の生存環境でもある上顎洞滲溜液に先ずその関連性を求めてみた。

実験対象は第一編と同一例で実験材料は、同方法により採取した128例、185洞の上顎洞滲溜液である。

実験は緒言に述べた立場から、又臨床と云うある程度限定された枠内で容易に行い得る事項という観点から滲溜液の肉眼的性状、臭気、pHの3項目に就いて行つた。

第1節 実験方法

(1) 滲溜液の性状：滲溜液は所謂、純膿性と粘液性との間に膿成分あるいは粘液成分の多少に依り、膿>粘性、粘>膿性の2段階を設け、膿性、膿>粘性、粘>膿性、粘液性の4種に肉眼的に区分し、同時に滲溜液色調を観察した。

(2) 滲溜液 pH：材料採取後30分(～1時間)以内に東洋濾紙製 pH 試験紙により測定した。

(3) 滲溜液臭気：滲溜液が腐敗臭、腐肉臭、スカトール様臭、あるいは壊疽臭乃至は酸性刺激臭等々、各種の不快臭気を発する場合、悪臭ありと判定する事にした。

第2節 実験成績

第1項 滲溜液性状と細菌との関係

(1) 嫌気性菌と滲溜液性状：それぞれの滲溜液性状に対する嫌気性菌の検出洞は膿性60洞中33洞(55.0%)、膿>粘性では52洞中16洞(30.7%)、粘>膿性では60洞中13洞(21.6%)、粘液性滲溜液13洞では1洞(7.6%)である(第1表)。即ち滲溜液の膿性成分が減少するに従い、嫌気性菌の検出洞は低下する(55.0%→30.7

第1表 滲溜液性状と嫌気性菌の検出

	膿 性	膿>粘性	粘>膿性	粘液性	計
検 査 洞	60洞	52洞	60洞	13洞	185洞
嫌気性菌 検 出 洞	33洞	16洞	13洞	1洞	63洞
検査洞に 対する率	55.0%	30.7%	21.6%	7.6%	

第2表 滲溜液性状と好気性菌の検出

	膿 性	膿>粘性	粘>膿性	粘液性
G (+) 双球菌	19株 (35.8%)	12株 (30.7%)	14株 (24.5%)	1株 (14.0%)
血 好 菌	5株 (9.4%)	6株 (15.5%)	23株 (40.3%)	4株 (57.0%)
G (+) 桿 菌	15株 (28.3%)	13株 (33.3%)	10株 (17.5%)	
G (-) 桿 菌	5株 (9.4%)	6株 (15.5%)	6株 (10.5%)	
ブ ド ー 球 菌	4株 (7.5%)	1株 (2.5%)	2株 (3.5%)	1株 (14.3%)
レ ン サ 球 菌	4株 (7.5%)	1株 (2.5%)	1株 (1.7%)	
其 の 他	1株 (1.8%)		1株 (1.7%)	1株 (14.3%)
計	53株 (100%)	39株 (100%)	57株 (100%)	7株 (100%)

G: グラム染色

%→21.6%→7.1%)。

(2) 好気性菌と滲溜液性状との関係：滲溜液性状を調査したのは185洞で成績は第2表に示した。

本成績からすると双球菌の検出は膿性→膿>粘性→粘>膿性→粘液性となるに従い35.8%→30.7%→24.5%→14.0%と減少するに反し、血好菌の検出はこれとは逆に膿性→粘液性となるに従い9.4%→15.5%→40.3%→57.0%と増加している。

又グラム陽性桿菌の検出は膿性、膿>粘性夫々28.3%33.3%を占めるが粘>膿性では17.5%と急減し、粘液性滲溜液では0%であつた。しかしグラム陰性桿菌の検出は膿性、膿>粘性、粘>膿性夫々9.4%、15.5%、10.5%で三者の間に著明な差がない。この関係を棒グラフで表したのが第1図である。

第1図 滲溜液性状と検出好気性菌菌種との関係

第2項 滲溜液の臭気と嫌気性菌との関係

滲溜液が悪臭を発したのは185洞中63洞(34.0%)で斯様な臭気陽性洞と滲溜液性状との関係をみると第3表の如く、膿性程悪臭を発する率が高く(73.3%→32.7%→3.3%→0%)、粘液性では悪臭を発する事は極めて稀かあるいは全くない。

第3表 滲溜液性状と臭気との関係

	膿性	膿>粘性	粘>膿性	粘液性	計
検査洞数	60	52	60	13	185
臭(-)洞数	16	35	58	13	122
臭(+)洞数	44	17	2	0	63
検査洞に対する(+)洞の率	73.3%	32.7%	3.3%		

第4表 悪臭滲溜液と細菌との関係

嫌気性菌の	嫌好共棲	好気性菌の	菌陰性	計
22洞 (34.9%)	20洞 (31.7%)	15洞 (23.8%)	6洞 (9.5%)	63洞 (100%)

次に滲溜液臭気と細菌との関係をみると(第4表)臭気陽性洞63洞中、嫌気性菌のみの検出は22洞(34.9%)嫌気・好気共棲検出は20洞(31.7%)好気性菌のみの検出が15洞(23.8%)、菌陰性の場合が6洞(9.5%)である。即ち菌陰性の場合でも強い臭気を発する場合もあるが、一般に云つて、悪臭滲溜液では好気性菌に比して嫌気性菌の検出される場合が多い傾向にある。以上の成績を繰返すと、臭気のある滲溜液では嫌気性菌の検出される場合が多く、又膿性である程、臭気を発する率が高い事になる。

このような傾向は前述した滲溜液性状と嫌気性菌検出率との関係(第1表)と同様であるから滲溜液が臭気を発することの少ない粘>膿性の場合(3.3%)を除外して滲溜液性状・臭気・嫌気性菌に就いて検討すると膿性滲溜液で悪臭を発する場合には70.4%、膿>粘性で悪臭を発する場合には58.8%に嫌気性菌が検出される事になる(第5表a, b)。

これに反して、膿性で悪臭のない場合には12.5%、同様膿>粘性の場合は17.1%に嫌気性菌が発見されるに過ぎないことになる。

第5表-a 膿性滲溜液の場合

臭気	(+)洞	(-)洞
嫌気性菌		
(+)洞	33洞 (70.4%)	2洞 (12.5%)
(-)洞	13洞 (29.5%)	14洞 (87.5%)
計	44洞 (100%)	16洞 (100%)

第5表-b 膿粘性滲溜液の場合

臭気	(+)洞	(-)洞
嫌気性菌		
(+)洞	10洞 (58.8%)	6洞 (17.1%)
(-)洞	7洞 (41.1%)	29洞 (82.8%)
計	17洞 (100%)	35洞 (100%)

第3項 滲溜液 pH と嫌気性菌との関係

(1) 予備実験成績：Hilding²⁴⁾に依れば鼻汁 pH は採取後短時間で酸性側からアルカリ性側に移行するとの報告があり、私の実験では滲溜液に就いて他に種々検索する事項があつたために、採取直後に行う事ができなかった。そこで本実験とは別に3例に就いて pH の移動を実験した結果(第6表)1時間以内では大した変動のない事を確め得た。

第6表 時間的経過による滌溜液 pH の移動

時間	pH	膿性	膿性	粘膿性
30"		6.2	6.2	7.2
60"		6.2	6.2	7.2
1'30"			6.2	7.2
2'		6.2	6.2	7.2
3'		6.2	6.4	7.0
3'30"			6.2	7.0
4'			6.2	7.2
5'		6.2	6.2	7.0
6'			6.2	
8'				7.0
10'		6.2	6.4	7.2
15'			6.4	7.2
20'		6.2	6.4	7.2
30'		6.2	6.2	7.4
60'		6.0	6.4	7.6
70'				7.4
80'				7.6
90'		6.0		7.8

は pH7.0 以下は 7.6% に過ぎず, pH7.8 以上が 86.4% を占め, 粘性では pH8.2 以下のものはなく, pH9.0 以上が 78% を占めた. 即ち滌溜液の粘性成分が増加するに従い滌溜液 pH はアルカリ性に傾く.

斯様な pH の動きと, 嫌気性菌 検出との 関係を検討すると, pH7.0 以下の滌溜液には 54.8%, pH7.6 以下では 70.8% でこれは膿性あるいは膿>粘性の pH の動きとも一致している. 換言すれば膿性成分の多い程, 又酸性側に近い程, 嫌気性菌の存在する率が高いことにな

第2図 滌溜液 pH・性状・嫌気性菌の関係

(2) 本実験成績: 滌溜液 pH を検索し得たのは 161 洞で成績は第7表及び第2図に示した. 即ち膿性では pH7.0 以下が 59.3%, 膿>粘性の場合は pH7.0 以下は 49.8% で約半数は酸性側にあるに反し, 粘>膿性の場合

第7表 滌溜液 pH・性状・嫌気性菌の関係

pH	膿性	膿性	膿>粘性	粘性	粘>膿性	粘性	粘液性	嫌気性菌
5.8	2 (2)	2 (3.7%)	1 (1)	1 (2.1%)				3 (5%)
6.0		10	1	10		1		13
6.2	4 (4)	(18.6%)	4 (3)	(21.7%)		(1.9%)		(23.0%)
6.4	6 (5)		5 (1)		1			
6.6	7 (3)		2 (1)	12	1 (1)	3		15
6.8	7 (4)	(37.0%)	6 (3)	(26.0%)	1	(5.7%)		(26.8%)
7.0	7 (2)		4		1 (1)			
7.2	5 (3)			6		3		9
7.4	2 (2)	(26.0%)	3	(13.0%)	1 (1)	(5.7%)		(16.0%)
7.6	7 (3)		3		2			
7.8	2		5 (1)	13	9 (2)	16		8
8.0	2 (1)	(7.4%)	6 (2)	(28.1%)	4 (1)	(30.7%)		(14.0%)
8.2			2		3 (1)			
8.4	2		1	4	8 (3)	22	2	5
8.6		(5.5%)	3	(8.7%)	4	(42.3%)	(22%)	(8.9%)
8.8	1 (1)				10 (1)		2	
9.0	1		1		5 (2)	7	5 (1)	3
9.2		(1.8%)			1	(13.4%)	(87%)	(5.3%)
9.6					1		2	
計	54 (100%)		46 (100%)		52 (100%)	9 (100%)		56 (100%)

る。しかし pH8.4 以上の滯溜液にも 14.2%, pH9.0~9.4 でも 5.3% に検出されている。

第4項 胆汁色調と嫌気性菌との関係

滯溜液が膿性である程淡緑色の色調を帯びる傾向を認めた。しかし緑色色調と嫌気性菌との間に有意義な相関は認めなかつた。

第3節 小括

(1) 上顎洞滯溜液の性状と嫌気性菌検出率との間に一定の関係を認めた。即ち滯溜液の膿性成分が減少するに従い、検出率は低下する。(55.0%→30.7%→21.6%→7.6%)。

(2) 滯溜液が悪臭を発する率は膿性成分の多い程頻度が高い。(73.3%→32.7%→3.3%→0%)。

(3) 滯溜液が膿性且悪臭を発する場合には 70% に、膿>粘性で悪臭ある場合には 59% に嫌気性菌が存在するとみてよい。

(4) 滯溜液 pH は膿性程、酸性側に近く(膿性では pH7.0 以下 59.3% 膿粘性では pH7.0 以下 49.8%) 粘液成分の増加に従いアルカリ性に傾く(粘膿性では pH8.4 以上が 55.7%, 粘液性では pH9.0 以上 78%)。嫌気性菌の検出率は pH7.0 以下で 54.8%, pH7.6 以下では 70.8% であつて、滯溜液が酸性に近い程検出頻度が高い。

(5) 本実験対象症例はいずれも 2~3 年以上の経過を有しているから嫌気性菌感染は化膿性炎症を惹起し易い傾向を有すると思われる。

(6) 上顎洞滯溜液の性状と検出好気性菌菌価との間にもある程度の関連性を認めた。

第3章 自他覚所見と嫌気性菌との関係に就いての観察

緒言に述べた観点より嫌気性菌の存在を大略予想できる場合を上顎洞滯溜液の性状、臭気、pH に求めた結果これ等との間に強い関係を認め、嫌気性菌の感染は化膿性炎症を起し易いと考えられる事を前章に述べた。さようであるとすれば、慢性副鼻腔炎の臨床像であるいは患者の訴えに、これと一致する所見を認め得るだろうか? 私はこれを患者の自覚症、副鼻腔炎の罹患側、固有鼻腔所見に求めてみた。

第1節 観察方法

(1) 自覚症: 患者が苦痛として訴える症状を総てとりあげ、その中最も苦痛な自覚症をその患者の主訴とした。

(2) 罹患側: 問診、固有鼻腔所見、レ線単純撮影所

見、試験穿刺所見の4項目から偏側、あるいは両側罹患を区別した。

(3) 固有鼻腔所見: 固有鼻腔所見に立脚した大沢の臨床型¹¹⁾に従い嫌気性菌検出例を分類した。即ちⅠ型(膿性肉芽型): 膿性鼻汁を多量に分泌し、あるいは乾酪様物質を含有するのではないかと考えられるもので、粘膜は特に中鼻道附近において赤色柔軟肉芽性を呈し、触れると出血するものが多い。稀に鼻茸を伴うこともある。Ⅱ型(膿性型): 中鼻道嗅裂部に亘り主として膿性分泌物を認めるもので粘膜は正常色に近く他に特別の所見を認め難い型で言い換えればⅠ型の軽症型とも称すべきもの。Ⅲ型(粘液膿性型): Ⅱ型に類似するがたゞ分泌物が膿性のみでなく、粘液をも含むもので、多くは甲介肥厚が強い。粘膜は概して正常色に近い。稀に鼻茸を伴う。Ⅳ型(茸性浮腫型): 中甲介が茸状、浮腫性に腫脹あるいは肥大し、同様の変化が中鼻道を中心として広く存在し、粘膿性分泌が種々の量に存在し、特に粘液は索線性の性質を有するものが多い。大多数に鼻茸を伴うのが普通である。下甲介は肥大する場合と萎縮性に見える場合がある。粘膜は蒼白色に傾き正常色とは云えない。Ⅴ型(アレルギー性膿性型): 鼻腔粘膜は一般に蒼白で浮腫性の傾向を帯び甲介は肥大し、T-saine, adrenaline 等の薬剤塗布で多量の粘液を分泌する。黒色に見えるような鼻茸を認めることが多い。要之、鼻アレルギーに膿性鼻汁を加たような型である。

第2節 実験成績

第1項 嫌気性菌検出例の自覚症

検出例 39 例の主訴に就いて調査した結果は第 8 表(a)の如く、悪臭鼻汁過多、内至鼻腔内悪臭を訴える例が 14 例 (35.8%) 鼻閉 11 例 (28.2%) 単に鼻汁過多を訴えるものが 11 例 (28.2%) 後鼻漏、頭重、鼻根部圧重感を主訴としたものは夫々 1 例 (2.5%) であつて嫌気

第 8 表-a 嫌気性菌検出例の主訴

悪臭鼻汁過多	10
鼻腔内悪臭	4
鼻汁過多	11 (28.2%)
鼻閉	11 (28.2%)
後鼻漏	1 (2.5%)
頭重	1 (2.5%)
鼻根部圧重	1 (2.5%)
計	39 (100%)

第 8 表-b 嫌気性菌検出例の自覚症

鼻汁過多	38 例 (94.7%)
内悪臭 (+)	12 例 (30%)
鼻閉	38 例 (94.7%)
頭重	33 例 (84.6%)
後鼻漏	24 例 (61.5%)
嗅覚障碍	13 例 (33.3%)
鼻腔内悪臭	7 例 (17.9%)

性菌検出例において悪臭と云う主訴の占める比率は非常に多いことになる。次に患者の訴える自覚症の総てを集計すると(第8表-b)鼻汁を訴えるものは39例中38例でこの中12例は鼻汁が臭気を帯びていると訴えている。鼻閉は鼻汁過多と同様38例が訴え、次いで頭痛あるいは鼻根部圧重感を訴える33例、後鼻漏の24例、嗅覚障害の13例、鼻腔内悪臭の7例の順である。従つて、悪臭のある鼻汁あるいは鼻腔内悪臭を訴えたものは12例及び7例の計19例に達している。即ちこれ等を主訴としない迄も、自覚症として訴えるものが5例ある事になり、その頻度は48.7%に達する事になる。

斯様に嫌気性菌検出例においては頻度が多いと考えられる悪臭に就いて、その持続期間を調査すると、1年以内3例、1年5例、2～3年7例、4年以上が4例となつており、意外に長い間患者は悪臭を自覚していた事になる。しかし斯様な悪臭の発来動機においては19例中1例のみが2ヶ月前の感冒罹患後という誘因を述べた上で18例は誘因あるいは原因に就いて述べ得なかつた。

第2項 副鼻腔炎の罹患例

第一編と同一例136例に就いて調査した。成績は第9表に示した。即ち両側罹患の場合の嫌気性菌検出例との比は30.1%:69.9%であり、偏側の場合には63.3%:36.7%である。即ち両側性よりも偏側性副鼻腔炎の場合に嫌気性菌を検出するが多い。

第9表 副鼻腔炎罹患例と嫌気性菌との関係

嫌気性菌	罹患例		計
	両側罹患	偏側罹患	
検出例	32例 (30.1%)	19例 (63.3%)	51例
非検出例	74例 (69.9%)	11例 (36.7%)	85例
計	106例 (100%)	30例 (100%)	136例

第3項 嫌気性菌検出例の固有鼻腔所見

固有鼻腔所見を各臨床型別に分類した成績は第10表の如くである。各型の移行型と考えられる例が14例あつたが、便宜上、表の如くⅠ～Ⅳ型に属せしめると、Ⅰ型2例(5.1%)、Ⅱ型20例(51.3%)、Ⅲ型13例(33.3%)、Ⅳ型4例(10.2%)でⅡ型(膿性型)に属する症例が過半数を占め、Ⅰ、Ⅱ型の合計は56.4%に達する事になる。

第10表 嫌気性菌検出例の臨床型(大沢)

Ⅰ型	Ⅰ(例)	Ⅱ型
Ⅰ～Ⅱ型	1	(5.1%)
Ⅱ型	11	20例
Ⅱ～Ⅲ型	9	(51.3%)
Ⅲ型	10	13例
Ⅲ～Ⅳ型	3	(33.3%)
Ⅳ型	3	4例
Ⅳ～Ⅴ型	1	(10.2%)

即ち嫌気性菌検出例においては上顎洞溜溜液が膿性且悪臭陽性の場合が多いことに一致して、嫌気性菌検出例では副鼻腔炎の臨床像が所謂化膿型を呈する場合が非常に多いことになり、他科領域における嫌気性菌感染症の症状りの²⁰⁾から慢性副鼻腔炎でも嫌気性菌の感染は化膿性炎を惹起する傾向にあると云えよう。

第3節 小括

(1) 嫌気性菌の検出頻度は両側性副鼻腔炎におけるよりも偏側性副鼻腔炎における方がはるかに高い。

(2) 嫌気性菌検出例では自覚症として悪臭鼻汁あるいは鼻腔内悪臭を訴える場合が多く(48.7%)且意外に長期に亘り自覚している。しかしその発来動機は不明である。

(3) 嫌気性菌検出例の固有鼻腔は所謂化膿型の所見を呈する場合が多い。

第4章 歯牙と嫌気性菌との関係に就いての実験

伏は前章の実験によつて、嫌気性菌と副鼻腔炎の臨床像との間にある関連性を認め得たが、次に私はその関連性を歯牙に求めてみた。それは私が検出した嫌気性菌(第一編に記述)は病的歯牙あるいは歯肉から屢々検出されている事、前章実験結果から偏側性副鼻腔炎における場合の検出頻度が高い事、歯牙と上顎洞との関係は遠い以前より論議されている問題である事の三点から出発した。

第1節 実験方法

実験対象は第一編と同一例78例109洞で、嫌気性菌検出洞46洞、非検出洞63洞である。歯牙の観察は上顎P₁→M₂(M₃)に就いて肉眼的に観察し、問診上も歯牙・歯肉に関する訴えのない場合肉眼的健常と見做した。嫌気性菌検出例では、歯牙所見の有無に拘わらず、口内法でレ線撮影を行い、病変の有無を詳細に観察する事に

した。レ線撮影条件は、10mA, 60KVP, 露出1.5～2.0秒, 距離18cmで、主放射は通常行われる方向に行い、3×4cmのDentalfilmを使用した。レ線像に就いては歯根膜断裂の有無、歯根端部病変の有無、歯槽骨網状像の整、不整、洞底線所見の4項目を検討した。

第2節 実験成績

第1項 歯牙所見と嫌気性菌

第11表に示す如く、嫌気性菌検出洞46洞では肉眼的に健常と思われる場合は27洞(58.7%)肉眼的に歯牙・歯肉に病変を認めた場合あるいは処置の施されている場合は19洞(41.3%)である。非検出洞63洞の成績は肉

第11表 嫌気性菌と歯牙との関係

嫌気性菌 歯牙所見	検出洞 46洞: 100%	非検出洞 63洞: 100%
肉眼的健常	27洞 (58.7%)	46洞 (73.0%)
肉眼的に病変或 は処置あるもの	19洞 (41.3%)	17洞 (27.0%)

眼的健常46洞(73.0%)肉眼的に病変あるいは処置を認めるもの17洞(27.0%)である。従つて嫌気性菌検出洞における場合の方が(41.3%)非検出洞における場合(27.0%)よりも歯牙・歯肉の病変あるいは処置を認める場合が多い事になる。しかし、歯牙に病変を認めた(19洞+17洞=36洞:100%)からと云つて、嫌気性菌を検出する率が(19洞:52.8%)検出しない場合(17洞:47.2%)よりも著明に高い訳ではない。即ち、その逆は成立しない。

嫌気性菌検出洞において認めた歯牙の病変処置は(第12表)齶齦が6件(27.2%)で最も多く、次いで根管充填の4件(18.1%)、Crown、義歯(部分義歯及び総義歯)、抜歯後無処置の各々3件(13.6%)、歯槽膿漏症2

第12表 肉眼的歯牙所見

嫌気性菌 歯牙所見	検出洞	非検出洞
無処置齶齦	6 (27.2%)	5 (25.0%)
義歯(橋及総)	3 (13.6%)	3 (15.0%)
歯槽膿漏	2 (9.0%)	2 (10.0%)
Crown	3 (13.6%)	7 (35.0%)
抜歯後無処置	3 (13.6%)	0
根管充填	4 (18.1%)	3 (15.0%)
歯肉炎	1 (4.5%)	0
計	19洞 22件	17洞 20件

件(9.0%)、歯肉炎1件(4.5%)で、嫌気性菌非検出洞の歯牙病変と比較すると、検出洞では抜歯後無処置が13.6%あるに反して、非検出洞にはこれがなく、Crownは逆に非検出洞において最も高い件数となつている。

第2項 歯牙レ線所見と上顎洞との関係

嫌気性菌検出洞で歯牙所見並にレ線所見を観察し得たのは65洞中45洞で、この内、肉眼的に歯牙に所見を認めた17例19洞のレ線所見は第13表-aに表示した。即ち、歯根膜断裂を認めたもの3洞(15.7%)歯根端部病変を認めたもの2洞(10.5%)、歯槽骨網状像の不整3洞(15.7%)で、洞底線の太いものは6洞(31.5%)、細いものは11洞(57.8%)、不明2洞(10.5%)であつた。以上のレ線像からみて、尠く共、上顎洞と确实に関係ありと考えられた例は、症例98号の[6]口蓋根端の病変のみである(附図参照)。これを肉眼的歯牙所見を認めない嫌気性菌検出洞27洞のレ線像と比較すると(第13表-b)、洞底線所見には著明な差がないが、その他の所見では歯牙に所見を認めたものに当然病的所見を多く認

第13表-a 嫌気性菌検出例の歯牙所見陽性群におけるレ線所見

症 例 No.	歯 所	牙 見	レ線所見			
			歯根膜 断 裂	歯根端 部病変	網状像 不 整	洞底線 所 見
9	7	K	—	—	—	細
10	総	義	—	—	—	細
26	歯槽膿漏		—	—	—	稍太
	歯槽膿漏		—	—	—	稍太
27	567	冠	—	—	±	細
44	6	K	+	—	+	?
45	6	K	—	—	—	細
58	4	橋 義	±	—	—	?
82	7	充	—	—	—	細
91	765	充	—	—	—	太
98	7	K	?	6 +	—	細
101	5	K	—	—	—	太
102	5	冠	±	5 +	—	細
108	76	充	—	—	—	細
	56	冠	—	—	—	細
112	6	抜75	—	—	—	細
	6	橋 義	?	—	±	太
113	6	橋 義	?	—	±	太
115	6	K	—	—	—	太
121	歯	肉 炎	—	—	—	細

K: 齶齦, 充: 根管充填, 義: 義歯

抜: 抜歯後無処置

第13表-b 嫌気性菌検出洞の歯牙レ線所見

肉眼所見 レ線所見	歯根膜断 裂(+)洞	歯根端病 変(+)洞	網状像 不整洞	洞底線		
				太	細	不明
所見陽性洞19洞	3洞(15.7%)	2洞(10.5%)	3洞(15.7%)	6洞(31.5%)	11洞(57.8%)	2洞(10.5%)
所見陰性洞27洞	1洞(3.7%)	0	2洞(7.4%)	9洞(33.3%)	15洞(55.5%)	3洞(11.1%)

めている。

第3節 小 括

(1) 歯牙・歯肉の病変あるいは処置を認めるのは、嫌気性菌検出洞における場合の方が(41.3%)非嫌気性菌検出洞における場合(27.0%)よりも多い。しかし、歯牙病変を認めたからと云つて、嫌気性菌を検出する率が検出しない場合より著明に高い訳ではない。即ち、その逆は成立しない。

(2) 肉眼的に認めた歯牙病変・処置は、嫌気性菌検出洞では齦齦、根管充填が多く、非検出洞では Crown、齦齦が多いが、両者の間に歯牙の病変・処置上、特に著明な差は認め得ない。

(3) 歯牙レ線撮影は嫌気性菌検出例のみに就いて行つたが、レ線上、歯牙所見のある場合の方が、当然、所見のない場合よりも病的レ線像を多く認めた。しかし、歯牙と上顎洞とを明確に結びつけ得る所見を得たのは46洞中1洞に過ぎなかつた。

第5章 化学療法による嫌気性菌の交代菌現象に関する実験

私共が既に過去において報告した^{11) 12) 74) 75)} “慢性副鼻腔炎に対する各種化学療法”の実験によつて、自、他覚所見の好転と共に、甲介腫脹の減退、中鼻道・嗅裂の開放、分泌物の粘液化等が起る事、軽快に向つた自、他覚所見が再び増悪する場合、治療開始前と全く種類の異つた好気性菌が検出される事等を知り得た。

又、先に私は本実験第1章の実験成績から、嫌気性菌は悪臭・膿性・酸性の上顎洞滯溜液から多く検出されることを知つた。とすれば、慢性副鼻腔炎に化学療法を施行した場合、その生存環境の変化に伴い、嫌気性菌の検出状況はいかに変化するか、又、治療過程における慢性副鼻腔炎の再燃は細菌的にみて、好気性菌のみにその原因を歸し、嫌気性菌の交代菌現象は全く考慮の必要がないだろうか。

私はこの点に就いて究明したいと考え、本実験を実施した。

第1節 実験方法

実験対象は第一編と同一例で嫌気性菌の検出された12

例である。使用薬剤は Homosulfamin, Domian, Penicillin, Chloromycetin の4種を全身的あるいは局所的(上顎洞穿刺洗滌後注入)に使用した。投与量は副作用のない限り通常臨床で使用する量を継続した。

検出細菌の状態は週2回上顎洞穿刺を行い無菌的に採取した滯溜液を第一編第2章記載の培地5種に接種し、嫌気・好気両種菌の検索を行つた。各回における嫌気性菌々種の決定は染色 顕鏡形態、VF プイヨン発育状態、VF 高層寒天集落形態の三者を総合し、同一菌種や否やを決定することとし、特に各回検出菌の生物学的性状検査は行わなかつた。滯溜液に就いては本編第2章記載の方法により、性状、色調、臭気、pH の4項目を検索した。

第2節 実験成績

成績は第14表-a, 第14表-b, 第14表-c に一括表示する如くで各症例毎の詳細は省略する。

さて、細菌学的にみて、本実験成績から慢性副鼻腔炎の化学療法による嫌気性菌の検出状態に就いて次の事が云えよう。即ち、化学療法によつて滯溜液が粘液化すると嫌気性菌の検出はほぼ陰性化する。この傾向は好気性菌でもほぼ同様である。しかし、嫌気性菌の検出陰性化は使用薬剤種類あるいは治療日数とは無関係で、各症例に依り、又は検出細菌種あるいは共棲菌により一定しない。しかし、一般的に云つて、局所使用を行つた場合の方が、全身使用よりも滯溜液の粘液化が早く、従つて嫌気性菌の消失も幾分早い傾向がある。好気性菌では交代菌現象を認めたが(症例82号、佐藤, Homosulfamin 局所使用例, 症例26号、三宮、及び症例103号、町田, Domian 局所使用例)、嫌気性菌では本現象は、本実験では認めなかつた。症状再燃の場合は好気性菌が主役を果すものゝようである(33号関口, Homosulf 局所例, 26号三宮及び103号町田, Domian 局所例)。

第6章 総括及び考察

第1節 上顎洞滯溜液に就いて

滯溜液性状と pH 値との関係は各種の方法で測定されているが、Mittermaier⁷⁶⁾、副島⁸⁶⁾、吉田⁸⁵⁾、中村¹³⁾等によれば、膿性滯溜液では pH6.19~7.02, 6.2~

第 14 表-a 薬 剂 局 所 使 用 例

No.33 関口 31Lj ♂ Ⅲ型 H. 局所例	使 用 前	H. 1 回 使 用 後	H. 2 回 後	H. 4 回 後	H. 5 回 後	H. 7 回 使 用 後	H. 8 回 使 用 後	
	R _s 淡黄, 膿性, 悪 (+) pH 5.8 L _s 淡黄緑, 膿>粘, 悪 (+) pH5.8 R _s 好:(-), 嫌: レ. L _s	R _s 淡黄灰白, 膿, 悪 (+) pH6.0 L _s 淡黄緑, 膿, 悪 (+) pH5.8 R _s 好:(-), 嫌: レ. L _s	R _s 灰白, 黄, 悪(-), pH7.0 L _s 灰白黄, 膿>粘, 悪(-), 6.2 R _s 好:血好, 嫌: レ. L _s	R _s 好 (-), 嫌(-) L _s 好 (-), 嫌: レ	R _s 灰白褐, 粘液性, 悪(-), 7.8 L _s 探レズ R _s 好(-), 嫌(-)	R _s 灰白淡黄, 粘液性, 悪(-) 7.8 L _s 灰白淡黄, 粘液性, 悪(-) 7.8 R _s 好(-), 嫌(-) L _s	R _s 灰白淡黄, 粘>膿, 悪(-) 7.6 L _s " " " " R _s 好: 血好, 嫌(-) L _s	
No.89 宮川 31Lj ♂ Ⅳ型 H. 局所例	使 用 前	H. 1 回 使 用 後	H. 3 回 後	H. 5 回 後	→D. 局所使用=変更			
	R _s 灰白黄, 粘>膿, 悪(-) pH8.2 L _s 灰白黄, 粘>膿, 悪(-) pH8.0 R _s 好: 双, 嫌(-) L _s 好(-), 嫌: 双	R _s 黄緑, 膿>粘, 悪(-) pH7.4 L _s " " " " R _s 好: 双, 嫌(-) L _s 好(-), 嫌: 双	R _s 灰白淡黄, 粘>膿, 悪(-), 7.8 L _s 黄褐, 粘>膿, 悪(-), 7.6 R _s 好: 双, 嫌: 双 L _s 好(-), 嫌: 双	R _s 黄, 粘>膿, 悪(-), 7.4 L _s 灰白黄, 粘>膿, 悪(-), 9.6 R _s 好: 双, 嫌(-) L _s 好: 双, 嫌(-)				
No.82 佐藤 23Ll ♂ Ⅳ型 CM. 後 H. 局所	CM. 22.5g 投与済	H. 1 回 伊 用 後	H. 3 回 後	H. 6 回 後	H. 10 回 後	H. 11 回 後	H. 13 回 後	H. 14 回 後
	R _s 淡黄緑, 膿>粘, 悪(+), pH6.8 R _s 好: G(+)桿, 嫌: レ, G(-)桿	R _s 淡緑, 膿, 悪(+), pH6.8 R _s 好: G(+)桿, 嫌: レ, G(-)桿	R _s 淡黄灰白, 粘>膿, 悪(-), 7.6 R _s 好: G(+)桿, 嫌: レ, G(-)桿	R _s 灰白淡黄, 粘>膿, 悪(-), 7.8 R _s 好 (-), 嫌: レ	R _s 灰白淡褐, 粘液, 悪(-), 8.6 R _s 好 (-), 嫌 (-)	R _s 灰白淡黄, 粘>膿, 悪(-), 8.2 R _s 好 (-), 嫌 (-)	R _s 淡黄, 粘>膿, 悪(-), 8.0 R _s 好: プ, 嫌 (-)	R _s 淡黄, 粘>膿, 悪(-), 8.0 R _s 好: プ, 嫌 (-)
No.18 渡辺 19Lj ♂ Ⅲ型 D. 局所例	使 用 前	D. 2 回 使 用 後	D. 4 回 後	D. 6 回 後	D. 8 回 後	D. 10 回 後		
	R _s 灰白黄, 粘>膿, 悪(-), pH8.0 R _s 好: 血好, 双, 嫌: 双	R _s 灰白黄, 粘>膿, 悪(-), pH8.2 R _s 好: 血好, 双, 嫌: 双	R _s 灰白黄, 粘>膿, 悪(-), pH8.6 R _s 好: 血好, 双, 嫌: 双	R _s 灰白淡黄, 粘>膿, 悪(-), 9.2 R _s 好(-), 嫌: 双	R _s 灰白淡褐, 粘液, pH9.2 R _s 好 (-), 嫌 (-)	R _s 灰白褐, 粘液, 悪(-), 9.2~9.4 R _s 好 (-), 嫌 (-)		
No.26 三宮 27Lj ♂ Ⅲ型 D. 全身後 D. 局所	D. 82g 投 与 済	D. 1 回 使 用 後	D. 2 回 後	D. 3 回 後	D. 4 回 後	D. 5 回 後		
	R _s 灰白黄, 膿>粘, 悪(-), pH6.8 L _s 淡褐, 粘>膿, pH7.4 R _s 好: レ, 嫌: G(-) 桿 L _s	R _s 淡褐, 粘>膿, pH7.4 L _s 淡緑, 粘>粘, 悪(+), pH6.8 R _s 好 (-), 嫌: G (-) 桿 L _s	R _s 淡緑, 膿>粘, 悪(+), pH6.8 L _s 淡黄, 粘>膿, 悪(-), 7.8 R _s 好 (-), 嫌: G (-) 桿 L _s	R _s 淡緑, 膿>粘, 悪(+), 6.8 L _s 淡黄, 粘>膿, 悪(-), 7.8 R _s 好 (-), 嫌: G (-) 桿 L _s	R _s 淡黄, 粘>膿, 悪(-), 7.8 L _s 淡黄緑, 膿>粘, 悪(-), 7.0 R _s 好: G (+) 桿, 嫌 (-) L _s			
No.89 宮川 31Lj ♂ Ⅳ型 H局所→D局所	H. 使用 5 回 済	D. 2 回 使 用 後	D. 4 回 後	D. 5 回 後	D. 8 回 後			
	R _s 灰白淡黄, 粘>膿, 悪(-), 8.4 L _s 淡緑, 膿>粘, 悪(-), 8.0 R _s 好: 双, 嫌: 双 L _s 好(-), 嫌: 双	R _s 灰白黄, 粘>膿, pH8.6 L _s 灰白黄, 膿>粘, pH8.0 R _f 好: 双, 嫌: 双 L _s 好(-), 嫌: 双	R _s 灰白褐, 粘液性, 悪(-), 9.0 L _s 灰白黄, 膿>粘, 悪(-), 8.0 R _s 好 (-), 嫌 (-) L _s 好 (-), 嫌: 双	R _s 灰白黄, 粘>膿, 悪(-), pH8.2 L _s 灰白褐, 粘液, 悪(-), pH9.0 R _s 好 (-), 嫌 (-) L _s 好 (-), 嫌 (-)	R _s 灰白褐, 粘液, 悪(-), pH9.0 R _s 好 (-), 嫌 (-) L _s 好 (-), 嫌 (-)			
No.103 町田 30Lj ♂ Ⅲ型 D. 局所例	使 用 前	D. 2 回 使 用 後	D. 3 回 後	D. 4 回 後	D. 5 回 後	D. 7 回 後		
	R _s 淡緑, 粘>膿, 悪(-), pH8.4 R _s 好: G(+)桿, 嫌: 双	R _s 淡黄灰白, 粘>膿, 悪(-), 8.4 R _s 好: G(+)桿, 嫌: 双	R _s 淡黄灰白, 粘>膿, pH8.6 R _s 好: G(+)桿, 嫌: 双	R _s 灰白, 粘液, pH9.0 R _s 好 (-), 嫌 (-)	R _s 淡黄緑, 膿>粘, 悪(-), 7.4 R _s 好: 双, 嫌 (-)	R _s 淡黄緑, 膿>粘, 悪(-), pH7.4 R _s 好: 双, 嫌 (-)		
No.45 櫻井 24Li ♂ Ⅱ~Ⅲ型 P. 局所例	使 用 前	P. 2回 (10万u) 後	P. 3回 (15万u) 後	P. 4 回 (20万u) 後	P. 6 回 (30万u) 後	P. 7 回 (35万u) 後	P. 8 回 (40万u) 後	P. 9 回 (45万u) 後
	R _s 淡緑, 膿, 悪(+), pH6.2 R _s 好: G(+)桿, 嫌: 双	R _s 淡黄緑, 膿, 悪(+), pH6.2 R _s 好: G(+)桿, 嫌: 双	R _s 淡黄緑, 膿, 悪(+), 6.8 R _s 好: G(+)桿, 嫌: 双	R _s 淡黄緑 膿, 悪(+), pH6.8 R _s 好: G(+)桿, 嫌: 双	R _s 淡黄褐, 粘>膿, 悪(-), 7.0 R _s 好 (-), 嫌: 双	R _s 淡黄緑, 膿, 悪 (+), pH7.4 R _s 好: 血好, 嫌: 双	R _s 淡黄緑, 膿>粘, 悪 (+), 7.4 R _s 好 (-), 嫌: 双	R _s 淡黄, 粘>膿, 悪(-), pH7.8 R _s 好 (-), 嫌: 双

中段: 猪溜液性状 (色調, 性状, 臭気, pH の順)

下段: 検出細菌 (好: 好気性菌, 嫌: 嫌気性菌, G: グラム染色, レ: レンサ球菌, プ: ブドウ球菌, 桿: 桿菌, 双: 双球菌, 血: 血好菌)

R_s: 右洞, L_s: 左洞

H: ホモスルファミン, D: ドミアン, P: ペニシリン, CM: クロロマイセチン

第 14 表-b 薬 剂 全 身 投 与 例

No.27 堀本 33Lj ♂ Ⅱ型 D.1日 4g	0g Ls 淡黄緑, 膿, 悪(+), pH7.9 Ls好(-), 嫌:ベイヨネラ, G(-)桿	D. 16g 投与後 Ls 淡黄緑, 膿, 悪(+), pH7.4 Ls好(-), 嫌:ベイヨネラ, G(-)桿	D. 24g 投与後 Ls 淡黄緑, 膿, 悪(+), pH7.0 Ls好(-), 嫌:ベイヨネラ, G(-)桿	D. 32g 投与後 Ls 淡緑, 膿, 悪(+), pH6.4 Ls好(-), 嫌: G(-) 桿	D. 52g 投与後 Ls 灰白淡褐, 粘液, 悪(-), 8.6 Ls好(-), 嫌(-)	D. 56g 投与後 Ls 粘液塊1ヶ Ls好(-), 嫌(-)		
No.26 三宮 27Lj ♂ Ⅲ型 D.1日 4g	0g Rs 淡黄, 粘>膿, 悪(-), pH8.4 Ls 淡黄緑, 粘>膿, 悪(-), 7.4 Rs好: (-), 嫌: G(-) 桿 Ls	D. 28g Rs 淡黄緑, 膿>粘, 悪(+), 7.0 Ls " " " " Rs好: (-), 嫌: G(-) 桿 Ls	D. 32g Rs 淡黄緑, 膿>粘, 悪(+), 7.8 Ls " " " " Rs好: (-), 嫌: G(-) 桿 Ls	D. 40g Rs 淡褐灰白, 粘液, 悪(-), 8.0 Ls 淡緑, 膿>粘, 悪(+), 6.8 Rs好(-), 嫌:(-) Ls好(-), 嫌: G(-) 桿	D. 68g Rs 淡緑, 膿, 悪(-), 8.2 Ls 淡緑, 膿>粘, 悪(+), 6.8 Rs好(-), 嫌: G(-) 桿 Ls	D. 72g Rs 灰白淡黄, 粘>膿, 悪(-) 7.8 Ls 灰白淡褐, " " 7.0 Rs好: レ, 嫌: G(-) 桿 Ls	D. 82g Rs 灰白黄, 膿>粘, 悪(-), 6.8 Ls " " " " Rs好: レ, 嫌: G(-) 桿 Ls	所 ミ ア ン 局 変 更 表 (a)
No.75 田村 15Lj ♂ Ⅱ型 D.1日 3g	0g Rs 淡緑, 膿, 悪(+), pH6.4 Ls " " " " pH7.2 Rs好: G(+) 桿, 嫌: プ Ls	D. 12g Rs 淡緑, 膿, 悪(+), pH6.4 Ls " " " " pH " Rs好: (-), 嫌: プ Ls	D. 21g Rs 灰白, 粘液, 悪(-), 8.6 Ls 灰白黄, 粘>膿, 悪(±), 6.6 Rs好: (-), 嫌:(-) Ls好: (-), 嫌: プ	D. 39g Rs 探レス Ls 淡緑, 膿, 悪(+), pH6.8 Ls好: (-), 嫌: プ	D. 48g Rs 探レス Ls 淡緑, 膿, 悪(+), 6.8 Ls好: (-), 嫌: プ	D. 54g Ls 淡黄緑, 膿, 悪(-), 6.8 Ls好: G(+) 桿, 嫌: プ		
No.24 稲葉 25Lj ♀ Ⅱ~Ⅲ型 P.1日 60万μ	0万μ Rs 淡緑, 膿, 悪(+), pH6.8 Ls " " " " " Rs好(-), 嫌: G(-) 桿 Ls	P. 180万μ 投与後 Rs 淡緑, 膿>粘, 悪(+), 7.0 Ls " " " " " Rs好(-), 嫌: G(-) 桿 Ls	P. 240万μ Rs 淡黄褐, 粘>膿, 悪(±), 8.6 Ls " " " " " Rs好: (-), 嫌: G(-) 桿 Ls	P. 360万μ Rs 淡褐, 粘液, 悪(-), pH9.0 Ls 探レス Rs好: (-), 嫌(-)	P. 540万μ Rs 灰白淡褐, 粘液, 悪(-), 8.8 Rs好(-), 嫌(-)			
No.82 佐藤 23Lj ♂ Ⅱ型 CM.1日 1.5g	0g Rs 淡黄緑, 膿>粘, 悪(+), pH6.8 Rs好: G(+), 桿, 嫌: プ, G(-)桿	CM 3.0g Rs 淡黄緑, 膿>粘, 悪(+), pH6.8 Rs好: G(+)桿, 嫌: プ, G(-)桿	CM 9.0g Rs 淡黄緑, 膿>粘, 悪(+), 6.8 Rs好(-), 嫌: プ	CM 15.0g Rs 淡緑, 膿>粘, 悪(+), pH6.8 Rs好: G(+)桿, 嫌: プ	CM 22.5g Rs 淡黄緑, 膿>粘, 悪(+), 6.8 Rs好: G(+)桿, 嫌: プ, G(-)桿	(局 ホ モ ミ ル ア ス ミ ル 更 ン フ 表 に ア ス ミ ル 変 更 局 変 更 表 (a))		
No.91 熊 24Lj ♂ Ⅲ~Ⅳ型 CM.1日 1.5g	0g Ls 灰白淡黄, 粘>膿, 悪(-), 8.4 Ls好(-), 桿: プ	CM 6.0g Ls 灰白淡黄, 粘>膿, 悪(-), 8.4 Ls好(-), 嫌: プ	CM 10.5g Ls 灰白褐, 粘液, 9.0 Ls好(-), 嫌(-)	CM 22.5g Ls 洗滌液透明				

第 14 表-c 薬 剂 全 身 ・ 局 所 併 用 例

No.102 山口 21Lj ♂ Ⅳ型 CM1日 1.5g	0g	CM 7.5g	CM 15.0g	CM 24.0g	CM 27g, CM 25mg局注1回	CM 30g, CM 局注2回	CM 37g, CM 局注3回
	Rs 淡黄緑, 粘>膿, 悪(+), 6.6 Rs好(-), 嫌: レ	Rs 淡黄緑, 粘>膿, 悪(+), 7.6 Rs好(-), 嫌: レ	Rs 淡黄緑, 膿>粘, 悪(+), 7.6 Rs好(-), 嫌: レ	Rs 淡緑, 膿>粘, 悪(+), 6.8 Rs好(-), 嫌: レ	Rs 灰白淡黄, 粘>膿, 悪(-), 9.2 Rs好(-), 嫌(-)	Rs 灰白褐, 粘液, 悪(-), 9.0 Rs好(-), 嫌(-)	洗滌液透明

8.0, 6.6 ± 0.3 , 粘膿性では $7.8 \sim 8.0$, $7.9 \sim 7.78$, $6.8 \sim 9.4$, 7.4 ± 0.3 , 粘液性では $8.0 \sim 9.2$, 7.4 ± 3 と報告され, 報告者の滯溜液成分に対する主観の入る事のためか, あるいは測定方法のためか, 測定値に若干の差を認めるが, 膿性から粘液性となるに従い, pH 値が増加する点では一致しており, 私の成績もこれ等報告と同様, 膿性→膿>粘性→粘>膿性→粘液性となるに従い pH 値が上昇する成績を得たが, これに就いて Mittermaier⁽⁵⁾ は慢性副鼻腔炎の滯溜液の pH 値は滯溜液主成分たる膿, 粘液, 滲出物の三要素の混合比即ち滯溜液膿成分の増加に従い, pH 値が低下する ($\text{pH} = \frac{\text{粘液性成分の量}}{\text{膿成分の量}}$) のと見解を述べたが, 私の成績からも, この彼の考えは妥当であると云えよう。

次に嫌気性菌の検出は検出洞 63 洞中 49 洞迄が膿性あるいは膿>粘性滯溜液であつたという成績は次の事実, 即ち, 組織の生物学的な破壊現象に当つて常に起る変化は局所酸度の増加であること, 炎症と化膿において最も重要な分子病理学的徴候の一つは水素イオンの変動であること, 及び膿性 pH 値が低かつたという既述した成績, 更に嫌気性菌検出例の固有鼻腔は所謂化膿型を示した成績等々を考え合せれば, 嫌気性菌の感染は副鼻腔の強い化膿性炎症を惹起すると考えてよいのではなからうか。この考えが正しいとすれば, 局所の弱酸度は血管の拡張をきたす事及び局所の静脈炎という事が考えられ, 第一編で述べた粘膜内嫌気性菌(細菌)の存在も説明できると思う。

次に嫌気性菌検出例の滯溜液がかなりな臭気を伴つたという事に就いて, 私は次のように考える。即ち, 臨床上, 悪臭を發する肺壞疽, 齒槽膿漏症に就いて, 佐藤及び藤正・米沢等⁽⁸⁾ は両病巣膿汁は4種の嫌気性菌を含む点において完全に一致したことを認め, 悪臭はこれ等の嫌気性菌の共棲による組織成分の分解に基づくものと考えた。又臭鼻症の悪臭発来に就いても幾多の説(Krause, Frese, Caldera, Rethi)があげられるが, 最終的には細菌による腐敗を考える点で一致している。

そこで, 腐敗とは周知の如く, 含窒素有機物(主に蛋白質)が細菌作用により悪臭ある有害物質を生成し次第に進行する分解現象であり, 本現象は酸素欠亡中において行われ, 主に嫌気性菌による蛋白質の還元作用に基づき, その結果, 硫化水素, アンモニア, メタン, トリメチールアミン, メチールメルカプタン, インドール, ヘカトールの産生を伴うものである。これに反して酸素供

給の十分な所で起る場合は好気性菌に依る蛋白質の酸化分解に基づくから, 分解は更に進み, 硫化水素, メルカプタン類は硫酸塩に, アンモニアは硝酸あるいは窒素に, メタンは炭酸ガスとなるため, 悪臭ガスの発生は認められないことになる。以上の事実を考えることによつて, 嫌気性菌検出例における滯溜液臭気の問題もある程度は解釈されると思う。ただ, 好気性菌のみの検出例でも臭気を發した事とこれ等の好気性菌を正確に同定する事によつてこの問題は更に正確に解釈できるかも知れない。

第2節 嫌気性菌と副鼻腔炎の臨床像に就いて

上顎洞滯溜液の性状からみて, 嫌気性菌感染は化膿性炎症を惹起し易いと考えられることは既述したが, 副鼻腔炎固有鼻腔所見からみても所謂化膿型が半数以上を占める成績を得て, この考えの妥当な事を知り得た。たゞ今回の実験では全例(好気・嫌気性菌検出例, 菌陰性例)の病型分類を行わなかつたので, 事実嫌気性菌検出例では化膿型が多いか否か知り得ない訳である。そこで過去の私共の実験症例⁽¹⁾⁽²⁾をもつてこれに当てると第15表の如くであつて, この考察の正しい事がうら附けられたと云えよう。

第15表 臨床型の比較

研究年 総数 臨 床 型	昭和23~24年 (大沢林之助他) 41例 (無選択)	昭和29~31年 (大沢林之助他) 40例 (無選択)	昭和29~32年 (著者) 39例 (嫌気性菌検出例)
I	4例(9.7%)	1例(2.5%)	2例(5.1%)
II	6例(14.6%)	8例(20.0%)	20例(51.3%)
III	15例(36.5%)	14例(35.0%)	13例(33.3%)
IV	13例(31.7%)	13例(32.5%)	4例(10.2%)
V	3例(7.3%)	4例(10.0%)	0例

第3節 歯牙・嫌気性菌・上顎洞との関係に就いて

齶齦窩, 感染根管内, 齒槽膿漏等における嫌気性菌の検索は, Veillon, Zuber に始まり, 報告された嫌気性菌の菌種, 菌株も多数にのぼつており, 文献上の主要業績のみに就いても, Monier⁽⁶⁾ は1904年に *B. ramosus*, *B. fragilis*, *Streptobacillus* を報告し, Rodella⁽⁹⁾ (1905) は *B. putrificus* (Biestock), *B. fusiformis*, *B. bifementans* を Idamann⁽¹⁰⁾ (1913) は *Streptococcus anaerobius*, *Strept. parvulus*, *Staphylo. anaerobius*, *B. ramosus*, *B. bifidus*, *B. fu-*

siformis を, Sommer⁹⁷⁾ (1915) は *B. fusiformis*, *B. ramosus*, *B. perfringens* を発見したが球菌を認めずと云い, Kramer⁹⁸⁾ (1929) は *B. ramosus*, *B. putrificus* (Bienstock), *B. bifidus*, *B. fusiformis*, *Micrococcus* を, Schick⁹⁸⁾ 等 (1929) は *Micrococcus*, *B. putrificus*, *B. emphysematosus* 等を分離し, 嫌気性菌を重視した. 又 Andre⁹⁶⁾ 100) (1933) は *B. bifidus*, *B. pseudodiphthericus*, *Micrococcus Gazogenes* を, Ozaki¹⁰¹⁾ (1912) は *B. fusiformis*, *Staphylococcus anaerobius* を報告し, この他 *B. fragilis*, *B. melaninogenicum*, *B. perfringens*, *Leptothorix* の検出が報告されている. 最近大木⁷⁾ (1956) は Weinberg-真柄法に依つて *Veill. parvula*, *Dip. magnus*, *Streptococcus*, *Micrococcus Gazogenes*, *Streptobacillus* 等多数の球菌を検出したと報告した. 以上の如く報告者の実験方法によつて, 桿菌を主とするもの, 球菌を主とするもの等まちまちではあるが, いずれにせよ, 私が上顎洞膿汁より分離した嫌気性菌はこれ等病的歯牙・歯肉から検出された嫌気性菌種の内に含まれている. Kostelka, Appleton⁹⁴⁾, Andre⁹⁶⁾ 100) 等は歯牙の部分欠除によりあるいは義歯装着により, 又は口腔内疾患によつて嫌気性菌が増殖することを述べており, 更に又, これ等の部位は次の条件即ち, 十分な水分と栄養 (食物残渣, 脱落上皮細胞) 至適温度, 最適 pH (唾液により), 空気に触れ難い (歯間, 歯肉嚢状部, 齦齦窩洞) 等のために嫌気性菌増殖に最適な培地を提供しているともいえる. 斯様に口腔内は嫌気性菌の生存発育にも適していると同時に, 嫌気性細菌学的にみて, 菌種の一致をみた歯牙と上顎洞とは, 解剖学的にみて, 血管 (Killian, Strubell, 久保) 淋巴管 (Tilley, 羽田野) 歯端裂孔等と極めて密接な関係を有している. 翻つて, 私の実験成績を検討するに, 嫌気性菌は偏側性副鼻腔炎の場合に, 又膿性悪臭滲溜液の場合に検出頻度が高く, 嫌気性菌検出例では歯牙歯肉の病変あるいは処置の施されている場合が非検出例よりも多かつたという成績を得ている. 即ち, 以上を要約すると, 細菌学的に検出菌種の一致をみた歯牙と上顎洞とは解剖学的にも密接な関係があり, 嫌気性菌を検出した副鼻腔炎の臨床所見からみても, 歯性の感染を充分想像させるものがあるといえよう. それにも不拘, 歯牙と上顎洞とを明確に結びつけ得る所見をレ線像上に認め得なかつた (46 洞中 45 洞迄). だからといって, 私はこのレ線像成績のみをもつて歯性の感染を否定するものではない. 何故ならば, 歯牙に由

来する特殊な副鼻腔炎である歯性上顎洞炎においても, 歯牙と洞とに必ずしも明確な交通路を認めぬ場合が尠くない (77) 78) 80) 81) 83) 91) 92) からであり, 更に又, 歯牙レ線像からみて慢性副鼻腔炎の内にも所謂歯性上顎洞炎に酷似する所見を認めるという報告 (三浦⁸⁴⁾), あるいは歯性上顎洞炎をより広義に解釈した堀口の見解^{78) 79) 80) 82)} に従えば, 一般の副鼻腔炎の内にも歯牙に由来するものがあつても差支えないということが考えられるからである. 但し, 私のこの考察は検出嫌気性菌種が一致したという事が出発の根本をなしている訳であつて, 果して歯牙からの上行性感染のみであるか否かの点に就いては解決されていないし, 症例をできる丈, 化学療法を受けた記憶のないものに限定したとは云え, 長い経過中に全く化学療法を受けなかつたとは云い切れないこと, あるいは副鼻腔, 固有鼻腔の変化に伴つて, 洞内が嫌気状態となつたがために洞内細菌叢に変化が起り, 偶々嫌気性菌が検出されたという可能性も否定できないし, 更に又, 細菌感染そのものが副鼻腔炎発症の一次的因子であるか否かの点はなお未解決に残されているという事を考慮に入れる必要がある.

第7章 結 論

第一編と同一例に就き, 嫌気性菌の存在を臨床上大略予想できる目安, 嫌気性菌検出例の特徴等を上顎洞滲溜液, 自・他覚所見, 歯牙に求め, 同時に化学療法による嫌気性菌の交代菌現象に就いて実験した結果, 次の結論を得た.

(1) 嫌気性菌は膿性且悪臭を發する酸性滲溜液の場合に最も検出頻度が高く, 粘液性の場合に検出されることは極めて少い (7.6%). 又両側性よりも偏側性副鼻腔炎における方が遙かに検出率が高い.

(2) 嫌気性菌検出例では悪臭鼻汁過多あるいは鼻腔内悪臭を自覚症として訴える場合が多く, 固有鼻腔は所謂化膿型を呈する場合が多い.

(3) 以上の成績を基として考察した結果, 嫌気性菌の感染は副鼻腔の強い化膿性炎症を惹起し易いと考えられた.

(4) 上顎洞滲溜液より検出された嫌気性菌は病的歯牙・歯肉より検出される嫌気性菌種に一致し, 嫌気性菌検出例では非検出例に比して, 歯牙の病変あるいは処置を認める場合が多い傾向にあるが, 歯牙と上顎洞とを明確に結びつけ得る所見は認め得ない. しかし一般の慢性副鼻腔炎の内にも, 歯牙に由来するものがあるという考えは否定できない.

(5) 化学療法による嫌気性菌の交代菌現象は認め得なかつた。化学療法過程中の再燃は細菌学的には好気性菌が主役のものようである。

参 考 文 献

- 1) 真柄正直：嫌気性細菌学，改訂増補1版，共立出版社，(昭29)。
- 2) 佐伯志郎：日本医大誌，18～3～1(1951)。
- 3) 中利正彌：日耳鼻，56, 512(1953)。
- 4) 山本純一：日耳鼻，55, 951(1952)。
- 5) 伊藤利男，工藤憲雄：福島医大誌，5, 10, 39, (1955)。
- 6) 真柄正直，網野榮作：日本医学新報，1743, 3, (1957)。
- 7) 大木忠雄：日本医大誌，23, 246(1956)。
- 8) 小泉敏雄：日耳鼻，60, 606(1957)。
- 9) 加藤宜之：日本医大誌，18, 1122, (1951)。
- 10) 大橋静衛：千葉医学会誌，17, 628, (1939)。
- 11) 大沢林之助他：日耳鼻，53, 371; 54, 24; 54, 65; 54, 151; 54, 305; 54, 362; 54, 456; 12) 大沢林之助他：耳鼻臨床，46, 456, (1954)。
- 13) 大沢林之助，中利正彌：通信医学，9, 747, (1957)。
- 14) 後藤敏郎：大日耳，41, 1112(1935)。
- 15) 後藤修二：大日耳，41, 1657(1935)。
- 16) 長谷川勝利：大日耳鼻，44, 1758(1938)。
- 17) 車重雄：耳鼻臨床，46, 700(1953)。
- 18) 羽根喜一，小西龍雄：大日耳鼻，21, 33, (1915)。
- 19) 和田徳次郎，三好桂：大日耳鼻，19, 338(1913)。
- 20) 弘中英信，近藤 榮：日耳鼻，32, 632(1927)。
- 21) 寺山吉彦他：日耳鼻，60, Suppl. 202(1957)。
- 22) 片岡：東北医誌，29, 327, (1941)。
- 23) 土肥義一：日本医学誌，14, 986, 1(1955)。
- 24) 前川望：Chemotherapy, 4, 132(1956)。
- 25) 渡辺暉邦，守田義雄：日本細菌学会誌，5, 210(1950)。
- 26) 池田広：日本細菌学会誌，9, 1594, 27) 青河寛次：Chemotherapy 4, 131, (1956)。
- 28) 河村栄一：日本伝染病学会誌，28, 97, (1954)。
- 29) 中沢進，竹内方志，岡秀雄他：J. Antibiotic, 6, 36, (1953)。
- 30) 秋葉朝一郎，岩原繁雄他：最新医学，3, 1061(1953)。
- 31) a) 小酒井望：細菌の薬剤耐性，1955，医学書院。b) 小酒井望，広明竹雄：最新医学，9, 994, (1954)。
- 32) 国分武行，根谷洋他：日本小児科学会誌，59, 225, (1955)。
- 33) 山下九三夫：医振，6, 234, (1952)。
- 34) 前田甲子郎：名古屋市立大誌，5, 13, (1954)。
- 35) The J. of Antibiotics SER. B. 7, (5), 172(1954)。
- 36) Jungo: J.R. Soc. biol. 1907 (1) ヲリ引用)。
- 37) Lewiss: , path. a. Bakt. 16, 1921 (10) ヲリ引用)。
- 38)

- William & McCinis: Laryngoscop, 33, 424(1923)。
- 39) Wirth: Z. Hals.-usw. Heilk. 16, 453, (1928)。
- 40) Sparreohn & Buch: Acta Oto-laryng. 34, 425(1946)。
- 41) Urdal & Berdal: Acta. Oto-laryng. 37, 20, (1949)。
- 42) Enlow & Alexander: Arch. of Otolaryng. 23, 665, (1936)。
- 43) Bondie, A. et al.: Science, 103, 399, (1946)。
- 44) Getty, R. E.: Ann. of Otol. 42, 576, (1933)。
- 45) Woodward, F.D.: Arch. of Otolaryng. 24, 753(1936)。
- 46) Maclay, O.H.: Ann. of Otol. 42, 567, (1933)。
- 47) Goldstein, L.J. & Daly, S.: Arch. of Otolaryng. 62, 384, (1955)。
- 48) Eggston, A.D. & Wolff, D.: Histopathology of the Ear, Nose and Throat 628, Baltimore. (1947)。
- 49) Bjuggren, G., Kraepelin, S., Lind, J. & Tunevall, G.: Acta. Oto-laryng. 42, 287, (1952)。
- 50) Loginova: Zbl. Hals.-usw. Heilk. 17, 410, (1932)。
- 51) Ashley, B.J. Frick, W.V.: Ann. of Otol. 39, 605, (1930)。
- 52) Balmer: Arch. of Otolaryng. 14, 440, (1931)。
- 53) Spink, W.W.: Arch. Int. Med. 94, 167, (1954)。
- 54) Kenny, M., Johnson, P.M. & Taty, J.S.: Antibioticus and Chemotherapy, 33, 1221, (1953)。
- 55) Rountree, P.M. & Thomson, E.F.: Lancet ii. 262, (1952)。
- 56) Berntsen, C.A.: J.A.M.A. 157, 331, (1955)。
- 57) Livingood, C.S., Nilasena, S., King, W.C. etc.: J.A.M.A. 148, 334, (1952)。
- 58) Livingood, C.S., Head, E.S., Johnson, E.A. etc.: J.A.M.A. 153, 1266, (1953)。
- 59) Miyahara, B.T., Cariker, K. & Clapper, W.E.: J. Lab. & Clin. Med. 41, 550, (1953)。
- 60) Lamanna, A.: Lo Sperimentale, 103, 122, (1953)。
- 61) ヲリ引用)。
- 62) Summers, G.A.C.: Lancet, i, 135, (1952)。
- 63) Umbreit, W.W.: Ann. of the new york Academy Science 53, Art. 1-6, (1950)。
- 64) ヲリ引用)。
- 65) Mc Dermott, M.M. Muschenheim, C., Hadley, S.T. etc.: Ann. Int. Med. 27, 769, (1947)。
- 66) Crofton, J.W. & Mitchison, D.A.: Brit. Med. J. i, 1009, (1948)。
- 67) James, L.A., Sides, L.J., Dye, W.E. etc.: Am. Rev. Tuber. 63, 275, (1951)。
- 68) Medlar, E.M., Bernsten, S. & Reeves, F.C.: Am. Rev. Tuber. 63, 449, (1951)。
- 69) Colquhoun, J. & Weetch, R.S.: Lancet, ii, 621, (1950)。
- 70) Garrod, L.P.: Brit. Med. J. i, 205, (1951)。
- 71)

- Finland, M., Murray, R., Harris, H.W., Kilham, L. etc.: J.A.M.A. 132, 16, (1946). 70) Grove, L.C. & Farrior, J.B.: J. Allergy, 11, 271, (1940). 71) Smenov, H.: J.A.M.A. 24, 2189, (1938). 72) Kistner, F.B.: Arch. of Otolaryng. 13, 225 (1931). 73) 貞柄正直: 産婦人科の実験, 3, 431, (1954). 74) 大沢林之助他: 耳鼻臨床, 47, 456, (1954). 75) 大沢林之助他: 耳鼻臨床, 47, 507, (1954). 76) 大沢林之助, 村主好弘: 通信医学, 9, 242, (1957). 77) 大沢林之助, 清水涼亭: 大阪医事新誌, 11, 6, 1, (1940). 78) 堀口申作: 歯界展望, 8, 4, (1951). 79) 堀口申作: 歯界展望, 10, 24, (1953). 80) 堀口申作: 日耳鼻, 53, 219, (1952). 81) 堀口申作: 耳喉, 22, 228, (1950). 82) 堀口申作: 耳喉, 28, 特集号, (1956). 83) 堀口申作, 三浦真一: 耳喉, 26, 459 (1954). 84) 三浦真一: お茶の水医誌, 4, 59, (1956). 85) 吉田一郎: 日耳鼻, 46, 127 (1940). 86) 副島登: 千葉医学誌, 12, 2018, (1934). 87) 羽田野薫: 日耳鼻, 42, 1695 (1936), 43, 110 (1937). 88) 角岡三郎: 日耳鼻, 44, 939, (1938). 89) 松宮誠一: 口腔病学図説 (1), 1955, 東歯大出版部. 90) 秋葉朝一郎, 中村敬三: 細菌学, 1版, 南山堂. 91) 神戸達三: 耳鼻臨床, 46, 786 (1953). 92) 森本三紀, 和田宗一: 耳鼻臨床, 37, 373, (1942). 93) 三留光男: 口腔病学会誌, 10, 51, (1936). 94) Hilding, A.: Ann. of Otol. 43, 47, (1934). 95) Hansel, F.K.: Allergy of the nose and Paranasal Sinusitis, 1936, London. 96) Appleton, J.L.T.: Bacterial infection in Dental practice, 1950, Philadelphia. 97) Sommer, K.: Deut. M. schrif. f. Zhk, S-297, (1915). 98) Schick, Fischer: Deut. M. Schrif. f. Zhk. S-334, (1929). 99) Mechtenberg, H.: Deut. M. Schrif. f. Zhk. S-677, (1931). 100) Andre: Deut. Zahnarztl. W.-Schrif. 37, 433, (1934). 101) Ozaki: Centralb. f. Bakteriolog. 62, 75, (1912).

交論文の一部は昭和31年5月第337回日本耳鼻
咽東地方会例会, 昭和31年5月第132回東京通信
病院医学集談会及び昭和32年4月第58回日本耳鼻
咽喉科学会総会に就いて夫々報告した。

稿を終るに臨み, 終始御懇篤な御指導, 御校閲を
賜わつた東京通信病院耳鼻咽喉科部長大沢林之助博
士, 日本医科大学教授貞柄正直博士に深甚の謝意を
表します。又実験上多大な御援助, 御指導を戴いた
日本医科大学網野栄作先生に深謝致します。

本研究は東京通信病院研究費によつて行つた。附
記して謝意を表する。

(原稿到着=昭和33.4.1日)

中 川 論 文 附 図 (I)

第 1 図

VF 高層寒天培地における好気性菌の発育状態
(寒天深部に集落発育なく、表面及び管壁に発育す)

第 2 図

同培地上の通性～微好気性菌

第 3 図

第 4 図

第 5 図

同培地上における偏性嫌気性菌 (各種の嫌気度を示した)

中 川 論 文 附 図 (I)

第 1 図

| 5 歯根端部肉芽腫様変化

第 4 図

| 6 口蓋根端の肥大と根端周辺の病変

第 2 図

| 5~4 間の洞底沈下

第 3 図

| 45 間の歯槽骨上昇 ((歯槽膿漏)

第 5 図

洞底前面の沈下