STUDY ON PROBLEMS IN GELLÉ'S TEST

By
T. MORI

*From the Department of Oto-Rhino-Laryngology Okayama University
Medical School (Director: Prof. S. Takahara)*

When the cases of otosclerosis, chronic adhesive otitis media and dislocation of the incudostapedial joint are examined using conventional Gellé's test, the results are always negative, and the test is of no use for the differential diagnosis of these diseases. Therefore, for the purpose of differential diagnosis, first, being confirmed that Gellé's test by bone conduction was negative, the qualitative test by air conduction was a pneumophon with applied to these cases. The following results were obtained:

1. Otosclerosis: The application of positive or negative pressure to the external auditory canal generally reduces the loudness of air-conducted tones.
2. Otitis media chronica adhesiva: When a negative pressure is applied to the external auditory canal, air-conducted tone decreases in loudness like in the case of otosclerosis but the application of positive pressure to the auditory canal causes no decrease in the loudness of air-conducted tone.
3. Dislocation of the incudostapedial joint: When the negative pressure up to -10mmHg is applied to external auditory canal air-conducted tone increases in loudness, but when the negative pressure up to $-30\sim-40\text{mmHg}$ is applied, the air-conducted tone decreases in loudness. The application of positive pressure causes a decrease in the loudness of air-conducted tone just as in the case of otosclerosis.

Summarizing the above, it seems that the differential diagnosis of those diseases negative to Gellé's test is made to some extent with the use of the qualitative test by air conduction with a pneumophon.

Gellé 氏 法 に つ い て の 検 討

外耳道に負荷した陰陽圧の変動に伴う気・骨導
聴力の推移を研究

岡山大学医学部耳鼻咽喉科教室 (主任: 高原滋夫教授)

森
モリ

哲
テツ

之
ユキ

目 次

- I 緒 言
- II 検査装置並びに検査方法
- III 検査対象耳並びにその圧変動に伴う聴力変化の成績
 1. 正常耳について
 - a. 量的検査

- b. 質的検査
2. 神経性難聴耳について
 - a. 量的検査
 - b. 質的検査
3. 鼓膜癒着症耳について
 - a. 量的検査
 - b. 質的検査

4. 耳硬化症耳について

- a. 量的検査
- b. 質的検査
- c. 検査成績と手術時所見

5. 砧鉦関節遊離の1症例について

- a. 量的検査
- b. 質的検査

Ⅳ 検査成績の陰陽性分類

Ⅴ 総括並びに考按

Ⅵ 結 語

参考文献

I. 緒 言

耳硬化症の診断法の一つとして古くから知られている Gellé 氏法は、耳硬化症以外のある種の中耳伝音系疾患に対しても、耳硬化症と同様な検査成績を示す事があるので、耳硬化症に特有な検査法とは云えない憾がある。そこで私は先づ従来から行われている Gellé 氏法を再検討し、これを補足充実させることによつて、耳硬化症に対する本法の診断的価値を向上させたいと念願してこの研究を企てた。

1881年 Gellé は London における国際医学会で、外耳道に圧を負荷すると、聴力に変化をきたす事を報告している。即ち彼の検査法はポリチエル球を短いゴム管によつて外耳道に当てがい、球上あるいは管上に振動する C 音叉を置いて気導音を聴かせ、次にポリチエル球の圧迫によつて外耳道に陽圧を負荷し、音が減弱あるいは消失する事を確認し、これを Gellé 陽性としている。又その音叉を頭頂部あるいは乳突部に置いて骨導音を聴かせる時も同様の効果がある事を認めた。しかしある種の中耳伝音系の難聴耳では圧を高める事によつて気導音は弱くなったり消失するが、骨導音はその影響を受けない場合のある事が明らかとなり、これを Gellé 陰性とし、このような検査成績を示すものには鑑骨強直があると述べている。しかし以上の検査法にはかなり粗雑な点があるので、私はより正確な検査法にするため、音叉の代りに較正されたオージオメーターを使用し、外耳道には陽圧の外に陰圧をも負荷し、この圧を厳密に測定できるように工夫した。なお気導検査に際して Dishoeck (1938) のプノイモホンを使用した。最初 Dishoeck は最良聴力帯の測定にこのプノイモホンを使用しているが、彼は論文の中で将来プノイモホンを使用して、Gellé 氏法を行つたら鑑骨強直の決定はより確実になるだろうと予言している。

最近 Zöllner と Thullen はプノイモホンを使用し、音叉の代りにオージオメーターを用い、陽圧及び陰圧による Gellé 氏改良法を発表して、中耳伝音系の検査法確立を図っている。なお外耳道に陽圧を加える Gellé 氏法に対して陰圧を負荷させることを最初に提案した人は Bartsch (1885) である。

又本邦では 1951 年恩地が耳栓骨導検査法を発表し、正常耳及び内耳性難聴耳では耳栓挿入によつて骨導音が増大するが（この増大は 250 及び 800cps で最も著明におきる）、中耳伝音系難聴耳ではこの骨導音増大は認められないから、この方法は鼓膜に変化がない場合には、耳小骨連鎖・卵円窓の機能障害を鋭敏に検出する長所があると紹介している。

しかし前者の Zöllner と Thullen による Gellé 氏改良法や後者の恩地氏法によつても、鼓膜に欠損を伴わないで正常な耳管通気度をもつ中耳伝音系疾患耳、例えば鼓膜癒着症耳、耳硬化症耳並びに砧鉦関節遊離耳等の鑑別が可能になったと云う詳細な報告をみない。そこで私は内耳開窓術を対象とする耳硬化症を夫等中耳伝音系諸疾患から鑑別したい目的のもとに、幾多の先人の業績を種々検討した上で、次に述べるような検査装置並びに検査方法により、これ等諸疾患を検査すると共に、所期の目的に添いしかも簡便に検査しうする方法（新 Gellé 氏法と仮称す）を考案したので、それをここに報告し諸氏の御批判を乞う次第である。

II. 検査装置並びに検査方法

検査は岡大医学部耳鼻咽喉科教室内の防音室で行つた。

Maico 製 MAI オージオメーターを使用し、気導聴力の測定には Dishoeck の記載に可及的に忠実なプノイモホンを用いた。そのレシーバーはラシヤ及びフェルトで被い、音が外部に透逸するのを防ぎ、約 4cm の誘導管で外耳に達するようにした。そして誘導管の端にはエポナイト製の有効耳栓を付け、その外側にゴムを当てがい外耳道入口部に対し気密にし、頭蓋骨への骨導をできるだけ少くするようにした。その誘導管の中央部に枝をつけ、マンメーター及び圧変動装置（100cc 注射筒を利用す）を装備した（第1図）。

骨導聴力の測定に当つては Maico 製 MAI オージオメーターに附属している骨導レシーバー及びノイズ・マスキングを用いた。又骨導聴力測定の際圧の変動を耳へ導く装置としては、先のプノイモホンをオージオメーターから切り離したものを用いた。

第1図 Pneumophon

図説明: O: 耳 栓
M: マノメーター
Rec: レシーバー
Audio: オージオメーター
K: 圧変動装置

第1表 オージオメーターの最大出力

周波数 cps	気導の最大出力 db	骨導の最大出力 db
125	50	45
250	65	50
500	40	50
750	85	70
1000	85	70
2000	70	70
4000	45	50
8000	20	

次に気導・骨導聴力を測定する際のオージオメーターの最大出力は第1表の如くである。

検査方法としては気導・骨導共に先づ量的検査を行い、次に質的検査を施行した。

扱て量的検査では 125, 250, 500, 750, 1000, 2000, 4000, 8000cps の8周波数で気導最小可聴閾値を求め、次にこの全周波数について夫々 -20, -40, -60, +20, +40, +60mmHg の順序で圧を負荷して気導閾値を測定した。又骨導の最小可聴閾値は 8000cps を除く前記全周波数で測定し、更に前記気圧下において骨導閾値を求めた。これ等の閾値決定に当つては所謂上行法により、3回以上にわたつて同一の測定を繰返し、その最小の値を以て測定値とした。

次に質的検査は 250, 500, 750, 1000, 2000, 4000cps の6周波数で気導・骨導最小可聴閾値上 5db の音を被検耳に聴かせ、大体2秒間に 10mmHg の割合で徐々に圧を変動させ、先づその音が変化する点、多くは減弱する点を患者に確答させ、更に圧の負荷によつて音が消失する点を指摘させ、夫々の圧値をマノメーターで読んだ。但しこの場合の骨導の最小可聴閾値は圧の変動を導く有孔耳栓を被検耳に装備した場合の閾値を以てした。

以上両検査共に先づ陰圧で各周波数について検査し、

次に陽圧で検査した。この場合圧の変動は最大 ± 80 mmHg までとした。即ちこれ以上の気圧下では患者は極度の鼓膜圧迫乃至疼痛のため不安に襲われるからである。

なおこれ等の諸検査を行うには極めて長時間を要するため、患者の疲労現象を考慮して大体20分位の検査で一応検査を中断し、十分な休息時間を置いて疲労による影響を極力避けるように努めた。又患者の一般状態は心身共に安静な時期を選んだ。

以上の検査方法により正常耳、神経性難聴耳並びに鼓膜に欠損を伴わないで正常な耳管通気度をもつ中耳伝音系疾患耳を検査した。

III. 検査対象耳並びにその圧変動に伴う聴力変化の成績

1. 正常耳について

耳鏡所見及び耳管通気度に異常なく、鼻・咽頭に疾患を認めず、既往歴にもなんら耳疾患のない正常聴力をもつ10耳を検査対象とした。

a. 量的検査

個々の症例の量的検査成績表は省略し、この成績表より圧変動に伴う聴力の低下度を算出した(第2表)。

この表から気導・骨導共に次のような事が明らかになった。

i) 陰陽熟れの圧によつても、全周波数で大なり小なり聴力の低下をみた。しかしながら 1000cps 以下の周波数域と 2000cps 以上の周波数域では、圧変動に伴う聴力低下度の趣は全く異り、前者の聴力低下著明なるに引き換え、後者では著変を認めなかつた。なお気導聴力の低下度が特に著明な周波数は 125, 250, 500cps であった。即ち 20mmHg の圧で大多数の症例が 10db の聴力低下をみ、40mmHg では 15db, 60mmHg では 20db 以上の聴力低下をみた。又骨導聴力は 125, 250, 500, 750cps 共に同程度の著明な低下度を示し、過半数の症例では 20mmHg は 10db, 40mmHg は 15db, 60mmHg は 20db 以上の聴力低下をみた。

ii) 20, 40, 60mmHg の陰圧による聴力低下度と夫々に対応する陽圧による聴力低下度は大凡等しかつた。

iii) 1000cps 以下の周波数域で自0至20mmHg, 自20至40mmHg, 自40至60mmHg の3種の圧負荷に伴う聴力の低下度を比較すると、多くの症例で自0至20mmHg の圧負荷による聴力低下度が最も大きく、次に自20至40mmHg, 次に自40至60mmHg の順に低下度は減少した。

附 耳栓骨導差

第4表 正常耳の質的検査成績
(単位 mmHg)

症例番号	検査項目	250	500	750	1000	2000	4000
		+	+	+	+	+	+
1	氣導	10	10	6	16	8	20
	骨導	20	20	16	30	20	16
	減消	20	20	16	30	20	16
2	氣導	8	6	10	8	6	20
	骨導	14	10	20	20	14	40
	減消	8	6	10	8	6	20
3	氣導	10	8	6	14	8	20
	骨導	20	14	10	20	8	8
	減消	10	8	6	14	8	20
4	氣導	4	2	2	4	8	8
	骨導	10	8	4	10	4	4
	減消	4	2	2	4	8	8
5	氣導	10	10	8	14	8	20
	骨導	20	20	14	30	20	30
	減消	10	10	8	14	8	20
6	氣導	8	6	8	10	4	4
	骨導	10	8	4	10	4	4
	減消	8	6	8	10	4	4
7	氣導	10	10	8	14	8	20
	骨導	20	20	14	30	20	30
	減消	10	10	8	14	8	20
8	氣導	8	6	8	10	4	4
	骨導	10	8	4	10	4	4
	減消	8	6	8	10	4	4
9	氣導	10	10	8	14	8	20
	骨導	20	20	14	30	20	30
	減消	10	10	8	14	8	20
10	氣導	8	6	8	10	4	4
	骨導	10	8	4	10	4	4
	減消	8	6	8	10	4	4

第5表 神経性難聴耳の量的検査での聴力低下度
(単位 db)

症例番号	性別	年齢	気導	骨導	陰圧下の低下度	陽圧下の低下度
					125 250 500 750 1000 2000 4000 8000 CPS	25 250 500 750 1000 2000 4000 8000 CPS
1	♀	21才	20	40	5 10 10 5 5 0 5 0	5 10 10 5 5 0 0 0
			40	60	5 10 15 10 15 5 0	10 5 10 5 10 5 0
			60	80	10 15 15 10 10 0 10 5	5 15 10 10 10 0 5 0
2	♀	21才	20	40	10 10 10 10 10 0 0	10 10 10 10 10 0 5
			40	60	10 10 10 5 5 0 10	10 10 10 5 5 5 10
			60	80	15 15 15 15 15 0 5	15 15 15 15 15 0 10
3	♀	32才	20	40	10 10 10 10 10 0	10 10 10 10 10 0
			40	60	10 5 10 5 5 0	5 5 10 5 5 0
			60	80	20 15 15 15 15 5	15 15 15 15 15 0
4	♀	32才	20	40	5 10 10 5 5 0	10 10 10 5 5 0
			40	60	5 10 10 5 5 0	5 10 10 5 5 0
			60	80	15 20 20 15 15 10	15 15 20 15 15 10
5	♀	16才	20	40	5 5 10 10 5 0 0	5 5 15 10 5 0 5
			40	60	5 5 10 5 10 0 10	0 0 5 5 5 5 5
			60	80	10 10 20 20 15 10 10	10 10 20 15 10 0 5

a. 量的検査

個々の症例の量的検査成績から圧変動に伴う聴力の低下度を求めた(第5表)。これから気導・骨導共に次のような事が明らかになった。

i) 陰陽孰れの圧によつても、全周波数で大なり小なり聴力の低下をみた。しかしながら 1000cps 以下の周波数域と 2000cps 以上の周波数域では、圧変動に伴う聴力低下度は全くその趣を異にし、前者では聴力低下著明なるにも拘らず、後者ではさしたる著変を認めなかった。特に聴力低下が著しい周波数は 500cps で、20 mmHg の圧で 10db の聴力低下をみ、40, 60mmHg では夫々 15, 20db 以上の聴力低下をみた。これと大凡等しい低下度をみた周波数は 250, 750cps であった。

ii) 20, 40, 60mmHg の陰圧による聴力低下度と夫々に対応する陽圧による聴力低下度は大凡等しかった。

iii) 自 0 至 20mmHg, 自 20 至 40mmHg, 自 40 至

と、陰圧は陽圧よりも大きな圧負荷によつて同一程度の音の減弱消失をきたした。

iii) ある一つの音の減弱圧値と消失圧値を比較すると、前者は後者の大凡半分値であつた。

2. 神経性難聴耳について

耳鏡所見及び耳管通気度に異常なく、鼻・咽頭にも疾患を認めないが、既往歴に中毒性難聴の原因と思われるものがあるか、あるいはこのような既往歴はなくても気導・骨導聴力検査等から神経性難聴と診断された5耳を検査対象とした。

60mmHg の 3 種の圧負荷に伴う聴力の低下を比較すると、1000cps 以下の周波数域では自 0 至 20mmHg の圧負荷による聴力低下度が最も大きく、次に自 20 至 40mmHg、次に自 40 至 60mmHg の順に低下度は減少した。

附 耳栓骨導差

第 6 表のような成績をえた。これによると有孔耳栓を被検耳に装備した場合、総ての症例で聴力上昇をみた。特に 1000cps 以下の周波数域では 2000cps 以上のそれより聴力上昇は著明で、殊に 250, 500cps は全症例で耳栓骨導差は 10db 以上であつた。

なお全症例で恩地氏法を行ったが、250, 750cps 共に 15db 以上の骨導音増大をみた。

b. 質的検査

第 7 表から気導骨導共に次のような事が明らかになった。

i) 陰陽孰れの圧によつても、総ての音はその感覚に減弱、消失をきたした。なお各周波数で最高の減弱圧値及び消失圧値を示せば、250, 500cps では夫々 10mmHg 及び 20mmHg、750, 1000, 4000cps では夫々 16mmHg

及び 30mmHg、又 2000cps では夫々 20mmHg 及び 40mmHg であつた。即ち少くとも全周波数を通じて 20mmHg までの圧で音の感覚に減弱をきたし、40mmHg で音の感覚に消失をきたした。

ii) 音の減弱、消失をきたす陰圧値と陽圧値を比較すると、陰圧は陽圧より大きな圧負荷によつて音の減弱、消失をきたした。

iii) ある一つの音の減弱圧値と消失圧値を比較すると、前者は後者の大凡半分値であつた。

以上正常耳と神経性難聴耳の検査成績を通覧すると、量的検査では圧変動に伴う聴力の低下度、質的検査では音の減弱、消失をきたす圧値共に大体同様の値を示す事が判明した。

3. 鼓膜癒着症耳について

既往歴に中耳炎又は耳管炎を経過し、その後難聴を訴え、耳鏡所見で鼓膜の動きが制限されるか、あるいは全

第 8 表 鼓膜癒着症耳の量的検査での聴力低下度
(単位 db)

症例 番号	性	年齢	気圧 mmHg	気導 骨導	陰圧下の低下度								陽圧下の低下度							
					125	250	500	750	1000	2000	4000	8000	125	250	500	750	1000	2000	4000	8000
					cps								cps							
1	♂	25才	20	気導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			20	骨導	0	5	5	5	0	0	5		0	0	0	0	0	0	0	
			40	気導	5	5	5	5	5	0	0		0	0	0	0	0	5	-5	
			40	骨導	0	5	5	5	5	0	5		0	0	0	0	0	5	0	
2	♂	25才	60	気導	10	10	10	10	10	10	5		0	0	-5	-5	0	5	-15	
			60	骨導	0	5	5	5	5	5	5		0	0	0	0	0	5	0	
			20	気導	0	0	0	5	5	5	5		5	0	10	10	5	0		
			20	骨導	0	0	0	5	0	0	0		0	0	0	0	-5	5	0	
3	♂	14才	40	気導	5	5	10	10	10	5			10	0	10	10	5	0		
			40	骨導	0	0	0	0	-5	0	0		-5	0	0	0	-10	5	0	
			60	気導	10	10	10	15	10	5			10	5	10	10	5	0		
			60	骨導	0	0	0	5	0	0	0		-5	0	0	0	-5	5	0	
4	♂	18才	20	気導	0	0	0	0	0	0	0		0	10	-5	0	5	0	0	
			20	骨導	5	5	0	0	5	0	0		0	0	-5	0	5	-5	0	
			40	気導	10	10	0	5	5	0	5		0	10	-5	0	10	0	-5	
			40	骨導	0	0	0	-5	0	0	-5	0		0	-5	0	0	-5	-5	0
5	♂	18才	60	気導	10	10	5	10	10	0	5		0	10	-5	0	10	0	0	
			60	骨導	0	0	0	0	5	-10	0		0	0	0	0	5	-5	0	
			20	気導	10	5	5	5	5	5			10	0	0	10	-5	0		
			20	骨導	0	5	0	0	5	0	0		0	5	0	0	0	0	0	
6	♂	18才	40	気導	10	10	10	10	5	5			10	-5	0	10	0	-5		
			40	骨導	0	5	0	0	5	0	0		0	5	0	0	0	0	0	
			60	気導	15	10	10	10	5	5			10	-5	0	10	0	0		
			60	骨導	0	5	0	0	5	0	0		0	5	0	0	0	0	0	
7	♂	18才	20	気導	0	-5	0	0	0	0	0		0	-5	0	5	5	-10		
			20	骨導	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
			40	気導	5	0	5	5	5	0	0		0	-5	0	5	5	-10		
			40	骨導	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
8	♂	18才	60	気導	10	5	10	10	5	5			5	-5	0	5	5	-5		
			60	骨導	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
			20	気導	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
			20	骨導	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	

第 7 表 神経性の質的検査成績
(単位 mmHg)

症例番号	気導	骨導	250	500	750	1000	2000	4000
1	減弱	減弱	8	8	12	8	14	12
	消失	消失	16	15	18	14	20	10
2	減弱	減弱	6	6	4	2	6	6
	消失	消失	18	16	10	4	22	10
3	減弱	減弱	8	8	4	2	8	6
	消失	消失	12	12	10	4	14	12
4	減弱	減弱	4	2	4	12	6	4
	消失	消失	10	10	10	20	10	24
5	減弱	減弱	6	4	8	6	10	8
	消失	消失	10	10	18	12	20	18
6	減弱	減弱	8	6	10	4	8	6
	消失	消失	16	10	24	16	14	22
7	減弱	減弱	8	6	6	12	12	14
	消失	消失	12	10	10	20	20	30
8	減弱	減弱	6	4	12	10	4	14
	消失	消失	14	10	22	20	10	30
9	減弱	減弱	10	10	8	6	8	4
	消失	消失	20	20	12	16	10	12
10	減弱	減弱	8	4	6	2	4	6
	消失	消失	16	8	12	8	14	10

く不動であるが、耳管通気に際し軽度な狭窄を認めるのみで、通気後の聴力に改善がみられなかった5耳を検査対象とした。なお症例2, 4は鼓膜成形術を施行した際、鼓膜の癒着を確認した。

a. 量的検査

個々の症例の量的検査成績から圧変動に伴う聴力の低下度を求めた(第8表)。

1) 陰圧下の気導

陰圧による聴力の低下度は圧の程度によつて異なる。即ち -20mmHg の圧負荷は殆ど聴力変化を惹起しないが(症例4を除く)、 -40mmHg では 1000cps 以下の周波数域で5乃至 10db の聴力低下をみ、 -60mmHg では10乃至 15db の低下をみた。しかしこれ等の聴力低下度は正常耳あるいは神経性難聴耳のそれには遠く及ばなかった。

2) 陽圧下の気導

陽圧下の聴力低下度は最大 10db であつて、さしたる著変は認められなかった。なお 20mmHg の圧負荷による聴力低下度と 40mmHg あるいは 60mmHg の圧負荷による低下度は大凡等しかつた。更に症例2以外の4耳では 500cps 及び 4000cps で僅な聴力上昇をきたした。

陰圧下の気導聴力の低下度と陽圧下のそれとを比較すると前者が遙に大であつた。

3) 陰圧及び陽圧下の骨導

陰陽孰れの圧によつても、全周波数で殆ど骨導聴力に変化は認められなかった。これは正常耳あるいは神経性難聴耳の検査成績とは全く異なる所であつた。

附 耳栓骨導差

第9表のような検査成績をえた。これによると全症例で耳栓骨導差は極めて小であつた(0乃至 5db)。

なお全症例で恩地氏法を計つた所、 $250, 750\text{cps}$ 共に骨導差は 0db であつた。

b. 質的検査(第10表)

1) 気導

陰圧負荷の際は正常耳あるいは神経性難聴耳に比較して大きな陰圧値ではあるが、音の減弱更には消失をきたした。しかしながら陽圧負荷の際は殆どどの症例で音の減弱はあつても消失はみられなかった。但し症例2, 3, 4の 1000cps の音は陽圧負荷で減弱、消失をみた。

第10表 鼓膜癒着症耳の質的検査成績
(単位 mmHg)

症例番号	気導	250	500	750	1000	2000	4000
		+	+	+	+	+	+
1	減弱	6 X	6 X	8 X	6 X	30 40	16 X
	消失	16 X	16 X	26 X	24 X	54 X	50 X
2	減弱	6 60	2 50	14 X	12 50	20 36	4 X
	消失	14 X	10 X	46 X	48 X	X X	X X
3	減弱	24 40	30 60	20 40	4 2	6 6	16 X
	消失	40 X	44 X	40 X	50 10	24 X	70 X
4	減弱	20 60	10 60	20 X	4 X	10 30	X X
	消失	X X	X X	X X	X X	X X	X X
5	減弱	30 X	50 X	30 X	30 20	X X	30 X
	消失	50 X	70 X	50 X	70 40	X X	60 X
6	減弱	X X	X X	X X	X X	X X	X X
	消失	X X	X X	X X	X X	X X	X X
7	減弱	20 X	20 X	10 X	20 50	20 X	16 X
	消失	36 X	40 X	30 X	30 70	40 X	36 X
8	減弱	X X	X X	X X	X X	X X	X X
	消失	X X	X X	X X	X X	X X	X X
9	減弱	30 X	30 X	30 X	30 X	34 X	30 X
	消失	50 X	58 X	50 X	58 X	50 X	50 X
10	減弱	X X	X X	X X	X X	X X	X X
	消失	X X	X X	X X	X X	X X	X X

2) 骨導

各症例別に述べると、症例3, 4, 5は陰陽孰れの圧によつても音の減弱、消失をみなかった。症例2は圧負荷によつてある周波数音が減弱をみ、音の消失は陰陽孰れの圧負荷によつてもみられなかった。症例1は気導聴力の場合と同様に陰圧負荷によつて音の減弱、消失をみたが、陽圧負荷では音の消失はみられなかった。

4. 耳硬化症耳について

既往歴に耳疾患なくして、耳鳴に始まり、徐々に進行する難聴を訴え、耳鏡所見並びに耳管通気度に異常なく、鼻・咽頭にもなんら疾患を認めないが、気導・骨導聴力検査等から耳硬化症を疑つた30耳で本検査法を行つたが、こゝではその中の10耳の検査成績を記載することにした。なお他の20耳の検査成績はほゞこゝに記載された成績と一致していた。検査対象の10耳中症例1, 2, 3, 4, 6, 8, 10の7耳は内耳閉塞術を施行したが、その際鑑骨の運動性を調べ、耳硬化症である事を確認している。

a. 量的検査

個々の症例の量的検査成績から圧変動に伴う聴力の低下度を求めた(第11表)。

1) 気導

陰陽孰れの圧によつても、気導聴力の低下度は 10db 以内の変化を全症例で示した。又圧変動の程度と聴力低

第9表
鼓膜癒着症耳の
耳栓骨導差

症例番号	125	250	500	750	1000	2000	4000
1	5	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	5	0	5	5
3	0	0	5	0	5	0	0
4	0	5	0	0	5	0	0
5	0	5	0	0	5	0	5

(単位 db)

第11表 耳硬化症耳の量的検査での聴力低下度

(単位 db)

症例番号	性	年齢	気圧mmHg	気骨導別	陰圧下の低下度										陽圧下の低下度														
					125	250	500	750	1000	2000	4000	8000	125	250	500	750	1000	2000	4000	8000									
1	↑	28才	20	気骨	20	10	10	5	-5	5	0	0	10	10	15	10	5	0	0	10	15	15	10	5	0	0	0	0	
				気骨	15	15	10	10	0	0	0	0	10	10	5	10	0	5	0	0	15	5	15	10	10	0	0	0	
				気骨	30	20	20	15	5	0	15	5	25	15	30	15	10	0	5	5	15	15	20	15	15	10	0	5	5
				気骨	20	15	15	20	0	5	0	0	20	15	10	15	5	5	0	0	20	10	20	15	10	0	0	0	
2	↑	29才	20	気骨	35	30	30	20	10	0	15	5	30	20	30	20	10	0	15	20	20	25	15	15	10	5	5		
				気骨	20	20	20	25	5	5	5	5	20	20	15	20	10	5	5	20	15	25	20	15	5	5	5		
				気骨	10	10	5	5	5	0	5	0	10	5	5	5	5	0	5	0	10	10	5	5	0	5	0	5	
				気骨	5	10	15	15	10	0	0	0	5	15	10	15	15	5	5	0	0	5	10	0	10	0	0		
3	↑	29才	20	気骨	15	15	10	10	10	0	10	0	10	15	10	10	5	5	15	20	15	10	10	5	15	5	5		
				気骨	15	20	20	20	20	5	0	0	15	20	15	10	10	0	15	5	10	15	10	15	5	15	5		
				気骨	20	20	15	15	15	5	10	0	15	20	25	15	15	5	15	5	20	25	20	15	15	5	20	5	
				気骨	20	25	25	25	5	5	5	5	10	20	25	25	20	5	5	15	10	15	20	20	5	15	15		
4	↑	29才	20	気骨	10	10	5	10	0	0	0	5	5	5	10	5	5	0	5	5	10	10	5	10	5	5	5		
				気骨	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	10	15	10	15	5	5	5		
				気骨	20	20	20	20	0	5	5	5	10	15	25	10	5	0	10	5	10	10	10	10	5	10	5		
				気骨	10	15	10	10	10	0	0	0	10	10	10	10	10	5	0	0	15	20	15	20	15	5	0		
5	↑	29才	20	気骨	25	25	25	25	5	5	10	5	15	25	25	15	10	5	10	15	15	15	15	5	10	5			
				気骨	15	20	15	15	15	5	5	5	15	15	15	15	5	5	5	15	15	15	15	5	5	5			
				気骨	10	15	15	15	5	0	10	10	10	15	5	5	5	5	5	10	10	15	15	10	5	10	5		
				気骨	5	10	10	5	10	5	5	5	10	15	15	10	10	0	0	0	10	15	10	10	5	0	10	0	
6	↑	29才	20	気骨	20	20	20	10	5	0	15	5	20	20	15	10	0	15	15	20	20	15	15	10	5	10	5		
				気骨	10	10	15	15	10	0	0	0	10	10	15	15	10	0	5	5	15	15	20	15	10	5	10	5	
				気骨	20	20	20	20	20	5	5	5	20	20	20	20	20	10	0	15	20	20	20	20	15	10	5	5	
				気骨	20	25	25	25	5	5	5	5	15	25	25	25	20	5	5	5	20	25	25	25	20	15	10	5	
7	↑	21才	20	気骨	5	10	10	5	5	0	5	5	5	5	10	5	5	0	5	5	10	5	5	0	5	0	5		
				気骨	5	10	10	5	5	0	5	5	5	10	5	5	0	5	5	5	10	5	5	0	5	0	5		
				気骨	15	20	20	10	10	0	15	5	15	20	20	10	10	0	15	5	15	20	15	10	10	5	15	5	
				気骨	5	15	15	10	15	5	10	10	5	10	15	15	10	5	10	5	10	15	15	10	10	5	15	5	
8	↑	27才	20	気骨	20	25	25	15	15	5	15	5	20	25	25	15	15	5	15	20	25	20	15	15	5	20	5		
				気骨	10	20	20	15	15	5	10	0	10	20	15	15	15	5	15	5	20	25	20	15	15	5	20	5	
				気骨	5	10	10	5	5	0	5	5	10	15	25	10	5	0	10	5	10	15	15	10	5	10	5		
				気骨	10	15	15	10	10	0	0	0	15	20	15	15	10	5	10	5	10	15	15	10	5	10	5		
9	↑	28才	20	気骨	5	10	10	5	5	0	0	0	10	15	10	5	5	0	5	5	10	5	5	0	5	0	5		
				気骨	10	15	10	10	10	0	0	0	10	15	10	10	10	5	5	5	10	10	10	10	5	5	0	5	
				気骨	20	20	15	10	10	0	15	5	15	20	15	10	10	0	15	5	15	20	15	10	10	5	10	5	
				気骨	10	20	10	10	10	0	0	0	15	20	15	10	10	0	15	5	15	20	15	10	10	5	10	5	
10	↑	28才	20	気骨	25	25	20	15	15	5	10	0	15	25	20	15	10	0	0	15	15	10	10	5	5	10	0		
				気骨	15	20	15	15	15	0	5	5	25	15	20	25	15	0	5	5	20	15	10	10	5	5	10	0	
				気骨	20	20	20	15	15	5	10	0	15	25	20	15	15	10	0	5	20	15	10	10	5	5	10	0	
				気骨	20	25	20	25	20	0	5	5	25	20	20	20	20	5	5	5	20	15	10	10	5	5	10	0	

下度の関係は不定であつた。

2) 骨 導

陰陽孰れの圧によつても、全症例で骨導聴力の低下度は 5db 以内であつた。

附 耳栓骨導差

第12表のような検査成績をえた。これによると全症例で耳栓骨導差は極めて小であつた(0乃至±5db)。

なお全症例で恩地氏法を行つた所、250, 750cps 共に骨導差は 0db であつた。

b. 質的検査(第13表)

1) 気 導

陰陽孰れの圧負荷によつても、大体音の減弱、消失をきたすが、2000, 4000cps で

第12表
耳硬化症耳の
力栓骨導差

症例番号	125	250	500	750	1000	2000	4000
1	0	5	0	0	5	5	0
2	5	0	0	0	0	0	5
3	0	0	0	5	5	0	5
4	0	0	0	0	5	0	5
5	0	-5	0	-5	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0
7	0	5	5	-5	-5	-5	-5
8	0	5	0	0	0	5	0
9	0	-5	0	5	-5	0	5
10	-5	-5	-5	0	5	0	0

(単位 db)

は音の減弱、消失をみない症例も多々あつた。しかし音の減弱及び消失をきたした症例における圧値を正常耳あるいは神経性難聴耳のそれと比較すると非常に大きく、大多数の症例の各周波数で減弱圧値 20mmHg 以上、消失圧値 40mmHg 以上の圧値を示した。

2) 骨 導

陰陽孰れの圧負荷によつても、全症例で音の感覚に減弱、消失をみなかった。

以上耳硬化症の検査成績を通覧すると、量的検査及び質的検査共に正常耳あるいは神経性難聴耳のそれとは全く異なる成績であつた。

c. 検査成績と手術時所見

内耳開窓術を施行した7耳(症例1, 2, 3, 4, 6, 8, 10)の手術時所見と本検査法によつてえた検査成績を比較検討してみた。

手術時行つた鑑骨の可動性検査は次のようにした。即ち骨ゾンデを鑑骨の頭部に当てがい、前後及びこれに直

第13表 耳硬化症の質的検査成績
(単位 mmHg)

症例番号	検査法	250		500		750		1000		2000		4000	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
1	気導	30	24	20	20	30	30	20	30	40	40	40	40
	骨導	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	気導	30	20	30	20	40	20	40	30	40	30	40	20
	骨導	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	気導	40	16	30	20	30	20	20	20	20	20	20	20
	骨導	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	気導	20	20	30	20	20	20	16	40	20	X	X	X
	骨導	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	気導	20	10	10	10	20	18	30	10	60	20	20	16
	骨導	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	気導	18	10	14	12	20	10	30	20	14	20	30	30
	骨導	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	気導	60	10	56	20	60	20	50	14	54	20	X	50
	骨導	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	気導	20	10	30	30	40	20	20	14	20	10	X	X
	骨導	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	気導	10	8	20	10	10	10	60	10	24	12	40	60
	骨導	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	気導	24	10	18	10	20	10	30	30	12	8	10	20
	骨導	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

角な方向に動かし、両運動共に不可能な場合を完全強直とし、その孰れかの運動が多少でも可能な場合を不完全強直とした。これに従うと7耳中症例1, 3, 6, 8の4耳は完全強直を呈し、症例2, 4, 10の3耳は不完全強直であった。しかして術前にえた検査成績(第11表, 第13表)からは、術前に完全強直の症例を判別することはできなかった。

5. 砧鉸関節遊離の1症例について

2才の頃、右側急性乳様突起炎を起し、直ちにシュワルツエ氏手術を施行したが、その後17才の現在に至る

まで右側難聴を訴え、その聴力改善を希望して来院した1患者があつた。耳鏡所見で鼓膜濁濁を認める外、鼓膜の運動にも異常なく、耳管通気度も正常であつた。しかし骨導聴力は正常であるにも拘らず、気導聴力は会話音域で平均 55db の損失を認めた。更に Weber 氏法は左偏し、Rinne 氏法(一)、恩地氏法(一)と云う検査成績をえた。そしてこの患者で本検査法を行つた所、単なる耳硬化症ではなく、耳小骨連鎖に何等か他の障害をもつた症例ではないかとの推測をえたので、一先ず耳内的に中耳腔を開放し耳小骨の状態を調べた所、砧鉸関節の遊離を確認し、更に鉸骨の不動態を認めたので直ちに内耳閉塞術を施行した。術後2週間目頃より聴力改善を自覚し、術後3ヶ月目の気導聴力検査では会話音域で平均 20db となり著明な聴力の改善を認めた。この症例において術前に行つた本検査の検査成績(第14表)を検討した所、聊か興味ある知見をえたので記述する。

a. 量的検査

量的検査成績から圧変動に伴う聴力の低下度を求めた(第14表 a)。

第14表 砧鉸関節遊離耳の検査成績

a. 量的検査

(単位 db)

気圧 mmHg	気導 導別	陰圧下の低下度								陽圧下の低下度							
		125	250	500	750	1000	2000	4000	8000	125	250	500	750	1000	2000	4000	8000
		cps								cps							
20	気導	-10	-10	-15	-15	0	0	0	0	5	5	20	10	0	0	0	0
	骨導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	気導	-10	-10	-15	-15	-5	-5	0	0	5	5	25	15	0	0	0	0
	骨導	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	気導	-5	-5	-10	-10	0	-5	0	0	5	5	25	20	15	0	0	0
	骨導	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b. 質的検査

(単位 mmHg)

検査法	推移	250		500		750		1000		2000		4000	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
気導	増減	10	10	10	6	30	30	40	12	X	10	X	X
	減消	X	12	X	26	X	20	X	30	X	20	X	X
骨導	増減	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	減消	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1) 気導

陰圧下の気導聴力は圧負荷によつて、全周波数で聴力上昇をみた。即ち 1000cps 以下の周波数域では10乃至15db の聴力上昇をみ、2000, 4000cps では5db の上昇をみた。

陽圧下の気導聴力は 1000cps 以下の周波数域で聴力低下をみた。特に 500cps では 20mmHg の圧負荷で 20db の低下をみた。しかし 2000, 4000 cps では全く聴力変化は認められなかった。

2) 骨 導

陰陽孰れの圧によっても、全周波数で骨導聴力の変化は認められなかった。

附 耳栓骨導差

全周波数で全く耳栓骨導差は認められなかった。

b. 質的検査 (第 14 表 b)

1) 気 導

1000cps 以下の周波数域では -10mmHg までの僅な陰圧負荷によって先ず気導音は増大し、更に -30 乃至 -40mmHg まで圧を負荷すると音の減弱をみるが、遂に音の消失はみられなかった。

陽圧を負荷すると、僅な圧負荷によつて音の減弱、消失をみた。但し 4000cps では音の減弱、消失はみられなかった。

2) 骨 導

陰陽孰れの圧を負荷しても、全周波数で音の感覚の減弱、消失はみられなかった。

IV. 検査成績の陰陽性分類

先づ気導の量的・質的検査成績を詳細に検討すると、各症例で大なり小なり種々違った値が出てくるため、これをもつて各症例を陰陽性に 2 大別する事は極めて困難であるが、骨導の量的・質的検査成績によれば各症例の陰陽性分類が可能である事を知った。即ち骨導の量的検査成績について云えば 1000cps 以下の周波数域で 20 mmHg の圧負荷により 10db 以上の聴力低下をきたす症例 (陽性例) と 60mmHg の圧を負荷しても 0 乃至 5db 程度の聴力低下しかみられない症例 (陰性例) とに分類されるし、骨導の質的検査成績について云えば 1000cps 以下の周波数域で圧の変動に伴つて音の感覚に減弱あるいは消失をみる症例 (陽性例) と音の感覚に全く変化をみない症例 (陰性例) とに大別される。しかしながら骨導の量的検査成績による各症例の陰陽性別と質的検査成績による陰陽性別とを対比してみると、この両者は全く一致しているので、骨導の量的あるいは質的検査成績の孰れかに拠つて各症例の陰陽性を決定しうるわけである。故に爾後の陰陽性分類を行うに当つては簡単に測定する事ができる 骨導の質的検査成績のみ を探る事にしたい。

今各症例を陰陽性孰れかに分類し顧ると、第 15 表の

第 15 表 各症例検査成績の陰陽性分類

症 例 名	症例数	陰圧検査		陽圧検査		総合結果	
		陽性例	陰性例	陽性例	陰性例	陽性例	陰性例
正常耳	10	10		10		10	
神経性難聴耳	5	5		5		5	
鼓膜癒着症耳	5	1	4		5		4
耳硬化症耳	10		10		10		10
砧鐙関節遊離耳	1		1		1		1

ような結果になる。なおこの表の総合結果中※印の症例は陰圧検査と陽圧検査でその結果が相違した症例である。

V. 総括並びに考按

従来の Gellé 氏法で用いられた音源としての音叉の振動音は減衰音であるため、可聴閾を越す瞬間を捉えにくく、Gellé 氏法のような圧変動に伴う聴力の変化を患者自身に答えさせる検査法では極めてその答が不正確となり、高度の難聴者では一層不確実になる。又圧変動を従来の Gellé 氏法のようにポリチール球で行うと、その圧変動速度が大且不定となり、検査が粗雑になりがちである。これ等の欠点を補うため音源としてはオージオメーターを用い、圧変動を正確にするためにはマノメーターを装備して圧変動速度を一定にするよう努めた。

本検査法 (気導・骨導の量的・質的検査を総称す。以下同様) の骨導検査成績によつて各症例を陽性あるいは陰性に分類すると第 15 表のようになるが、陰性を示した耳硬化症耳、砧鐙関節遊離耳 (この症例は鑑骨強直を合併していた) 及び鼓膜癒着症耳の大部分はこの表の症例分布から推しても、骨導の量的・質的検査成績 (500 cps を中心とした 1000cps 以下の周波数域で圧変動に伴う聴力低下は殆んど認め難い) からみても、耳小骨連鎖の障害が存在するため、かゝる結果をえたものと推察される。これは従来の Gellé 陰性と決定された症例に鑑骨強直の診断が下された事と大凡符合する事実である。

なお骨導検査を行うに当り耳孔部に圧変動用の有孔耳栓を使用したため、陽性を示した正常耳及び神経性難聴耳では、耳栓を使用しない場合より良く聴え (本論文ではこれを仮に耳栓骨導差と称した)、陰性を示した 3 疾患耳では殆んど聴えは不変であつた。これは恩地氏法の理論と全く軌を一にするものである。しかしながら私が観察した上記の耳栓骨導差は恩地氏法の骨導差に比較

すると多少小さな値をえた。これは私が用いた有孔耳栓には約 4mm の孔があり、耳孔部の閉鎖が不完全なためであろうと思われる。

扱て皆同一に陰性を示した耳硬化症耳、鼓膜癒着症耳及び砗鐙関節遊離耳等を鑑別する目的のために、これ等諸疾患を気導の質的検査成績で比較検討した所、次に述べるような興味ある結果をえた。

1) 耳硬化症耳: 1000cps 以下の周波数域では、陰陽孰れの圧負荷によつても、大体気導検査音に減弱、消失をきたした。しかし音の減弱圧値及び消失圧値を正常耳あるいは神経性難聴耳のそれと比較すると非常に大きく、大多数の症例の各周波数で減弱圧値 20mmHg 以上、消失圧値 40mmHg 以上の圧値を示した。

2) 鼓膜癒着症耳: 陰圧を負荷すると、耳硬化症耳でみられると同様に、気導検査音の減弱、消失をみるが、陽圧負荷の際は殆んどの症例で検査音の消失はみられなかった。

3) 砗鐙関節遊離耳: 陽圧を負荷すると、耳硬化症耳でみられると同様に、気導検査音の減弱、消失をみるが、陰圧を負荷すると -10mmHg と云う僅な圧で先づ検査音は増大し、更に -30乃至 -40mmHg まで圧を負荷して行くとき検査音の減弱をみた、なお僅な陰圧負荷により検査音の増大をみたのは、耳内筋並びに鼓膜の緊張に何んらかの変化が齎され、その結果惹起されたものであろうか。

即ち以上の検査成績を通覧すると、これまで一律に陰性を示していたこれ等 3 疾患の鑑別もある程度可能であるように思われる。

次に本検査法を行うに当り最も有効であつた周波数について述べたいと思う。正常耳及び神経性難聴耳の気導・骨導の量的検査成績(第2表及び第5表)をみると、1000cps 以下の周波数域の気導及び骨導聴力の圧変動に伴う低下度は 2000cps 以上の周波数域の低下度より著明であつた(特に 500cps では著明な聴力低下度をみた)。即ち正常耳及び神経性難聴耳に圧変動が起きると、今まで正常な機能を営んでいた鼓膜や耳小骨連鎖が音響の伝音に障碍をきたして、殊に鼓膜や耳小骨連鎖機能と密接な関係がある 1000cps 以下の周波数域において、著明な聴力低下をみたものと考えられる。又正常耳及び神経性難聴耳の気導・骨導の質的検査成績(第4表及び第7表)をみると、1000cps 以下の周波数域の気導及び骨導検査音は 2000 及び 4000cps の検査音で検査した場合より僅な圧を負荷して、その音覚に減弱あるいは消失

をきたすと云う成績をえた。即ち 1000cps 以下の周波数は圧変動に対して 2000 及び 4000cps より鋭敏であることがわかる。以上の結果から 500cps を中心とした 1000cps 以下の周波数が本検査を行うに当り最も有効な周波数であると推察される。この事については文献的にも低調音は高調音より圧変動により影響を受け易いと明記されているが(Mach and Kessel, Békésy, Rasmussen etc.), 上記の点からも首肯される。

次に圧の問題について少し触れてみる。正常耳及び神経性難聴耳の気導・骨導の量的検査成績(第2表及び第5表)で圧負荷による聴力低下度を観察すると、自 0 至 20mmHg, 自 20 至 40mmHg, 自 40 至 60mmHg の順に聴力の低下度は次第に減少する。特に自 40 至 60mmHg の圧による低下度は前2者に比べ概して小さいので、本検査を行うには 20 及び 40mmHg の圧負荷を試みるだけで充分と思われる。次に気導・骨導の質的検査では最高 ±80mmHg までの圧変動を試みたが、正常耳及び神経性難聴耳の最高減弱圧値及び最高消失圧値は夫々 20mmHg 及び 40mmHg である事からも察せられるように、40mmHg までの圧変動で質的検査は充分遂行できると思う。

扱て臨牀的に本検査法を用いてみると、その検査方法はあまりに繁雑過ぎるので、検査順序をより合理的にし、不必要と思われる周波数や圧による検査を除いて、必要にして充分な周波数あるいは圧で検査を行い、しかも本検査法と同様の診断的価値をもつ新しい形式の検査法を考案したので、これについて簡単に述べてみる(新 Gellé 氏法と仮称す)。即ち次の a) b) c) の順に検査する。

a) 気導・骨導閾値の測定

b) 500cps の骨導検査音(閾値上 5db の音)で質的検査施行: Gellé 陽性あるいは陰性の決定。

c) 陰性例は 500cps の気導検査音(閾値上 5db の音)で質的検査施行: 耳硬化症、鼓膜癒着症あるいは砗鐙関節遊離疾患の鑑別決定。

なお c) 検査を行つた場合の上記 3 疾患の特徴については前に列記したのでここでは省略する。

この新 Gellé 氏法については今後なお多数の症例に當つてみて、不備な点があれば補正し、より正確な検査法にしたいと思う次第である。

VI. 結 語

従来の Gellé 氏法を改良し、外耳道に陽圧及び陰圧を負荷した際の気導・骨導の量的・質的検査(以下本検

査と略称す)を行つた。

研究の対象としては、鼓膜欠損を伴わないで正常な耳管通気度をもつ中耳伝音系疾患耳、正常耳並びに神経性難聴耳を選び、次のような知見をえた。

1) 本検査法の骨導の質的検査成績に拠れば、正常耳並びに神経性難聴耳は陽性を示し、耳硬化症耳及び砧鐙関節遊離耳(鐙骨強直を合併)は陰性を示した。なお鼓膜癒着症耳では大多数の症例が陰性を示した。

2) 本検査法で陰性を示した耳硬化症、鼓膜癒着症及び砧鐙関節遊離疾患の鑑別は気導の質的検査によりある程度できる可能性がある。次にこれ等3疾患の気導の質的検査成績を簡単に列記すると。

i) 耳硬化症: 外耳道に陰陽熟れの圧を負荷しても気導検査音は大体減弱した。

ii) 鼓膜癒着症: 外耳道に陰圧を負荷すると、耳硬化症でみられると同様に、気導検査音の減弱をみるが、陽圧負荷の際は検査音の減弱をみなかった。

iii) 砧鐙関節遊離疾患: 外耳道に陽圧を負荷すると、耳硬化症でみられると同様に、気導検査音の減弱をみるが、陰圧負荷の際は僅な圧によつて先づ検査音は増大し、更に圧を負荷すると検査音の減弱をみた。

3) 本検査法によつて予め耳硬化症と診断された症例に内耳開窓術を施行する際、先づ鐙骨の可動性を調べた所、その症例の総てに鐙骨の強直を認めた。しかし強直の程度を術前に本検査法で決定する事はできなかった。

4) 本検査に用いられる最も有効な周波数は1000cps以下の周波数域殊に500cpsを中心とした周波数である。

5) 本検査法と同様の診断的価値をもち、而も臨床的に簡単に使用できる検査法を新しく提案し、これを新Gellé 氏法と仮称した。その方法は次の如く。

a) 気導・骨導閾値の測定。

b) 500cpsの骨導検査音(閾値上5dbの音)で質的検査施行: Gellé 陽性あるいは陰性の決定。

c) 陰性例は500cpsの気導検査音(閾値上5dbの音)で質的検査施行: 耳硬化症、鼓膜癒着症あるいは砧鐙関節遊離疾患の鑑別決定。

註 この新Gellé 氏法については今後なお症例を加えて、その的確性に関し研究を進めたい。

参 考 文 献

1) Békésy: Phys. Zeitschr., 30, 1929. 2) Béké-

sy: Ann. d. Phys., 13, 1932.

Zeitschr. Ohrenheilk., 18, 1888.

3) Bezold: 4) Bing: Mschr. Ohrenheilk., 33, 1899.

5) Bloch: Zeitschr. Ohrenheilk., 25, 1894.

6) Brühl: Zeitschr. Ohrenheilk., 32, 1898.

7) Dishoeck: Arch. f. O., 144, 1938.

8) Gellé: Transact. of the internat. med. congr., 1881, London.

9) Hallpike: J.O.L., 45, 1930.

10) 広瀬: 日本耳鼻咽喉科会報, 55, 1952.

11) Jones and Edmonds: Ann. of O.R.L., 58, 1949.

12) 角田: 日本耳鼻咽喉科会報, 56, 1953.

13) 角田: 日本耳鼻咽喉科会報, 57, 1954.

14) Kelly: J. Exp. Phys., 21, 1937.

15) Kietz u. Zangemeister: Zeitschr. f. L.R.O., 32, 1953.

16) 切替: 医学と生物学, 31, 1954.

17) 切替: 聴力検査法.

18) 黒住: 耳鼻咽喉科臨床, 43, 1950.

19) 黒住: 日本耳鼻咽喉科会報, 53, 1950.

20) Lucae: Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, 40 u. 41, 1863.

21) Mach and Kessel: Sitzungsber. d. Wiener.

22) 松下: 日本耳鼻咽喉科会報, 60, 1957.

23) 内藤, 他: 耳鼻咽喉科臨床, 41, 1948.

24) 内藤, 他: 日本耳鼻咽喉科会報, 52, 1949.

25) 内藤, 他: 日本耳鼻咽喉科会報, 56, 1953.

26) 恩地: 日本耳鼻咽喉科会報, 54, 1951.

27) 恩地: 耳鼻咽喉科, 26, 1954.

28) 大和田: 日本耳鼻咽喉科会報, 55, 1952.

29) Politzer: Wiener. med. Wschr., 13 u. 14, 1862.

30) Rasmussen: Acta O.L., 34, 1946.

31) 鈴木, 他: 耳鼻咽喉科, 25, 1953.

32) Thullen: Archiv. f. O.N.K., 164, 1954.

33) Zöllner: Audiologie, 1954.

34) Zöllner u. Thullen: Zeitschr. f. L.R.O., 30, 1951.

稿を終るに臨み終始御懇篤な御指導並びに御校閲を賜つた恩師高原滋夫教授に深甚な謝意を表し、併せて有益な御助言を頂いた水河忠敬博士に衷心より感謝致します。

本論文の要旨は日本耳鼻咽喉科学会中国地方会第76例会並びに第77例会において発表されている。

(原稿到着=昭和33.10.7日)