STUDIES ON THE NATURE AND FORMATION OF THE OTOLITH

By

Y. SAKAGUCHI

*From the Department of Oto-Rhino-Laryngology, Tottori University
School of Medicine (Director: Prof. H. Sasaki)*

Otolith and Maculae were removed in the condition as fresh as possible by means of the particular method from frog, guinea-pig and hen. The nature and formation of otolith were studied and the results were as follows:

(1) It was shown by pressure method, X-ray diffraction technique and electron microscope that the otolith was in a gel-like condition in vivo. But when otolithic membrane became to non-physiological condition by the chemical and physical stimuli, the extremely small crystals got to gather and developed to form the otolith which has been observed as large crystals.

(2) Ca^{45} was used as a tracer to study the formation of otolith. The rise and fall of Ca^{45} as tracer were investigated. Ca^{45} moved rapidly to the otolith and mostly disappeared in 72 hours after the injection. It seemed that there were calcium metabolism was present in the otolith.

(3) Carbonic anhydrase was demonstrated in the otolithic organs of hen and frog, especially in high concentration in the otolithic membrane and so called Smith's extramacular portion.

(4) As the results of the administration of various enzyme inhibitors, it was demonstrated that carbonic anhydrase was related to the formation of calcium carbonate in the shell.

(5) From these studies, it seems that carbonic anhydrase plays an important part in the formation of otolith.

耳石の本態並びに形成に関する研究

鳥取大学医学部耳鼻咽喉科教室 (主任: 佐々木寛教授)

坂 口 幸 雄
サカグチ ユキオ

目 次

I 耳石の本態に関する研究

1. 緒 言

2. 圧迫実験

緒 言 材料並びに方法

成 績 小 括

3. 電子顕微鏡による実験

緒 言 材料並びに方法

成 績 小 括

4. X線廻折による実験

緒 言 材料並びに方法

成 績 小 括

5. 総括並びに考按

II 耳石の形成に関する研究

1. 緒 言

2. Ca^{45} による Ca 代謝の研究

緒 言 材料並びに方法

成 績 小 括

3. 組織化学による C.A. の証明

緒 言 材料並びに方法

成 績 小 括

4. C.A. の各種酵素阻止剤による実験

緒 言 材料並びに方法

成 績 小 括

5. 総括並びに考按

III 結 論

I 耳石の本態に関する研究

1. 緒言

耳石の本態に関する研究としては、船岡、豊田¹³⁾ (1928) が殿様蛙の耳石における X 線結晶構造の研究によつて、初めて蛙耳石を Aragonite であると決定して以来、20 数年間というものは、生物の耳石は総べて Aragonite であると信じられてきたのである。ところが、佐々木、宮田³⁷⁾ (1953 年 4 月) は、マイゲン氏反応、電子顕微鏡、X 線廻折、等により、人間、家兎、ラット等の哺乳動物の耳石は Calcite である事を発見し、発表したのである。次いで Engström, Carlström⁴⁾ (1953 年 11 月) も全く同様な事実を報告した。その後、佐々木、宮田³⁸⁾ (1955) は更に研究を進める中に、生体内にあつては耳石は所謂、普通見るが如き結晶型をなして居らず、耳石膜に包まれて一種のカルシウムのコロイド状態として存在し、お互いに吸引し合い、又反撥し合つて平衡を保ち存在するのであり、従つて生体内にある時は耳石は白色泥状をなしてはいるが、摘出等により容易にその平衡状態が破られ引力である Van der Waals 力が強く作用し、水分を脱して固まり、結晶型を形成してくるのではなからうかと推論したのである。

ところで、現在に至るまで、かような生体内における耳石の態度を実験的に追求した報告は見ないのである。著者は先に佐々木、宮田が提示した耳石の本態に関してこれを徹底的に探索する意図をもつて、引続き次のような実験を行つたので、茲に報告する次第である。

2. 圧迫実験

緒言

先に述べた如く耳石の染色性の研究に端を発し、佐々木、宮田³⁸⁾ (1955) は、生体内にあつては耳石は従来考えられていたような大なる結晶としては存在せず、一種の炭酸カルシウムのコロイド状態として、存在するのであるとの推論を提示したが、これをさらに追求する目的で次のような実験を行い成績を得たので報告する。

材料並びに方法

実験動物には殿様蛙を使用した。

両側前庭迷路を破壊し、白色泥状の耳石塊を針先にて摘出する。そして試験片としては、二枚の厚ガラス (厚さ 5mm, 縦 8.5cm, 横 2.5cm) を用い (図 1), そのガラス板の間に先に述べた耳石を挿入する。実験装置としては、理研計器株式会社の光弾性実験装置を用いて試験片に荷重を加えたまま、前後左右に移動できるもので、又荷重は横杆で一端を固定し、途中試験片をおさえ、他

第 1 図

荷重装置模図

A: 試料片 (厚ガラス). B: 重錘. C: 横杆.
O: 耳石. P: 加圧装置. H: 木板 (試験片保持板)

の端に鉄製重錘を適宜増減して荷重することができるもので、本医学部で作成されたものである (図: 参照)。この場合はこれに 1kg の重錘を荷重し、一往復の磨擦を行つたのである。以上の装置の元で摘出直後のものと、乾燥したものとに大別し、乾燥したものではその時間的経過に従つて観察した。その際直後のものでは次のような方法を用いた。即ち助手に二枚のガラス板の間に直ちに資料が挿入できて、更に同時に荷重が加わる状態に準備をさせ、一方ではガラス板の横で耳石の摘出を行い瞬時にこれをガラス板上にのせ上記の操作を試みた。

成績

かようにして行つた摘出直後のものでは砂粒状、顆粒状をなした大きさ約 0.1μ の耳石が観察されるのみであつたが (写真 No.1), これに反して乾燥したものでは、即ち摘出後 5 分を経過してやゝ乾燥した耳石では同様な操作を加えて検鏡したところ、一部砂粒状ではあるが、大部分は判然とした $1\mu\sim 10\mu$ 程度の結晶型を示した (写真 No.2)。更に 10 分間~20 分間乾燥した後の資料について試みた結果は殆んど大なる結晶型を示し、一部には耳石の崩壊したと思われる小片が散在性に観察されたのである。

小括

以上の実験より摘出直後のものでは砂粒状、顆粒状になつた耳石が、更に乾燥した資料では一部砂粒状であつても、かなり判然とした結晶型を呈しているのを知り、両者の間には劇然たる差異のあるのを認める事ができた。

3. 電子顕微鏡による実験

緒言

各部門において最近電子顕微鏡が普及し、現在まで未知とされている諸問題が次々と究明せられ、吾が耳鼻咽喉科学領域においても、漸く新しい分野が開拓されつつある。そこで私は引き続きこれを使用し耳石の生体内における状態をさらに究明しようと思ひ、より生体に近い状態において、次のような実験を行ったのである。

材料並びに方法

実験動物には殿様蛙を使用した。

先ず摘出直後の耳石を予め用意しておいた載物硝子上のヘマトキシリン（アルカリ性の）の溶液に混入し空気中で乾燥後、水洗し、更に充分乾燥させた後、その耳石の一部を取り電子顕微鏡（JEM-4C 型日本電子光学研究所作製）により至細にわたり観察した。

成 績

以上のような観察から光学顕微鏡で見た顆粒状の物質は、実は $0.1 \sim 0.05 \mu$ の紡錘形に近い結晶型を呈し、更にこの一つの結晶型は写真に（写真 No.3, 4）示されるような非常に微細なる約 0.005μ の大きさ略々一定せる粒子よりなっている所見を得ることができたのである。なお、染色せずに摘出し乾燥した耳石にあつては、 $1 \sim 20 \mu$ 程度の大なる耳石塊として観察された。

小 括

ヘマトキシリンにより染色された場合は、微細な粒子表面に色素顆粒が吸着され、耳石の凝結現象が妨げられた結果、写真に見られる以上のような微細な顆粒の集合として観察されたのであるが、染色しない場合は、漸次乾燥し、水分を脱して、かような微細顆粒が相結合し、先に述べたような大なる結晶型を形成したものである。

4. X 線廻折による実験

緒 言

生鮮な乾燥しない耳石について、X 線廻折実験は未だかつて行われていないのである。しかるに今回、著者は生体内にあつて、耳石は果していかなる状態で存在しているものかどうかを知るために、上述の圧迫実験、電子顕微鏡観察により生体内耳石はコロイド状態にて存在する事を殆んど実証し得たのであるが、更にこれを決定付けんとして、X 線廻折実験を行ったのである。

材料並びに方法

実験動物としては、殿様蛙、250~300gr の正常海猿を使用した。

さて蛙³⁹⁾の膜性迷路（大半は耳石にて占められているが）は耳嚢に包まれて存在している。この嚢

は横立の軟骨附属物により合一せる二個の骨部に囲繞せられ、外側性後頭骨は耳嚢の後部、前耳骨はその前部をなしている。側壁は軟骨及び骨性の被蓋に接し、内壁においては数多くの開口が認められ、こゝより聴神経、リンパ管が出ている。そこで先ず断頭後、外側頭骨を切除し、耳嚢の一部を露出して、後内壁において針先で入念にリンパ管及び聴神経を切断し、この断端を尖鋭なピンセットにて固く把持し、緩徐に嚢が破れない状態の完全なる耳嚢を取り出した。

かようにして取り出した耳嚢を破壊しないように慎重に、予め作製した直径約 5mm、長さ約 1cm のセロテープの略々中央に入れ、次に述べるような方法で実験に供したのである。こゝで著者は X 線廻折法として、Debye Scherrer 及び Hull の法に基づいて実験を行った。即ち、銅を対陰極とする Coolidge 管球より一定波長の X 線（ $\text{CuK}\alpha$ 線）を出し、これを管球より 10 乃至 15cm 後方の上記の試料にあて、その反射 X 線を試料周囲に存する直径 10cm の円筒型カメラにて撮影する方法である（X 線廻折装置は図 2 参照）。なおこの際フィルターとしてはニツケルを用いた。フィルムはコダックの X 線フィルム（富士 X 線フィルムの約 3~5 倍の感光度を有する）を使用し、管電圧 33KV、電流 33MA、焦点距離 10cm、露出時間 10 分、海猿では電圧

第 2 図

X 線廻折装置

- A. X 線管電子銃： B. 電子の焦点調整棒
C. 廻転陽極 X 線管： D. X 線出口
E. 試料軸： F. フィルムセット： G. 真空引口
H. デバイ装置のマウント： I. 陽極廻転モーター： J. ビームトラップ

35KV, 電流 35MA, 焦点距離 10cm, 露出時間 23 分にして撮影した結果, 鮮明なる廻折写真を得ることができた。この場合試料の廻転は行なかつた (表 1)。

第 1 表

動物	状態 (耳石)	管電圧 (KV)	電流 (mA)	焦点距離	露出時間 (分)	試料回転
蛙	生鮮	33	35	10	10	(一)
蛙	乾燥	33	35	10	10	(一)
海猿	生鮮	35	35	10	23	(一)
海猿	乾燥	35	35	10	23	(一)

かくて X 線により結晶の廻折像が干渉環 (D-S 環) として撮影され, この区形あるいは線の強さ等は, 各結晶により固有で, これ等より結晶系の推定, 結晶粒子の大きさを判定するわけである。

成 績

先づ自然に存する結晶型の確定された霰石の結晶, 及び先に実験に供した耳嚢を破り取り出して乾燥した耳石について, X 線廻折を行った結果, 勿論, 霰石の D-S 環に一致しているのを認めたのであるが, これ等は D-S 環上にぶつぶつ状の砂粒状の斑点として現われ (写真 No.5), 生鮮の半乾にある耳石では, 矢張り霰石と同じ D-S 環ではあるが, 一様に色附いた瀾漫性の環として認めたのである (写真 No.6, 図 3)。後者のぶつぶつ状の斑点は, 結晶粒子が波長に比して粗大なるため生ずるもので, 結晶が 1μ 以上の大きさを持つ事を意味し, 又斑点なき環は粒子が 0.1μ 以下の微細なものである事を表わしているのである。

海猿の場合も蛙耳石の場合と同様に乾燥したものである, D-S 環上にぶつぶつの斑点として現われ (写真

No.7), 生鮮なものでは, 一様に色づいた環として観察された (写真 No.8)。

小 括

以上の両者の相違からして, 著者は耳石は生体内にあつては, 今まで考えられていたような結晶の集りではなく, 0.1μ 以下の一種の炭酸カルシウムの微粒子即ち, コロイド状態として存在している事が確実に言えると思う。

即ち炭酸カルシウム極微粒子が分散媒となり, 蛋白質が分散質として平衡を保つ一種のコロイドが形成されていると云える。

5. 総括並びに考按

圧迫実験

先づ上記実験の前段階として著者は摘出直後の耳石を二枚の厚ガラス板の間に挟み, 指先にて圧を加えて観察する方法を試みていたのであるが, か様な方法では, その正確なる圧を規定することが不可能である。従つて更には一定の圧力を得られる Air Compressor を使用して, 直接資料に圧を与える方法をとつたが, 資料が四散するため, 不成功に終つた。そこで一定の荷重を加える装置があれば, 理想的な方法であらうと, 種々検討した上, 全く独創的な方法として, 先の光弾性実験用具の一部である荷重装置の利用を思いつたのである。さて生体内にある耳石は一度, 空気中に曝露されると, 速やかに乾燥され易い性状をもっている。従つて摘出直後のものについては, 非常に迅速なる処置が必要である。ために全く瞬時に操作でき得る体勢に準備した。所謂耳石は, 生体内にあつては, 白色泥状をなしている, この事実は生体内では耳石そのものが柔き物質として存在しているのか, あるいは, 硬固な結晶であるのか, それを含む周囲のゼラチンよう物質のために柔かいものとして

感ずるのか, 今仮に耳石が硬固なる結晶であると仮定すると, 軽微な圧迫では容易に崩壊しない筈である。ところが以上の実験により, 著者は生体内にあつては, 耳石は硬固な結晶ではない事を立証したことになる。

電子顕微鏡による実験

一般に一個の耳石は, それ自身, それぞれ単結晶のように考えられていたが, 染色しない状態の耳石を電子顕微鏡で観察すると, 矢張り大なる単結晶様の像として現われてくる。しかるに Engström と Carlström⁴⁾ (1955) は人間の耳石を押し潰し, これを電

第 3 図

X 線廻折写真模倣図

A: 乾燥耳石 (蛙) B: 生体内耳石 (蛙)

予顕微鏡で検索した結果、実は単一結晶を示さない微細結晶の集合のように思えると報告している。一方佐々木、宮田は同年、摘出して殆んど乾燥しない儘の耳石をヘマトキシリン中に混入し、これを電子顕微鏡で観察した結果は、微細結晶型が次第に融合し大なる結晶型を呈する像をとらえることに成功した。しかるに前者は飽くまで乾燥しない儘の状態、後者は全く乾燥した状態の耳石について試みられたものであつて、両者間にはその出発点に明らかな相違があり、又その結果は、先の圧迫実験がこの事実を明らかに意味づけていると思う。

更に今回行った実験から（摘出直後の耳石を間髪を入れずヘマトキシリンに混入した結果）、佐々木、宮田³⁰⁾の云う一つの微細結晶型は、実は更に微細なる粒子より構成されていると云う所見を得たが、このことは生体内にあつては、耳石は一種の炭酸カルシウムの微粒子即ち、コロイドの状態として存在するものであらうとの推論をより確実にする事ができた。

X 線廻折による実験

X 線廻折法には種々あるが、極めて微細な結晶の決定には、粉末法が賞用されているが、これは更に試料の作り方、及び撮影方法により二種類に分類できる。著者は Debye-scherrer 及び Hull の法に基づいて実験を行った。その結果、耳石膜を破り取り出した耳石を乾燥させて後撮影したものでは、Aragonite 及び Calcite を示してはいるが、各環輪は明らかに著明なぶつぶつの斑点を認め、決して漸慢性ではないのである。これに反して、耳石膜を全く破らない儘の即ち生体内耳石を X 線廻折した結果は、矢張り Aragonite 及び Calcite 特有の干渉環ではあるが、明らかに漸慢性同一色調として現われた。以上のような実験結果から、従来考えられていたような大なる耳石結晶の集合体は耳石膜が破れるとか、他の化学的影響をうけて、その微結晶質が相集つて結晶の成長をなしたものであり、生体内では炭酸カルシウムのコロイド状態として存在していると云う推論に重要な根拠を与えたものと確信する。

II 耳石の形成に関する研究

1. 緒 言

耳石の発生に関しては、Wittmaack³⁰⁾ (1919)、Studnicka²⁸⁾ (1921)、Donadai⁹⁾ (1925) が、聴斑の上皮細胞は一種の分泌機能を有することを報告し、又 Cupula の間隙、耳石膜、あるいは聴斑の感覚細胞の表面に見出されると言う滴状の球形形成物を Donadai⁹⁾ は一種の分泌物と考え、続いて Studnicka²⁸⁾ と共に、こ

れを Otoconien と名附けた。その後、この事は西尾¹⁸⁾ (1926) の追試により標本作製時の誤謬であると反対された。

更にその後 Wittmaack³⁰⁾ (1930) は実験を進展させ、膠様質上の Otolithen は Endolymph より沈澱として生じたものであると主張した。

一方 Herzog¹⁶⁾ (1925) は、耳石は上皮細胞の原形質より生成されるものに非ず、先づ上皮細胞より「コロイド」分泌せられ、これに直接炭酸カルシウムが沈着して、生成されてものであると述べ、又西尾¹⁸⁾ (1926) は実験的に「マクラ」に近き部の内リンパはその部の上皮の作用により炭酸カルシウムの含量が漸次増大し豊富となり、逆に炭酸カルシウムを沈降するに至る事実を認めている。

それ以来というものは、耳石形成乃至は発生に関する研究は、殆んど停滞した感があつたが、最近になり、Vilstrup²⁵⁾ (1951) は鮫を用い内淋巴管の上皮の中に、あるいは管腔内に、又耳石膜の中に Vacuoles を見出し、これを種々な方法により検索し、この Vacuoles は、炭酸カルシウムを含んでいるように思われ、内淋巴上皮より分泌された Vacuoles は内淋巴管に移動し、聴斑上の耳石膜の中に入つてくると述べている。更に、この Vacuoles は Donadai、Studnicka 等の言う分泌物と一致している。即ち、彼は内淋巴管上皮に分泌機能を有する事を認めているのである。

次いで Savin⁷⁾ は (1955) Chickenembryo を使用し、孵卵 5 日目の Gallus domesticus embryo において、endolymphatic sac 中にカルシウム物質の存在を認め、上皮細胞あるいは、内リンパ管中に結晶を形成する力をもっているものである事は注目すべきであると結論し、更に彼は⁸⁾ 翌年、孵卵 9 日目の Chicken embryo の内淋巴囊内に既に耳石は存在していたが、特殊の神経終末、あるいは線毛細胞を欠除していることを証明した。

以上、諸家によつて耳石形成をめぐる問題も漸次解明されてきてはいるが、なお不明の点も多く、現在もなお推論の域を脱していないといつても過言ではない。

さて、先に著者は耳石のコロイド説を再確認し、耳石形成の問題解決にもある光明を得ることができた。そこで更に進んで、その問題究明に次のような実験を行い、所期の成績を得たので報告する。

2. Ca⁴⁵ による Ca 代謝の研究

緒 言

生物は養分と呼ばれる一定の物質を体内に摂取して、身体の内部で色々に変化させ個体の構成、生命の保持に役立たせているが、そのように変化した物質の内、一定部分を体外に放出する。これは生命現象の一つの新陳代謝と呼ばれる現象である。

しかるにかゝる代謝、殊に Ca の代謝に関しては各方面で研究がなされていたが、最近この面の研究に新しい道程として、Campbell と Greenberg²²⁾ が初めてアイソトープを物質代謝研究に応用し、それ以来各分野において盛んに使用されるに至つたのである。著者も今回初めて耳石形成を追究の目的で、 Ca^{45} を tracer として用い、次のような実験を行い、いさゝか知見を得ることができた。

材料並びに方法

放射性同位元素 Ca^{45} を用いた。 Ca^{45} は次のようなものである。

Description Ca^{45} (P-1)

Specific activity: 75mc/gr

Analysis

Chemical Form: CaCl_2

Concentration: $0.69 + 10\%$ mc/ml

Heavy metals: 10P.P.M.

Normality: 1.32 Acid

Ca: 92.0mgr/ml

実験動物としては 250～600gr の正常なる海猿、及び殿様蛙を使用した。

(1) 海猿には $250\mu\text{c}$ 、殿様蛙には $20\mu\text{c}$ のを背部皮下に注射し、種々の時間即ち海猿では 10 分間隔、蛙では 5 分間隔で断頭し実験に供した。

(2) 放射性同位元素の耳石内推移及び耳石器官における分布状態を知る手段として次の方法を用いた。

ラジオオートグラフ (Radioautography)

ガイガー・ミューラー計数管による測定 (G-M Counter と略す)

ラジオオートグラフとは、標本中の放射性同位元素の分布を写真乳剤膜に直接記録する方法である。

海猿においては、断頭後、側頭骨を取出し、入念に鉋及び針を以つて橢圓嚢が完全に明視しうる状態まで破壊し、これを慎重に剔出し、氷醋酸を含まないウイットマーク氏溶液 (以下 W-錯液と記す) 中に 2～3 日間固定して後、充分に水洗 (約 24 時間) 後、アルコールにて脱水し、アルコール・エーテル溶液に浸し、チエロイザン膜で載物硝子に貼布した。

その際、一側は Ca^{45} 注射側、他側は非注射側とした (写真 No.11)。かようにした載物硝子上に暗室で Fuji-X-ray-film を一枚の中間紙を介在させて接着させ、黒色紙にて覆い、光を完全に遮断して、ゴム輪をかけ、各標本は湿気を防止するために乾燥剤 (塩化カルシウム) を入れた Decicator 中に安置し、これを低温保持のため $1^\circ\sim 4^\circ\text{C}$ の電気冷蔵庫内に入れ 10 日間露出して後、FD-111 (20°C) にて 5 分間現像、FS-1 (20°) で現像停止 1 分間、FF- H_4 (20°C) で 6～7 分間定着した。

蛙においては、3 群に分ち実験を行った。

(a) 断頭後、耳嚢を慎重に針先にて剔出し、嚢内より耳石を殆んど除去した後、更に嚢内をば注射器を用い蒸溜水にて、何回も洗滌し、顕微鏡的に耳石なきを確かめて後、先に述べた方法で、非注射側の耳嚢を対照に、載物硝子に耳嚢の外面が硝子面に当るようにして貼布し (写真 No.13)、これに Fuji ET-2E Contact 型乾板と一枚の中間紙を介し接着し、黒色紙で覆い、Decicator に入れ、 $1^\circ\sim 4^\circ\text{C}$ の温度に保ち、41 日間露出した。露出後は FD-111 (20°C) で 3 分現像、FS-1 で現像停止後、FF- H_4 (20°C) で 15 分間定着、後 20°C 30 分間水洗した。

(b) 注射後、種々の時間で断頭し、直ちに載物硝子上に耳石を塗抹し、非注射側の耳石を対照に乾燥するのを待ち、例の如く中間紙を介在させ、Fuji-X-ray-film に接着し 3 日間露出後現像した (写真 No.9)。

(c) 断頭後、両側の耳嚢を丁寧に剔出し、化学天秤にて秤量し、更にこれと同重量の各内蔵 (肝臓、脾臓、腎臓、骨、筋肉片) を取り、自己吸収、その他の影響を考慮して、可及的条件を同一にするように努めた。

前記試料の一定量を、夫々 60% 過塩素酸並びに、過酸化水素を用い、湿性灰化せしめ、アンモニアにて、pH6.8 に補正し、飽和硫酸アンモニアを加えて沈澱せしめ、生ずる硫酸カルシウムの沈澱を更に、アンモニアにて洗滌後、アルコール浮遊液として試料皿に入れ、赤外線にて乾燥したものを、神戸工業の、G-M Counter (GM132) を用いて測定した。

測定条件 G-M 管よりの距離 15mm

電圧 1125Volts

海猿 ($800\mu\text{c}\sim 250\mu\text{c}$)、蛙 ($20\mu\text{c}$) 注射後、種々なる時間で断頭し、W-錯液に一週間固定し、蛙の耳嚢及び海猿の橢圓嚢を剔出し、充分水洗し、ヘマトキシリン・エオジン重染色を行った切片 ($8\mu\sim 15\mu$ の種々な厚さの) あるいは、ヘマトキシリンで染色した耳石を、載物

硝子に固定し、セロイデン膜で覆い、更に、ゼラチン下塗 (0.5% ゼラチン水溶液 100cc, 1% クロム 明礬水溶液 1cc 使用直前に混合する) を施した。次いで乾板を 20°C の蒸溜水の入った硝子箱に浸漬し、約 1 分の後、乳剤膜が充分膨潤してから、左手で乾板を持ち、右手の人差指の腹で乾板の四方の縁から乳剤膜を静かに内側にこすると、直ちに乳剤膜が硝子より剥ぐれる。この一辺を右手でつまんで静かに反対側に引くと容易に乳剤膜のみが剝離する。硝子板を除いて、代りに、上述した標本を水中に入れ、その表面に附着している空気泡を完全に除き、次に左手で載物硝子標本面を上にして持ち、水中で乳剤膜を平らに広げて、静かに泡が入らず、異物が中間に入らず、皺がよらないように注意しつつ、載物硝子を引き上げた。余滴を濾紙で除いて扇風機で乾燥し、全体を黒色紙にて覆い、前に述べたと同様な方法で露出

後、現像、定着及び水洗を行い検鏡した。この際特に露出期間が長期に亘るため、特に低温低湿に保ち、有害ガスより守るために、Decicater 中の塩化カルシウムを数回交換した。

成績

以上の実験より、海蜃の場合は注射後 1 時間にして、漸く写真 (No.12) に示す如き陰影を認め、更に、蛙では写真 (No.10) で見られるように 15 分後には、既に Ca^{45} が耳石内に移行している事実が判明したのである。又興味あることは、蛙耳石膜に Ca^{45} の分布を認めたことである (写真 No.14)。

なお蛙では注射後 30 時間の観察から、他の臓器では次第に減少するにも拘わらず、耳石内においては、除々ではあるが、増加の傾向を見 (表 2, 図 4), 72 時間では殆んど消失するように思えた。

小 括

耳石がコロイド状態であるとすれば、耳石も矢張り、その他の骨組織と同様に Ca 代謝を営んでいる事が充分想像されるのであるが、以上の実験からこれ等動物に投与せられた Ca^{45} は、比較的速やかに耳石に集まるが、72 時間程度で殆んど消失してしまう事実よりして耳石は Ca 代謝を行つていると云つても差支えないと思う。

3. 組織化学による C.A. の証明

緒 言

骨格に沈着する Ca は、主としてその磷酸塩としてであり、phosphatase がその生成に触媒的な働きをなしていることは周知の事実である。しかるに著者は、卵殻、真珠、は主として炭酸カルシウムからできており、

しかも卵殻は Calcite であり、貝殻特にアコヤ貝殻では両層に区別され、稜柱層は Calcite、真珠層では Aragonite であり、真珠も Aragonite である。又 Aragonite, Calcite である耳石とその形成過程に何等かの類似点が存在するのではなからうかと言う事は充分考えられる処から、かかる方面の内外文献を渉猟しながら検討を加えてみたのである。ところが、卵殻形成に関しては、Common²⁴⁾ (1941) が殻の石灰化に初めて、Carbonic anhydrase (C.A. と略す) なる酵素が関係し、鶏の子宮組織又は卵管組織にかかる酵素が多く含まれている事実を発見し Gutwska と Mitchell²⁵⁾ (1945) は C.A. の作用機転について次のように説明して

第 2 表 耳石及各种臓器内への Ca^{45} の移行 (c.p.m.)

	骨組織	肝 臓	脾 臓	腎 臓	耳 石
30 分	130	100	70	54	15
1 時間	140	92	60	52	17
2 "	140	94	50	43	20
4 "	130	84	58	48	14
6 "	114	87	54	49	22
12 "	120	84	59	48	24
18 "	112	80	58	40	28
24 "	78	40	35	40	28
30 "	87	37	33	38	30

第 4 図 Ca^{45} の耳石内及各种臓器内消長

K: 骨組織, L: 肝臓, M: 脾臓, N: 腎臓, O: 耳石

いる。即ち C.A. は子宮の分泌細胞内における H_2CO_3 の解離に対して触媒的な働きをなしている。

子宮内の重炭酸イオンは血液中より得られ、炭酸及び炭酸イオンを形成する反応を呈し得た。これは不可逆反応であり、炭酸が蓄積すれば、殻の CaCO_3 のために必要な量の生成を制限するだらうと述べ、又一方 Fremann と Wilbur¹²⁾ (1948) 及び Bevelander²⁾ 又本邦では、辻井⁴⁸⁾ (1952) が真珠及び貝殻形成に C.A. が重要な因子をなしていることを証明し発表したものである。さて、C.A. なる酵素は Brinkmann³⁶⁾ 40) (1931) が初めてその存在を予想したのである。即ち、血液を薄めても、生理的 pH の下で重炭酸塩より炭酸ガスの発生することを認め、これは次の

なる反応を促進する何等かの酵素が存在せねばならない筈だと言った。それに次いで、Meldrum 及び Rough-ton¹⁷⁾ (1932) が初めてこの酵素を牛の血液より白色の粉末として抽出する事に成功したのである。

ところが、かゝる酵素を組織化学的に証明しようとする試みは、初めて Stadie, O'Brien¹⁶⁾ (1933) により、次いで本邦では倉田¹⁶⁾ (1953) により追試され種々と改良が加えられている。

一方人体においては、今迄、赤血球、脾臓、腎臓に証明されているが、耳石器官においては試みたと言う報告は未だ知らない。

今回著者は、かゝる酵素の耳石形成に対する意義を追求するために、先ず第一段階として、耳石器官にかゝる酵素の存在の有無を確認する目的で次のような組織化学的検索をしたのである。

材料並びに方法

実験動物には股様蛙及び 1.5kg～2.0kg の正常家鶏を使用した。

実験方法

(1) 2mm 位の厚さの組織片を冷アセトンで 1 時間固定。

(2) 溜水により 10～30 分間水洗

(3) 組織片を新調した次の基質液中に 37°C で 30～45 分間浸漬する。

塩化マンガ

1g

8% 重炭酸ソーダ水溶液

100cc

桃色が消えるまで攪拌し、後濾過する。

(4) 溜水を数回交換して、約 1 時間水洗。

(5) アルコールで脱水、パラフィン包埋、又はセロイデンパラフィン包埋切片作製。

(6) 切片を 0.1% 過沃素酸カリウム水溶液に入れ、37°C で 48 時間浸漬。

(7) 溜水で水洗。

(8) アニリン色素水溶液で温染色、脱水、キシロール (この際石炭酸キシロールは使用してはいけない) バルサム封入。

かゝる証明法の原理は、適当なる状況下において、重炭酸 Ca の溶液で培養される時の酵素作用により炭酸 Ca の沈澱をその基礎としている。この際の処理により、 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ は Mn, Ni, Co の重炭酸塩により代用せられる (この場合 Mn 法, Ni 法, Co 法と称する)。これを反応式で示すと、この酵素は

の反応式を促進する酵素であり、酸性炭酸ナトリウムと塩化マンガンを基質として、酵素の分解を起すと (Mn 法)

となり、この場合生ずる MnCO_3 の沈澱を過沃素酸化化によつて検出するのである。即ち

これにより生じた亜マンガ酸が酵素の活性を示し、茶褐色乃至は黒褐色の顆粒として現われるのである。

更に、Ni 法の場合は、酵素活性を示す部位が赤色調の顆粒として現われ、この場合は、 MnCl_2 の代りに NiCl_2 を用い、過沃素酸カリの代りに 95% アルコールに 1gr のジメチルグリオキシムをとかした溶液を使用すれば反応が比較的瀾漫性に現われてくる。

成績

先ず組織標本作成に当つては、次の点を考慮に入れ、比較的良好な結果を得た。即ち、

(i) 塩化マンガ、8% 重炭酸ソーダ水溶液を混じ攪拌し、濾過した基質液に普通は 30～40 分間浸漬するのであるが、3 時間程度浸漬すれば、その活性度が明瞭に現われてくる。

(ii) 0.1% 過沃素酸カリウム水溶液を使用するに当つては、完全に溶解に至らないものでは不成功に終る例が多いため、作成直後のものは使用しないようにした。

(iii) 先の過沃素酸カリウム水溶液中に浸漬しておく場合、塵埃を特にさけるよう注意した。

(iv) アニリン色素として、Mn 法にはエオジンを使用した。濃染し過ぎると、顆粒の少ない場合は見難くなるので、濃い過ぎないよう軽く染色する程度にとどめた。

か様にしてまず、この酵素が多量に含まれていると言われる赤血球及び、胃臓、脾臓（蛙、海猿、家兎）において、予め当該酵素を証明し、更に血液（人間）より C.A. を Stadie O'Brien の方法で白色の粉末として抽出し、これを含ませた、アルブミン膜を上記方法にて染色し、強陽性の結果を得た。これを参考として、家鶏及び蛙耳石器官に、まず Mn 法を用いて、その証明を試みたのである。

周知の通り、耳石器官である脩円囊、正円囊共に、その微細構造は、単層の扁平上皮よりなり、何れも聴斑を備えているが、この場合、酵素は耳石膜及び聴斑に近い部の body 即ち、Extramacular portion の一部にも強い活性を認めたのである（写真 15, 16, 17）。

なお、次に Ni 法を使用し、上記の部位に一致して、多少陽性ではあるが、赤色の色素顆粒が、比較的明瞭に観察できたのである。更に対称標本として、(3) の基質液を蒸留水として、切片を作成した場合、全く C.A. の活性を認めざる点を確認し、正確を期した。

小 括

蛙、家鶏を使用して、組織化学的検索を行った結果、これ等動物の耳石器官特に、耳石膜、及び Extramacular portion に強い C.A. の活性を認めた。

4. C.A. の各種酵素阻止剤による実験

緒 言

酵素反応の阻碍実験は、酵素の活性基の性質及び、その反応の作用機序を研究する上に、重要な手がかりを与えるものである。一方生化学においても、いくつかの酵素系から構成されている中間代謝の複雑な過程を、阻碍剤を利用して、いろいろな個所で遮断し、蓄積する中間物質を分離固定して構造決定を行い、各段階の反応を明らかにしていこうとする試みがなされている。

又臨床的な面からいっても、抗生物質、化学療法剤などは、総べてある特異な代謝過程を阻碍することによって有効であることが知られている。従つて種々の酵素阻碍剤を治療に応用しようとする試みが最近盛んとなっている。

さて、酵素というものは、極めて不安定な高分子蛋白

体であり、種々なる試薬によつて不活性化される。これ等の阻碍剤には2種類あつて、すべての酵素に対して、一様に作用する非特異的な阻碍剤と、ある特定の酵素乃至は酵素群を、特異的に阻碍するものとが知られている。こゝでは後者のみに限定して記述することにする。

ところで、Keilin 及び Mann²⁴⁾ は R-SO₂:NH₂ 型 (R: ベンゼン, ナフタリン, ピリジン) の化合物は非常に僅かではあるが、C.A. を特異的に阻止すると報告している。

著者は先に C.A. なる酵素を耳石器官に証明したのであるが、この酵素が果して実際に炭酸カルシウムの生成に関与するものかどうかを証明するため次のような実験を行った。

材料並びに方法

実験動物としては産卵能力のある 1.5kg~2.0kg の健康なる 10 羽の牝鶏を使用した。

投与せる各種薬剤は次のようなものである。

Diamox (Lederle)

Nirexon (Bayer)

飼料には、完全飼料（日本農産工業：粗蛋白質 16.0%，粗脂肪 3.0%，粗繊維 7.0%，粗灰分 12.0%）を使用した。

鶏舎には、各部屋は金網を用い完全に仕切られ、相互に交流するを避けた。

方 法

薬剤投与に際しては表 3 に示す量を、ゲラチンカプセルに入れ、指先を以つて、食道入口部におし入れた後、4~5 滴の水を注射器にて注入し、暫くして後、再度食道入口部を観察し、正確に飲み込んだか否かを確かめた。投与薬物は表 3 の如くで、Diamox 4 日間、Nirexon 7 日間、各々 5mg/kg. Sulfathiazole 7 日間、Sulphanilamide 3 日間、重曹 7 日間、各々 0.2g/kg を投与し、7% 重曹水（メイロン）は毎日 10cc 10 日間注射を試みた。

第3表 各種酵素阻止剤の C.A. 阻止効果

NO	I	II	III	IV	V	VI
卵数	1	1	2	1	2	1
薬	5mg/kg	5mg/kg	0.2g/kg	0.2g/kg	7%重曹水	0.2g/kg
物	ニレキソロン	ニレキソロン	ニレキソロン	ニレキソロン	ニレキソロン	ニレキソロン
投与回数	4日目	7日目	7日間	7日間	7日間	3日目
卵殼性	非常な菲薄 一部欠除 表面粗雑	中等度菲薄 表面粗雑	正常	正常	正常	全く欠除 卵内容露出
C.A. 阻止効果	(++)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+++)

成 績

Sulphanilamide では、投与後 1~2 日目には卵殼は非常に菲薄、表面粗雑で、紫外線にて正常の卵殼は一樣の赤紫色の螢光を呈するに反し Sulphanilamide 投与卵殼は、まばらの斑点の多い螢光を發し、3 日目では、写真 No.20 の如く、全く卵殼を欠除し、卵内容が露出していた。Diamox は投与後、4 日目では非常に菲薄、表面粗雑で、一部欠除せる卵殼を、又 Nirexon 投与例でも同様であるが（写真 No.19）、その程度は Diamox に比し軽度で、両者とも紫外線に欠陥り、まばらの斑点の多い螢光を發した。写真 No.18 は特殊な例で Diamox 250mg, 3 日間連続投与（全量 750mgr）を行ったもので、カルシウム沈着異常の結果と考えられる。この卵殼は菲薄で非常に小さく正常卵殼の 1/3 程度であった。次に対象として行った重曹、重曹水注射群においては、先づ重曹を試みに 0.5g/kg まで増量し、10 日間投与したにも拘らず、卵殼には何等の変化をきたさなかった。又 7% 重曹水 10cc を 10 日間に亘り連続静脈注射を試みたが、重曹未投与と同様、卵殼形成には全く異常は認められなかった。更に Sulfathiazole を投与し、得られた卵殼も全く正常であった。なおこれ等実験を通じて鶏にはチアノーゼ、呼吸困難、筋弱化等の副障害は示さなかった。又食慾、産卵能力の低下等も認められなかった。

小 括

Sulphanilamide, Diamox, Nirexon は明らかに、C.A. 阻止作用として卵殼形成即ち炭酸カルシウムの形成を阻止したが、特に Sulphanilamide 及び Diamox は顕著であった。これに反し、重曹、7% 重曹水、Sulfathiazole では全く阻止効果を認めなかった。

5. 総括並びに考按

Ca⁴⁵ による Ca 代謝の研究

最近放射性同位元素の応用が非常に盛んとなり Radi-

oautography を用いて、放射性物質の存在、分布等を知る研究も多く行われるようになった。Radioautography とは放射性物質によって感光乳剤が黒化する事実を応用したもので、放射性物質を含む動物の組織片、又は細胞塗抹面に感光乳剤膜を直接に接触して一定時間露出し、現象し、感光乳剤銀粒子の黒化で、放射性物質の分布像を見る方法である。大体量的分布状態が、宇宙線や硬 γ 線に影響されることなく半永久的に記録されるが、放射線が放散するために像がぼやけるので、微細構造内の分布を明確にする事はできない欠点がある。しかしこゝに使用した放射性同位元素は β 線であつて energy が非常に弱いため乳剤中の行程は短かくて Radioautography を撮るのに便利である。ただ Ca⁴⁵ は energy が特に弱すぎるため、感度の低い Stripping film には感光しにくい欠点がある。かゝる方法を使用して実験した結果、Ca⁴⁵ は注射後速やかに耳石内に集り、徐々に増加して後消失した事実を知つたのである。そして更に Ca⁴⁵ の微細なる分布を知るため行つた Microautography は、その操作にでき得る限り万全を期して行つた。先づ露出時間を決定するため、各切片につき G-M counter で測定したが、殆んど Natural count と変わらない程度の数値より示さなかつた。従つて次に、X 線フィルムを用い、予備実験を行つて、最大 300 日間の露出を行い、その間種々なる期間において現像を行つてみた。しかし明確なる結論を得るまでに至らなかつたのは遺憾である。このことは先に述べたように、Ca⁴⁵ は、energy が弱過ぎる上に Stripping film が特に感度が低く、長期間の露出により更にその感度を低下させたためと、その他の微細なる因子が大いに関係しているように思われた。

組織化学による C.A. の証明

著者は炭酸カルシウムよりなつている真珠及び卵殼の形成に興味を持ち、その形成に関与していると思われる Glykogen, 多糖類, 核酸, Phosphatase 等を取扱つた論文を多数参照したが最近炭酸カルシウム形成に C.A. が重要な因子をなしている報告を知り、この酵素出現を、耳石器官に実証しようとする試みは、非常に合理的であると信じ、先づ蛙に、次いで家鶏の耳石器官に初めて、C.A. の活性を認めたのであるが、特に耳石膜に一致して、その活性が観察された。そして組織化学的実験を更に進める内に、聴斑に近い部の body 即ち Extramacular potion に一致して強い活性を認めたのである。ところが Smith⁵⁾ (1956) は、電子顕微鏡に

て、橈円囊の body 内に分枝上皮細胞、Bronchial epithelcelles を実証した。そしてかゝる細胞は無数の突起を出し、基底膜により限界がつけられていて、かゝる場所で濾過あるいは分泌が行われ、内リンパを産生するのであらうと推論しているのである。

C.A. の各種酵素阻止剤による実験

Roblin 及び Clapp²⁰⁾ (1950) は C.A. 抑制体を系統的に追求し遂に 2-Acetyl-amino-1, 3, 4-thiadiazol-5-Sulfonamid (略して Acetazolamid) を発見した。このものは有効な内服利尿剤として Diamox と呼ばれ、アメリカで治療に用いられるに至った。又ドイツでも以前より他の種類の即ち、Sulfonamid の C.A. 抑制作用を研究していたが Schraufsttter²¹⁾ (1956) はこれ等の物質を合成し、Schmidt-Kastner²¹⁾ (1956) は in vivo で C.A. の抑制を検討し、Wolfgang²⁰⁾ (1957) 及び共同研究者は、Bissulfonamid の一群を見出し、即ち Diphenyl-methen-4, 4'-Disulfonamid を Nirexon なる名称で Diamox 同様、内服利尿剤及び緑内障における眼圧降下剤として用いた。又 Corvera⁶⁾ は Diamox を初めてメニエル氏症候群患者に使用し、効果のある事を実証した。か様な R-SO₂: NH₂ 型の化合物としての Diamox, Nirexon 及び Sulphanilamide は明らかに炭酸カルシウムよりなる卵殻の形成を阻止したが、Sulphanilamide-Gruppe が置換された化合物である Sulfathiazole では全く C.A. 阻止効果のないことを示している。

なお Diamox, Nirexon, Sulphanilamide を 2 週間連続的に投与した結果、8～10 日目頃より酵素、即ち卵殻形成阻止作用が減弱あるいは消失した。一方 Diamox を利尿に使用した実験でも連用して 5～6 日で効果の減退をみた。その際更に投与量を増大しても利尿効果は認められず、数日の休薬期間をおいて投与することにより、再び利尿効果を認めているが、著者の例でも投薬中止後、1 週間程度で著明な卵殻形成阻止を観察することができた。

以上より、C.A. が卵殻（炭酸カルシウム）形成に重要な酵素である事を実証したわけであるが、かゝる観点よりして、この酵素が炭酸カルシウムよりなる耳石形成にも充分必要な理由が説明されうるように思われる。

なお外リンパ中の Ca がいかなる経路を通り、内リンパ腔に移行するかは、現在全く未解決の問題であるが、以上述べた諸点からして、外リンパ中のカルシウムは、

C.A. の分布せる所謂 Macula の近くの body を通り、この部分で酵素の作用をうけ、内リンパ腔内に移行し、更に耳石膜中の C.A. の作用により、初めて炭酸カルシウム（耳石）として折出されるのではなからうかと思考されるのである（第 5 図）。

第 5 図

耳石器官模図

E: 内リンパ腔, OM: 耳石膜, O: 耳石,
EP: Extramacular potion, NE: 聴斑神経上皮
NV: N, vestib, MP: 膜様壁

III 結 論

以上蛙、海猿、家鶏を用い固有の方法を以て、耳石及び聴斑を摘出し、その本態及び形成に関する究明を行い、次のような結論に到達した。

(1) 圧迫実験、電子顕微鏡、X 線廻折により、耳石は生体内にあつては、炭酸カルシウムが分散質となり、蛋白質が分散媒として存在する一種のゲルの状態として存在するものであり、従来耳石結晶として観察された粒子の集積は耳石膜の破壊、又は化学的、物理的影響等で、耳石膜の非生理的となつた場合、その平衡が破れ微細結晶質が相集つて結晶の成長をなし、大なる結晶をなすものであつて、非生理的なものと考えられる。

(2) Ca⁴⁵ を tracer として、耳石内消長を検索したところ、Ca⁴⁵ は投与後、除々に増加し約 72 時程度で交代する事実から所謂耳石も代謝をなしているものと考えられる。

(3) 家鶏、及び蛙の耳石器官即ち、耳石膜並びに、聴斑に近い Extramacular potion に集約的に Carbonic Anhydrase を証明した。

(4) 当酵素は炭酸カルシウム折出に密接に関与し、耳石形成に重要な役割を果すものである。

参 考 文 献

- 1) Benesch, R.N.S. Barron, and C.A. Mawson: Na-

- ture, 153, 138, 1944. 2) *Bevelander, G.*: Biol. Bull, 102, 9, 1952. 3) *Carström, O.*: J. Histochem, Cytochem, 2, 194, 1954. 4) *Carström, O. and Engström, H.*: Acta Otolaryng, 65, 14, 1955. 5) *Cathalin, A. Smith.*: Ann. of Otol, 65, 464, 1956. 6) *Corvera, J.*: Ann. of Otol, 65, 351, 1956. 7) *Consuelo Savin V, M.S.*: Ann. of Otol, 65, 611, 1956. 8) *Consuelo Savin V, M.S.*: Ann. of Otol, 64, 1019, 1955. 9) *Donadai, C.*: Zbl. H.N. Kh. 7, 858, 1925. 10) *Engström, H.*: Acta Otolaryng, 60, 5, 1951. 11) *Fieandt, H.*: Acta Otolaryng, 60, 5, 1951. 12) *Freeman, T.A. and Wilbur, K.M.*: Biol. Bull, 94, 55, 1948. 13) *Funaoka, S. u. Toyota, S.*: Folia Anatomica Japonica, 6, 1928. 14) *Giaccai, F. et Carle, A.*: Arch. Otolaryng, 53, 434, 1951. 15) *Herzog, H.*: Z. Schr. f. Ohren heilk. 12, 413, 1925. 16) *Kurata, Y.*: Stain Technology, 28, 231, 1953. 17) *Meldrum, N.V. and Roughton, F.J.W.*: Jour. Physiol, 80, 113, 1933. 18) *Nishio, S.*: Arch. O.N.K. heilk. 115, 19, 1926. 19) *Okada, Y. etc.*: Report of Faculty of Fisheries, prefectural university of mie, 2, 199, 1956. 20) *Roblin, R.O. etc.*: J. Amer. Chem. Soc. 72, 4890, 1950. 21) *Schraufstätter, E., Schmidt-kastner, G. Wirth, W.*: Medizin u. Chemie Bd. V, S 107, 113, 1956. 22) *Schwieck, H.*: Künstliche Radioactive Isotope in physiologie, Diagnostik, u. Therapie, Berlin, 1953. 23) *Studnicka, F.K.*: Arch de Biol, 31, 299, 1921. 24) *Surkie, P.D.*: Avian. physiology, Comstock Publishing Associated, Ithaca, N.Y., 1954. 25) *Thure, Vilstrup.*: Ann. of Otol. 60, 974, 1951. 26) *Van Goor, H.*: Enzymologia, 13, 73, 1948. 27) *Wersall J., Engström, H., and Hijorth, S.*: Acta Otolaryng. Supp. 116, 298, 1954. 28) *Wilbur, K.M. and Anderson, N.G.*: Biol. Bull, 98, 12, 1950. 29) *Wolfgang, W.*: Dtsch. Med. Wschr. 82, 45, 1098, 1957. 30) *Wittmaack.*: Arch. O.N. u. Kh. Heilk. 124, 177, 1930. 31) 内田肇: 耳鼻臨, 46, 215, 1952. 32) 北野康, 西村雅吉他: 日化, 76, 581, 1955. 33) 久保猪之吉: 日耳鼻全, 2, 180, 1934. 34) 古関靖夫: オートラジオグラフィー, 東京, 1954. 35) 小林新二郎: 水産増殖, 3, 45, 1957. 36) 坂口謹一郎, 植村定治郎: 酵素, 東京, 1957. 37) 佐々木寛, 宮田壽一: 耳鼻喉科, 25, 65, 1953. 38) 佐々木寛, 宮田壽一: 耳鼻喉科, 27, 815, 1955. 39) 佐々木寛, 宮田壽一: 耳鼻喉科最近の進歩, 東京, 279, 1957. 40) 神前武和: 酵素学, 東京, 1950. 41) 田中正三, 波多野博行: 水産増殖, 3, 38, 1957. 42) 田中正三, 波多野博行: 第一回日本アイソトープ会議アイソトープ研究利用総覧, 1, 307, 1956. 43) 辻井稔, 町井昭: 科学, 23, 148, 1953. 44) 中井恩也, 倉田自章: 日本病理学会誌, 38, 108, 1949. 45) 長谷川高敏: 耳鼻喉科, 26, 659, 1954. 46) 宮田壽一: 日耳鼻, 57, 349, 1954. 47) 山下憲治: 日学術協会報, 10, 220, 1935. 48) 山下久雄: アイソトープ医学応用技術, 東京, 1956.

写真説明

- (No. 1) 圧迫実験: 摘出直後の耳石(蛙). (400×)
 (No. 2) 圧迫実験: 乾燥せる耳石(蛙). (400×)
 (No. 3) 電子顕微鏡写真(蛙耳石). (28,000×)
 (No. 4) 電子顕微鏡写真 (No.3 の拡大写真) (40,000×)
 (No. 5) X線廻折実験: 耳石膜を破り乾燥した耳石塊(蛙).
 (No. 6) X線廻折実験: 同一資料で耳石膜を破壊しないままの状態.
 (No. 7) X線廻折実験: 耳石膜を破り乾燥した耳石塊(海猿).
 (No. 8) X線廻折実験: 同一資料で耳石膜を破壊しないままの状態.
 (No. 9) 蛙耳石塗沫標本: 矢印は Ca^{45} 注射側, 矢印なきは非注射側.
 (No.10) 矢印は陰影で Ca^{45} が耳石に移行し感光せる像を示す.
 (No.11) 海猿, 楠田囊, 矢印は Ca^{45} 注射側, 矢印なきは非注射側.
 (No.12) 矢印は陰影で Ca^{45} が耳石に移行し, 感光せる像を示す.
 (No.13) 蛙耳囊: 矢印は Ca^{45} 注射側, 矢印なきは非注射側.
 (No.14) Ca^{45} が耳石膜に移行し, 感光せる像を示す.
 (No.15) 蛙耳石器官 A: 耳石膜に一致し C.A. の活性を認む. B: 耳石 (400×)
 (No.16) 蛙耳石器官 NE: 聴斑の神経上皮:

坂口論文附図(1)

(No. 1)

(No. 2)

(No. 3)

(No. 4)

(No. 5)

(No. 6)

(No. 7)

(No. 8)

(No. 9)

(No. 10)

(No. 11)

(No. 12)

坂口論文附図(Ⅱ)

(No. 13)

(No. 14)

(No. 15)

(No. 16)

(No. 17)

(No. 18)

(No. 19)

(No. 20)

A: Extramacular portion に C.A. の活性を認む. B: 耳石 (400×)

(No.17) 家鷄楠田養 NE: 聴斑の神経上皮

A: 耳石膜に一致して C.A. の活性を認む.
(黑色顆粒が酵素反応部位を示す).

B: 耳石, 切片作製中殆んど消失す. (400×)

(No.18) Diamox 投与卵殻で CaCO_3 沈着異常による特殊な例.

(No.19) Nirexon を投与した例で, 卵殻は柔軟, 粗糙で一部欠除している.

(No.20) Sulphanilamide を投与した例で, 卵殻を全く欠除した状態.

(稿を終るに臨み, 終始御懇篤な御指導・御校閲を賜った恩師佐々木寛教授に衷心より謝意を表し, 種々御教示を頂いた宮田助教授, 及び本研究のために, 場を提供され御助言を賜った九州大学工学部応用理学教室, 米田助教授に深謝し, 併せて金沢大学医学部病理学教室石川太刀雄教授, 倉田自章助教授の組織化学的方法の御助言に深甚なる謝意を表す.)

本論文要旨は日本耳鼻咽喉科学会第59回総会, 及び第78回日本耳鼻咽喉科学会中国地方会, 第1回日本耳鼻咽喉科学会中国四国合同地方会において発表した.

(原稿到着＝昭和34.1.27日一急載)