THE EFFECT OF HIGH VERSUS LOW PRESSURE ON THE PNEUMATIZATION OF THE MASTOID CELLS. AN EXPERIMENTAL STUDY

By
K. OGAWA

*From the Department of Oto-Rhino-Laryngology, Nagasaki University School of Medicine
(Director: prof. T. Goto)*

It is generally recognized that the extent of pneumatization of the mastoid cells may be genetically determined. On the other hand, otitis in infancy has been considered an important factor associated with underdeveloped mastoid cells. The author and T. Goto do not agree with this opinion and have believed that the development of the mastoid cells may be genetically determined.

Recently T. Goto and S. Shibata have reported that there is a marked fibrosis in the lungs of skin divers and limited development of the mastoid cells. From these results they suspected that pressure might have some influence on the extent of pneumatization of the pneumatic cavities, the lungs, accessory sinuses and mastoid cells.

The author has planned to study experimentally the effect of pressure upon the mastoid cells. For this experiment he constructed a pressure tank, in which constant pressure could be maintained at 3 atmospheres or at a pressure of $\frac{2}{5}$ of an atmosphere. The oxygen was insufflated into the tank under constant pressure.

The animals used for this experiment were young chickens 7 days old at the start of the experiment. The chicken has well-developed mastoid cells and its mastoid cells develop very quickly. The experiment was carried out on the two main groups, namely the high pressure group and the low pressure group. Chickens in each of the groups were placed in the tank for 2 hours daily. In each of these groups the observation was made at the end of 30 and 60 days on 15 chickens in each subgroup. During these experiments chickens have not shown any gross changes. The development of the chickens was not delayed compared with the control chickens. But the mastoid cells of each group were markedly underdeveloped. The septae of the air cells were thickened and the lumen of the cells were decreased in size. The height of the lining epithelial cells was increased and the subepithelial tissue was fibrous and thick. Residual cartilage tissue was found. The microscopic appearance of the air cells in chickens exposed for 60 days to high and low pressures are similar. The normal process of development, in which leucocytes infiltrate the subepithelial tissue, macrophages cause bony resorption, and the epithelium proliferates causing an increase in pneumatization, is delayed.

These findings indicate a delay in the development of the mastoid cells. The findings in the mastoid cells of chickens in the two groups were similar, whether they were exposed to positive pressures or negative pressures. The animals exposed for the longer time period (60 days) revealed only a slightly increased limitation in the development of the mastoid cells than seen at the end of 30 days.

高圧・低圧下の中耳蜂窠發育に及ぼす影響に 就ての実験的研究

長崎大学医学部耳鼻咽喉科学教室（主任：後藤敏郎教授）

小 川 清
オ ガワ キヨシ

目 次

- I 緒 論
- II 中耳蜂窠の發育に関する文献的考察
- III 研究方法
- IV 研究成績
 - 1) 肉眼的所見
 - 2) 組織学的所見
- V 総括並に考按
- VI 結 論
- VII 主要文献

I. 緒 論

科学の進歩に伴い、人類の生活環境は著しく変化し、高圧あるいは低圧環境の下に活動しなければならない状態となつた。特に近年そうした異常環境における生活の問題が医学に課せられた課題となつてきた。大気の圧の変化の下における疾患としては航空機病、高山病、潜函病等が既に知られている疾患であつて、耳鼻咽喉科方面においては航空性耳炎、航空性副鼻腔炎、潜函病における平衡異常等の問題がある。これ等に就ては研究対照として注意されてきたが、その実験の困難なることにも基因して、根本的問題に就ては不明のことが多い。特にその病理組織学的な問題に就ては殆んど報告されていない。

後藤教授は Pneumatisations-lehre の一系として、高圧・低圧環境において含気腔（中耳・副鼻腔及び肺を包含して）がいかなる変化をきたすかを研究中であるが、著者はその一部として実験的に中耳蜂窠（乳様蜂窠）の高圧・低圧によるその發育上に及ぼされる影響に就て研究を試みた。この方面の研究報告としては、後藤、柴田による潜水漁夫に就ての観察があり、それによるとかような高圧下に生活する職業のものでは中耳蜂窠抑制状態のものが多く、肺にはレ線的に著明の線維性変化の認められることが明らかとなつた。この論文の結論によるとこれ等の変化は高圧が長期作用するためであるといわれているが、これは実証を要する問題として実験

的な研究が残されていたものである。特に中耳蜂窠の發育抑制に就ては、後藤教授は遺伝的因子を特に重視し、炎症その他による影響を否定した立場にあつたが、高圧の作用がその發育に影響を及ぼす重要な条件であることが推測されるようになった。この研究の主目的はこの点の実証にあるが、又更に研究は副鼻腔及び肺における変化に対しても拡大される状況にある。

II. 中耳蜂窠の發育に関する文献的考察

中耳蜂窠の發育状態即ち Pneumatisation (以下 Pn.) のいかに判定するために、正常な中耳蜂窠の發育過程に就ての従来の説を挙げると次のようである。

Wittmaack によると、第1期を乳様洞形成期（生後1年）として、第2期を蜂窠形成完成期（4～5才迄）とし、個人の蜂窠形態の決まる時期としました。第3期は、別に名称はありませんが、終生に亘る緩徐なる發育期を当てゝいます。

後藤教授及び小林によると、中耳蜂窠の發育は次の3期に分類され、Wittmaack の誤謬が指摘されている。

第1發育期 基本的空腔形成期（生後1年迄）

第2發育期 蜂窠完成期 （青春期迄）

第3發育期 含気化充実期 （終生）

第1發育期は側頭骨内に骨の完成と共に、将来空腔となるべき部位に胎生組織にて充された部分ができ、そのうちに鼓室に接属して含気化された小洞、即ち Antrum ができる時代である。

第2發育期はその個人特有の蜂窠の形態が構成される時期であつて、求心性 konzentrische Pn. と共に遠心性 exzentrische Pn. に強い發育が行われる。この時期を Wittmaack は4～5才迄としているが、この年令の時期に發育上の劃期的な一線を引くことは困難であつて、青春期迄とするのが妥当であるとされている。

第3發育期は空腔の改変とその拡大は主として蜂窠隔壁内において行われる時期 interstitielle Pn. で、その發育は極めて緩慢であるが、終生に亘るものであるといわれている。

次に中耳蜂窠の發育を組織学的にみると、胎生3カ月、耳管の侵入により鼓膜の後方に狭い間隙が認められる。胎生5カ月、鼓室腔の輪廓がやゝ明らかになり、空腔に相当すべき間隙はその大いさを増すが、大部分の鼓室腔は胎生組織により充たされている。胎生週令の進むに従つて、この鼓室間隙腔の拡大と共に鼓室後方の myxomatös な胎生組織で充たされた骨腔も拡大し、新生児では側頭骨内の迷路殻を囲む部分に広く拡大しており、myxomatös な組織内には将来蜂窠壁となる可き骨梁 Balken が多数散在して見られ、胎生組織腔の中心部には含気腔の侵入が見られる。この時期では蜂窠の上皮下組織は非常に厚く、胎生組織で充たされている。この組織は發育と共に、次第に成熟し、線維化すると共に吸収されて縮小してくる。同時に骨梁においては破骨細胞による窩状吸収 lacunäre Resorption が見られる。特に外皮質に向つた方向の骨梁の内側に著明である。他方吸収部の反側の骨梁では骨の増殖も盛んに認められ、窩状吸収による吸収部位へは結合織の侵入が見られ、これに伴つて上皮細胞は陥凹し、空腔あるいは空腔となるべき間隙の拡大が行われる。かくして蜂窠の拡大及び改変は求心性、遠心性に行われ、mucoperiostal な上皮をもつ中耳蜂窠が完成される。これが所謂「含気化機転」である。この含気化機転に伴つて現れる組織反応が所謂「含気化浸潤」、即ち新生児及び胎生末期に著明にみられる炎症様の細胞浸潤である。これは Aschoff により“Fremdkörperotitis”として紹介され、又 Wittmack により“latente Säuglingsotitis”と呼ばれていたものである。この異物の刺激原としては羊水の内容物が考えられていた。しかしこれは重大な誤謬であつて、後藤教授門下の一連の研究によつて、この炎症様細胞浸潤は全く生理的なものであり、含気化活動を現わしている組織反応であり、又その含気化過程における中間的物質の吸収機転であり、骨含気腔或立上の特異なる現象であるとしている。

上述の含気化機転及び含気化浸潤は胎生末期より青春前期頃まで、即ち第2發育期までが最も旺盛であつて、この時期までに蜂窠の形態が完成される。それ以後の組織の活動は緩慢であるが、終生に亘つて行われ個人特有の蜂窠の構成がみられるものであるとした。これ等に就ての詳細は関係文献を参考にされ度い。

鳥類の中耳蜂窠に就ては、1939年、指宿は鳥類は極めて良好に發育した多数の蜂窠を有し、人類の乳嘴蜂窠系統と酷似していると述べている。教室の柳野によ

ば、鶏における Pn. の形成は極めて速かにして、孵化後6時間では殆んど完成の域にあるため、Pn. 形成の初期の状態を観察するためには、孵化前に遡らなければならないと述べている。

鳥類の中耳蜂窠の發育に就ては、山下の鳩における詳細な研究がある。それに依ると、孵化前24時間においては、鳩の胎仔の頭蓋は殆んど軟骨であつて、鼓室及びその副室（第1、第2、第3副室）が形成せられているだけであつて蜂窠の形成は認められない。そして鼓室及びその副室は頭蓋の大いさに比して非常に大きい。鼓室粘膜は外下部において、一部重層扁平上皮を認めるが、おゝむね単層の扁平あるいは骰子状細胞で被覆せられ、また副室粘膜は単層扁平上皮で被われ、何れも上皮下結合織は厚く、多数の小血管の存在を認める。この頃から急速に蜂窠形成が行われるのであつて、即ち頭蓋各部より較骨の化骨が開始せられ、時日の経過と共に周囲軟骨内に進展する。これに平行して蜂窠はその既化骨部に各副室・中耳腔間及び耳管間を基点として漸次形成せられる。即ち化骨により形成せられた海綿様骨質は粘膜下に接した骨梁がところどころにおいて、破骨細胞により破壊吸収せられて消失し、次で粘膜下結合織は髓腔内に侵入しきたり、固有髓細胞は漸次退行を始め、終に全く線維髓を形成するようになる。その後再び線維髓も吸収せられ、粘膜は髓腔内に没入しきたり、副室表面は種々なる形態の嚢入あるいは小空洞を形成し、遺残骨梁部は副室内に突出する。かくして各髓腔は順次線維髓を形成すると共に、空洞即ち蜂窠の数を増すのである。かくの如く蜂窠は孵化後時日の経過ととも化骨の進展に平行して、既化骨部より次第に形成せられ、三半規管鼓腹部は孵化後12日目に全く蜂窠をもつて圍繞せられ、第1、第2、第3副室からの各蜂窠は互に癒合し交通し、30日目に至り各蜂窠群はほぼ完成せられ、名蜂窠壁表面は骨膜とも粘膜とも判別困難な mucoperiostal な上皮で被覆せられるようになる。しかしこの時期では蜂窠壁はなお厚く、海綿様骨質の性状を有するものも各所に見られ、且各蜂窠壁には少量の線維髓の遺残附着するのを認める。爾後蜂窠の形成は漸次行われて、中耳蜂窠の拡大と共に蜂窠壁骨質の硬度を増し、骨壁は菲薄となり含気性が増大される。孵化後10カ月の鶏の中耳蜂窠では線維髓もすべて消失し、蜂窠壁は全く菲薄となり、頭蓋骨の大部分は含気性蜂窠となる。

以上より鳥類の中耳蜂窠の發育を人類のそれに比較するとき、その蜂窠の含気化機転は人類の含気化機転によ

く似ており同一の過程において行われるのであるが、人類においては、新生児の側頭骨は既に海綿様骨質の性状を有し、将来含気化されるべき部分が胎生組織で充たされているのに対して、鳥類では孵化直後においては、頭蓋骨は大部分軟骨であり、軟骨組織が化骨されて海綿様骨質となり始めて蜂窠形成が行われ、線維髄腔の部分が極めて少い点是人类とはやゝ趣を異にしている。蜂窠はその発生起部より次第に外周に向つて発育すると共に、蜂窠の隔壁においても含気化機転が行われるが、求心性の発育の認められない点是人类の場合と異なる。

III. 研究方法

先づこの研究の目的に適するように、加圧及び減圧用の0.8立方メートルのタンクを作製した(写真1, 図1)。

写真 1

実験動物として鶏の雛(雄)を用いた。即ち雛は孵化後7日目のものを対照群、加圧群及び減圧群の3群に分け、夫々20羽, 30羽, 30羽計80羽を用いた。

加圧群には表1のように、タンク内を1気圧(水深

図1 実験用加圧及び減圧タンク模型図

- ① 加圧・減圧タンク ② コンプレッサー兼真空ポンプ ③ モートル ④ エアータンク
- ⑤ 空気清浄器 ⑥ 圧力調節器 ⑦ 調節ハンドル ⑧ 真空計 ⑨ 安全弁
- ⑩ 換気用コック ⑪ 加圧・減圧切換用三方コック ⑫ 加圧・減圧切換用三方コック
- ⑬ 空気清浄器 ⑭ 安全弁 ⑮ 圧力計 ⑯ 圧力計

10m に相当する) 加圧した環境に夫々30分, 60分, 120分入れた。4日目からは2気圧(水深20mに相当する), 7日目からは3気圧(水深30mに相当する)のタンク内に入れ, 10日目からは毎日3気圧のタンク内に2時間入れた。加圧の方法として、急激なる圧の変化に伴う諸種の障害、特に squeeze を避けるために、大気圧より3気圧加圧する場合には20分かけて階段状に徐々に上昇せしめ、又大気圧に下降せしめるときも、同様に徐々に下つた。

加圧3気圧の場合、モートルに装置してある自動調節器により、エアータンク内の圧が4気圧に上ると、自動的に電流が遮断されてモートルが停止し、実験用タンク内圧が3気圧より以上に強く上昇することを防ぎ、3気圧に下降すると再び自動的にモートルが作動するように作られてある。従つて圧力調節器のハンドルを適宜の位置に廻し、実験用タンク内の圧を3気圧に調節すると、所要の時間内は3気圧を持続することができる。酸素欠乏、温度上昇をできるだけ防ぐため排気口より所定の圧の下で、持続的に換気が行われるように作られてある。

低圧群も表1のごとく徐々に減圧せしめ、10日目か

ら毎日2時間、300mmHg (5000m の上空に相当する) の減圧タンク内に入れた。低圧の場合も階段状に減圧して、常圧に復せしめる までには20分を要するようにした。

表 1

	加圧群	タンク内に入れた時間	減圧群
1日目	1気圧	30分	~100mmHg
2日目	"	60分	"
3日目	"	120分	"
4日目	2気圧	30分	~200mmHg
5日目	"	60分	"
6日目	"	60分	"
7日目	3気圧	30分	~300mmHg
8日目	"	60分	"
9日目	"	60分	"
10日目	"	120分	"

鶏の飼養には混合飼料、野菜及び水を与えた。孵化後30日目までは1日5回、それ以後は1日3回の割合とした。実験開始後30日目の雛を、対照群10羽、加圧及び減圧群を各15羽づゝ断頭、残りの雛を60日目に断頭し、ホルマリン固定、ホルマリン加硝酸脱灰あるいは塩酸による電気脱灰法にて脱灰を行い、パラフィン及びツエロイデン包埋にて外耳道にはゞ垂直なる連続切片を作製、ヘマトキシリン・エオジン重染色、一部ワンギーソン、マロリー染色を行った。

IV. 研究成績

1) 肉眼的所見

a) 発育 全身的发育に就ては、加圧及び減圧30回の雛も、加圧及び減圧60回の雛も共に、対照群と比較して全く差異を認めなかった。写真(2)は加圧及び減圧60回の雛と孵化後67日目の対照群の雛の発育を示したもので、肉眼的に差異を認め得ない。

写真 2

対照 (孵化後 67 日)

加圧 60 回 (孵化後 67 日)

減圧 60 回 (孵化後 67 日)

写真 3

頭蓋の発育に就ても、写真(3)のごとく肉眼的に対照群と実験群との間に、殆んど差異を認めない。しかし頭蓋骨の横径、縦径を測定してみると、表2のごとく実験群に軽度なる発育障害が認められる。横径は外耳道の上縁を通り眼窩の後縁と頭蓋骨の後縁とを水平線で結んだ長さであり、縦径は外耳道の後縁を通り頭蓋骨の上縁と下縁を垂直に結んだ長さを選んだ。

b) 中耳蜂窠及び個々の蜂窠の大きさ

論文附図〔1〕はそれぞれ実験開始後30日目、60日目の実験群及びその対照群の中耳蜂窠を示したものであ

表 2

対 照 群				加 圧 群				減 圧 群			
蜂窠の番号	孵化後 の日数	横径 (mm)	縦径 (mm)	蜂窠の番号	孵化後 の日数	横径 (mm)	縦径 (mm)	蜂窠の番号	孵化後 の日数	横径 (mm)	縦径 (mm)
1	37 ⁰	17	24	21	37 ⁰	17	24	51	37 ⁰	16	23
2	"	17	24	23	"	16	23	52	"	17	24
4	"	16	23	24	"	17	23	55	"	16	23
5	"	16	23	26	"	16	23	56	"	16	23
7	"	17	24	28	"	16	23	58	"	16	23
9	"	17	24	29	"	17	24	59	"	16	23
10	"	17	24	31	"	16	23	61	"	17	24
12	67 ⁰	21	27	38	67 ⁰	19	26	65	67 ⁰	18	25
13	"	21	27	39	"	20	27	67	"	19	26
15	"	20	26	40	"	20	26	68	"	20	26
16	"	20	27	41	"	20	27	69	"	19	26
17	"	21	27	43	"	20	26	71	"	20	27
18	"	20	26	45	"	19	26	72	"	20	26
19	"	20	26	46	"	19	26	73	"	19	26
20	"	21	27	48	"	20	27	75	"	19	26

る。これは外耳道には直角なる垂直連続切片で、骨性外耳道入口部よりほぼ同一なる距離にある断面の中耳蜂窠である。これをみると、実験群も対照群も頭蓋の發育が肉眼的に殆んど変化を認めないのに、中耳蜂窠の大きさは肉眼的に著明な変化を認めるのであつて、加圧30回、60回の雛の中耳蜂窠の大きさはそれぞれ対照群のそれに比して小であり、又個々の蜂窠の大きさも小である。しかし加圧群と減圧群との間には全く差異を認めない。

c) 蜂窠隔壁の厚さ

附図〔Ⅱ〕に示されているごとく、実験群即ち加圧群、減圧群は対照群に比し、蜂窠壁の骨梁が著明に肥厚している。又頭蓋表面の骨の肥厚も著明である。対照群において孵化後67日目の蜂窠隔壁の厚さは、孵化後37日目のそれに比して著明に菲薄になつてはいるが、実験群においてはこの同時期の間に殆んど差異が認め得られないのみでなく、加圧群と減圧群との間にも差異を認めない。

d) 鼓 膜

加圧群の鼓膜を減圧群のそれに比較するに、その位置は両群の間に殆んど変化はなく、又対照との間にも変化なく、著明な鼓膜の陥凹、凸出は認められず、又鼓膜の破裂も見られなかつた。

小 括:

実験群と対照群との間に認められる著明な変化は、肉眼的に頭蓋の發育に変化を認めないにも拘らず、実験群が中耳蜂窠の広り、個々の蜂窠の大きさが小であり、且骨梁の著明なる肥厚が認められた。即ち著明な發育抑制が認められた。実験30回の群と実験60回の群との間には著明な差異が認められなかつた。対照群では蜂窠隔壁は孵化後37日から67日に及んで著しく菲薄になることが認められたが、実験群では、変化は既に30回加圧群(37日目)のものにおいて著明に現れ、それ以降の加圧

に対する変化は肉眼的には著明に認められていない。

2) 組織学的所見

孵化後7日目の中耳蜂窠の發育をみると、附図〔Ⅲ〕に見られるごとく中耳蜂窠の形態はほぼ形成されているが、軟骨組織が諸所にみられ、中耳腔の周囲は未だ軟骨にて囲まれている。又蜂窠の周辺部では未気胞化の原始髓腔及び線維髓が多数に認められるのであつて、上皮下に接した線維髓のところでは、破骨細胞による骨の窩状吸収、毛細管の増殖及び少量の円形細胞浸潤が認められる。

孵化後37日目の雛の中耳蜂窠の形態は殆んど完成されているが、未だ中耳腔の周囲には軟骨組織が認められ、化骨とともに蜂窠の形成が見られる。蜂窠の周辺部では僅かに線維髓が認められるに過ぎない。

孵化後67日目の雛の中耳蜂窠は完成されており、中耳腔の周囲の軟骨も殆んど化骨され、含気化されている。蜂窠の周辺部にも未気胞化の骨髓組織は全く認められない。

孵化後10カ月の鶏の中耳蜂窠は、含気化が周辺とともに蜂窠隔壁間においても行われ、高度の含気化が示されている(附図〔Ⅲ〕)。

a) 中耳蜂窠の發育度

先づ加圧30回の雛の中耳蜂窠の發育度を対照群のそれに比較してみると、大きさは前述したごとくであり、軟骨の化骨状態は、対照群では中耳腔の周囲以外には軟骨を認めないが、加圧群ではその他の部分にもなお僅かな軟骨組織が認められ、未気胞化の原始髓腔及び線維髓がより多く認められる。加圧60回の雛においても、対照群では中耳腔周囲に殆んど軟骨は認められないが、加圧群ではなほ多くの軟骨組織が認められる。又蜂窠の周辺部に線維髓が認められ、減圧群においても全く同様であつた(附図〔Ⅲ、Ⅳ〕)。

b) 上 皮

正常な蜂窠ではその初期にはやや厚い扁平上皮細胞あるいは骰子状の上皮で被われているが、含気化の進むに従つて、極めて扁平は上皮細胞となるのであつて、対照群ではこの状態をよく示し、上皮細胞は極めて扁平で上皮組織は極めて薄く、所謂 mucoperiosteal の上皮と云われる状態を示している。実験群では上皮細胞はいずれもその高さを増し、ところによつては骰子状の上皮細胞のまゝである。上皮から見ると上皮細胞の成育抑制の状態である。

c) 上皮下組織

孵化後7日目の中耳蜂窠では、含気化された蜂窩壁の上皮は上皮下組織が吸収されて既に mucoperiostal の上皮となっているが、その周縁部にはなほ僅かな線維髄が見られ、上皮下にも 幼若な結合組織の厚い層が存在し、その部分では骨梁の窩状吸収、毛細管の増殖及び少量の円形細胞浸潤が認められる。

孵化後37日目及び67日目の対照群の中耳蜂窠では、上皮下組織は薄く、広く mucoperiostal の上皮となっているが、中耳蜂窠の周縁部の蜂窠隔壁においてはやゝ厚い上皮下組織を有する部分も見られる。孵化後10カ月の鶏では、蜂窠の上皮は極めて薄く上皮下組織層は殆んど認め得られない程度である(附図〔Ⅲ〕)。

加圧群ではいずれも上皮下結合組織の肥厚が認められ、加圧60回の雛では極めて著明である。上皮下結合組織中には毛細管の増殖が認められ、又骨梁に接して造骨細胞の増殖が認められる。又時に軽度の出血も認められた。

減圧群も加圧群とほぼ同様の所見を呈し、差異を認め得られなかつた(附図〔Ⅴ〕)。

d) 蜂窠隔壁の厚さ

対照群において、蜂窩隔壁になほ皮下結合組織を有するところでは、緩慢ではあるが含気化が行われており、即ち骨の窩状吸収部には結合組織の陥入が行われ、それと共に上皮も陥入し、骨梁の菲薄をきたすと共に蜂窠内腔の拡大が起つている。従つて孵化後67日目の雛の蜂窠隔壁は37日目のそれよりも更に厚さを減じており、各蜂窠腔も拡大している。

加圧群では骨梁の厚さは対照群のそれに比して著明に肥厚しており、又頭蓋表面の骨も著明に肥厚している。加圧30回と加圧60回の雛の骨梁を比較しても、その間は殆んど差異は認め得られないが、この点は対照群と著しく異つている。

減圧群においても全く同様の所見が認められ、両群の間には差異は認められ得なかつた(附図〔Ⅱ〕)。

e) 骨の増殖

対照群において、中耳蜂窠の周縁部をみると、薄い上皮下組織内に骨に接して少数の造骨細胞が認められ、僅かではあるが骨の増殖を示している。中耳蜂窠を囲む頭蓋骨においては、骨膜下に造骨細胞の層があり、盛んなる骨の増殖を示している。

実験群においては、対照群に比して造骨細胞の増殖が著明であり、蜂窠隔壁においても、中耳蜂窠を囲む頭蓋骨においても明らかに骨の肥厚が認められる。次に実験群における実験30回のもものと実験60回のを比較し

て、後者に肥厚がより強く認められない点は一見不審に思われるが、これは、対照群に比すれば僅かではあるが、骨の吸収が行われているためであると思われる。

この骨梁の肥厚している状態を发育の抑制と見做すときは、30回加圧時期の状態よりも60回加圧の時の方がより強い发育抑制状態を示さないことは当然の現象である。この发育上の状態は同時期の対照と比較してはじめて意義があるのであつて、60回加圧即ち孵化67日目の加圧例を67日目の正常群と比較するとその間の差異が30回加圧例とその対照群との間より著明なことが知られる。

f) 骨の吸収

対照群では、周縁部の上皮下組織の存在する蜂窠壁において、僅かではあるが窩状吸収が行われており、腔内に少数の円形細胞浸潤が認められる。特に頭蓋骨の蜂窠に面した上皮下には、骨の窩状部に菱形の破骨細胞が認められ、盛んなる窩状吸収像を示しており、上皮下にあるいは腔内に遊離骨片が認められ、その周囲には著明な細胞浸潤が認められる(附図〔Ⅳ〕)。

実験群においては、著明な所見は蜂窠の上皮下に結合組織の著明な増殖が認められるが、細胞の浸潤は極めて弱く、頭蓋骨の皮質に向つている蜂窩骨梁にも、窩状部が少なく破骨細胞による骨吸収の緩慢であることを示している。盛んなる含気化機転の産成物と見られる遊離骨片も認められない。これ等の所見は加圧群と減圧群との間には差異は認められない。

小 括:

実験群と対照群とを比較して認められる著明な変化は、蜂窠の上皮細胞層の高いこと、上皮下結合組織の増殖肥厚、造骨細胞の増殖を伴つた骨梁の肥厚及び含気化機転、これに伴う含気化浸潤の緩慢さとその乏しさとである。又対照群では既に軟骨組織の存在しない部位に、実験群ではなほ軟骨の残存が認められ、対照群に見られたような遊離骨片の存在も見られない。加圧群も減圧群も同様の変化を示し、差異を認めることはできなかつた。これ等の現象は一言にして云えば蜂窠发育の著しい遅延又は抑制であつて、Pneumatisations-hemmung の所見に相当する。しかもこれ等の変化が減圧・加圧の両群ともに認められる点は予測しなかつた知見である。自然の圧の変動という因子に対する反応の仕方は一つであることを示している。

V. 総括並に考按

Pn-hemmung の成因に就て

人類に見られる中耳蜂窠の發育抑制 Pn.-hemmung なる特異なる現象の成因に就て今日迄種々論ぜられてきたが、これを文献的に考察してみると、二つの學説に分ける事ができる。その第一は遺伝的因子を主因とする先天説である。即ち Schwarz u. Eysel (1873), Wildermuth (1887), Bezold (1882), Mouret (1913) は Pn.-hemmung なる現象は、個人的差異による遺伝的なものと考へた。

Wagner (1921) は Pn.-hemmung の原因は、頭蓋骨の硬軟によるとし、又 Turner u. Porter (1922) は人種的研究より頭蓋骨の型体に就て、長径頭顱に Pn.-hemmung が多いことを指摘した。

後藤教授門下の一連の研究では、Pn. の型体が全く遺伝体質的なものであることをレ線學的に又組織學的に証明した。教室の光増は家系的調査より Pn.-hemmung の遺伝型式に就て研究し、Pn. の型体は遺伝的關係を有し、抑制因子は優性因子であることを明らかにした。

Albrecht, Schwarz 等は双生児の研究より Pn.-hemmung は遺伝因子によることを発表した。本邦においても田中 (1926), 下田 (1932), 岡崎 (1936) 等はこの説を支持している。

第二は炎症を主因とした後天説であつて、これに就ては Schüller (1928), Van Gilse (1926), Albrecht, Grahe (1928) 等の研究があるが、後天説の主体をなすものは Wittmaack の炎症説である。Aschoff (1897) が新生児の中耳蜂窠の粘膜に 85% に円形細胞浸潤を認め、その後 Wittmaack (1918) はこの円形細胞の浸潤を羊水による異物性炎症とし、これに latente Säuglings-otitis と名付け、これを Pn.-hemmung の原因であるとした。由來炎症と Pn.-hemmung とは密接な因果關係を持つものと考えられることとなり、Pn.-hemmung は炎症によつてくるものであるとの説が現在も広く信ぜられている。しかしながら後藤教授門下の一連の研究により、この新生児に見られる炎症様所見は生理的なものであり、含気化機転に伴つて起る含気化浸潤即ち含気化による骨壁の吸収破壊と破壊物の融解、貧食のための反応であるとした。従つて後藤教授の Pn.-lehre から見れば、Wittmaack の炎症説は当たらないが、Aschoff 以來の異物性の炎症という意味は肯定することができる。但し、この場合の異物となるものは羊水分内容物でなくして、含気化のための組織の破壊吸収による成産物自身である点が異つている。

炎症が Pn.-hemmung の原因とされた理由は、慢性

の炎症によつて蜂窠の骨壁は増殖し、更に進んで蜂窠を埋めつくすものであるとするのである。教室の重野は慢性中耳炎の患者に就て、発病後 10 年以下、20 年以下、20 年以上の炎症持続の 3 群に分けて、これを組織學的に觀察し、中耳蜂窠の骨壁は sklerosierung を起すことなく、粘膜の変化とも關係なく、緩慢であるが個性的、生理的な変化を営むものであるとしている。従つて現在、中耳蜂窠の發育抑制は、主として遺伝的因子によるものとの考が信じられている。

しかしながら最近、既に前掲の後藤、柴田の潜水漁夫における頭部含気腔の変化についての研究で、潜水漁夫の中耳蜂窠のレ線像で Pn.-hemmung が極めて多い。即ち抑制型が 82%、良好型が 18% であつた。教室における一般人に就て行つた統計では抑制型が 14.5%、良好型が 85.5% であり、一般人とは全く逆の關係を示している。又隔壁の著明な肥厚が認められ、蜂窠發育良好なものにおいてはその外廓を連ねる限界線 Grenzlinie の肥厚が極めて著明である。これらの所見から裸潜漁夫に見られる中耳蜂窠の Pn.-hemmung の状態は單に遺伝因子のみによるとは考え難く、水圧が關係するのではないかと述べていたが、この推測は本実験の結果からその妥当なことが肯定された。

中耳蜂窠發育抑制 Pn.-hemmung とは

Pn.-hemmung を理解するためには、正常蜂窠の發育過程を知ることが必要である。これに就ては既に述べた。即ち中耳蜂窠の發育機転は基本的空腔形成機転と蜂窠形成機転に依つて成り立つており、Pn. の良否、その個人差は、この基本的空腔の大小と蜂窠形成の強弱によつて決まるものである。又中耳蜂窠の發育は基本的空腔形成期、蜂窠完成期、含気化充実期の 3 期に分けることができるのであつて、Pn.-hemmung は發育の停止又は緩慢さが主として第二發育期より起つたものである。

これを組織學的にみるならば、Ideal の Pn. を持つものでは上皮下の myxomatöses Gewebe が吸収されて上皮下層が縮小すると共に、骨梁においては盛んなる窩状吸収が行われ、窩状吸収部位へは結合組織の侵入が見られ、これに伴つて上皮細胞は陥入し、空腔の拡大が行われる。又吸収部の反側には、造骨細胞の盛んなる増殖を示し、蜂窠の發育は遠心性・求心性及び蜂窠間性に行われる。これが所謂「含気化機転」であり、これに伴つてみられる炎症様細胞浸潤がわれわれが仮に「含気化性の浸潤」と呼んでいたものである。この「含気化機転」の停止又は緩慢さが Pn.-hemmung である。

本研究成績の批判

鶏における中耳の Pn. は極めて良好であり、人類の中耳蜂窠の発育によく似ているのであつて、山下に依れば、鳥類は孵化 24 時間前において既に基本的空腔は形成され、人類と異り将来、蜂窠となるべき部位は軟骨であり、中耳腔及び副室は頭蓋の大いさに比して極めて大きく、この時期迄が人類の第 1 発育期に相当するものと考えられる。この頃から化骨現象が急速に進み、化骨により形成された骨梁はところどころ破骨細胞により破壊吸収せられるとともに他方又増殖が認められる。胎生組織内に散在する島嶼状の骨梁片は互に融合してそのうちに線維髄様の腔を作る。一部には又骨髄が吸収せられて線維髄となつている部分も存在する。次に線維髄もやがて吸収されて mucoperiosteal な上皮で被われた蜂窠形成を見るのである。孵化後 7 日目、37 日目、67 日目の中耳蜂窠の発育をみると、7 日目より既に蜂窠の形態は見られるが、軟骨も全く化骨された中耳蜂窠の完成された状態は 67 日目の雛に見られる。それ以後は緩慢ではあるが含気化が行われ、周縁に向つて遠心性に又蜂窠の隔壁間において蜂窠間性に蜂窠の拡大、増大が行われる。この点から孵化後 67 日頃までが人類の第 2 発育期に相当するものと考えられる。

本実験は丁度第 2 発育期に加圧・減圧が加えられたものである。

孵化後 37 日目の対照群では中耳腔の周囲に多くの軟骨が認められ、又蜂窠の周辺部に僅かな原始髄腔、線維髄が認められ、化骨現象・蜂窠形成が見られる。孵化後 67 日目の対照群では中耳腔の周囲に残存していた軟骨が殆んど化骨、含気化されており、蜂窠の周辺部にはもはや原始髄腔、線維髄は認められない。

これに対して、加圧及び減圧 30 回の雛の中耳蜂窠では、中耳腔の周囲は勿論その他の部位にも軟骨を認め、多くの原始髄腔、線維髄が認められる。又加圧及び減圧 60 回の雛でも中耳腔の周囲には多くの軟骨を認め、化骨、含気化が行われている。これは明らかに含気化発育の抑制を示すものである。

次に対照群においては蜂窠の周縁部特に頭蓋表面に相對する蜂窠の上皮下に破骨細胞による窩状吸収が盛んに認められ、ところにより上皮、腔内に遊離骨片及び著明な細胞浸潤が認められた。実験群では窩状吸収像、円形細胞浸潤乏しく、遊離骨片は認められていない。

従つて実験群に認められた中耳蜂窠及び個々の蜂窠の大いさの小さいことは含気化機転の遅延を示すものであ

り、含気化抑制の所見である。

又蜂窠隔壁及び頭蓋表面の骨の肥厚は主として胎生結合組織細胞の吸収されずにそのまゝの成熟又は化骨によるものであつて、広く見ると含気化の発育抑制と見られるが、又これは圧に対する骨の反応的肥厚も加つていると見なければならない。

しかも加圧も減圧も中耳蜂窠の発育に及ぼす変化は全く同一であり、著明な発育抑制の認められることが明らかにされた。

VI. 結 論

中耳蜂窠の発育抑制 (Pn.-hemmung) は、主として遺伝的因子によるものとの考えは、現在広く信じられている。慢性炎症によつて Pn.-hemmung をきたさないことは、教室の重野によつて確められた。圧の変化が中耳蜂窠の発育にいかなる変化をきたすかに就ては、先に後藤教授、柴田助教授の潜水漁夫に就いての研究がある。著者は高圧・低圧環境が中耳蜂窠の発育にいかん作用するかを加圧・減圧用タンク・鶏の雛を用いて実験的研究を行い、次のことを結論する事ができた。

1. 高圧環境も低圧環境も中耳蜂窠の発育に抑制的に働いた。
2. 高圧も低圧も刺激としては同一であつた。

VII. 主要文献

- 1) 後藤: Pneumatisation の成立とその臨床, 日耳鼻, 56 巻, 12 号, 昭 28.
- 2) 柳野: 中耳蜂窠発育初期に見られる炎症様所見に関する研究, 日耳鼻, 56 巻, 11 号, 昭 28.
- 3) 山下: 中耳蜂窠の発育に関する研究, 耳鼻臨, 46 巻, 増刊号, 439, 昭 28.
- 4) 後藤(敏), 柴田: 潜水漁夫に見られる頭部含気腔及び肺の変化に就て, 日耳鼻, 60 巻, 4 号, 昭 32.
- 5) 小林: 中耳 Pneumatisation の生後の発育に関する研究, 日耳鼻, 57 巻, 2 号, 昭 29.
- 6) 重野: 慢性中耳炎と Pneumatisations-hemmung の関係に就いての組織学的研究, 日耳鼻, 58 巻, 5 号, 昭 30.
- 7) 光増: 中耳 Pneumatisation の遺伝型式に就て, 日耳鼻, 58 巻, 4 号, 昭 30.
- 8) 後藤: Sauglingsotitis に就いて, 耳鼻咽, 25 巻, 3 号, 昭 28.
- 9) 土田: 所謂潜在性耳炎に就いて, 耳鼻咽, 25 巻, 3 号, 昭 28.
- 10) 土田, 寺山: 側頭蜂窠, 副鼻腔及び骨體腔の關係, 耳鼻臨, 45 巻, 9 号, 昭 27.
- 11) 後藤, 柳野: 成人中耳蜂窠の含気化機転と Kachexie 患者の中耳蜂窠内に見らるゝ特異なる所見, 日耳鼻 58 巻, 8 号, 昭 30.
- 12) 山野: 副鼻腔発育機能とその初期に見られる潜在性炎症に

様所見, 日耳鼻, 56 卷, 8 号, 昭 28. 13) 柴田: 節骨蜂窠再生の実験的研究, 日耳鼻, 56 卷, 10 号, 昭 28. 14) 橋本, 稗田, 江崎: 家鶏上腕骨々髓における含気髓の発生について, 久留米医会誌, 15 卷, 11 号, 昭 27. 15) 栗田: 中耳的窠發育の実験的研究 (I), 日耳鼻, 59 卷, 4 号, 昭 31. 16) 栗田: 中耳蜂窠發育の実験研究 (II), 日耳鼻, 60 卷, 2 号, 昭 32. 17) 下田: 顴骨の組織解剖学的研究, 日耳鼻, 38 卷, 1 号, 昭 7. 18) 梨本: 高気圧による障碍, 医学のあゆみ, 24 卷, 2 号, 3 号, 昭 32. 19) 緒方: 高圧の生体に及ぼす影響, 熊本医誌, 14 卷, 1331~1342, 昭 13. 20) 日下, 山田, 郷本: 航空性中耳炎に就て, 日耳鼻, 58 卷, 4 号, 昭 30. 21) 佐藤, 仙石, 三沢: 航空性副鼻腔炎に就て, 耳鼻咽, 28 卷, 13 号, 昭 31. 22) 久保, 吉田:

Jet 機塔乗員の耳及び副鼻腔障碍に就て, 日耳鼻, 61 卷, 臨時号, 昭 33. 23) 佐藤, 菊地, 小手, 武田, 酒井: 急激な減圧の聴器その他に及ぼす影響(潜函病)の研究, 日耳鼻, 61 卷, 臨時号, 昭 33. 24) *Preysing*: Otitis media der Sauglinge, Arch. f. Ohrenheilk., Bd. 61, 1904. 25) *Marx H.*: Zur Frage der Bedeutung der Mittelohrentzündung des frühesten Kindesalters für sprter, Arch. f. O.N.u.K.-Heilk., Bd. 126, 1930. 26) *Aschoff*: Die Otitis media neonatorum, Zeitschr. f. Ohrenheilk., Bd. 31, 1897. 27) *Wittmaack*: Über die normale u. pathologische Pneumatization des Schläfenbein, Jena 1918.

(原稿到着＝昭和 34. 1. 30 日)

小川論文附図(1)

対照群、加圧群及び減圧群における中耳蜂窠の発育状況

1. 対照 (孵化後 37 日)

2. 対照 (孵化後 67 日)

3. 加圧 30 回 (孵化後 37 日)

4. 加圧 60 回 (孵化後 67 日)

5. 減圧 30 回 (孵化後 37 日)

6. 減圧 60 回 (孵化後 67 日)

小川論文附図(Ⅰ)

対照群、加圧群及び減圧群における蜂窠隔壁の上皮及び骨梁の状況

1. 対照 (孵化後 37 日)

2. 対照 (孵化後 67 日)

3. 加圧 30 回 (孵化後 37 日)

4. 加圧 60 回 (孵化後 67 日)

5. 減圧 30 回 (孵化後 37 日)

6. 減圧 60 回 (孵化後 67 日)

小 川 論 文 附 図 (Ⅲ)

1. 孵化後7日の雛の中耳腔を示す

2. (1)の組織所見 頭蓋表面における原始髄腔を示す

3. 孵化後10カ月の鶏の中耳腔を示す

4. (3)の組織所見 骨髓組織は全く認められない

5. 加圧30回(孵化後37日)の雛の頭蓋表面における線維化されつつある原始髄腔を示す

6. 減圧30回(孵化後37日)の雛の頭蓋表面における線維髄を示す

小 川 論 文 附 図 (Ⅳ)

7. 加圧30回(孵化後37日)の雛の蜂窠内における化骨現象の遅延した軟骨組織の部分を示す

8. 加圧30回(孵化後37日)の雛の蜂窠隣接の線維髄の含気化されつゝある所見を示す

9. 対照(孵化後37日)の雛の蜂窠周縁部における幼若な上皮下結合織の残存を示す

10. 対照(孵化後37日)の雛の蜂窠腔内における遊離骨片と細胞浸潤を示す

11. 対照(孵化後67日)の雛の頭蓋表面における蜂窠に面する上皮下に窩状吸収破骨細胞及び遊離骨片を示す

12. (11)の強拡大
矢印は窩状吸収部における破骨細胞を示す

小 川 論 文 附 図 (V)

13. 加圧 60 回（孵化後 67 日）の雛の蜂窠における上皮組織の肥厚及び骨梁に接する造骨細胞の増殖を示す

14. 減圧 60 回（孵化後 67 日）の雛の蜂窠における軟骨組織の残存及び遅延せる化骨含気化機転を示す