TRANSPLANTATION OF LARYNGEAL PAPILLOMA TO CHICK EMBRYO AND ITS CAUSATIVE AGENT

By
M. ITO

*From the Department of Oto-Rhino-Laryngology, Keio University School of Medicine
(Prof. T. Nishihata)*

From the Department of Viral Rickettsial Diseases, The Kitazato Institute for Infectious Diseases (Chief. S. Kasahara)

Though Ullmann and Ishikawa had demonstrated the virus which produced laryngeal papillomas, the virus theory of the development of laryngeal papilloma has not generally been accepted because there has been no further demonstration by others. An attempt was made to demonstrate the causative agent of laryngeal papillomas by the following experiments.

Thirteen samples were obtained from 5 patients with laryngeal papillomas and inoculated on the chorioallantoic membrane of 7~8day old chick embryo.

A) The fresh specimens (within 2 hours after they were obtained) were inoculated on the chorioallantoic membrane and 7 cases out of 12 developed pocks. A passage method was performed on these and the pock was found in 1 case out of 3 cases.

B) The emulsion of the fresh specimens was prepared grinding in the mortar, filtered through the membrane filter and then inoculated. The pock was found in one case out of 2 cases. A passage method was performed and the pock was found in 1 case.

C) The material frozen (-20°C) and kept (7~53 days) in the refrigerator was planted. The pock was found in 2 cases out of 3 cases.

D) No pock was found on chorioallantoic membrane when the material was boiled in Hank's solution (100°C 60 minutes) prior to the inoculation.

Above mentioned results suggest that filtrable agent plays an important role in the development of laryngeal papillomas.

喉頭乳嘴腫の孵化鶏卵移植試験とその発生因子について

慶応義塾大学医学部耳鼻咽喉科教室 (西端驥一教授・小野譲客員教授)
北里研究所ウイルス・リケツチア部 (笠原四郎部長)

伊 藤 真
イ トウ マコト

人の喉頭乳嘴腫は喉頭良性腫瘍の一つであつて、我が国におけるその頻度は9.4%であり、(小野)^{12) 13)}、喉頭ポリープの83.3%に比すれば遙かに少いと言える。しかしながら、この乳嘴腫は幼少児にも発生し各種の治療も効なく、増大蔓延の傾向をたどることがあり、又治療が奏効しても屢々再発の傾向があつて臨床的には悪性とも言われる所以である。

その原因についての学説は種々あつて、内因的因子と

しては、年齢・性別・遺伝関係・栄養状態・ホルモン・ビタミン・酵素などが挙げられており、外因的因子としては慢性機械的刺激・化学的刺激及び細菌・ウイルスによる感染が考えられている。

こゝに人喉頭乳嘴腫のウイルス説を文献的にみてみよう。この乳嘴腫が臨床的観察からウイルス性かも知れぬということは、すでに Boies, Kirchner, Wolff, Zalin, Holinger, Hajack が述べているが、これを実験的に研

究したのは Ullmann¹⁵⁾ である。彼は7才の少年から摘出した喉頭乳嚢腫の浸出液を人の腕部の皮膚に接種して新生物の発生を認めたほか、犬の腔粘膜へ移植して陽性成績を得、更に細菌濾過管をもつての濾過液をもつて、移植試験陽性成績を得て、喉頭乳嚢腫の発生因子はウィルス性であろうと論じた。

Findlay⁴⁾ は Ullmann の移植試験の結果を追認できなかったが、石川⁵⁾ は人及び犬の口腔粘膜に移植を行って陽性成績を得た。併し継代移植と濾過試験は陰性成績であった。

しかし、その後多くの研究者の報告はいずれも陰性であった。即ち Simeoni は人とウサギの腔粘膜において、Buratti は動物の腔粘膜・結膜・腹膜において移植陰性であった。また、Sangiovanni, Barretto, Gonzalo, Ogure Bjork, 三辺¹⁷⁾, Frugoni も移植陰性を報じた。

かくして、人喉頭乳嚢腫の移植株にその発生因子についての Ullmann のウィルス説は遺憾ながら追認されざる状態であった。しかるに近年 Holinger⁸⁾ がこの乳嚢腫にオーレオマイシンが奏効した経験に基いて再びウィルス説を提唱してから、人喉頭乳嚢腫の発生因子につきウィルスの面からも再検討すべきことが学界の趨勢になった。著者は先ず人喉頭乳嚢腫の実験動物株に孵化鶏卵への移植試験を企図し、その間に行つた実験成績からその発生因子がウィルス性であることを誘導せしめ得る結果を得たので、ここに報告したいと思う。

実験方法

1) 実験材料

慶応大学耳鼻科小野教授が気管支直達鏡により摘出された喉頭乳嚢腫を100単位/ccのペニシリン・100 γ /ccのストレプトマイシンを含む Hanks 液中に入れて研究室に持ち帰り、摘出後2時間以内に移植を行つた。乳嚢腫は5名の患者より13の材料を得た。

2) 移植並に接種方法

白色レグホンの6～8日孵化卵(主として8日卵)を用い、その漿尿膜上に接種を行つた。即ち6～8日卵の気室部の卵殻の一部を無菌的に取り除いた後、注射針にて漿尿膜と接する卵殻膜を漿尿膜の方は傷つけることなく卵殻膜のみ軽く切り口をつけ、その上に Hanks 液を2～3滴たらし卵殻膜と漿尿膜の間に、Hanks 液が浸み込むように卵殻膜のみを取り除く。露呈された漿尿膜上に特に大血管の走っている部分に患者より得られた乳嚢腫組織をメスにて微小片として1～2個のせた後、セロテープにて先にあけた卵殻の窓をふさぎ36°Cの孵卵器内

におさめる。約8日間培養後生存せる卵の漿尿膜を取り出し、斑点(Pock)の有無を調べる。継代には Pock を含むように漿尿膜を切り取り細切小片となし、あるいは乳剤にして次代の鶏卵に接種すると共に、一部は凍結保存(-20°C)し、残りは組織標本作製に供した。

実験成績

5名の乳嚢腫患者から13の材料を得て、実験を行つた。以下患者材料毎に実験成績を述べる。

第1例 西堀栄一 8 23才

発生部位 喉頭前連合(この患者は右足踝と左肘部に皮膚乳嚢腫があつた)。

1) 材料—1

7個の8日卵の漿尿膜上に接種し、内5個が事故死したが8日後まで生き残つた2個の内1個の卵の漿尿膜上に Pock を認めた。

2) 材料—2

8日卵6個を用いて実験を行つたが、Pock は全然認められなかつた。なおこの時の材料の一部を凍結保存(-20°C)し、10日後8日卵7個を用いて実験を行つたが Pock は全く認められなかつた。

第2例 ケリーハーマンド 8 7才

発生部位 喉頭後連合

1) 材料—1

8日卵7個を用い漿尿膜上に接種し、8日後まで生存した3個の内2個の卵の漿尿膜上に Pock を多数認めた。

Pock を含む漿尿膜の小片を細切し新しい8日卵7個の漿尿膜上に接種したが Pock は認められなかつた。又この Pock のできた漿尿膜の一部を凍結保存12日間の後、別の8日卵6個の漿尿膜上に接種したが、これにも Pock は認められなかつた。

2) 材料—2

7日卵7個を用いて実験を行い、8日後まで生存した4個の卵の内、3個の卵の漿尿膜上にそれぞれ多数の Pock を認めた。

第3例 佐々木悦代 9 2才

発生部位 左右声帯附近

1) 材料—1

8個の7日卵の漿尿膜上に接種し、8日後まで生存した5個の卵の内1個の卵の漿尿膜上に Pock を認めた。

2) 材料—2

7個の6日卵の漿尿膜上に接種を行い、9日後まで生存した5個の卵のいずれにも Pock を認めなかつた。

3) 材料—3

6個の8日卵の漿尿膜上に接種し8日後開卵したが Pock は認められなかった。

4) 材料—4

6個の7日卵を用い膜上接種を行つたが、Pock を認めることはできなかった。

5) 材料—5

8個の8日卵に膜上接種し、8日まで生存した6個の卵の内1個の卵の漿尿膜に Pock を認めた。

6) 材料—6

得られた材料を次の三通りに分けて実験を行つた。即ち (1) 一部はこれまでの実験の如くメスにて小片となし、12個の8日卵の漿尿膜上に、(2) 次の一部はメスにて小片となしたものを少量の Hanks 液中加入し、100°C 60分間加熱を行つた後、その小片を11個の8日卵の漿尿膜上に、(3) もう一つは Hanks 液を用いて乳剤としたものを、membrane filter (東洋濾紙製孔径 200~300 μ) をもつて濾過し、その濾液を13個の8日卵の漿尿膜上に接種した。

残った材料の一部は Hanks 液に入れ、他はグリセリン・リンゲル液中加入し凍結53日間保存後実験に供した。

三通りに分けて行つた実験につき先ず述べると毎常の実験の如くに行つた、(1) の場合においては8日後まで生存した9個の卵の漿尿膜に Pock は認められなかったが、2代・3代と継代された各代の卵の漿尿膜に Pock が認められた。加熱された材料を接種した (2) の場合においては Pock を認めることはできなかった。membrane filter を用いた (3) の場合、即ちその濾液の接種を受けた卵の漿尿膜では12個中1個の卵の漿尿膜に Pock を認め、更に2代・3代と継代された卵においては、Pock を示す卵の数を増すのが認められた。即ち2代目では8個の卵の内2個に、3代目では6個の卵の内2個の卵の漿尿膜上に Pock を認めた。

Hanks 液中及びグリセリン・リンゲル液中で53日間凍結保存された材料につき8日卵をそれぞれ8個宛用いて接種を行つたが、Pock は認められなかった。

第4例 佐藤文子 ♀ 16才

発生部位 被裂間部 大きいものは右声帯後連合部にあった。

1) 材料—1

8個の8日卵の漿尿膜上に接種し、8日後まで生存した5個の卵の内1個の卵の漿尿膜上に Pock を認めた。

また、患者から採取した初めの材料を24日間凍結保存したものを11個の8日卵に接種したが、8日後開卵した9個の卵の内1個の卵の漿尿膜上に Pock を認めた。

2) 材料—2

得られた材料を3通りに分けて実験を行つた。即ち症例3の5) 項に記載した如く、1群の8日卵にはメスにて小片となした材料をそのまま接種、次の1群の8日卵にはメスにて小片となした材料を少量の Hanks 液中加入し100°C 60分間加熱後その小片を接種し、また別の1群の8日卵には材料を Hanks 液を用いて乳剤としたものを membrane filter を用いて濾過し、その濾液を接種した。Pock を認めたのは毎常の実験の如くに行つた初めの1群の8日卵7個の内1個の卵の漿尿膜にのみで、他の2群の卵には Pock を認めることができなかった。

第5例 ケー・ケー・エー ♂ 6才

初診前1年半前に喘鳴を伴う呼吸困難があり、近医により直ちに気管切開をうけ、喉頭乳嘴腫の診断の下に、腫瘍の摘出、電気焼灼をうけたが再発の傾向強く、気管切開を行いたるまゝであつた。喉頭は灰白色、軽度光沢をおびた花菜乳嘴状の腫瘍で充満しており、声帯・仮声帯などは全く見ることはできなかった。

この腫瘍組織の病理組織学的所見としては、重層扁平上皮の乳嘴状増殖並びに著明な肥厚が見られた。即ち棘細胞層の著明な増生と表面の角化傾向が見られた。上皮の増生により粘膜下組織は所々に認められるに過ぎなかった。上皮細胞には大小不同性、異型性は見られなかった。粘膜下組織は浮腫性に毛細管に富み、好中球を主とする円形細胞浸潤が認められた。

1) 材料—1

今までの実験で材料を凍結保存した後用い得ることがわかつたので、得られた材料を一部は8日間凍結保存、後一部は58日間凍結保存後実験に供した。即ち8日後に冷凍器内より取り出した材料を乳鉢にて Hanks 液を用いて乳剤となし、9個の8日卵に接種したが8日後までに生存した4個の卵の内2個の卵の漿尿膜に Pock を認めることができた。またこの時の乳剤を membrane filter で濾過した濾液を9個の8日卵に接種し、8日後に開卵した8個の卵の内1個の卵の漿尿膜に Pock を認めることができた。しかし、この Pock は2代・3代と8日卵に継代したが継代不能に終つた。

上記の Pock の性状及びその病理組織学的所見を総

括記載するに次の如くである。

1 Pock の性状

漿尿膜に認められる Pock は径 1~2mm 位の大きさで白色不透明でありほぼ円形でやゝ膨隆している。数は少ないもので漿尿膜 1 枚に 2~3 個から多いもので 30 個位で普通 10 個位のものが多く観察された。

II 病理組織学的所見

組織標本はなるべく Pock を含むように作製した。中性ホルマリン水で固定後、パラフィンで包埋し切片を作り、ヘマトキシリン・エオジン染色を行った。一部ではヘマトキシリン・フロキシン染色を行った。

所見としては外胚葉では上皮が瀰漫性あるいは結節状時に乳嘴状の肥厚増生をなし、一部では上皮が中胚葉中に鹿角状に侵入増殖している像が見られる。上皮細胞がエオジンで紅染し角化を起していると思われるものもある。外胚葉上に残存していた移植片は完全に壊死していた。中胚葉では浮腫性の肥厚をなし、中に上皮細胞が真珠体様に増殖している像をみることがある。線維芽細胞の増生が見られ、エオジン好性細胞が浸潤しており、血管内皮細胞の腫脹増生が認められる。内胚葉には殆んど変化がない。

即ち、Pock を含む漿尿膜の病理組織学的変化は軽度の浸出変化を伴った増殖性炎性変化であると言える。

総括および考察

腫瘍の孵化鶏卵への移植は Raus and Murphy¹⁴⁾ の大先輩が鶏肉腫をもつて陽性成績を得たのに端を発し、Goodpasture⁶⁾ は鶏痘・牛痘などのウイルスが孵化鶏卵内接種で増殖し、漿尿膜に Pock が発生するのを認めて以来、孵化鶏卵は各種のウイルス・リケツチアの培養に利用されるに至ったことは周知の事実であつて、この間のことは Cox²⁾ Beveridge and Burnot の著述に明らかである。

他方 neoplasm の孵化鶏卵漿尿膜上への移植については、Kaufman¹⁰⁾、Kornofsky が述べているが、移植初代では移植母組織の腫瘍細胞は一部生残し、あるいは増殖することもあり、一部は壊死に陥り、2代以後の継代移植は不可能である (Dagg)¹³⁾。移植の難易については結締織性のものはやゝ容易であるが、上皮性のものは非常に困難である (Kaufman)¹⁰⁾。

人喉頭乳嘴腫の孵化鶏卵への移植は未だ試みられていない。著者は若年者喉頭乳嘴腫患者 5 名から、腫瘍組織を採り孵化 8 日の鶏卵漿尿膜上に移植を試みた。患者 5 名においていずれの症例からも漿尿膜上に Pock の発生

を認めた。移植回数から見れば 13 回中 7 回に Pock を検出した。初代移植において Pock を認め得ない場合でも、2代・3代と継代した場合に Pock を認めるに至ったものがある。

移植母組織片の低温保存については、石川⁵⁾ は氷室中に 24 時間保存では移植陽性であつたという。著者は乳嘴腫小片を -20°C 冷凍器中に 24 日間凍結保存した材料をもつてしても Pock の発生を認めた。また孵化鶏卵移植 1 代及び 2 代の漿尿膜材料を -20°C 6 日間凍結保存した材料をもつてしても、次代鶏卵漿尿膜上に Pock を発生したものがある。

乳嘴腫組織の移植性が -20°C 24 日間凍結保存に耐え得た事実に対しては、乳嘴腫細胞自体が細胞分裂能を保有していたと解することは、吉田肉腫細胞が凍結融解後にその移植性を喪失することと対比してかなりの無理がある。凍結保存融解後にも発輝する移植性は喉頭乳嘴腫にある種の発生因子の存在を想定しめるに充分である。その発生因子が濾過性であるならば、これをウイルスと称し得られる筈である。

それならば、乳嘴腫の濾過はいかん、著者は membrane filter (孔径 200~300 μ) をもつての 2 回の濾過試験の結果、いずれも漿尿膜に Pock の発生を認めたのである。

次に著者が観察した Pock が喉頭乳嘴腫発生因子の感染の結果、宿主側の組織反応として出現したものか、即ちその Pock の特異性について論議してみよう。

Wyler¹⁶⁾ は孵化鶏卵漿尿膜接種によつて非感染性物質例えば蒸溜水・ペニシリン・正常漿尿膜乳劑などによつても Pock が発生することがあるという。Wyler の記載する非特異性 Pock は大小不揃であり、形も不正形で、瀰漫性で屢々大きく融合し膜上に帯状に蛇行して、色彩も白色・黄白色・黄色といろいろである。これらのことから著者の観察した Pock と Wyler のそれとは相異点があると断定できる。しかも、著者の行つた対照実験—正常人喉頭粘膜・鼻茸・ 100°C 60 分加熱乳嘴腫組織及び 100 単位/cc ペニシリン・100 γ /cc ストレプトマイシン添加 Hanks 液を孵化鶏卵漿尿膜上に添加した—10 例において、いずれの場合も Pock の発生を認めていない。

次に Pock 並びにそれを含む漿尿膜の病理組織学的所見について考えてみよう。非感染性物質を孵化鶏卵漿尿膜に添加した釜洞⁹⁾、Wyler は著者が喉頭乳嘴腫材料を接種した場合に認めたと同じような組織変化を記

載している。蓋し孵化鶏卵漿尿膜は刺激に対して敏感に組織反応を起すものであり、その反応形式は簡単であるべきことは容易に想像される所である。非感染性物質と感染性因子例えばウイルスによつて招来される漿尿膜の病理組織学的変化は、その陽性頻度の差と強度の差において相異を見出し得るものと考えられる。著者が行つた10例の対照実験においては、外胚葉に軽度の肥厚と、中胚葉に軽度の浮腫を認めたに過ぎず、主実験における組織変化とは明瞭なる相異のあつた事を強調したい。

以上によつて喉頭乳嘴組織材料を孵化鶏卵漿尿膜に移植・接種して、該膜上に発生を認めた Pock は感染性因子によるものであり、その因子が濾過性であり且つ継代できたことからウイルスであると推論できるであろう。

む す び

1) 著者は人殊に若年者の喉頭乳嘴腫組織を孵化8日鶏卵漿尿膜上に移植し、患者5名の材料から全例に、移植材料13例中7例において漿尿膜上に Pock の発生を認めた。この Pock は初代鶏卵で陰性のものが、2~3代継代後に Pock 発生を認めたものがある。

2) 対照実験である正常人喉頭粘膜・鼻茸・100°C 30分加熱乳嘴腫組織及び100単位/cc ペンシリン・100r/cc ストレプトマイシン添加 Hanks 液を用いた場合、計10例においては Pock 発生は陰性であつた。

3) 孵化鶏卵漿尿膜における Pock 形成因子は-20°C 24日間凍結保存においても、Pock 発生能を保有し、孔径200~300 μ membrane filter を通過した。

4) Pock を含んだ漿尿膜の病理組織学的所見は、外胚葉における上皮細胞の限局性及び瀰漫性増殖が著しく、中胚葉における強度の浮腫と単核細胞浸潤・線維芽細胞の増生、血管内皮細胞の腫脹であつた。即ち浸出性変化を伴つた増殖性炎であつた。

5) 若年者喉頭乳嘴腫発生因子のウイルス説に有力なる支持を与えた。

文 献

1) *Beveridge, W.I.B. and Burnet, F.M.*: The cultivation of virus and rickettsiae in the chick embryo. Medical Research Council, Special report series, No. 256, His Majesty's stationary Office, London 1~9, (1946). 2) *Cox, Harold, R.*: Growth of viruses and rickettsiae in the developing chick embryo. Ann. New York Acad. Sci. 55, 236~248, (1952). 3) *Dagg, C.P. Karnofsky, D.A. and*

Roddy, J.: Growth of human tumors in the chick embryo and hatched chick. Proc. A.A. Cancer Research, 2, 11~12, (1955) cit after Kaufman et al. 4) *Findlay, G.M.*: A System of Bacteriology, 7, 252, (1930). 5) 石川恵助: 乳嘴腫の発生に関する臨床的並に実験的研究, 福岡医学雑誌, 29, 1740~1798, 昭11, (1936). 6) *Goodpasture, E.W. Woodruff, A.M. and Buddingh, J.*: The cultivation of vaccinia and other viruses in the chick-allantoic membrane of chick embryos. Science, 74, 371~372, (1931). 7) *Goodpasture, E.W., Douglas, B. and Anderson, K.*: A study of human skin grafted upon the chorioallantois of chick embryo. J. 8) *Holinger, Paul, H., Johnston, Kenneth, C., Anison, George, C.*: Papilloma of the larynx: A review of 109 cases with a preliminary report of aureomycin therapy. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, 59, 547, (1950). 9) 釜洞醇太郎, 荻原喜一, 稻森啓三, 加藤四郎: 孵化鶏卵におけるバーネット法の病理組織学的研究, 第2回日本ウイルス学会口演(東京), (1955) Virus, 5, 39~40, (1955). 10) *Kaufman, Nathan, Kinney, Thomas, P., Mason, Earl, J. and Prieto, L.C., Jr.*: Maintenance of human neoplasm on the chick chorioallantoic membrane. Am. J. of Path. 32, 271~287, (1956). 11) *Murphy, J.B.*: Transplantability of tissue to the embryo of foreign species. J. Exp. Med. 17, 482~493, (1913). 12) *Ono, Jo, Saito Hideo, Igarashi Makoto and Ito Makoto*: The etiology of papilloma of the larynx. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, 66, 1119~1932, (1957). 13) 小野謙, 斎藤英雄, 五十嵐真, 伊藤真, 永瀬邦彦, 宮部勲, 鈴木啓司: 喉頭乳嘴腫, 耳鼻咽喉科, 30, 404~413, (1958). 14) *Raus, P. and Murphy, J.B.*: In mor implantation in the dereloping embryo. Experiments with a transmissible sarcoma of the fowl. J.A.M.A. 56, 741~742, (1911). 15) *Ullmann, E.V.*: On the etiology of the laryngeal papilloma. Acta Otology, 5, 317~334, (1925). 16) *Wyller, R. and van Tongeren, H.A.E.*: J. Path. Bact., 74, 275~279, (1957). 17) 三辺武右衛門, 松浦補: 喉頭乳嘴腫のウィールズ病原性に就て, 第8回日本気管食道科学会口演(千葉), 1956.

伊藤論文付図

第 1 図

第 2 図

第 3 図

第 4 図

写真説明

- Fig. 1. 患者佐々木悦子の摘出喉頭乳嚢腫の組織標本、パラフィン切片、ヘマトキシリン・エオジン染色、弱拡大。
- Fig. 2. 患者佐藤文子の乳嚢腫の小片を孵化鶏卵漿尿膜上において8日間培養したものと漿尿膜。ほぼ血管に沿って十数個の Pock の発生を認める。Pock は円形～楕円形で白色であつて周囲の境は明らかで堅い感じがする。
- Fig. 3. 同上患者の乳嚢腫材料を -20°C 24 日間凍結保存したものと乳剤を孵化8日鶏卵漿尿膜に接種し8日間培養した漿尿膜の組織標本。外胚葉上皮細胞は漸慢性に増生し、所所中胚葉に向つて結節状に肥厚している。中胚葉には浮腫が著明であつて、単球組織球様細胞が結節状に増生し、一般に線維芽細胞が活性化している。小血管内皮細胞は腫脹している。120 倍。
- Fig. 4. 患者佐々木悦代喉頭乳嚢腫材料を孵化鶏卵漿尿膜に移植後、8 日間培養。外胚葉は軽度ながら瀰漫性に肥厚す。中胚葉の内部に外

胚葉上皮細胞は真珠腫様に増生している。中胚葉には浮腫著しく単球組織球様細胞が著しく浸潤し、線維芽細胞は活性化している。内胚葉には著変を認めない。120 倍。

御指導御校閲を賜つた恩師西端驥一教授小野謙教授に謹んで謝意を表します。実験的方面に御指導と御共力を戴いた北里研究所笠原四郎部長並びに吉岡勇雄博士慶大医学部耳鼻咽喉科教室五十嵐真博士に厚く御礼申し上げます。

併せて慶大医学部耳鼻咽喉科教室先輩各位と北里研究所笠原研究室員各位に敬意を表します。

この報告の内容の一部は小野教授によつて第6回国際耳鼻咽喉科学会 (Washington) 及び第7回国際気管食道学会々議 (京都) において口演発表され、笠原、吉岡、牧野、小野、伊藤によつて第6回日本ウイルス学会 (東京) において口演された。

(原稿到着＝昭和34.2.28日)