HISTOCHEMICAL STUDY ON ALKALINE PHOSPHATASE OF SPIRAL GANGLION CELLS IN THE GUINEA PIG EXPOSED TO PURE TONE.

By

K. NAKAMOTO M.D.

*From the Department of Otolaryngology, Nihon University School of Medicine, Tokyo.
(Director: Prof. S. Nakamura, M.D.)*

The author conducted experiments to investigate histochemically the change in alkaline phosphatase of the spiral ganglion cells in the guinea pig exposed to powerful 1000cps pure tone stimuli (135 db, 5~180 minutes).

The results obtained were as follows:

- 1) Alkaline phosphatase activity of the normal spiral ganglion cells was extremely strong in nucleoli, secondarily in peripheral region of cytoplasm, thirdly in another region of cytoplasm and subsequently in nuclei.
- 2) Following to the exposure to 1000cps pure tone stimulation, alkaline phosphatase activity in spiral ganglion cells was temporarily increased for three days, then remarkably decreased in 1~2 weeks after the stimulation, thereafter, there was a tendency to recover to normal condition. Namely, in the cases exposed to stimulation for 5~15 minutes alkaline phosphatase activity became to normal limit in 3 weeks. In spite of that in the other cases with 30~180 minutes' stimulation activity did not recover to normal.
- 3) When the duration of stimulation was longer, the variation of alkaline phosphatase activity was greater.

音響刺激に対する SPIRAL GANGLION CELLS の組織化学的研究

特に Alkaline Phosphatase について

日本大学医学部耳鼻咽喉科学教室 (主任: 中村四郎教授)

中 本 勝 利
ナカ モト カツ トシ

目 次

第 I 章 緒 言	
第 II 章 実験材料および実験方法	
第 1 節 実験材料	
第 2 節 音響刺激装置	
第 1 項 純音発生装置	
第 2 項 音圧測定装置	
第 3 項 純音実験箱	
第 3 節 実験方法	
第 1 項 音響刺激方法	
第 2 項 病理組織標本作製法	

第 III 章 実験成績

第 1 節 対 照 群	
第 2 節 音響刺激群	
第 1 項 5 分間音響刺激群	
第 2 項 10 分間音響刺激群	
第 3 項 15 分間音響刺激群	
第 4 項 30 分間音響刺激群	
第 5 項 60 分, 120 分および 180 分間音響刺激群	
第 IV 章 総括ならびに考按	
第 V 章 結 語	
主要参考文献 付図	

第I章 緒 言

最近飛躍的な進歩をとげた機械文化の発達には、私共の日常生活を豊かにし、数多くの恩恵を与えてくれた反面において、また思いがけない不幸な影響を残しつつある。その一つとして、特に私共の興味をひくものに acoustic trauma がある。この acoustic trauma は職業性難聴の発生原因として重要視されるのみならず、いわゆる socioculus の発生原因としても等閑視することのできない問題である。

この acoustic trauma の問題に関しては、20 世紀始めより幾多の著名な先学者により、いろいろな観点から多数の詳細な研究が行なわれており、しだいにその様相も明らかにされつつあるが、それらの研究方法の殆んどすべてが形態学的方法である。しかし実際にこの形態学的方法を続けてみた結果では、この方法にはやはり一定の限界があつて、この限界をのりこえることは極めて困難を伴うことが分つた。殊に Corti's organ の可逆性病変の推移を追究するような場合には、当然聴器細胞内に出現する微細な生体反応を捕えるより他に方法がない。しかし、この組織化学的研究に関しては、なお多くの未解決の問題が山積しているという感が深い。

幸い最近の生化学の進歩発達には、化学領域において驚くべきものがあるが、これと組織学の生体微細構造への探究は、新たな細胞そのものの形態学的方法、すなわち、組織化学、あるいは細胞化学として生まれてきた。紫外線顕微鏡による核酸の研究者 Caspersson¹⁾ を初め、あるいは電子顕微鏡、あるいは位相差顕微鏡、同位元素などの応用により、細胞体内の構造、または機能などがしだいに解明されつつあり、ここに生命の神秘も一步一步とそのベールがはがされようとしている。

生物体内においては、個々の細胞の生活のため、常に合成および分解反応が同時に行なわれている。この両者の動的な平衡状態こそ、生命保存のための必須条件であるが、この合成および分解反応は、高度に特異化された酵素の作用によつて行なわれている。これらのうちでも磷酸に関与する酵素は、生物体の機能のうえからみて、最も重要にしてかつ不可欠の酵素の一つであると考えられる。ここにおいて、私は組織化学のうちの磷酸代謝に関与する一つの酵素として alkaline phosphatase (以後 Al. p-ase と略す) に着目した。

本酵素は生体内および細胞体内において、糖、脂肪、核酸などの物質代謝に直接、あるいは間接に関与し、生

理的にこれらの代謝の行なわれるところには本酵素が存在するのみならず、代謝が異常に旺盛なる時には増強し、また異常代謝の場合に出現するといわれており、しかもこれらの生体内における energy 供給源たる高エネルギー磷酸結合の代表ともいわれる ATP 代謝に本酵素は密接な関係をもつといわれている。

そこで私は、spiral ganglion cells 内に現われる本酵素の変動を indicator として、音響刺激に対し、spiral ganglion cells 内における合成および分解過程がどのような代謝機構で行なわれているかを観察することに興味をひかれた。

この代謝機構に及ぼす音響刺激の影響を知ることには、ひとり聴覚疲労ないしは聴覚外傷の研究として耳科学的興味があるのみならず、acoustic trauma の予防的立場からも臨床的意義の深いものであると思われるので、ここに本実験を企て、興味ある成績を得たので報告する。

第II章 実験材料および実験方法

第1節 実験材料

実験動物は、体重約 300 ないし 400gr. の聴力正常な、成熟モルモットを使用した。

なお、これらの動物については、実験前に耳鏡検査を行ない、鼓膜正常で、Preyer 氏耳介反射の良好なことを確認したうえで実験材料とした。

第2節 音響刺激装置

第1項 純音発生装置

純音発生は純音発生機、増幅器および driver unit の3部の装置からなり、純音発生機は菊水電波製、R-C Signal Generator ORC-27、増幅器は山水電気製、Amp. Model Q-50、driver unit はアシダ音響製、RU-25-S 型2個を使用した。この際の sine curve の

第1図 1000cps の sine curve

波形を観察すると、第1図のようであり、歪みのないことを確認したうえでこれを音源として使用した。

第2項 音圧測定装置

音圧測定には東京理工製、音圧測定器を使用した、この装置は第2図のようである。

第2図 音圧測定装置および校正装置

なお、本装置の microphone head に probe tube を装着することにより、実験動物の鼓膜直前の音圧を正確に測定した。測定時におけるこの tube の位置的關係は第3図の通りである。

第3図 耳鏡および MICROPHONE HEAD と PROBE TUBE との関係

第3項 純音実験箱

この実験箱の全体は、脚により床上約 80cm で固定し、研究室の壁および床などよりの振動の伝導を防ぐように留意した。この実験箱の内容積は、60×80×120cm で、壁はすべて外側より、木板、ロックウール、テックス、鉄板、テックス、ロックウール、木板、吸音剤（但し底部のみ厚壁硝子）よりなっている。

音響刺激実験は、すべてこの防音箱内において行なつた。

第3節 実験方法

第1項 音響刺激方法

あらかじめ一定条件で飼育した成熟モルモットを、特別に考案作製したモルモット固定器で固定し実験箱内に入れ、純音発生装置から発生する、1000cps 135db の音響を実験動物の被検耳（一応すべての実験動物の左耳を使用）に、金属製 tube により導き、microphone head に probe tube を装着することにより、鼓膜直前の音圧を正確に測定しながら、5分、10分、15分、30分、60分、120分、180分の各刺激時間による音響刺激を行なつた後、その各実験動物群につき、3日後、1週間後、2週間後、3週間後に生体灌流固定を行なうことなく、そのまま断頭失血死させ、直ちに中耳腔を破り、双眼拡大鏡下で細心の注意のもとに鼓軸を蝸牛神経を含んだまま取り出し、つぎの操作によつて染色処理を行なつた。

第2項 病理組織標本作製法

取り出した標本は、直ちに1対2の割合の 4°C の acetone 無水 alcohol 混合液中に入れ、8時間固定および脱水（この間、1, 2回固定液を換えた）し paraffin 包埋を行なつたが、paraffin は MERCK 製の軟 paraffin（融点 46°~48°C）を使用し、包埋中常に 50°C の温度を保ち、加温時間は 60分と限定した。ついで、これを 7μ の厚さの切片にし、脱パラ後、Al. p-ase 証明法中、Gomori 氏改良法に従い、0.5% celloidin-alcohol-ether 液に入れて薄膜をはり、普通 alcohol 中で薄膜を硬化させ、切片をつぎに述べる基質液中に移し、37°C で 3時間 30分浸漬した。

- 3% α グリセロ磷酸ソーダ水溶液：10cc
- 2% 塩化カルシウム水溶液：25cc
- 10% 塩化マグネシウム水溶液：10滴
- バルビタールソーダ粉末：1gr

以上の溶液へ溜水を加えて全量 50cc とした。なお、この基質液の pH は常に 9.4 と限定したが、その際の緩衝液には、(2-amino-2-methyl-1, 3-propanediol) を使用した。ついで標本を流水で 1分間水洗後、2% 硝酸コバルト水溶液中に 5分間浸漬、流水で 3ないし 4分間水洗し、薄い多硫化アンモニウム液（100cc の溜水に多硫化アンモニウム液を数滴加える）中に 5分間投入、切片を流水で充分洗滌し、できるだけ敏速に脱水および xylol 透徹を行ない、バルサム封入を行なつた。なお、対照として必ず同一切片で、100°C で 10分間加熱したものを、同時に同一の基質液で染色し、これが陰性であるかどうかを確めた。

また、Gomori 氏改良法のほか、haematoxylin-eosin 染色を行ない、切片の良否や蝸牛神経の各部が含まれているかどうかの検索のために参考とした。

第III章 実験成績

第1節 対 照 群

前章に述べた Gomori 氏改良法に従って染色すると、一般に Al. p-ase の活性陽性部位は褐色または黒色に着染するが、本方法によるモルモットの spiral ganglion cells をみると、核内において、中等度の活性度を示す小顆粒が一樣に散在するのがみられ、特定の部位に偏在する活性強陽性部は見当らない。また、細胞質内においては、同様に特定の部位に偏在することなく、一樣に小顆粒が散在し、これは核内におけるよりもや高度の活性度を認めたが、概して細胞質辺縁部における活性度が多少高度のように思われた(写真2, 3)。また、これらの小顆粒は Nissl 氏小体と一致しているように思われた。なお、毛細血管壁では、かなり強い陽性反応を呈するが、殊にその内膜にいちじるしい活性度を示すのを認めた。

第2節 音響刺激群

音響刺激群は、全動物につき 1000cps 135db の純音を金属製 tube により被検耳に導き、probe tube で正確に音圧測定を行ないながら音響刺激を行なったことは前述の通りであるが、この刺激により、spiral ganglion cells には、かなり著明な変化を認めた。

すなわち、この変化は spiral ganglion cells 内における機代謝機能の異常な充進および減退を示しているが、それらは一定の時間と共に、一定の経過をとって変動していた。しかしその時間的变化には、ある程度の個体差を認め、また、個々の細胞についても、多少の活性度の相違のあるものが混在していることを認めた。

また、各回転における spiral ganglion cells の相互間の差異は上方回転よりも下方回転において著明にみられたが、このほかにはあまり著明には認められなかった。写真1のように、特に第2回転附近の神経節細胞が、他の回転部のそれよりも活性度が強いように思われたので、私はこれら音響刺激群の spiral ganglion cells の観察にはすべて、主として第2回転を観察の対象に選んだ。

第1項 5分間音響刺激群

音響刺激後3日目に観察した群では、核、細胞質、細胞質辺縁部、共に著明な変化は認められず、殆んど対照群と同様の活性度を示すものが多い(写真4)が、1週

間および2週間経過した動物においては、細胞質における活性度は、3日間経過した群と比較してや低下し、核および細胞質辺縁部においても軽度の低下をみた(写真5および6)。しかし、刺激後3週間経過した群は、核、細胞質および細胞質辺縁部のいずれにも、対照群のものと同様、あるいはそれよりも強い活性度を示しているものが多かった。特に細胞質辺縁部においてその傾向が強いように思われた(写真7)。

第2項 10分間音響刺激群

音響刺激後3日目に観察した群では、5分間刺激群とほぼ同様な所見であるが、しかしよくみると各部位における活性度はや強くなり、特に細胞質辺縁部にや強い活性度を示す顆粒の増加を僅かに認めた(写真8)。刺激後1週間および2週間経過した群では、核、細胞質、細胞質辺縁部、共にかなりの活性度の低下を認めた(写真9および10)。3週間経過した群では、対照群と比較して、ほぼ同程度の活性度を示すものが多く、なかには対照群よりもや強い活性度を示すものも多くみられた(写真11)。

第3項 15分間音響刺激群

音響刺激後3日目に観察した群では、細胞質辺縁部に比較的強い活性度を示す顆粒が出現し、また細胞質内の活性度も強くなっていた(写真12)。1週間および2週間経過した群では、3日目の群と比較し、明らかに活性度の減退がみられ、細胞質辺縁部の活性度も弱まってきた(写真13および14)。3週間経過した群においては、特に細胞質辺縁部に強い活性度を示すものが多くなっていた(写真15)。

第4項 30分間音響刺激群

音響刺激後3日目に観察した群では、特に細胞質辺縁部に、いちじるしく強い活性度を示す部分があるが、また細胞質内の活性度もかなり強い像を呈している(写真16)。1週間および2週間経過したものでは、対照的に、強い活性度を示していた部位も、一樣に活性度の減退をきたしているのがみられた(写真17および18)。なお、3週間経過した群では、1週間および2週間経過した群と比較し、細胞質辺縁部および細胞質内にある程度の活性度の回復がみられたが(写真19)、3日間経過した群と比較すると、今なお活性度は減退しているように思われた。

第5項 60分、120分および180分間音響刺激群

音響刺激後3日目に観察した群では、これら細胞質辺縁部に特に強い活性度を示し、細胞質内においても、か

なり強い活性度を示すものをみたが、これらの活性度の強さと音響刺激時間とは、大体において正比例の関係にあったが、全例において必ずしも正比例してはいなかった(写真 20, 24, 28)。その後、1 週間および 2 週間経過したものにおいては、各部位において著明な活性度の減退を示していた(写真 21, 25, 29 および 22, 26, 30)。この活性度の減少は、刺激時間の長いものほど著明に現われた。なお、3 週間経過した群は、前項迄の群と異り、今なお依然として活性度はいじむるしく減退したまゝであり、殆んど活性度の回復はみられなかった(写真 23, 27, 31)。

音響刺激により、spiral ganglion cells 内の血管壁、特に血管内膜における Al. p-ase 活性度の変化は、全く認められなかった。そのほか、音響刺激による核仁における活性度の変化も認められず、常に強陽性を示しているものが多かった。

音響刺激により、spiral ganglion cells 内の Al. p-ase 活性度の増加、あるいは低下が、時間の経過につれて一定の段階を踏んで経過して行くもようは、上述のようであるが、その変化にも個体差が認められ、また、個々の細胞についても、種々の活性度を示すものと混在も多少は認められた。

第 1 表
音響刺激による SPIRAL GANGLION CELLE 内の ALKALINE PHOSPHATASE 活性度

(A) 対照群

	核	細胞質	細胞核
①	44	45	55
②	42	43	59
③	34	41	42
④	36	50	62
⑤	37	52	54
⑥	56	45	61
⑦	30	38	58
⑧	45	50	64
⑨	51	42	52
⑩	59	52	71
⑪	38	50	53
⑫	52	49	62
⑬	41	40	56
⑭	45	40	54
⑮	36	38	50
平均値	43	45	57

○数は動物の番号

なお、Al. p-ase 活性度を、もつと簡明に数値的に示す何かよい方法はないものかと考えた結果、私はつぎのような方法に従い、活性度の変動推移を数値的に表現して、その大体の傾向を求めた。すなわち、検鏡的に標本の染色濃度により、真黒色の部位を最大値 10 とし、以下黒色の減退するにつれて順次に数を減じ、無色透明の部位を 0 とし、各々の段階により数値的に色の濃度を表現するようにして、一匹の実験動物より、第 2 回転部の spiral ganglion cell 10 個を任意に無選択的に選び、その核内における Al. p-ase 活性度、細胞質内における Al. p-ase

(B)

		3 DAYS				7 DAYS				14 DAYS				21 DAYS			
		①	②	③	平均	①	②	③	平均	①	②	③	平均	①	②	③	平均
5 分間	音響	53	46	36	45	21	35	37	34	26	33	36	32	43	53	50	51
	細胞質	51	49	48	49	38	42	42	40	29	34	37	33	50	59	55	54
	細胞核	60	63	56	60	31	36	43	37	25	41	41	36	59	66	62	61
10 分間	音響	49	36	38	41	36	39	35	37	42	30	39	37	53	47	40	47
	細胞質	50	44	38	47	38	46	40	41	40	31	30	37	51	50	50	53
	細胞核	50	54	55	55	39	45	39	41	48	39	42	43	59	56	59	58
15 分間	音響	37	47	56	48	37	43	39	40	39	35	31	33	48	44	38	43
	細胞質	40	50	58	51	42	44	43	43	39	33	38	35	50	46	42	46
	細胞核	61	58	63	61	37	47	48	44	35	39	38	37	58	52	43	51
30 分間	音響	58	51	54	54	30	29	28	29	26	35	23	28	39	32	31	34
	細胞質	71	60	70	69	38	32	28	32	28	36	26	30	40	34	31	35
	細胞核	70	73	75	73	33	34	29	32	28	40	29	32	43	38	37	39
60 分間	音響	64	45	40	50	24	25	17	22	18	25	16	20	20	22	21	21
	細胞質	74	60	57	64	24	29	22	25	21	20	23	24	25	27	26	26
	細胞核	82	66	63	70	25	32	18	25	19	35	20	25	23	23	29	25
120 分間	音響	68	46	59	58	22	21	10	18	24	12	22	19	22	18	16	19
	細胞質	84	61	72	72	26	26	13	22	25	16	19	20	21	20	17	19
	細胞核	62	60	74	72	21	24	9	20	14	14	27	24	27	18	24	23
180 分間	音響	61	60	56	59	14	20	12	15	15	19	13	16	16	14	17	16
	細胞質	68	71	68	68	15	19	16	17	16	23	15	18	16	16	17	16
	細胞核	72	74	71	72	15	14	9	13	17	23	15	18	16	17	25	19

活性度および細胞質辺縁部(核膜周辺部および細胞膜周辺部)における Al. p-ase 活性度についての数値を求め、この 10 個の細胞の数値を合計したものを X とすれば、X/100 はこの動物の Al. p-ase 活性度を示すことになる。したがってこの動物の第 2 回転の spiral ganglion cells の Al. p-ase 活性度の大体の変動の状況は、第 4 表のように得られた。このようにして得られた数値を、同一条件の動物の間で算術平均値を出し、図

第 4 図 核内の音響刺激に対する ALKALINE PHOSPHATASE 活性度

第5図 細胞質内の音響刺激に対する ALKALINE PHOSPHATASE 活性度

第6図 細胞質辺縁部の音響刺激に対する ALKALINE PHOSPHATASE 活性度

第2表 核内における ALKALINE PHOSPHATASE 活性度の要因分析表

f	SS	DF	V	F ₀
T	3089.1	6	514.8	15.50**
D	7788.0	3	2596.0	78.19**
T×D	4324.7	18	240.2	7.23**
B(TD)	1858.0	56	33.2	
TDB	17059.8	83		

註: T_i 音響刺激時間 (i=1, ~7)D_j 経過日 (j=1, ~4)

** 1% で有意

* 5% で有意

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	T ₇
T ₁					**	**	**
T ₂					**	**	**
T ₃				*	**	**	**
T ₄			*		**	**	**
T ₅	**	**	**	**			
T ₆	**	**	**	**			
T ₇	**	**	**	**			

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
D ₁		**	**	**
D ₂	**			**
D ₃	**			**
D ₄	**	**	**	

$$** |D| \geq \sqrt{2 \times 12 \times 33.2 \times 7.12} = 75.3 (T); |D| \geq \sqrt{2 \times 21 \times 33.2 \times 7.12} = 99.6 (D)$$

$$* |D| \geq \sqrt{2 \times 12 \times 33.2 \times 4.02} = 56.6 (T); |D| \geq \sqrt{2 \times 21 \times 33.2 \times 4.02} = 74.9 (D)$$

示すると、第4, 5, 6図のようであつた。こゝで繰り返えし述べておきたいことは、これはあくまでも肉眼的に検鏡し、記録した数値であるため、絶対不変の数値ではない。しかしこの数値を、一応、推計学的に検索してみ

示ると、第2, 3, 4表のようになつた。したがつて要因分析の結果、1%および5%内において有意の差があるという結果がでた。

以上の成績を総合してみると、音響刺激が加わると、spiral ganglion cellsの細胞質、特にその辺縁部に、Al. p-ase 活性度の増加が一時的に認められ、また、核にも同様に多少のAl. p-ase 活性度の増加がみられたが、その後は時間の経過と共に、これらの部位のAl. p-ase 活性度の低下がいちじるしくなり、ついで、短時間(15分以内)

の音響刺激群では、個々の細胞内のAl. p-ase 活性度の回復がみられたが、長時間音響刺激群(15分以上)では、私の観察した期間内(21日間)では、Al. p-ase 活性度はなお依然として低下したままで、なんら回復の兆

第3表 細胞質内における ALKALINE PHOSPHATASE 活性度の要因分析表

f	SS	DF	V	F ₀
T	2807.3	6	467.8	13.96**
D	12926.7	3	4308.9	128.62**
T×D	6534.4	18	363.0	10.83**
B(TD)	1880.4	58	33.5	
TDB	24148.8	83		

註: T_i 音響刺激時間 (i=1~7)D_j 経過日 (j=1~4)

** 1% で有意

* 5% で有意

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	T ₇
T ₁					**	**	**
T ₂					**	**	**
T ₃					**	**	**
T ₄					**	**	**
T ₅	**	**	**	**			*
T ₆	**	**	**	**			
T ₇	**	**	**	**	*		

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
D ₁		**	**	**
D ₂	**		*	*
D ₃	**	*		**
D ₄	**	*	**	

$$** |D| \geq \sqrt{2 \times 33.5 \times 7.12 \times 12} = 76 \text{ (T)}; |D| \geq \sqrt{2 \times 33.5 \times 7.12 \times 21} = 100 \text{ (D)}$$

$$* |D| \geq \sqrt{2 \times 33.5 \times 4.02 \times 12} = 57 \text{ (T)}; |D| \geq \sqrt{2 \times 33.5 \times 7.12 \times 21} = 75 \text{ (D)}$$

第4表 細胞質辺縁部における ALKALINE PHOSPHATASE 活性度の要因分析表

f	SS	DF	V	F ₀
T	6254.9	6	1042.4	302.1**
D	16599.3	3	5533.1	160.37**
T×D	8517.7	18	473.2	13.71**
B(TD)	1934.7	56	34.5	
TDB	33306.6	83		

註: T_i 音響刺激時間 (i=1~7)D_j 経過日 (j=1~4)

** 1% で有意

* 5% で有意

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	T ₇
T ₁		**		*	**	**	**
T ₂	**		**	**	**	**	**
T ₃		**		*	**	**	**
T ₄	*	**	*		**	**	**
T ₅	**	**	**	**			*
T ₆	**	**	**	**			
T ₇	**	**	**	**	*		

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
D ₁		**	**	**
D ₂	**		*	**
D ₃	**	*		*
D ₄	**	**	*	

$$** |D| \geq \sqrt{2 \times 34.5 \times 7.12 \times 12} = 77 \text{ (T)}; |D| \geq \sqrt{2 \times 34.5 \times 7.12 \times 21} = 101 \text{ (D)}$$

$$* |D| \geq \sqrt{2 \times 34.5 \times 4.02 \times 12} = 58 \text{ (T)}; |D| \geq \sqrt{2 \times 34.5 \times 7.12 \times 21} = 76 \text{ (D)}$$

候は認められなかった。そしてこれらの Al. p-ase 活性度の増減の度合いは、音響刺激時間の長さに正比例している。

このように、音響刺激後の spiral ganglion cells 内の Al. p-ase 活性度の変化することは、音響刺激による神経の興奮伝導に関する労作代謝と密接な関係があることを示しているものと思われる。

第IV章 総括ならびに考察

1914年頃より基本的な研究が開かれて以来、今日迄の生化学領域のいちじるしい進歩に伴い、新しく誕生した組織化学の躍進にもまためざましいものがあり、生体の各種構成物質の実体や、それぞれの分解反応や合成反応についても次第に解明されつつあり、今や生命の神秘の扉もまさに開かれようとしている。

生体内においては、合成および分解の相反する作用が、一定の動的平衡状態を保ちながら同時に営まれているが、この二つの相反する反応は、各細胞内に存在する高度に特異化された酵素の触媒作用によつて営まれているものである。故に、これらの酵素の作用なくしては生命の維持はあり得ないといつても過言ではあるまい。

生物体内における磷代謝の研究は、Embden(1915) Meyerhof(1917)の解糖型式の研究を始めとして、その後、数多くの研究がみられるが、生体内で化学反応が行なわれる場合には、energyの供給を絶対に必要とする。これらのenergy

は、主として高エネルギー磷酸結合 (energy rich phosphate bond) の energy によつて賄われており、その代表的な存在ともいふべき、adenosin triphosphate (ATP) が Lohman (1928) によつて、筋肉中に発見されて以来、今日迄多数の学者により基礎的研究が横行され、生体内における ATP の意義と作用が逐次解明されるに至り、その存在意義はますます重要視されてきて

いる。こゝにおいて、ATPこそenergy代謝の主役を演ずるものであるということが出来る。このATPの生産には無機磷酸が関与しているが、この磷酸基の離脱および附加、あるいは転移というような化学的变化は、無秩序に行なわれているのではなく、各々の目的に適した種々の酵素の支配によつて、整然と行なわれ、調節されているのであつて、この意味において磷酸に関係する酵素は、生命の保存上、最も必要にしてかつ重要な酵素の一つであり、各々の細胞の構成物質の変化や機能の変化を知るうえにおいて、一つの指標となりうると考えられる。

磷酸に関する酵素の研究業績としては、まず Grosser・Husler (1912) があげられるが、彼らは動物組織の磷酸 ester の酵素的加水分解について研究し、これは phosphatase に関する数々の研究を生み出す基礎をなした。殊に、高松²⁾ および Gomori³⁾ の両者が、1939年に同時にしかも全々別個にほぼ同一の原理により、phosphatase の組織化学的証明法を発表して以来、これがあらゆる病理医学方面に応用され、研究はますます活発に展開されてきた。Dixon⁴⁾ によれば、磷酸に関する酵素を総称して phosphorase といふ、このうちで磷酸を離脱させる酵素、詳しくいうならば、磷酸塩基の ester を加水分解的に引き離し、磷酸を遊離させる反応の触媒をする酵素を、phosphatase といつてゐる。phosphatase は加水分解される磷酸結合の性質により、phosphomonoesterase, phosphodiesterase, phosphotriesterase の3つの型に分類することができるが、一般に狭義の phosphatase といわれているものは phosphomonoesterase で、この酵素は種々の磷酸 monoester の加水分解反応に関与する酵素で、基質の alcohol 分子には特異性はみられず、種々の磷酸 ester に作用する。また、phosphatase は試験管内における至適 pH によつて、アルカリ性、特に pH 9.0、あるいはそれ以上で作用するものを alkaline phosphatase といふ、一方 pH 5.0 の辺りで作用するものを acid phosphatase といつてゐるが、特に動物細胞内機能と関係深いものは、高松⁵⁾ のように Al. p-ase である。

神経組織についての phosphatase の研究は、他臓器におけるそれに比べ決して多いとはいえないが、これに関しては、Newman, Albert⁶⁾, Bourne⁷⁾, 井本⁸⁾ らの報告があり、聴中枢路の phosphatase については、只木⁹⁾ が研究を行なつてゐるが、末梢聴神経節については、その文献は見当たらない。

過度の音響刺激を実験動物に加え、その聴器の形態学的変化を観察した論文は枚挙にいとまがない。しかしその多くのものは、与えられた音響刺激は自由音場においての音圧値を示しており、鼓膜に接した音圧値ではなくその精密度のある程度欠いてゐるといつてよからう。私の教室における聴覚研究の一環として、私は正確を期して、Davis 氏¹⁰⁾ の施行した実験と同様、音響を実験動物の被検耳に金属製 tube により導き、microphone head に probe tube を装着し、これにより鼓膜直前の音圧を正確に測定しながら音響刺激を行なつた。

私の実験では、実験動物はすべて生体灌流固定を行なうことなく、そのまま断頭失血死させたのであるが、これによる死後変化も、大藤¹¹⁾, 山川¹²⁾, 猪狩¹³⁾ らのいうようように、多少は考えられるが、私の研究目的である組織化学的变化をみるうえには、直接障害をおこす程度の変化はみられなかつた。勿論、固定液により、なら変化をうけない物質の変化を観察するのならば、生体灌流固定を行なつた方がよいものと考えられるが、私の研究目的とする Al. p-ase は、水分により容易に溶解・流出する恐れのあることを考え、敢えて生体灌流固定法は行なわなかつた。前に述べたように、Al. p-ase の聴神経における変化を観察するには、断頭失血死させ実験を施行するだけで十分その目的は達せられるものと考えられる。また、脱灰操作も水分を加えることは、前に述べたような理由のため禁忌とされているので、やむなく双眼拡大鏡下で細心の注意を払いながら、非脱灰法により穀軸を蝸牛神経を含んだまま取り出し、1対2の割合の4°Cのacetone無水alcohol混合液中で8時間固定した。Gomori¹⁴⁾ 氏改良法によると、冷acetone無水alcohol等量液中で24時間脱水および固定を行なうことになつてゐる。しかし、これでは本組織はacetoneのため固定が過剰になるため、私はacetone 1. 無水alcohol 2. の混合液中に8時間浸漬することにより、脱水および固定の目的は十分果された。この固定液については、既に多くの化学的研究報告が行なわれているが、Gomori¹⁴⁾ は、化学的固定法はどのような方法によつても、程度の差はあるがアルカリ性および酸性の両phosphataseの活性度の低下、もしくは更に進んで非活性化のような見逃すことのできない影響を蒙るといつてゐる。Cappelin¹⁵⁾ によれば、もし標本をchloroformで固定し得るならば、そのphosphataseの活性度の98%は保存できるが、80%alcoholで固定すると、30%

の活性度しか現わさないといい、Coujard¹⁶⁾ は、これに反し、腸を用いて行なつた phosphatase の実験で、alcohol や acetone の固定では、その活性度の低下は殆んどないといっている。また、Doyle¹⁷⁾ および Stafford & Atkinson¹⁸⁾ らは、無水 alcohol で固定した場合、その活性度の保存率は 75% であるといっている。acetone の使用については、高松¹⁹⁾ は、一番良好な成績が得られたと述べているが、Cappelin¹⁵⁾、Doyle¹⁷⁾、Stafford¹⁸⁾、Cleland²⁰⁾ らは 70 ないし 100% の活性度を示すと述べている。一方、formalin 固定法については、Emmel²¹⁾ は 0 ないし 24%、Coujard¹⁶⁾ および Ravinovich²²⁾ は 25%、Cappelin¹⁵⁾ は 40% の活性度しか示さないといっている。このように phosphatase を固定できないのは、高松⁵⁾ のいうように、本酵素が氷に溶解し去るためであろうと考えられる。したがって標本作製中は脱水操作は特に慎重にすべきである。また、標本の paraffin 包埋中に生ずる phosphatase 活性度の低下についても、特に注意しなければならない。これに関しては多くの報告をみるが、そのうちでも、Cappelin¹⁵⁾ および Cleland²⁰⁾ は paraffin 包埋による活性度の低下は微々たるものと述べているものから、Danielli²³⁾ の 75% の活性度低下と述べているものまでいろいろである。また、武内ら²⁴⁾ によると、この酵素の証明には、凍結切片、paraffin 切片、celloidin 切片、carbowax 切片などが使用できるが、それらのうち反応の強く現われる順序は、凍結切片、carbowax 切片、paraffin 切片の順で、celloidin 切片が一番弱いという。しかしかたに反応が強く現われても、自家基質にもとづく非特異性反応のように、不必要な反応が強く現われるので、新鮮組織の凍結切片や凍結乾燥法による切片は、標本作製に都合がよいとはいえず、結論として paraffin 切片を使用するのが、一番よいと述べている。

このように酵素に関する組織化学の固定および包埋については、今日なお種々の問題点があり、討議されていて、決定的な結論はでない。そこで私は、種々の点より考え、實際上操作し易い paraffin 切片作製法を使用した。このように多数の研究者が、paraffin 包埋についての活性度を云々しているが、要は、Pearce²⁵⁾ のいうように、包埋中の温度および時間により反応の低下という影響を受けやすいものと考え、私の行なつた実験では、包埋は benzol を通す時も 4°C を保ち、paraffin は融点の低い 46° ないし 48°C のものを使用し、常に加温時間は 50°C で 60 分とできる限り厳重にし、包埋過

程における活性度の誤差を生ぜしめぬように注意した。

貯蔵する間の温度についても、大きな影響をうけるものと考えられるが、Gomori および Pearce²⁵⁾ らのように、室温でもなんら影響なしという者もあるが、私は経験上 Lison²⁶⁾ のいうように、4°C に保つことが望ましいと考え、常に 4°C で貯蔵した。また、slide に切片をはりつける操作も、Pearce²⁵⁾ のいうように、決して酵素組織化学には 37°C 以上にしてはならない。これによる活性度の低下も、大きいものと考えられる。

基質液中の温度および浸漬時間については、Gomori 氏改良法に示されているものは、37°C で 1 ないし 4 時間浸漬としてあるが、種々検討した結果、神経細胞においては、37°C で 3 時間 30 分浸漬するのが、人工的な拡散現象を起さず、必要にしてかつ最短時間であるという成績を私は得た。また、基質液中に含まれるグリセロ磷酸ソーダは、Pearce²⁵⁾ は本法において、 β -グリセロ磷酸ソーダを基質として使用しているが、 β -では線維組織中に陽性にでるものがあるので、私は β -よりもむしろ α -グリセロ磷酸ソーダを使用し、良好な結果が得られた。染色過程中の xylol および alcohol を通す場合、できるだけ迅速にやるが、その理由は Pearce²⁵⁾ のいうように、この操作を長時間かけると、拡散現象を生ずるためであり、この点にも十分注意した方がよい結果が得られると思う。

このような注意を重ね、良好な反応が現われたとしても、その結果を判断するという問題が残っている。Gomori¹⁴⁾ は、この結果の判断のむづかしさについて注意をうながし、つぎの 3 つの項目について議論している。すなわち、① False negative reactions: 組織の一部分に、calcium の沈澱するのをさまたげるいろいろの factor により、組織中に phosphatase が必ずあるものと当然考えられるにもかかわらず、positive reaction が現われてこないもの。② False positive reactions: 本酵素に類似したものによつて生ずる反応か、または他から入つてきた物質により反応が起るもの。③ False localizations: 本来の位置よりも他の部位に陽性反応が生ずるものなどである。以上の各々につき彼は説明し、注意をうながしているが、現在の所、組織化学的方法により、酵素活性の厳密な局在位置を確定することは困難なことと考えられる。Lison²⁶⁾ らは、phosphatase の局在性を知ることは組織の段階では可能であるが、細胞の段階では不可能であるといっている。Gomori¹⁴⁾ もこの問題につき、各種の詳細な実験検討を加え、基質

液中の浸漬時間が短時間ならば局在性の確定もできるが、非常に長時間になると拡散現象が起り、局在位置を確定することはむづかしくなる。故に、種々の条件、特に温度および作用時間等の諸条件を完全にして実験を施行するならば、現在の方法においても、phosphatase の組織化学は組織の段階ではなく、細胞学的段階まで可能であると述べており、これを実験的に証明しているが、現在行なわれている酵素の組織化学的操作も、このような諸点に留意して行なえば、細胞内の phosphatase 分布についても十分議論する価値があると考えられる。

Al. p-ase の証明法のうち、後染色を行なうよう指導しているものが多いが、これにより phosphatase 活性部位がかえつて不明瞭になり、間違われやすい欠点があるので、後染色はあえてこれを行なわないほうがよいものと考えられる。また、必ず同一切片を、基質液中に浸漬する代りに生理的食塩水中で incubate するよう指示しているが、これでは NaCl 中に、もし万一、磷酸物質があれば、これと組織中の phosphatase と作用するということも考えられるので、むしろ 100°C で 10 分間加熱し、組織中の phosphatase を破壊して同一基質液に入れ、非加熱切片の活性部位が明らかに phosphatase によるものと判断する方が賢明な方法であると考えられる。

つぎに音響刺激に対する聴器の態度について考察するに、これについては古くより主として病理組織学的な研究が多く、研究者によつて行なわれてきた。すなわち、Wittmaack (1907) および Siebenmann (1917) ²⁷⁾ らを初め多くの研究者達は、聴器の病理組織学的研究を行なっているが、その後、河田 (1936) ²⁸⁾ は、持続性強大音響刺激後のモルモット spiral ganglion cells について、独自の Nissl 氏小体染色法によつて、Nissl 氏小体の消失や萎縮等の変化を認め、その結果として、Nissl 物質の復帰により、神経細胞は維持されると解釈している。ところが Caspersson (1940) は Nissl 氏小体は RNA にはかならないことを証明し、その後、彼 (1941) は、細胞内の核酸が蛋白の合成に重要な意義をもつことを指摘したことは、特に注目すべき点である。これに関連して、耳科領域においては、Hamberger & Hydén (1945) ²⁹⁾ らは、細胞化学的および紫外線吸収像のうえから、6000cps 80db 3 時間の純音刺激を行なつたモルモットの spiral ganglion cells では、細胞内の核酸および蛋白の変化は刺激後最初の 24 時間目より徐々に始まり、1 ないし 2 週間でその減少は最大となり、3

週間でほぼ正常に回復することを認め、またコルト銃による実験では、2 週間目に最も強く核酸の減少することを認めている。中村 (1955) ³⁰⁾、水越 (1956) ³¹⁾ らは、聴中枢の組織化学的研究で、PY-MG 染色による神経細胞の RNA の分布について観察し、音響刺激により細胞質の平等分布濃染型の減少および平等分布淡染型の増加、核周囲限局型の増加を認め、RNA 代謝の亢進像が把握できたと述べているが、安藤 (1958) ³²⁾ も同様、PY-MG 染色による神経細胞の RNA の分布について調べ、同様の結果を報告している。さらに教室の石山 ³³⁾ も、音響刺激の強さと spiral ganglion cells 内の RNA の増減との相関関係について報告している。Spöndlin (1958) ³⁴⁾ は、モルモットを 30 分間 white noise 125db で刺激した電子顕微鏡所見から、24 時間後に外毛細胞の apical mitochondria の封入体の著明な増加と、外毛細胞の神経終末の膨化を認めたと報告している。只木 (1958) ³⁵⁾ は、蝸牛神経中枢路において、ribonucleophosphatase 反応の観察を行ない、組織化学的に、正常安静時には神経細胞核の仁に最も強い活性反応をみるが、音響刺激を与えた mouse では、一般に反応染色性が高まると共に、一部活性部位に多少の変動をきたすことを認めたと報告している。また宇野 (1958) ³⁶⁾ も、direct ultraviolet microphotometry を使用し、音響刺激により、聴中枢神経細胞質内の RNA の一過性の増加の後、減少することを認め、蛋白の消耗が核酸代謝系の活性化を計るためではないかと述べ、この音響刺激後、一時的に RNA が増加するということは、従来の文献にもみられず、非常に興味深い成績であると報告している。これらの研究は主として、音響刺激に対する聴中枢、あるいは末梢神経細胞内の RNA の影響を研索したものであるが、この RNA の変動からみただけでも、聴器細胞の代謝過程に、音響刺激は極めて重大な影響を与えることがうかぐえると思う。このような代謝異常が進行することからみれば、細胞内における合成と分解の過程中の energy の供給源である高エネルギー磷酸化合物の代謝過程にも、当然異常が現われることと思われる。

私の行なつた実験からみれば、音響刺激後 3 日目に spiral ganglion cells 中に Al. p-ase の一過性の増加を示した後、第 1 ないし 2 週目にいちじるしい減少を、そして第 3 週目には回復に向う傾向を示したが、初期の Al. p-ase の一過性の増加は、音響刺激により、spiral ganglion cells における興奮伝導機能が頻繁に活動化さ

れるために、Hydén²⁹⁾ らのいうように、正規の量に比べていちじるしい蛋白の消失が神経細胞内で行なわれることになる。そのために、ここで神経細胞の失われた蛋白は、新に合成されなければ、神経細胞の機能は維持されない。故に、この蛋白の消失を償うため旺盛な脱磷酸作用、すなわち細胞内物質代謝が行なわれることになる。したがって活動神経細胞において、蛋白の減少が始まると同時に、高度の phosphatase 活性化がみられるものと考えられる。つぎにこの初期の Al. p-ase の一過性の増加の後、第1ないし2週目で Al. p-ase 活性度の減少するという事実は、蛋白の減少がいちじるしくなると、細胞内におけるこの合成反応と分解反応との間の動的な平衡状態が破れ、phosphatase の増加の限界をこえて、より多くの蛋白消失に至れば、本酵素の減少ということが当然考えられる。この事実は、刺激時間の大きなもの程著明に現われた実験事実からも推察される。また、刺激後3週間を経過すれば、Al. p-ase は正常に回復するか、あるいは弱い刺激条件では正常をこえた活性度を示すが、この事実は細胞内の減少された蛋白量の回復を意味するものと思われる。しかし、長時間刺激群、すなわち刺激時間15分を限度として、これをこえた音響刺激群においては、神経細胞内蛋白の強度の消失のため、初期には一過性に、phosphatase の活性化がおこるとはいえ、3週間経過してもなお依然として phosphatase の強い減少が持続して回復がみられないものと考えられる。なお、この長時間刺激群は、3週以後どの位経過すれば、5ないし15分間音響刺激群のように、回復するものか、あるいはこのまゝ変性に陥るのかについては、未だ疑問が残されている。Hammer³⁶⁾ は、コルト銃による shock wave の実験で、6カ月後のモルモットの spiral ganglion cells において、なお核酸物質の減少を認めていることからみても、spiral ganglion cells にみられる Al. p-ase の強い減少は、恐らく回復の可能性はないものと思われる。135db, 15分間の純音刺激によつては、spiral ganglion cells の変化を論ずる前に、すでに Corti's organ は不可逆性の強い破壊変性を蒙ること(教室、菊池発表³⁷⁾)を考慮する必要がある。

一方、健康モルモットの spiral ganglion cells における Al. p-ase 活性度が、核仁に最も強く、ついで細胞質辺縁部に強く現われることは、これらの部位の脱磷酸作用が他の部位よりも、より活発に営まれていることを意味するものであると考えられる。

正常、安静時の神経細胞においては、刺激による興奮

伝導動作は、大して活発なものではない。従つて蛋白合成作用もわづかで、それに伴う脱磷酸作用も安定した状態にあるが、一度、音響刺激により該神経細胞の活発な興奮伝導動作が営まれると、神経細胞内の蛋白が減少し、その不足を補給するため蛋白の合成作用が営まれ、それに伴い phosphatase の活性化がみられるものと考えられる。また、核内における phosphatase 活性度の変化については、一般に Al. p-ase 反応は、核実質内では陰性であるものとされているが、細胞内の変化がまづ起り、これにより核内においても、phosphatase 活性度が附随的に変化してくるものと考えられる。なお、音響刺激により、血管、特に毛細管内膜における Al. p-ase 活性度の変動は全く認められず、常に一定の強度の活性度を示していたということは、音響刺激による変化が神経細胞にのみ限局しており、血管系には、なんらその影響を及ぼさないためと考えられる。

組織化学的に、操作し作製した切片の染色像による phosphatase の観察では、phosphatase の存在位置、特にその局在性については、ある程度詳細な検討を加えられるが、その phosphatase の活性度の強さについて詳細に議論することは、今日の病理組織学的技術をもつてしても、なお不可能なことが多い。しかしながら私の行なつたように、正常時の切片と同時に染色処理を行なつた音響刺激時の切片について、反応がいずれも正常時の切片のものと比較して増強、あるいは低下している事実より、音響刺激群においては、経時的にみて一過性に phosphatase の増強後、低下、ついでである一定の条件下のものでは、3週間目に回復しようということが推測できると思われる。これをなおいくらかでも明瞭にするため、病理学界においては、反応を最強度、強度、中等度、軽度、反応なし、の5段階に分類し意味づけているが、私はこの推測をいくらかでも、より正確なものとするために、数値的にその活性度の強さを表現してみたが、その結果得られた数値は、もちろん組織中の phosphatase の量、あるいはその活性の強さを現わす絶対的な数値ではないが、要因分析の結果では有意なことが分つた。

現在の組織化学的研究には、一つの大きな欠点がある。すなわち、それは個々の細胞の変化を観察する場合、刺激を加える前後の細胞の変化を観察するのに、一つの細胞の刺激前の構造、あるいは機能を観察し、その観察した細胞に刺激を与えて生ずる変化を観察するのではなく、別の動物の同一組織を、その動物は刺激前はど

のような像を呈していたかは不明であるが、一応他の動物と同一の像を呈していたものと考え、変化の有無を云々するのである。従つて理想的には、同一の細胞の刺激前後の変化の比較ができれば申し分ないが、これは現在の組織化学的操作によつては、到底不可能のことで、我々は一定動物の同一組織は全く同一の構造、あるいは機能を持っているということを前提条件として実験を行なわざるをえない。

私は本研究において、phosphatase という一つの酵素を取りあげて研究を行なつたが、生体の物質代謝に関与する酵素という、高度に特異化された選択的作用をもつ物質を考えなければ、生命の神秘は明らかにされないものと考えると同時に、聴神経における酵素系の解明も、聴覚機能の究明上極めて重要な問題であると考えている。

第V章 結 語

実験動物として、健康モルモットを使用し、1000cps 135db の pure tone を、金属製 tube により被検耳に導き、probe tube で鼓膜直前の音圧を正確に計りながら音響刺激を与え、その spiral ganglion cells の Al. p-ase の変動を、組織化学的に観察して、つぎの結果を得た。

1) 正常 spiral ganglion cells 内の Al. p-ase 活性度は、核仁に最もその反応強く、ついで細胞質辺縁部、細胞質、核の順に弱く、また毛細血管壁にも、強度の陽性反応を認めた。

2) 1000cps 135db 5分ないし180分間の音響刺激の範囲内では、刺激停止後3日目で細胞内の Al. p-ase 活性度は一過性に増加した後、第1～2週目にいちじるしく減少し、以後回復に向う傾向を示す。そしてこの活性度の変動は、音響刺激時間の延長するにつれて著明になる。

3) 1000cps 135db 5分ないし15分間の音響刺激では、Al. p-ase 活性度の一過性増加の後、刺激後1～2週間で Al. p-ase 活性度の軽度の減少を認めるが、3週間目には回復する。

4) 1000cps 135db 30分ないし180分間の音響刺激では、Al. p-ase 活性度は一過性に増加した後は、急激にいちじるしくその活性度は減少し、刺激後第3週目に至るも全然その回復はみられない。

主要参考文献

1) *Caspersson*: The Relation between Nucleic Acid and Protein Synthesis. Symp. Soc. Exp. Biol., 12: 127, 1951. 2) 高松: フォスファターゼの組織学

的並に生化学的研究, (第一報) フォスファターゼの組織化学的研究方法並に該酵素の諸臓器における分布, *Tran. Soc. Path. Jap.*, 29: 492, 1939. 3) *Gomori*: Microtechnical Demonstration of Phosphatase in Tissue. *Proc. Exper. Biol. & Med.*, 42: 23, 1939. 4) *Dixon*: Multi Enzyme System, Cambridge, Univ. Press., 1948. 5) 高松: フォスファターゼの組織学的並に生化学的研究, 第一篇, 序説並にフォスファターゼの組織化学的証明方法, 東京医事新誌, 63: 2868, 1939. 6) *Albert*: Über Lokalisation und Spezifität der Alkalischen und Sauren Phosphatase im Nervengewebe. *Hoppe-Seyler's Zeitschrift für Physiolog. Chemie.*, 302: 129, 1955. 7) *Bourne*: Phosphatases in the Central Nervous System. *Nature*, 179: 1247, 1957. 8) *Imoto*: Histochemical Studies on the Hypothalamo-hypophyseal Neurosecretory System. III. Vitamin C, Phosphatase, Peroxydase and Zinc. *Arch. Hist. Jap.*, 13: 491, 1957. 9) 只木: 聴覚中枢路の Ribonucleophosphatase に関する研究, 耳鼻咽喉科臨床, 51: 626, 1958. 10) *Davis H. et al.*: Acoustic Trauma in the Guinea Pig. *J. Acons. Soc. Amer.*, 25: 1180, 1953. 11) 大藤: 聴器の灌流固定法に就いて, 耳鼻と臨床, 2: 186, 1956. 12) 山川: 人体聴器死後の種々な温度と時間における所見, 日耳鼻会報, 昭和30年総会号, 154. 13) 猪狩: 家兎聴器死後変化に関する実験的研究, 特にコルチ器について, 日耳鼻会報, 55: 491, 1952. 14) *Gomori*: Microscopic Histochemistry, Chicago Univ. Press., 1952. 15) *Cappelin*: *Gomori*: Microscop. Histochem., 1952. 16) *Coujard*: *Gomori*: Microscop. Histochem., 1952. 17) *Doyle*: Effects of Dehydrating Agents on Phosphatases in the Lymphatic Nodules of the Rabbit Appendix. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, 69: 43, 1948. 18) *Stafford & Atkinson*: Effect on Acetone and Alcohol Fixation and Paraffin Embedding on Activity of Acid and Alkaline Phosphatases in Rat Tissues. *Science*, 107: 279, 1948. 19) 高松: 酵素の組織化学 (京大結研記念講演別冊), 1955. 20) *Cleland*: *Gomori*: Microscop. Histochem., 1952. 21) *Emmel*: *Gomori*: Microscop. Histochem., 1952. 22) *Ravinovitch*: *Gomori*: Microscop. Histochem., 1952. 23) *Danielli*: *Gomori*: Microscop. Histochem., 1952.

中 本 論 文 付 図 (1)

写 真 1

中 本 論 文 付 図 (Ⅱ)

写 真 2

写 真 3

写 真 4

写 真 5

写 真 6

写 真 7

中 本 論 文 付 図 (Ⅲ)

写 真 8

写 真 9

写 真 10

写 真 11

写 真 12

写 真 13

中 本 論 文 付 図 (Ⅳ)

写 真 14

写 真 15

写 真 16

写 真 17

写 真 18

写 真 19

中 本 論 文 付 図 (V)

写 真 20

写 真 21

写 真 22

写 真 23

写 真 24

写 真 25

中 本 論 文 付 図 (Ⅵ)

写 真 26

写 真 27

写 真 28

写 真 29

写 真 30

写 真 31

24) 武内他：アルカリ性フオスファターゼ反応における随伴反応について，東京医事新誌，70：357，1953.
25) *Pearce*: Histochemistry, Churchill, London, 1953. 26) *Lison*: 組織化学及び細胞化学，白水社，1954. 27) *Siebenmann*: Entgegnung auf vorstehende Abhandlung von K. Wittmaack: "Über Experimentelle Schallschädigung etc." Passow-Schäfers Beitr, 9: 38, 1917. 28) 河田：螺旋神経節細胞の検索に就て，日耳鼻会報，42：459，1936. 29) *Hamberger & Hyden*: Cytochemical Changes in the Cochlear Ganglion caused by Acoustic Stimulation and Trauma. Acta Oto-laryng. Suppl., 61: 5, 1945. 30) 中村他：音響に対する蝸牛神経中枢の抵抗性，日耳鼻会報，58：139，1955. 31) 水越：聴中枢化学の基礎的研究，日耳鼻会報，59：33，1956. 32) 安藤：音響性外傷に対する Vitamin B₁ の予防的意義に関する実験的研究，耳鼻と臨床，4，補冊，6：446，1958. 33) 石山：音響刺激によるテンデクネズミラセン神経節細胞の核酸の変動について，日耳鼻会報，63：1985，1960. 34) *Spoendlin*: Submikroskopische Veränderungen am Cortischen Organ des Meerschweinchens nach Akustischen Belastung. Pract Oto-rhino-laryng., 20: 197, 1958. 35) 宇野：紫外線吸収性より見たる蝸牛神経中枢の核酸成分の研究，日耳鼻会報，61：827，1958. 36) *Hammer*: A Quantitative Cytochemical Study of Shock Wave Effects on Spiral Ganglion Cells. Acta Oto-laryng. Suppl., 127, 1956. 37) 菊池：純音刺激と聴器病変，特に Cortis organ の病変の拡がり方について，日耳鼻会報，63，1149，1960.

付 図 説 明

- 写真 1 1000cps 135db, 30 分間音響刺激後 3 日目の各回転の SPIRAL GANGLION CELLS の変化
写真 2 対 照 群
写真 3 対 照 群
写真 4 5 分間音響刺激後 3 日目
写真 5 5 分間音響刺激後 7 日目
写真 6 5 分間音響刺激後 14 日目
写真 7 5 分間音響刺激後 21 日目
写真 8 10 分間音響刺激後 3 日目

- 写真 9 10 分間音響刺激後 7 日目
写真 10 10 分間音響刺激後 14 日目
写真 11 10 分間音響刺激後 21 日目
写真 12 15 分間音響刺激後 3 日目
写真 13 15 分間音響刺激後 7 日目
写真 14 15 分間音響刺激後 14 日目
写真 15 15 分間音響刺激後 21 日目
写真 16 30 分間音響刺激後 3 日目
写真 17 30 分間音響刺激後 7 日目
写真 18 30 分間音響刺激後 14 日目
写真 19 30 分間音響刺激後 21 日目
写真 20 60 分間音響刺激後 3 日目
写真 21 60 分間音響刺激後 7 日目
写真 22 60 分間音響刺激後 14 日目
写真 23 60 分間音響刺激後 21 日目
写真 24 120 分間音響刺激後 3 日目
写真 25 120 分間音響刺激後 7 日目
写真 26 120 分間音響刺激後 14 日目
写真 27 120 分間音響刺激後 21 日目
写真 28 180 分間音響刺激後 3 日目
写真 29 180 分間音響刺激後 7 日目
写真 30 180 分間音響刺激後 14 日目
写真 31 180 分間音響刺激後 21 日目

稿を終るに臨み，終始御懇篤なる御指導，御校閲を賜わった恩師中村四郎教授に深甚なる謝意を表すると共に，本研究に対し，御指導を仰いだ本学病理学教室馬場正郎教授，衛生学教室白石信尚教授，慶大解剖学教室安田健次郎講師に深謝し，御協力をいただいた教室員の菊池，石山，山藤の諸学兄に心からなる謝意を表します。なお，本研究に対しては，昭和33年度文部省科学研究費の援助をうけました。こゝに附記して謝意を表します。

本論文の要旨は，日本耳鼻咽喉科学会関東地方会第38回大会，および第5回オーグジョー学会において発表した。

(原稿到着＝昭和35.6.4日)