EXPERIMENTAL STUDIES ON THE INFLUENCE OF TEMPERATURE TO THE POSTMORTEM CHANGES OF THE INNER EAR

By

N. TAKIZAWA

*From the Department of Oto-Rhino-Laryngology, Nippon Medical School
(Director: Prof. T. Daito)*

The author made investigation on postmortem change depend on the temperature in the inner ear by Daito's inner ear irrigating fixation method with three ways that were 5°C, 15°C and 30°C in rabbits.

The results were as follows.

1) 5°C after death. The hair cells showed no marked change in 6 hours, and were showed atrophic, slender and contained pycnotic nuclei from 12 hours after death. There showed no marked change in the stria vascularis and the supporting cells after 24 hours on postmortem specimen.

The nuclei of the spinal ganglion cells showed no marked change till 6 hours after death, and were atrophic, slender and contained pycnotic nuclei from 12 hours after death.

The vestibule and the semicircular canal showed no marked change till 6 hours after death.

2) 15°C after death. The hair cells showed no marked change in 3 hours, and tended to deteriorate from 6 hours after death. The supporting cells showed no marked change after 24 hours, while the stria vascularis tended to deteriorate from 12 hours after death.

The nuclei of the spinal ganglion cells showed no marked change till 2 hours after death, and all nuclei became atrophic and slender after 6 hours.

The vestibule and the semicircular canal showed no marked change till 6 hours after death.

3) 30°C after death. The hair cells showed no marked change in 1 hour, and marked change from 3 hours, and tended to deteriorate from 12 hours. The supporting cells tended to deteriorate from 6 hours, while the stria vascularis tended to deteriorate from 3 hours.

The nuclei of the spinal ganglion cells showed marked change after 1 hour, tended to deteriorate from 2 hours.

The vestibule and the semicircular canal showed no change till 2 hours, and showed loosening of the epithelium after 3 hours.

4) In 5°C after death the specimen showed no marked postmortem change histologically after 6 hours. The state at 15°C and 30°C corresponds to that respectively after 3 hours and 1 hours.

温度の内耳死後変化に及ぼす影響に関する実験的研究

日本医科大学耳鼻咽喉科教室（主任：大藤敏三教授）

助 手 滝 沢 伸 行
タキ ザワ ノブ ユキ

I 緒 言

1910年初めて内耳死後変化に関する実験的研究が偶々東西同時に発表された。即ち本邦の富田¹⁾、欧州にお

ける Nager 及び吉井²⁾ によつてである。以来多くの人の業績が続々と出たが、その成果は必ずしも満足すべきものでなく、核心に触れるようなものはなかつた。

その原因は結局固定法の不備にあり、死後変化と固定変化が入りまじつてはいかに慧眼の士と雖もこれを見分けることは不可能であつた。

しかるに当教室より固定変化を除外し得る内耳灌流固定法が発表され、これを用いて南³⁾ (1956) は家兎の、亦菅井⁴⁾ (1959) は人体内耳の死後変化に就いて検索し、新知見を発表した。

しかしながらこれらの死後変化に関しては、経過した時間の他、屍体の置かれていた所の温度が問題になることは当然考えられる。何となれば死後変化は即ち組織の自家融解である以上この病理変化は温度に左右されることは贅言を要さない。

これに関して松井⁵⁾ (1918) はモルモット屍を2匹宛1°, 27°, 37° C に夫々5時間放置して、温度の高い程死後の変化は顕著でしかも尖端回転よりも基底回転の方において甚しいという。

Werner⁶⁾ (1934) によれば人屍を1°, 10°, 27°, 37° C に15時間保存する時は温度の低い程死後変化は少いという。近くは藤原⁷⁾ (1953) がモルモットを用い、2°より43° C に至る迄5°おきの10段階において保存し、5° C で死後変化最も少く、検索可能の標本を得るには23° C 1時間、18° C 2時間、13° C 6時間、5° C 12時間、2°~8° C 6~12時間迄であるとしている。次いで酒井⁸⁾ (1957) は内耳細胞の生存性に就いて実験を行い、37° C においては有毛細胞は断頭後1時間迄相当数ほど確実に生存し、2時間以上は不確実とし、ダイテルス以下の支持細胞は3~5時間生存しているものという。

以上の如く死後変化と温度との関連に関する実験は聴器灌流固定の標準標本作製に際し不可欠の課題である。

そこで私は四季の温度を勘案し、5°, 15°, 30° C の3段階における死後変化の様相を家兎を用いて検索し、一定の成績を得たので、ここに報告する。

II 実験方法

実験動物には家兎を用い、外耳道並に鼓膜に異常のない体重約2 kg のものを選んだ。これ等は無麻酔の下に突然断頭し、頭部を5° C 氷室(電気冷蔵庫)、15° C 恒温室、30° C 孵卵器内に夫々放置して、死後1, 2, 3, 6, 12, 24時間後に側頭骨を取り出し、内耳灌流固定法を施し、法の如く後固定、脱灰、ツエロイデン包埋、薄切の後、ヘマトキシリン、エオジン重染色を行つて観察した。

III 実験成績

1) 死後1時間

動物番号 23, 27号 (5° C に放置)

41, 46号 (15° C に放置)

4, 5, 14, 15号 (30° C に放置)

組織学的所見:

内・外リンパ腔: 清澄。

前庭膜: 核は長橢円形に濃染し異常はない。

血管条: 全例とも異常を認めない。

蓋膜: 線状構造明らかに変化を認めない。

ラセン器: 5°, 15° のものにおいては内・外有毛細胞の核は金米糖状に濃縮し、外有毛細胞は軽度で萎縮して細胞間に間隙をつくつている。ダイテルス、ヘンゼン、クラウデュース細胞の原形質は淡明で、顆粒状乃至網目状を呈し、細胞間の境界は明瞭である。トンネル繊維は明らかに認められる。即ち5°, 15° のものゝラセン器は生体固定像と全く同じである。30° のものでは大部分は上記と同様であるが、一部に外有毛細胞萎縮せず、その核も正円形淡染するものが見られた。しかし内有毛細胞、支持細胞には変化はない。

ラセン神経節細胞: 5°, 15° のものには変化が認められない。30° のものでは一部の核が濃縮し胞体も少し萎縮して周囲に空隙をつくつている。

前庭・半規管: 平衡斑及び膨大部稜の有毛細胞の核は濃縮して正常像を示し、支持細胞その他に著変はない。

前庭神経節細胞: 異常はない。

2) 死後2時間

動物番号 2, 3号 (5° C に放置)

42, 47号 (15° C に放置)

7, 36号 (30° C に放置)

組織学的所見:

内・外リンパ腔: 清澄。

前庭膜: 一般に変化なく、36号のみ核が膨大淡染している。

血管条: 5°, 15° のものでは異常を認めないが、30° のものでは上皮細胞の核が濃縮しているのが少し見られた。

蓋膜: 変化なし。

ラセン器: 5°, 15° のものには変化がないが、30° のものでは有毛細胞の核は正円形に淡染し、胞体も生体像の如く少し萎縮するものもあるが、一般には浸漬固定像の如くフツクラとして萎縮していない。しかし支持細胞には著変はない。

ラセン神経節細胞: 5° のものに变化なく、15° のもの

のには核の濃縮するものが少し認められる。30°のものでは染色性の低下、核の濃縮、空隙形成（胞体の萎縮による）が見られた。

前庭・半規管：一般に著変はないが、有毛細胞の核の濃縮しないものもかなり見受けられた。

前庭神経節細胞：異常を認めない。

3) 死後 8 時間

動物番号 24, 26 号 (5° C に放置)

40, 48 号 (15° C に放置)

16, 18, 43 号 (5° C に放置)

組織学的所見：

内・外リンパ腔：清澄。

前庭膜：5°のものでは核は長楕円形に濃染し異常ないが、15°のものでは一部膨大淡染し、30°のものでは全て膨大淡染している。

血管条：5°、15°のものには変化を認めないが、30°のものでは上皮細胞の結合ゆるみ崩壊に傾き一部の核は濃縮している。

蓋膜：変化なし。

ラセン器：5°のものは全く変化がないが、15°のものゝ一部の有毛細胞の核は正円形淡染している。30°のものでは外有毛細胞は支柱蓐より離れ、円形に近づき、核は点状（小円形）に濃縮し、内有毛細胞は浮き上つて、その核は正円形に淡染している。しかし支持細胞には著変なく、唯クラウデュース細胞の一部が崩壊しかけている。トンネル繊維は消失している。

ラセン神経節細胞：5°のものに変化なく、15°のものでは核が濃縮するもの半数、30°のものでは全て濃縮し、且染色性の低下、胞体周囲の空隙形成が見られる。

前庭・半規管：5°及び15°のものでは変化なく、30°のものでは平衡斑及び膨大部稜の上皮層は剝離し、崩壊に傾き一部の支持細胞の核は濃縮し有毛細胞の核と区別ができなくなっている。

前庭神経節細胞：5°、15°のものに変化はないが、30°のものでは虎斑融解起り、一部の核は濃縮している。

4) 死後 6 時間

動物番号 30, 31, 34 号 (5° C に放置)

37, 45 号 (15° C に放置)

8, 9, 19, 21 号 (30° C に放置)

組織学的所見：

内外リンパ腔：5°、15°のものでは清澄。30°のものでは血管条附近に Amorphmasse を見る。

前庭膜：5°、15°のものでは膨大淡染する核を有し、30°のものでは点状に萎縮や濃染している。

血管条：5°、15°のものに殆んど変化を見ないが、30°のものでは上皮層が基底より剝離し、崩壊に傾き、染色性の低下と核の濃縮が見られる。

蓋膜：5°、15°のものに変化を認めないが、30°のものではラセン縁との附着部が離れている。

ラセン縁：上皮細胞の一部には核濃縮が見られる。

ラセン器：5°のものは有毛細胞の核が濃縮し、胞体も軽度の萎縮を示すものが多いが、一部は核が正円形淡染し、胞体も萎縮していない。支持細胞に変化はない。

15°のものでは外有毛細胞の核は正円形淡染し、胞体は一部円形に近づき配列が乱れている。しかし第1廻転始部においては有毛細胞の核は金米糖状に濃縮し、胞体も軽度の萎縮を示し、トンネル繊維も明らかに認められる。支持細胞は全て変化を見ない。30°のものでは有毛細胞の核は点状に濃縮し、胞体も支柱蓐より離れ萎縮し、配列が乱れている。支持細胞は膨化し、クラウデュース細胞は崩壊に傾いている。

ラセン神経節細胞：5°、15°のものでは核が濃縮し、30°のものでは更に胞体も萎縮して周囲に空隙をつくっている。

前庭・半規管：5°、15°のものでは平衡斑、膨大部稜の有毛細胞の核は濃縮しているが、膨大部稜の支持細胞の核が円形に膨化するもの多く、30°のものでは上皮層は基底より剝離し、崩壊に陥り、核は全て濃縮し、裸核を多く見る。

前庭神経節細胞：5°、15°のものに変化を認めないが、30°のものでは核の濃縮をかなり見受ける。

5) 死後 12 時間

動物番号 29, 32, 33 号 (5° C に放置)

38, 28 号 (15° C に放置)

10, 11, 20 号 (30° C に放置)

組織学的所見：

内・外リンパ腔：30°のものゝ血管条附近に上皮細胞の崩壊物を少し認める。

前庭膜：5°、15°のものでは膨大淡染する核を認め、30°のものでは大部分点状に萎縮、や濃染している。

血管条：5°のものに変化なく、15°のものでは上皮層には全般に著変はないが、所々一二の細胞の結合緩み、その核は濃縮している。30°のものでは核の濃縮甚しく、上皮細胞は膨化解離し、崩壊した細胞が内リンパ腔に逸出している。

蓋膜：5°、15°のものに変化なく、30°のものではラセン縁との結合が離れて線状構造が幾分不明瞭となつてゐる。

ラセン縁：上皮細胞及びその下の結合組織では核濃縮が認められる。

ラセン器：5°のものでは外有毛細胞の核は正円形淡染し、胞体は短縮して立方形に近ずき、支柱芽より離れている。内有毛細胞は膨化して跳上り核が正円形淡染している。支持細胞には変化がない。トンネル繊維は認められぬ。しかし第1廻転始部においては外有毛細胞の核はやゝ濃縮し形も整い、トンネル繊維も明らかに認められる。15°のものでは外有毛細胞は立方形又は円形となり、配列は乱れ、内有毛細胞は膨化し跳上つている。核は全て正円形淡染している。支持細胞には殆んど変化がないが内ラセン溝細胞の一部の核が濃縮している。しかし第1廻転始部においては外有毛細胞の核は点状に濃縮し、トンネル繊維も認められる。30°のものでは外有毛細胞の核は点状（小円形）に濃縮し、胞体も円形に萎縮するもの、崩壊するものあり、内有毛細胞は膨化している。支持細胞も膨化し、配列乱れ、境界不明瞭となつてゐる。特にクラウデユース細胞は崩壊し、ベツチエル細胞に核濃縮を見る。第1廻転始部においては幾分変化の度は少いが、トンネル繊維はもはや認められない。

ラセン神経節細胞：核は全て濃縮しているが、胞体は15°、30°のものだけ萎縮し周囲に空隙を作つてゐる。特に30°のものでは染色性が甚だしく低下し変化がひどい。

前庭・半規管：5°のものでは軽度に、15°及び30°のものでは高度に有毛細胞の核が点状に濃縮し、支持細胞の核は膨化淡染している。

前庭神経節細胞：5°、15°のものに著変なく、30°のものでは染色性が低下し、一部の核が濃縮し、胞体も少し萎縮している。

6) 死後24時間

動物番号 25, 35号 (5° C に放置)
39, 44号 (15° C に放置)
12, 17, 22号 (30° C に放置)

組織学的所見：

内・外リンパ腔：30°のものゝ内リンパ腔には Amorphasse を多く認める。

前庭膜：25号では長楕円形に濃染する核も見られたが、一般に5°、15°のものは膨大淡染する核を有し、30°のものでは核の染色性甚しく低下して小さく萎縮し、膜

そのものも菲薄となる。

血管条：5°のものに異常なく、15°のものでは核は濃縮し、一部崩壊し、30°のものでは上皮細胞は膨化して基底膜より剥れ、分離崩壊が起つてゐる。残つてゐる核は全て濃縮し、一部崩壊に陥つてゐる。

蓋膜：5°のものに変化なく、15°のものでは39号のみラセン縁との附着部が剥れかけ、30°のものではこれが完全に離れ、膨化して形を変えている。

ラセン靱帯及びラセン縁：5°、15°のものに変化はないが30°のものではラセン靱帯は浮腫状となり核が点状に濃縮している、ラセン縁は染色性甚だ低下し空胞形成あり、一部は崩壊して核濃縮を見る。

ラセン器：5°のものでは外有毛細胞は円形になり、配列乱れ、核は点状に濃縮している。内有毛細胞は膨化して核は正円形淡染している。支持細胞には殆んど変化がない。トンネル繊維は認められないが、第1廻転始部においては残存している。15°のものでは外有毛細胞の核は点状に濃縮又は崩壊し、胞体も崩壊している。内有毛細胞は膨化し核は点状に濃縮している。支持細胞に著変はない。しかし第1廻転始部においては有毛細胞の形は整い、トンネル繊維が認められる。30°のものでは有毛細胞は崩壊飛散しているが、点状に濃縮する核を持つ細胞は未だ旧位置附近に少し認められる。ダイテルス細胞を初め支持細胞は殆んど崩壊消失しているが、ヘンゼン細胞の一部がベツチエル細胞と共に残つてゐる。内、外柱は異常ない。しかし第1廻転始部では幾分形が整つてゐる。

ラセン神経節細胞：核は全て濃縮し、15°のものでは胞体も萎縮し、30°のものではこれが甚しく、染色性も低下している。

前庭・半規管：5°、15°のものでは平衡斑、膨大部稜の上皮層では核濃縮が著しく支持細胞の核は膨化淡染している。30°のものではその上皮層は全く崩壊し、その残渣物中に高度に濃縮した裸核及び硝子様球を認める。

従つてクブラ下腔は消失し、クブラの線状構造はやゝ不明瞭となつてゐる。

前庭神経節細胞：5°のものでは僅かに核濃縮が見られ、15°のものでは約半数が核濃縮を起し、30°のものでは染色性が特に低下し、核濃縮と共に胞体も萎縮するもの又逆に膨化し崩壊に傾き、核も痕跡程度となり更に一部は融解消失している。

IV 総括並に考按

以上の成績を総括すれば

1) 内・外リンパ腔: 5°及び15°のものにおいては死後24時間に至るも清澄, 30°のものにおいては3時間後のもの迄清澄, 6時間後のものでは血管条附近にAmorphmasseを見, 12時間以後のものでは上皮細胞の崩壊物等の多量のAmorphmasseが見られる。

2) 前庭膜: 5°のものは死後3時間迄核は長楕円形に萎縮濃染して異常はない。15°のものは死後2時間迄異常なく, 3時間のものでは一部の核の膨大淡染するのが見られる。5°, 15°とも6時間以後は核が膨大淡染するだけで著変はない。30°のものは死後2時間ですでに約半数の核の膨大淡染するのが見られ, 死後3時間では全部の核が膨大淡染する。6時間以後のものでは核は点状に萎縮し, やゝ濃染する。24時間後になると核の染色性は低下し, 萎縮し, 膜そのものも菲薄となつてゐる。

3) 血管条: 5°のものでは死後24時間に至るも異常は見られず, 15°のものにおいては死後6時間迄異常なく, 12時間後に至つて上皮層の一二の細胞の結合がゆるみ, 核は濃縮している。24時間後で核は濃縮し, 一部は崩壊している。30°のものでは死後2時間で一部の上皮細胞の核が濃縮し, 3時間後では上皮細胞の結合がゆるみ, 崩壊に傾き, 一部の核は濃縮している。6時間後では上皮層が基底より剝離し, 崩壊に傾き, 染色性は低下し, 核は濃縮している。12時間以後においては核は全て濃縮し, 上皮細胞は膨化, 解離し, 崩壊した細胞が内リンパ腔に逸出している。

4) 蓋膜: 5°のものでは死後24時間に至るも線状構造明からで変化はない。15°のものでは死後12時間迄は変化なく, 24時間後のものでは一部ラセン縁との附着部が離れている。30°のものでは死後3時間迄変化なく, 6時間後のものではラセン縁との附着部が離れている。12時間後のものでは線状構造が幾分不明瞭となり, 24時間後に至つてはラセン縁との附着部が完全に離れ, 膨化して形を変えている。

5) ラセン器:

イ) 外有毛細胞 5°のものでは死後3時間迄核は金米糖状に濃縮し, 胞体は軽度萎縮して生体固定像と全く同じで変化を見ない。6時間後では一部の核は正円形淡染し, 胞体も萎縮せず, 12時間後では核は全て正円形に淡染し, 胞体は短縮して立方形に近ずき支柱萼より離れている。24時間後に至つては細胞は円形となり, 配列は乱れ, 核は点状に濃縮している。

15°のものでは死後2時間迄は変化なく, 3時間後の

ものでは一部の核が正円形に淡染している。6時間後のものでは核は正円形に淡染し, 胞体は一部円形に近ずき, 配列が乱れている。12時間後のものでは胞体は立方形又は円形となり, 配列の乱れは更に強くなつてゐる。しかし第1廻転始部においては未だ核は濃縮し, 胞体も軽度の萎縮を示しているのが認められる。死後24時間に至つては核は点状に濃縮又は崩壊し, 胞体も崩壊している。

30°のものでは死後1時間では大部分変化なく, 一部に胞体が萎縮せず, 核も正円形に淡染しているものもある。2時間後のものでは核は正円形に淡染し, 胞体は一般にフックラとして萎縮せず, 3時間後のものでは胞体は円形に近ずき, 支柱萼より離れ, 核は点状(小円形)に萎縮している。6時間後のものでは配列乱れ, 萎縮して支柱萼より離れ, 12時間後のものでは胞体は萎縮するもの, 又崩壊するものあり, 死後24時間に至ると細胞は崩壊, 飛散している。しかし点状に萎縮する核をもつた細胞は未だ旧位置附近に少し認められる。

ロ) 内有毛細胞 5°のものでは死後3時間迄は変化なく, 6時間後のものでは一部の核は正円形に淡染し, 胞体も萎縮せず 12時間及び24時間後のものでは核は正円形に淡染し, 胞体は膨化して跳上つている。

15°のものでは死後2時間迄変化なく 3時間及び6時間後のものでは一部の核は正円形に淡染している。12時間後のものでは核は全て正円形に淡染し, 胞体は膨化して跳上つている。24時間後のものでは胞体は膨化し, 核は点状に濃縮している。

30°のものでは死後1時間は変化はない。2時間後のものでは核は正円形に淡染し, 胞体も少し萎縮するものもあるが一般にフックラとして萎縮せず。3時間後のものでは有毛細胞は浮き上つて, その核は正円形に淡染している。6時間後のものでは核は点状に萎縮し, 胞体も支柱萼より離れ, 萎縮して配列が乱れている。12時間後のものでは胞体は膨化しており, 24時間後のものでは完全に崩壊飛散している。

ハ) 支持細胞 5°のものでは各細胞の原形質は淡明で顆粒状乃至網目状を呈し, 細胞間の境界は明瞭で死後24時間に至るも殆んど変化を見ない。

15°のものでは死後6時間迄は変化はない。死後12時間のものでも殆んど変化はないが, 内ラセン溝細胞の一部の核が濃縮している。死後24時間に至つても著変はない。

30°のものでは死後3時間迄は変化はない。

第1表 (5°C のもの)

部 位 \ 時 間	1	2	3	6	12	24
内・外リンパ腔	—	—	—	—	—	—
前庭膜	—	—	—	+	+	+
血管条	—	—	—	—	—	—
蓋膜	—	—	—	—	—	—
ラセ { 外有毛細胞	—	—	—	+	++	++
セン { 内有毛細胞	—	—	—	+	++	++
器 { 支持細胞	—	—	—	—	—	—
トンネル繊維	—	—	—	—	+	+
ラセン神経節細胞	—	—	—	+	++	++
前庭・半規管	—	—	—	+	++	++
前庭神経節細胞	—	—	—	—	—	—

第2表 (15°C のもの)

部 位 \ 時 間	1	2	3	6	12	24
内・外リンパ腔	—	—	—	—	—	—
前庭膜	—	—	+	+	+	+
血管条	—	—	—	—	++	++
蓋膜	—	—	—	—	—	+
ラセ { 外有毛細胞	—	—	+	++	++	+++
セン { 内有毛細胞	—	—	+	+	++	++
器 { 支持細胞	—	—	—	—	+	+
トンネル繊維	—	—	—	+	+	++
ラセン神経節細胞	—	—	+	+	++	++
前庭・半規管	—	—	—	+	++	++
前庭神経節細胞	—	—	—	—	—	+

第3表 (30°C のもの)

部 位 \ 時 間	1	2	3	6	12	24
内・外リンパ腔	—	—	—	+	+	++
前庭膜	—	+	++	++	++	++
血管条	—	+	++	++	+++	+++
蓋膜	—	—	—	+	++	++
ラセ { 外有毛細胞	+	+	++	++	+++	+++
セン { 内有毛細胞	—	+	++	++	++	+++
器 { 支持細胞	—	—	—	++	+++	+++
トンネル繊維	—	—	++	++	+++	+++
ラセン神経節細胞	+	++	++	++	+++	+++
前庭・半規管	—	++	++	++	+++	+++
前庭神経節細胞	—	—	+	++	++	+++

(—) は変化なし (十) 軽度変化あり (++) 中等
度変化あり (++) 高度変化あり (++) 崩壊

死後6時間のものでは各細胞は膨化し、クラウドューズ細胞は崩壊に傾いている。死後12時間に至つては膨化は更に進み、配列は乱れ、境界は不明瞭となつている。特にクラウドューズ細胞は崩壊しベツチエル細胞に核濃縮を見る。24時間後のものではダイテルス細胞を始め支持細胞は殆んど崩壊消失しているが、ヘンゼン細胞の一部がベツチエル細胞と共に残つているのが認められるだけである。

ニ) トンネル繊維 5°のものでは死後6時間迄は明らかに認められる。死後12時間のものでは殆んど認められないが、第1廻転始部においては明らかに認められる。死後24時間のものでは第1廻転始部において僅かに残存している。

15°のものでは死後3時間迄は明らかに認められるが、死後6時間のものでは第1廻転始部においてのみ明らかに認められる。24時間後のものでも第1廻転始部においては明らかに残存している。

30°のものでは死後2時間迄は明らかに認められる。死後3時間以上経過したものでは消失しており、死後12時間のものでは第1廻転始部においても認められない。

6) ラセン神経節細胞: 5°のものでは死後3時間迄変化なく、6時間後のものでは一部の核が濃縮している。12時間後のものでは核は全て濃縮しており、24時間後のものでは胞体も萎縮している。

15°のものでは死後1時間のものは変化なく、2時間後のものでは核の縮濃するものが少し認められる。3時間後のものでは約半数の核が濃縮し、6時間後のものでは核は全て濃縮している、12時間以後のものでは胞体も萎縮している。

30°のものでは死後1時間ですでに一部の核は濃縮し、胞体も少し萎縮して周囲に空隙を作っている。2時間後のものでは染色性の低下、核の濃縮、空隙形成が進み、3時間以後のものでは核は全て濃縮し、染色性は甚しく低下する。12時間以後のものでは変化が甚しく染色性もいちじるしく低下している。

7) 前庭・半規管: 5°のものでは死後3時間迄は平衡斑及び膨大部核の有毛細胞の核は濃縮し、正常像を示す。6時間以後のものでは膨大部核の支持細胞の核が円形に膨化している。12時間後のものでは有毛細胞の核が点状に濃縮し、支持細胞の核は膨化淡染している。24時間後のものでは平衡斑並に膨大部核の上皮層において核の濃縮甚しく、支持細胞の核は膨化淡染している。

15°のものでは死後3時間迄は変化はない。6時間後

のものでは膨大部核の支持細胞の核が円形に膨化し、12時間後のものでは有毛細胞の核が高度に点状に濃縮し、支持細胞の核は膨化淡染している。24時間後のものでは平衡斑及び膨大部核の上皮層の核濃縮甚しく、支持細胞の核は膨化淡染している。

30°のものでは死後1時間のものは変化はない。2時間後のものでは有毛細胞の核の濃縮しないものが見られる。3時間後のものでは平衡斑及び膨大部核の上皮層は剝離し、崩壊に傾き、一部の支持細胞の核は濃縮し、有毛細胞の核と区別ができなくなっている。6時間以後のものでは上皮層は基底より剝離し、崩壊に陥り、核は全て濃縮し、裸核を多く認める。24時間後のものに至つては上皮層は全く崩壊し、高度に濃縮した裸核及び硝子球を認める。従つてクブラ下腔は消失し、クブラの線状構造はやゝ不明瞭となつてゐる。

8) 前庭神経節細胞：5°のものでは死後12時間迄変化はない。24時間のものでは僅かに核濃縮が見られた。

15°のものでは死後12時間迄変化なく24時間後のもので約半数の核濃縮が見られた。

30°のものでは死後2時間迄は変化なく、3時間後のものでは虎斑融解起り、一部の核は濃縮している。6時間後のものでは核の濃縮はかなり見受けられる。12時間後のものでは染色性は低下し核は濃縮し胞体も萎縮している。24時間後のものでは染色性が特に低下し、核濃縮と共に胞体も萎縮するもの又逆に膨化し崩壊に傾き、核も痕跡程度となり更に一部は融解消失している。

さて、上記の成績と先人のものとを比較してみよう。

ラセン器に就いては藤原⁷⁸⁾がモルモットを用い、5°Cでは12時間迄、13°Cでは6時間、18°Cでは2時間迄検索可能としている。そして28°C以上では1時間後で既に死後変化が明らかにあらわれ、正確な検索は困難であるとしている。

従来の見解では動物の種類、大小で死後変化の速度は異るとされてはいるが、私の用いた家兎では上記の如く5°Cでは6時間迄生前の像に近いものであり、24時間後でも全ての支持細胞は変化なく唯々有毛細胞の変形と配列の乱れが見られた。15°Cでは3時間迄生前に近く、支持細胞は24時間後でも変化ないが、有毛細胞は6時間後で変化をきたし、12時間後ではこれが強くなり配列が乱れてくる。30°Cでは1時間後迄生前に近く、それ以後急激に変化をきたし、支持細胞は6時間後で既に膨化し崩壊に傾く。

即ち藤原の成績より検索可能な時間が延びているのは

動物の種類による違いも少しはあるが、主として固定法の優劣によるものと思われる。私の用いた灌流固定法は即座に一樣に固定できるに反し、従来の浸漬固定では固定変化が加わるからである。

しかして浸漬固定を行つた場合、Nager及び吉井⁹⁾を初め、中村登¹⁰⁾他多くの人は固定液は前庭・蝸牛両窓より入る故、死後変化は基礎廻転より先端廻転に向つて次第にその度を増加すると言ひ、松井⁹⁾は前記の如く先端廻転より基礎廻転の方に変化が甚しいとしているし、久保(護)¹¹⁾は第2～3廻転に甚しく、先端と基礎廻転は固定液浸入に便なるため変化は少いとしている。

即ち死後変化とは言ふものの、固定液の浸入の工夫で変ることを各著者とも認めているわけであるが、私の場合は灌流固定であるためこの固定差はないものと思われる。

それにも拘らず第1廻転始部の変化は上方のものと較べて明らかに数段少く、例えばトンネル繊維に注目してみても、5°Cのものは一般に6時間後迄認められるのに第1廻転始部では24時間後でも明らかに認められる程であり、15°Cでも一般に3時間後迄であるのに該部のみは24時間後でも認められる。

このことは曾つて久保¹¹⁾も記載しているところで彼は48時間後でも基礎廻転の始部の最始部においては恒にトンネル繊維を認めたという。即ちこの部の変化の度が他に較べて著しく軽いのは洵に奇妙なことである。

酒井⁹⁾の37°Cに置いた場合、有毛細胞は1時間後迄相当数ほど確実に生存し、2時間以上は不確実としているが、私の実験でも30°Cで1時間後には大部分の有毛細胞の核は金米糖状に濃縮して胞体も軽度の萎縮を示してはいるが、一部に胞体が萎縮せず核も正円形淡染し、正常組織の反応像を呈しなかつたことはこの一部のものだけが多少活力が落ちてはいるが、大体生きていると見做してよいであろう。しかして2時間後ですべての核は濃縮せず胞体もフックラとしており、3時間後では変形が起り、支柱専より離れるのであるから30°Cに置かれた場合は2～3時間で細胞死が起るとみて差支えないであろう。

次に藤原⁷⁸⁾は死後変化は温度が高い程速かであるが、体温附近では6時間後迄は寧ろ遅延する。これは特にラセン神経細胞に明らかにあらわれるとしているが、蛋白分解の如き化学変化である死後変化が生前の体温に保持された場合却つて遅延する。即ち33°Cが最もひどく、38°Cで寧ろ少いというのは何とも理解しがたいことである。私の実験では30°Cのものは2時間で既に

高度の変化があらわれるが、これが仮に家兎の体温 40°C の所に置かれていたとした場合、変化が却つて少くなるとは到底考えられない。

前庭・半規管の変化は従来ラセン器より軽いものとされていたが、構造の簡単、複雑の違いでそのように見られがちではあるが、仔細に見るなら時間の経過と共に夫々かなりの変化を現わし、変化の殆んどないのは 5°C 、 15°C では3時間後迄、 30°C では1時間迄で時間的にはラセン器と同じ程度で、特に 30°C の場合3時間後で上皮層が剝離し、崩壊に傾くことはラセン器の支持細胞が3時間後迄変化を見ないのに較べ注目すべきことである。

前庭神経節細胞はラセン神経節細胞に較べれば確かに変化は少いが、この場合の固定状況の違いは夫々の位置的関係からどうにもならぬことである。

ともあれ、内耳の死後変化は動物の種類によつて多少の違いはあろうが、冬期 5°C 附近の気温であれば死後5～6時間でも所謂純死後変化のない生前に近い標本が得られるに反し、夏期 30°C 前後の気温では死後2時間でも既に変化が現われることは特記すべきことで我々としては標本採取に際しその時の状況を精しく調べねばならない。

V 結 論

温度の内耳死後変化に及ぼす影響を研究するため、家兎を用い、断頭後 5°C 、 15°C 、 30°C の環境に放置し、夫々一定時間後に内耳灌流固定を行つて検索し、次の成果を得た。

i) 5°C のところに放置した場合には、有毛細胞は6時間後迄大部分、死直後の如き核の濃縮像を示して変化なく、12時間後で変形が起る。支持細胞、血管条及び蓋膜は24時間後でも変化を認めない。

ラセン神経節細胞は6時間迄著変なく、12時間後では核が濃縮する。

前庭・半規管も6時間後迄大した変化はない。

ii) 15°C では有毛細胞は3時間迄著変なく、6時間後で少し変形が起る。12時間後ではこれが増強し、配列が乱れている。支持細胞は24時間後でも変化を見ないが、血管条は12時間以後、次第に崩壊への道を辿る。

ラセン神経節細胞は2時間迄著変なく、6時間後では全ての核が濃縮する。

前庭・半規管は6時間後迄は著しい変化はない。

iii) 30°C では有毛細胞は1時間後迄著変なく、3時間後ではかなり変形が起り、12時間後で崩壊する。支

持細胞も6時間後に膨化を認め崩壊に傾く。血管条は3時間後で崩壊し始める。

ラセン神経節細胞は死後1時間で既に変化を示し、2時間後のものでは染色性の低下、核濃縮を認める。

前庭・半規管では2時間後迄大した変化はないが、3時間後では上皮層の剝離、崩壊が認められる。

iv) 5°C では6時間後でも所謂純死後変化は殆んど認められないが、これに相当するものは 15°C では3時間後迄、 30°C では1時間後迄である。

文 献

- 1) 富田：耳鼻臨床，4：234，1910.
- 2) Nager u. Yoshii: Z. O. Heilk. 60: 93, 1910.
- 3) 南：日耳鼻，59：296，1956.
- 4) 菅井：日耳鼻，62：1525，1959.
- 5) 松井：日耳鼻，24：725，1918.
- 6) Werner: Z. Hals u.s.w. H. K. 35, 1934.
- 7) 藤原：日耳鼻，56：54，u. 855，1953.
- 8) 藤原：耳鼻咽喉科最近の進歩，山川著による，353，1956.
- 9) 酒井：日耳鼻，60：1367，1957.
- 10) 中村登：日耳鼻，21：591，1915.
- 11) 久保護：福岡医誌，15：901，1922.

付 図 説 明

第1図： 15°C ，死後1時間

有毛細胞の核は濃縮。胞体間に隙間を生じ、支持細胞の原形質は淡明で顆粒状をなし、生体固定像と全く同一である。

第2図： 30°C ，死後1時間

外有毛細胞の第2列目のみ核が濃縮せず、胞体も細長くなっていない。染色性低下す。しかし一般に著しい変化はない。

第3図： 15°C ，死後3時間

内ラセン溝細胞の膨化の他殆ど変化ない。

第4図： 30°C ，死後3時間

有毛細胞の核は点状に萎縮し、胞体も支柱旁より離れ、円形に近づいている。支持細胞は膨化し、一部崩壊に傾いている。

第5図： 5°C ，死後6時間

第1図と同じく有毛細胞の核は濃縮し、殆ど変化を認めない。

第6図： 30°C ，死後6時間

有毛細胞の核は小点状に濃縮し、胞体も変形して崩壊しかけている。支持細胞は一部崩壊し、蓋膜もラセン縁より剥れている。

第7図： 5°C ，死後12時間

外有毛細胞の核は正円形淡染し、胞体は立方形に近ず

き、内有毛細胞は跳上っている。しかし支持細胞に変化はない。

第8図：15°C, 死後12時間

有毛細胞変形して配列乱れる他、支持細胞に著変はない。

第9図：30°C, 死後12時間

有毛細胞は崩壊に傾き、支持細胞も一部完全に崩壊し、蓋膜、血管条も基底より剥れている。

第10図：5°C, 死後24時間

外有毛細胞は円形になり、配列乱れているが、支持細胞に変化はない。

第11図：15°C, 死後24時間

有毛細胞は崩壊しているが、支持細胞に著変はない。

第12図：30°C, 死後24時間

ラセン器は大部分崩壊して、柱細胞とヘンゼン細胞の一部を残すのみ。血管条は剥れ、細胞は分離崩壊に陥っている。

第13図：5°C, 死後1時間

ラセン神経節細胞に変化は認めない。

第14図：15°C, 死後3時間

ラセン神経節細胞の約半数に核濃縮を見る。

第15図：30°C, 死後12時間

ラセン神経節細胞は萎縮して周囲に空隙をつくり、核も全て濃縮している。

第16図：15°C 死後6時間

膨大部後、支持細胞の核が円形に膨化。クブラ下腔に多くの Amorphmasse 又は硝子様球を見る。

第17図：30°C, 死後24時間

上皮層は崩壊し、濃縮した裸核や Amorphmasse 及び硝子様球を多く見る。

第18図：30°C, 死後24時間

前庭神経節細胞。萎縮及び核の濃縮と、逆に膨化、崩壊に陥っているものを見る。

終稿に臨み御懇篤なる御指導、御校閲を賜った恩師大藤教授、野本講師に衷心より謝意を表し、併せて終始御叱正、御鞭撻を頂いた芳野助教授、下谷病院内山院長、耳鼻咽喉科医長永井汜博士、北嶋俊之博士に深謝致します

本論文の要旨は日本耳鼻咽喉科学会関東地方会第369回大会で報告した。

(原稿到着＝昭和35.8.31日—急載)

滝沢論文付図(1)

第 1 図

第 2 図

第 3 図

第 4 図

第 5 図

第 6 図

滝沢論文付図(Ⅱ)

第 7 図

第 8 図

第 9 図

第 10 図

第 11 図

第 12 図

滝沢論文付図(Ⅲ)

第 13 図

第 14 図

第 15 図

第 16 図

第 17 図

第 18 図