EXPERIMENTAL STUDIES OF THE EFFECTS OF DIABETES MELLITUS ON MIDDLE EAR INFECTION

By
W. TAKAGAWA

*From the Department of Oto-Rhino-Laryngology, Faculty of Medicine, Hokkaido University
(Director: Prof. S. Hirano)*

Two groups of rabbits, one with diabetes mellitus developed by alloxan injection, and another healthy groups for the contrast were studied. In each group, middle ear infection was developed by staphylococcus aureus injection in tympanic bulla.

The specimens of auditory organs were fixed in Wittmaack's solution, then embedded in celloidin and stained with hematoxylin-eosin.

The results of the examination were as follows:

In diabetes mellitus group, histopathological changes were more remarkable than that in contrast group on following points.

- 1) External auditory canal: Desquamation of the epithelium, cellular infiltration in subcutaneous tissue.
- 2) Tympanic cavity: Edema, cellular infiltration and bleeding in mucous membrane.
- 3) Bone absorption and Multiplication of tympanic cavity and tympanic bulla.
- 4) Periosteal thickening, bone absorption in auditory ossicles.
- 5) Changes in inner ear were more remarkable and healing of inflammation was slower in diabetes mellitus group than in contrast group.

糖尿病の中耳炎に及ぼす影響についての実験的研究

北海道大学医学部耳鼻咽喉科学教室（主任：平野新治教授）

高 川 亘
タカ ガワ ワタル

目 次

- I 緒 言
- II 実験方法
- III 実験成績
- IV 総括並に考按
- V 結 論
- 文献・附図

I. 緒 言

新陳代謝疾患の一つである糖尿病は身体各部に種々の障害を起し、神経炎、皮膚疾患、眼疾患、動脈硬化症、肺結核その他、化膿性疾患を屢々合併することがあり、この際生体の抵抗力減弱などのため、臨床上これ等の合併症が治り難いことが従来から数多く報告されている。

糖尿病患者に化膿性中耳炎を併発するときは骨破壊が急速に行われ、早期に乳様突起炎を起し、広範囲の骨壊死を起し頭蓋内合併症を起す傾向が大であると云われている。中耳炎と糖尿病との関係についての文献は Kirchner (1884)¹⁾ 以来数多く、Rueda (1912)²⁾ は糖尿病患者で中耳炎を併発し、腐骨を形成して重症な経過をとつた例を報告し、Schlander (1923)³⁾ は糖尿病患者で急性中耳炎に罹患し、広範囲の骨破壊、壊死を起し、脳膜炎、膿血症で死亡した例を報告している。本邦においても山本 (1931)⁴⁾、犬塚 (1936)⁵⁾、佐藤 (1935)⁶⁾、(1938)⁷⁾ 等の報告がある。その他糖尿病に中耳炎が合併した場合の臨床報告例は数多いのであるが、病理組織学的に記載したものは少く、その詳細な所見は未だ明ら

かにされていない。著者は茲において家兎に Alloxan を用いて糖尿病を発症させ、これに中耳炎を併発させて糖尿病の場合に中耳炎がいかなる経過進展を示すかについて病理組織学的に検索するため本実験を企てたのである。

II. 実験方法

本実験に使用した動物は体重 2.5kg 前後の成熟家兎で、外耳道及び鼓膜正常でプライエル氏反射正常と認められるものを使用した。飼料は豆腐粕、燕麦、人参、青草等の普通の飼料を朝夕 2 回に分けて与え、血糖検査は午後 3 時の定めた時刻に施行した。家兎を Alloxan 注射群と対照群とに分け、各群の家兎の中耳腔内に黄色葡萄球菌（寺島株）を注入して中耳炎を起させ、3 乃至 30 日の各時期において断頭又は生体固定を行い、聴器の組織標本を作成して病理組織学的変化を観察した。

1) Alloxan 注射

最初 5% Alloxan 水溶液 200mg/kg を家兎耳静脈内に注射したが注射直後乃至数時間後に死亡するものが多かったので、以後は 130mg/kg を注射して糖尿病を発症させた。Alloxan 注射によつて注射後 2～3 時間以内に一過性の高血糖が起り、次いで 5～12 時間に強い低血糖の時期が続くが、この時期に糖液の補給を行わないと痙攣を起して死亡するものが多い。この低血糖期を経て後に血糖は漸次上昇する。Alloxan 注射後家兎は一時興奮状態となるが次第に運動不活発となり食欲も幾らか低下した。

2) 血糖測定

採血は耳静脈より行い、Crecelius-Seifert 氏法によつた。Alloxan 注射前及び注射後 3 日目毎に血糖を測定した。

3) 尿糖測定

採尿方法は飼育箱の下部に金網を張り、糞、糞くず等が混じらないようにして下部に大きな濾斗を置いて尿を採取した。尿糖の測定は Benedict 氏法により試薬 3cc 尿 6 滴を加え、加温煮沸後なお 2 分間加熱を続けた後、放置冷却して下記の表に従つて判定した。

記号	液	沈 澱	大体の糖の濃度
—	青 色	な し	
±	青緑色	な し	0.02% 以下
+	青緑色	黄緑色	0.02～0.2%
++	青緑色	赤褐色	0.2 ～0.5%
+++	緑 色	赤褐色	0.5 ～1.5%
++++	無色透明	赤 色	1.5 ～2% 以上

4) 菌 注 入

本学細菌学教室より分与を受けた黄色葡萄球菌（寺島株）の 1 白金耳（約 2mg）を 1cc の生理的食塩水に浮遊させ、ツベルクリン注射器を用いて鼓膜穿刺して中耳腔内に 0.2cc 宛 1 回注入を行つた。Alloxan 注射群に対しては Alloxan 注射で糖尿病発症 1 カ月後に菌注入を行つた。

5) 体重測定

Alloxan 注射前及び断頭又は生体固定時に測定した。

6) 聴器の固定及び組織標本作成

大多数は断頭固定を施したが生体固定によつたものもある。固定液は Wittmaack 氏固定液を使用し、脱灰液は 10% フォルマリン液に 5% の割合に局方硝酸を加えたものを使用した。脱灰後 5% 硝酸曹達液で中知し、水洗、漸強アルコールで脱水、ツエロイジン包埋を行い 15～20μ の連続切片を作成し、ヘマトキシリン・エオジン重染色を行つた。

III. 実験成績

各実験例についてその実験概要は次の表に示す通りである。

	家兎番号	体 重		アロキサン糖 尿病期 間	血 糖 mg/dl	尿 糖	菌の注 入の固 定期間 （日）	生断 体頭 固固 定定
		前	後					
ア ロ キ サ ン 注 射 群	6	2550	2700	30	150	+	3	断
	7	2800	2900	30	180	++	5	断
	4	3700	3500	30	260	+	7	断
	3	3800	3750	30	375	+++	14	断
	34	2700	2600	30	220	+++	14	生
	58	2400	2500	30	170	+++	21	生
	1	2600	2900	30	200	+	30	断
対 照 群	21		2600		90	—	3	断
	24		3500		95	—	5	断
	18		2700		85	—	7	断
	32		2600		90	—	7	生
	15		2500		100	—	14	断
	19		2800		90	—	21	断
	38		1900		80	—	30	生

次に各実験例について聴器の組織学的所見を記載すれば次の通りである。

No. 21 対照例、菌注入後 3 日目

外耳道：多量の好中球、単球、好酸球並びに一部出血を含む化膿性滲出物で充され、上皮は部分的に上記細

胞浸潤のため、侵蝕性の脱落を示している所がある。皮下組織は中等度若しくはそれ以上の単球及び好中球を主体とした細胞浸潤があり、該部における血管はいずれも拡張、充盈を示し、血管内皮細胞の増生並びに円形細胞浸潤を認める箇所も所々に認められる。

鼓膜： 多量の膿性滲出物で被われ、鼓膜は著しく肥厚、組織内にも好中球、好酸球の多量の滲出を認める。上皮細胞の増生も目立つ。

中耳腔： 粘膜上皮層には部分的ではあるが中等度若しくはそれ以上に単球、好中球等の浸潤が認められ、該部は好中球を主体とした膿性滲出物で被われている。粘膜上皮の軽度の肥厚を示す箇所もあるが、粘膜上皮層は浮腫を示し中等度の充血及び軽度若しくは部分的に中等度の円形細胞浸潤をみる他著変はない。

鼓室： 好中球及び単球を主体とした膿性滲出物が出現、粘膜は溷濁腫脹を示し、軽度ではあるが単球等の細胞浸潤が認められる。

聴小骨： 骨膜は軽度に肥厚、部分的に円形細胞の出現をみる箇所があり、蜂窩状の骨吸収が極く軽度ではあるが認められる。

内耳： 内外リンパ腔内に漿液線維素性の物質が中等度に認められ充血が目立つ。膜迷路壁には溷濁腫脹、軽度の単球等を主体とする円形細胞浸潤がみられる。

No. 6 糖尿病例、菌注入後3日目

外耳道： 多量の好中球、赤血球、好酸球等よりなる膿性滲出物で充されその一部は上皮内に侵入、上皮の破壊消失が強く認められる所がある。皮下組織にも高度の上皮細胞の浸潤が認められ、浮腫が強く血管はいずれも高度の充盈を示し、炎症細胞の浸潤が著しい。上皮の離脱の著しい所もある。

鼓膜： 不規則鋸歯状に破綻、穿孔、残存組織も空腔形成、核消失等変性像が強い。表層に膿性滲出現の附着が認められる。

中耳腔： 多量の出血性膿性滲出物で充され粘膜上皮は一部、特に鼓膜周辺においては脱落、残存せる粘膜上皮も膨化変性像が著しい。粘膜上皮層は浮腫状でかなり広範囲に亘る出血を認め好中球、好酸球、単球、リンパ球等の中等度の細胞浸潤が認められる。骨壁は部分的に不規則に破壊吸収されている箇所も認められる。

鼓室： 多量の膿性滲出物を容れ、粘膜上皮の変性、浮腫が強い。小出血を認める箇所もある。

聴小骨： 骨膜の肥厚は部分的にかなり強く、中等度の円形細胞の浸潤があり、Havers氏腔は拡大、血管周

囲には軽度ではあるが細胞浸潤を認め充血が著しい。なお骨膜下において骨の吸収がかなり強く認められる。

内耳： 内外リンパ腔内には線維素性滲出物の析出があり、膜迷路壁は浮腫が強く、リンパ球、好中球その他円形細胞浸潤が中等度に認められ充血も高度である。

No. 24 対照例、菌注入後5日目

外耳道： 多量の膿性並びに出血性滲出物の出現があり、上皮の脱落、欠損も中等度に認められる。皮下組織は浮腫性変化が強く、好中球、リンパ球等を主体とした中等度の細胞浸潤があり、表皮内にも多数の円形細胞浸潤が認められる。

鼓膜： 表層にかなりの量の膿性滲出物の附着を認めると共に、組織内にも好中球、単球等の中等度の細胞浸潤があり出血を認める箇所も存在している。

中耳腔： 腔内に顆粒球、単球を含む線維素性滲出物の出現があり、上皮層は顆粒球の中等度の浸潤が特に鼓膜周辺に強く認められ、該部における上皮層は浮腫性で充血が極めて強いが円形細胞浸潤は比較的軽度である。骨壁の変化は殆んど認められない。

鼓室： 粘膜内に小出血巣あり、腔内にはかなり多量の線維素性滲出液を認める。粘膜上皮の膨化腫大が目立つ。

聴小骨： 骨膜は肥厚血管は充盈を示すが特記すべき変化はない。

内耳： 内外リンパ腔に少量の線維素性滲出物の出現が認められ、膜迷路壁には軽度の浮腫性変化、単球等の少量の細胞浸潤が認められる。

No. 7 糖尿病例、菌注入後5日目

外耳道： 極めて多量の膿性滲出物で被われ、一部赤血球の出現をみる箇所もある。上皮の変性も著しく、円形細胞の高度の浸潤が認められる。なおかなり強い上皮の増生、肥大の認められる所もある。

鼓膜： 赤血球を含む膿様物質で被われ単球等の中等度の細胞浸潤が存在する。

中耳腔： 腔内には若干の赤血球を含む漿液性膿性滲出物の出現が認められる。粘膜上皮層には軽度の細胞浸潤があり上皮層は一部膨化、軽度の細胞浸潤が認められる。なお特に外耳道に近い骨壁は類骨組織の新生が出現し始めるが一部骨質の吸収をみる箇所もあり、両者は不規則な形に混在している。

鼓室： 大体中耳腔の所見に類似するが特に滲出液の滯留が目立つ。

聴小骨： 骨膜は概して肥厚、骨質の蜂窩状吸収が目

立つ。

内耳：内リンパ腔内にリンパ球，単球，線維素よりなる滲出物を容れ，膜迷路壁は膨化，腫大が強く空胞形成，核消失等壊死に陥っている所もあり充血が著しい強い顆粒球の細胞浸潤が認められる。

No. 18 対照例，菌注入後7日目

外耳道：主として線維素及び漿液よりなる滲出物が中等度に出現，上皮層は不規則鋸歯状を呈し，単球，リンパ球等の中等度の浸潤が認められる。皮下組織は肥厚，リンパ球，線維芽細胞等の出現が目立ち充血も著しい，なお上皮の変性欠損を示す所もある。

鼓膜：少量の漿液性滲出物の沈着が表層に認められ，部分的に単球等の軽度の浸潤が認められるのみである。

中耳胞：少量の漿液性滲出物が存し，小部分的ではあるが軽度若しくは中等度の単球，あるいはリンパ球等の浸潤が粘膜内に認められ，粘膜は概して肥厚浮腫状を呈し，血管充盈が目立つ。骨の窩状吸収あるいは新生が軽度に認められる。

鼓室：漿液性並びに膿性滲出物を中等度に認め粘膜に小出血をみる箇所もあり中等度の円形細胞浸潤がみられる。

聴小骨：軽度の骨膜肥厚並びに骨膜下において骨の窩状吸収が認められるが特記すべき程の所見はない。

内耳：内外リンパ腔内に軽度の線維素性滲出物の出現を認め，膜迷路壁の軽度の潤濁腫脹及び円形細胞浸潤が認められる。

No. 32 対照例，菌注入後7日目

大体 No. 18 の所見と類似するが，中耳胞における膿性滲出物はかなり多量に存在している。鼓室も線維素性滲出物が相当量に存し，粘膜上皮下層の浮腫も No. 18 に比べて強いように思われる。

No. 4 糖尿病例，菌注入後7日目

外耳道：血性膿性滲出物を多量に含み上皮は変性脱落等のため不規則鋸歯状凹凸を示し，好中球，リンパ球等多数の細胞浸潤が認められる。皮下組織に強い円形細胞並びに線維芽細胞の浸潤あり出血も認められる。

鼓膜：単球，リンパ球等の細胞浸潤が中等度，血性膿性滲出物の附着が認められる。

中耳胞：多量の赤血球を含む膿性滲出物を容れ粘膜上皮下層は高度に腫大，充血が極めて強く一部かなり強い出血をみる所もある。なお軽度若しくはそれ以上の円形細胞浸潤が該部に認められる。

鼓室及び聴小骨における変化も対照例に比べて著し

く，粘膜における出血，骨吸収，滲出物出現等はいずれも高度である。

内耳：変化が強く，膜迷路壁の細胞浸潤並びに出血が目立つ。

No. 15 対照例，菌注入後14日目

外耳道：表層に線維素様物質よりなる塊状をなした滲出物を部分的軽度若しくはそれ以上に認めるが前例に比して著しく減少している。なお上皮の極く軽度の剝離が認められるが潰瘍形成はない。鼓膜の附近では上皮乳頭はかなり強く肥厚している。皮下組織は浮腫状を呈し中等度の充血を示し，好酸球，単球，線維芽細胞の軽度の出現を認める。

鼓膜：一部軽度の単球様細胞の浸潤を認めるが特記すべき所見はない。

中耳胞：鼓膜に近い粘膜上皮は一部腫大，単球様細胞の軽度の出現を認めるが，一般に著変はない。線維素様物質を主体とした軽度の滲出物の出現が認められる。粘膜上皮下層にはリンパ球，単球等の軽度の出現が認められる。類骨組織の軽度の出現がある。

鼓室：単球，リンパ球等の滲出細胞を含む滲出液の中等度の潑溜が認められ，粘膜上皮下層は浮腫充血をみるが游走細胞の出現はかなり軽度となつている。

聴小骨：骨膜は肥厚，表層に軽度の線維素様物質の沈着を認めるが変化は軽い。

内耳：内リンパ腔内に軽度の線維素様物質の出現があるが膜迷路壁には異常細胞等の出現はなく充血も軽い。

No. 3 糖尿病例，菌注入後14日目

外耳道：単球，リンパ球等を含む滲出物がかなり強く存し，上皮層には軽度ではあるが細胞浸潤が認められ，一部上皮の欠損をみる所もある。皮下組織は肥厚，単球，リンパ球，線維芽細胞の中等度の細胞浸潤が特に鼓膜に近い部分に強く認められる。

鼓膜：肥厚を示し，中等度の単球，リンパ球，好酸球の出現が認められ，中央近く出血をみる箇所もある。滲出物の附着も強い。

中耳胞：粘膜上皮下層は特に肥厚と充血が著明で外耳に近い部分では特に好中球，単球，リンパ球等の出現が著明で，骨部に対して窩状様の吸収を示す所もある。粘膜上皮層にはリンパ球等の細胞浸潤があり一部出血を示す箇所も認められる。骨膜も肥厚を示す。胞内に軽度の滲出物の出現をみる。

鼓室：腔内にはかなりの量の好酸球，単球等よりな

る滲出物を容れ特に鼓膜に近い部分の粘膜に新しい肉芽の形成をみる所もある。粘膜上皮下層の浮腫は極めて強い。

聴小骨：骨膜は著しく肥厚，線維芽細胞等の出現も認め更に肉芽形成も強く鼓室壁より波及し，聴小骨内に突入し，部分的には聴小骨の大半を充している所もある。

内耳：内リンパ腔内に線維索並びに少量の滲出細胞を含む滲出液がみられ，膜迷路壁には単球細胞の軽度の出現をみる。充血がかなり強い。

No. 34 糖尿病例，菌注入後 14 日目

外耳道：上皮の脱落が所々にみられ，上皮層には単球，リンパ球の中等度の浸潤をみる。表層には滲出性細胞を主体とする滲出物の附着が認められ，皮下組織は肥厚，細胞浸潤も目立つ。

鼓膜：穿孔が大きく，中等度の単球，リンパ球，好酸球の出現が認められる。

中耳腔：粘膜上皮は著しく肥厚し不規則な凹凸を示し，多数の好中球，単球等の細胞浸潤が認められ且つ腔内は大量の赤血球を含む膿性滲出物で充され，粘膜上皮下層では細胞浸潤が極めて強く充血が高度，小出血をみる所もある。骨膜も肥厚，窩状の骨吸収が認められ一部頰骨組織の出現をみる所もある。

鼓室：多量の膿性滲出物を含み，粘膜層に著しい好中球等の細胞浸潤が認められる。

聴小骨：骨膜は強く肥厚，単球その他の細胞浸潤が強く且つ全般的に骨破壊が強く，新しい肉芽の形成が目立ち聴小骨内に波及，骨内を充している所もある。対照例に比べて病変は極めて高度である。

内耳：内外リンパ腔内に多量の赤血球を含む膿性滲出物の出現があり，膜迷路壁の変化も高度で炎性細胞浸潤も極めて高度である。

No. 19 対照例，菌注入後 21 日目

外耳道：外側に近い所では上皮の萎縮はかなり強いが鼓膜に近い所では上皮層は肥厚，乳頭は高度に發育，皮下組織も肥厚，線維芽細胞，単球等の細胞浸潤が軽度若しくは中等度に認められる。一部線維索様滲出物の附着をみる。

鼓膜：一部かなり強い肥厚を示し，中等度の新しい肉芽の發育をみる。充血が強い。

中耳腔：粘膜上皮層に軽度の単球等の細胞浸潤がみられ一部膨化，粘膜上皮下層の肥厚をみる所もある。骨組織は軽度の新生を示している。

鼓室：粘膜は軽度ではあるが腫大，肥厚を示し，滲出物の潴溜を認める。骨変化としては特記すべきものはない。

聴小骨：骨膜は軽度に肥厚，骨変化として骨新生も僅かながら認められる。

内耳：内リンパ腔内に網状線維索様滲出物を容れ，膜迷路壁に軽度の細胞浸潤と出血を認める。

No. 58 糖尿病例，菌注入後 21 日目

外耳道：所々に上皮の剝脱が認められると共に単球様細胞の浸潤が認められるが，一部かなり強い萎縮を示す所もある。中耳近くでは乳頭の發育が極めて強く，皮下組織も浮腫性で単球，組織球，線維芽細胞の出現が認められる。

鼓膜：軽度の単球様細胞の浸潤が認められる。周辺部に近く軽度ではあるが滲出物の附着をみる。

中耳腔：粘膜上皮は膨化，腔内には線維索様物質を主体とする滲出液を容れ一部粘膜上皮と癒着を示す所もある。粘膜上皮下層は軽度ではあるが浮腫状を呈し，不規則な骨吸収が軽度ではあるが認められ，更に新に頰骨新生をみる箇所もある。

鼓室：かなり多量の滲出液を充し，粘膜上皮は膨化，一部脱落を示している所もある。粘膜上皮下層は浮腫，軽度の単球様細胞の出現をみる。

聴小骨：骨膜は一般に肥厚，不規則な骨吸収が認められる。

内耳：内リンパ腔内に軽度の滲出液を認め膜迷路壁は膨化を示すが概して著変はない。

No. 38 対照例，菌注入後 30 日目

外耳道：上皮は部分的に肥厚を示す所もあり一部欠損をみる所もあるが，細胞浸潤は極めて少く，滲出物も認められない。上皮上層は角化を示している。皮下組織は一般に浮腫性であるが，異常細胞出現は認められない。

鼓膜：一部は浮腫状を呈している所もあるが異常所見は殆んどない。

中耳腔：粘膜上皮層に著変なく，粘膜上皮下層は極めて軽度の浮腫を示す他，こゝにも特記すべき変化は認められない。なお腔内には極めて微量の細胞に乏しい滲出液を容れている。骨部に異常は認められない。

鼓室：粘膜上皮下層が軽度の浮腫状を呈し腔内に少量の線維索様物質を容れているが一般に著変は認められない。

聴小骨：Havers 氏腔の軽度の拡張をみる他著変は

認められない。

内耳：特記すべき変化は認められない。

No. 1 糖尿病例，菌注入後 30 日目

外耳道：上皮は一般に肥厚，鼓膜周辺では特に強く，乳頭の発育が著しい。皮下組織は肥厚，単球，組織球，リンパ球等の浸潤を認める。上皮の離脱，欠損をみる所もある。

鼓膜：肥厚が周辺部でかなり強く新しい肉芽の形成も認められ，特に周辺では線維芽細胞の出現に混じて単球，好中球の出現があり充血も強い。

中耳腔：粘膜上皮は膨化腫大，腔内には線維素様一部膿様の滲出物が認められる。粘膜上皮層及び下層に小出血の存在する所もある。骨膜下では骨吸収を相俟つて類骨新生も認められる。

鼓室：粘膜上皮層は肥厚，膿球を混じた網状滲出物の出現が認められる。粘膜上皮下層に出血をみる所もある。

聴小骨：骨膜は一般に肥厚，骨の窩状吸収が目立ち，Havers 氏腔はむしろ拡大を示す。

内耳：線維素様物質を容れ，膜迷路の膨化が目立つ。
組織所見小括

3 日目：対照例 (No. 21) に比べて糖尿病例 (No. 6) では外耳道上皮の破壊消失，皮下組織の炎性細胞の浸潤，鼓膜における組織の空胞形成，核消失等の変性像，中耳腔粘膜上皮の変性，上皮下層の浮腫，細胞浸潤，出血，骨部の吸収が強い。内耳における変化も強い。

5 日目：対照例 (No. 24) に比べて，糖尿病例 (No. 7) では外耳道上皮の変性，肥大，増生，皮下組織の細胞浸潤，中耳腔における粘膜の細胞浸潤，類骨組織の新生，聴小骨の蜂窩状吸収，内耳の変化が強く目立つ。鼓膜の変化は両者に大差は認められない。

7 日目：対照例 (No. 18, No. 32) に比べて糖尿病例 (No. 4) では外耳道における円形細胞の浸潤，出血，鼓膜の細胞浸潤，中耳腔の粘膜の腫大，充血，出血，細胞浸潤が極めて強い。鼓室，聴小骨においても粘膜骨膜における出血，骨吸収，滲出物出現が高度である。内耳においても細胞浸潤，出血が強い。

14 日目：対照例 (No. 15) は外耳道表層における滲出物は 7 日目より著しく減じているが糖尿病例では滲出物がなお多量に存し上皮下組織の細胞浸潤も強い。糖尿病例 (No. 3) では鼓膜中央部附近の出血が認められ，中耳腔粘膜の細胞浸潤，出血，骨吸収が極めて強い。鼓室及び聴小骨に肉芽が認められ内耳の充血が強い。

21 日目：対照例 (No. 19) に比べて糖尿病例 (No. 58) では外耳道における皮下組織の浮腫，中耳腔及び鼓室粘膜の浮腫，骨壁の吸収，新生が強い。聴小骨の変化も強い。鼓膜では大差は認められない。

30 日目：対照例 (No. 38) に比べて糖尿病例 (No. 1) では外耳道上皮の離脱，乳頭の発育，単球，組織球，リンパ球等の浸潤が強い。鼓膜では新しい肉芽形成，単球，好中球の出現が強い。中耳腔では No. 38 は粘膜の軽度の浮腫を示す他に骨部にも特に異常を認めないが No. 1 ではなお腔内に膿様滲出物を認め粘膜に出血，骨膜下では骨吸収及び新生が認められる。鼓室，聴小骨では対照例では殆んど変化が認められないが No. 1 では粘膜内出血，骨膜肥厚，骨の窩状吸収が目立つ。

IV 総括並に考按

以上の成績を総括すると糖尿病群では対照群に比べて外耳道上皮の剥脱，上皮下組織の細胞浸潤が強く，鼓室中耳腔の粘膜の浮腫，細胞浸潤，出血傾向が強く，骨壁の破壊，吸収，新生が著明である。聴小骨においても骨膜の肥厚，窩状吸収が著明である。外耳道，鼓室，中耳腔，内耳における滲出物の量も多い。又対照群では 14 日目から粘膜の浮腫が少くなり炎症像が少なくなつてきているが，糖尿病群ではその傾向がみられない。又病変の進み方の経過をみると，対照群では 3 日目，5 日目が最も変化が大で 7 日目以後は次第に変化が少なくなつてきている。一方糖尿病群では 3 日目，5 日目，7 日目よりも 14 日目の方がより変化が強くなっている。これは No. 3, No. 4 が血糖値が他に比べて高かつたことも原因の一つと思われる。21 日目，30 日目のものは変化は少なくなっているがなお，浮腫，小出血，骨吸収，新生が認められる。3 日，5 日，7 日，14 日，21 日，30 日の各時期の病変の状態を比較してみるといずれの場合も糖尿病群の病変が高度である。

茲において再び中耳炎と糖尿病の合併せる場合についての文献をみると Kirchner (1884)¹¹⁾，Rueda (1912)¹²⁾，Edgar (1915)⁹⁾ を始めとして数多く Schlander (1923)⁸⁾ は 73 才の糖尿病患者が急性中耳炎に罹患し，手術時側頭骨含気蜂窩に濃漿液性膿汁を充し，粘膜は炎症性に変化し，広範囲の骨破壊を認めたが遂に脳膜炎，膿血症で死亡した例を報告し，その中で糖尿病患者の急性中耳炎は広範囲に及ぶ骨破壊，瘻道を起すことを強調している。Bernfeld, K. (1926)⁹⁾ は 6 例の慢性中耳炎と糖尿病の合併している症例を経験し，そのうち重症 2 例について種々検査を行い中耳炎の症状も糖尿病自身に

関係があると述べている。統計的には Olrik, B.¹⁰⁾ によれば 2866 例の化膿性中耳炎中 11 例が糖尿病を合併し、そのうち 7 例が手術を施行されたが約 50% の死亡率であつた。又 Mygind, H.¹¹⁾ は約 1500 例の中耳炎を治療してその中に 6 例の糖尿病を認めたが 6 例中 5 例に手術が施行され、4 例が死亡し予後が悪いと述べ、糖尿病の場合、中耳炎は一般に慢性の経過をとるか、しばしば合併症を起すことが多いと述べている。Grossmann¹²⁾ によれば中耳炎で入院した患者中、糖尿病患者はその 72.7%、非糖尿病患者は 56.3% が手術を余義なくされたように糖尿病患者では合併症の発生が高率である。その他、現在迄多数の症例が報告されているが糖尿病の場合、中耳炎の経過が重篤であることには一致している。著者の実験成績も糖尿病の場合、中耳炎の病変が高度であり、諸家の臨床報告例と一致していることを示している。

次に著者の実験をふり返つてみると、著者は Alloxan によつて家兎に糖尿病を発症させたのであるが、糖尿病発症に関する研究は近年大いに進み、実験的糖尿病の発症方法としては脾摘による方法 (Mering & Minkowski)¹³⁾、脳下垂体前葉エネス投与による方法 (Haus say¹⁴⁾、Young¹⁵⁾)、葡萄糖の長期連続投与による方法 (Dohan & Bailey)¹⁶⁾、Alloxan 注射による方法 (Bailey & Bailey)¹⁷⁾ 等数多く報告されている。Alloxan 注射によつて糖尿病が発症するのは Alloxan が脾臓の β 細胞に選択的に作用して壊死を起すためであることが明らかにされている¹⁸⁾。家兎では切片に表れる Langerhans 氏島 1 個内には平均 α 細胞 13 個、 β 細胞 38 個であるが Alloxan 等の投与で α 細胞は 2～5 日後には 5 個以下、 β 細胞は 17～18 個となる。又脾臓全体の Insulin 含有量は 1/8～1/36 に激減することも認められている。Alloxan 等の化学試薬によつて発症した糖尿病は人体の糖尿病と類似の点が多い。

糖尿病の場合、中耳炎の病変が高度であるのは低抗性が減弱するためと考えられるが、糖尿病の場合何故易感染性であり、低抗力が減弱するかについての研究は各方面から進められている。内分泌関係では Insulin の不足があり、脳下垂体、副腎系については Alloxan 糖尿病家兎での特等¹⁹⁾ は脳下垂体前葉の好酸性細胞の軽度増加と好塩基性細胞の軽度減少を認め、池本²⁰⁾ は脳下垂体前葉細胞の退行性変性を認めている。近藤等²¹⁾ は脳下垂体後葉、間脳視索上核、脳室旁核における Gomori 陽性顆粒減少の傾向を認め、副腎皮質では

Cortical hypertrophy の像で細胞の肥大、増殖を認めている。平田²²⁾ は副腎剥出後、低血糖をきたした場合、Cortison 投与によつて速かに糖尿病状態に移行すると云つてゐる。衛藤等²³⁾ は Chlorpromazin が Alloxan 糖尿病発症を抑制するのは植物神経遮断による脳下垂体副腎系関与の抑制と考え度いと云つてゐる。これ等のことから考へて糖尿病の場合、脳下垂体副腎系の内分泌機能の失調があり、これが低抗性減弱の一因となると思われる。

次に血液及び組織内の糖濃度が従来から云われているが、実験的には健康な組織では 0.2～0.3% 位迄の糖濃度では障害はないが、ある種障害組織に対しては低濃度の糖でも有害性に働くことが認められている²⁴⁾。

又 Alloxan 糖尿病家兎で抗体産生能の低下、Opsonin 指数の低下、皮下組織の墨汁貪喰能低下、血清の細菌発育抑制能の低下²⁵⁾、白血球貪喰能の低下²⁶⁾、血液 Catalase の減少、血漿 Catalase の増加²⁷⁾ が認められている。糖尿病患者において血清 Jod 酸値、残余窒素増加及び A/G 比の低下²⁸⁾、著者の実験例においても粘膜内出血を多く認めたが、毛細血管抵抗性の減弱²⁹⁾、赤血球細胞の成熟障害が知られている³⁰⁾。糖尿病の場合、動脈硬化症を合併することが多いが、糖の処理能力の低下のみならず、蛋白、脂質代謝も障害され、脂肪代謝の異常から血中にヒヨロステリン等が増加して動脈硬化症が表れ、これも低抗性減弱の一因となり得ると考える。川野³¹⁾ は家兎の両側調圧神経を切除して血圧亢進、動脈硬化症を起させ、外耳、中耳の化膿性炎症は動脈硬化症著しいもの程著明なことから微環障害、それによる栄養障害から生体の抵抗力減退をきたすためであろうと云つてゐる。切替³²⁾ は糖尿病患者について血管系と関係ある諸疾患(高血圧症、動脈硬化症等)を合併するものに難聴者が多かつたと報告している。糖尿病で中耳炎を起した場合、早期に骨に著明な変化をきたすことが特徴と云われているが著者の実験においても骨の破壊吸収等の変化が著明であることを認めている。骨系統の変化について鈴木³³⁾ は糖尿病家兎の産仔の骨について管状骨の發育遲滯、組織学的に骨幹部に軟骨を含む骨梁の遺残著明、中間軟骨増殖帶菲薄、骨多孔症を認めた。加藤³⁴⁾ は耳下腺の退行性変化、軟骨細胞の変性萎縮、骨では吸収亢進、添加骨質減少による骨多孔症像を認め、池本²⁰⁾ は骨端線部に石灰化しない軟骨層が非常に幅広く存在しているのを認めている。阿部³⁵⁾ は Alloxan 糖尿病家兎で骨折時血清 Ca、無機 P 量は最高値

に達する時期が正常のものより約7日おくれ、骨折治癒現象の遅延しているのを認めている。又核蛋白代謝障害の結果 Allaxon が、又トリプトファン代謝過程でキサンテン酸生成の可能性が明らかにされ、これ等による糖尿病発症にも成巧している³⁰⁾。糖尿病に罹患している生体内に有毒物質の存在が考えられ、このため糖のみならず蛋白脂肪代謝にも障害を起し生体に不利な影響を及ぼすと考える。

糖尿病の場合は以上記した種々の悪い条件が重つて抵抗力が減弱するため、中耳炎に罹患した場合も病変が高度で経過も長くなるものと考ええる。

V. 結 論

家兎を Alloxan 糖尿病群と対照群とに分け、各群に黄色葡萄球菌で中耳炎を起させ、特に病理組織学的立場から次の結論を得た。糖尿病群では対照群に比べて

- 1) 外耳道上皮の剥脱、皮下組織の細胞浸潤が強い。
- 2) 鼓室、中耳胞において粘膜の浮腫、細胞浸潤、出血傾向が強い。
- 3) 鼓室、中耳胞の骨壁の骨吸収、新生が強い。
- 4) 聴小骨の骨膜肥厚、窩状吸収が高度である。
- 5) 内耳の病変が強い。
- 6) 治癒傾向がおそい。

文 献

- 1) Kirchner: Arch. f. O.H., 22: 16, 1884. 4) より引用.
- 2) Rueda: Mastoiditis bei einem Diabetiker. Monatschr. f. O.H. 66J. 1349, 1912.
- 3) Schlönder: Otitis media acuta, Diabetes mellitus, Meningitis purulenta, unter dem Bilde einer Pyämie verlaufend. Monatschr. f. O.H. 57J. 513, 1923.
- 4) Edgar, Th. O.: Klinische Untersuchungen über die Erkrankungen des Gehörgangs bei Diabetes mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankung des inneren Ohres. Monatschr. f. O.H. 69J. 225, 1915.
- 5) 山本隆: 糖尿病に併発せるベツオルド氏乳嘴突起炎の治験例(特にインシュリンの効果), 日耳鼻, 37, 206, 1931.
- 6) 犬塚衛: 糖尿病に併発する乳嘴突起炎の一例, 耳喉, 9, 501, 1936.
- 7) 佐藤日吉: 糖尿病と急性中耳炎との併発について, 日耳鼻, 46, 6, 762, 1935.
- 8) 佐藤日吉: 糖尿病患者における耳鼻咽喉科的観察, 耳喉, 11, 7, 637, 1938.
- 9) Bernfeld, K.: Mastoiditis bei Diabetes Mellitus. Monatschr. f. O.H. 60J. 980, 1926.
- 10) Olrik, B.: Affection de l'oreille chez les Diabètes. Acta Oto-Lar. Bd. V. 254, 1923.
- 9) より引用.
- 11) Migind, H.: La trepanation de l'apophyse mastoïde chez les diabétiques. Acta otolar. da nsise Bd. V 118, 1923. 10) より引用.
- 12) Grossmann: Handbuch der H.N.O. (Denker u. Kahler) Bd. 6, 660, より引用.
- 13) Mering, J. und Minkowski, O.: Diabetes mellitus nach Pankreasextirpation Zbl. Klin. med. S. 393, 1889, 18) より引用.
- 14) Houssay, B.A., A. Biassoti & C.T. Rictti: Action diabetogene de l'extrait antéhypophysaire. Compt. rend. Soc. de biol. Tome III. S. 479, 1932. 18) より引用.
- 15) Young, F.G.: (a) permanent experimental diabetes produced by pituitary (anterior lobe) injections, Lancet. Vol. 2, 372, 1937. (b) The diabetogenic action of crude anterior pituitary extracts. Bioch. J. Vol 32: 512, 1938. 14) より引用.
- 16) Dohan, F.C. & F.D.W. Lukens.: Experimental diabetes produced by the administration of Glucose. Endocr. Vol. 42, 244, 1948. 18) より引用.
- 17) Bailey, C.C. & D.T. Bailey: The production of diabetes mellitus in rabbits with alloxan. J. of Amer. med Assoc. Vol. 122, S. 1165, 1943. 18) より引用.
- 18) 岡本耕造: 糖尿病の実験的研究, 綜合医学, 9, 7, 346, 1952.
- 19) 的場直矢, 小関要, 伝法強, 佐藤輝夫: 歴代雄又は雌のみ Alloxan 糖尿病の子孫家兎の脾臓 Langerhans 氏島及び諸臓器, 組織の計測学的研究, 東北医学雑誌, 54, 3, 256, 1956.
- 20) 池本稔: 幼弱期糖尿病に関する実験的研究, 特に幼弱ウサギの糖尿病の発症と経過について, 神戸大医紀要, 4, 2, 692, 1953.
- 21) 近藤寒, 福井巖, 高本公, 松山愼一, 中村久男, 岡本健一, 川口英二: Alloxan 糖尿病家兎の病理組織学的研究, (1の1) 脳下垂体間脳副腎系(会), 日本内分泌学会雑誌, 32, 3, 169, 1956.
- 22) 平田幸正: Alloxan 糖尿病発生に及ぼす副腎剔除, Cortison 投与の影響, 日本内分泌学会雑誌, 32, 3, 170, 1956.
- 23) 衛藤鏖三郎, 片岡邦三, 山口与市: 実験的糖尿病における下垂体, 副腎系と植物神経系の関係(会), 日本内科学会雑誌, 32, 3, 172, 1956.
- 24) 館石叔: 糖尿病と神経痛(糖尿病の合併症と抵抗性減弱の成因及び治療), 日本医事新報, No. 1609, 3, 1955.
- 25) 館石叔, 吉田秀雄, 島田克己, 高田久, 佐藤東達, 後藤典信, 北村一善, 小寺恒次, 大坂文雄, 近藤寛, 高本公, 小池克己, 増田一郎: 糖尿病に関する研究(続報), 日本内科学会雑誌, 44, 5, 414, 1955.
- 26) 増田一郎: 生体防衛能

を基盤とせる実験的糖尿病に関する研究, 日本内分泌学会雑誌, 32, 9, 714, 1956. 27) 菅井治郎: 血液並に血漿 Catalase に関する実験的研究, Alloxan 糖尿病における血液並に血漿 Catalase の消長, 東北医学雑誌, 53, 3, 253, 1956. 28) 溝田輝彦, 友淵又右衛門, 楠野和一, 辻村久: 糖尿病の代謝異常, 日本消化機病学会雑誌, 51, 1, 7, 1954. 29) 伊川裕: 糖尿病患者の皮膚機能, 糖代謝と皮膚との関連, 四国医学雑誌, 9, 5, 250, 1956. 30) 蓮田正二: 糖尿病患者の骨髓像に関する研究, 東北医学雑誌, 48, 1, 23, 1953. 31) 川野昇: 高血圧及び動脈硬化症の聴器に及ぼす影響に関する実験的研究, 日耳鼻, 46, 4, 701, 1940. 32) 切替一郎: 糖尿病患者の聴器障害, 日耳鼻, 50, 10, 843, 1944. 33) 鈴木辰正: 実験的糖尿病母獣の産仔, (2) 骨変化, 大阪市立大学雑誌, 6, 1, 30, 1957. 34) 加藤明: Alloxan 糖尿病に関する研究, 特に唾液腺及び骨, 軟骨系統の変化, 千葉医学会雑誌, 31, 3, 323, 1955. 35) 阿部英生: 糖尿病と骨再生の実験的研究, 神戸大医紀要, 10, 2, 397, 1957. 36) 古武弥人: 糖尿病の実験的研究, 臨床消化機病学, 2, 9, 539, 1954.

付 図 説 明

- 第 1 図 No. 6, :糖尿病例, 菌注入後 3 日目
鼓室, 粘膜の浮腫高度
- 第 2 図 No. 21, 対照例, 菌注入後 3 日目
鼓室, 粘膜の浮腫中等度
- 第 3 図 No. 7, 糖尿病例, 菌注入後 5 日目
中耳胞, 骨質の吸収, 新生を認める.
- 第 4 図 No. 24, 対照例, 菌注入後 5 日目
中耳胞, 骨の変化殆んどなし.
- 第 5 図 No. 4, 糖尿病例, 菌注入後 7 日目

- 中耳胞, 粘膜の浮腫充血出血高度
- 第 6 図 No. 18, 対照例, 菌注入後 7 日目
中耳胞, 粘膜の肥厚中等度, 骨の吸収新生軽度
- 第 7 図 No. 4, 糖尿病例, 菌注入後 7 日目
鼓室, 粘膜の出血及び骨吸収著明
- 第 8 図 No. 18, 対照例, 菌注入後 7 日目
鼓室, 粘膜及び骨の変化軽度
- 第 9 図 No. 3, 糖尿病例, 菌注入後 14 日目
中耳胞, 粘膜内出血, 骨窩状吸収著明
- 第 10 図 No. 15, 対照例, 菌注入後 14 日目
中耳胞著変なし, 頬骨組織軽度新生
- 第 11 図 No. 58, 糖尿病例, 菌注入後 21 日目
中耳胞, 滲出物があり骨の吸収新生認められる.
- 第 12 図 No. 19, 対照例, 菌注入後 21 日目
中耳胞, 粘膜部分的に軽度肥厚し, 骨変化殆んどなし.
- 第 13 図 No. 1 糖尿病例, 菌注入後 30 日目
中耳胞, 粘膜に浮腫小出血認められる.
- 第 14 図 No. 38, 対照例, 菌注入後 30 日目
中耳胞, 著変なし.

稿を終るに臨み, 御指導御鞭撻を賜った恩師
故猿渡二郎教授, 本学病理学教室安保寿教授,
恩村雄太助教授, 耳鼻咽喉科学教室平野新治教
授, 土田武正助教授に深謝すると共に, 終始本
実験に協力された教室の諸兄に感謝致します

(原稿到着＝昭和 35.2.10 日)

高川論文付図(1)

第 1 図

第 2 図

第 3 図

第 4 図

第 5 図

第 6 図

高川論文付図(Ⅰ)

第 7 図

第 8 図

第 9 図

第 10 図

第 11 図

第 12 図

高川論文付図(Ⅲ)

第 13 図

第 14 図