HISTOLOGICAL STUDY OF SKIN GRAFT ON THE BONE IN MASTOID CAVITY.

By
H. ENOSHIMA

*From the Department of Oto-Rhino-Laryngology, Nagoya University School of Medicine
(Director Prof. Goto M.D. Prof. Tauchi M.D.)*

Histological studies of 133 skin grafts in bulla ossea of rabbits were made as one of the fundamental studies of tympanoplasty. The examination was done on 1st, 2nd, 3rd, 5th, 8th, 15th, and 30th postoperative day. The results were as follows:

New epithelium was regenerated under the degenerated old grafts on 3rd and 5th. day. The epithelium was thickened after 8th day. The epithelialization was disturbed by infection, excessive pressure, dryness and insufficient immobilization of the grafts.

When mucus membrane was present, cyst formation was frequent and the grafts were scarcely taken. On the periosteum, the grafts were easily taken and epithelialization was satisfactory. On the bone without periosteum, the grafts were difficult to be taken and epithelialization was also disturbed. When the bone was injured prior to the graft, thick layer of granulation tissue was seen between the skin and bone. Regeneration of the bone was seen on 5th day but organization of the bone tissue was not seen even on 30th day.

Thick grafts contained many hair follicles and sebaceous glands which became atrophied and formed vacuoles later. Therefore, thin grafts were thought to be better than thick ones.

骨面皮膚移植に関する組織学的研究

名古屋大学医学部耳鼻咽喉科学教室（主任：後藤修二教授）
名古屋大学医学部第二病理学教室（主任：田内久教授）

研究生 榎 島 寛 美
エノ シマ ヒロ キ

目 次

第1章 緒 言	1
第2章 実験材料及び実験方法	2
第1節 実験動物	2
第2節 手術法	3
第3節 標本作製法	4
第3章 実験成績	5
第4章 総括並に考按	10
第5章 結 論	11
主要文献	12
附 図	13

第1章 緒 言

古来聴器に対する手術的治療はその第1目的として合併症の予防にあつたが、その当時より既に聴力の犠牲を

最小限に止めんとする方法が種々考案されてきた。しかしながら、やはり合併症を予防して、生命の危険から救うことが主体であつた。ところが急性炎症が化学療法、抗生物質によつてその進展を防止し得るに至つた最近においては、手術的療法の目的の主たるものを失つたのである。

ここにおいて、その目的も合併症予防から、炎症消退を計るという方向に向つたのであるが、慢性化膿性中耳炎の場合、中耳根治手術又は保存的中耳手術を施しても、術後の耳漏の消失しないものがある。このことは、炎症が完全に消失しておらず、手術方法の不完全を意味している。このため、乳突鼓室根治手術、乳突鼓室錐体手術が実施されるに至つたが、この手術によつて、炎症の消退という目的は達せられたが、耳骨連鎖という音伝

導系を犠牲にするため、聴力も犠牲にされることが少ない。

かくして古くから行われている保存的手術が聴力を犠牲にしないという意味で重要視されてきた。そこで炎症を消退せしめて、聴力を保存する手術法ということが考えられるのである。

また一方においては、聴力を保存するのみでなく更に恢復せしめんとする努力が払われてきた。即ち Lemper, Shambaugh 等の内耳開窓術の成果と、音伝導機構に関する研究の進歩と共に 1952 年, Moritz, Zöllner, Wullstein の方法が相次いで発表され、1953 年, 1954 年には, Zöllner, Wullstein は自己の手術法を整理して発表, Mundnich も、1953 年独自の手術法を発表している。我が国においては、1952 年後藤教授が始めて発表され、これを「聴力増進中耳根治手術」と命名され、その後 3 回にわたって、同手術法の改良法を発表せられ、その手術方法も「鼓室成形術」とされた。

しかしてこの手術方法の基礎的研究の一環として、私は動物に、かかる手術的操作を実施して、骨壁に移植された皮弁が癒着する際、1) 骨壁の状態のいかん、2) 皮弁の厚、薄がいかに影響するかを研究し、もつて本手術における骨面への植皮の最良条件を求めんとした。

第2章 実験材料及び実験方法

第1節 実験動物

実験動物としては、体重 3.0kg 前後の白系の健康成熟家兔を用いた。

第2節 実験方法

まず耳骨胞前壁をノミで広く除去して、耳骨胞を開放した。次いで耳骨胞内壁は、1) 粘膜を残すもの、2) 粘膜を除去して骨膜を残すもの、3) 粘膜及び骨膜を除去して骨は傷つけないもの、4) 粘膜及び骨膜を除去して骨も表面を傷つけたもの、以上 4 種の状態になるように意図して、それぞれ、1) 耳骨胞を開放しただけ、2) ガーゼ片で耳骨胞内部を拭く、3) 鋭匙で軽く内部を搔把する。4) 鋭匙で強く内部を搔把する。という処置をした。

しかして、かかる骨壁に移植する皮膚は、耳介内面の皮膚を薄く剝離し、1) これをそのままのものを、皮弁の厚いものとし(附図 1)、2) 同一皮膚片を、リンゲル氏液を入れた滅菌シャーレ中で、剃刀をもつてできるだけ薄くなるように真皮をけづいたものを、皮弁の薄いものとした(図 2)。

前記方法で処置した耳骨胞内壁に、これら皮弁をお

き、感染予防の目的をもつて、テトラサイクリンの粉末を附着したガーゼ片を栓塞して手術を終った。

爾後、毎日実験動物の創面及び健康状態に留意し、ガーゼ交換は手術後 3 日目に初回を行い、その後は 2～3 日の間隔で行った。このガーゼ交換も感染予防のために、テトラサイクリンの粉末をガーゼ片に附着したものを使用した。

第3節 標本作製法

以上の手術を行つて、1) 粘膜を残したもの、2) 粘膜を除去して骨膜を残したもの、3) 粘膜及び骨膜を除去して骨に損傷のないもの、4) 粘膜及び骨膜を除去し更に骨まで傷つけたものの各 4 種類の動物を、更にそれぞれ植皮後、1 日、2 日、3 日、5 日、8 日、15 日、30 日の日数経過後に断頭して、耳骨胞のみを剔出し、10% フォルマリン液で固定、イオン交換樹脂で脱灰し、水洗、補強アルコールで脱水後、ツェルロイジン・パラフィン包埋を行い、3～5μ の連続切片を作製、ヘマトキシリン・エオジン重染色を施し、バルサムで封入後、鏡検した。

第3章 実験成績

上記の方法によつて作製した標本は、皮弁の厚いものでは 67 例、皮弁の薄いものでは 66 例で、この 133 例は移植後、1 日、2 日、3 日、5 日、8 日、15 日、30 日のものである。これらにおける皮弁並に骨胞内の粘膜、骨膜、骨の変化を検索した結果は次の通りである。

I 採取直後の皮弁の所見

本実験の対照として先ず使用皮弁の組織を検索した結果は次のようである。表皮は最下層にヘマトキシリンに良染した核の明瞭な円柱状の基底細胞が 1 層認められ、その配列もほぼ整然としている。その上部に扁平な棘細胞が 1～2 層認められるが、細胞間隙及び細胞間橋は認め難い。更に上部の顆粒細胞は不明でエオジンに良染した角質がある。乳頭の発育は悪く殆ど認められない。真皮においては結合組織細胞の核は明瞭であり、細胞浸潤も殆どなく、毛嚢及び皮脂腺は正常である。

II 表皮所見の分類

本実験による表皮の所見は複雑であるから、次のように整理した。

1. 最下層に円柱状の基底細胞が一層あり、配列も正しく、ヘマトキシリンに良染し核も明瞭である。その上部に 1～2 層のや扁平な棘細胞があり核も明瞭であるが、細胞間橋及び細胞間隙は認め難い。更に上部の顆粒細胞は不明で角質に移行している。

2. 基底細胞は上と同様であるが、棘細胞は、核の濃縮、崩壊があり胞体も小型で退行変性像を示しその数も少く、大部分が角質によつて置き換えられている。

以上の、1と2は、基底細胞がよく保持されているもので、Ⅰ型と仮称する。

3. 基底細胞にも核の濃縮があり胞体も小型で、配列が乱れ、ところどころに空胞化を伴う退行変性像を示し、棘細胞も退行変性像を示している。

4. 基底細胞は上と同様な退行変性像を示し、退行変性像を示す棘細胞の大部分が角質によつて置き換えられている。

以上の、3と4は、基底細胞が退行変性像を示すもので、Ⅱ型と仮称する。

5. 表皮細胞の大部分が、薄い角質によつて置き換えられている。

6. 表皮細胞が認められない

以上の、5と6は、表皮の変性が高度なもので、Ⅲ型と仮称する。

7. 最下層に配列の正しい染色性良好な、円柱状の基底細胞が1層あり、この基底細胞は、上記1のものに比して胞体はやゝ大きく核も大きくて明瞭であるが、やゝ扁平なものもある。棘細胞は認められず、その上部には、上記3, 4, 5のような退行変性像を示す表皮細胞がある。

8. 最下層には、7と同様な基底細胞があり、その上部には1～2層のやゝ扁平な棘細胞があり、染色性も良好で核も明瞭である。この棘細胞も上記1のものに比して、胞体はやゝ大きく核も大きい。その上部に前記3, 4, 5のような退行変性像を示す表皮細胞がある。

以上の、7と8は基底細胞がよく保持されているが、この基底細胞は上記1とはやゝ異つており且つ上部には変性像を示す表皮細胞が認められるもので、Ⅳ型と仮称する。

9. 最下層に配列の正しい円柱状の基底細胞が1層あり、染色性も良好で胞体も大きく核も大きくて明瞭である。その上部に3～5層のやゝ扁平な棘細胞があり胞体も大きく、核も大きくて明瞭で、細胞間橋及び細胞間隙も認められるものもある。最上層には1～3層の顆粒細胞があり、ケラトヒアリン顆粒も認められ角質に移行する。角質は極めて菲薄なものもある。乳頭の発育は余りよくないが極めて良好なものもある。

この9は、表皮細胞が肥厚像を示しているものでこれをⅤ型と仮称する。

表皮所見の記載は、各型の部分の多いものはⅢ、少ないものは+とし、その中間のものは++として表示した。

Ⅱ 植皮後1日の所見

この成績は、表1に示す通りである。

表 1

No.	皮 膚											粘 膜	骨 膜	骨
	表 皮					真 皮								
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	硝子化	細血管	毛嚢	皮脂腺	肉芽	化膿			
	法	型	型	型	型	血	生	血	生	生	生	分	有	有
1	+	+	+			++	正	正	正			+	++	++
2	+	+	+			+	正	正	正				++	++
3	+	+	+			+	正	正	正				++	++
4	+	+	++	+		++				++				
5	+	+	+	+		+				+				
6	+	+	++	+		++								+
7	+	+	+	+		+								+
8	+	+	+			+		+				+	++	++
9	+	+	++			++	正	正					++	++
10	+	+	++	+		++	+						++	++
11	+	+	+	++	+	++				+				
12	+	+	++	+	+	++								
13	+	+	+	+	+	+		++				+	++	++
14	+	+	+	+	+	+								+
15	+	+	+			+		+	+					
16	+	+	++	++	+	+	+							+

皮弁の表皮は、Ⅰ型の部分の多いもの5例（No. 1, 2, 3, 8, 16）においては、真皮の硝子化がないもの（No. 1, 2, 8）と、軽度なもの（No. 3, 16）があり、細血管の充血があり、毛嚢、皮脂腺は正常である。Ⅰ型の部分の少ないもの2例（No. 9, 15）では、硝子化のないもの（No. 9）と、硝子化が軽度なもの（No. 15）とがあり、細血管の充血は1例（No. 9）において認められ、毛嚢は正常であるが皮脂腺が軽度に萎縮しているもの（No. 9）及び毛嚢が軽度に萎縮しているもの（No. 15）がある。Ⅱ型の部分では、硝子化は軽度又は中等度で、この部分の多いもの9例（No. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15）においては、この部分の真皮は硝子化が中等度なもの（No. 4, 5, 6, 7, 10, 13）が多く、毛嚢、皮脂腺も萎縮しているもの（No. 4, 13）がある。細血管の充血は1例（No. 10）に認められた。Ⅲ型の部分では真皮の硝子化は高度で、この部分の多いもの2例（No. 11, 12）では、細血管の充血がない。淋巴球、好中球を主とする円

形細胞の浸潤は3例 (No. 8, 11, 15) において認められ、皮弁の深層が浮腫状を呈しているものは1例 (No. 5) あり、出血のあるものは5例 (No. 1, 6, 7, 9, 10) である。皮弁と粘膜又は骨膜、骨とは未だ癒着は認められず接しているのみで、この部分のやゝ多いものは8例 (No. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14) で、少ないものは2例 (No. 1, 4) あり、粘膜、骨膜がなく骨に損傷のないもの (No. 3, 5, 11, 12, 14) に多い。その他のものは、接している部分が極めて少い (No. 6, 13) か、小間隙をもつて離れている (No. 8, 10, 15, 16)。

粘膜のあるもの3例 (No. 1, 8, 13) では、粘膜上皮に著変はなく、骨膜に出血及び細血管の充血がある。淋巴球、好中球を主とする円形細胞の浸潤のあるもの (No. 8, 13) がある。皮弁の表皮は厚いものではⅠ型の部分が多く、薄いものではⅡ型であるものが多い。

粘膜がなく、骨膜のあるもの2例 (以下骨膜のあるものと記す。No. 2, 10) では骨膜に出血及び細血管の充血があり、淋巴球、好中球を主とする円形細胞の浸潤がある。皮弁の表皮は厚いもの (No. 2) は、Ⅰ型で、薄いもの (No. 10) ではⅡ型である。

粘膜、骨膜がなく、骨に損傷のないもの6例 (以下骨に損傷のないものと記す。No. 3, 4, 5, 11, 12, 15) では骨に著変はなく、皮弁の表皮は、厚いもの3例 (No. 3, 4, 5) では、Ⅰ型のものは1例 (No. 3) で、他のものはⅡ型である。薄いもの3例 (No. 11, 12, 15) ではⅠ型が少部分あるものが1例 (No. 15) あり、他の部分はⅢ型の部分が多い。

粘膜、骨膜がなく、骨に損傷のあるもの5例 (以下骨の損傷のあるものと記す。No. 6, 7, 9, 14, 16) では、その損傷は軽微で骨に著変は認められない。皮弁の表皮は、厚いもの3例 (No. 6, 7, 9) では、Ⅰ型が少部分あるものが2例 (No. 6, 9) あり、他のものはⅡ型である。薄いもの2例 (No. 14, 16) では、Ⅱ型のみであるもの (No. 14) とⅠ型のあるもの (No. 16) とがある。

Ⅳ 植皮後2日の所見

この成績は、表Ⅱに示す通りである。

皮弁の表皮は、Ⅰ型の部分の多いもの4例 (No. 18, 19, 20, 26) では、真皮の硝子化はなく、少ないもの3例 (No. 17, 21, 27) では、硝子化が軽度なもの (No. 17, 21) と中等度なもの (No. 27) があり、中等度なものでは、皮弁内に淋巴球、好中球を主とした化膿性の細胞浸潤を認める部分があり、その部分の表皮はⅢ型である。Ⅱ型の部分が多いもの7例 (No. 17, 21, 22, 23, 28, 31,

表Ⅱ

No	皮 弁												粘 膜		骨 膜				骨						
	厚	表 皮				黄 皮				化 脓	肉 芽	子 欠	テ	出 血	細 血管	肉 芽	骨 質								
		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ									Ⅸ	Ⅹ	Ⅺ	Ⅻ	Ⅼ	Ⅽ	Ⅾ	Ⅿ
17	厚	+	+										+		+	+	+								
18	厚	+	+												+	+	+								
19	厚	+	+										+		+	+	+								
20	厚	+	+												+	+	+								
21	厚	+	+																						
22	厚	+	+																						
23	厚	+	+																						
24	厚	+	+																						
25	厚	+	+																						
26	厚	+	+												+	+	+								
27	厚	+	+												+	+	+								
28	厚	+	+																						
29	厚	+	+																						
30	厚	+	+																						
31	厚	+	+																						
32	厚	+	+																						
33	厚	+	+																						
34	厚	+	+																						
38	厚	+	+																						

32) では、硝子化は軽度なもの (No. 17, 21, 22, 23, 32) が多く、硝子化の高度なものは2例 (No. 28, 31) である。その1例 (No. 28) には皮弁に軽度の化膿性炎症を認めた。Ⅲ型の部分の多いもの8例 (No. 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 38) では、凡て硝子化が高度である。皮弁内に出血のあるものは7例 (No. 18, 19, 20, 21, 23, 25, 32) あり、これらはⅠ型及びⅡ型の部分に多く、Ⅲ型の部分にあるものは1例 (No. 25) のみであり、又皮弁の厚いもの (No. 18, 19, 20, 21, 23, 25) に多い。細血管の充血は6例 (No. 17, 20, 21, 23, 26, 32) で、Ⅰ型のあるもの4例 (No. 17, 20, 21, 26) と、Ⅱ型で硝子化が軽度なもの2例 (No. 23, 32) である。毛嚢及び皮脂腺はⅠ型である部分では正常であるが、Ⅱ型及びⅢ型の部分では萎縮しているものが多い。少量の淋巴球、好中球を主とする円形細胞の浸潤があるもの (No. 17, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33) があり、Ⅱ型であるもの (No. 21, 22, 23, 28, 31, 32) に多い。このうち真皮が浮腫状を呈しているものは、皮弁の厚いものに2例 (No. 17, 24) あつた。皮弁に化膿性炎症を認めたものは6例 (No. 24, 27, 28, 30, 32, 34) で、その部分の表皮はⅢ型であるものが多い。Ⅱ型であるものは1例 (No. 32)

のみであり、皮弁の厚いものは2例 (No. 24, 28) で、他は凡て皮弁の薄いものである。

皮弁と粘膜、骨膜及び骨とは未だ癒着は認められずに接しているが、この部分の多いものは7例 (No. 17, 19, 21, 23, 26, 32, 33)、やゝ多いものは4例 (No. 22, 30, 31, 38) でこれは粘膜のあるものは3例 (No. 17, 19, 26)、骨に損傷のないものは7例 (No. 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33)、骨に損傷のあるもの1例 (No. 38) である。これらのうち、粘膜のあるものは3例とも、骨に損傷のないものは1例 (No. 21) が表皮はⅠ型であるが、他の7例では表皮はⅡ型又はⅢ型である。又接している部が極めて少ないか、離れているものは8例 (No. 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 34) で、そのうち表皮がⅠ型であるものは、粘膜のあるもの1例 (No. 27)、骨膜のあるもの2例 (No. 18, 20) である。

粘膜のあるもの4例 (No. 17, 19, 26, 27) では粘膜上皮が少部分において消失しているもの (No. 17) があり、又皮弁の真皮側に反転して再生しているのを認めた。骨膜は浮腫状で細血管の充血があり、淋巴球、好中球を主とする円形細胞の浸潤及び線維芽細胞の浸潤を認めた。出血のあるもの (No. 17, 26) もある。皮弁は厚いもの (No. 19) も、薄いもの (No. 26, 27) も表皮はⅠ型の部分の多いものがある。

骨膜のあるもの3例 (No. 18, 20, 29) では、2例 (No. 18, 20) に細血管の充血、淋巴球、好中球を主とする円形細胞及び線維芽細胞の浸潤を認め皮弁はⅠ型の部分が極めて多い。他の1例 (No. 29) においては、骨膜細胞を認めないエオジンに赤染した薄層が皮弁との間に存在し、且つ皮弁も表皮の変性が高度であり真皮の硝子化も甚だ高度である。

骨に損傷のないもの8例 (No. 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33) では、骨に著変は認められない。皮弁の厚いもの4例 (No. 21, 22, 23, 24) では、Ⅰ型のあるものは1例 (No. 21)、Ⅱ型のものは2例 (No. 22, 23) で、Ⅲ型であるものは1例 (No. 24) あり、これは皮弁の化膿している部分が多い。皮弁の薄いもの4例 (No. 30, 31, 32, 33) では、表皮がⅡ型のものは2例 (No. 31, 32) あり、他の2例 (No. 30, 33) はⅢ型で、その1例 (No. 30) は皮弁の化膿した部分が多く、真皮も硝子化が極めて高度である。

骨に損傷のあるもの4例 (No. 25, 28, 34, 38) では、骨小管内に細胞浸潤があり、骨の充血を認めるものが1例 (No. 25) あつた。表皮がⅡ型であるものは、皮弁の

厚いものに1例 (No. 28) あり、他のものは表皮細胞の変性は高度である部分が多い。

V 植皮後3日の所見

この成績は、表Ⅲに示す通りである。

表Ⅲ

No.	皮 弁										粘 膜										骨 膜										骨																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	表 皮					真 皮					化 膿					骨 質					血 管					血 管					血 管					血 管																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	硝子化	細血管	毛細血管	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽	肉芽

皮弁の表皮は、Ⅰ型である部分の多いものは1例 (No. 56) のみで、この部分の真皮は硝子化はなく、少ないものも1例 (No. 45) で、この部分の硝子化は中等度である。Ⅱ型のみであるものが非常に少なく2例 (No. 51, 62) のみで、真皮は硝子化が中等度である。表皮がⅢ型の部分の多いものは5例 (No. 53, 59, 60, 61, 66) あり、このうちの3例 (No. 59, 60, 66) はⅡ型の部分が少しあるが、真皮の硝子化は中等度なものは2例 (No. 59, 61) で、他の3例 (No. 53, 60, 66) は硝子化は高度で且つ皮弁内に化膿を認めた。Ⅳ型の多いものが5例 (No. 41, 42, 43, 46, 47) あり、このうち真皮の硝子化のないものが2例 (No. 43, 47) あり、他のものは硝子化が軽度である。又Ⅳ型の部分の少ないものは6例 (No. 44, 45, 52, 54, 55, 58) で、真皮の硝子化が軽々なものが4例 (No. 44, 52, 54, 55) で、他の2例 (No. 45, 58) は硝子化が中等度である。

細血管の充血のあるものは7例 (No. 43, 45, 46, 55,

56, 58, 59) で、表皮はⅠ型のものが2例 (No. 45, 56) で、他の5例はⅣ型である。淋巴球、好中球を主とする円形細胞の浸潤が増加しているものが多く、細胞浸潤のないものは3例 (No. 43, 51, 66) である。線維芽細胞の浸潤を認めたものは9例 (No. 41, 44, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 58) で、表皮がⅠ型の部分の多いもの1例 (No. 56) と、Ⅱ型のもの1例 (No. 53) を除いて、他はみなⅣ型の部分にあるものである。真皮の出血は2例 (No. 55, 56)、浮腫は2例 (No. 45, 55) において認めた。化膿は4例 (No. 42, 53, 60, 66) において生じ、その中の3例 (No. 53, 60, 66) まで、表皮はⅢ型であり真皮の硝子化も高度である。他の1例 (No. 42) においては化膿が認められる部分の表皮はⅡ型で真皮の硝子化は高度であるが、他の部分では表皮はⅣ型で真皮も硝子化が軽度である。

皮弁が粘膜、骨膜、骨から小間隙をもつて離れている部分では、表皮はⅡ型であるが、癒着している部分では表皮がⅣ型である部分のものが多く、又表皮にⅢ型の部分の多いもの5例 (No. 53, 59, 60, 61, 66) 中、骨と単に接着している部分の多いものは1例 (No. 59) あり、他の2例 (No. 53, 66) は、骨との間に淋巴球、好中球、好酸球を主とした細胞浸潤があり化膿がある。

粘膜のあるもの6例 (No. 42, 43, 45, 46, 47, 56) では、骨膜内に細血管の充血、線維芽細胞及び円形細胞の浸潤が認められ、細血管の新生のあるもの (No. 43, 56) もある。粘膜上皮が消失している部分のあるもの (No. 42, 43, 47, 56) があり、その部分では皮弁真皮内に線維芽細胞が浸潤しているのを認める。骨膜が浮腫状になつていもの (No. 43, 45, 56) もあり、出血のあるもの (No. 46) もある。皮弁の厚いもの3例 (No. 43, 45, 46) では表皮はⅣ型の部分があり、皮弁の薄いものでは、表皮はⅠ型のもの (No. 56) とⅣ型の部分のあるもの (No. 42, 47) とがある。

骨膜のあるもの4例 (No. 41, 44, 58, 60) では、骨膜に化膿性の炎症のあるものが1例 (No. 60) あり、その他のものでは細血管の充血、線維芽細胞、円形細胞の浸潤が著明であり、皮弁内に浸潤している部分があるもの (No. 41, 44, 60) がある。細血管の新生を認めるもの (No. 41, 58) もある又骨膜が軽度の浮腫状を呈しているもの (No. 58) や、出血のあるもの (No. 44) もある。皮弁の厚いもの2例 (No. 41, 44) では表皮がⅣ型の部分があり、皮弁の薄いもの2例 (No. 58, 60) では化膿したもの (No. 60) では表皮はⅡ型もあるがⅢ型の部分が多

く、他のもの (No. 58) では、Ⅳ型の部分がある。

骨に損傷のないもの6例 (No. 51, 54, 55, 59, 61, 62) では、骨小管内に充血、細胞浸潤が認められる。皮弁の厚いもの3例 (No. 51, 54, 55) では、表皮はⅡ型のもの (No. 51) 及びⅣ型の部分のあるもの (No. 54, 55) がある。皮弁の薄いもの3例 (No. 59, 61, 62) では、表皮はⅡ型のもの (No. 62) と、Ⅲ型の多いもの (No. 59, 61) があり、1例 (No. 59) は骨面に多くの部分が付着しており、他の1例 (No. 61) は骨面から全く離れている。

骨に損傷のあるもの3例 (No. 52, 53, 60) では、皮弁の厚いもの2例 (No. 52, 53) のうち、1例 (No. 53) は、皮弁に化膿があり表皮はⅢ型である。他の1例 (No. 52) は損傷骨面に骨芽細胞が浸潤し皮弁との間に厚い肉芽織が形成されており、一部皮弁内に侵入し、この部分の表皮はⅣ型の部分がある。皮弁の薄いもの (No. 60) は皮弁に化膿が甚だしく、表皮はⅣ型が多く真皮の硝子化も高度である。

Ⅵ 植皮後5日の所見

この成績は、表Ⅳに示す通りである。

皮弁の表皮は、Ⅳ型を認める部分の多いものは4例

表Ⅳ

No.	皮 分										粘 膜				骨 膜				骨			
	表 皮					真 皮					化 膿		血 管		細 血管		骨 質		骨 質		骨 質	
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	硝子化	出血	浮腫	新生	浸潤	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
67	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
68	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
69	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
70	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
71	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
72	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
73	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
74	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
75	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
76	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
77	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
78	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
79	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
80	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
81	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
82	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
85	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
86	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

(No. 69, 70, 73, 79) で、この部分の真皮には硝子化を認めない。このうちⅠ型の部分が接続しているものは2例 (No. 69, 79) あり、この部分の真皮もまた硝子化を認めない。他の1例 (No. 70) では、Ⅱ型の部分が接続しておりこの部分の真皮には淋巴球、好酸球、好中球を主とする細胞浸潤が著明で化膿性炎症があり硝子化も高度である。又皮弁の表皮にⅣ型を認める部分の少ないものは9例 (No. 68, 71, 72, 74, 77, 78, 81, 82, 86) で、この部分の真皮に硝子化を認めないものは2例 (No. 68, 77) で、硝子化が軽度なものは3例 (No. 71, 74, 81) で、他の4例 (No. 72, 78, 82, 86) には硝子化が中等度に認められる。しかしこれらにⅡ型の部分が接続しているものは4例 (No. 68, 71, 74, 86) で、この部分の真皮に硝子化が軽度なものは1例 (No. 68)、中等度なものは1例 (No. 74)、他の2例 (No. 71, 86) においては硝子化が高度で且つその部分に化膿を認める。又Ⅲ型の部分が接続しているものは5例 (No. 72, 77, 78, 81, 82) で、この部分の真皮の硝子化が軽度なものは2例 (No. 77, 81)、中等度なものは1例 (No. 78)、高度なものは2例 (No. 72, 82) である。以上の他、表皮にⅣ型の部分を認めないものは6例 (No. 67, 75, 76, 80, 83, 85) で、Ⅱ型の部分のみのものは2例 (No. 67, 83) で、1例 (No. 67) は真皮の硝子化が中等度で、他の1例 (No. 83) は硝子化が高度である。又Ⅲ型の部分のみのものは4例 (No. 75, 76, 80, 85) で、このうち真皮の硝子化が中等度なものは1例 (No. 80) で、他の3例 (No. 75, 76, 85) は硝子化が高度で、このうちの1例 (No. 85) は皮弁の化膿が甚だしい。

真皮内細血管の充血は6例 (No. 68, 69, 70, 73, 77, 79) においてみられ、細血管の新生は3例 (No. 69, 73, 79) に認められ、いずれも主として表皮がⅣ型である部分が多く、真皮の硝子化のない部分においてみとめられる。線維芽細胞及び淋巴球、好中球を主とした円形細胞の浸潤は大部分のものにみられるが、3例 (No. 75, 76, 83) においては認められず、これらの表皮はいずれもⅢ型で真皮の硝子化も高度なものである。肉芽組織を認めるものが12例 (No. 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 82, 86) あり、そのうちの3例 (No. 70, 78, 80) は極めて少なく、又1例 (No. 80) のみ表皮はⅢ型であるが、他は凡て表皮はⅣ型の部分である。真皮が軽度浮腫状を呈しているものは4例 (No. 67, 68, 74, 79) あり、毛嚢、皮脂腺は正常なものもあるが萎縮しているものが多く、皮弁の厚いものに多くみられる。

粘膜のあるもの4例 (No. 69, 73, 77, 78) では、1例 (No. 73) は皮弁は遊離している。粘膜上皮が一部消失し骨膜よりの肉芽組織で、一部分皮弁と癒着しているもの3例 (No. 69, 77, 78) があり、癒着部内に粘膜上皮が残存しているのを認められたが、大部分皮弁との間に細隙があり、癒着端より皮弁の真皮側にやや扁平になった粘膜上皮が反転して再生している。骨膜内には凡て細血管の充血、新生が認められ肉芽組織が増生されている。又骨膜が浮腫状に腫脹しているもの (No. 69, 78) もある。皮弁の厚いもの2例 (No. 69, 73) の表皮はⅣ型の部分が多く、皮弁の薄いもの2例 (No. 77, 78) では少ない。

骨膜のあるもの5例 (No. 68, 70, 71, 79, 81) では、肉芽組織によつて癒着している部分が多いもの (No. 70, 71, 81) と、間隙をもつて離れているもの (No. 68, 79) がある。骨膜内には肉芽組織が増生し、細血管の充血及び新生が認められる。骨膜が浮腫状に腫脹しているものが2例 (No. 68, 70) あり、その1例 (No. 70) は骨膜の一部に化膿性の炎症を生じている。皮弁の厚いもの3例 (No. 68, 70, 71) では、表皮はⅣ型の部分が多く、その2例 (No. 70, 71) は皮弁の一部に化膿を認めた。皮弁の薄いもの2例 (No. 79, 81) では、表皮はⅣ型の部分が多いもの (No. 79) と少ないもの (No. 81) がある。

骨に損傷のないもの6例 (No. 72, 74, 75, 82, 83, 86) では、骨小管内に線維芽細胞、円形細胞が浸潤し、骨小管開口部において特に著明で皮弁内に侵入し一部肉芽組織によつて癒着しているもの (No. 72, 74, 82, 86) がある。又骨壁に接着しているが、表皮はⅡ型又はⅢ型で真皮の硝子化が極めて高度なもの (No. 75, 83) がある。皮弁の厚いもの3例 (No. 72, 74, 75) も、薄いもの3例 (No. 82, 83, 86) も、表皮はⅣ型の部分は少ないもの4例 (No. 72, 74, 82, 86) と、表皮がⅢ型又はⅡ型のみのもの (No. 75, 83) とがある。皮弁の薄いもので一部に化膿のあるものが1例 (No. 86) あつた。

骨に損傷のあるもの4例 (No. 67, 76, 80, 85) では、損傷骨面に骨芽細胞が増生して肉芽組織を形成し皮弁と癒着しているものが、皮弁の厚いもので1例 (No. 67)、薄いもので1例 (No. 80) ある。皮弁の厚いもの (No. 67, 76) では、表皮がⅡ型のもの (No. 67) と、Ⅲ型のもの (No. 76) があり、Ⅲ型のものでは真皮の硝子化が高度で、骨の損傷は軽微であり且つ骨面より大部分が遊離している。皮弁の薄いもの (No. 80, 85) では、表皮はⅢ型で1例 (No. 80) において硝子化が中等度で骨とは肉芽組織により一部癒着しているが、他のもの (No. 85)

では真皮の硝子化も極めて高度で且つ皮弁及びその周囲に化膿性炎症があり、皮弁は骨面より遊離し骨との間には、淋巴球、好酸球を主とする化膿性の細胞浸潤があり、骨の充血が強い。

Ⅶ 植皮後8日の所見

この成績は、表Ⅴに示す通りである。

表Ⅴ

No.	号	皮 弁										粘 膜		骨 膜		骨
		表 皮					真 皮					欠スデ	出 血	細 血 管	肉 芽 織	骨 質 浸 潤
		Ⅰ型	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	硝子化	血管	毛 囊	皮 脂 腺	肉 芽 織					
87	厚															++
88	〃	+						++			+		++	++	+	
89	〃	+						++	正	正	+	+	++	++	+	
90	〃							++			+		++	++	+	
91	〃							++			+	+	++	++	+	
92	〃							++			+					
93	〃							++			+	+	++	++	+	
94	〃							++								
95	〃	+						++	++	++	+	+				++
96	法	+						++			+	+	++	++	+	
97	〃							++			+	+	++	++	+	++
98	〃							++	++	++	+	+	++	++	+	
99	〃	++						++				+	++	++	+	
100	〃							++	++	正	+	+	++	++	+	
101	厚							++	++	正	+	+	++	++	+	
102	法							++	++		+	+	++	++	+	
103	〃							++				+				
104	〃							++	++	正	+	+	++	++	+	
107	〃							++			+	+	++	++	+	
109	〃							++								+
111	〃							++			+	+	++	++	+	++

皮弁の表皮は、Ⅴ型の部分の多いものが10例(No. 88, 89, 90, 91, 98, 100, 101, 102, 104, 107)ある。この部分の真皮に硝子化を認めないものは7例(No. 88, 89, 90, 100, 101, 104, 107)で、このうち1例(No. 100)は肉芽織で置き換えられている。又細血管の充血及び新生がある。毛嚢及び皮脂腺は正常なものが多い。線維芽細胞及び円形細胞の浸潤のあるもの(No. 88, 89, 90, 104, 107)が多く、肉芽織も増生しているもの(No. 89, 100, 101, 104, 107)が多い。この部分に接続して、Ⅱ型の部分のあるものが2例(No. 88, 89)あり、いずれもⅡ型の部分の真皮は化膿があり硝子化も中等度から高度である。Ⅴ型の部分の真皮に硝子化が軽度で認められるものは3例(No. 91, 98, 102)で、いずれも細血管の充血、新生があり、線維芽細胞及び円形細胞の浸潤があり肉芽織も増生されている。Ⅴ型の部分の少ないものは1

例(No. 96)で、真皮は硝子化が軽度で、細血管の新生があり、線維芽細胞及び円形細胞の浸潤があり肉芽織が増生されⅤ型の部分に接続してⅡ型の部分があり、硝子化が軽度で軽度の化膿を認める。Ⅳ型の部分のあるものが3例(No. 87, 95, 97)あり、この部分の真皮は硝子化が中等度で細血管の充血及び新生は1例(No. 95)にみられ、線維芽細胞及び円形細胞の浸潤は3例共にあり、肉芽織は2例(No. 87, 97)においてみられた。この部分にⅠ型の部分が接続しているのが1例(No. 95)あり、このⅠ型の部分の真皮はⅣ型の部分の所見と同様である。Ⅱ型の部分のみあるものは3例(No. 92, 93, 94)で、このうち真皮に硝子化が中等度にあるものは2例(No. 92, 93)で細血管の充血があり、1例(No. 92)は化膿があり、毛嚢皮脂腺の萎縮がある。線維芽細胞及び円形細胞の浸潤があり肉芽織を認めるものが1例(No. 93)ある。他の1例(No. 94)は真皮の硝子化が高度である。Ⅲ型の部分の多いものは4例(No. 99, 103, 109, 111)でいずれも真皮の硝子化は高度である。1例(No. 99)は、Ⅱ型が少部分あり、このⅡ型の部分の真皮は同様に硝子化が高度である。皮弁の一部に化膿を認めたものは2例(No. 103, 111)で、うち1例(No. 111)は化膿のない部分に線維芽細胞及び円形細胞の浸潤があり肉芽織を認めた。又Ⅴ型の表皮の上部にⅡ型の表皮が萎縮した皮脂腺と共に剝離しているもの(No. 98)がある。

粘膜のあるもの5例(No. 88, 89, 91, 98, 104)では、粘膜上皮が消失して肉芽織により癒着している部分のあるもの(No. 91, 98, 104)もあり、この癒着部内には粘膜上皮がやや扁平化して一部残存しているものがあり、チステを形成しているもの(No. 91, 98)もある。このチステの内腔は1～2層の円柱上皮からなっている。癒着がなくて、粘膜面より皮弁が遊離しているもの(No. 88, 89)もある。粘膜上皮は扁平化して皮弁の真皮側に再生している。骨膜内には細血管の充血及び新生があり、肉芽織が増生されている。1例(No. 88)においては、粘膜及び骨膜の一部分に化膿性の炎症を認め、この部分の粘膜上皮は炎症性の多層配列があり骨膜も腫脹している。皮弁の厚いもの3例(No. 88, 89, 91)も、薄いもの2例(No. 98, 104)も表皮はⅤ型である。

骨膜のあるもの5例(No. 90, 99, 100, 101, 102)では、4例(No. 90, 100, 101, 102)は細血管の充血及び新生があり肉芽織が増生されている。皮弁と骨膜が肉芽織でよく癒着しているものは3例(No. 100, 101, 102)。

で、この部分の表皮はⅤ型である。骨膜より離れているものが1例(No. 90)あるがこの部分の表皮はⅤ型である。他の1例(No. 99)の骨膜はエオジンに赤染して菲薄になり骨膜細胞もなく、皮弁はこの変性した骨膜によく接着しているが、表皮はⅢ型である。皮弁の厚いもの2例(No. 90, 101)は、表皮はⅤ型で、薄いもの3例(No. 99, 100, 102)も同様Ⅴ型であるが、1例(No. 99)のみ表皮はⅢ型である。又1例(No. 100)は真皮が膠原化した肉芽織で置き換えられている。

骨に損傷のないもの6例(No. 92, 93, 94, 96, 103, 107)では骨に充血があり、骨小管内に線維芽細胞及び円形細胞の浸潤があり、肉芽織でもつて皮弁と一部癒着しているものが3例(No. 93, 96, 107)あり、1例(No. 93)は、皮弁は厚いもので表皮はⅡ型で、他の2例(No. 96, 107)は、皮弁は薄いもので表皮はⅤ型である。皮弁の厚いもの3例(No. 92, 95, 94)は、表皮はⅡ型で、1例(No. 94)は真皮の硝子化が高度で骨面から遊離し、1例(No. 92)は皮弁が化膿して皮弁と骨との間には化膿性の細胞浸潤がある。皮弁の薄いもの3例(No. 96, 103, 107)では、表皮はⅤ型で骨と肉芽織で癒着しているものが2例(No. 96, 107)あり、他の1例(No. 103)の表皮はⅢ型で皮弁及びその周囲に化膿があり真皮の硝子化も高度である。

骨に損傷のあるもの5例(No. 87, 95, 97, 109, 111)では、損傷骨面に骨芽細胞が増生して厚い肉芽織を形成し、皮弁と癒着しているもの(No. 87, 95, 97)があり、表皮はⅣ型である。その他の1例(No. 111)は骨芽細胞の増生も少なく、肉芽織も余り厚くなくて皮弁と癒着している。この表皮はⅢ型であるが、癒着部分の真皮には硝子化は認められず、他の部分では化膿性の炎症があつて真皮の硝子化が高度である。又他の1例(No. 109)は、骨の損傷が軽微な骨面に、表皮はⅢ型で真皮の硝子化も極めて高度な皮弁が接着している。皮弁の厚いもの2例(No. 87, 95)では、表皮はⅣ型であり、皮弁の薄いもの3例(No. 97, 100, 111)では、表皮はⅣ型のもの(No. 97)と、Ⅲ型のもの(No. 109, 111)とがある。

Ⅷ 植皮後15日の所見

この成績は、表Ⅶに示す通りである。

皮弁の表皮は、Ⅴ型であるものが多く17例(No. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 132)ある。この部分の真皮に硝子化を認めないものは13例(No. 113, 114, 115,

表Ⅶ

No.	皮 弁											粘 膜	骨 膜	骨
	表 皮					真 皮								
	Ⅰ型	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	Ⅴ型	硝子化	血管新生	肉芽織	肉芽織	肉芽織	肉芽織			
	法	型	型	型	型	血	血	血	血	血	血			
113	粘				Ⅲ				+	+	+	+	+	
114	厚				Ⅲ	++	正	正	+	+	+	+	++	
115	"	+			Ⅲ	++		+	+	+	+	++		
116	"				Ⅲ	++	+	+	+	+	+	++		+
117	"				Ⅲ	++	+	++	+	+	+	++		
118	"				Ⅲ	+	++	++		+	+	++		+
119	"				Ⅲ				+	++	++	++		+
120	"				Ⅲ	++	正	正	+	+	+			
121	"				Ⅲ	++	+	+	+	+	+			++
122	"				Ⅲ	++	正	正	+	+	+	++		+
123	粘				Ⅲ	+	++		+	+				
124	厚				Ⅲ	++	正	正	+	+				++
125	粘				Ⅲ	+	++		+	+				++
126	"	+			Ⅲ	+				+				++
127	厚				Ⅲ			+		+				
128	粘	++	+		Ⅲ				+	++	+	+	+	+
129	"		++		Ⅲ				+					+
130	"				Ⅲ				+	+	+	+	++	
131	"	+			Ⅲ				+	+	+	++		
132	"				Ⅲ	++	+	+	+	+	+	++		+
133	"				Ⅲ						+			
134	"	++	+		Ⅲ				++	++				
135	"				Ⅲ									

116, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 130, 131, 132), 硝子化が軽度なものは2例(No. 125, 126), 中等度なものは2例(No. 118, 123)である。これらには細血管の充血及び新生があり、線維芽細胞、円形細胞の浸潤のあるもの(No. 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 132)が多い。又皮弁が粘膜より遊離して皮弁内に肉芽織が僅かにみとめられるもの2例(No. 122, 132)を除いて、他は凡て肉芽織で癒着している。このⅤ型の部分に、Ⅱ型の部分が接続しているものが2例(No. 115, 131), Ⅲ型のものが1例(No. 126)あり、Ⅱ型の部分の真皮はⅤ型のものと変化はないが、Ⅲ型のものは真皮の硝子化が極めて高度である。Ⅱ型の部分とⅢ型の部分とが共にあるものが2例(No. 128, 134)あり、Ⅱ型の部分の真皮は、硝子化が中等度で、肉芽織により癒着しているがⅢ型の部分では、真皮に化膿があり硝子化も極めて高度である。この他に表皮の変性が高度でⅢ型のものが4例(No. 127, 129, 133, 135)あり、真皮の硝子化は極めて高度で、その中の2例(No. 127, 129)は皮弁に化膿があり、1例(No. 133)はエオジンに赤染して骨膜細胞を認めない菲薄な層によく接着している。他の1例(No. 135)は骨膜がなく損傷のない骨面

によく接着している。毛嚢及び皮脂腺は正常なものもあるが萎縮高度なものもあり、変性になった既存表皮と共に剝離しているもの (No. 116, 123) も認めた。

粘膜のあるもの 6 例 (No. 113, 116, 119, 122, 128, 132) では、粘膜上皮が消失して皮弁と癒着しているものが 4 例 (No. 113, 116, 119, 128) あるが、皮弁との間には細隙のある部分があり、又チヌテを形成しているもの (No. 113, 116, 119) もある。このチヌテの内壁は 1～2 層の内柱上皮からなっている。癒着部内に一部粘膜上皮が残存しているものもあり、この上皮は扁平化しているものもある。皮弁は粘膜面より遊離しているもの (No. 122, 132) がある。骨膜内には細血管の充血及び新生があり、肉芽組織が増生されている。粘膜及び骨膜の一部分に化膿を認めたもの (No. 128) もありこの部分の皮弁も化膿がある。皮弁の厚いもの 3 例 (No. 116, 119, 122) は表皮は V 型であり、皮弁の薄いもの 3 例 (No. 113, 128, 132) では表皮が V 型であるものは 2 例 (No. 113, 132) で他の 1 例 (No. 128) の表皮はⅡ型の部分とⅢ型の部分があり、Ⅱ型の部分では真皮の硝子化は中等度で肉芽組織で癒着しているが、Ⅲ型の部分では真皮の硝子化は極めて高度で化膿があり、その部分の粘膜、骨膜にも化膿が認められる。

骨膜のあるもの 7 例 (No. 114, 115, 117, 118, 130, 131, 133) では、細血管の充血及び新生があり、肉芽組織が増生されて皮弁と癒着し、その 1 例 (No. 130) は膠原化した肉芽組織で真皮は置き換えられているが、1 例 (No. 133) のみは、骨膜はエオザンに赤染して菲薄化し骨膜細胞も認められない。しかしてこれにⅢ型真皮の硝子化も極めて高度である皮弁が密に接着している。皮弁の厚いもの 4 例 (No. 114, 115, 117, 118) では表皮は V 型である。皮弁の薄いもの 3 例 (No. 130, 131, 133) では、2 例 (No. 130, 131) は、表皮が V 型であるが、他の 1 例 (No. 133) はⅢ型である。

骨に損傷のないもの 5 例 (No. 120, 123, 127, 134, 135) では、骨壁と皮弁との間に骨膜性の肉芽組織が増生されて皮弁と癒着しているもの (No. 120, 123, 134) があり、骨小管内には線維芽細胞及び充血が認められる。癒着している部分の表皮は V 型のものが多いが、1 例 (No. 134) のみはⅡ型で硝子化も中等度で且つ他の部分に化膿があり、この部分の表皮はⅢ型である。皮弁の厚いもの 2 例 (No. 120, 127) は、1 例 (No. 120) が V 型で他の 1 例 (No. 127) はⅢ型である。皮弁の薄いもの 3 例 (No. 123, 134, 135) では、1 例 (No. 135) は

Ⅲ型であり、他の 1 例 (No. 134) は表皮がⅡ型の部分とⅢ型の部分があり、Ⅲ型の部分の真皮には化膿がある。

骨に損傷のあるもの 5 例 (No. 121, 124, 125, 126, 129) では、骨に充血があり、損傷骨面には多数の骨芽細胞が集簇して骨の再生機転がみられ、それより肉芽組織が増生されて皮弁と癒着しているもの (No. 121, 124, 125, 126) があり、これらの表皮は V 型である。

又、損傷が軽微で骨に著変がないもの (No. 129) では、皮弁の表皮はⅢ型で真皮に化膿があり硝子化が極めて高度であり、骨とはよく接着している。皮弁の厚いもの 2 例 (No. 121, 124) は、表皮は V 型で癒着があり、皮弁の薄いもの 3 例 (No. 125, 126, 129) では、癒着しているもの (No. 125, 126) は、表皮は V 型であるが、他の 1 例 (No. 129) は表皮はⅢ型で骨とは癒着はなく、ただ接着しているのみであり化膿している部分が僅かにある。

Ⅱ 植皮後 30 日の所見

この成績は、表Ⅶに示す通りである。

皮弁の表皮は、V 型の部分のものが 12 例 (No. 145, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160) あり、真皮は硝子化のないもの (No. 145, 150, 151,

表Ⅶ

No.	月	皮 弁										粘 膜		骨 膜		骨	
		表 皮		真 皮		化 膿		骨 質		血 管		有	チヌテ	出 血	細 血管	骨 質	骨 質
		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	硝子化	細血管	肉芽	肉芽	肉芽						
144	法		Ⅲ														+
145	法			Ⅲ													++
146	法		Ⅲ														
147	法			Ⅲ	+			+	+	+	+			+	+		
148	法			Ⅲ	+									+			
149	法			Ⅲ	+			+	+	+	+						++
150	法			Ⅲ													
151	法			Ⅲ				+	正	正	+			+	+	+	+
152	法		Ⅲ														
153	法		Ⅲ														+
154	法			Ⅲ				+	正	正	+						
155	法			Ⅲ	+			+	+	+	+						++
157	法			Ⅲ				+	+	+	+						++
158	法			Ⅲ	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
159	法			Ⅲ				+				+	+	+	+	+	+
160	法			Ⅲ				+	+			+	+				+

154, 160), 硝子化の軽度なもの (No. 147, 149, 158) 硝子化の中等度なもの (No. 148, 155) 及び線維性の肉芽組織で置き換えられているもの (No. 157, 159) とがある。細血管の新生があり, 肉芽組織で癒着しているものが多い。皮弁が粘膜面より遊離しているもの (No. 151) では, 肉芽組織は認められないが, 真皮内に線維芽細胞, 円形細胞の浸潤がある。骨膜面より遊離しているもの (No. 148) も肉芽組織は認められず線維芽細胞及び円形細胞の浸潤が著明であつた。Ⅲ型のみもの (No. 144, 146, 152, 153) では, 真皮の硝子化も極めて高度であり, その中の1例 (No. 152) は骨膜のない骨壁によく接着している。他の3例 (No. 144, 146, 153) では, 皮弁は化膿している。毛嚢及び皮脂腺は正常なものもあるが, 萎縮しているものもある。萎縮しているものの中で空胞化しているもの (No. 147) もあつた。表皮の乳頭の発育は良くないものが多いが, 時に良好なものもある。

粘膜のあるもの2例 (No. 151, 158) では, 骨膜に細血管の新生があり, 肉芽組織が増生し一部線維化されている。皮弁と一部分癒着しているもの (No. 158) では, 粘膜上皮が残存してチステを形成し, 他の部分では細隙があり, この部分の皮弁の真皮側には, 扁平化した粘膜上皮が再生している。他のもの (No. 151) では, 皮弁は粘膜面より遊離している。皮弁の表皮は厚いもの (No. 151) も薄いもの (No. 158) も共にⅤ型である。

骨膜のあるもの4例 (No. 147, 148, 159, 160) では, 骨膜は線維性の肉芽組織で皮弁と癒着しているが, 1例 (No. 148) では皮弁と骨膜とが遊離している。皮弁の表皮は, 皮弁の厚いもの2例 (No. 147, 148) も薄いもの2例 (No. 159, 160) も共にⅤ型である。

骨に損傷のないもの4例 (No. 146, 150, 152, 154) では, 骨小管内に線維芽細胞及び充血があり, 骨膜性の線維化した肉芽組織で皮弁と癒着しているもの (No. 150, 154) では, この肉芽組織は粘膜のあるもの, 骨膜のあるものに比して少ない。又他の1例 (No. 152) は, 表皮はⅢ型で真皮も硝子化が極めて高度であり, 骨面と密に接着している。皮弁の表皮は癒着しているものでは, 皮弁の厚いもの (No. 154) も薄いもの (No. 150) もⅤ型であるが, 癒着していないものでは, 皮弁の厚いもの (No. 152) も薄いもの (No. 146) もⅢ型である。

骨に損傷のあるもの6例 (No. 144, 145, 149, 153, 156, 157) では, 骨の陥凹部に多数の骨芽細胞が集簇して骨の充血があり, 骨の再生機転を認め, 皮弁は骨膜と連続する陳旧な肉芽組織を形成して癒着しているもの

(No. 145, 149, 155, 157) がある。これらのものゝ表皮はⅤ型である。又皮弁の表皮がⅢ型のもの2例 (No. 144, 153) では皮弁に化膿があり, 骨との間にも化膿性の細胞浸潤がある。皮弁の表皮は, 癒着しているものでは, 皮弁の厚いもの2例 (No. 145, 149) も薄いもの2例 (No. 156, 157) もⅤ型で, 癒着していないものでは, 皮弁の厚いもの (No. 153) も薄いもの (No. 144) もⅢ型で, 真皮も硝子化が極めて高度であり, 且つ化膿している。

第4章 総括並に考按

以上の実験成績を総括して, これに考按を加えれば次のようである。皮弁の表皮は, 移植後1日の16例においてⅠ型の部分の多いものは5例 (No. 1, 2, 3, 8, 16), 少ないものは4例 (No. 6, 9, 10, 15) で, 他の7例はいずれもⅠ型の部分が認められない。この7例中, Ⅱ型の部分の多いものが5例 (No. 4, 5, 7, 13, 14) で他の2例 (No. 11, 12) はⅢ型の部分の多いものであるがⅢ型の部分のみものはない。移植後2日の19例においては, Ⅰ型の部分の多いものは4例 (No. 18, 19, 20, 26), 少ないものは3例 (No. 17, 21, 27) で, 他の12例はいずれもⅠ型の部分が認められない。この12例中, Ⅱ型の部分の多いものは5例 (No. 22, 23, 28, 31, 32) で, 他の7例 (No. 24, 25, 29, 30, 33, 34, 38) はⅢ型の部分が多く, この中の3例 (No. 24, 30, 34) はⅢ型の部分のみであつた。移植後3日の19例では, Ⅰ型の部分があつてⅣ型のないものは1例 (No. 56) のみである。他の18例中, 初めてⅣ型の部分が11例 (No. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 58) において認められた。残りの7例中, Ⅱ型の部分のみものが2例 (No. 51, 62), Ⅱ型とⅢ型の部分が共にあるものが3例 (No. 59, 60, 66), Ⅲ型の部分のみが2例 (No. 53, 61) あつた。植皮後5日の19例では, Ⅳ型の部分のあるものが13例あり, このⅣ型の部分が多いものは6例 (No. 69, 70, 73, 74, 78, 79), 少ないものは7例 (No. 68, 71, 72, 77, 81, 82, 86) である。他の6例中, Ⅲ型の部分のみものは4例 (No. 75, 76, 80, 85) で残りの2例 (No. 67, 83) はⅡ型の部分のみである。植皮後8日の21例では, Ⅳ型の部分のあるものは3例 (No. 87, 95, 97), Ⅱ型の部分のあるものが3例 (No. 92, 93, 96), Ⅱ型とⅢ型の部分が共にあるものが3例 (No. 94, 99, 103), Ⅲ型の部分のみものが2例 (No. 109, 111) で残りの10例中 (No. 88, 89, 90, 91, 98, 100, 101, 102, 104, 107) において初めてⅤ型の部分が認められた。植皮後

15 日の 23 例では、V 型の部分のあるものが 17 例 (No. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 132) で非常に多く、残り 6 例中、Ⅱ型とⅢ型の部分が共にあるものが 2 例 (No. 128, 134) で、他の 4 例 (No. 127, 129, 133, 135) はⅢ型の部分のみである。植皮後 30 日の 16 例では、V 型の部分のものが 12 例 (No. 145, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160) で残りの 4 例 (No. 144, 146, 152, 153) はⅢ型の部分のみであった。

以上の成績から、中耳腔内の骨面に移植された遊離皮弁の表皮は、術後 1～2 日においては、その基底細胞がよく保持されている部分のあるものもあるが、退行変性像を示す部分のあるものもある。術後 3～5 日ではⅣ型の部分のあるものが多くなっているが、このⅣ型の表皮 (付図 9, 10) は、一方正常な表皮細胞の変性の移行像と考えられ、又一方ではこの変性崩壊に対する表皮細胞の再生の像と考えられる。特に付図 18, 22 にみるように、高度に萎縮した皮脂腺を伴って変性像を示す既存表皮が剝脱しているものでは明らかに表皮は新しく再生されたものである。しかして術後 8 日以後では、V 型即ち表皮細胞は肥厚 (付図 18～28) している。即ち皮弁は、初め退行変性を示すが 3～5 日後には新しく再生され、以後は環境の変化、即ち耳介部から中耳腔内に移植されたことが一つの因子となつて肥厚すると考えられる。この移植皮弁の再生については、津田が鼓膜成形術を行つた際の発表では、表皮層の剝脱と同時に基底細胞から表皮層の再生が行われると述べている。

又上記のように良好な表皮化が認められないものもある。特に 15 日以後、表皮の肥厚がないもの 10 例 (No. 127, 128, 129, 133, 134, 135, 144, 146, 152, 153) について考察すると、No. 128, 134 の 2 例は、表皮はⅡ型の部分とⅢ型の部分がありそのⅢ型の部分の真皮は硝子化が高度で化膿があるが、Ⅱ型の部分の真皮は硝子化が中等度で肉芽織を認め癒着がある。このことは、この化膿のために隣接した部分も影響を受けて皮弁の表皮化が妨げられているが、癒着があり、この部の表皮はⅡ型であるから、若し将来において化膿が治癒すれば、一方では表皮化が行われずに肉芽織による器質化も考えられるが、又一方では表皮化が行われるとも考えられる。勿論皮弁全部に化膿が波及すれば表皮化は行われないであろうが、いずれにしてもこの 2 例はその後の表皮化不良とは断定できない。次に No. 127, 129, 144, 146, 153 の 5 例は、いずれも表皮はⅢ型のみで真皮の硝子化は極

めて高度であり且つ化膿も広範囲に認められ、皮弁は遊離しているから、これは化膿による表皮化不良のものと考えられる。又 No. 133, 135, 152 の 3 例は、いずれも表皮はⅢ型のみで真皮の硝子化も極めて高度であるが化膿は No. 129 に少部分あるのみで他はない。しかしこの 3 例に共通していることは、骨膜 (No. 133) 又は骨面に密に接している部分が多いことである。ことに No. 133 においては骨膜は極めて菲薄でエオジンに赤染し且つ骨膜細胞を認めないことにより、恐らくは移植後皮弁をガーゼで圧迫することが過度であつたためと中耳腔内が乾燥していたために組織液乃至は血液の循環が阻害され皮弁は勿論骨膜までも壊死の状態になつたものと考えられる。これと同様な所見は術後 8 日の No. 99 においても認められた。以上の所見によりこの 3 例は移植の際、皮弁を附着するためにガーゼ片で過度に圧迫したことに加えて内部が乾燥したものと考えられる。この 10 例中、前記の 2 例 (No. 128, 134) を除いた 8 例は骨膜のあるもの 1 例 (No. 133)、骨に損傷のないもの 4 例 (No. 127, 135, 146, 152)、骨に損傷のあるもの 3 例 (No. 129, 144, 153) である。更に移植後 8 日のもの 21 例では、表皮にⅢ型の部分のあるものは 5 例あり、骨膜のあるもの 1 例 (No. 99) については前述の通りである。骨に損傷のないもの 2 例 (No. 94, 103) のうち No. 94 は皮弁が骨面より遊離しており、No. 103 は皮弁に化膿がある。骨に損傷のあるものは 2 例 (No. 109, 111) で No. 109 は No. 129 (術後 15 日) と同様に損傷が極めて軽微な骨面と密に接着している。No. 111 は皮弁内に化膿がある部分があり、化膿のない部分では肉芽織を認め癒着がある。以上のことから、皮弁の表皮化を妨げる原因としては、(1) 皮弁が化膿する、(2) 皮弁を過度に圧迫すると共に中耳腔が乾燥した場合、(3) 皮弁が粘膜、骨膜及び骨面から遊離した場合、(4) 更に骨壁の状態として、骨膜のない場合が考えられる。

真皮は、移植後 1～2 日では、表皮がⅠ型の多いものでは硝子化はなく、Ⅱ型の多いものでは軽度のものが多いが、Ⅲ型の多いものでは高度なものが多い。移植後 3～5 日では、表皮にⅣ型即ち再生像が認められるものでは硝子化はないが軽度のものが多い。移植後 8 日以後では、表皮がⅤ型のものでは硝子化の認めないものや軽度のものが多い。表皮がⅢ型の部分では、硝子化は高度であり、その部分に化膿を認めるものが多い。

細血管の拡張充血は移植後 1 日からみられ、表皮のⅠ型の部分に多く認められるがⅢ型の部分では認めらず、

3～5 日では表皮の再生が行われている部分に多く、8 日以後では表皮が肥厚を示す部分に多く認められる。

多核白血球、淋巴球を主とする細胞浸潤は、移植後 2 日から認められ、線維芽細胞の浸潤は移植後 3 日で表皮再生のある部分に認められる。移植後 5 日では骨壁側よりの肉芽組織で癒着するものが多くその部分の表皮は再生像を示しているものが多い（付図 11, 12, 13）。移植後 8 日以後ではこの肉芽組織は増生して癒着部は多くなり細血管の新生を伴い表皮は V 型であるものが多い（附図 18～28）。皮弁の薄いものでは真皮がこの肉芽組織で置き換えられているものがある（付図 19, 20, 25, 27）。

皮弁の栄養に関しては、陳実は植皮初期の組織内液体循環、次いで組織内液体循環と血液循環の移行期、肉芽期の血液循環、そして修復期の血液循環の 4 期に分けて記述し、永山、橋本等は家兎を用いて、鼓室成形術を試みて遊離皮弁を移植し、これ等に上行大動脈経由、墨汁、リンゲル氏液を注入した結果、皮弁断端の細血管断端と粘膜上皮の細血管とが通じて血液供給を行うのは、ほぼ 1 週間であると述べている。又、W. Krey 及び O. Bandtrow は遊離皮弁の栄養補給を実験するため、モルモットの背部皮膚の両側に、反対側の皮弁を移植して縫合し、腹部皮下に種々な蛍光染料、Fluorochrome (Natri, Fluoreszine の 15% 水溶液, Rhodamin B の 10% 水溶液, Acridinorange の 7.5～10% 水溶液) を注射して蛍光顕微鏡下、乃至は青色光線下で、蛍光が正常皮膚並に下層部に認められ、3 時間後には皮弁も周囲と同一程度に発光し 3 日後に徐々に蛍光は減退し、7～8 日後で蛍光を失うと述べている。私の成績では、移植後 1～3 日まででは皮弁に細血管の新生がみられず、移植後 5～8 日で骨壁側より肉芽組織が皮弁に侵入すると共に細血管も新生されることにより、皮弁の栄養は移植後 3 日まででは組織内液体により行われ、移植後 5～8 日で血液循環が始り、それ以後は血液循環によるものと解される。

皮弁の厚い薄いについては、児玉、浜田は、両者に一長一短あつてその優劣は決定し得ずと述べ、陳実は、真皮及び皮下組織の薄いほど生着し易いと述べているが、私の実験では、厚いものは皮脂腺や毛嚢を多く有するために、その多くに皮脂腺、毛嚢の萎縮を生じ、ひいてはその空胞化を認めたもの（付図 26）があつた。かゝる点からすれば、皮弁は薄いものの方がよいが、反面、薄いものは化膿性の炎症を生ずるものが厚いものに比してやゝ多かつた。この点に関しては、天野、田中（英）も既に

記述し、この原因については術後の栄養障害より起る抵抗の減弱が化膿性炎症を発生し易いと述べているが、私の成績からも同様であると思われる。肉芽組織の増殖は厚いものの方が多く、皮弁も肥厚していると認められるものがあつた。薄いものでは肉芽組織の増生は少なく、皮弁の真皮が肉芽組織で置き換えられるものは移植後 30 日では全例において認められた。

粘膜上に移植した場合には、移植後 1 日で粘膜下の骨膜に細血管の拡張充血を認め（No. 1 付図 3）、多核白血球、淋巴球を主とする細胞浸潤は移植後 2 日において認められ粘膜上皮細胞は、移植後 2 日で皮弁と接する一部分において消失しているのを認め、又皮弁の真皮側に反転再生しているもの（No. 17, 19, 26 付図 6）を認めた。移植後 3 日では線維芽細胞及び円形細胞の浸潤が骨膜内に認められ肉芽組織が新生しているもの（No. 56 付図 8）があつた。移植後 5 日では骨膜内に肉芽組織が新生して、粘膜上皮細胞の認められない部分より真皮内に侵入し細血管の新生も認められるもの（No. 69, 77, 78 付図 14）があるが、皮弁と粘膜とは未だ多くの細隙を有し皮弁の真皮側には反転再生した粘膜上皮細胞があり、又皮弁が粘膜面より離れているものが 1 例（No. 73）があるが、表皮は V 型の部分がある。移植後 8 日では骨膜よりの肉芽組織は増生し皮弁と癒着する部分が多くなるが皮弁と粘膜との間には細隙のある部分があり（No. 98 付図 20）この癒着部内に粘膜上皮が一部残存しやゝ扁平化しているものや、テストを形成しているもの（No. 91, 98）がある。このテストの内腔は 1～2 層の円柱上皮からなっている。粘膜面から皮弁が遊離しているもの（No. 88, 89）もあるが表皮は凡て V 型の部分が多い。移植後 15 日以後の 8 例においては、癒着の認められるものは 5 例（No. 113, 116, 119, 128, 158）ありその 1 例（No. 128）は、表皮は II 型であるが他の 5 例は V 型で且つテストを認めた（付図 21, 23）。しかして他の 2 例は癒着した部分を認めないが、表皮は V 型である。このテストの成因については、西端等は術後、残存した円柱上皮が進展してきた重層扁平上皮の下に陥入し、表面に近い部分が癒着し、排泄が阻害されてテストを形成すると述べている。友田は家兎の鼻中隔粘膜を下肢の皮下へ移植するとテストを形成し、円柱上皮は扁平化すると述べ、これについて西端は、遺存粘膜が術後、周囲から増生した肉芽組織の内に埋没された場合、終いにはテストを形成することは充分考えられると述べている。私の実験では、移植後 2 日で粘膜上皮の一部分が消失しているの

を認め、移植後3日では、その消失した部分より肉芽組織が皮弁内に侵入し且つ癒着部内に樹枝状の粘膜上皮が圧迫され、やゝ扁平化して残存しているもの(付図8)を認め、又皮弁は粘膜と癒着している部分が少く、粘膜と間隙を有している部分が多く、その皮弁真皮側に粘膜上皮が再生反転していることにより、かゝる小さな粘膜の消失部は(1)手術時、耳骨腔前壁を開放する際、骨片が粘膜上に落下して粘膜を傷つけ、(2)その骨片を取り出す際、骨片又は鑷子で再び粘膜を傷つけたり、(3)No. 56(付図8)のように、皮弁の表皮がⅡ型で菲薄化していることにより皮弁を粘膜上に圧迫したために接着部の粘膜上皮が退行変性して遂には消失した部分を生じ、(4)この他、皮弁と粘膜が、ずれて磨擦を生じ(3)と同様な経過で粘膜の消失部が生じ、そのところより肉芽組織が皮弁内に侵入して癒着し、以上の如き部分が近接している部分では肉芽組織が増生して互に癒合するが、その際粘膜と皮弁とが小間隙を有している部分で癒着部分に閉塞されたものが一部は樹枝状に残存し一部はチステになるのではないかと思考される。又移植後15日以後の癒着のあるものでも、皮弁は粘膜面と間隙を有している部分があり、又表皮はⅤ型でも遊離しているものが2例(No. 122, 132)あることは、移植の際、粘膜上に皮弁を圧迫することが不足であつたことも考えられるが、一方では粘膜と皮弁とは癒着は甚だ生じ難いとも考えられる。しかし中耳成形手術において、術創の治癒とは、Mayer等は術創全面の完全な表皮化であると述べ、Grunert, Laurowitsch, Lange等を始めとし、いずれも術後その経過を観察し、術創全面の完全な表皮化をもつて完全治癒又は理想的治癒となしている。かゝる皮弁の完全な表皮化を妨げる重要な因子が、手術時における遺残粘膜であることが、Lange, Wittmack, Bruner等によつて臨床的に又病理学的立場から述べられており、かゝる点からしても、粘膜が存在することは望ましくない。

骨膜上に移植した場合は、移植後3日で皮弁の癒着が認められ、術後15日以後の11例では表皮はⅤ型が多く比較的厚い肉芽組織で皮弁は癒着し且つ癒着部分も極めて多いものが9例(No. 114, 115, 117, 118, 130, 131, 147, 159, 160 付図20, 22, 24, 25)あり、他の1例(No. 148)は骨膜と遊離し、1例(No. 133)は、前述のように皮弁の圧迫等により骨膜と共に類瘻死となつている。

骨膜がなく骨に損傷のない骨面に移植した場合は、移植後3日で骨小管内に充血及び多核白血球、淋巴球を主

とする円形細胞の浸潤が認められ、移植後5日では、骨小管内に線維芽細胞、円形細胞の増生があり、骨小管開口部において特に著明で一部肉芽組織で癒着しているもの(No. 72, 74, 82, 86 付図12)があるが、表皮は、Ⅱ型又はⅢ型が多くⅣ型及びⅤ型は少ない。移植後15日以後のもの9例中、表皮がⅤ型のものは4例(No. 120, 123, 150, 154)で、肉芽組織は比較的薄い。表皮がⅢ型のものが5例あり、その中の3例(No. 127, 134, 146)は皮弁に化膿があり、他の2例(No. 135, 162)は前述のように皮弁を過度に圧迫したためである。

骨に損傷を与えた場合は、移植後3日で厚い肉芽組織を認め、移植後5日では骨芽細胞の浸潤も認め皮弁と一部分癒着しているもの(No. 67, 80 付図13)があるが、表皮はⅢ型が多い。移植後30日では皮弁と骨とは新陳代謝的肉芽組織によつて癒着し、骨損傷面に多数の骨芽細胞の集簇を認め骨の再生機転も認められるもの(No. 145, 149, 155, 157 付図27, 28)があり表皮はⅤ型であるが、未だ骨質の沈着は認められなかつた。高久は家兎を使用して内耳開窓術を行つて観察し、術後1週間で窓孔は肉芽組織の侵入像を認め、Schambauchは猿を使用して、術後4日目に乳様蜂巣の外骨膜に沿ひ骨芽細胞の集簇を認めたと述べ、田中(英)は家兎を用いて内耳開窓術を行つた結果、術後10日目で線維性肉芽組織の増生を認め、術後30日では骨芽細胞の出現と新生骨の発生を認めたが、骨組織は未だ完全に基質化されていないと述べており、私の実験もほぼ上記の所見と同様であつた。

第5章 結 論

鼓室成形術の基礎的研究の一環として、成熟家兎の、耳骨腔内に遊離皮弁を移植した結果、次の如き知見を得た。

1) 移植後1～2日では、皮弁の表皮細胞に変化が少く、移植後3～5日では、既存表皮は変性像を示すが、新しくその下に表皮が再生され、移植後8日では、既存表皮は剝脱されると共に、再生表皮細胞は胞厚像を示す。

2) 術創の表皮化が妨げられる場合は、皮弁の化膿、皮弁への過度な圧迫とそれに伴う術創の乾燥及び皮弁の遊離である。

3) 皮弁の栄養は、移植後3日までは組織液により、移植後5日までは一部組織内液一部血液循環により、移植後8日以後では血液循環により行われる。

4) 粘膜上に移植した場合は、チステを形成するものが多く、且つ皮弁と粘膜は間隙を有している部分が多

い。

5) 骨膜の存する場合、癒着は良好で皮弁の表皮化もよく、肉芽織も厚い。

6) 粘膜、骨膜がなく、骨に損傷をあたえない場合は、皮弁の表皮化及び癒着は余り良くない。肉芽織は比較的少ない。

7) 粘膜、骨膜がなく、骨に損傷をあたえた場合は、肉芽織の増生は多く、骨の再生機能は移植後5日において認められたが、移植後30日でも骨の基質化は未だ認められない。

8) 皮弁の厚いものでは、肉芽織の増生が多く、皮弁も肥厚するものがあり、毛嚢、皮脂腺が多くそれが萎縮し空胞化したものもあつた。皮弁の薄いものでは、肉芽織の増生は著明でなく、厚いものに比して化膿性炎症を起すものがやゝ多い。

主 要 文 献

1) 緒方知三郎、三田村篤志郎、緒方富雄：病理学総論、中巻、下巻、昭和18年。2) 小山良修：動物実験手技、昭和30年。3) 緒方知三郎：病理組織顕微鏡標本の作り方、昭和32年。4) 戸刈近太郎：組織学、昭和34年。5) 児玉俊雄、浜田弁次：臨床外科、第6巻、第1号、昭和26年。6) 後藤修二：手術、第7巻、第10号。7) 後藤修二：日耳会、第25巻、第11号、昭和28年。8) 後藤修二：日耳会、第26巻、第4号、昭和29年。9) 後藤修二：日耳会、第26巻、第5号、昭和29年。10) 後藤修二：日耳会、第26巻、第7号、昭和29年。11) 後藤修二：日耳会、第26巻、第13号、昭和29年。12) 後藤修二：日耳会、第27巻、第5号、昭和30年。13) 後藤修二：日耳会、第27巻、第10号、昭和30年。14) 天野博：日耳会、第59巻、第6号、昭和31年。15) 陳実：医学研究、第26巻、第8号、昭和31年。16) 友田洋一：日耳会、第61巻、第4号、昭和33年。17) 津田修三：日耳会、第61巻、第3号、昭和33年。18) 高久享：日耳会、第60巻、第6号、昭和32年。19) 西端八郎：日耳会、第62巻、第6号、昭和34年。20) 田中英二：日耳会、第62巻、第11号、昭和34年。21) 橋本泰彦、弓削庫太、永山薫、藤井春三：日耳会、第61巻、第12号、昭和33年。22) Zeroni: Arch. Ohr Heilk 45, 1898. 23) Lange, W.: Beitr. Anat. Sc., Ohr. 3, 1910. 24) Schambaugh: Arch. Otolaryng. 41, 1935. 25) Lange, K.: Surgery. 15: 38. 1944. 26) Mir, Y. Mir.: Plast. Reconstr. Surg.

8: 378, 1951. 27) Contway, H.: Plast. Reconstr. Surg. 10: 67, 1952. 28) Bruner: Arch. Otolaryng. Chicago, 60, 1954. 29) W. Krey, u. O. Bandtrow: Laryng. Rhino. Otologie. 38: 7, 1959.

付 図 説 明

Fig. 1. 皮弁（厚いもの）

Fig. 2. 皮弁（薄いもの）

Fig. 3. No. 1 術後1日

皮弁の厚いもの。表皮は、基底細胞はよく保持され棘細胞も正常である。真皮の結合組織細胞は正常で深層に細血管の充血がある。骨膜内に細血管の充血がある。

Fig. 4. No. 3 術後1日

皮弁の厚いもの。表皮は、基底細胞はよく保持され棘細胞も正常である。真皮には硝子化が軽度で、毛嚢は正常、皮脂腺も正常である。粘膜、骨膜はなく骨に著変はない。

Fig. 5. No. 10 術後1日

皮弁の薄いもの。表皮は、基底細胞はよく保持され棘細胞も正常である。真皮は硝子化が中等度である。粘膜はなく、骨膜内には出血があり、円形細胞の浸潤がある。

Fig. 6. No. 17 術後2日

皮弁の厚いもの。表皮は、基底細胞はよく保持され、棘細胞も正常である。真皮は硝子化があり、深層には細血管の充血があり、円形細胞の浸潤がある。皮弁と粘膜の接している部で、粘膜上皮を認めず1部残存している。この接着端より皮弁裏面に粘膜上皮が再生している。骨膜は浮腫状を呈し円形細胞の浸潤があり細血管の充血が認められる。

Fig. 7. No. 22 術後2日

皮弁の厚いもの。表皮は退行変性像を示す基底細胞のみで、核の濃縮があり細胞は小型で配列も不整である。真皮深層に円形細胞の浸潤がある。粘膜及び骨膜は認めない。

Fig. 8. No. 56 術後3日

皮弁の薄いもの、骨膜内に線維芽細胞及び円形細胞が浸潤し細血管の新生があり、皮弁と1部癒着している。粘膜上皮が1部残存している。

Fig. 9. No. 43 術後3日

皮弁の厚いもの。再生表皮は、最下層に基底細胞がよく保持されその上部に棘細胞が1～2層あり、その上部に退行変性像を示す既存表皮がある。それに接続する部分ではやゝ扁平な基底細胞のみを認める。

Fig. 10. No. 45 術後3日

配列の不整な所々空胞化もある。小型で核の濃縮した基底細胞のみ認められる既存表皮下に、染色性のよいやゝ扁平な基底細胞が認められる再生表皮がある。

Fig. 11. No. 71 術後5日

皮弁の厚いもの。再生表皮は1層の基底細胞及び1～2層の棘細胞があり、その上部に変性像を示す既存表皮がある。真皮内に細胞浸潤があり肉芽織で骨膜と癒着している。

Fig. 12. No. 71 術後5日

皮弁の厚いもの。骨壁には骨膜を認めない。骨小管内に線維芽細胞及び充血を認め、骨小管開口部には線維芽細胞、円形細胞が増生し皮弁内に侵入している。

Fig. 13. No. 67 術後5日

皮弁の厚いもの。骨に損傷があり損傷骨面には骨芽細胞が多数認められ皮弁との間には厚い肉芽織があり新生細血管の充血を多数みとめる。

Fig. 14. No. 69 術後5日

皮弁の厚いもの。皮弁は肉芽織によつて骨膜と癒着している。

Fig. 15. No. 70 術後5日

皮弁の厚いもの。退行変性像を示す既存表皮の下に、再生表皮があり、基底細胞はよく保持され、その上部に棘細胞も1～2層認められる。これにやゝ扁平な基底細胞のみの部分が接続している。

Fig. 16. No. 97 術後8日

皮弁の薄いもの。再生表皮は染色性の良好な基底細胞のみあり真皮は中等度の硝子化がある。骨には損傷があり骨芽細胞が多数認められ皮弁とは肉芽織で癒着している。

Fig. 17. No. 95 術後8日

皮弁の厚いもの。骨に損傷があり骨芽細胞が集簇し皮弁との間には厚い肉芽織があり新生細血管の充血がある1部は真皮内に侵入している。骨の充血もある。

Fig. 18. No. 98 術後8日

皮弁の薄いもの。皮脂腺は変性して既存表皮と共に剥脱している。皮弁には再生された表皮があり肥厚像を示している。皮弁と粘膜との間に細隙があり皮弁の真皮側に粘膜上皮が再生している。

Fig. 19. No. 100 術後8日

皮弁の薄いもの。表皮は肥厚像を示している。真皮は

膠原化した肉芽織で置き換えられ骨膜に連続している。

Fig. 20. No. 130 術後15日

皮弁の薄いもの表皮は肥厚像を示し、真皮は膠原化した肉芽織で置き換えられ骨膜に連続している。

Fig. 21. No. 116 術後15日

粘膜上皮が残存し1部は粘膜チステを形成している。

Fig. 22. No. 123 術後15日

皮弁の薄いもの。表皮は軽度の肥厚像を示し、角質は剥離性でその上部に萎縮高度な皮脂腺が剥脱している。骨小管内に線維芽細胞及び出血が認められる。皮弁とは少量の肉芽織で癒着している。

Fig. 23. No. 113 術後15日

皮弁の厚いもの。表皮は肥厚像を示している。乳頭の発育も著明であり粘膜チステがある。

Fig. 24. No. 114 術後15日

皮弁の厚いもの。皮弁の表皮は肥厚像を示し、真皮は正常で細血管の充血があり肉芽織で骨膜と癒着している。毛嚢及び皮脂腺は正常である。

Fig. 25. No. 159 術後30日

皮弁の薄いもの。表皮は肥厚像を示し、真皮は線維性の肉芽織で置き換えられ、線維性の骨膜と連続している。

Fig. 26. No. 147 術後30日

皮弁の厚いもの。空胞化した皮脂腺が多数認められる。

Fig. 27. No. 157 術後30日

皮弁の薄いもの。表皮は肥厚像を示している。真皮は線維化した肉芽織で置き換えられている。骨表面に凹凸があり骨芽細胞が集簇し、皮弁と線維性の肉芽織で癒合している。

Fig. 28. No. 145 術後30日

皮弁の厚いもの。表皮は肥厚像を示し真皮は正常である。骨表面の陥凹部に骨芽細胞が集簇し骨の充血も認められる。

稿を終るにあたり、終始御懇篤なる御指導を賜わり、御校閲をいただきました後藤修二教授並びに田内久教授に心から感謝を致します

(原稿到着＝昭和35.3.8日)

榎島論文付図(1)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

榎島論文付図(Ⅰ)

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

榎島論文付図(Ⅲ)

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

榎島論文付図(Ⅳ)

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

榎島論文付図(V)

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28