ELECTRON MICROSCOPIC STUDIES ON THE MACULA STATICA

By
H. UEMATSU

*From the Department of Oto-Rhino-Laryngology, Osaka University Medical School
(Director: Prof. T. Hasegawa)*

Electron microscopic and partially histochemical studies on the macula utriculi were conducted in the normal guinea pig. Several of main findings are as follows;

- 1) The otolith crystal consists of a number of the fine granules with high density.
- 2) Between the otolith₂ crystals and under neath the otolith layer, there is colloidal substance which shows positive reaction to P.A.S. staining.
- 3) The sensory hair of a sensory cell consists of a kinocilium and 60~70 stereocilia, and these cilia end in the colloidal substance under neath the otoliths.
- 4) So called "Cuticle" of the sensory cell is reticular structure which is the basal part of the stereocilia and is composed of many fine fibers. The intracellular portion of the axial filaments of the stereocilia situate in the networks.
- 5) Near the surface of the sensory epithelium, there are well developed terminal bars, which surround the sensory and supporting cells and form the reticular membrane.
- 6) Two kinds of nerve endings are distinguished. Most of them belong to so called nerve calix, in which nerve fiber maks basket-like endings around the sensory cell. The other type is bud-shaped one.

平 衡 斑 の 電 子 顕 微 鏡 的 研 究

大阪大学医学部耳鼻咽喉科教室（主任：長谷川高敏教授）

植 松 治 雄
ウエ マツ ハル オ

I. 緒 言

前庭迷路の形態学的研究は、Retzius²⁹⁾ (1881) 以来 Kolmer¹⁷⁾, Wittmaack⁴⁶⁾ などによつてなされてきた。しかし前庭迷路は、骨性迷路内にあり、ことに平衡斑は耳石結晶を含むため、組織学的研究に困難が多く、不明な点も多い。

近年電子顕微鏡（以下電顕と略す）の発達および、その医学への応用の進歩にともない、これら前庭迷路においても、Wersäll & Engström⁴³⁾ (1953) のコルチ器の電顕的研究を初めとして、彼等および Sjöstrand⁸⁾, Smith³⁵⁾ 36) 37) が、コルチ器、膨大部稜、平衡斑について、電顕的研究を行い、感覚毛の微細構造をはじめ多くの新しい知見をもたらした。しかし平衡斑についての、Wersäll, Engström & Hjorth⁴³⁾ (1954) および Smith³⁶⁾ (1956) の二つの研究は、耳石膜を除去した標

本についてなされ、耳石結晶と感覚上皮の相互関係については観察されていない。耳石結晶の構造については、Reibisch¹⁹⁾ (1899) 以来魚類については、その年輪様層構造が報告されているが、他の動物については、耳石結晶の内部構造についての形態学的研究は見られない。又耳石結晶と感覚上皮との相互関係についても、光学顕微鏡（以下光顕と略す）的研究により、Retzius²⁸⁾, Kolmer¹⁷⁾, Wittmaack⁴⁶⁾, Werner⁴²⁾ などが、種々論じているが定説を得ていない。

著者はこれらの点を含め、平衡斑の微細構造を明らかにするため、モルモットの卵形嚢について、耳石結晶とともに卵形嚢全層の超薄切片を作製し、電顕的観察を行った。

II. 材料ならびに方法

1) 実験動物

実験には体重 400gr 前後のモルモットを使用し、その卵形嚢について観察を行った。実験に先立ち、プライエール反射、跳躍準備反射および 20 秒 10 回転後眼震を検査し、前庭迷路機能の正常なことを確かめてから実験に使用した。耳石結晶および耳石間物質研究には、参考のために一部嚢と蛙を使用した。

2) 材料作製方法と観察方法

(a) 電子顕微鏡標本の作製方法と観察方法

モルモットをエーテル麻酔下に断頭し、軟部組織を除去して側頭骨を取り出し、中耳骨胞を開くとともに双眼ルーペ下に、前庭を開いて卵形嚢を露出し、直ちに Palade 法⁽³⁾による 1% オスミツク酸ペロナール緩衝液 (pH 7.6) を約 0.2cc 前庭内に注入した。以上の操作を 3 分間以内に行い、2～3 分後卵形嚢が黒褐色に固定されたのを確かめ、卵形嚢陥凹にそつて切線を加えて卵形嚢を取り出し、同上固定液中にて 3 時間固定後脱水、包埋を行った。包埋に際し耳石層内への樹脂の滲透を充分にするため、浸透時間は 2 昼夜以上とし、n-ブチル・メタクリレートとメチル・メタクリレートの比を 7:3 ないし 6:4 とし硬い標本を作つた。超薄切片作製はライツ・ウルトラミクロトームにダイヤモンドナイフを用いることにより、耳石結晶と感覚上皮をともに超薄切片とした。電顕は電子工学 JEM 5G、日立製作所 HU 10、明石製作所 TRS 50 を使用し、直接倍率 2,000×～30,000×にて観察した。

(b) レプリカ作製と観察方法

耳石結晶の立体ならびに表面構造観察のためにレプリカを作製した。双眼ルーペ下にモルモット、嚢、蛙の卵形嚢から、耳石層をピンセット又は注射器にて取り出し、スライドグラス上に作つたポリビニールアルコール膜上に塗抹し、以下二段レプリカ法に従い、クロームでシャドウイングを行つたものを、電顕にて 2,000～5,000×にて観察した。

(c) 光学顕微鏡の観察方法

耳石結晶および耳石間物質に対しては、切片ならびに一部塗抹標本について、組織化学的⁽²⁰⁾(P.A.S., Sudan III, Sudan black 染色)に観察した。

III. 観察所見

1) 耳石層

(a) 耳石結晶

耳石結晶はレプリカ像(写真 1)で、六角稜柱状を呈し、その大きさは大多数のものが数 μ ～10 数 μ で一部数 10 μ の巨大な耳石が見られる。一個の耳石結晶は、

側面を 6 つの長方形で六角柱状に囲まれ、先端部は六角錐状でなく、相対する 2 面がほぼ屋根状に相接し、その両側のおのおの二面は三角形を呈するが、全体としてはほぼ六角稜柱に近い。レプリカ像では稜線が少し円味をおびているが、耳石表面は平滑で稜線の不整も認められない。耳石結晶の大小は、横径より縦径において著明に認められ、大きな耳石結晶は細長い結晶として見られることが多い。

耳石結晶内部(写真 2)は、直径 100～500Å の極めて電子密度の高い微細顆粒が、極度に密集した像を呈する。この顆粒は耳石結晶内に、ほぼ均一に分布しているが、一部には中心辺において周辺部より集合状態の粗な像の見られることもある。オスミツク酸固定を施した標本の電顕像では、耳石結晶を包む膜様構造は認められない。

(b) 耳石間および耳石下物質

耳石層下部に直径 0.5～1 μ の不整形の嚢状ないしは小胞状の構造(写真 3)が見られることがある。この構造は周縁部が比較的電子密度が高く、その内部に電子密度の低い均一な物質があり、その中央部にやや電子密度の高い網状ないしは網状の構造が見られるものが多い。

耳石結晶間および耳石結晶と感覚上皮との間には、電子密度の低い均質な物質が見られる(写真 4)。標本によつては一部索状ないしは網状を呈することもある。組織化学的には、耳石結晶間および耳石結晶下には、P.A.S. 陽性を呈する物質が認められ、Sudan III, Sudan black 陰性を示す。この P.A.S. 陽性物質と、電顕で見られる均一な耳石間物質は、同一のものであろうと考えられる。

感覚毛はこの耳石下物質中を耳石層へ走り、耳石結晶下でこの物質中に終る(写真 4)。感覚上皮と耳石結晶間に膜様構造は認められない。

2) 感覚細胞

感覚細胞は感覚毛を有する表面、やや細くなつた頸部、円柱状の体部、円い底部からなり、神経終末の形態から 2 種類を区別できる。多くのものは神経終末部が盃状ないしは指状を呈して、細胞底部から頸部を包むいわゆる nerve calix⁽⁴³⁾⁽⁴⁴⁾を作るが、一部には桿状ないしは蕾状の神経終末が、細胞底部に接するものを認める。神経終末の形態から 2 種類の感覚細胞を区別できるが、その内部構造には差違は認められない。感覚細胞は卵形嚢周辺部では、感覚毛のない毬子状上皮の如き形態を示すいわゆる辺縁上皮細胞⁽²⁰⁾に移行する。

(a) 細胞質

細胞質は電子密度のやゝ高い細胞膜におゝわれ、細胞膜は細胞表面に近い所で、その厚さおよび電子密度を増し閉鎖堤を形成する(写真16, 17)。感覚細胞上部に見られる閉鎖堤は、支持細胞上部のものに比し、厚さも薄く内部構造も認め難い。細胞質には均質な基質の中に、種々な顆粒が見られる。最も多いものは $50\sim 100\text{\AA}$ の電子密度の高い顆粒で、Palade 顆粒²³⁾と考えられる。細胞上部にはこれより大きな顆粒および、 $0.2\sim 0.5\mu$ の類円形の極めて電子密度が高く内部構造の認められない脂肪顆粒と考えられる顆粒が少数見られる。細胞表面で細胞の一侧に偏して、感覚毛と平行に $5\times 3\times 3\mu$ 位の細胞質の指状突起が見られる(写真11)。この突起は細胞膜から連続した膜におゝわれ、その部の細胞質は他の部に比して電子密度が低く、少数の顆粒を認めるのみで、小胞体や糸粒体は全く認められない。stereocilia⁴⁴⁾の中、この突起に近い2~3本のものは、ciliaの外膜が指状突起と連続し、指状突起内にstereociliaの線維様構造を認めることがある(写真5, 11)。細胞下部で神経終末に接する部分には、小胞様構造が見られる(写真21)。

(b) 糸粒体(写真12, 13, 14, 21, 22)

糸粒体は $0.5\times 0.8\mu$ 前後の楕円形を呈し、他の組織に見られると同様な二重膜構造に囲まれ、内部に基質とcristae mitochondrialeが認められる。cristaeは一般には糸粒体の短径にはゝ平行に、多くは糸粒体を完全に横断するように排列する。糸粒体はほぼ細胞全域に見られるが、stereocilia基底部に最も多数集合し(写真13, 14)。その他核周囲および細胞底部で神経終末(写真21, 22)と接する附近に3~数個集合して認められる。stereocilia基底部直下に集合する糸粒体は、他の部分のものに比しやゝ大で、cristaeの断裂、cristaeの減少、cristaeの消失などの像が見られる。このように種種変形した糸粒体が多数見られるが、この場合も二重膜構造は明らかに認められる。kinocilia基底部には、これに反し糸粒体はほとんど認められない(写真7, 8)。stereocilia基底部附近のもの以外では、上述の如き変形した糸粒体は認められない。

(c) 小胞体(写真12, 23)

感覚細胞の小胞体は主として、粗面小胞体であり、滑面小胞体は時として核側部に認められるのみである。

粗面小胞体は長さ約 2μ で、電子密度の高い外層と、それに囲まれた電子密度の低い中層とからなり、外層の

外側には $150\text{\AA}$ 位の電子密度の高い顆粒が排列する。粗面小胞体は核下部には2~3個平行に並んで認められ、核側部では孤立性に認められることが多い。

核側部には最大 $4\times 0.5\mu$ の大きさを有し、電子密度のやゝ高い限界膜に囲まれ内部電子密度の低い滑面小胞体が見られることがある。この小胞体は形態および大きさが全く不整であり、細胞によつては認められないことも少なくない。

(d) ゴルヂ野(写真14)

ゴルヂ野は卵形嚢中央部より、周縁部の感覚細胞に著明に認められる。細胞内で占める位置は核上部に限られ、ことにcilia基底部下 $2\sim 4\mu$ の範囲に数個集合して認められる。卵形嚢中央部では、最大 $0.7\times 0.02\mu$ の管状構造と、微細な胞体および顆粒が集合して、 $1\times 1\mu$ 程度のゴルヂ野が形成され、数個所にやゝ散在して認められる。この部分の感覚細胞のゴルヂ野では、著明な空胞は認められない。卵形嚢周辺部に近づくに従い、ゴルヂ野は著明となり、ゴルヂ層板、ゴルヂ顆粒、ゴルヂ小胞および胞体も明らかとなり、核上部の横断像ではほとんど細胞全域をゴルヂ野が占めるような像が見られることがある。

(d) 核(写真21, 22)

核は約 8μ のはゝ円形を呈し、細胞の底部に近く存在し、通常小さな裁痕を1個有し、核小体は1個認められる。核実質は支持細胞の核に比しやゝ電子密度が低い。

(e) 感覚毛およびその基底部

1個の感覚細胞から出る感覚毛は、60~70本のstereociliaと1本のkinociliaからなる(写真5)。卵形嚢周辺部では60本前後のstereociliaのみでkinociliaは認められない。1個の感覚細胞から出るciliaは、従断像ではほぼ平行に、横断像ではほぼ六角形に規則正しく排列集束する。kinocilia, stereociliaとも直径約 0.2μ の円柱状で、細胞膜と同じ薄い被膜を有する。Ciliaは、耳石下物質中を、垂直に耳石層へ走り、耳石下物質中に終るが、途中ciliaの融合、分枝などは認められない(写真4)。kinociliaは外膜におゝわれた電子密度の低い基質内に、電子密度の高い9本のfilamentsが被膜の内側に同一円周上に、規則正しく排列し、cilia内で平行に走る。線毛上皮のkinocilia^{10) 14)}に見られるような、一対の中心性filamentsは認めることができなかった(写真5)。kinociliaは常に細胞の指状突起部に近く偏在し、その基底部では9本のfilamentsが、横断像で歯車状に連りstereocilia起底部を作る網状構造部。

とは独立に更に深い基底小体を作る(写真9)。基底小体の周囲には、相当広い範囲にわたり電子密度の高い微細顆粒が多数認められる(写真7)。基底小体から中央寄り $0.7\sim 0.8\mu$ の所に、基底小体と垂直面上で更に 90° 距つて中心小体を認める(写真8)。

stereocilia は感覚細胞表面から出る所では、やゝ細く(直径 0.1μ) 次第に太くなり直径 0.2μ となる。cilia 基底部 0.5μ と細胞外部 $0.7\sim 1\mu$ の範囲には、cilia の中心部に1本の電子密度の高い軸糸を認める。それより上部では cilia 内部は全体として微細線維様を思わせる像を示すが、明らかに認められなかつた(写真6)。

stereocilia は従来蓋板(cuticle)と呼ばれている部分から出る。この部は縦断像では、感覚細胞表面から約 0.5μ の厚さの範囲に、 $50m\mu$ 以下の電子密度の高い顆粒が集合し、この層内に stereocilia 軸糸の起底部が垂直に認められる(写真6)。その横断ないしは斜断像では $50m\mu$ 位の電子密度の高い線維が、ほぼ同心円的に層状をなして走り、全体として網状を呈し、線維間に直径約 0.2μ の類円形の空隙を作り、そのおのおの中心部に1本づつ stereocilia 軸糸の基底部を容れている(写真9, 10)。この網状構造は、細胞質の指状突起の存在する反対側に偏し、横断像で感覚細胞の $1/2\sim 2/3$ 時にはそれ以上の部分を占める。感覚細胞表面に近い所では、この網状構造を作る線維は閉鎖堤と極めて近く走るが、相互間に線維の連絡は認められない。網状構造はその下部では、その線維がほとんど細胞全周を囲んでいるが、その場合でも細胞の一侧に小さくとも $1\times 1\mu$ の網状構造のない部分があり、kinocilia 基底部が認められる。stereocilia 軸糸は細胞外部に出る時 $50m\mu$ の太さを有するが、その基底部では漸次その太さを減じ、細胞表面から 0.5μ の位置で消失する。stereocilia 基底部網状構造直下には、前述のごとく糸粒体が多数集合する(写真13)。

3) 支持細胞

支持細胞は基底膜から感覚上皮表面まで達し、感覚細胞、神経線維、神経終末を囲む(写真19, 20, 24)。その形態は不整であるが、基底膜に接する底部はほぼ平面的であり、耳石層に面する表面は、全体として膨隆し、直径 0.1μ 内外で長さ $0.2\sim 0.5\mu$ のほぼ円柱状の microvilli を有する(写真7)。

細胞質は細胞底部では電子密度が極めて近く、顆粒もほとんど認められない(写真24)。核上部では細胞質は電子密度がやゝ高く、 0.1μ 以下の大小不同の顆粒ないしは小胞様構造が多数見られ、細胞表面に近い細胞質内

に、 $0.2\sim 0.3\mu$ の円形を呈し電子密度の高い限界膜に囲まれ、その内部に電子密度の高い微細顆粒の認められる胞状体が見られる(写真11, 17)。核上部にはその他にも、 0.4μ 以下の小胞状ないし胞状の構造も認められる。

糸粒体は感覚細胞のものに比しやゝ小さく、 0.5μ 以下の楕円形で、核上部ことに表面に近い部分に認められる(写真7)。この部分では感覚細胞の stereocilia 基底部の下のものと同様、糸粒体の空胞化や cristae の断裂像が認められる。

ゴルジ野は比較的小さく、 $0.6\times 0.6\mu$ 程度のものが、核上部に散在する。

感覚上皮表面に近い所で、支持細胞と感覚細胞および支持細胞相互が接する所で、細胞膜はその厚さと電子密度を増し、閉鎖堤を形成する。この部は横断像で、支持細胞上部を全周にわたつて環状に取り囲み網状膜を形成する(写真15, 16, 17)。閉鎖堤を形成する電子密度の高い構造は場所によりその厚さが異なるが、最大 2μ 位で内部は微細線維様構造が見られる(写真16)。感覚細胞と支持細胞、支持細胞相互間の細胞間隙は、網状膜の部分で横断像において、波形を呈し、空隙の狭い部と広い部が認められ、最も広い場合 $30\sim 35m\mu$ に達する。

核は最大直径 9μ の楕円形で、その長径は基底膜にほぼ直角で、基底膜に近く位置する。核実質は感覚細胞の核より電子密度が高く、核小体を通常2個認める(写真18, 19, 20, 24)。

(4) 神経線維および神経終末

前庭神経の枝として入った神経は、基底膜下に基底膜とは平行に走る神経叢を作っている。こゝでは神経線維は有髄で、厚さ約 0.3μ の層板構造の見られるミエリン鞘を有し、更にその外側にはシュワン氏細胞が見られる。軸索は薄い軸索膜に包まれ、その中に細長い糸粒体と、神経走行にほぼ平行に走る細い neurofilaments が認められる。

基底膜を通る所で神経線維は、ミエリン鞘を失い無髄となつて感覚上皮内へ入り、更に分枝して支持細胞間を感覚細胞へ走る(写真19, 20, 24)。感覚上皮内では、軸索は太いもので 3μ 前後で、内部に神経走行に平行な neurofilaments と僅かの糸粒体が認められる。軸索は軸索膜をもつて支持細胞と接し、相互間に細胞質の移行は認められない。軸索内の neurofilaments は感覚細胞に近づくに従い認め難くなる。

神経終末はその形態上、二種類を区別することができる。第一の型は軸索が、その終末部で盂状に広がり、感

観細胞の底部から頸部にかけて包むいわゆる nerve calix^{48) 49)}を作るもので(写真 20, 21), 大多数のものがこの型に属する。第二の型は神経終末部で桿状ないしは蕾状となつて、感覚細胞底部ないしは底側部に接するもので(写真 22), この型に属するものは僅かである。

nerve calix を作るものでは、軸索は感覚細胞底部に達すると、その太さを増すと同時に盃状の凹みを作り、感覚細胞の底部を容れる(写真 20)。感覚細胞体部から頸部にかけては、盃状となつた軸索が指状ないしは樹枝状となる。横断像では感覚細胞底部では、軸索が同心円的に、感覚細胞全周を囲んでいるが、上部になるに従い感覚細胞の周囲に、数個あるいはそれ以上の軸索が接する像が見られる。縦断像では感覚細胞底部は軸索の凹みの中にあるが、側面では必ずしも全面を連続して囲まず、所々軸索の見られない部分が認められる(写真 21)。即ちこの型の神経終末は、前述の如く盃状となつた軸索が更に先端で、指状ないしは樹枝状をなして感覚細胞を包んでいると考えられる。神経終末部で感覚細胞と軸索の接する所で、所々に感覚細胞に 0.5μ 前後の凹みができ、その中へ軸索の凸部が入り込み、この部の軸索内に $0.1\sim 0.2\mu$ の円形の小胞状構造が見られ、その附近により小さな小胞を認める。糸粒体は神経終末部では、感覚細胞の縦軸に平行に排列し、一層に感覚細胞を囲む。一方この部に相当する感覚細胞内にも、糸粒体が数個集合して認められる。神経終末と感覚細胞は各々その細胞膜をもつて相接し、細胞質の移行は認められない。軸索は感覚細胞頸部で閉鎖堤の見られる所より上部に達することはない。一つの nerve calix が一つの感覚細胞を支配するとは限らず、一つの軸索が2つの凹みを作り、2つの感覚細胞を容れる場合も認められる(写真 12, 23)。

第二の型においては、神経軸索は感覚細胞底部ないしは底側部に、蕾状あるいは瘤状の膨みを作つて接する(写真 22)。神経終末部には、多数の糸粒体が集合し、微細顆粒と $500\text{\AA}$ 以上の小胞状構造が見られ、相対する感覚細胞にも、糸粒体および顆粒が比較的集合する傾向が見られる。1個の感覚細胞にはこのような神経終末が2～数個接している。この型の神経終末にも、軸索と感覚細胞の細胞質の移行は認められない。

(5) 基底膜および基底膜下組織

感覚上皮最下層は一層の基底膜によって、基底膜下組織と分かたれている(写真 20, 24)。基底膜の感覚上皮内への陥入像は認められず、神経軸索のみに貫かれている。前述の如く神経線維は、基底膜を通る所で無髄とな

る。基底膜下の有髄神経は、直径 $3\sim 4\mu$ のものと $1\sim 2\mu$ のものゝ二種類があり、大多数のものは太い方に属する。軸索はその外側を $0.2\sim 0.3\mu$ のミエリン鞘で包まれ、ミエリン鞘には電子密度の高い層と低い層の層板状構造が認められ、ミエリン鞘の外側には、シュワン細胞が認められる。1個のシュワン細胞は1本の神経線維を包み、1個のシュワン細胞が多数の神経線維を包む像は認められない。基底膜下には神経線維、シュワン細胞の他に小血管および僅かの間質細胞を認める。

IV 総括ならびに考察

(1) 耳石層

Kolmer¹⁷⁾等の記載の如く、脊椎動物のいわゆる Macularium は、有機性の耳石を保持するものと、無機性の耳石結晶から成っている。耳石結晶は従来光顕的には、ヘマトキシリンに濃染する辺縁部と、淡染する内部とからなり、ほぼ六角稜核形を呈すると記載され、著者の光顕像でも同様の所見を得た。しかしながら耳石結晶の内部構造については、Reibisch (1899) 以来 Ruysch, Werner¹⁸⁾などが、魚類の耳石結晶は年輪様層構造を認めた以外は、他の動物においては不明である。舟岡、豊岡¹⁹⁾(1928)は X 線的に囊の耳石研究し、炭酸カルシウムは arragonit の結晶系を示し、蛋白体に石灰塩が沈着して耳石結晶を作ると報告している。耳石結晶の発生学的研究は、Wittmaack (1919), Kawano¹⁶⁾(1922)によつて、系統的に行われ、感覚上皮から最初膠質が分泌され、次いで石灰の沈着が始まることとは確実であろうと考えられる。このことから耳石結晶が、単なる炭酸カルシウムの結晶ではなく、何らかの内部構造を有するのであろうと推測できる。著者の行つたオスミック酸固定を行つたモルモットの耳石結晶の超薄切片の電顕像では、電子密度の高い微細顆粒が、電子密度の低い基質中に集合して認められ、対照として行つた白色ゴムの中に炭酸カルシウムを封入したものゝ超薄切片を電顕的に観察しても、電子密度の高い均一な像のみで、耳石結晶のような顆粒状構造は認められない。又光顕像で区別できるような、内外2つの部分は、電顕的には区別することができなかった。従つて光顕の場合固定によつて、耳石間物質が耳石結晶の周囲に沈着して膜様を呈したのではないかと推測される。耳石結晶の立体構造は、著者のレプリカ法による電顕像で、明に六角稜柱形であることが認められ、従来の光顕像で言われていたことを裏付けることができた。

前述のごとく耳石層下部には、直径 $0.5\sim 1\mu$ の囊状

構造が見られるが、これが耳石結晶と関係のあるもの（例えば耳石結晶の基となる膠様物質）か、あるいは耳石間物質に関係あるものかは不明である。

従来耳石間物質の本態については、膨大部頂、コルテ器の被蓋膜と共に、膠性のキテン質であろうとする説が多いが、Belanger¹⁾ (1953) は放射性同位元素 S^{35} を二十日鼠に注射し、autoradiograph により被蓋膜、膨大部頂、耳石間物質に S^{35} を証明し、これらは sulfomucopolysaccharide からなるのであろうと述べ、著者も1959年モルモット卵形嚢の非脱炭切片と、嚢の耳石器管の塗沫標本について耳石間物質が P.A.S. 陽性を示すことを認め、次いで立木 (1960) も上記各位の P.A.S. 陽性を報告している。キテン質は組織化学的に認められず、各種脂質および蛋白質に対する反応も陰性であった。電顕的には耳石結晶間および耳石結晶と感覚上皮との間に、電子密度の低い無構造な物質として認められ、時として網状を呈することもある¹²⁾。これらの事実と文献から考按して、耳石を保持する物質は、膠様をなす粘液多糖類恐らく sulfomucopolysaccharide はからなると考えられる。電顕的に網状を呈したり、光顕的に耳石結晶の被膜状を呈したりするのは、固定に伴う人工変化ではないかと考える。

(2) 感覚細胞

(a) 感覚毛

Bowen⁹⁾ (1931) は魚の膨大部稜の感覚毛を観察し、1秒間に1～5回の運動のあることを認め、最近では Löwenstein & Roberts²¹⁾ (1949) が電気生理学的に、魚の前庭に周期的放電のあることを報告している。これら生理学的研究からも前庭感覚上皮に線毛があるのではなからうかと考えられてきた。一方形態学的には、感覚毛に kinocilia とそうでない細胞からの突出物があることは Fürst⁴⁾ が見出し、Helb¹³⁾ (1909) は内耳感覚上皮には線毛があり、細胞質中の中心小体から出ていると記載している。電顕的には Wersäll⁴⁾ (1956) がモルモット膨大部稜感覚細胞からの感覚毛は、多数の stereocilia と1本の kinocilia からなることを見出している。卵形嚢については Wersäll, Engström & Hjorth⁴⁾ (1954) が、感覚毛は1列に8本づつ5列に並ぶ cilia があると記載しているが、stereocilia と kinocilia の区別については述べられていない。著者はモルモットの卵形嚢の感覚毛は、1本の kinocilia と60～70本の stereocilia からなり、横断像では六角形に規則正しく集束するのを認めた。しかし卵形嚢周縁部

の感覚細胞では、感覚毛に kinocilia を認めなかつた。kinocilia については Fawcett & Porter¹⁰⁾ (1954) が各種の線毛について、田路³³⁾ (1958) は卵管上皮について、山本⁴⁷⁾ (1953) は気管粘膜について、猪木¹⁴⁾ (1958) はトリコモナスについて、欠田、田中¹⁸⁾ (1959) は二枚貝のエラについて、それぞれ kinocilia について研究し、いずれも一対の中心性軸糸と、cilia 周縁に規則正しく排列する9本の周縁性軸糸の合計11本の絨毛構造を認めている。膨大部稜感覚細胞においても、Wersäll⁴⁾ (1956) は kinocilia に同様11本の軸糸が認められると報告している。著者の卵形嚢感覚細胞についての観察では、9本の周縁性軸糸は著明に認められるが、中心軸糸は認めることができなかった。著者の観察した範囲のみから卵形嚢感覚細胞の kinocilia は、中心軸糸を有しないと断言できないとしても、少なくとも上記各種線毛についての記載のような著明な中心軸糸を持たないことは確実と考えられる。このような形態的な差異が機能的にどんな意味を有するかは不明であるが、少なくとも卵形嚢の kinocilia は一般の線毛のような著明な運動性がないことと関係があると考えられる。すなわち卵形嚢の場合 kinocilia は、stereocilia の支持補強に働くものではないかと考える。

卵形嚢、膨大部稜、コルテ器において、Wersäll, Engström 等は、kinocilia は stereocilia と同様感覚細胞表面の蓋板に基底小体があると記載しているが、著者の卵形嚢における観察では、後述の如くいわれる蓋板と言われる部は、stereocilia 基底部を作る網状構造であり、kinocilia はその部とは独立して細胞質指状突起部に近く偏在する。基底小体の構造については、前述 Fawcett その他が、kinocilia は基底部で中心軸糸を失ない、9本の周縁軸糸が輪状に連絡して歯車状の基底小体を作ることを明かにしている。更に下等動物では、基底円板および小根が認められることは、前述猪木がトリコモナスにおいて欠田、田中が二枚貝のエラについて報告している。著者は卵形嚢感覚細胞の kinocilia に、Fawcett 等の記載と同様な基底小体を認めた。基底円板や小根は認めなかつたが、基底小体の周囲に電子密度の高い微細顆粒が多数あり、縦断像では stereocilia 基底部網状構造とよく似た像を示す kinocilia 基底小体から $0.7 \sim 0.8 \mu$ はなれて、基底小体と垂直な面上で更に 90° 回転した位置に、基底小体と同様歯車状構造を持つ中心小体様の構造が認められる。基底小体の立体構造については田路³³⁾ らの研究があり、基底小体が種々の

角度に屈曲することが明にされているが、二つの平面上に屈曲した基底小体は報告されていない。著者の場合の二つの基底小体およびそれと同様な構造は、山田、安武⁴⁷⁾ (1958) が嗅粘膜上皮で見た kinocilia 基底小体の近くにある中心小体と同じような構造と考えた方が、二面上に屈曲した基底小体と考えるより妥当であろうと思われる。

stereocilia の内部構造については、Wersäll⁴⁴⁾ がその底部近くに一本軸糸を認めているが、著者も同様中心軸糸を基底部から、細胞外部 $0.7 \sim 1 \mu$ の範囲に認めるが、それより上部で中心軸の認められない部分においても、cilia 内部に微細線維様構造があるように思われる。これらの構造は kinocilia と異ると同時に microvilli や brush border と異っている。Engström⁹⁾ (1956) はコルチ器について、Wersäll⁴⁴⁾ (1956) は膨大部稜について、中山⁴²⁾ (1950) もコルチ器について感覚毛は、感覚細胞表面の蓋板にその基底部があると述べているが、stereocilia と kinocilia の基底部の差違および stereocilia 基底部については報告されていない。著者の観察によれば、いわゆる蓋板から出るのは stereocilia であり、前述の如く kinocilia は独立した基底部を有する。蓋板と呼ばれる部分は、縦断像では Engström & Sjöstrand, Wersäll の言う如く、 0.5μ の厚さに細胞表面にある微細顆粒状構造を示し、その層内に stereocilia 軸糸の基底部が、基直に入っており、著者も同様像を観察したが、その横断および斜断像では、 $50 m\mu$ 程度の線維が、網状に走りその線維ではさまれた 0.2μ のほぼ円形の部分の中心に、stereocilia 軸糸の基底部が認められる。すなわち従来微細顆粒状をなし、感覚細胞表面を覆うとされていたいわゆる蓋板と言われる部分は、stereocilia 基底部を構成する網状構造である。このような構造および網状構造下に糸粒体が集り、糸粒体の変形が認められることなどから、感覚に関与するのは stereocilia で、各々の stereocilia からの刺激がその基底部網状構造で集合されて神経終末へ伝達するのではないかと考えられる。

感覚毛終末については光顕的に種々の説があり、Retzius²⁸⁾ (1881), van der Stricht⁴²⁾ (1922), Kolmer^{16) 17)} (1923, 1926) は、耳石膜は支持細胞から分泌された膠様物質が層状をなしたもので、その中に垂直にある空隙の中を、感覚毛が上へ走りその中で遊離の状態で終るとし Wittmaack⁴⁶⁾ (1926) は感覚毛はその上部で相互に連絡し網状となりその最上部で耳石膜を作るとして

いる。その他 Werner⁴²⁾ も又異説をなし、定説を得ていない。著者の電顕像では、cilia 相互間に連絡を認めず、耳石結晶下に膜様構造も認められない。これ等の点は、Kolmer の説とほぼ同一所見であるが、耳石下物質中に Kolmer の言うような空隙を認めることはできなかった。このような cilia の状態からも、平衡斑は cilia の力学的歪よりも、長谷川教授の説の如く、静水圧の変化によく対応しうる形態を示していると考えられる。

(b) 細胞内微細構造

小胞体：細胞内膜様構造は、Dalton⁵⁾ (1951) が脾臓の外分泌細胞において見出したのが最初で、その後各種細胞において報告されている。この膜様構造は 40Å の膜で囲まれた管状構造で、その外側に 150Å のリボ核蛋白質の顆粒の見られる粗面小胞体と、顆粒の見られない滑面小胞体の二種類が区別されている。その機能については Palay⁵⁾ (1958), Siekevitz, palay & palade (1958), Siekevitz³²⁾ (1928) 等が脾臓におけるチモゲン顆粒の形成分泌をはじめ、その酵素系について研究し、細胞内代謝における重要性が明にされつつある。内耳感覚細胞については、コルチ器、膨大部稜について、Engström, Wersäll が報告し、同様な粗面小胞体は卵形感覚細胞の核下部に、2~3 個集合して認められた。核側部に見られることのある $4 \times 0.5 \mu$ の内腔を有する胞状構造は、Wersäll (1956) が言うように一般に言われる意味での滑面小胞体と呼ぶのが適当かどうかは多少疑問に思われる。

糸粒体：糸粒体の微細構造に関しては、Claude & Fullan⁴⁾ (1945) をはじめ、Palade²⁹⁾ (1952), Sjöstrand³³⁾ (1953), Zetterquist⁵⁰⁾ (1956) らによつてなされ、その形態から更に酵素系についても研究されている。その微細構造に関しては、まだ多少の論議がなされているが、一般には二層の電子密度の高い膜とその間にある電子密度の低い中層とからなる三層に囲まれ、その中に基質と Cristae を有すると理解してもよいと考えられる。卵形囊感覚細胞の糸粒体は、 $0.5 \times 0.8 \mu$ のほぼ楕円形であるが、その分布が主として stereocilia 基底部直下で、この部に多数集合し形態も種々変化したものも認められる。糸粒体の種々な形態および変性糸粒体については、辻村³²⁾ (1957) らが報告しているが、著者の場合 stereocilia 基底部下の糸粒体にのみ空胞化、cristae の断裂、減少などを認めることは、前述の如くこの部において代謝が最も激しいことを示しているのでは

ないかと考えられる。

ゴルヂ野；電顕的にゴルヂ野を観察したのは、Dalton⁹⁾ (1951), Dalton & Felix (1953) 等で、ゴルヂ野は 1) ゴルヂ空胞, 3) ゴルヂ顆粒からなると述べられている。前庭については、光顕的に Cajal (1908) および Kawano¹⁰⁾ (1922) が核上部に 1 個のゴルヂ野を認めている。電顕的には Wersäll が感覚細胞の核周辺に数個のゴルヂ野を認めている。卵形嚢についての著者の観察では、ゴルヂ野は核上部に限られ、数個のものがほど近い位置に比較的集合して認められる。又卵形嚢中央部の感覚細胞より、辺縁部のもの更に辺縁上皮細胞に著明に認められる。このことは分泌と何らかの関係があるのではないかと考える。

(3) 支持細胞

支持細胞は Retzius²⁸⁾ 以来糸細胞とも呼ばれ、Werner⁴²⁾ の記載によれば、“支持細胞は感覚上皮全層にわたり、基底膜から表面まで達し、底部にはほぼ楕円形の核を有し、1—3 個の核小体がある。底部細胞部分から支持線維を有する細い突起が表面に達し、そこで広く強くなり、全体として網状膜を作る”とされている。電顕的には Wersäll が平衡斑および膨大部稜について研究し、支持細胞には光顕的に言われた線維様突起をみとめていない。著者も卵形嚢支持細胞に支持線維は認めなかった。この点 Engström & Wersäll⁷⁾ (1953) がダイテル氏細胞に支持線維を認めたのと相違がある。感覚上皮表面に近い所で、感覚細胞も支持細胞も細胞膜はその電子密度と厚さを増し閉鎖堤を形成する。この閉鎖堤は多くの上皮細胞において報告され、明な三層構造が示されているが、卵形嚢の支持細胞では特にその発達が著明で 2 μ の厚さにも達する。閉鎖堤の部分で横断した像では、細胞全周を取囲んでいるが部分的に発達の程度が異なり、Porter²⁹⁾ (1954) がイモリの表皮で観察した Biszero の結節に多少似た構造を呈する。又普通閉鎖堤の部分では細胞間の間隔が狭いが、卵形嚢感覚上皮では細胞は波形を呈して接し、細胞間隙の広い部分と狭い部分が認められる。閉鎖堤は全体として網状膜を作つて、感覚上皮表面に近い場所を取り囲んでいるが、著者の観察所見からは、従来言われてきた支持のみでなく、感覚上皮の上部と感覚上皮間の交通路をなしているのではないかと考えられる。

支持細胞と神経線維との関係は、コルチ器において Engström & Wersäll⁷⁾ が、網膜において Sjöstrand³³⁾ (1953), 田中³⁰⁾ (1959) が、味蕾において Engström

⁹⁾ (1956) が、又膨大部稜において Wersäll⁴⁰⁾ (1956) がその所見から、軸索に対して支持細胞はシュワン細胞と同様な関係を有するのであると述べているが、著者の場合も同様と考えられる。

Wersäll⁴³⁾ (1954) は卵形嚢の支持細胞の表面に、balloon-shaped process と呼ぶ細胞質の突起を記載しているが、著者の感覚細胞の指状突起と呼ぶものと同じのものではないかと考える。

(4) 神経終末

神経接合部の構造が電顕的に明確に示されたのは、Rager²⁷⁾ (1955), Robertson³⁰⁾ (1956) の端板におけるものである。感覚器については網膜、味蕾、コルチ器、膨大部稜について報告されている。卵形嚢については Retzius²⁹⁾ 以来 2 種類の神経終末があることが光顕的に示されており、電顕的にも Wersäll⁴⁰⁾ 等が nerve calix とそうでない小さな神経終末を認め、更に Wersäll⁴⁰⁾ は膨大部稜についても明確な電顕像を示した。著者も卵形嚢で 2 種類の神経終末を認めることができた。nerve calix は Wersäll が模型図でも示しているような、軸索が盃状になり感覚細胞を完全に包むのではなく、感覚細胞底部では盃状であるがそれより上部では推状ないしは樹枝状となり、感覚細胞を包む籠のようなものと考えられる。又軸索はその終末部で 2 つの凹みを作り、2 つの感覚細胞を作る場合も認められ、Wersäll 等の記載するような軸索の分枝が支持細胞間のみで行われるものでないと考えられる。nerve calix には Palay²⁴⁾ (1954) 等の記載した synaptic vesicles と呼ばれるものは著明には認め難いが、これは神経終末と感覚細胞の接する面が広いことと関係があるのではないかと考える。他の一つの蕾経神経終末は Sjöstrand³³⁾ (1953) が網膜で、Engström 等がコルチ器で観察したものと同様構造を示す。このように前庭と聴器の神経終末の形態の違いは、感受する刺激の相違のみに基づくものかどうかは不明である。

V. 結 語

以上モルモットの卵形嚢について、電顕的ならびに一部光顕的に観察を加えたが、その結果を要約すると次の如くである。

1) 耳石結晶は六角稜柱状をなし、内部は均一な基質と微細顆粒からなる。

2) 耳石間、耳石下には P.A.S. 陽性を呈する膠様と考えられる無構造な物質がある。

3) 感覚毛は 1 本の kinocilia と 60—70 本の stereo-

cilia からなり、集束し、耳石下物質中に終る。2種類の cilia はその起始部を異にする。

4) 従来蓋板(クチクラ)と言われた部分は、steocilia 起始部を形成する網状構造である。

5) 支持細胞上部にはよく発達した閉鎖堤があり、網状膜を形成し感覚細胞、支持細胞を囲む。

6) 神経終末は主として nerve calix を形成するが、一部桿状ないしは蕾状を呈するものも認められる。

主 要 文 献

- 1) *Bélanger*: Science 118, 1953. 2) *Bielchowski u. Brühl*: Arch. mikr. Anat. 71, 1907. 3) *Bowen*: Proc. Nat. Acad. Sc. 1931. 4) *Claude & Fullan*: J. Exp. Med. 81, 1945. 5) *Dalton*: Am. J. Anat. 89, 1951. 6) *Dalton & Felix*: Am. J. Anat. 92, 1953. 7) *Engström & Wersäll*: Acta Otolary. 43, 1953. 8) *Engström & Sjöstrand*: Acta Otolary. 44, 1954. 9) *Engström*: Ann. Oto. 1956. 10) *Fawcett & Porter*: J. Morph. 94, 1954. 11) 長谷川: 加速度病, 1948. 12) 長谷川, 他: 綜合臨床, 7, 1958. 13) *Held*: Untersuchung über den feineren Bau des Ohrlabyrinthes der Wirbeltiere 1909. 14) 猪木, 他: 寄生虫学雑誌, 7, 1958. 15) *Kawano*: Arch. Ohrenhk, 110, 1922. 16) *Kolmer*: Arch. Ohrenhk, 116, 1926. 17) *Kolmer*: Handbuch der Neurologie des Ohres 1923. 18) 欠田, 田中: 電子顕微鏡, 7, 1959. 19) 工藤, 他: 耳石, 1951. 20) リゾン: 組織化学および細胞化学, 1954. 21) *Lowenstein & Roberts*: J. Phys. 110, 1949. 22) 中山: 日耳鼻, 63, 1960. 23) *Palade*: J. Exp. Med. 95, 1952. 24) *Palay*: Anat. Rec. 118, 1955. 25) *Palay*: Frontiers in Cytology 1958. 26) *Porter*: Anat. Rec. 118, 1955. 27) *Regar*: Anat. Rec. 122, 1955. 28) *Retzius*: Das Gehörorgan der Wirbeltiere Bd. I. 1881. 29) *Retzius*: Biolog. Untersuch. 1881. 30) *Robertson*: J. Biophys. Biochem. Cytol. 2 Suppl. 1956. 31) 瀬戸: 人の知覚, 1957. 32) *Siekevitz*: Ciba Foundation Symposium on the Regulation of Cell Metabolism 1959. 33) *Sjöstrand*: J. Appl. Phys. 24, 1953. 34) *Sjöstrand & Rhodin*: Exp. Cell. Rec. 4, 1953. 35) *Smith*: Anat. Rec. 121, 1955. 36) *Smith*: Acta Otolaryng. Suppl. 126, 1956. 37) *Smith*: Ann. Oto. 65, 1956.

- 38) 田路: 大阪市立大学医学雑誌, 7, 1958. 39) 田中: 最新医学, 14, 1959. 40) 辻村: 電子顕微鏡, 6, 1957. 41) 立木: 日耳鼻, 63, 1960. 42) *Werner*: Das Labyriuth. 1940. 43) *Wersäll, Engström & Thjorth*: Acta Otolary. Suppl. 116, 1954. 44) *Wersäll*: Acta Otolary. Suppl. 126, 1956. 45) *Wittmaack*: Arch. Ohrenhk, 114, 1926. 46) *Wittmaack*: Arch. Ohrenhk, 116, 1926. 47) 山本: 気食会報, 9, 1958. 48) 山田, 安武: 第14回電顕学会総会予稿集, 1958. 49) *Yokokama*: Arch. Hist. Jap. 6, 1956. 50) *Zetterqvist*: The Ultrastructural Organization of the Colmner Epithelial Cell of the Mouse Intestin 1956.

写 真 説 明

- 第1図 耳石結晶レプリカ像
- 第2図 耳石結晶超薄切片像
- 第3図 耳石下囊様構造
- 第4図 耳石結晶と感覚毛の相互関係
C; 感覚毛, S; 耳石下物質, O; 耳石結晶脱落像
- 第5図 感覚毛横断像
K; kinocilia, S; stereocilia, F; 感覚細胞指状突起
- 第6図 Stereocilia 縦断像
S; stereocilia, A; stereocilia 中心軸系基, R; stereocilia 底部網状構造
- 第7図 kinocilia 基底小体(B)横断像
- 第8図 kinocilia 基底小体(B)および中心小体(C)
- 第9図 stereocilia 基底部網状構造横断像
A; stereocilia 中心軸系, B; kinocilia 基底小体, M; microvili, T; 閉鎖堤
- 第10図 Stereocilia. 基底部斜断像
S; stereocilia, A; stereocilia 中心軸系, R; 網状構造を作る線維
- 第11図 感覚細胞および支持細胞上部縦断像
S; stereocilia, F; 感覚細胞指状突起, R; stereocilia 基底部網状構造, M; 糸粒体, T; 閉鎖堤
- 第12図 感覚細胞横断像
N; 核, M; 糸粒体, E; 粗面小胞体, n; nerve calix
- 第13図 感覚細胞上部横断像
M; 糸粒体, R; 網状構造, T; 閉鎖堤

- 第 14 図 感覚細胞上部縦断像
S; stereocilia, R; 網状構造, M; 糸粒体,
G; ゴルヂ野, T; 閉鎖堤
- 第 15 図 感覚上皮上部斜断像
C; 感覚毛, R; 網状膜
- 第 16 図 同上強拡大像
S; 支持細胞, R; 網状膜 (閉鎖堤)
- 第 17 図 支持細胞上部縦断像
T; 閉鎖堤, S; stereocilia, M; microvili
- 第 18 図 支持細胞横断像
N; 核, n; 核小体, M; 糸粒体
- 第 19 図 支持細胞及び軸索斜断像
S; 支持細胞, N; 支持細胞核, n; 軸索,
M; 糸粒体軸索
- 第 20 図 感覚上皮下部斜断像
N; 感覚細胞核, N'; 支持細胞核, S; 感覚
細胞, S'; 支持細胞, n; 軸索
- 第 21 図 nerve calix 縦断像
N; 感覚細胞核, M; 感覚細胞糸粒体,
n; nerve calix, M'; 軸索糸粒体
- 第 22 図 蕾状神経終末
N; 感覚細胞核, M; 感覚細胞糸粒体, n; 軸
索, M'; 軸索糸粒体
- 第 23 図 nerve calix 横断像 (2つの感覚細胞を包んで
いる像)
N; 感覚細胞核, M; 感覚細胞糸粒体, R; 感
覚細胞小胞体, n; nerve calix
- 第 24 図 基底膜附近斜断像
S; 支持細胞, S'; 感覚細胞, N; 軸索,
B; 基底膜, C; 毛細血管

御指導御校閲を頂いた恩師長谷川高敏教授,
御教示を頂いた阪大第二解剖学教室小浜基次教
授, 実験指導を頂いた大川内勝次講師ならびに
技術的援助を頂いた田中昭, 横田武両技官に深
謝いたします

この論文の要旨は, 第 58 回日耳鼻総会, 第
85, 87, 93, 98, 99, 101 回日耳鼻大阪地方会,
第 3 回耳鼻咽喉科臨床会において発表した。

(原稿到着＝昭和 35.6.14 日—急載)

植 松 論 文 付 図 (1)

第 1 図 (×10,000)

第 2 図 (×40,000)

第 3 図 (×30,000)

第 4 図 (×5,000)

植 松 論 文 付 図 (Ⅰ)

第 5 図

($\times 40,000$)

第 6 図

($\times 80,000$)

植松論文付図(Ⅲ)

第 7 図

($\times 20,000$)

第 8 図

($\times 20,000$)

第 9 図

($\times 10,000$)

第 10 図

($\times 20,000$)

第 11 図

($\times 15,000$)

第 12 図

($\times 7,000$)

植 松 論 文 付 図 (V)

第 15 図 ($\times 5,000$)

第 16 図 ($\times 20,000$)

第 17 図 ($\times 15,000$)

第 18 図 ($\times 8,000$)

第 19 図 ($\times 17,000$)

第 20 図 ($\times 3,000$)

植松論文付図(VI)

第 21 図 (×15,000)

第 22 図 (×17,000)

第 23 図 (×20,000)

第 24 図 (×5,000)