SENSATION OF THE NASAL MUCOSA.
PHYSIOLOGICAL AND NEURO-HISTOLOGICAL STUDY

By
K. TOGAWA

*From the Department of Oto-rhino-laryngology, Chiba University,
School of medicine. (Director Prof. T. Kitamura)*

Aiming to resolve the problem on sensation of the nasal mucosa, the anterior part of the inferior turbinate was stimulated with rectangular pulse generated from an electrostimulator, and the subjective threshold of intensity (volt) and the objective observation with GSR were measured in normal, sinusitis, atrophic rhinitis, hypertrophic rhinitis etc.

A silver-wire of 0.4mm in diameter, the end of which was covered by a cotton-ball soaked with normal saline solution, was used as an electrode, and a silver-plate of 55×100 mm was applied to the wrist as the indifferent pole.

Sensation of prick, pain or touch were produced by electric stimulation.

The threshold in simple atrophic rhinitis was the lowest, and that in hypertrophic rhinitis was the highest: the thicker the turbinate, the higher was the threshold.

Neuro-histological changes were investigated by means of Bielschowsky-Suzuki's silver impregnation at the same time.

The mucosa was innervated abundantly by considerable fine nerve-fibers of myelinated and fine whose myeline-sheath were lost which were ramifying in plexiform. Most of them terminated freely in every layer of the mucosa, but some in terminal bodies were seen only in the vascular layer.

Normal density of nerve-endings was confirmed in normal cases and simple atrophic rhinitis. Rather low density was seen in hypertrophic rhinitis but was normal in turbinal hypertrophy due to cavernous tissues.

The density in genuine atrophic rhinitis varies according to the grade of pathologic process.

Sensory nerve-endings were preserved well in the turbinal tissue of simple chronic inflammation, but lessened or absent in that of degenerative and destructive inflammation, and higher threshold in the latter was obtained. Such findings were confirmed in Wegener's granulomatosis.

Generally, nerve-fibers show more resistance than other tissues against these pathologic process.

In cases of nerve-injury due to invasion of tumors, the threshold rose abnormally high, and revealed at times insensitivity.

It is concluded that threshold-shift depends on the distance between the electrode and nerve-endings, the grade of pathologic changes of nerve-fibers, and on mucosa such as epithelial metaplasia and fibrosis.

北村武教授開講十周年記念論文

鼻 粘 膜 の 知 覚

生理学的研究及び組織学的研究

千葉大学大学院医学研究科 外科系 耳鼻咽喉科学（主任：北村武教授）

戸 川 清
ト ガワ キヨシ

目 次

I. 緒 言

II. 生理学的研究

A. 文献的考察

B. 研究方法

1. 検査方法

2. 検査対象

C. 研究成績

1. 正常下鼻甲介の検査成績

a. 閾値及び夫に影響を与える条件

b. 自覚感覚

2. 鼻疾患に於ける下鼻甲介検査成績

a. 各種疾患に於ける閾値

b. 正常閾値との比較

c. 神経障害例の検討

3. 下鼻甲介以外の部位の検討

D. 小括及び考察

III. 組織学的研究

A. 文献的考察

B. 研究方法

1. 研究材料

2. 研究方法

C. 研究成績

1. 知覚神経の形態学的観察

a. 神経線維の形態学的観察

b. 神経終末の形態学的観察

2. 正常下鼻甲介に於ける知覚神経分布

a. 骨膜及び骨の知覚神経

b. 偽海綿体層の知覚神経

c. 腺層の知覚神経

d. 上皮下層の知覚神経

e. 上皮層の知覚神経

3. 病的下鼻甲介に於ける知覚神経分布

a. 肥厚性鼻炎

b. 萎縮性鼻炎

c. Wegener 氏肉芽腫症

D. 小括及び考察

IV 総 括

V 結 論

主要参考文献

付 図

I. 緒 言

鼻腔は種々の機能を司る。そのうち粘膜上皮線毛運動、鼻腔加温能、通気度、嗅覚等に就いては諸家の研究によりかなり解明されているが、反射乃至防禦作用を司る鼻粘膜の知覚に関する精しい研究は未だ非常に少い。

由来、形態と機能の間には密接な関係が存在し、機能は形態の裏付けによつて初めて高い価値を現すことは容易に肯定し得る。しかし乍ら個々の問題に就いては従来から必ずしも見解の一致があつたと云い難い。鼻粘膜の知覚に対する見解も又その研究方法によつて異り、生理学的及び臨床的には知覚乃至反射機能は鋭敏のように考えられているが、神経組織学的には知覚神経分布は報告者により相違し、あるいは豊富であるとし、あるいは少く従つて痛覚は余り感じられないだろうとし、そのいずれの研究においても充分納得を得るに至っていない。又鼻疾患の際に知覚が鈍麻あるいは鋭敏となると云われているが、夫に関する確かな研究も殆んど見当らない。私は鼻疾患特に萎縮性鼻炎の病態生理研究の一環としてこの問題を解明すべく、夫々生理学的及び組織学的見地より研究を行つた。即ち電気刺激により鼻粘膜の知覚検査を行い、正常者及び各種鼻疾患に就いて得られた成績を検討し、同時にその裏付けともなる粘膜の神経分布及び組織との関係等に就いて検討した。

II. 生理学的研究

A. 文献的考察

鼻腔は反射器官として古くから知られており、鼻粘膜の知覚を追求せんとする試みは既に Kayser ('04), v.

Gyergyai ('20), Schriever u. Strughold ('26) 等によりなされた。即ち、Kayser は触覚（圧覚及び温度感）は鼻前庭部に限られ、鼻全体には Gemeingefühl のみであると述べ、v. Gyergyai は鼻腔後端及び鼻咽腔の知覚を調べて非常に鋭敏であると報告した。Schriever 等は鼻入口部より鼻腔前部に就いて機械的（Frey 刺激毛及び Stachelborste）、電氣的（感應電流）及び温度刺激（一定温に浸しておいた金属棒）を用いて感覚の種類及び閾値を求め、入口から前庭迄は各種刺激に反応するが、夫より内部では痛覚のみよく保たれ、他感覚は消失していると述べている。1928 年には Ornstein が Schriever 等の検査法にならつて鼻腔各部位（鼻底、下及び中鼻甲介、鼻中隔、側壁、天蓋等）を調べ、更に病的粘膜に就いても感覚の変化等を検討した。彼は固有鼻腔粘膜は外皮と異り痛覚のみ存在し、閾値の部位的差は殆んど認められないが、後部の方が前部より、又上部が下部より鋭敏であると云い、組織学的裏付けとして Kadanoff ('28) の業績を引用した。近年に至り Wolff Goodel 等 ('47, '50) は痛みと云う観点から鼻腔に起因する疼痛に関する実験を行つた。彼等は鼻腔、副鼻腔各部を種々の方法で刺激し、生ずる疼痛の程度と投射部位を調べ、最も敏感なのは上顎洞入口で、以下鼻前頭管、鼻甲介、天蓋、鼻中隔の順であると述べ、下鼻甲介前部の刺激で鋭い、燃えるような痛みが上歯列に放散した。又三叉神経完全切断例ではいずれの刺激でもその部位になにも感じなかつたと述べた。

斯る刺激の手段としての電気（感應電流及び平流）は 19 世紀後半より諸家に用いられるに至つた。近年、エレクトロニクスの急速な進歩に伴い、即時最大強度に達し、任意の持続、強度、頻度の刺激が得られる矩形波が用いられ、伊藤、加納等は痛覚閾値の電気診断のためにこれ等諸種電流に就いて検討を加え、直流及び矩形波断続流が適当であると結論した。

電気刺激成績、特に閾値及び知覚の種類を求めたのは前述の Schriever u. Strughold 及び Ornstein のみである。彼等は接触覚、圧迫感、振動感、くすぐり感を触覚の刺激によるとし、痒感、疼痛、灼熱感、刺感等を痛覚刺激状態とみなして検索し、鼻腔には後者しか存在しないと結論した。病的粘膜の知覚に就いて Ornstein は、充血及び組織の肥厚は多少疼痛感覚に影響を及ぼすと述べ、事実彼は一側鼻腔にアドレナリンを塗布し、同側の閾値の低下を確かめた。又、粘膜上皮の形態変化が感受性低下を来すとして機械的及び化学的刺激を行つ

て、肥厚性鼻炎では本質的な相違はなかつたが、萎縮性鼻炎では閾値が高まつており、特に本症では夫に加うるに病理変化の程度（神経要素の障害）に従つて Hyp-乃至 Ahästhesie になると述べ、その例を挙げた。但し電気刺激成績は挙げていない。Wolff 等は鼻粘膜及びその下部組織の炎症や、破壊を生ぜしめるような原因は化学的でも、伝染性でも、新生物によるものでも疼痛閾値を低くすると述べている。

B. 研究方法

1. 検査方法

鼻粘膜刺激には電子管刺激装置（日本光電製 MSE-2-JA）を用い、矩形波を与えた。

閾電極は 0.4mm 径の捲綿銀線（先端を残してビニール管で絶縁）に生理食塩水を浸したもので、自作の簡単な装着並びに固定装置を用いて電極の先端を軽く下鼻甲介前部粘膜に接着させた。不閾電極は夫々大、55×100mm、小、22×24mm の銀板を用い、前腕掌側に装着して測定した（第1図）。測定は下鼻甲介の他、鼻中隔前下部、鼻茸等に就いて行つた。

第1図 知覚検査状況

刺激条件は刺激持続時間 0.5 秒の任意単一矩形波及び刺激間隔 10 秒の断続流とし、電圧を変化させて閾値を求めた。

閾値決定は被検者の自覚的応答により、同一電圧で数回刺激して正答が過半数の場合を以つてした。同時に客観的閾値測定法として皮膚電気反射（GSR）及び呼吸の同時記録を行つた。両者共 Wheatstone-bridge 回路を経て直流増巾（渡辺測器製 CH-1）後、ペン書きオシログラフ（EO-4）で記録した。GSR は非常によく自覚応答と一致し、時には閾値附近で被検者が刺激を感じたように思つても不確かなためにスイッチを押さなかつた

第 2 図

第 3 図 Block-Diagram

場合にも、その心的動揺が記録に現れる。反面、刺激を与えない時でも他の外的刺激あるいは心的動揺によつて変動するので、刺激及び自覚応答と一致した場合をもつて閾値とした。呼吸曲線は刺激が比較的弱いためか、殆んど変化が生じなかつた。更に脳波の検討も行つたが、この場合は電気刺激が被検者の自覚閾値以下で大きく記録に入つて妨げとなる上、その際の波形に特異の変動が認められなかつた。検査装置の記録及び大略は第 2、第 3 図の如くである。

2. 検査対象

被検者は当科外来及び入院患者、医局員等で、鼻疾患の無い、耳その他の疾患々者及び医局員を正常とし、慢性副鼻腔炎、萎縮性鼻炎、肥厚性鼻炎、血管運動(神経)性鼻炎等の鼻疾患、更に上顎腫瘍に就き夫々検査を行つた。

慢性副鼻腔炎は臨床的に鼻副鼻腔炎と云われているように、同時に下鼻甲介も影響を受け、多少肥厚乃至萎縮の傾向があるが、変化は軽いものであり、逆に下鼻甲介の肥厚性変化が強く、副鼻腔炎はあつても軽度の例を肥厚性鼻炎とした。萎縮性鼻炎に就いても同様である。猶、萎縮性鼻炎は痙攣形成の有無をもつて単純性、真性

第 1 表 正常群閾値分布及び平均

m	1.69 ± 0.21	1.38 ± 0.13	2.61 ± 0.50	2.01 ± 0.40
5				
4			•	
3			•••••	•••••
2	•••••	••	•••••	•••••
1	•••••	•••••	••	•••••
極	+	-	+	-
不関	大		小	

に分けた。更に本症を北村教授の分類に従つて一次型 (Ia, b 及び Ic 型) と二次型 (II 型) に分けた。

C. 研究成績

1. 正常下鼻甲介の検査成績

a. 閾値及び夫に影響を与える条件

1) 得られた閾値は刺激極、不関電極の大きさにより異なり、陰極刺激値(以下⊖値と記す)の方が陽極刺激値(以下⊕値)より低く、不関電極は大の方が小の場合より低い。即ち不関電極大では⊕値 1.69 ± 0.21 volt. ⊖値 1.38 ± 0.13 volt であり、小の場合は夫々 2.61 ± 0.50 volt, 2.01 ± 0.40 volt であつた(第 1 表)。

2) 不関電極の大きさによる差異は、閾値が異なる他、信頼限界乃至分散の相違、自覚感覚の強弱として現れるが、両者を比較すると、被検者に与える感じは小さい方が軽度で、不快感も少い。しかし閾値の分散は大であり、一長一短であつた。

3) 刺激極差：⊕値－⊖値で極差を求めると、後者が低いことが推計学的に認められた。又⊖値は⊕値より分散が小さであつた（第2表）。

第2表 極差（陽極閾値－陰極閾値）

測定極	差	-0.5	0	0.5	1.0	1.5	2.0	m	ts
下降法	大		21	12				0.18±0.09	4.28>2.05
	小		6	19	6	2		0.56±0.14	8.25>2.05
上昇法	大		19	12	2			0.24±0.11	4.50>2.05
	小		6	20	4	3		0.56±0.15	4.50>2.05

第3表 上昇法・下降法の比較（上昇値－下降値）

不関極	差	-1.0	-0.5	0	0.5	1.0	1.5	m	ts
大	+			28	4			0.06±0.06	2.12>2.04
	-		1	29	2			0.02±0.05	0.59<2.04
小	+		2	21	9	2		0.16±0.12	2.76>2.04
	-	1	5	17	9	2		0.08±0.15	1.19<2.04

4) 測定方法：低電圧から強める上昇法と、閾値上ある程度の強さから弱めて行く下降法に就いて夫々閾値を比較すると、差の無いものが過半数、次で上昇法の閾値が高いものが多く、平均して下降法で求めた方が僅かに低い傾向にあつた。実施の際は下降法を用いた（第3表）。

5) 刺激持続時間：矩形波の幅を変えて閾値の i-t 曲線を求めたが、1 秒から 0.01 秒迄はほぼ一定であり、夫以下において閾値の上昇をみた。

6) 左右差：同一被検者の左右差に就いて検討した。この際、鼻腔構造の非対称即ち両側下鼻甲介の異同が左右差の要因となり得ることは容易に想像されるので、下鼻甲介対称群と非対称群に分けて検討した。前者では両極値共差が認められなかつたに反し、後者では有意差即ち下鼻甲介の厚い方が閾値が高いことが認められた（第4表 a, b）。

7) 環境条件：皮膚の生理に影響を与える室温と閾値の関係をみると、平均値の上では温度が上昇するにつ

第4表 a 左右差（左右同大）（左側値－右側値）

不関極	差						m	t _s
		-1.0	-0.5	0	0.5	1.0		
大	+	1	10	8	4	2	-0.08±0.21	0.78<2.06
	-		3	18	4		0.02±0.11	0.37<2.06
小	+	4	5	13	5	5	0.03±0.22	0.28<2.04
	-	1	6	12	11	3	0.14±0.17	1.59<2.04

第4表 b 左右差（左右異大）（厚－薄）

不関極	差	-1.0	-0.5	0	0.5	1.0	m	t _s
大	+		1	6	4	2	0.27±0.27	2.25>2.18
	-		1	7	3	2	0.23±0.27	1.95<2.18
小	+	1	3	2	4	4	0.25±0.39	1.45<2.20
	-		1	2	8	3	0.46±0.24	4.32>2.20

第5表 体重との関係

Kg		~ 45	~ 50	~ 55	~ 60
大	+	1.32 ± 0.27	1.58 ± 0.52	1.79 ± 0.25	2.17 ± 0.72
	-	1.23 ± 0.23	1.50 ± 0.47	1.58 ± 0.12	1.67 ± 1.44
小	+	2.50 ± 0.67	2.46 ± 0.62	3.20 ± 0.54	2.67 ± 1.44
	-	2.20 ± 0.56	2.00 ± 0.48	2.50 ± 0.38	2.00

れて閾値は僅かに低くなる傾向にあるが、有意な関連性は得られなかつた。湿度は温度の変動と大体平行しており、特記すべきことはなかつた。

8) 個体条件：人体は大きな抵抗体であり、その大小も1つの因子たり得るので、日安を体重においてみると、僅かながら体重が増すにつれて閾値が上昇する傾向を示した（第5表）。年令的差異は余り著明でない。

性別差異は全体平均で男子より女子がやや低かつた。

b. 自覚感覚

刺激によつて被検者の受ける感じは第6表の如くで、本検査が閾値附近の低電圧で測定されたためか、はつきり疼痛として感じる事が少なかつたようだが、これか

第6表 自 覚 感 覚

不関電極 大	同 小
つまかれる感じ	さわる感じ
ちくんと刺される感じ	くすぐつたい感じ
強く感じる	軟い感じ
歯の方にひやく	硬口蓋にびりびりする感じ
電気が伝わる感じ	暖いような感じ
びりつと来る	刺激がじわりとくる
口唇にひきつれる感じ	
眼にひやく	

ら触覚，圧覚，痛覚等の存在が推測される。即ち“さわる感じ”は云う迄もなく触覚，“刺される感じ”は痛覚線維の興奮によると思われ，“くすぐつたい感じ”は一般に触覚その他の共働によると考えられる。

電気刺激とは別に，電極（捲綿銀線）圧抵時にはくすぐつたい，痛い，つまかれる感じ等を訴えるが，同部に維持しておくで極く短時間でこれ等の感覚が軽減し，順応が比較的速かである。又，電極の尖端で下鼻甲介の異なる部位に接触させて部位的識別閾（二点弁別閾）を調べたところ，被検者は（うまく表現できないこと，該部が見えないことも手伝つてか）殆ど識別できなかった。表面麻酔塗布後の検査では触覚，痛覚は消失していた

第7表 正常及び各種疾患群閾値平均

	大			小		
	数	+	—	数	+	—
Hyperpl.	6	2.08±0.38	1.83±0.43	8	4.63±0.70	3.94±0.68
Vasomot.	8	2.00±0.45	1.69±0.38	12	3.30±0.46	2.50±0.72
Empyem	24	1.79±0.21	1.54±0.17	31	2.73±0.28	2.37±0.23
Normal	24	1.69±0.21	1.38±0.13	23	2.61±0.50	2.01±0.40
Atroph.	30	1.25±0.15	1.17±0.13	39	2.26±0.21	1.79±0.20

第8表 副鼻洞炎群閾値平均

	大			小		
	数	+	—	数	+	—
Empyem	24	1.79±0.21	1.54±0.17	31	2.73±0.28	2.37±0.23
Ea.	6	1.42±0.40	1.25±0.29	8	2.25±0.74	1.94±0.41
En.	12	1.88±0.36	1.63±0.24	15	2.83±0.44	2.57±0.33
Eh.	6	2.00±0.33	1.83±0.27	7	3.07±0.49	2.79±0.59

第9表 萎縮性鼻炎群閾値平均

	大			小		
	数	+	—	数	+	—
Atroph.	30	1.25±0.15	1.17±0.13	39	2.26±0.21	1.79±0.20
As.	22	1.20±0.10	1.11±0.13	25	2.26±0.22	1.80±0.22
Ag.	8	1.38±0.43	1.31±0.38	14	2.25±0.48	1.79±0.48
Ia. b.	6	1.25±0.29	1.17±0.27	8	2.19±0.44	1.63±0.62
Ic.	20	1.25±0.16	1.20±0.18	23	2.33±0.30	1.83±0.29
II	4	1.13±1.00	1.00±0.65	6	1.75±0.29	1.33±0.27

が、強く触れると押されるような感じがあつた（圧覚）。温度感覚に就いては本法では確認ができなかつた。適当な検査装置を作製して今後更に研究を進めたい。

2. 鼻疾患における下鼻甲介検査成績

a. 各種疾患における閾値

慢性副鼻腔炎（E）、萎縮性鼻炎（A）、肥厚性鼻炎（H）、血管運動性鼻炎（V）に就いて夫々閾値の平均を求めると、A 群が最も低く、以下 E 群、V 群、H 群の順に高い値を示した（第7表）。

E 群を下鼻甲介の状態によつて更に正常（En）、厚い（Eh）、薄い（Ea）に細分してみると、Ea 群が最も低く、以下 En、Eh の順であつた。これ等のことから下鼻甲介の状態と閾値とは密な関係があることが判つた（第8表）。

萎縮性鼻炎を北村教授の分類によつて検討すると、Ⅱ型が最も低く、次で Iab、Ic 型の順に高い値を示したが、夫々の間に有意差は認められなかつた。又本症を単純性（As）と真性（Ag）に分けてみると、下鼻甲介の萎縮状態は両者共同様か、かえつて後者の方が強いのに、閾値は前者が低い値を示した（第9表）。

更に（本症の先駆疾患とも考えられる）Wegener 氏肉芽腫症例に就いてその経過を追求したところ、病勢の消長に従つて閾値が変動し、悪化した際の値は A 群の棄却限界外の異常高値を示し、知覚神経障害も予想され

第10表 病変の推移と閾値の変動

た（第10表）。

b. 正常閾値との比較

1) 以上各疾患群と正常の閾値（N）を比較検討すると、A 群は N 群より低い、他の群はいずれも N 群より高い値を示し、E 群、V 群、H 群の順であつた。大電極値では E 群とは有意差が無かつたが、他の三者とは夫々有意差が認められた。小電極の場合は総てが N 群に対して有意差を示した（第11表）。

2) 副鼻腔炎細分群との比較：E 群のうちの Ea, En, Eh 各群に就いて夫々を N 群と比較すると、En,

第11表 正常と各疾患との比較

有意差	X	○	○	X	X	X	X	○	○	X	○	○
Volt												
4												
3												
2												
1												
疾患群	E	A	As	Ag	H	V	E	A	As	Ag	H	V
極	+						-					
不測	大											

第12表 正常と副鼻腔炎細分群の比較

有意差	X	X	X	X	O	O	X	X	X	X	O	O
Volt												
4												
3												
2												
1												
細分群	Ea.	En.	Eh.	Ea.	En.	Eh.	Ea.	En.	Eh.	Ea.	En.	Eh.
極	+			-			+			-		
不測	大						小					

第13表 正常と萎縮性鼻炎型別閾値との比較

有意差	X X X	X X O	X X X	X X X
Volt				
4				
3				
2				
1				
型	Iab Ic II	Iab Ic II	Iab Ic II	Iab Ic II
極	+	-	+	-
傾向	大		小	

Eh 群は N 群より高く、⊖ 値で有意差が認められた。

Ea 群は逆に N 群より低値を示した (第12表)。

3) 萎縮性鼻炎細分群との比較: 本症の型別閾値はいずれも N 群より低く、特に II 型で有意差が認められた。又真性、単純性の別では、単純性において N 群との有意差が認められた (第13表)。

c. 神経障害例の検討

下鼻甲介の支配知覚神経が障害された場合の閾値を得るために、臨床上の好例として上顎腫瘍による神経障害例に就いて検査を行い、得られた閾値と手術所見 (摘出標本) と対比検討した (第14表)。

1) 閾値は障害の程度により差はあつたが殆ど全例が正常棄却限界外の異常高値を示し、半月神経節に近い部分で完全に障害された例では不閃電極装着部位に刺激を感じなくなつても刺激部位にはなんら自覚しなかつた。

2) 同一人に就いて健側との閾値差を求めると、これも明らかな異常高値を示し、その差が1.5乃至2 volt

第14表 神経障害例 (上顎癌) の閾値及び健側との差

	閾値分布		健側との差	
Volt				
12				
10				
8				
6				
4				
2				
極	+	-	+	-
棄却限界	$0.90 \leq X \leq 2.93$	$0.84 \leq X \leq 2.32$	$-1.08 \leq X \leq 0.92$	$-0.77 \leq X \leq 0.63$

より大であれば神経障害ありとみなされる。健側との閾値差は閾値の絶対値同様あるいは夫以上に重要である。

これ等の事から、神経が (その終末領域に至る前の) 経過途中で障害された場合は異常高値を示し、本法が知覚障害の診断に有用であることが証明された。

3. 下鼻甲介以外の部位の検討

本検査が麻酔を行わないで実施されること及び鼻腔の構造から、測定可能な部位に限られるので、下鼻甲介の他に鼻中隔前下部に就いて求めた。又正常ではないが、鼻茸に就いても検査を行つた (第15表)。

1) 鼻中隔粘膜閾値は下鼻甲介の夫に比べて明かに高値を示し、有意差が認められた。両者の粘膜の厚さを比べると、前者が遙かに薄いのに閾値が高かつた事は、鼻中隔粘膜は下鼻甲介粘膜より感覚が鈍いことを示している。

第15表 鼻腔内各部の閾値

		大			小		
		数	+	-	数	+	-
下鼻甲介		24	1.69 ± 0.21	1.38 ± 0.13	23	2.61 ± 0.50	2.01 ± 0.40
鼻中隔		11	2.14 ± 0.66	1.64 ± 0.41	11	4.05 ± 0.58	3.50 ± 0.52
鼻茸		11	3.77 ± 0.99	3.27 ± 0.69	9	7.56 ± 1.88	8.28 ± 2.71

2) 鼻茸には一般に知覚が殆どあるいは全く無いとされている。本検査においても夫が証明された。即ち閾値は他の鼻粘膜の夫に比べて高く(鼻茸の大きさにより異なるが)、しかも鼻茸に接触している電極の部位では殆どあるいは全く感じないで、“齒にひびく”、“口唇にひびく”、“鼻の奥の方に感じる”等と云い、これは鼻茸自身の知覚ではなく、周囲組織の知覚神経の興奮によるものと解釈される。又鼻茸が大きい場合、鼻内では全く感ぜず、前腕の不関電極装着部位で刺激を感じた例もあった。

D. 小括及び考按

知覚研究の手段として電気刺激の他に、機械的、化学的、温熱、輻射等色々の刺激方法が行われているが、鼻腔と云う入口が小さくて奥行きのある構造の部分に対しては、刺激用具、装置等に制約があり、適切な刺激が適用しにくい。例えば機械的刺激では粘膜に対する作用角度が測定部位によつて異なり、検査成績の信頼性が減引される。これ等の点からみて電気刺激は最適である。

従来、固有鼻腔粘膜には痛覚のみ、あるいは痛覚と冷覚しか存在しないと云われていた。知覚検査の際聴取した刺激に対する自覚感覚に就いて検討したが、痛覚の他に“さわる感じ”と云う応答を得た。これは明かに触覚である。更に表面麻酔剤を使用して触覚、痛覚は消失したが、“圧迫される感じ”が残存していた。これは圧覚であろうと思われる。

又、接触等の機械的刺激に対して非常に敏感で反射作用も強い反面、部位識別閾(二点弁別閾)が非常に高く、殆んど区別できないことは、外皮の知覚に就いての性質と非常に異なる点であり、夫々外皮と鼻粘膜の異なる使命に合目的に備わっていることは興味深い。

次に閾値と下鼻甲介の状態に就いて検討すると、同粘膜の厚さと閾値とに平行的な関係が認められた。即ち萎縮性鼻炎では知覚鈍麻が多いと云う一般の考えに反し、肥厚性鼻炎の値が最も高く、萎縮性鼻炎が最低であつた。これに就いては、一つの組織乃至器官に分布する神経線維乃至終末の数は大体一定しており、個人差は著しくない。一方、組織が特にその表層において増殖、肥厚すれば、該部に分布する神経線維の密度、及び粘膜表面と神経終末間の距離等に差が生じるためであろうと考えられる。これは後述する組織学的所見により是認された。

慢性副鼻腔炎患者の平均値が正常の夫より高い値を示したことは、臨床的に鼻副鼻腔炎と云われているよう

に、同時に下鼻甲介も多少共影響を受け、細胞浸潤、増殖、肥厚が起つていと解釈される。斯る関係の極端な場合が鼻茸においてみられる。即ち閾値が非常に高く、あるいは測定不能(不関電極部が刺激されるに至つても該部では感じない)であつた。

萎縮性鼻炎に就いて単純性と真性を比べると、同程度の萎縮を示す下鼻甲介でも真性は単純性より閾値が高かつた。これは真性では上皮化生が認められ、上皮組織の病変(線維性変化、細胞浸潤等)も種々の程度に起つており、夫等のいずれか、あるいは双方の影響、更には病変高度の場合には、夫に伴う神経終末部の障害も考えられる。元来、扁平上皮は強い外界刺激に曝されている部分を覆い、斯る刺激、あるいは体液蒸散等による内部組織の障害を防ぐ意味を有する。従つて諸家の刺激に対する抵抗が大であり、電気抵抗も又粘膜の円柱乃至線毛上皮より大である。組織の線維性変化に就いては、再生して肉芽部位にのびた神経線維がやがてその部の瘢痕化に伴つて遂には消失すると云う実験的成績(荒木)からも、その影響又無視する訳には行かないが、これは瘢痕性変化が強い場合以外は余り考えなくてもよいように思われる。

こうした変化を示す真性萎縮性鼻炎でも正常者閾値平均より低い値を示したことは、一つには電気刺激は単に表層に止らず、深部に迄及ぶこと、次に神経線維は種々の環境条件に対して著しい抵抗性を示し、痛覚脱失が非常に起りにくいこと、更には上皮化生は生じていても上皮組織の萎縮により、神経線維及び終末の分布が比較的密になることにより理解できる。Ornstein は機械的及び化学的刺激により単に表面知覚に就いて検査したため、上皮化生を起こした萎縮性鼻炎において閾値の著しい高値をみたのである。確かに表面知覚は多少鈍麻しているようだが、彼の得た結果はむしろ本来の粘膜上皮と化生扁平上皮との生理学的差を暗示しており、これをもつて萎縮性鼻炎が Hypästhesie 乃至 Anästhesie であると云うのは正しくない。この事は下鼻甲介の破壊性、萎縮性変化を強く起す Wegener 氏肉芽腫症例に就いて証明された。即ち病勢の消長に従つて閾値は変動し、悪化の際は異常高値を示した。又下鼻甲介支配神経障害例(上顎腫瘍による神経侵襲)では、正常棄却限界外の異常高値を示した。以上の事実から、神経障害を起している場合には電気刺激閾値も上昇することが明かである。

III. 組織学的研究

前項で得た生理学的知見を組織学的に確かめ、説明に

裏付けを与えるべく、正常及び病的下鼻甲介粘膜に就いてその神経分布及び形態の観察を行った。

A. 文献的考察

鼻粘膜分布神経に関する研究は Retzius (1892) が猫及び家兎鼻粘膜の上皮内線維を報告し、以来諸家により人、あるいは動物における研究がなされてきた (Schiefferdecker, Kallius 他)。

下鼻甲介の神経分布に就いても Ross ('13), Kadanoff ('28), 岡本 ('37), 丸山 ('39), Caminiti ('42), 伊藤 ('48), 佐藤 ('49), Temesrékási ('59), 倉井 ('60) 等の業績をみる事ができるが、その成績は研究方法その他の諸条件のためか必ずしも一致せず、上皮内線維、小体様特殊終末等の有無、神経分布及び種類等に就いて異なる知見が報告されている。特に知覚神経の分布に就いては比較的少ないとするものが多く、特に佐藤は呼吸上皮を有する部位の中で最も知覚神経に恵まれない所で、疼痛も少ないのではないかとさえて述べている。

以上の業績は大体正常乃至病変軽度の粘膜に就いて行われており、病変著しい粘膜に就いては未だ殆んどその報告をみない。

神経線維の形態に就いては Schwann (1839) 以来、同一線維ではその途中経過において直径が殆んど変わらないことが知られている。軸索と髄鞘の関係は、軸索の小さな線維はその太さの割に比較的厚い髄鞘を有することが諸家により確められ、就中 Sanders ('48) は家兎を用い髄鞘染色を行い、両者の関係は直線的ではなく、対数曲線のように髄鞘の厚さがある値に収斂するものであった。有髄と無髄の区別に就いては、近年 Clara ('42) その他が marklos にかえて markarm を markhaltig に対せしめた。Gasser ('52), Fernández-Morán ('52) は偏光顕微鏡像や電子顕微鏡像で髄鞘構成成分であるリポイドが軸索膜及びシュワン氏細胞膜に存在することを見出し、髄鞘の量の差異にすぎないとした。

一方、生理学的見地から Erlanger & Gasser ('30, '37) は線維直径と機能の間に一定の関係をみており、伝導速度の相違により A (体性有髄線維), B (自律有髄線維), C (体性一及び自律無髄線維) に区別した。Gasser ('55) は無髄体性知覚線維 (d, r, C) 中に痛覚線維及び嗅系が含まれていることを指摘した。

形態と機能の関連に就いては Woollard, Wedell, Harpman ('40, '41) が人間の皮膚感覚に就いて詳しく検討し、夫々の受容器との関係を解明した。Zotterman, Hensel ('52), 丸橋等 ('52) は動物単一求心線維により

受容器を、又知覚線維の種類を求めた。

神経変性に関しては従来より末梢神経切断後に起る Waller 変性に就いて研究がなされてきた (福山他)。この変化過程は軸索及び髄鞘の崩壊機転、及びシュワン氏細胞の増生作用と結合織被膜の変化に大別できる。これを軸索のみに就いてみると、初期には直径の不同化乃至膨化 (捻珠様変化)、異常好染色性を示し、暫時後には染色性は急激に減少し、変性軸索は断片となり、遂には消失する。しかし Glees & Nauta ('55) は直径の不規則さは必ずしも artefact と区別できないので、軸索の滴状断裂 (Tropfige Desintegration) のみを変性の確証とすべきだと唱えた。この変性の際に末梢無髄線維の軸索は変化の現れるのが遅い (Cajal '28 他)。又時には膨化現象を起さず直ちに微細な嗜銀顆粒に壊れてしまう (Scholz) と云われている。

荒木 ('55) は上記変性の他に B₁ 欠乏症, Heine-Medin 氏病, 癩等の場合の神経線維の変化につき、又福井 ('55) は胃潰瘍, 胃癌, 腸結核, 中垂炎等における神経変化を追求し、夫々変性乃至消失をみている。

B. 研究方法

1. 研究材料

当科外来及び入院患者より手術の際あるいは試験切除で得た下鼻甲介粘膜を使用した。

鼻以外の疾患で入院した者 6 例、軽度の慢性単純性鼻炎及び慢性副鼻腔炎 10 例を正常に近いものとして取扱ひ、これに対する異常粘膜として肥厚性鼻炎 8 例、萎縮性鼻炎 18 例、Wegener 氏肉芽腫症 4 例等に就いて検索した。

2. 研究方法

材料採取後直ちに 10% 中性ホルマリン液に浸し、最短半年以上固定した (一年以上の例も可成りあつた)。甲介骨を含むものは固定後、Plank & Rychlo 法により脱灰して再び固定液に浸しておき、20—30μ 凍結切片を作製して鍍銀染色を行い、その他、組織の一部は型通り H・E 染色を施した。切断方向は総合的に観察するために矢状断、水平断及び前頭断を適宜行つた。鍍銀法は主に Bielschowsky—鈴木法を用い、一部瀬戸法, Gros-Schultze 法をも試みたが、組織全体に就いての分布を調べると云う点からは前者が優れていた。

C. 研究成果

1. 知覚神経の形態学的観察

末梢神経の研究に現今最も使用されている鍍銀法も、その方法の差異により結果も又多少異なることがある。私

が用いた Bielschowsky 法の変法は神経の軸索染色法であつて髄鞘、シュワン氏鞘等は染め出されていない。以下の観察成績は末梢神経線維乃至終末の全体像を必ずしも示していないことをお断りしておく。

a. 神経線維の形態学的観察

1) 下鼻甲介に分布する神経線維はその直径にかなりの差があるが、全般的に中等大及び細小線維が多く、太い線維は稀である。この関係を明確にすべく線維（軸索）の直径スペクトルを求め、ヒストグラムを作製した（第2図）。これで見ると明かであるが最大 4μ であつた。しかしこれはごく僅かで、最も多かつたのは 0.5μ

第2図 知覚神経分布（軸索径）

前後のもの及び $1\sim 1.5\mu$ の間の線維であつた。 2μ 以上の太い線維は少かつた。これ等のうち $1\sim 1.5\mu$ の線維は静脈叢壁乃至周囲結合組織中に終るものが多いが、勿論表層に達するものも少からず認められた。 $0.5\sim 1\mu$ の線維の終末はむしろ上皮下層に多く分布しているようであつた。ある一つの太い神経束中にも太さの種々異なる知覚線維があり、大体前述の量的関係に一致した。

2) 同一線維の軸索直径の変化は、 $2\sim 3\mu$ の太い線維ではその差が最大 1.0μ 位に及び、 $1\sim 1.5\mu$ のものでは $0.4\sim 0.5\mu$ であつた。これは偶々みられる、採取後操作による変化とみなされる膨化部は除外し、銀塩により良

く黒染した、変化の無いと思われる部分に就いて測定した。

b. 神経終末の形態学的観察

下鼻甲介における神経終末様式は遊離性終末と小体様終末に大別できる。

1) 遊離性終末：これは神経線維の分岐の有無及びその程度により非分岐性終末、単純分岐性終末及び複雑分岐性乃至樹枝状終末に分けられる（第3、第4図）。これ

第3図 単純分岐性終末

第4図 複雑分岐性終末

等は又線維の直径、終末の存在する部位等により多少差異がある。直径の小さな線維では比較的単純な分岐を示すものが多く、稀に非分岐終末も認められた。しかしこれ等の微細終末は時には更に分岐を出して広範に拡がり、その範囲を軸索の可視限界迄測定したところ数百 μ に及び、それ以上に亘るものも認められた。これは終末の一断面に就いての測定であり、実際は立体的拡がりを有し、又染め出されていない Leitplasmodium 等も考慮に入ると更に広範囲の支配が考えられる。勿論同じ太さの線維でもその終末範囲はかなり異なるものがあることも推測できる。

一方、比較的太い線維は所謂樹枝状終末のような複雑分岐を示すことが多い。これを粘膜浅層におけるものと深層の夫を比べると、後者の方が比較的単純な分岐を示すようであつた。この両者の間にも何らか機能的差異があつても不思議ではない。

2) 小体様終末：これは殆んど総てが深層の偽海綿体静脈叢壁に接して、あるいは叢間結合組織中に発見された(第5図 a, b)。

第5図 a 小体様終末

第5図 b 小体様終末

糸毬状終末は規模が単純で、叢間結合組織中に形成されておる。その構成する神経線維の太さ、数及び形態に多少の相違があり、夫等の間に異なる機能が想像される。即ち一つは細い線維よりなる比較的緩かな纏絡を示すもの、他は二、三本の中等大の線維が螺旋状に纏絡しているもの及び籠状を呈するものが発見された。又叢壁に接して所謂 Schlingenterritorien と見做されるようなものも認められた。これ等にいずれもシュワン氏細胞及び特殊細胞を伴うが、被膜は認められなかつた。

その他、所々に一見類似の所見を得たが、線維群の経過途中における屈曲、纏絡、あるいは線維束の横断面等との区別が困難なことがあり、明かに小体と確認できたものに止めた。又所謂終末棍と云われるようなものもみられたが、線維の断端との判別が確実と云う訳には行かないので記載は差控えた。

自律神経に関する知見に就いては改めて論を起すことにしたい。

2. 正常下鼻甲介における知覚神経分布(附図参照)

下鼻甲介は Schumacher により次のように分けられているが、これに従つて各層に分布する知覚神経に就いて検討した。即ち、深層より

骨膜及び骨

偽海綿体層(血管層)

固有層深層

腺 層

上皮下層(腺様層あるいはリンパ層)

固有層浅層

上 皮 層

下鼻甲介には自律神経は云う迄もなく、知覚神経も予想より豊富である。周知のように該部の知覚神経は三叉神経第二枝に由来し、翼口蓋神経節を通過した後、自律神経線維を伴つた混合神経束即ち下後鼻枝として分布している。下鼻甲介骨膜近傍の固有層最深層中を前方に進み、その経過中に適宜分岐を行い、知覚及び自律両神経によつて構成された太い混合神経束は疎な網工即ち骨膜周囲神経叢を形成している。

a. 骨膜及び骨の知覚神経

1) 骨膜：前述の神経叢から比較的細小なる神経線維が岐れて骨膜内に入る。密な結合織よりなる骨膜内での走行は余り屈曲、蛇行を示さず、随時分岐しつつ深部に達して遊離性に終っている(単純分岐性終末)。検索標本では小体様特殊終末様式は認められなかつた。

2) 骨質：骨膜表層の豊富な神経束網から分岐した細小知覚線維は微細自律線維を伴つて小血管と共に栄養管

あるいはハーヴェルス氏管を貫通して骨髓腔に分布する。この部の知覚線維は比較的平滑な縁と平等な太さを持つていて、軟部組織中を走行するものと多少差異が認められ、一見自律神経の走行と類似しているが、その太さにおいて明かな差があつた。これ等は非分岐あるいは単純分岐性終末を形成している。複雑な分岐終末はなく、全体としての神経分布も稀であつた。

b. 偽海綿体層の知覚神経

骨膜近傍に存在する豊富な太い混合神経束群は夫々、あるいは動脈に並行し、あるいは単独に叢間疎性結合組織中を上昇する。その経過中に適宜分岐を行つて線維量を減じ、一方では又、他の神経束と線維の交換をなし、太い網工を形成する。しかしこれ等太い神経束の中には途中殆んど分岐を示さずに上昇し、浅層に達してから幾つにも岐れるものもある。

太い神経束から分岐した中等大の神経束(10本内外の混合線維よりなる)は更に分岐を行い、静脈叢間に神経叢を形成する。この線維群は蛇行あるいは螺旋状走行を示しながら、ある線維は分岐を幾度か行い、又あるものは余り分岐せずに終末部に達する。中には中等大の神経束から1〜2本の知覚線維が(自律線維を伴つて)岐れ、直ちに支配領域に達するものもある。これ等の線維は叢間結合組織中に、あるいは叢壁平滑筋層及びその近傍に単純性あるいは複雑分岐性終末を形成する。

比較的稀ではあるが、静脈叢壁に接してあるいはその近傍の結合組織中に既述のような単純な糸毬状終末及び螺旋状乃至籠状終末、又所謂 Schlingenterritorien と見做されるものが発見された。動脈に並行して上昇する太い混合神経束から適宜分岐した線維群は動脈壁周囲に非常に密な動脈壁神経叢を形成している。本神経叢は自律神経が多くて知覚線維は少いが、これ等の線維は外膜に接して屈曲、蛇行し、更には螺旋状に纏回している。

又、本層には動静脈吻合(AVA)が発見された。吻合部断面は非常に狭い腔で、内被細胞は一列に配列し、その外側の中膜に相当する部分は非常に厚く、その中に類上皮細胞が多量に、不規則に配列している。一般にAVA周囲には知覚神経が多いとされている。本例でも周囲に比較的太い混合神経束が存在し、分枝が外膜に終るが、中には類上皮細胞層に分岐性終末を形成していた。しかし特殊終末様式は認められなかつた。

c. 腺層の知覚神経

粘膜固有層の深層から浅層にかけて複雑管状腺混合腺の性状を有する鼻腺が所々に集簇して存在する。

叢間結合組織中をぬつて上昇した混合神経束のある物は腺組織の深部で分岐して神経叢を形成し、あるいはその儘腺組織周囲を取巻くようにしながら表層に達して神経叢を作り、又一部の線維束は腺組織内を貫通して表層に達する。これ等の多くは自律線維であるが、知覚線維も含んでおり、これから岐れて腺組織内に拡がる分岐性知覚終末も認められた。多くは腺小葉間をぬつて走行するが、中には腺胞内を貫いて走るような所見もみられた。

この部の知覚終末は腺の活動と関係があるのかあるいは全く関係なく固有層に分布する終末であつて、その部に腺組織が増殖したものかは判然としないが、恐らく後者の考えが妥当であろう。

d. 上皮下層の知覚神経

深層から上昇した自律神経を伴う知覚神経束は支配領域に近づくにつれて岐れ、これ等の線維群は互に交錯して密な神経叢所謂上皮下層神経叢を形成し、更に進んで終末に達する。本層における知覚線維の終末様式は単純及び複雑分岐性乃至樹枝状終末が多く、非分岐性終末は稀であつた。これ等の終末枝は横走、縦走、斜昇し、あるいは反転したりループを画いたりしながら上皮直下に達している。個々により相違はあるが、一つの分岐性終末の支配範囲は非常に広範で、且つ他の分岐性終末の線維と複雑に交錯している。該部には定型的な小体様終末は認めることが出来なかつた。

腺排泄管周囲には知覚線維がこれを取巻くように走行し、夫から出た終末枝は管壁上皮細胞間に進み、一乃至三回分岐を行い、表層附近で遊離性に終っている。

e. 上皮層の知覚神経

上皮下から斜めに、あるいはほぼ垂直に上昇して基礎膜下に達した微細単一線維は二、三枝に岐れ、あるいはその儘基礎膜を貫いて上皮層に入り、細胞間をぬつて上皮層のほぼ中央部迄に終末を形成する。終末様式は単純で、非分岐、尖鋭状に終るものが多いが、中には一、二回分岐するものも認められた。一般にその頻度は少く、上皮層表面に迄及ぶものは発見できなかつた。

3. 病的下鼻甲介における知覚神経分布

下鼻甲介粘膜の変化のはつきりしている肥厚性鼻炎と萎縮性鼻炎及び Wegener 氏肉芽腫症等に就いて検討した。

a. 肥厚性鼻炎

本症における神経線維の形態には異常所見は認められなかつた。唯その分布状態は病型により差が認められた。これを Vogel の分類によつて検討すると、

1) 血管型：偽海綿体の管腔増加，拡大による腫脹で，上皮下層に肥厚は認められない．従つて該部の知覚神経分布は豊富で，既述の正常例と同様の複雑な神経叢を形成している．

2) 乳頭様型：上皮下層が肥厚して lappig となり，組織は粗鬆で，神経線維群は上皮下層の深部から中央部にかけて単純及び複雑分岐性終末を形成し，上皮直下に達する線維は少く，上皮内に進入するものは殆んど発見できなかった．又神経線維の走行は正常に比べて垂直気味であり，屈曲，蛇行の程度が心持弱いようである．

3) 瀰漫性混合性肥大：本型における上皮下層神経分布は前二者の中間で正常におけると同様上皮下層神経叢を形成しつつ表層へ向うが，上皮直下に達するのは比較的少ない．

一方，腺層，偽海綿体層等の深層における神経分布乃至形態に就いては以上の三群の間に判然とした差は認められなかった．

b. 萎縮性鼻炎（附図参照）

本症の病理組織学的所見は病変の時期乃至程度あるいは病型により異なる．早期には慢性炎症像を示し，細胞浸潤が強く（特に腺及び細小動脈周囲に著しい），上皮下組織の線維化，上皮の化生，血管変化等は軽いが，晩期に至ると上皮化生は強く，又屢々上皮剝脱をみる．腺組織は萎縮し，遂に消失するに至る．固有層は全く線維化し，正常粘膜構造を失つてしまう．動脈は全層に線維性，肥厚性変化が高度で，所謂 periarteritis 乃至 Endoarteritis obliterans の像を示し，更に骨に迄線維性変化が起る．

本症における神経形態及び分布状況は病変の時期乃至程度により多少異なる．

1) 単純性萎縮性鼻炎：上皮は化生を示さぬことが多く，薄い上皮下層には（多少の細胞浸潤や線維化はみられるが）深層から上昇する混合神経束が適宜分岐して形成した豊富な神経叢が存在し，上皮直下に縦横に錯走しており，これ等の神経線維の走行様式及び終末形態に就いて特に異常所見は認められなかった．腺組織以下の深層の変化は軽度で，正常構造がよく保たれており，分布する神経線維にも異常を認めなかった．

2) 真性萎縮性鼻炎：病変軽度の例は勿論，上皮化生，細胞浸潤，線維性変化が相当ある例でも知覚神経の分布はよく保たれていた．即ち化生を起した上皮層の直下にも神経叢が認められ，中には夫から更に上皮内に進入し，その基底部附近に非分岐の遊離性終末を形成する

のを認めた．

上皮下層の神経分布は細胞浸潤の強い例ではやや少いように思えるが，これは浸潤細胞の核が共染して発見の妨げとなつていることも一因である．細胞浸潤の程度が比較的軽く，しかも線維化の明瞭な例では神経線維が豊富に認められることから前述の推測がなされる．

深層の神経分布乃至形態は前述の如く浅層に比べて変化が軽いので特に異常は認めなかった．病変高等の例はこれを Wegener 氏肉芽腫症にみることができる．

c. Wegener 氏肉芽腫症（附図参照）

組織の破壊性変化が強く，上皮層は破壊，剝離が起り，上皮下層も線維化と細胞浸潤等で正常構造を失つてゐる．同層の神経線維はために分布が非常に疎となり，残存する神経線維の走行状態は異常で，正常における曲折が少くなつてゐるが，これは周囲組織の線維化による圧迫あるいは牽引のためかと考えられる．又この線維には結節（Varikosität），原線維性膨化，滴状膨大，断裂等の変性を思わせる所見が認められた．腺組織も変性，萎縮，消失して線維化の状態となるが，このような部分には殆んど神経を認めることはできなかった．

動脈壁には全層に亘り強度の変化が認められた．即ち内腔狭小，外膜の肥厚，線維性変化及び硝子様変性が強く，homogen な組織で占められている．周囲に豊富にあるべき神経叢は消失しているか，残存していても膨化，断裂，顆粒状変化等の異常所見が認められた．このような変化は神経叢を構成する知覚及び自律神経のいずれにも認められる．しかし前者は一般に抵抗性を示し，病変高度な部分にも認められるが（変性を起しながらも），後者はそのような部分から殆んど完全に消退している．

斯る場合でも深層殊に骨膜近傍にも中等大，あるいは太い線維束が残存し，個々の線維の変化も表層の夫に比べて軽かつた．

D. 小括及び考按

既述の如く下鼻甲介分布知覚神経は中等大及び細小線維が多い．即ち軸索径 0.5μ 前後のもの及び $1\sim 1.5\mu$ の線維が大部分を占め， 2μ 以上の線維は少かつた．この場合，組織学的検索に当つて自律神経線維との鑑別が問題になる．

一般に有髄知覚線維は次の点で無髄線維と区別されている．即ち直径が大である，その線維の経過における横径の変化が後者より著しい，又走行状態が後者のように滑かでない等である．しかしこの区別は必ずしも容易でない．何故ならば両者の直径分布には重複があり，且つ

髄鞘の有無に就いても最近の電顕所見によると、髄鞘同様構造が全く無い線維は無いと云われ、無髄線維は marklose でなく markarme Nervenfaser と呼ばれるに至っている（しかし両者は質的に異なるとする意見も存在する）。

他方 Erlanger, Gasser 以来の研究により無髄線維の中に体性知覚線維 (d. r. C) が存在し、痛覚を司ることが判明した。Gasser ('55) はこの線維の軸索直径スペクトルを求め、大多数は $0.5\sim 1\mu$ であるが $0.25\sim 1.39\mu$ に亘るのをみている。又 Sanders ('48) は有髄線維の軸索と髄鞘の関係を髄鞘染色を用いて調べ、軸索の小さな線維が太さの割に比較的厚い髄鞘を有し、線維直径 7μ の軸索径は 4.2μ 、直径 1.75μ の線維の軸索は 0.35μ であつたと述べ、単に軸索の直径にのみでは区別できない。私の検索した線維の軸索スペクトルのうち 0.5μ 前後のものは恐らく途中の経過で髄鞘を失つて無髄となつた線維あるいは（所謂 d. r. C に類する）無髄知覚神経線維かも知れない。 1μ 前後のものは有髄線維及び既に途中で髄鞘を失つた線維が混在しているのであろう。これ等を知覚線維とみなしたのは軸索径の他に、これ等細小線維の多数は上皮下層に達して上皮下層神経叢を形成し、広い範囲に亘る単純分岐性終末を形成すること、更に上皮下の各層に $0.1\sim 0.2\mu$ あるいはそれ以下の微細な無髄線維群が上記線維に伴い、あるいは単独に走行している所見等からである。

神経終末のうち遊離終末は諸家の得た所見と同様に非常に多く認められたが、分岐の有無及び程度により非分岐性、単純分岐性及び複雑分岐性（樹枝状）終末に分けられる。前二者は痛覚受容器（Wollard, 瀬戸他）であり、全層に亘り存在している。樹枝状終末は比較的太い線維が上皮下層に迄達して複雑に分岐する所から、毛根周囲神経叢と同様な（形態上に差はあるが）触覚受容器ではないかと思われる。

小体様終末の有無に関しては、認められないとするもの（佐藤、倉井等）と認めたもの（岡本、Temesrékási）があるので詳細に検討したところ、粘膜の前部及び後部で、しかも偽海綿体層に確認された。Temesrékási は後に行くにつれて多くなると述べている。岡本は形態上3つに分類している。自験例のうち叢間結合組織中に存在する、細小線維の比較的緩かな糸毬状の纏絡を示すものはあるいは温度反射受容器かも知れない。又叢壁乃至その近傍に見出される中等大線維よりなる螺旋状又は籠状のものは恐らく圧受容器であろうと思われる。この小

体様終末の機能に就いては、岡本は主として知覚作用を営むであろうとし、Temesrékási は温度受容器と知覚受容器を分けて考えている。

上皮内神経線維に就いても成績がまちまちであり、古くより Retzius, Schiefferdecker, Kadanoff その他の諸家が見事な記載を行つているが、私の検索例では上皮内線維は僅かしか発見できず、該線維は上皮層のその底部から中央部附近に終つている。これは岡本、倉井の所見と同じである。本線維の検索にあたり問題を感じたのは、標本が正しく上皮面に垂直に切れたものか否かと云うことで、斜めであれば基礎膜直下の線維も上皮内のようにみえるし、上皮内基底部に分布するものは中央部から表層に見えることもあるからである。正しく垂直断された上皮においては細胞間隙の嗜銀物質との鑑別であり、猶今後検索を重ねるつもりである。

以上の成績から下鼻甲介の知覚は鈍くなく、特に痛覚は鋭いであろうことは上皮下層に形成された豊富な神経叢及び終末から容易に想像できる。瀬戸、佐藤等は上皮の乳頭発達と知覚神経分布の関係は平行的であり、乳頭形成をみない呼吸上皮部は知覚線維が少く、余り痛み等を感じないだろうとみているが、この説は総ての組織に就いて妥当とは云えない。と云うのは角膜は乳頭形成は無いが知覚線維は決して少なくなく、鋭敏かつ反射が強い。これは鼻粘膜に就いても云えることで、乳頭形成は無く、二点弁別閾は高いが、痛覚は鋭くかつ反射が著明である。恐らくこれ等の部位は髄鞘を失つた細小知覚線維が主に分布しているからであろうと思われる。夫を暗示する好例は、鼻内刺激により“くさめ”反射が出そうな時、外鼻皮膚を刺激すると止ることで、これは該神経のインパルスが外鼻皮膚に分布する太い有髄線維の興奮のため打消されたと考えられる。動物実験（皮膚神経標本）でこの現象が確認されている。

下鼻甲介の状態（肥厚、萎縮）と神経分布状況も、閾値の場合と同様の関係が認められた。即ち前の考按で述べたように、神経は最も高度に発達した組織であつて、ある組織乃至器官に分布する神経線維乃至終末の数は大体一定しており、個人差は著しくない。該組織が増殖、肥厚した場合は神経線維の分布密度が小となる（Arbeits-hypertrophie の場合は問題が別である）。

萎縮性鼻炎の場合も強度の変化が起る迄神経分布がよく保たれていた。これは該部に分布する神経線維は半月状神経節に栄養中枢即ち神経細胞があるので他の組織に比べて障害を受けにくいからである。しかし破壊性の強

い高度の病変がある場合は、末梢部の神経障害像即ち線維（軸索）の膨化、断裂、滴状膨大、顆粒状変化、走行状態の異常等の所見が認められた。又、病変に対する抵抗性は有髄線維の方が大であつたが、これは Waller 変性の場合（この場合は有髄線維の変化が速か）と異り、中枢（神経細胞体）より栄養が保たれているので、末梢部の変化に対して抵抗性があるので、この場合、髄鞘の有無が関係してくるものと思われる。又、神経障害状況をみると、破壊性変化の強い表層において著しく、深層に在る神経束の変化は比較的軽い。しかも全体としてその他の組織の変化に比べると、変化の程度が軽い。これは神経障害が、中枢におけるよりも末梢部において、二次的に生じたものとする証拠でもある。

IV. 総 括

本研究において得られた生理学的及び組織学的知見を総括すると、

鼻粘膜知覚の特徴：鼻粘膜は反射乃至防禦器官として知覚神経の豊富な分布をみるが、外皮とは非常に性質を異にしている。先ず刺激に対する自覚感覚が異なる。即ち痛覚、触覚が鋭敏で、流涙、くさめ等の反射も非常に強い反面、部位識別閾が高い。又、被検者の精神乃至心理的要素が大なる影響を与える。例えば初診時著しく疼痛、不快感等を訴えた患者が治療を続けるうちに余り疼痛を感じなくなることで判る（これには多少“馴れ”の現象があるが）、これは円柱線毛上皮の粘膜と重層扁平上皮の皮膚その自体の性質の差もあるが、当然粘膜に分布する神経線維及び終末の種類乃至性質に関連すると思われる。この部の知覚線維は 0.5μ 前後及び $1\sim 1.5\mu$ の太さ（軸索）の線維が最も多かつたが、前者は直径、走行状態、分岐性終末様式等から、既に経過途中で髄鞘を失った細小線維あるいは無髄知覚線維と考えられ、これが特に上皮下層に豊富に広がっていること、又この線維自体の性質等によるものと考えられる。

神経の形態と機能の対比：鼻粘膜に存在する痛覚、触覚、圧覚等の受容器に就いて組織学的検索を行い、遊離終末として中等大及び細小線維よりなる非分岐性、単純分岐性及び中等大線維の複雑分岐性終末（樹枝状終末）を、又、小体様終末として細小線維の糸毬状終末及び中等大線維の螺旋状乃至籠状終末を発見し、夫々痛覚（単純分岐及び非分岐性）、触覚（樹枝状）、温度反射（糸毬状）、圧覚（螺旋状及び深層の分岐性終末）を対応させて考えた。温度感覚はこれを確かめることが不能であつた。

刺激閾値と神経分布及び粘膜の状態との間の関係：神経障害の無い例では閾値の高低と粘膜、殊に上皮下層の厚さ乃至神経分布の間に一定の関係が認められた。即ち、肥厚性鼻炎が閾値最高で、上皮下層は肥厚し、該部神経密度は小、かつ上皮直下に達する線維は少なかつたが、萎縮性鼻炎は閾値最低であり、上皮下層は薄く、上皮直下に神経線維が豊富に認められた。

萎縮性鼻炎の知覚：一般には本症の知覚は鈍麻していると云われているが、実際に当つてみると必ずしも一様でなく、かえつて鋭敏であると思われる例も認められる。冒頭に述べた目的で本症の知覚を調べたところ、高度病変の場合を除いては障害は認められなかつた。本症を単純性と真性に分けると、後者が高い値を示したが、上皮下の神経分布は前者と余り変らなかつた。これは上皮化生、固有層の線維性変化等による影響と思われ、夫等による表面知覚鈍麻はあつても神経線維に本質的な障害はない。即ち本症病因に対する一次的意義を持たないことが判つた。

外見上同様な萎縮像を呈していても、組織の破壊性変化の強い Wegener 氏肉芽腫症では閾値は異常に高く、神経線維末梢部に変性が認められた。しかし他組織の変化に比べると軽度であつた。又、本症の病状進行と共に、初め低かつた閾値が上昇したが、これは病変進行に伴つて二次的に神経障害が起つたためと思われ、事実、試験切除標本で神経線維の変性像が認められた。

神経障害例（腫瘍による侵襲）：この場合は異常高値を示し、該部では全く感じないこともあつた。しかも同一人の健側は正常値を示していた。このことから、閾値の異常上昇をみた場合は（装置、接触の異常を除外した後）神経障害があると診断することができる。

V. 結 論

未だ充分解明されていない鼻粘膜の知覚に就いて研究を行い、正常及び病的粘膜に就いて生理学的立場から電気刺激に対する反応を求め、組織学的立場から鍍銀法による神経末梢部の検索を行い、比較検討した。

1) 知覚検査成績（閾値）と神経分布及び粘膜の状態の間に密接な関係が認められた。

2) 下鼻甲介の神経分布を各層に就いて詳細に検索し、自律神経のみならず、知覚神経も又豊富であることを知つた。

3) 自覚感覚を調べ、痛覚の他に触覚、圧覚の存在を明かにし、夫々に応ずる終末形態（非分岐、単純分岐及び複雑分岐性終末、小体様終末）を組織学的に発見し

た。

4) 痛覚、触覚は鋭敏で、反射作用も強かつたが、部位識別閾は非常に高かつた(鼻粘膜知覚の特徴)。

5) 知覚神経直径スペクトルを求め、中等大乃至比較的細い有髄線維と、途中で髄鞘を失つたと思われる細小線維(あるいは無髄知覚線維か)よりなることを知つた。

6) 萎縮性鼻炎は病変高度でない限り、神経線維の変化による本質的な知覚障害は認められなかつた。

7) Wegener 氏肉芽腫症の病状消長と共に閾値変動し、組織学的に神経末梢部の変性をみた。

8) 知覚神経障害例(腫瘍の侵襲)では閾値は異常高値を示し、診断には有用なることが判つた。

9) 鼻中隔は下鼻甲より閾値が高く、感受性は下鼻甲に劣るものと判定した。

10) 鼻茸は著しく高いか、全く感じなかつた。鼻茸自体には知覚は殆んどあるいは全く無いと考えた。

主要参考文献

- 1) 荒木正哉：京府医大誌，58：143，(1955)。
- 2) Bonica, J.J.: The Management of Pain. Lea & Febiger (1954)。
- 3) Caminiti, F.: Scritti. biol. 16: 90. (1942)。
- 4) 伊藤基：京府医大誌，43：163，(1948)。
- 5) Denker u. Kahler.: H.b. d. Hals- usw. Hkde. II. (1926)。
- 6) Erlanger, J. & Gasser H.S.: Am. J. Physiol. 92: 43, (1930)。
- 7) Erlanger, J. & Gasser, H.S.: Electrical signs of nervous activity. Univ. Pennsylv. Press. (1937)。
- 8) Fernández-Morán: Exper. Cell Res. 3: 282, (1952)。
- 9) v. Frey, M. u. a.: Zsch. für Biol. 82: 395, (1924)。
- 10) 福井泰次郎：京府医大誌，58：735，(1955)。
- 11) 福山右門：基礎医学最近の進歩，解剖・病理篇 2. 医歯薬出版 (1958)。
- 12) Glees & Nauta.: Msch. Psychiatr. 129: 74, (1955)。
- 13) Gasser, H.S.: J. Gen. Physiol. 38: 709, (1955)。
- 14) v. Gyergyai.: Arch. für Laryng. 33: 353, (1920)。
- 15) 初岡三千夫：耳鼻臨，30：434，(1935)。
- 16) Holmes, T.H. etc.: Am. J. Med. Sci. 218: 16, (1949)。
- 17) Holmes, T.H. etc.: The Nose. Charles C. Thomas. (1947)。
- 18) Hensel, H.: Ergebn. Physiol. 47: 166, (1952)。
- 19) 伊藤竜，加納純一：日生理誌，14：233，(1952)。
- 20) Kadanoff, D.: Zschr. für Zellforsch. u. Mikrosk-Anat. 6: 337, (1928)。
- 21) Kayser.: Zschr. für Ohrenhkde. 49: 53, (1904)。
- 22) 北村武他：日耳鼻，61臨：234，(1958)。
- 23) 倉井秀夫：日耳鼻，63：101，(1960)。
- 24) Maruhashi, J. etc.: J. Physiol. 117: 129, (1952)。
- 25) 丸山一男：耳喉，12：347，(1939)。
- 26) 三浦岱栄他：日医新報，No. 1822, 7, (1959)。
- 27) Möllendorff': Hb. d. Mikrosk-Anat. IV/1, 28) Möllendorff': Hb. d. Mikrosk-Anat. IV/4, 29) Möllendorff: Hb. d. Mikrosk-Anat. IV/5, 30) Möllendorff: Hb. d. Mikrosk-Anat. V/3, 31) 本川弘一：医学・生物学，電気的実験法，南山堂，(1955)。
- 32) 中村信成：千葉医会誌，33：82，(1957)。
- 33) 緒方知三郎：病理組織学を学ぶ人々へ，南山堂。
- 34) 岡本重雄：大阪医会誌，36：1559，(1937)。
- 35) Ornstein, S.: Passow-Schaeffer Beitr. 26: 153, (1923)。
- 36) Retzius, G.: Biol. Unt. N.F. Bd. 3 & 4 (1892)。
- 37) Sanders, F.K.: Proc. Roy. Soc. Lond. Ser. B 135: 323 (1948)。
- 38) 佐藤竜男：東北医誌，40：8，(1949)。
- 39) Scholz W.: Hb. d. Speziell. Path. Anat. 13/IA. Springer. (1957)。
- 40) Schriever, H.: Zsch. für Biol. 83: 415, (1925)。
- 41) Schriever, H. u. H. Strughold.: Zschr. für Biol. 84: 193, (1926)。
- 42) Scott-Brown, W.G.: Diseases of the Ear, Nose and Throat. I. Butterworth & Co. (1952)。
- 43) 瀬戸八郎：人の知覚，医学書院，(1957)。
- 44) 鈴木清：実験治療，No. 310—320, (1959)。
- 45) 新海一義他：学術月報別冊資料，32：72, (1953)。
- 46) Temesrékási, D.: Zbl. für HNO 64: 272 (1959)。
- 47) Temesrékási D.: Pract. Oto-laryng. 21: 254, (1959)。
- 48) Terracol, J.: Les Maladies des Fossa nasais. Masson et C^{ie}. (1953)。
- 49) 問田直幹他：新生理学，上，医学書院，(1960)。
- 50) Tower, S.S.: J. Neurophysiol. 3: 486, (1940)。
- 51) Vogel, K.: Zschr. für H.N.O. 22: 507, (1929)。
- 52) 若林勲他：医学エレクトロニクス，南山堂，(1956)。
- 53) Weddell, G.: J. Anat. 75: 346, (1941)。
- 54) Weddell, G.: J. Anat. 75: 441, (1941)。
- 55) Weddell, G.: Brit. Med. Bull. 3: 167 (1945)。
- 56) Wolff, H.G.: Headache and other Headpain. Oxford Univ. Press. (1948)。
- 57) Wollard, H.H. etc.: J. Anat. 74: 413, (1940)。
- 58) Zarniko, C.: Die Krahkheiten der Nase Nasenrachens. S. Kargler. (1910)。
- 59) Zotterman.: Nerve Impulse IV, 140. Josiah. Macy

Foundation, (1953).

付 図 説 明

- 第 1 図 上皮内線維
- 第 2 図 排泄管上皮内線維
- 第 3 図 上皮下の単純分岐終末
- 第 4 図 上皮下層神経叢
- 第 5 図 腺層内を走る神経
- 第 6 図 静脈叢壁近傍の分岐終末
- 第 7 図 上皮下層を上昇する神経叢
- 第 8 図 動静脈吻合と神経
- 第 9 図 糸毬状終末（結合織中）
- 第 10 図 糸毬状終末（叢壁）
- 第 11 図 動脈壁神経叢
- 第 12 図 叢間結合織中を上昇する神経束
- 第 13 図 骨膜に進入する線維
- 第 14 図 深層における神経束の網工
- 第 15 図 骨髓内神経
- 第 16 図 上皮下層神経叢 (At.)
- 第 17 図 結合織中の遊離終末 (At.)
- 第 18 図 動脈壁神経叢 (At.)

- 第 19 図 病変高度な部分に神経残存 (W)
- 第 20 図 線維化強く、小動脈閉塞、神経も変性 (W)
- 第 21 図 神経線維の変性 (W)
- 第 22 図 動脈壁の変化と神経の顆粒状変性 (W)
- 第 23 図 動脈壁に高度の変化、該神経叢変性 (W)
- 第 24 図 深層には残存する神経束網 (W)

注 (At) 萎縮性鼻炎

(W) Wegener 氏肉芽腫症

稿を終るに臨み、終始御懇篤な御指導、御校閲を賜った恩師北村武教授、及び第一解剖学教室福山右門教授に深甚なる謝意を捧げると共に、種々御鞭撻、御助力戴いた金子講師、並びに教室員各位に感謝致します 又貴重なる標本を貸与戴いた社保大宮病院耳鼻科倉井博士に深謝致します

本論文の要旨は日耳鼻関東地方会第 373 回例会、及び日耳鼻第 63 回総会において発表した。

(原稿到着＝昭和 36. 2. 26 日)

戸川論文付図(1)

第 1 図

第 2 図

第 3 図

第 4 図

第 5 図

第 6 図

戸川論文付図(Ⅱ)

第 7 図

第 8 図

第 9 図

第 10 図

第 12 図

第 11 図

戸川論文付図(Ⅲ)

第 13 図

第 14 図

第 16 図

第 15 図

第 17 図

第 18 図

戸川論文付図(Ⅳ)

第 19 図

第 20 図

第 21 図

第 22 図

第 23 図

第 24 図