ROENTGENOLOGIC DIAGNOSIS OF THE CANCER IN THE MAXILLARY SINUS

By

SHIGEAKI AIHARA

*Department of Oto-Rhino-Laryngology, Chiba University,
School of Medicine (Director: Prof. T. Kitamura)*

Roentgenograms of 30 cases of the operated maxillary cancer are compared with the histological findings in the large section preparates. Results as follows:

1) The maxillary sinus. The dense shadows with the bright portions and discontinuous contours of the sinus walls are the pathogmotical findings. The destruction of the posterior wall and the pterygoid process are visualized by means of the axial views, Rhese's technic and horizontal or sagittal tomography.

2) The almost similar findings are found in the ethmoid portion.

3) The sphenoidal sinus has to be examined by means of the axial views and the frontal tomography.

4) The dense shadows sometimes were found

in the frontal sinus, but no invasion of the cancer in this series.

5) The nasolacrimal duct was visualized through the injection of 40% moljodol (0.3cc). Its abnormality revealed the invasion of the cancer in the anterior superior portion of the nasal cavity.

6) The arteriography of the external carotid reveals the destruction of the bony walls according to the dislocation of the stem and its branches.

The existence of the cancer in the maxillary sinus today is easily diagnosed, but the destruction of the bony wall and its grade may be only demonstrated through the adequate technic according to each wall of the sinus, so that the necessary and complete diagnosis will be only successful by means of some films, taken by adequate technics to the cases.

上 顎 癌 の X 線 診 断

千葉大学医学部耳鼻咽喉科学教室 (主任: 北村武教授)

相 原 茲 明
あい はら しげ あき

目 次

I 緒 言

II 文献的考察

- A) 単純撮影その他
- B) その悪性腫瘍への応用
- C) 断層撮影
- D) 外頸動脈造影撮影

III 研究方法

- A) 単純撮影
- B) 断層撮影

C) 涙道造影撮影

D) 外頸動脈造影撮影

IV 研究成績

- A) 手術・摘出標本・大切片標本所見
- B) 単純撮影と手術所見との比較
 - 1) 後頭前頭撮影
 - 2) 後頭頤撮影
 - 3) 軸位撮影
 - 4) Rhese 氏法撮影
- C) 断層撮影と手術所見との比較

- 1) 前頭断層撮影
- 2) 矢状断層撮影
- 3) 水平断層撮影
- D) 涙道造影撮影と手術所見との比較
- E) 外頸動脈造影撮影と手術所見との比較

V・総括並びに考按

- A) 上顎洞陰影
- B) 上顎洞骨壁
- C) その他の副鼻腔
- D) 鼻腔内各部
- E) 翼状突起と頬骨
- F) 外頸動脈と上顎洞各壁の関係

VI 結 語

主要参考文献

付 図

I. 緒 言

上顎癌の診断には従来病歴、鼻鏡検査の他に X 線写真、更には試験的開洞術等が用いられ、診断の確定には試験切除による組織学的検査を必要としていた。近年、超音波診断法等の新技術の導入並びに諸種診断法の進歩により、上顎癌の診断は次第に容易且つ確実となつて来たが、その中に占める X 線診断法の位置は依然として大きいものがあり、特にその進展範囲の決定には欠かせないものである。X 線診断法の耳鼻咽喉科領域への応用の初期においては、上顎癌の診断に用いられたものは後頭前頭・後頭頤撮影であり、その後軸位・斜位撮影等の案出があり、更に第二次世界大戦直前での断層撮影法の実用化から、戦後でのその目覚ましい普及まで進歩は絶え間ない。現在、上顎癌の診断に一般に用いられているものは後頭前頭・後頭頤撮影に加えて前頭断層撮影である。しかし、これ等の撮影法では鼻鏡検査で知り難い上顎洞後壁及びその附近への腫瘍の侵襲状態を観察し難く、近年 X 線以外の診断法の導入とは別に X 線写真利用によるこの方面の開拓が各地で試みられており、断層撮影法では矢状・水平・回転・斜位断層等種々の撮影法の発表が行われ、又、外頸動脈撮影法のこの領域への応用も報告されているが、多くは断片的なものである。そこで私は更めて上顎癌の X 線診断法を体系化する意味において、矢状・水平断層、涙道造影、外頸動脈造影撮影をも加えた諸種 X 線撮影法の応用による上顎癌の診断法に就いて研究を行い、些かの知見を得たのでここに報告する。

II. 文献的考察

A) 単純撮影その他

鼻副鼻腔領域への X 線の応用は既に X 線の発見された 1896 年に Scheier が頭部の射創患者に側位撮影法を用いたのに始る。その後 Meyer (1898) は上顎肉腫の大きさを側位撮影を用いて詳細に測定し、Winkler (1902) も側位撮影を用いた研究を行つている。次で Haegeler (1904) は矢状位撮影法を考案発表したが、同年 Goldmann は矢状位撮影法に就いて更に詳しい報告をしており、彼等は側位撮影では左右の鼻副鼻腔が重るために左右の観察が不十分であるのに対して、矢状位撮影では左右が別々に描出される利点のある事を指摘している。この二つの撮影法は時代の経過と共にその研究が盛んとなり、撮影法の改善と X 線機械の改良により次第に鮮明な像が得られるようになって、病的变化の診断に大きな価値を持つて来た。即ち Goldmann と Killian (1907) が副鼻腔炎にこの撮影法を応用し、健側と比べて患側の陰影増強を指摘している。その後も Coakley (1906), Caldwell (1907), Albrecht (1908), Peyser (1909) 等の研究があり、彼等は一様に副鼻腔炎の診断には X 線写真は重要な補助的診断法であると云つており、Peyser の如きは疑いもなく必須の診断法であると述べている。

蝶形洞は側面撮影で鮮明に描出されていたが、左右陰影が重つて了う欠点があつた。この事は後に Haike (1911) も指摘している通りである。そこで Küttner (1908) は矢状位撮影で蝶形洞を描出しようとして屍体を使つて水銀を洞内に注入して撮影した処、洞底は水平陰影として判然と現れたが、鼻中隔と交叉しており篩骨洞とも重り、しかもこの方法では生体に応用する事は不能であり、Albrecht (1908) も矢状位撮影での蝶形洞の描出は不能であると述べている。処が、Siebenmann (1907) は小フィルムを口内に挿入、頭頂より X 線を投射する軸位撮影法を発表し蝶形洞の観察を行い、Spiess (1907) は頤の下にフィルムを置き、頭頂から頤部に向け X 線を投射する方法(垂直頤下法)を考案し、翌年には Pfeiffer が Spiess の方法と逆の方向からの X 線投射の方法(頤下垂直法)を行い、両法の比較を行つている。即ち、前者では蝶形洞前部と下顎骨が重るので下顎骨を前方に描出せねばならず、後者ではフィルムと蝶形洞の距離が大きくなるので像が拡大されると述べている。この撮影法は頭蓋底及び蝶形洞の観察法として相当な価値が認められた。しかし、当時は X 線装置やその

附属品が余り進歩していないために十分な効果を示す事ができなかつた。かくて、Pfahler (1921) と Knick (1923) が口腔内カセットを考案し、蝶形洞の鮮明な影像を得るに至つた。我国でも松井・義江が注目し、義江 (1940) と橋本 (1940) が夫々独自の口腔内カセットを考案し、蝶形洞炎の診断に応用して相当の効果を挙げている。Pfeiffer (1916) によれば蝶形洞描出を目的に考案された軸位撮影法もその後の研究により全副鼻洞の描出が可能であり、洞の前後及び左右方向の拡り並びに壁の観察が可能で、特に前頭洞の観察では後頭前頭撮影で欠損しているように見える洞をこの方法で観察できると述べている。

一方、Rhesse (1910) は篩骨蜂窠と蝶形洞観察を目的として斜位法を試み、Pfahler (1917) は別に上顎洞観察のための斜位法を考案し、洞前・下壁の観察、特に歯からの感染の疑いのある場合の観察に適し、又蝶形洞の陰影を眼窩の軟部組織を通して投影できると云つている。更に Coalwin (1925) も独自の斜位法を用いて視神経管の計測を行つている。

その他、Waters (1915) は既に Caldwell と Killian によつて始められた後頭前頭撮影法の変法として頭位の僅かな変化により各副鼻洞への側頭骨錐体部陰影の重畳による陰影の不鮮明化を除く事に成功した。

又、Sicard (1922) は沃度油を上顎癌患者の上顎洞に注入し、造影剤の使用による腫瘍の映像把握を初めて試みた。更に Fraser (1926) も同様な試みを行い、同年に Proetz は置換法の利用による副鼻洞への造影剤の注入を行つている。

涙道に造影剤を初めて注入したのは Ewing (1909) で、その後 Aubaret (1911)・Szily (1914)・Gaugelen (1918)・Campbell (1922)・早野 (1922) 等が各種の造影剤を注入し、その狭窄・拡張・走行異常等の発見に努めた。リビオドールの発見後は Hoeve (1925)・Stedefeld (1927)・中村 (1928)・Unterberger (1931)・武藤 (1932)・畑 (1935)・Spackmann (1938) 等多くの研究がなされているが、本村 (1958) は 40% モルヨドールを注入し、種々の鼻副鼻腔疾患における涙道の状態を調べ、上顎悪性腫瘍の際に特有な所見として陰影欠損を挙げ、大多数において狭窄・内方圧排が見られたと報告している。

B) その悪性腫瘍への応用

上顎悪性腫瘍の研究に X 線を初めて応用したのは前述の如く meyer (1898) であるが、彼は上顎肉腫の大

きさを側位撮影法を用いて測定したに過ぎない。その後、上顎悪性腫瘍への応用は Graupner (1912)・Passow (1925) 等によつて行われている。Houser (1933) は上顎悪性腫瘍の診断には単純及び造影撮影は他の検査法より以上に重要であると云つており、Pfahler (1940) は上顎癌の X 線所見として、鼻副鼻腔の陰影増強・骨影の拡大と崩壊・造影剤による軟部組織の不規則輪廓を挙げ、前述の諸種撮影法の組合せによる診断法を推奨している。

本城 (1940) は後頭前頭撮影での上顎隆起の影像を TM 線と呼び、悪性腫瘍の際にはその消失が見られ診断上重要な示針となると述べている。吉川 (1941) は上顎洞壁は X 線により切線的に投影される時最も鮮明に描出されるとし、Rhesse の始めた斜位法で上顎洞側後壁が切線的に投影されるので、この方法はこの部の観察に適していると述べ、又彼は腫瘍により陰影増強をきたした上顎洞影像は腫瘍の侵襲が進み骨融解をきたすと明瞭化すると云う。これに就いては山本 (1947) も同様の見解を持つているが、この場合骨融解があつても頬部腫脹の見られるものでは陰影が増強すると彼は付け加えている。Gilmore (1956) は上顎悪性腫瘍の陰影濃度はポリープより濃く、骨腫より淡いと云つているが、Gordon (1955) は陰影の濃度からそれが悪性腫瘍によるものか炎症によるものかは不明であると述べ、更に彼は Graham (1951) が悪性腫瘍では一側性の洞陰影増強を示すと云つている事と、Haas (1951) が上顎悪性腫瘍の際に前頭洞に骨粗鬆や硬化が多く見られると云つている事を否定している。

一方、山本 (1956) は上顎悪性腫瘍患者に上顎洞造影撮影を行い、特徴的な陰影を得たと述べ、浅井 (1958)・服部 (1962) も上顎癌の早期診断に同撮影が重要な意義を持つとしている。

C) 断層撮影

断層撮影を最初に試みたのは Bocage (1921) で、深部 X 線照射量の測定に利用した。しかし、実際の応用は Vallebona (1930) が頭蓋の X 線的研究に用い、単純撮影で見られる陰影の重畳を除く事に成功した事を嚆矢とする。しかも、これが耳鼻咽喉科領域における最初のものである。以来、断層撮影は主に頭部・咽喉・胸部において研究が行われており、鼻副鼻腔領域においては More (1938) は篩骨洞の、Cone (1939) は副鼻洞と球後性視神経炎の關係に関する、Epstein (1942) は蝶形洞の研究に断層撮影を用いている。Holvey (1944) は

成人屍体の断面と断層写真を比較し、その所見の一致する事を詳細に記述、更に上顎癌・副鼻腔炎に応用し、洞壁の輪廓が他の撮影方法より明瞭に示され、診断上極めて有意義であり、特に上顎腫瘍の拡りを知る上には断層撮影がよりよい方法であると推奨している。第二次世界大戦終了後、鼻副鼻腔領域における断層撮影の研究は益々盛んとなり、Reynaud (1949)・Prevedi (1950)・Stanislow (1953)・Psenner (1953)・Carini (1954)・Sichel (1957) その他によつて行われているが、Dargent (1948)・Ennuyer (1951)・Baclesse (1952) は夫々上顎腫瘍の診断と治療計画の上で断層撮影は必須のものであるとしている。又、Boschet (1954) は副鼻腔の系統的断層撮影の必要性を強調し、診断には眼窩縁を基準に少なくとも四層の断層写真が必要であると述べている。我国でもこの頃から鼻副鼻腔疾患特に上顎腫瘍への断層撮影の応用が活潑となり、野中 (1953) は断層撮影で頭部各断面の形態学的所見を説明し、松田・笹尾 (1954) は上顎癌に応用し、骨欠損の判定は容易であり、腫瘍の侵蝕程度をより明確に知り得、これにより手術法・手術範囲の決定に資する所大であるとしている。更に、高須賀 (1957)・太田 (1958) は単純撮影では困難な翼状突起及び篩骨蜂窩への上顎癌の浸潤も適当な断層面に現れる突起輪廓の不鮮明及び蜂窩壁・隔壁の崩壊像により診断が容易になると述べている。鼻副鼻腔領域への断層撮影はその創始期より前頭・矢状断層面の研究が行われているが、大多数は前頭面のものであつた。所が、これでは描出困難な上顎洞後壁・翼口蓋窩附近の描出に関する研究が次第に行われるようになった。即ち、浅井・太田 (1958)、Dodd・網野・太田 (1959)、服部 (1962) 等は矢状断層撮影を行い、左右両側を同一面に描出できない欠点はあるが、前後方向特に上顎洞前・後壁、翼状突起、翼口蓋窩、蝶形洞への腫瘍の侵襲を知り得る利点に触れている。一方、片桐 (1954)・浜崎 (1961) は回転横断撮影を、佐藤 (1960) は水平断層撮影を行い、上顎腫瘍の水平面的拡り特に上顎洞後壁・翼状突起・蝶形洞の状態を知り、吉井 (1961) は斜角断層撮影を行い、上顎洞側後壁の影像を鮮明に描出した。

D) 外頸動脈造影撮影

血管造影は1923年以来動物を用いて幾つかの研究が行われていたが、人間への応用はMoniz (1927) が脳血管に行つたのが最初であり、彼は当時の造影剤が脳障害をきたすのでヨードナトリウムを用いた所、これは造影力は強いが局所障害も強く、次で彼 (1931) はトロト

ラストを用いた。この造影剤は副作用もなくより早く血管系を通過するために、Löhr (1932)・Tönnis (1933) 等を始め一般に使用されるようになった。しかし、Eckström (1838) がトロトラストによる血管周囲の肉芽腫形成例を報告したのに始まり同様の報告が相次いだので、Hämmerli (1939) はエチルトリヨードステアリンを用い、その毒性の殆どない事を証明し、その後専らこれが用いられるようになり、現在に至るもそれと同類の各種の有機ヨード製剤が賞用されている。

脳血管即ち内頸動脈造影は脳内疾患の診断に必須のものとして数十年前より日常に行われているが、鼻副鼻腔領域の血管即ち主に外頸動脈造影は未だ殆ど行われてなく、文献上僅かに数例に過ぎない。Schrudde (1957) は上顎洞附近の腫瘍患者にウログラフィンを用いて本法を行い、上顎洞後方における血管に富んだ腫瘍の診断に特に有意義であり、同部の悪性腫瘍の存在も血管の走行異常から知り得ると報告しており、Scheunemann (1957) は屍体に本法を用い、外頸動脈領域の変異は他部血管領域のそれよりも少い事を述べ、生体にも応用して経皮的注入法も可能であると語っている。更に、彼 (1958) は浅側頭動脈及び顔面動脈の個々の造影法を発表した。Arslan (1959) は鼻部の膠原病患者に本法を行い、頸動脈末端が「mousetail」様の特殊陰影を示す事を指摘している。

III. 研究方法

昭和36年1月から37年12月までの二年間に千葉大学医学部附属病院で腫瘍摘出術を行つた上顎癌患者30例に、術前次のX線撮影法を施行し、そのX線写真所見と手術・摘出構本・大切片標本所見と比較検討した。X線撮影装置は東芝放射線株式会社製DRX 81型を使用した。

A) 単純撮影

- 1) 後頭前頭撮影 (62k Vp, 100mA, 1.0sec., 距離100cm, プツキーブレンデ使用)
- 2) 後頭頤撮影 (66k Vp, 100mA, 1.5sec., 距離100cm, プツキーブレンデ使用)
- 3) 軸位撮影 (頤下垂直法) (64k Vp, 200mA, 1.5sec., 距離100cm, リスフォルムブレンデ使用)
- 4) 斜位撮影 (Rhese 氏法) (66k Vp, 100mA, 1.5sec., 距離100cm, プツキーブレンデ使用)

B) 断層撮影

- 1) 前頭断層撮影 (60k Vp, 100mA, 3.0sec., 移動角度45°, 距離100cm, プツキーブレンデ使用)

腹臥位で独逸水平面をフィルムに垂直にし、次の四面で撮影した。

- 1面：2面より1.0cm前方の面。眼窩前部・前篩骨蜂窠前部・上顎洞前部・鼻腔前部・鼻涙管・歯槽突起前部を通る。
 - 2面：外眼角を通る面。眼窩中央部・前篩骨蜂窠後部・上顎洞中央部・鼻腔中央部・歯槽突起後部・頬骨前部を通る。
 - 3面：2面より1.5cm後方の面。眼窩後部・後篩骨蜂窠・上顎洞後部・鼻腔後部・口蓋後部・頬骨後部を通る。
 - 4面：外眼角と外耳道前縁を結ぶ線上で後1/3を通る面。蝶形洞・鼻腔最後部・翼状突起を通る。
- 2) 矢状断層撮影 (60kV_P, 100mA, 2.0sec., 移動角度45°, 距離100cm, プツキーブレンド使用)

腹臥位で頭部矢状面をフィルムに平行に患側を下にして次の四面で撮影した。

- 1面：患側外眼角を通る面。頬骨を通る。
 - 2面：患側眼窩中央を通る面。上顎洞中央部・翼状突起を通る。
 - 3面：患側内眼角を通る面。篩骨蜂窠・蝶形洞・鼻腔を通る。
 - 4面：健側眼窩中央を通る面。
- 3) 水平断層撮影 (74kV_P, 100mA, 2.0sec., 移動角度45°, 距離100cm, プツキーブレンド使用)

腹臥位で顔面を前方に出し独逸水平面をフィルムに平行にして次の四面で撮影した。

- 1面：鼻腔底部を通る面。上顎洞下部・鼻腔最下部・翼状突起下部を通る。
- 2面：1面と4面間の下1/3を通る面。上顎洞中央部・鼻腔下部・翼状突起中央部・頬骨最下部を通る。
- 3面：1面と4面間の上1/3を通る面。上顎洞中央部・鼻腔中央部・翼状突起上部・頬骨下部を通る。
- 4面：眼窩下縁を通る面。上顎洞上部・鼻腔上部・頬骨中央部・篩骨蜂窠下部・蝶形洞下部を通る。

C) 涙道造影撮影【64kV_P (側面60kV_P), 100mA, 1.0sec (側面0.8sec), 距離100cm, プツキーブレンド使用】

40% モルヨドール 0.3cc を注入器を用いて下涙点より注入し、正面及び側面撮影を行った。

D) 外頸動脈造影撮影【74kV_P (側面70kV_P), 100mA, 1.0sec., 距離100cm, リスフォルムブレンド使用】

腫瘍摘出術に際し予め露出した外頸動脈起始部より末端へ1~2cm, 離れた部位に、長さ4.0cm, 内径0.8mmの注入針を刺入, 76% ウログラフィン10cc をできるだけ早い速度で注入し、正面及び側面撮影を行った。

IV 研究成績

A) 手術・摘出標本・大切片標本所見 (以下手術所見と略す) (表1)

上顎洞各壁は主に大切片標本所見に頼り、足りない所を摘出標本所見で補った。表中(Ⅲ)は骨に欠損のあるものを、(Ⅱ)は骨に腫瘍の侵襲の見られるものを、(Ⅰ)は洞粘膜に腫瘍の侵襲の見られるものを示し、(○)は以下全て侵襲のない事を示す

篩骨蜂窠は主に摘出標本所見により、手術所見で補足した。(Ⅱ)は腫瘍の侵襲の著しいものを、(Ⅰ)はそれの軽いものを示す。蝶形洞・前頭洞は専ら手術所見に頼り、(Ⅲ)は洞骨壁の欠損のあるものを示す

梨状孔縁・下鼻介・中鼻介・涙道・鼻底は摘出標本所見により、(Ⅲ)は骨崩壊の見られるものを、(Ⅱ)は骨に腫瘍の侵襲の見られるものを、(Ⅰ)は粘膜に腫瘍の侵襲の見られるものを示す。鼻中隔は手術所見によるものである。

翼状突起・頬骨は主に摘出標本所見に頼り、手術所見で補った。翼状突起では(Ⅰ)は腫瘍の侵襲の見られるものを示す。頬骨では(Ⅲ)は骨の欠損の見られるものを、(Ⅱ)は骨に腫瘍の侵襲の見られるものを、(Ⅰ)は周辺骨に腫瘍の侵襲の見られるものを示す。

眼球除去では(Ⅰ)が除去を示し、(○)は除去しない事を示す。

B) 単純撮影所見と手術所見との比較

1) 後頭前頭撮影 (表2)

(一)は骨・軟部陰影に断絶・消失のあるものあるいは含気腔陰影の透明化を、(Ⅲ)は骨・軟部陰影の厚化高度なものを、(Ⅱ)はそれの中等度なものを、(Ⅰ)はそれの軽度なものを、(±)はそれの疑わしいものを、(○)は正常所見を示す。不規則性は(○)と(一)を両極端とし、各例での両端の差を以て示した。対照として対側を使用した。他の撮影法においても同様である。なお、前頭洞の項の斜線は洞不在を示す

a) 上顎洞陰影

不規則性 3が1例, 2が9例, 1が17例, 0が3例で、

表 1 手術・摘出標本・組織所見

症 例		性	年 令	患 側	上 顎 洞 (壁)						篩 骨 蜂 窠	蝶 形 洞	前 頭 洞	梨 状 孔 縁	下 鼻 介	中 鼻 介	鼻 淚 管	鼻 底	鼻 中 隔	翼 状 突 起	頰 骨	眼 球 除 去
番 号	名				上	下	内	外	前	後												
1	I U	♂	40	R	+	○	+	+	+	+	+	○	○	+	+	+	+	○	○	○	○	
2	H S	♀	53	L	+	○	+	+	+	+	○	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
3	M i S	♀	62	L	○	+	○	+	○	+	○	○	○	○	○	+	○	+	○	○	○	
4	H K	♂	50	R	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	+	+	+	○	
5	M O	♂	58	L	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
6	O M	♂	49	L	+	○	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
7	H S	♂	61	R	○	+	+	+	○	+	+	○	○	○	+	+	○	○	+	+	○	
8	T N	♂	60	R	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	○	○	○	○	○	+	○	
9	T I	♀	70	R	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	○	○	○	○	+	○	
10	M N	♂	61	L	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
11	M a S	♂	58	R	+	○	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
12	C H	♂	79	L	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	+	+	○	
13	K Y	♀	59	L	+	○	+	○	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
14	Z E	♂	70	L	+	+	+	+	+	+	○	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
15	M I	♀	46	R	+	+	+	+	+	+	+	+	○	+	+	○	+	○	+	+	○	
16	E O	♂	55	L	○	○	+	+	+	+	○	○	○	○	○	○	○	○	○	+	○	
17	TK o	♀	43	L	+	○	+	○	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	○	○	
18	S O	♀	63	L	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
19	S H	♀	64	R	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
20	S M	♂	41	L	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
21	Y M	♂	28	L	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	○	○	○	○	+	○	
22	TK a	♂	28	R	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
23	S S	♂	79	L	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	○	○	
24	K A	♀	55	L	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
25	I M	♂	59	L	○	+	+	+	+	+	○	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
26	TK i	♂	53	R	+	+	+	+	+	+	○	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
27	K S	♂	57	R	+	○	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
28	Y W	♀	48	L	+	○	+	+	+	+	○	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
29	H N	♀	67	R	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	
30	G M	♂	37	L	+	○	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	○	○	○	+	○	

大多数の例が不規則性を示す。

b) 上顎洞上壁 (表 12)

正常例 4 例全てが X 線上軽度乃至中等度厚化を、骨侵襲例 6 例全てが軽度乃至高度厚化を示し、骨欠損例 20 例中 10 例が断絶・消失を示すが、他の 10 例は中等度乃至高度厚化を示す。両所見の一致率は 16/30 である。なお、表中太枠の中が両所見の一致を示す（以下の表もこれに同じ。）

c) 上顎洞下壁 (表 14)

正常例 10 例中 4 例が X 線上も正常所見を示すが、6 例は軽度か中等度厚化を示しており、粘膜侵襲例 1 例が中等度厚化を、骨侵襲例 5 例全てが軽度乃至中等度厚化を示し、骨欠損例 14 例中 10 例は断絶・消失を示すが、4 例は軽度乃至高度厚化を示す。一致率は 20/30 である。

表 2 後 頭 前 頭 撮 影 所 見

症 例	上 顎 洞										篩 骨 洞			前頭洞		鼻 内					
	輪 廓					陰 影					紙 状 板	蜂 窠 隔 壁	陰 影	輪 廓	陰 影	下鼻介		中鼻介		鼻 底 骨	中 對 側 彎 曲
	上	下	内	外	不 則 規 性	上 内	上 外	下 内	下 外	不 則 規 性						骨	軟 部	骨	軟 部		
1	I	U	+	+	—	+	+	+	—	+	+	+	+	○	+	—	+	+	+	+	+
2	H	S	+	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	+	+	—	—	○	+	+	—
3	M	i	+	—	+	+	+	+	+	+	○	+	+	+	+	○	○	○	○	○	—
4	H	K	—	—	—	—	+	+	—	+	+	○	+	+	+	—	+	—	+	+	+
5	M	O	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	—	+	—	+	○	—
6	O	M	+	○	+	+	+	+	+	+	+	—	○	+	+	+	+	+	+	+	—
7	H	S	+	+	—	+	+	—	+	+	+	—	+	+	+	—	+	+	+	+	—
8	T	N	—	+	+	—	+	—	+	—	+	—	+	+	+	○	○	○	+	+	—
9	T	I	+	+	—	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	○	+	—	+	+	—
10	M	N	—	+	+	—	+	+	+	+	+	—	+	+	+	—	+	○	+	○	—
11	M	a	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	—	+	—	+	+	—
12	C	H	—	+	—	—	—	+	+	+	+	—	+	+	+	—	+	—	+	+	+
13	L	Y	—	○	—	○	+	+	+	+	+	—	+	+	+	—	+	—	+	+	—
14	Z	E	+	+	—	+	+	+	+	+	○	○	+	+	+	○	○	○	+	○	—
15	M	I	—	—	—	+	+	—	—	—	+	—	+	○	+	—	+	○	+	○	—
16	E	O	+	+	+	—	+	+	+	+	+	○	+	+	+	○	+	+	+	+	—
17	T	K	+	○	+	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	—	+	—	+	○	—
18	S	O	—	—	—	—	+	—	—	—	+	—	+	+	+	+	+	—	+	+	—
19	S	H	—	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	+	+	—	+	○	+	+	—
20	S	M	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	+	+	—	+	—	+	○	—
21	Y	M	+	+	+	—	—	+	—	—	+	—	+	+	+	○	+	○	+	+	—
22	T	K	+	—	—	—	+	+	+	+	+	—	+	+	+	—	+	○	+	—	—
23	S	S	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	—	+	○	+	—	+
24	K	A	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	—	+	+	+	○	—
25	I	M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	○	+	+	+	+	+	+	+	+	—
26	T	K	+	—	+	—	+	—	—	—	+	○	+	+	+	○	○	○	+	○	—
27	K	S	+	+	+	—	+	—	+	—	+	—	+	+	+	—	+	+	+	+	—
28	Y	W	+	+	+	—	—	—	—	—	○	○	+	+	+	○	○	+	+	+	—
29	H	N	+	+	—	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	—	+	—	+	+	—
30	G	M	—	○	+	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	○	+	+	+	+	—

d) 上顎洞内壁 (表 16)

正常例 1 例が軽度厚化を, 骨侵襲例 5 例全てが中等度乃至高度厚化を示し, 骨欠損例 24 例中 13 例が断絶・消失を示すが, 11 例は中等度乃至高度厚化を示す 一致率は 18/30 である。

e) 上顎洞外壁 (表 18)

正常例 2 例中 1 例が正常で, 他は軽度厚化を, 骨侵襲例 9 例全てが軽度乃至高度厚化を示し, 骨欠損例 19 例

中 13 例は断絶・消失を示すが, 6 例は軽度乃至高度厚化を示す 一致率は 23/30 で, 他壁より高率である。又, 各壁陰影の不規則性は 30 例中 28 例で認められる。

f) 紙状板と篩骨蜂窠との関係 (表 24)

篩骨蜂窠正常例 7 例中 2 例が X 線上紙状板正常で, 5 例は軽度乃至高度厚化を, 軽度侵襲例 13 例全てが軽度乃至高度厚化を示し, 高度侵襲例 10 例中 7 例が軽度乃至高度厚化を示し, 3 例は断絶・消失を示す。一致率

表 3 後頭頤撮影所見

症 例	上 顎 洞											紙 状 板	前頭洞		鼻 内 陰 影
	輪 廓					陰 影					眼窩下孔消失		輪 廓	陰 影	
	上	下	内	外	不規則性	上内	上外	下内	下外	不規則性					
1	I U	++	齒牙	—	+	3	+	++	++	+	1	++	++	++	++
2	H S	+++	齒牙	—	+++	0	+++	++	+++	++	1	+	○	+	○
3	M i S	+	齒牙	—	+	0	○	++	○	++	2	○	+	+	○
4	H K	—	—	—	—	0	++	++	+++	++	1	+	+	/	/
5	M O	—	齒牙	—	++	2	+++	+++	+++	+++	0	++	+	++	+++
6	O M	—	○	—	++	4	++	++	+++	++	1	±	+	++	++
7	H S	+	+++	—	+++	3	+++	++	+++	+++	1	○	++	+	+++
8	T N	—	++	+++	—	2	++	—	+++	++	2	+	+	++	++
9	T I	+++	++	—	++	2	+++	—	++	++	1	±	+	+	++
10	M N	—	齒牙	—	—	0	++	+++	+++	+++	1	+	—	+	+++
11	M a S	++	齒牙	—	++	2	++	++	+++	++	1	++	+	++	+++
12	C H	—	++	—	—	2	+++	+++	+++	+++	0	±	+	/	/
13	K Y	++	○	—	+	4	++	++	+++	++	1	+	+	/	/
14	Z E	—	齒牙	—	—	0	++	++	+++	+++	1	+	○	+	○
15	M I	—	—	—	+++	1	++	+++	+++	++	1	++	—	○	○
16	E O	++	+++	+++	—	1	+++	++	+++	++	1	±	+	+	++
17	T K o	++	○	++	○	2	+++	++	+++	++	1	○	○	/	/
18	S O	—	—	—	+++	1	+++	++	+++	—	2	++	++	+	++
19	S H	—	—	+++	—	1	+++	+++	+++	—	1	++	+	+	+
20	S M	++	—	—	—	2	++	+++	+++	++	1	±	+	/	/
21	Y M	+++	齒牙	++	—	2	++	+++	+++	+++	1	+	+	+	++
22	T K a	—	齒牙	—	—	0	+++	+++	+++	+++	0	++	++	○	+++
23	S S	—	++	—	++	2	++	+++	+++	+++	1	+	++	+	+++
24	K A	++	++	—	+	3	++	+++	+++	+++	1	±	+	+	+++
25	I M	+	—	+	+	3	++	+++	+++	+++	1	○	+	+	+
26	T K i	+++	—	—	—	1	++	+++	+++	+++	1	±	++	/	/
27	K S	—	齒牙	++	—	2	+	+++	+++	++	2	±	+	+	++
28	Y W	—	+	++	—	3	+++	+	+++	—	3	+	+	+	+
29	H N	—	+	—	—	3	+++	+++	+++	+++	0	++	+	/	/
30	G M	—	齒牙	+++	++	1	++	+++	+++	++	1	+	+	/	/

は25/30である。

g) 篩骨蜂窠とその隔壁との関係 (表25)

篩骨蜂窠正常例7例全てがX線上隔壁正常で、軽度侵襲例13例中12例は断絶・消失を示すが、1例は正常で、高度侵襲例10例中1例が厚化を示し、9例は断絶・消失を示す。一致率は29/30の高率である。なお、篩骨洞陰影は大多数例で増強が見られる。

h) 前頭洞

前頭洞への侵襲は全例で認められないが、X線上輪廓は20例中17例で軽度、1例で中等度厚化を示し、陰影は全例で増強し、しかも軽度増強はその中3例に過ぎない。

i) 下鼻介骨 (表27)

正常例5例全てがX線上も正常で、軟部侵襲例5例

表4 軸位撮影所見

症 例	上後 顎洞壁	蝶形洞		翼状突起		頬骨陰影
		輪廓	陰影	形態	陰影	
1	I U	++	○	+	○	+
2	H S	+++	+	+	○	++
3	M i S	+++	+	+	○	++
4	H K	—	+	+	—	—
5	M O	++	++	++	○	+++
6	O M	+++	++	++	○	+++
7	H S	—	++	++	○	++
8	T N	下顎骨	++	++	○	++
9	T I	++	○	+	○	++
10	M N	下顎骨	++	++	○	++
11	M a S	+++	++	++	○	++
12	C H	++	++	++	—	++
13	K Y	下顎骨	++	++	○	++
14	Z E	+++	+	++	○	++
15	M I	—	—	++	—	++
16	E O	+++	+	++	○	++
17	TK o	+++	++	++	○	++
18	S O	++	+	++	○	++
19	S H	—	+	++	○	++
20	S M	—	++	++	○	++
21	Y M	—	+++	++	○	+
22	TK a	下顎骨	++	++	○	++
23	S S	+	++	++	○	++
24	K A	+	+	++	○	++
25	I M	+++	+	++	○	++
26	TK i	—	++	++	○	++
27	K S	++	++	++	○	++
28	Y W	—	○	+	○	++
29	H N	—	++	++	○	++
30	G M	++	++	++	○	++

中4例が正常で、1例は骨下端消失を、骨侵襲例12例全てが骨消失を示し、骨崩壊例8例中6例は骨消失を示すが、2例は骨下端消失を示す 一致率は27/30である。

j) 中鼻介骨

正常例7例中6例がX線上も正常で、1例は骨下端消失を、軟部侵襲例10例中5例が正常で、他の5例は骨下端消失を、骨侵襲例7例中2例が骨下端消失を、5例は骨消失を示し、骨崩壊例6例全てが骨消失を示す。一致率は24/30である。

表5 レーゼ氏法撮影所見

症 例		上 顎 洞										視 經 孔	
		輪 廓					陰 影					輪	陰
		上	下	梨 狀 孔 緣	後	不 規 則 性	上 前	上 後	下 前	下 後	不 規 則 性	廓	影
8	T N	—	+	++	—	2	++	+++	+++	1	○	○	
9	T I	++	++	++	++	0	++	+++	+++	1	○	○	
10	M N	—	++	—	++	2	++	+++	+++	1	++	+	
11	M a S	—	+	+++	++	3	+	++	+++	2	○	○	
12	C H	—	++	—	+++	2	++	+++	+++	1	○	+	
13	K Y	—	++	—	—	2	+++	+++	—	++	+	+	
14	Z E	+++	++	+++	—	2	++	++	+++	1	○	○	
15	M I	—	—	++	—	2	+++	—	++	2	+++	+++	
16	E O	+	++	+	—	3	++	—	++	2	+	+	
17	TK o	++	++	+	—	3	++	+++	+++	1	++	+	
18	S O	—	—	—	—	0	++	+++	+++	1	+	++	
19	S H	—	++	++	—	2	+	+	+++	2	○	+	
20	S M	+++	—	—	—	1	+++	+++	—	1	○	○	
21	Y M	++	—	++	—	2	+	++	+++	2	+	+	
22	TK a	—	—	—	—	0	++	+++	+++	1	++	++	
23	S S	—	—	—	+++	1	++	+++	+++	0	○	+	
24	K A	++	++	—	+++	2	+++	+++	+++	1	○	+	
25	I M	++	—	○	++	4	++	+++	+++	1	○	○	
26	TK i	++	—	+++	—	2	+++	+++	+++	0	○	○	
27	K S	+++	+	—	—	3	+++	+++	+++	1	++	+	
28	Y W	—	+	++	—	3	++	+++	○	+++	3	○	○
29	H N	—	++	—	+++	2	+++	+++	+++	1	+	++	
30	G M	++	+	++	—	3	++	++	+++	1	○	+	

k) 鼻底骨(表29)

正常例7例中2例がX線上も正常であるが、4例は軽度乃至高度厚化を、軟部侵襲例8例中6例が軽度乃至高度厚化を示すが、2例は正常で、骨侵襲例7例中4例が軽度乃至高度厚化を示すが、3例は正常で、骨欠損例9例中2例が断絶・消失を示すのみで、3例は正常で、4例は軽度乃至高度厚化を示す 一致率は14/30と低率である。

1) 鼻中隔

鼻中隔の対側への彎曲は30例中4例に見られ、いずれも上顎洞内壁への腫瘍の侵襲の著しい例である。

2) 後頭頤撮影(表3)

表中上顎洞輪廓で「歯牙」とあるのは歯牙陰影との重畳による下壁の読影不能を示す。眼窩下孔消失の項では

[illegible]

症 例	断 層 面	上 顎 洞										篩 骨 洞			蝶形洞		鼻						内		翼状突起		頰 骨 陰 影	
		輪 廓					陰 影					紙 狀 板	蜂 窠 隔 壁	陰 影	輪 廓	陰 影	下鼻介軟骨部		中鼻介軟骨部		鼻底骨	鼻中骨	隔對側彎曲	形 態	陰 影			
		上	下	内	外	不規則性	上 内	上 外	下 内	下 外	不規則性																	
16	E O	1 2 3 4	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	— — — —	2	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	○ — — —	++ ++ ++ ++	/// /// /// +	/// /// /// ++	/// /// /// ○	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	/// /// /// ○	/// /// /// ++	— ++ ++ ++			
17	T K o	1 2 3 4	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	1	○ ○ ○ ○	— — — —	++ ++ ++ ++	/// /// /// +	/// /// /// ++	/// /// /// +	/// /// /// ++	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	/// /// /// ○	/// /// /// +	± ○ ○ ○	
18	S O	1 2 3 4	— — — —	— — — —	++ ++ ++ ++	— — — —	1	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	— — — —	2	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	/// /// /// +	/// /// /// ++	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	/// /// /// ○	/// /// /// +	++ ++ ++ ++
19	S H	1 2 3 4	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	— — — —	3	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	— — — —	2	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	/// /// /// —	/// /// /// ++	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	/// /// /// ○	/// /// /// ++	++ ++ ++ ++	
20	S M	1 2 3 4	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	— — — —	3	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	— — — —	2	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	/// /// /// ++	/// /// /// ++	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	/// /// /// ○	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	
21	Y M	1 2 3 4	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	— — — —	3	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	2	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	/// /// /// +	/// /// /// ++	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	/// /// /// ○	/// /// /// ++	— — — —	
22	T K a	1 2 3 4	— — — —	++ ++ ++ ++	— — — —	— — — —	1	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	1	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	/// /// /// ++	/// /// /// ++	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	— — — —	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	/// /// /// ○	/// /// /// ++	— — — —	
23	S S	1 2 3 4	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	4	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	1	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	/// /// /// ++	/// /// /// ++	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	± ± ± ±	++ ++ ++ ++	— — — —	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	/// /// /// ○	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	
24	K A	1 2 3 4	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	3	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	1	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	/// /// /// ++	/// /// /// ++	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	± ± ± ±	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	/// /// /// ○	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	
25	I M	1 2 3 4	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	3	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	3	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	/// /// /// ++	/// /// /// ++	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	/// /// /// ○	/// /// /// ++	++ ++ ++ ++	
26	T K i	1 2 3 4	++ ++ ++ ++	— — — —	— — — —	— — — —	2	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	— — — —	1	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	/// /// /// +	/// /// /// ++	/// /// /// +	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	/// /// /// ○	/// /// /// ++	— — — —	
27	K S	1 2 3 4	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	— — — —	3	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	2	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	/// /// /// +	/// /// /// ++	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	± ± ± ±	++ ++ ++ ++	/// /// /// ○	/// /// /// ++	— ++ ++ ++	
28	Y W	1 2 3 4	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	— — — —	3	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	2	± ± ± ±	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	/// /// /// ○	/// /// /// +	/// /// /// +	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	/// /// /// ○	/// /// /// ++	— — — —	
29	H N	1 2 3 4	— — — —	++ ++ ++ ++	— — — —	— — — —	3	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	2	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	/// /// /// ++	/// /// /// ++	/// /// /// +	++ ++ ++ ++	— — — —	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	/// /// /// ○	/// /// /// ++	— — — —	
30	G M	1 2 3 4	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	++ ++ ++ ++	— — — —	4	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	1	○ ○ ○ ○	— — — —	++ ++ ++ ++	/// /// /// ○	/// /// /// ++	/// /// /// +	○ ○ ○ ○	— — — —	++ ++ ++ ++	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	/// /// /// ○	/// /// /// ++	++ ++ ++ ++	

表 7 矢 状 断 層 撮 影 所 見

症 例		上 顎 洞										翼狀突起	
		輪 廓					陰 影					形 態	陰 影
		上	下	前	後	不則 規性	上前	上後	下前	下後	不則 規性		
8	T N	—	++	++	—	2	+++	—	+++	+++	1	○	+
9	T I	++	++	++	++	0	++	++	+	++	1	○	+
10	M N	—	++	++	++	2	+++	—	++	++	2	○	+
11	M ^a S	+	++	++	++	1	—	++	+	++	3	○	++
12	C H	+	++	—	++	3	++	++	+	++	1	—	+
13	K Y	—	+	—	—	3	—	++	++	+++	2	○	+
14	Z E	+++	+++	++	—	2	+++	++	++	++	1	○	++
15	M I	—	—	++	—	2	+++	—	+++	—	1	—	++
16	E O	++	+	++	++	1	++	+++	++	+++	1	○	+
17	TK ^o	+	+	+	—	3	++	+++	++	++	1	○	+
18	S O	—	—	—	—	0	—	++	+++	+++	2	○	++
19	S H	—	++	—	—	2	—	+++	—	++	2	○	++
20	S M	+++	—	+++	—	1	++	+++	+++	+++	1	○	+
21	Y M	++	+	++	++	1	+	++	+	+	1	○	++
22	TK ^a	—	—	—	—	0	—	+++	—	+++	1	○	+++
23	S S	—	—	—	+++	1	—	+++	++	+++	2	○	+++
24	K A	++	+	++	++	1	++	+++	++	+++	1	○	++
25	I M	++	—	++	—	2	++	++	++	+++	1	○	++
26	TK ⁱ	++	—	—	—	2	—	++	—	+++	2	○	+++
27	K S	—	+	++	++	3	+++	+++	++	+++	1	○	++
28	Y W	—	+	++	—	3	++	+++	+++	+++	1	○	+++
29	H N	—	+	—	+++	3	+++	—	+++	—	1	○	++
30	G M	—	+	—	++	3	+	—	++	++	3	○	+

(++), (+), (±), (○) は夫々完全消失, 不完全消失, 消失の疑わしいもの, 正常を示す。

a) 上顎洞陰影

不規則性 3 が 1 例, 2 が 4 例, 1 が 21 例, 0 が 4 例で, 大多数の例が不規則性を示すが, 後頭前頭撮影における所見より不規則性がやや弱い。

b) 上顎洞上壁 (表 12)

正常例 4 例全てが X 線上軽度乃至中等度厚化を, 骨侵襲例 6 例全てが中等度乃至高度厚化を示し, 骨欠損例 20 例中 16 例が断絶・消失を示すが, 4 例は中等度乃至高度厚化を示す。一致率は 22/30 で, 後頭前頭撮影よりかなり良い。

c) 上顎洞下壁 (表 14)

正常例 5 例中 3 例が X 線上も正常であるが, 2 例は

軽度か高度厚化を, 粘膜侵襲例 1 例が中等度厚化を, 骨侵襲例 4 例全てが軽度乃至中等度厚化を示し, 骨欠損例 9 例中 7 例が断絶・消失を示すが, 2 例は中等度乃至高度厚化を示す。一致率は 15/19 で, 後頭前頭撮影よりやや良い。

d) 上顎洞内壁 (表 16)

正常例 1 例が軽度厚化を, 骨侵襲例 5 例全てが軽度乃至高度厚化を示し, 骨欠損例 24 例中 19 例が断絶・消失を示すが, 5 例は中等度乃至高度厚化を示す。一致率は 24/30 で, 後頭前頭撮影よりかなり良い。

e) 上顎洞外壁 (表 18)

正常例 2 例中 1 例が正常で, 他は軽度厚化を, 骨侵襲例 9 例全てが軽度乃至高度厚化を示し, 骨欠損例 19 例中 14 例が断絶・消失を示すが, 5 例は中等度乃至高度

表 8 水 平 断 層 撮 影 所 見

症 例		断 層 面	上 顎 洞										鼻内陰影		頰 骨 陰 影
			輪 廓					陰 影					前 部	後 部	
前	後	内	外	不則 規性	前内	前外	後内	後外	不則 規性						
8	T N	1 2 3 4	齒牙 ++ —	齒牙 +++ —	齒牙 ++ —	齒牙 +++ —	2	齒牙 +++ ++	齒牙 ++ —	齒牙 +++ +++	齒牙 +++ +++	2	++ ++ ++	++ ++ ++	/ — —
9	T I	1 2 3 4	— ++ ++	++ ++ ++	++ ++ —	— ++ ++	3	+++ +++ +++	— ++ ++	++ ++ +++	++ ++ +++	3	± ± ++	++ ++ ++	/ ++ ++
10	M N	1 2 3 4	++ ++ —	++ ++ +	+++ +++ ++	++ ++ +++	3	++ +++ +++	++ ++ +	+++ +++ +++	+++ ++ ++	2	++ +++ +++	+++ +++ +++	/ ++ ++
11	M a S	1 2 3 4	++ +++ —	++ ++ +++	— — —	++ ++ —	3	+++ ++ +++	++ ++ +++	+++ +++ +++	+++ +++ +++	1	++ +++ ++	++ ++ +++	/ +++ —
12	C H	1 2 3 4	— — —	++ ++ ++	++ +++ —	++ ++ —	3	++ ++ —	— — —	++ ++ +++	++ ++ +++	3	++ ++ ++	+++ +++ ++	/ ++ ++
13	K Y	1 2 3 4	++ ++ —	++ ++ —	++ — —	○ ○ ++	4	++ ++ ++	++ ++ +++	++ ++ +++	++ ++ ++	2	++ ++ ++	++ ++ ++	/ ++ ++
14	Z E	1 2 3 4	齒牙 — ++	齒牙 — +++	齒牙 — —	齒牙 — —	2	齒牙 ++ ++	齒牙 ++ ++	齒牙 +++ +++	齒牙 +++ +++	1	○ ○ ○+	++ ++ ++	/ ++ ++
15	M I	1 2 3 4	齒牙 — — —	齒牙 +++ — —	齒牙 +++ — —	齒牙 ++ — —	2	齒牙 +++ +++ +++	齒牙 ++ ++ ++	齒牙 +++ +++ +++	齒牙 ++ ++ +++	2	++ ++ ++	+++ +++ +++	/ ++ ++
16	E O	1 2 3 4	齒牙 ++ ++ +	齒牙 +++ +++ +++	齒牙 ++ ++ ++	齒牙 — — —	3	齒牙 ++ ++ ++	齒牙 ++ ++ ++	齒牙 +++ +++ +++	齒牙 ++ ++ ++	1	++ ++ ++	++ ++ ++	/ +++ ++
17	T K o	1 2 3 4	++ ++ ++	++ ++ —	++ ++ —	○ ○ ○ ○	4	++ ++ ++	++ ++ ++	++ +++ +++	++ ++ ++	2	++ ++ ++	++ ++ ++	/ ○ ○ ○
18	S O	1 2 3 4	— — —	— — ++	++ — —	— — —	2	++ ++ ++	— — —	+++ +++ ++	— — —	3	++ +++ ++	++ ++ ++	/ ++ ++
19	S H	1 2 3 4	齒牙 — —	齒牙 — +++	齒牙 +++ +++ +++	齒牙 — — ++	2	齒牙 ++ ++ ++	齒牙 +++ +++ +++	齒牙 +++ +++ +++	齒牙 ++ — ++	2	++ ++ ++	++ ++ ++	/ ++ ++

症 例	断 層 面	上 顎 洞										鼻内陰影		頰 骨 陰 影			
		輪 廓					陰 影					前 部	後 部				
		前	後	内	外	不則 規性	前内	前外	後内	後外	不則 規性						
20	S M	1 2 3 4	齒牙 — — —	齒牙 — — +	齒牙 +++ — —	齒牙 — — ++		3	齒牙 +++ ++ ++	齒牙 +++ ++ ++	齒牙 +++ ++ ++	齒牙 +++ ++ ++		1	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	／ ++ ++ ++
21	Y M	1 2 3 4	++ ++ ++ +	— — +++ ++	++ +++ +++ ++	— — ++ ++		3	++ ++ ++ +	++ ++ ++ ++	+++ +++ +++ ++	— ++ ++ +		3	++ ++ ++ +	++ ++ ++ ++	／ — ++ ++
22	T K a	1 2 3 4	— — — —	— — ++ ++	+++ +++ — —	— — ++ ++		3	+++ +++ +++ +++	+++ +++ ++ ++	+++ +++ +++ +++	++ +++ +++ ++		1	++ +++ ++ ++	+++ +++ ++ ++	／ — ++ ++
23	S S	1 2 3 4	— +++ +++ ++	++ ++ ++ ++	— — — +++	++ ++ ++ ++		3	+++ +++ +++ +	++ ++ ++ ++	++ +++ +++ +++	++ +++ +++ +++		2	+++ +++ +++ +++	+++ +++ +++ +++	／ ++ ++ ++
24	K A	1 2 3 4	++ ++ +++ +++	++ ++ ++ ++	+++ +++ ++ ++	++ ++ ++ ++		2	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	+++ +++ +++ ++	++ ++ ++ ++		1	+++ +++ ++ ++	+++ +++ +++ +++	／ ++ ++ ++
25	I M	1 2 3 4	++ ++ ++ ++	— — +++ ++	+++ +++ +++ ++	++ ++ ++ +		3	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ +	+++ +++ +++ ++	+++ +++ +++ ++		2	++ +++ ++ ++	++ ++ ++ ++	／ ++ ++ ++
26	T K i	1 2 3 4	+++ +++ — —	— — — ++	+++ +++ — —	— — — +		3	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	+++ +++ ++ ++	++ +++ ++ ++		1	++ +++ ++ ++	++ +++ +++ +++	／ ++ ++ ++
27	K S	1 2 3 4	— +++ ++ ++	齒牙 ++ — —	++ +++ ++ —	— — — ++		2	++ ++ ++ ++	+++ +++ ++ ++	+++ +++ +++ +++	+++ +++ +++ ++		1	++ ++ ++ ++	++ +++ +++ +++	／ — — +++
28	Y W	1 2 3 4	— ++ ++ ++	— — — ++	+++ +++ +++ +++	— — — ++		2	+++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ +++	+++ +++ +++ +++		1	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ +++	／ — +++ ++
29	H N	1 2 3 4	齒牙 — — —	齒牙 — — —	齒牙 — — —	齒牙 — — —		0	齒牙 +++ +++ +++	齒牙 +++ +++ +++	齒牙 +++ +++ +++	齒牙 +++ +++ +++		0	+++ +++ +++ +++	+++ +++ +++ +++	／ — — —
30	G M	1 2 3 4	齒牙 +++ +++ ++	齒牙 +++ — ++	齒牙 — — —	齒牙 — — +		3	齒牙 +++ +++ +	齒牙 +++ +++ ++	齒牙 +++ +++ +++	齒牙 ++ ++ ++		2	++ ++ ++ ++	++ ++ ++ ++	／ ++ ++ ++

表 9 涙 道 造 影 撮 影 所 見

症 例		囊				管							
番 号	名	輪 廓		拡 張		輪 廓		狭 窄		「モ」影淡化		走行異常	
		正 面	側 面	正 面	側 面	正 面	側 面	正 面	側 面	正 面	側 面	正 面	側 面
1	I U	平	平	≡	—	/	/	/	/	/	/	/	/
2	H S	平	平	+	—	平	波	≡	+	+	+	内方	前方
3	M i S	平	平	—	—	/	波	/	≡	/	≡	/	前方
4	H K	平	平	≡	≡	平	波	≡	—	+	—	内方	—
5	M O	波	波	≡	≡	平	平	+	+	≡	≡	内方	前方
6	O M	平	平	≡	≡	平	平	≡	≡	—	—	内方	前方
7	H S	波	波	+	+	波	波	≡	—	—	—	内方	—
8	T N	平	平	—	—	波	平	≡	≡	+	≡	内方	前方
9	T I	平	波	—	—	平	波	≡	≡	+	+	内方	前方
10	M N	波	波	—	—			閉		塞			
11	M a S	波	波	≡	≡	平	平	≡	≡	+	+	内方	前方
12	C H	平	平	≡	≡			閉		塞			
13	K Y	平	平	≡	≡	平	波	≡	≡	—	≡	内方	前方
14	Z E	波	波	+	—	平	波	+	+	—	—	内方	前方
15	M I	平	波	—	—	波	波	≡	≡	+	+	内方	前方
16	E O	平	平	—	—	波	波	≡	+	+	+	—	後方
17	T K o	平	平	—	—	波	波	≡	≡	≡	+	—	前方
18	S O	平	平	+	—	波	/	≡	/	—	/	—	/
19	S H	波	波	—	—			閉		塞			
20	S M	波	波	+	—	波	波	≡	+	+	+	—	前方
21	Y M	波	波	—	—	波	波	≡	+	+	+	内方	前方
22	T K a	波	波	—	—	波	波	≡	≡	+	+	内方	後方
23	S S	平	平	+	—	波	波	≡	≡	≡	+	内方	前方
24	K A	平	波	—	—			閉		塞			
25	I M	波	波	—	—	波	波	+	≡	+	+	—	—
26	T K i	平	波	—	—	波	波	+	≡	+	+	内方	前方
27	K S	波	波	≡	≡	波	/	≡	/	+	/	内方	/
28	Y W	波	波	—	—	波	波	≡	≡	+	+	—	前方
29	H N	波	波	≡	—	波	波	≡	≡	+	+	内方	後方
30	G M	波	波	—	—	波	波	+	—	+	+	内方	—

厚化を示す 一致率は 24/30 で、後頭前頭撮影と殆ど同じである。又、各壁陰影の不規則性は 30 例中 24 例で認められる。

f) 眼窩下孔と上顎洞上壁との関係 (表 23)

上壁正常例 4 例中 3 例が X 線上眼窩下孔も正常で、1 例は眼窩下孔の崩壊疑わしきものであり、骨侵襲例 6 例中 2 例は不完全乃至完全消失を示すが、3 例は疑わしきもの、1 例は正常である。骨欠損例 20 例中 16 例が完

全乃至不完全消失を示すが、4 例は疑わしきものである。一致率は 24/30 である。

g) 紙状板と篩骨蜂窩との関係 (表 24)

篩骨蜂窩正常例 7 例中 2 例が X 線上紙状板も正常で、5 例は軽度乃至高度厚化を、軽度侵襲例 13 例全てが軽度乃至高度厚化を示し、高度侵襲例 10 例中 4 例が断絶・消失を、5 例が軽度乃至高度厚化を示すが、1 例は正常である。一致率は 24/30 で、後頭前頭撮影と殆ど同じで

表 10 外頸動脈造影撮影所見 (対照)

症 例	名 診 断	頸動脈		眼窩下脈		前上歯槽動脈		後上歯槽動脈		蝶口蓋動脈	
		後上方位	側方転位	起蛇始部	上方転位	前上方位	後上方位	前上方位	後上方位	分 布	蛇 行
UH	鼻出血性鼻	—	—	+	—	—	—	—	—	密	+
YS	鼻肉腫	—	+	+	—	—	—	—	—	稍疎	—
TT	鼻線維頭腫	—	+	+	+	—	—	—	—	疎	+
SN	鼻梅毒	—	—	+	—	—	—	—	—	疎	—
KA	鼻肉腫	—	—	+	—	+	—	—	—	密	+
MK	鼻出血	—	—	+	—	—	—	—	—	密	+
AM	下鼻介腫	—	—	+	—	—	—	—	—	密	+
KY	壞疽性鼻炎	—	—	+	—	—	—	—	—	疎	—
KD	舌 癌	+	+	+	—	—	—	—	—	密	+
MK	喉頭癌	—	+	+	—	—	—	—	—	密	+
HS	喉頭癌	—	—	+	—	—	—	—	—	密	+
TU	顎下腺腫瘍	—	+	+	—	—	—	—	—	密	+

表 11 外頸動脈造影撮影所見 (上顎癌)

症 例		頸動脈	眼窩下脈	前上歯槽動脈	後上歯槽動脈	後下齒槽動脈	蝶口蓋動脈	
		後上方位	側方転位	起蛇始部	上方転位	上方転位	分 布	蛇 行
1	I U	++	++	—	++	++	密	+
2	H S	++	++	++	++	○	疎	+
3	M i S	++	+	+	++	○	密	++
4	H K	++	○	—	++	++	稍疎	—
5	M O	+	+	—	++	++	疎	—
6	O M	++	+	消失	消失	消失	消 失	—
7	H S	++	+	—	++	○	疎	—
8	T N	+	++	消失	消失	++	稍疎	—
9	T I	+	++	—	+	+	稍疎	—
10	M N	+	○	+	++	+	稍疎	—
11	M a S	++	++	++	+	+	疎	—
12	C H	++	++	++	+	+	疎	—
13	K Y	++	○	+	++	+	疎	—
14	Z E	+	++	+	+	++	稍疎	—
15	M I	○	+	消失	消失	消失	消 失	—
17	T K o	+	+	+	+	+	疎	—
18	S O	++	++	—	+	+	稍疎	—
19	S H	++	++	—	++	+	稍疎	—
24	K A	++	++	—	+	○	疎	—

表 12 上 顎 洞 上 壁 の 所 見 (単純撮影)

X 線 手 術	後 頭 前 頭					後 頭 頤					レ ー ゼ 氏 法				
	正 常	軽度 厚化	中等度 厚化	高度 厚化	断絶・消失	正 常	軽度 厚化	中等度 厚化	高度 厚化	断絶・消失	正 常	軽度 厚化	中等度 厚化	高度 厚化	断絶・消失
正 常		3	1				3	1				1	1		
粘膜侵襲															
骨 侵 襲		2	3	1				4	2				4	1	
骨 欠 損			6	4	10			2	2	16			2	2	12
一 致 率	16/30					22/30					17/23				

表 13 上顎洞上壁の所見 (断層撮影)

手 術 X 線	前 頭					矢 状				
	正 常	軽 度 厚 化	中 等 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶・ 消 失	正 常	軽 度 厚 化	中 等 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶・ 消 失
正 常		1	3					2		
粘膜侵襲										
骨 侵 襲		2	4				3	4	2	
骨 欠 損		2	1	1	16					12
一 致 率	22/30					21/23				

ある。

h) 前 頭 洞

X 線上輪廓は 22 例中 17 例で軽度, 2 例で中等度厚化を示し, 陰影は 1 例以外の全てで増強し, 半数以上は中等度以上の増強を示す。

3) 軸 位 撮 影 (表 4)

表中「下顎骨」とあるのは下顎骨の重畳による上顎洞後壁の読影不能を示す 翼状突起形態の項での (一), (○)は 夫々変形, 正常を示す。

a) 上顎洞後壁 (表 21)

骨侵襲例 8 例全てが軽度乃至高度厚化を示し, 骨欠損例 18 例中 9 例が断絶・消失を示すが, 他の 9 例は中等度乃至高度厚化を示す 一致率は 17/26 と低率である。

表 14 上顎洞下壁の所見 (単純撮影)

手 術 X 線	後 頭 前 頭					後 頭 頤					レ ー ゼ 氏 法				
	正 常	軽 度 厚 化	中 等 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶・ 消 失	正 常	軽 度 厚 化	中 等 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶・ 消 失	正 常	軽 度 厚 化	中 等 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶・ 消 失
正 常	4	4	2			3	1		1			4	3		
粘膜侵襲			1					1				1			
骨 侵 襲		1	4				1	3					5		
骨 欠 損		2	1	1	10			1	1	7			2		8
一 致 率	20/30					15/19					14/23				

表 15 上顎洞下壁の所見 (断層撮影)

手 術 X 線	前 頭					矢 状				
	正 常	軽 度 厚 化	中 等 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶・ 消 失	正 常	軽 度 厚 化	中 等 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶・ 消 失
正 常	2	5	3				6	1		
粘膜侵襲			1					1		
骨 侵 襲		3	2				3	3	1	
骨 欠 損		2		2	10			1		7
一 致 率	18/30					15/23				

表 16 上顎洞内壁の所見 (単純撮影)

手 術 X 線	後 頭 前 頭					後 頭 頤				
	正 常	軽 度 厚 化	中 等 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶・ 消 失	正 常	軽 度 厚 化	中 等 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶・ 消 失
正 常		1					1			
粘膜侵襲										
骨 侵 襲			3	2			1	2	2	
骨 欠 損			2	9	13			2	3	19
一 致 率	18/30					24/30				

表 17 上顎洞内壁の所見（断層撮影）

手 術 線 X	前 頭					水 平				
	正	軽度	中等	高度	断絶・	正	軽度	中等	高度	断絶・
	常	厚化	度厚化	厚化	消失	常	厚化	度厚化	厚化	消失
正 常		1								
粘膜侵襲										
骨 侵 襲			2	3				1	4	
骨 欠 損			1	8	15				2	16
一 致 率	20/30					21/23				

表 20 上顎洞前壁の所見（断層撮影）

手 術 線 X	矢 状					水 平				
	正	軽度	中等	高度	断絶・	正	軽度	中等	高度	断絶・
	常	厚化	度厚化	厚化	消失	常	厚化	度厚化	厚化	消失
正 常										
粘膜侵襲										
骨 侵 襲		1	12	1			1	2	1	
骨 欠 損					9		1		1	17
一 致 率	23/23					21/23				

表 18 上顎洞外壁の所見（単純撮影）

手 術 線 X	後 頭 前 頭					後 頭 頤				
	正	軽度	中等	高度	断絶・	正	軽度	中等	高度	断絶・
	常	厚化	度厚化	厚化	消失	常	厚化	度厚化	厚化	消失
正 常	1	1				1	1			
粘膜侵襲										
骨 侵 襲		4	3	2			4	3	2	
骨 欠 損		1	3	2	13			3	2	14
一 致 率	23/30					24/30				

表 21 上顎洞後壁の所見（単純撮影）

手 術 線 X	軸 位					レ ーゼ 氏 法				
	正	軽度	中等	高度	断絶・	正	軽度	中等	高度	断絶・
	常	厚化	度厚化	厚化	消失	常	厚化	度厚化	厚化	消失
正 常										
粘膜侵襲										
骨 侵 襲		2	4	2				3	3	1
骨 欠 損			3	6	9			1	1	14
一 致 率	17/26					20/23				

表 19 上顎洞外壁の所見（断層撮影）

手 術 線 X	前 頭					水 平				
	正	軽度	中等	高度	断絶・	正	軽度	中等	高度	断絶・
	常	厚化	度厚化	厚化	消失	常	厚化	度厚化	厚化	消失
正 常		1	1			1	1			
粘膜侵襲										
骨 侵 襲		1	5	3			1	2		
骨 欠 損			3						1	7
一 致 率	25/30					21/23				

表 22 上顎洞後壁の所見（断層撮影）

手 術 線 X	矢 状					水 平				
	正	軽度	中等	高度	断絶・	正	軽度	中等	高度	断絶・
	常	厚化	度厚化	厚化	消失	常	厚化	度厚化	厚化	消失
正 常										
粘膜侵襲										
骨 侵 襲			7	1			2	4	1	
骨 欠 損			2	1	12					16
一 致 率	20/23					23/23				

表 23 眼窩下孔と上壁との関係

手術 (上壁)	X 線	眼 窩 下 孔			
		正 常	疑 わ し き も の	不 完 全 消 失	完 全 消 失
正 常		3	1		
粘 膜 侵 襲					
骨 侵 襲		1	3	1	1
骨 欠 損			4	9	7
一 致 率		24/30			

b) 蝶 形 洞

輪廓は蝶形洞侵襲例 1 例で断絶・消失が見られ、正常例 29 例中 26 例が軽度乃至中等度厚化を示し、3 例で X 線上も正常を示すに過ぎない。

陰影は侵襲例も含めた 12 例で高度、14 例で中等度、4 例で軽度増強を示し、全例に陰影増強が認められる。

c) 翼 状 突 起

翼状突起侵襲例 5 例中 3 例で形態の変形が見られ、2 例は正常で、正常例 25 例は全て形態も正常である。

侵襲例 5 例中 2 例で陰影淡化が見られ、3 例は中等度陰影増強を示し、正常例 25 例も全て軽度乃至高度陰影増強を示す。

d) 翼状突起陰影と上顎洞後壁との関係 (表 30)

後壁骨侵襲例 10 例中 3 例が翼状突起陰影軽度増強を、7 例は中等度乃至高度増強を示し、骨欠損例 20 例中 3

表 24 紙状板と篩骨蜂窠との関係

手術 (篩骨蜂窠)	X 線 (紙状板)	後 頭 前 頭				後 頭 頤				前 頭 断 層			
		正 常	軽 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶 ・ 消 失	正 常	軽 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶 ・ 消 失	正 常	軽 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶 ・ 消 失
正 常		2	3	2		2	4	1		1	4	2	
軽 度 侵 襲			10	3			9	4			7	2	4
高 度 侵 襲			5	2	3	1	4	1	4	1	2	3	4
一 致 率		25/30				24/30				23/30			

表 25 篩骨蜂窠とその隔壁との関係

手術 (蜂窠)	X 線 (隔壁)	後 頭 前 頭			前 頭 断 層		
		正 常	厚 化	断 絶 ・ 消 失	正 常	厚 化	断 絶 ・ 消 失
正 常		7			6	1	
軽 度 侵 襲		1		12			13
高 度 侵 襲			1	9			10
一 致 率		29/30			29/30		

表 26 梨状孔縁の所見

手術	X 線	レ ー ゼ 氏 法				
		正 常	軽 度 厚 化	中 等 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶 ・ 消 失
正 常			1			
粘 膜 侵 襲		1		4	1	
骨 侵 襲			1	3	2	
骨 欠 損						10
一 致 率		21/23				

表 27 下鼻介骨の所見

X 線 手 術	後 頭 前 頭			前 頭 断 層		
	正 常	骨 下 端 消 失	骨 消 失	正 常	骨 下 端 消 失	骨 消 失
正 常	5			5		
軟 部 侵 襲	4	1		4	1	
骨 侵 襲			12	1		11
骨 崩 壊		2	6			8
一 致 率	27/30			28/30		

表 28 中鼻介骨の所見

X 線 手 術	後 頭 前 頭			前 頭 断 層		
	正 常	骨 下 端 消 失	骨 消 失	正 常	骨 下 端 消 失	骨 消 失
正 常	6	1		7		
軟 部 侵 襲	5	5		7	3	
骨 侵 襲		2	5	1		6
骨 崩 壊			6			6
一 致 率	24/30			26/30		

表 29 鼻 底 骨 の 所 見

X 線 手 術	後 頭 前 頭				前 頭 断 層			
	正 常	軽 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶 ・ 消 失	正 常	軽 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶 ・ 消 失
正 常	2	3	1		1	4	1	
軟 部 侵 襲	2	4	2			7	1	
骨 侵 襲	3	3	1			2	3	2
骨 欠 損	3	1	3	2		4	2	3
一 致 率	14/30				17/30			

例が軽度増強を，15例が中等度乃至高度増強を示すが，2例は淡化を示す。腫瘍の後壁への侵襲が進むに従って翼状突起陰影所見も著明となる。

e) 頬骨陰影 (表 31)

正常例 4 例中 2 例が X 線上も正常で，他の 2 例は軽度増強を，周辺骨侵襲例 6 例全てが軽度乃至中等度増強を，頬骨侵襲例 9 例中 1 例が軽度増強を，8 例が中等度乃至高度増強を示し，頬骨欠損例 11 例中 6 例が淡化を示すが，5 例は中等度乃至高度増強を示す 一致率は 23/30 である。

4) Rhese 氏法撮影 (表 5)

a) 上顎洞陰影

不規則性 3 が 1 例，2 が 6 例，1 が 14 例，0 が 2 例で，大多数の例が不規則性を示す。

b) 上顎洞上壁 (表 12)

正常例 2 例いずれも軽度乃至中等度厚化を，骨侵襲例 5 例全てが中等度乃至高度厚化を示し，骨欠損例 16 例中 12 例は断絶・消失を示すが，4 例は中等度乃至高度厚化を示す 一致率は 17/23 で，後頭前頭撮影と殆ど同じである。

c) 上顎洞下壁 (表 14)

正常例 7 例全てが軽度乃至中等度厚化を，粘膜侵襲例 1 例が軽度厚化を，骨侵襲例 5 例全てが中等度厚化を示し，骨欠損例 10 例中 8 例は断絶・消失を示すが，2 例は中等度厚化を示す。一致率は 14/23 で，後頭前頭撮影と殆ど同じである。

d) 上顎洞外後壁 (表 21)

骨侵襲例 7 例中 6 例が中等度乃至高度厚化を，1 例は断絶・消失を，骨欠損例 16 例中 14 例は断絶・消失を示すが，2 例は中等度乃至高度厚化を示す 一致率は 20/23 で，軸位撮影よりかなり良い。

e) 梨状孔縁 (表 26)

正常例 1 例が軽度厚化を，粘膜侵襲例 6 例中 5 例が中等度乃至高度厚化を示すが，1 例は正常で，骨侵襲例 6 例全てが軽度乃至高度厚化を示し，骨欠損例 10 例全てが断絶・消失を示す 一致率は 21/23 と高率を示す。

f) 視神経孔と蝶形洞との関係

蝶形洞侵襲例 1 例が X 線上視神経孔輪廓の断絶・消失を示し，正常例 22 例中 13 例は正常であるが，9 例は軽度乃至中等度厚化を示す 両所見間にはかなりの関連性がある。

蝶形洞侵襲例 1 例が視神経孔陰影の高度増強を示し，正常例 22 例中 8 例は正常であるが，14 例は軽度乃至中

等度厚化を示す。

g) 視神経孔と上顎洞上壁との関係 (表 32)

上顎洞上壁正常例 2 例中 1 例が X 線上も視神経孔輪廓正常で、他は軽度厚化を、骨侵襲例 5 例中 2 例が軽度乃至中等度厚化を示すが、3 例は正常である。骨欠損例 16 例中 1 例が断絶・消失を 6 例が軽度厚化を示すが、9 例は正常である。両所見間には多少の関連性がある。

上顎洞上壁正常例 2 例中 1 例が X 線上も視神経孔陰影正常で、他は軽度増強を、骨侵襲例 5 例中 3 例が軽度増強を示すが、2 例は正常で、骨欠損例 16 例中 1 例が淡化を、10 例が軽度乃至中等度増強を示すが、5 例は正常である。

C) 断層撮影と手術所見との比較

表中斜線の部は所属断層面に存在しない事を示す
又、四面中最も強い変化をもつてその部位の所見として手術所見と比較検討した。

1) 前頭断層撮影 (表 6)

a) 上顎洞陰影

不規則性 3 が 5 例、2 が 17 例、1 が 8 例で、全例が不規則性を示し、単純撮影と比べ著明な不規則性を示す

b) 上顎洞上壁 (表 13)

正常例 4 例全てが X 線上軽度乃至中等度厚化を、骨侵襲例 6 例全てが軽度乃至中等度厚化を示し、骨欠損例 20 例中 16 例が断絶・消失を示すが、4 例は軽度乃至高度厚化を示す 一致率は 22/30 で、後頭前頭撮影よりかなり良い。

c) 上顎洞下壁 (表 15)

正常例 10 例中 2 例が X 線上も正常で、8 例は軽度乃至中等度厚化を、粘膜侵襲例 1 例が中等度厚化を、骨侵襲例 5 例全てが軽度乃至中等度厚化を示し、骨欠損例 14 例中 10 例が断絶・消失を示すが、4 例は軽度あるいは高度厚化を示す 一致率は 18/30 で、後頭前頭撮影よ

表 30 翼状突起陰影と後壁との関係

手術 X線 (後壁)	軸 位					前 頭 断 層					矢 状 断 層				
	正 常	軽 度 増 強	中 等 度 増 強	高 度 増 強	淡 化	正 常	軽 度 増 強	中 等 度 増 強	高 度 増 強	淡 化	正 常	軽 度 増 強	中 等 度 増 強	高 度 増 強	淡 化
正 常															
粘膜侵襲															
骨 侵 襲		3	5	2			2	5	3			4	2	1	
骨 欠 損		3	12	3	2		5	11	3	1		5	8	3	

表 31 頬骨陰影の所見

手術 X線	軸 位					前 頭 断 層					水 平 断 層				
	正 常	軽 度 増 強	中 等 度 増 強	高 度 増 強	淡 化	正 常	軽 度 増 強	中 等 度 増 強	高 度 増 強	淡 化	正 常	軽 度 増 強	中 等 度 増 強	高 度 増 強	淡 化
正 常	2	2				3	1					2			
周 辺 骨 侵 襲		2	4				2	4				1	5		
頬骨侵襲		1	5	3			1	6		2			5		
頬骨欠損			4	1	6				1	10			2	1	7
一 致 率	23/30					26/30					18/23				

りやや悪い

d) 上顎洞内壁 (表17)

正常例1例が軽度厚化を、骨侵襲例5例全てが中等度乃至高度厚化を示し、骨欠損例24例中15例が断絶・消失を示すが、9例は中等度乃至高度厚化を示す 一致率は20/30で後頭前頭撮影よりやや良い。

e) 上顎洞外壁 (表19)

正常例2例いずれも軽度乃至中等度厚化を、骨侵襲例9例全てが軽度乃至高度厚化を示し、骨欠損例19例中16例が断絶・消失を示すが 3例は中等度厚化を示す 一致率は25/30で、後頭前頭撮影よりやや良い。又、各壁陰影の不規則性は全例で認められ、しかも30例中28例で2以上の不規則性を示す

f) 紙状板と篩骨蜂窩との関係 (表24)

篩骨蜂窩正常例7例中1例がX線上紙状板も正常で、6例は軽度乃至高度厚化を、軽度侵襲例13例中9例が軽度乃至高度厚化を、4例は断絶・消失を示し、高度侵襲例10例中4例が断絶・消失を、5例が軽度乃至高度厚化を示すが、1例は正常である。一致率は23/30で、後頭前頭撮影よりやや悪い。

g) 篩骨蜂窩とその隔壁との関係 (表25)

篩骨蜂窩正常例7例中6例がX線上隔壁も正常で、1例は厚化を、軽度侵襲13例全てが断絶・消失を示し、高度侵襲例10例も全て断絶・消失を示す。一致率は29/30と高率を示す。なお、篩骨蜂窩陰影は全例で増強し、しかも大多数で中等度以上の増強を示す

h) 蝶形洞

輪廓は蝶形洞侵襲例1例で断絶・消失が見られたが、正常例29例中4例が高度、11例が中等度、9例が軽度厚化を示し、僅か5例に正常所見が見られたに過ぎない。

陰影は侵襲例も含めた17例で高度、9例で中等度4例で軽度増強を示し、全例に陰影増強が見られる。

i) 下鼻介骨 (表27)

正常例5例全てがX線上も正常で、軟部侵襲例5例中4例が正常で、1例は骨下端消失を、骨侵襲例12例中11例は骨消失を示すが、1例は正常で、骨崩壊例6例全てが骨消失を示す 一致率は28/30で、後頭前頭撮影よりやや良い。

j) 中鼻介骨 (表28)

正常例7例全てがX線上も正常で、軟部侵襲例10例中7例が正常で、3例は骨下端消失を、骨侵襲例7例中6例が骨消失を示すが、1例は正常で、骨崩壊例6例全

てが骨消失を示す 一致率は26/30で、後頭前頭撮影よりやや長い

k) 鼻底骨 (表29)

正常例6例中1例がX線上も正常で、5例は軽度乃至高度厚化を、軟部侵襲例8例全てが軽度乃至高度厚化を、骨侵襲例7例中5例が軽度乃至高度厚化を示すが、2例は断絶・消失を示し、骨欠損例9例中3例が断絶・消失を示すが、6例は軽度乃至高度厚化を示す 一致率は17/30で、後頭前頭撮影よりかなり良い。

l) 鼻中隔

鼻中隔の対側への彎曲は30例中4例に見られ、いずれも上顎洞内壁への腫瘍の侵襲の著しい例で、後頭前頭撮影と同じ結果を示す

m) 翼状突起

翼状突起侵襲例5例中4例で形態の変形が見られ、1例は正常で、正常例25例は全て形態も正常である。軸位撮影より成績が良い。侵襲例5例中1例で陰影の淡化が見られ、3例で中等度以上の陰影増強を見、正常例25例も全て陰影の増強を示し、しかも18例で中等度以上の増強を示す

n) 翼状突起陰影と上顎洞後壁との関係 (表30)

後壁骨侵襲例10例中2例が翼状突起陰影軽度増強を、8例は中等度乃至高度増強を示し、骨欠損例20例中5例が軽度増強を、14例が中等度乃至高度増強を示すが、1例は淡化を示す 両所見の関係は軸位撮影と同じく平行する。

o) 頬骨陰影 (表31)

正常例4例中3例がX線上も正常で、1例は軽度増強を、周辺骨侵襲例6例全てが軽度乃至中等度増強を、頬骨侵襲例9例中7例が軽度乃至中等度増強を示すが、2例は淡化を示し、頬骨欠損例11例中10例が淡化を示すが、1例は高度増強を示す 一致率は26/30で、軸位撮影よりかなり良い

2) 矢状断層撮影 (表7)

第4面(健側)を対照として第2面(患側)の所見を検討した。

a) 上顎洞陰影

不規則性3が2例、2が6例、1が15例で、全例不規則性を示す

b) 上顎洞上壁 (表13)

正常例2例いずれもX線上中等度厚化を、骨侵襲例9例全てが軽度乃至高度厚化を示し、骨欠損例12例全てが断絶・消失を示す 一致率は21/23と高率で、単純

各撮影・前頭断層撮影より著しく良い。

c) 上顎洞下壁 (表 15)

正常例 7 例全てが軽度乃至中等度厚化を、粘膜侵襲例 1 例が中等度厚化を、骨侵襲例 7 例全てが軽度乃至高度厚化を示し、骨欠損例 8 例中 7 例が断絶・消失を示すが、1 例は中等度厚化を示す。一致率は 15/23 で、後頭前頭撮影と殆ど同じである。

d) 上顎洞前壁 (表 20)

骨侵襲例 14 例全てが軽度乃至高度厚化を示し、骨欠損例 9 例全てが断絶・消失を示す。一致率は 23/23 の 100% である。

e) 上顎洞後壁 (表 22)

骨侵襲例 8 例全てが中等度乃至高度厚化を示し、骨欠損例 15 例中 12 例が断絶・消失を示すが、3 例は中等度乃至高度厚化を示す。一致率は 20/23 で、Rhese 氏法と同じである。又各壁陰影の不規則性は 23 例中 20 例で見られる。

f) 翼状突起

翼状突起侵襲例 2 例いずれも形態の変形を示し、正常例 21 例は全て形態も正常である。

侵襲例 2 例中 1 例が陰影中等度増強を、他は軽度増強を示し、正常例 21 例も全て陰影の増強を示し、17 例で軽度乃至中等度増強を示す。

g) 翼状突起陰影と上顎洞後壁との関係 (表 30)

後壁骨侵襲例 7 例中 4 例が翼状突起陰影軽度増強を、3 例は中等度乃至高度増強を示し、骨欠損例 16 例中 5 例が軽度増強を示し、11 例は中等度乃至高度増強を示す。手術、X 線両所見の関係は他撮影と同じく平行する。

3) 水平断層撮影 (表 8)

表中斜線の部は所属断層面に存在しない事を示し、「歯牙」とあるのは歯牙陰影との重畳を示す。

a) 上顎洞陰影

不規則性 3 が 4 例、2 が 9 例、1 が 9 例、0 が 1 例で、23 例中 22 例が不規則性を示し、単純撮影と比べかなり著明な不規則性を示す。

b) 上顎洞内壁 (表 17)

骨侵襲例 5 例全てが X 線上中等度乃至高度厚化を示し、骨欠損例 18 例中 16 例が断絶・消失を示すが、2 例は高度厚化を示す。一致率は 21/23 で、他撮影より著明に良い。

c) 上顎洞外壁 (表 19)

正常例 2 例中 1 例が X 線上も正常で、他の 1 例は軽

度厚化を、骨侵襲例 3 例全てが軽度乃至中等度厚化を示し、骨欠損例 18 例中 17 例が断絶・消失を示すが、1 例は高度厚化を示す。一致率は 21/23 で、単純撮影よりかなり良い。

d) 上顎洞前壁 (表 20)

骨侵襲例 4 例全てが軽度乃至高度厚化を示し、骨欠損例 19 例中 17 例が断絶・消失を示すが、2 例は軽度あるいは高度厚化を示す。一致率は 21/23 の高率だが、矢状断層撮影よりやや悪い。

e) 上顎洞後壁 (表 22)

骨侵襲例 7 例全てが軽度乃至高度厚化を示し、骨欠損例 16 例は全て断絶・消失を示す。一致率は 23/23 の 100% で、矢状断層撮影よりやや良い。又、各壁陰影の不規則性は 23 例中 22 例で見られ、いずれも 2 以上の不規則性を示す。

f) 頬骨陰影 (表 31)

正常例 2 例いずれも軽度増強を、周辺骨侵襲例 6 例全てが軽度乃至中等度増強を、頬骨侵襲例 5 例全てが中等度増強を示し、頬骨欠損例 10 例中 7 例が淡化を示すが、3 例は中等度乃至高度増強を示す。一致率は 18/23 で、軸位撮影と殆ど同じである。

D) 涙道造影撮影と手術所見との比較 (表 9)

表中斜線の部は下鼻道への造影剤の流下は見られるが、該部に造影剤の存在しない事を示し、「閉塞」とするのは鼻涙管の閉塞を示す。

1) 涙嚢輪廓 (表 33)

正面撮影では正常例 9 例中 5 例が平滑で、4 例は波形を、粘膜侵襲例 7 例中 5 例が平滑で、2 例は波形を、骨侵襲例 4 例中 2 例が平滑で、他の 2 例は波形を示し、骨崩壊例 11 例中 5 例が平滑で、6 例は波形を示す。

表 32 視神経孔と上壁との関係 (Rhese 氏法)

X 線 術 (上壁)	視 神 經 孔	輪 廓					陰 影				
		正	軽 度 厚 化	中 等 度 厚 化	高 度 厚 化	断 絶 ・ 消 失	正	軽 度 増 強	中 等 度 増 強	高 度 増 強	淡 化
		常					常				
正 常		1	1				1	1			
粘膜侵襲											
骨 侵 襲		3	1	1			2	3			
骨 欠 損		9	3	3		1	5	7	3		1

表 33 涙嚢輪廓の所見

手 術 X 線	正 面		側 面	
	平	波	平	波
	滑	形	滑	形
正 常	5	4	4	5
粘 膜 侵 襲	5	2	3	4
骨 侵 襲	2	2	2	2
骨 崩 壊	5	6	4	7

表 34 涙嚢拡張の所見

手 術 X 線	正 面				側 面			
	正	軽	中	高	正	軽	中	高
	常	度	等	度	常	度	等	度
正 常	8		1		8		1	
粘 膜 侵 襲	3	2	1	1	4	1	2	
骨 侵 襲	1	3			4			
骨 崩 壊	3	1	1	5	6		3	1

表 35 鼻涙管輪廓の所見

手 術 X 線	正 面		側 面	
	平	波	平	波
	滑	形	滑	形
正 常	2	6	1	8
粘 膜 侵 襲	2	5	1	6
骨 侵 襲	2	1		2
骨 崩 壊	2	4	2	3

表 36 鼻涙管狭窄の所見

手 術 X 線	正 面					側 面				
	正	軽	中	高	閉	正	軽	中	高	閉
	常	度	等	度	塞	常	度	等	度	塞
正 常		2	5	2		2	2	3	2	
粘 膜 侵 襲		1	4	1		1	1	3	2	
骨 侵 襲		1	1	1	1		2		1	1
骨 崩 壊		1	2	5	3		1	1	5	3
一 致 率	21/30					22/30				

側面撮影でも殆ど類似の結果を示す

2) 涙嚢拡張 (表 34)

拡張の基準は本村に倣い、正面像では 3~4mm, 4~5mm, 5mm 以上を、側面像では 5.5~6.5mm, 6.5mm ~7.5mm, 7.5mm 以上を夫々軽度、中等度、高度拡張とし、夫々 (+), (H), (HH) で表した。

正面撮影では正常例 9 例中 8 例が正常で、1 例は中等度拡張を、粘膜侵襲例 7 例中 4 例が軽度乃至高度拡張を示し、3 例は正常で、骨侵襲例 4 例中 3 例が軽度拡張を示し、1 例は正常で、骨崩壊例 10 例中 2 例が軽度乃至中等度、5 例が高度拡張を示し、3 例が正常で、病変の進むに従って拡張の率と程度が進む。この関係は側面撮影でも同じである。

3) 鼻涙管輪廓 (表 35)

正面撮影では正常例 8 例中 2 例が平滑で、6 例は波形を、粘膜侵襲例 7 例中 2 例が平滑で、5 例は波形を、骨侵襲例 3 例中 2 例が平滑で、1 例は波形を示し、骨崩壊例 6 例中 2 例が平滑で、4 例は波形を示す

側面撮影でも殆ど類似の結果を示す

4) 鼻涙管狭窄 (表 36)

狭窄の基準は本村に倣い、正面像では 1.2~1.0mm, 1.0~0.8mm, 0.8mm 以下を、側面像では 2.0~1.5mm, 1.5~1.0mm, 1.0mm 以下を夫々軽度、中等度、高度狭窄とし、夫々 (+), (H), (HH) で表わした。

正面撮影では正常例 9 例全てが軽度乃至高度狭窄を、粘膜侵襲例 6 例全てが軽度乃至高度狭窄を、骨侵襲例 4 例中 3 例が軽度乃至高度狭窄を、1 例は閉塞を示し、骨崩壊例 11 例中 8 例が軽度乃至高度狭窄を示すが、3 例

表 37 鼻涙管「モ」影淡化の所見

X 手 術 線	正 面			側 面		
	正 常	軽 度 淡 化	高 度 淡 化	正 常	軽 度 淡 化	高 度 淡 化
正 常		8		1	6	2
粘 膜 侵 襲	3	3	1	2	4	1
骨 侵 襲	2	1		1	1	
骨 崩 壊		4	2		4	1

表 38 鼻涙管走行異常と内壁との関係

X 手 術 (内 壁)	正 面 (鼻 涙 管)		側 面		
	正 常	内 方 圧 排	正 常	後 方 圧 排	前 方 圧 排
正 常					1
粘 膜 侵 襲					
骨 侵 襲	3	1	1	1	2
骨 崩 壊	3	17	3	2	13

は閉塞を示す。一致率は21/30である。

側面撮影では正常例9例中2例と粘膜侵襲例7例中1例がレ線上也正常である他は殆ど類似の結果を示し、一致率も22/30と殆ど同じである。

5) 鼻涙管モルヨード陰影淡化(以下「モ」影淡化と略す)(表37)

正面撮影では正常例8例全てが軽度淡化を、粘膜侵襲例7例中3例が軽度淡化を、1例が高度淡化を示し、3例は正常で、骨侵襲例3例中1例が軽度淡化を示し、2例は正常で、骨崩壊例6例中4例が軽度、2例は高度淡化を示す

側面撮影でも殆ど類似の結果を示す

6) 鼻涙管走行異常と内壁との関係(表38)

走行異常の基準は本村に倣い、上部と下部の midpoint を結ぶ直線が水平面となす角度が正面像では $93^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 、側面像では $78^{\circ} \pm 5^{\circ}$ をもつてした。

正面撮影では内壁の骨侵襲例4例中3例が正常で、1

例は内方圧排を示し、骨崩壊例20例中17例が内方圧排を示し、3例は正常である。

側面撮影では正常例1例が前方圧排を示し、骨侵襲例4例中1例が正常で、他の1例が後方圧排を、2例が前方圧排を示し、骨崩壊例18例中3例が正常で、2例が後方圧排を、13例が前方圧排を示す

E) 外頸動脈造影撮影と手術所見との比較

1) 正 常 像 (表10)

対照として鼻部非癌及び舌・喉頭癌症例等12例に外頸動脈造影撮影を行い、顎動脈及びその分枝の正常像として次の如き所見を得た。即ち、顎動脈は外頸動脈より分岐後、正面像では側上方へ凸面を向けた緩い弧を描きつつ内上方へ向い、側面像では直線的に前上方へ向う。側面像において眼窩下動脈の起始部は著明な蛇行を示し、眼窩下壁に沿い上方に凸面を向けた緩い弧を描きつつ前方へ向い、その末梢の前上歯槽動脈は頬骨弓前縁に沿って下向し、顎動脈より分岐し、硬口蓋に沿って前方へ向う後上歯槽動脈と吻合する。顎動脈より分岐した蝶口蓋動脈は鼻介及び鼻中隔に分布するその分枝が正面像においてかなり密で蛇行を示している。

2) 上 顎 癌 (表11)

a) 顎動脈と上顎洞後壁との関係(表39)

後壁骨侵襲例8例中7例が顎動脈の後上方への軽度乃至中等度転位を、他の1例も高度転位を示し、骨欠損例11例中10例が軽度乃至中等度転位を示すが、1例は転位を示さない。一致率は18/19の高率である。

b) 顎動脈と上顎洞外壁との関係(表40)

外壁正常例2例中1例が顎動脈の側方への転位を示さず、他の1例は中等度転位を、骨侵襲例7例全てが軽度

表 39 顎動脈と後壁との関係

X 手 術 線 (後壁)	顎 動 脈			
	正 常	軽 度 転 位	中 等 度 転 位	高 度 転 位
正 常				
粘 膜 侵 襲				
骨 侵 襲		3	4	1
骨 欠 損	1	3	7	
一 致 率	18/19			

表 40 顎動脈と外壁との関係

手 術 (外壁)	X 線	顎 動 脈			
		正 常	軽 度 転 位	中 等 度 転 位	高 度 転 位
正 常		1		1	
粘 膜 侵 襲					
骨 侵 襲			4	2	1
骨 欠 損		2	1	5	2
一 致 率		16/19			

乃至高度転位を示し、骨欠損例 10 例中 2 例が転位を示さないが、8 例は軽度乃至高度転位を示す 一致率は 16/19 である。

c) 眼窩下動脈と上顎洞上壁との関係(表 41)

上壁正常例 2 例中 1 例が眼窩下動脈起始部の蛇行軽度で、他の 1 例は蛇行消失を、骨侵襲例 3 例中 1 例が蛇行軽度で、2 例は蛇行消失を示し、骨欠損例 14 例中 6 例が蛇行を示すが、5 例は蛇行消失し、3 例は同動脈の消失を示している。一致率は 11/19 と余り良くない。

又、上壁正常例 2 例いずれも眼窩下動脈の上方への中
等度乃至高度転位を示し、骨侵襲例 3 例全てが軽度ある
いは高度転位を示し、骨欠損例 14 例中 11 例が軽度乃至
高度転位を示し、他の 3 例も同動脈の消失を示す 一致
率は 17/19 である。

d) 前上歯槽動脈と上顎洞前壁との関係(表 42)

前壁正常例 2 例いずれも前上歯槽動脈の前方転位を示
さず、骨侵襲例 2 例いずれも軽度乃至中等度転位を示
し、骨欠損例 15 例中 2 例が転位を示さないが、10 例は
軽度あるいは高度転位を示し、3 例は同動脈の消失を示
す 一致率は 17/19 である。

e) 後上歯槽動脈と上顎洞下壁との関係(表 43)

下壁正常例 6 例中 4 例が後上歯槽動脈の下方への転位
を示さないが、1 例は軽度転位を、他の 1 例は同動脈の
消失を、粘膜侵襲例 1 例が中等度転位を示し、骨侵襲例
4 例中 1 例が転位を示さず、3 例は軽度転位を示し、骨
欠損例 8 例中 3 例が軽度乃至高度転位を示し、1 例も動
脈消失を示す 一致率は 15/19 である。

表 41 眼窩下動脈と上壁との関係

手 術 (上壁)	X (眼窩下動脈)	起 始 部 蛇 行				上 方 転 位				
		蛇 行 高 度	蛇 行 軽 度	蛇 行 消 失	動 脈 消 失	正 常	軽 度 転 位	中 等 度 転 位	高 度 転 位	動 脈 消 失
正 常			1	1				1	1	
粘 膜 侵 襲										
骨 侵 襲			1	2			2		1	
骨 欠 損		3	3	5	3		5	4	2	3
一 致 率		11/19				17/19				

表 42 前上歯槽動脈と前壁との関係

手 術 (前壁)	X (前上歯槽動脈)	正 常	軽 度 転 位	中 等 度 転 位	高 度 転 位	動 脈 消 失
		常	位	位	位	失
正 常		2				
粘 膜 侵 襲						
骨 侵 襲			1	1		
骨 欠 損		2	7		3	3
一 致 率		17/19				

表 43 後上歯槽動脈と下壁との関係

手 術 (下壁)	X (後上歯槽動脈)	正 常	軽 度 転 位	中 等 度 転 位	高 度 転 位	動 脈 消 失
		常	位	位	位	失
正 常		4	1			1
粘 膜 侵 襲				1		
骨 侵 襲		1	3			
骨 欠 損			1	5	1	1
一 致 率		15/19				

表 44 蝶口蓋動脈と内壁との関係

X 線 (蝶口蓋動脈) 術 (内壁)	分 布			蛇 行			
	密	稍疎	消 失	正 常	軽 度	消 失	動脈消失
正 常	1			1			
粘 膜 侵 襲							
骨 侵 襲		1				1	
骨 欠 損	1	6	8	2	1	14	2
一 致 率	18/19			19/19			

f) 蝶口蓋動脈と上顎洞内壁との関係 (表 44)

内壁正常例 1 例が蝶口蓋動脈の分布が密で、骨侵襲例 1 例はやや疎を示し、骨欠損例 17 例中 1 例が分布密で、14 例はやや疎か疎を、他の 2 例も同動脈の消失を示す一致率は 18/19 の高率である。

又、内壁正常例 1 例が蝶口蓋動脈の蛇行著明で、骨侵襲例 1 例が蛇行の消失を示し、骨欠損例 17 例中 15 例が蛇行軽度乃至消失を、他の 2 例も同動脈の消失を示す一致率は 19/19 と 100% である。

V. 総括並びに考按

A) 上顎洞陰影

上顎癌の X 線所見として先づ考えねばならない事は患側上顎洞の陰影増強である。Pfahler・Dodd 等は上顎癌の X 線所見として三項目を挙げ、その一つとして上顎洞の陰影増強を記載している。その原因として Gordon は腫瘍による軟部組織の増加と脂肪組織の腫瘍への置換を挙げている。Gilmore はその濃度はポリープによるガラス様の陰影より濃く、肥厚した粘膜や分泌物による各種の陰影濃度が混在しており、悪性腫瘍による陰影より濃いものは骨腫によるもののみであると云っている。Pfahler も Gilmore と同様に上顎洞陰影は偏在性の不規則な陰影欠損の存在を示す事を指摘している。私の研究ではその中に骨破壊によると思われる上顎洞陰影の異常な透明化が各種単純・断層撮影で認められた。その結果、上顎洞陰影は各症例で増強と透明化の濃淡の入り交った様相を示しており、私はこれを不規則性と呼んだが、この不規則性は後頭前頭撮影で後頭頭撮影より著明で、各断層撮影では極めて著明である。それは後頭頭撮影では X 線が前・後壁に対し斜めに投射されるため

に、上顎洞陰影が骨壁陰影と重り易くなる事に起因し、断層撮影では四断層面での陰影が夫々描出されるために詳細な読影が可能である事に由来すると考えられる。

上顎癌に際しての上顎洞陰影に就いて吉川は腫瘍によつて一旦陰影増強をきたしたものが、腫瘍の侵襲の進展によつて骨融解をきたすと明澄化を見るようになるとし、山本は患側上顎洞の陰影が透明な場合は顔面壁に骨融解の認められる場合が多いが、骨融解に頬部腫脹が加わると反つて陰影は増強すると述べ、高須賀も上顎洞陰影が濃く現れたり透明像として現れたりするが、後者では周囲の骨吸収が著明であるのみでなく、腫瘍組織の融解の起っている例であると語っている。私の症例でも上顎洞陰影の透明化の見られる例が半数を占め、このような例では前壁の骨崩壊著しく、骨崩壊が著明でも頬部腫脹の著しい例及び骨崩壊部の小さい例では透明化を示していず、上述の諸家の報告を裏付けている。

B) 上顎洞骨壁

更に重要な所見は上顎洞骨壁の状態である。太田は副鼻腔の悪性腫瘍は他の諸疾患と比べて早期且つ高度に骨侵襲をきたすので、X 線診断は腫瘍それ自体より腫瘍による骨崩壊の観察に主眼が置かれると述べ、Dodd は骨崩壊は洞壁の淡化が斑状陰影で示され、骨の欠損か崩壊は腫瘍の確実な診断となるとしている。更に、彼及び Pfahler は前述の上顎癌の X 線所見の三つの特徴の一つとして骨影増強・骨欠損等の骨陰影の変化を挙げている。Gordon は上顎洞の骨欠損には腫瘍の拡大による変形に起因するものと侵襲による崩壊とがあるが、多くは後者に基くものであるとし、Pfahler は腫瘍による骨の侵襲あるいは圧迫萎縮と合併症としての感染に基く骨髓炎による破壊が見られるのであると述べている。又、骨崩壊の前段階と考えられる骨陰影の増強は Dodd によれば、腫瘍の侵襲による骨増殖性の反応及び二次的な慢性炎症性の反応に基くものであると云う。私の研究でも全例でいずれかの骨壁に欠損が見られ、X 線写真でもこれに一致して洞輪廓の断絶・消失を示す例が多いが、骨欠損の小さな場合にはその周辺の骨増殖に基く陰影で打消されて、X 線上洞輪廓の厚化像として示されることがあり、この現象は当然単純撮影において著しい。一方洞壁への腫瘍の侵襲の見られない場合にも多くは X 線上洞輪廓の厚化が現れるが、これは二次的な炎症性変化が洞壁に及んだためでなく先行していた炎症によるものであろうが、その慢性炎症が腫瘍を誘発したと云う証拠はない。

吉川は上顎洞壁はX線により切線的に投影された場合に最も適確に判読され、上壁の観察には鼻位法（原文のまま、以下同様）が適しているとし、Pfahlerによれば上壁は各種の矢状位及び斜位撮影によつて良く描出されると云う。私は後頭前頭・後頭頤・Rheses氏法撮影及び前頭・矢状断層撮影で上壁の観察をしたが、後頭前頭撮影で手術所見との一致率が最低を示した。これは同撮影では上壁に側頭骨錐体部陰影が重畳するために、読影が難しい事によるものと考えられ、当然断層撮影特に矢状断層撮影で著しく良い一致率を示している。

下壁はPfahlerによれば彼の斜位法が最も良く描出すると云う。私は上壁と同じ撮影を行い、単純撮影では後頭頤撮影で他の撮影と比べ一致率が良かったが、それは同撮影では歯牙残存の認められる例で下壁の読影が不能なために除いてあるが故であろうか。単純・断層撮影間には著しい差は認められない。

内壁の観察には吉川によれば前頭位・鼻位法が適していると云う。私は後頭前頭・後頭頤撮影及び前頭・水平断層撮影を行つた。後頭頤は後頭前頭撮影より、水平断層は前頭断層撮影より一致率が良かったが、それは後頭前頭撮影で内壁に重畳する椎骨陰影が後頭頤撮影では除かれるためと、水平断層撮影では前頭断層撮影より細かく内壁を切断したためであると考えられる。単純撮影に比べ断層撮影で一致率が良いのは当然である。

外壁の描出には前頭位・鼻位法が適していると吉川が述べている。私は内壁と同じ撮影を行い、単純撮影間では一致率に差はなく、断層撮影では水平断層撮影で一致率がやや良いが、これは内壁の場合と同じ理由による。ここでも断層撮影が単純撮影より一致率が良い。

前壁はPfahlerの斜位法が良く描出するとPfahlerは云っている。私は矢状・水平断層撮影で観察した。両者共一致率は極めて良い。

上顎洞後壁への腫瘍の侵襲状態は他の洞壁のように外来診察では知り難く、しかも一般に行われている矢状位撮影・前頭断層撮影でも描出不能であり、古来多くの研究者の探求に拘らず、未だ満足すべき状態ではない。悪性腫瘍での側後壁の診断的意義を初めて提唱したのは本城であり、彼は後頭前頭撮影で側後壁をTM線として投影しており、山本もTM線の消失は側後壁の骨融解と密接な関係があるとしている。しかし、この線は必ず描出されるとは限らず、吉川はRheses氏法では側後壁がX線で切線的に投射されるので、その観察に適していると述べ、一方Pfeifferは軸位法において上顎洞の前

後方向の観察が可能であると語っている。又、最近の断層撮影法の普及により、Gordon・浅井・太田等は矢状断層撮影が上顎洞の前後方向の観察に適しているとし、片桐は回転横断撮影で後壁の描出に、吉井は斜角断層撮影で側後壁の描出に成功している。私は軸位、Rheses氏法、矢状・水平断層撮影を行つた。一致率は軸位撮影に比べRheses氏法で著明に良いが、これは後者では側後壁の上下軸が長い陰影として描出されるのに対し、前者では壁が幅の狭い陰影として描出される事の差によると考えられ、断層特に水平断層撮影では単純撮影より一致率が良い。

眼窩下孔の観察は後頭頤撮影で可能であり、上壁と密接な関係を持ち、X線上眼窩下孔に異常所見の見られる時は上壁への腫瘍の侵襲が考えられる。

C) その他の副鼻洞

篩骨蜂窩の観察には古くは側位撮影が用いられていたが、この方法では左右陰影の重畳をきたすために診断的価値は認められず、後頭前頭撮影・Rheses氏法の考案により診断的応用が可能となつたが、断層撮影法の実用化により更に診断的精度が高まつた。即ち、高須賀は篩骨蜂窩への腫瘍の浸潤の判定は多くの場合篩骨蜂窩炎を合併しているので単純写真では困難であるが、断層写真では蜂窩壁及びその隔壁の破壊像の確認により鑑別ができると述べ、太田・服部等も前頭断層撮影は篩骨蜂窩の観察に適しているとしている。又、Gordon・浅井・太田等は矢状断層撮影も左右病変の比較には不便を伴うが、同部の描出に適しているとし、片桐は回転横断撮影で同部の描出に成功している。私は後頭前頭・前頭断層撮影で篩骨蜂窩を、又この二法と後頭頤撮影で紙状板の観察を行つた。即ち、X線上紙状板に厚化・断絶・消失が見られる時は篩骨蜂窩への腫瘍の侵襲を考えるべきであるが、篩骨蜂窩への腫瘍の非侵襲例でもX線上紙状板の厚化を認める場合が多く、それは高須賀の述べている如く上顎腫瘍に伴う篩骨蜂窩炎に基因するものと考えられる。又、篩骨蜂窩への腫瘍の侵襲の見られる場合は例外なしにX線上蜂窩隔壁の断絶・消失が現れると云つてよい。

蝶形洞の観察は初めは側位撮影で行われていたが、篩骨蜂窩と同じく解剖学的意義しか持たず、その後Rhesesが蝶形洞観察の目的で始めた斜位法と、Spiess・Pfeiffer等の考案になる軸位撮影が専らその診断に用いられ、Pfeiffer・橋本・服部等がその価値を認めている。又、Pfahlerは彼の考案になる斜位法で蝶形洞の描出が可能

であると述べている。しかし、近年浅井・太田・服部等は矢状断層撮影を上顎癌患者の蝶形洞描出に応用し、その観察に適しているとし、Epstein もこれ迄の蝶形洞撮影法では附近骨組織陰影の影響で判然としなかった前・下壁と蝶形骨各翼がこの方法では判然と描出されると強調している。又、片桐は回転横断撮影で蝶形洞の観察を行っている。私は軸位撮影と前頭断層撮影で蝶形洞を描出し、特に前頭断層撮影ではかなり鮮明な洞壁陰影を得、蝶形洞への腫瘍の非侵襲例でも蝶形洞輪廓の厚化と洞陰影の増強をきたす事を知り、これは二次的の炎症性変化であると考えた。視神経孔の観察を Rhese 氏法で行い、孔輪廓と陰影の X 線所見と上壁の手術所見とがかなり深い関係にある事を知った。

上顎癌に際しての前頭洞への影響は余り重視されておらず、その報告も少いが、Pfeiffer は後頭前頭撮影で存在しない如く見える小さな前頭洞も軸位撮影では観察できるとし、Ackerman は上顎癌の際に前頭洞に二次的炎症による陰影増強が見られると述べ、Haas が他の副鼻洞の悪性腫瘍の際に前頭洞の二次的閉塞性浸潤が認められ、しかも炎症性疾患に比して洞壁の骨粗鬆症や骨硬化症が多く見られると云っているのに対して、Gordon は 28% にそれが認められたと報告している。私は後頭前頭・後頭頭撮影で前頭洞を観察し、多くの例で輪廓の軽度厚化と陰影の中等度増強を認め、前述の諸報告との一致を見た。

D) 鼻腔内各部

梨状孔縁の観察は Rhese 氏法で可能であった。X 線所見と手術所見とは良く一致し、梨状孔縁の状態は Rhese 氏法が忠実に描出する事を知った。

鼻腔内各部の所見は視診で概ね観察が可能なために X 線所見は余り重視されていないが、Pfahler は上顎癌の特徴の一つとして副鼻洞の陰影増強と共に鼻腔の陰影増強を挙げ、太田は断層撮影が鼻腔特にその骨部への腫瘍の侵襲を知る上で極めて有意義であるとしている。私は下・中鼻介骨を後頭前頭・前頭断層撮影で観察し、その所見と手術所見とが良く一致する事、特に前頭断層撮影で、しかも下鼻介骨所見がより良く一致する事を知ったが、それは下鼻介骨がより大きく、周囲組織との間隔が保たれているためと考える。

鼻底骨の観察も上記二撮影で行い、後頭前頭撮影で X 線所見と手術所見とが一致しない例がかなりあったが、それは幅が狭く奥行きが深い鼻底であるがためと考えられ、それも断層撮影ではかなりの改善が認められた。

鼻中隔も同じ二撮影で観察し、鼻中隔の対側への著明な彎曲が認められた例の全てが上顎洞内壁への腫瘍の侵襲の著しい例である事を知ったが、それが腫瘍による圧迫のためか、あるいは元来存在した彎曲症かは不明である。

涙道の観察に就いては本村が 40% モルヨドールを用いて涙道造影を行って詳細な報告をし、上顎悪性腫瘍に際して鼻涙管は狭窄像、「モ」影の淡化、走行異常特に内方への圧排、輪廓の波形を示すと述べている。私も涙道の造影撮影を行い、正面・側面撮影を行つた。涙嚢では輪廓が半数で波形を示し、病変の進行に従つて波形を示す率が高くなる事を知ったが、これは腫瘍の侵襲と共に二次的な炎症性変化も関係するものと考えられる。涙嚢の拡張は正面像で著明で、病変の進行に従つてその程度が高度となる傾向を示している。

鼻涙管では輪廓が大多数で波形を示しているが、これは涙嚢の場合と同意義を持つものと考えられる。鼻涙管の狭窄は腫瘍の侵襲例では側面像で 1 例に認められなかった他は全てに認められ、しかも病変の進行に従つて狭窄の程度も高度となつていくが、正常例でも狭窄を示す例が多く、これは二次的な炎症性変化が管粘膜に及んでいる事を示すものであろう。「モ」影の淡化も多くの侵襲例で見られるが、正常例でも大多数で認められ、これも前述の理由に基くものと考えられる。次で鼻涙管の走行異常と内壁との関係を探した所、多くの例で正面像では内方圧排を、側面像では前方圧排を示し、その関係の深さを知った。

E) 翼状突起と頬骨

上顎洞後方即ち翼口蓋窩及び翼状突起等はそこへの腫瘍の侵襲が視診では知り難く、しかも腫瘍の進展し易い部位であるがために重要な部位であり、従つて X 線の検索が重要視され、古来多くの報告がなされている。高須賀・太田・佐藤等は前頭断層撮影で、浅井・太田等は矢状断層撮影で、佐藤は水平断層撮影で翼状突起陰影の観察を行い、診断の一助としている。私は軸位、前頭・矢状断層撮影で翼状突起を描出し、その形態・陰影共に両断層撮影が軸位撮影に比べて良くその状態を示している事を知った。又、翼状突起陰影と上顎洞後壁との関係を調べたが、いずれの撮影でも後壁病変の進行程度と翼状突起陰影の程度とがかなり良く一致する事から両者の関係の深い事が判った。

頬骨への腫瘍の侵襲はそれが外表に近いために X 線写真への依存度は低く、殆ど報告も見られない。私は軸

位、前頭・水平断層撮影を行い、頬骨陰影を観察し、前頭断層撮影で最高的一致率を示す事を知った。

F) 外頸動脈と上顎洞各壁の関係

外頸動脈撮影に関する報告は内頸動脈のそれに比べれば極めて稀である。それは診断的価値の軽重と手技の難易によるものであろう。上顎洞附近の悪性腫瘍への応用は Schrudde が数例の患者に行っているのみであり、彼は同部の悪性腫瘍の存在は血管の走行異常から知り得ると云っている。私は19例の上顎癌患者に本法を行い、頸動脈及びその分枝と上顎洞各壁との関係を追求した。即ち、

1) 後壁に癌腫の侵襲のある時には、頸動脈が後上方に転位する。

2) 側壁に癌腫の侵襲のある時には、頸動脈が側方に転位する。

3) 前壁に癌腫の侵襲のある時には、前上歯槽動脈が前方に転位する。

4) 下壁に癌腫の侵襲のある時には、後上歯槽動脈が下方に転位する。

5) 上壁に癌腫の侵襲のある時には、眼窩下動脈が上方に転位すると共に、同動脈起始部の蛇行が見られなくなる。

6) 内壁に癌腫の侵襲のある時には、蝶口蓋動脈の分布が疎となると共に、同動脈の蛇行が見られなくなる。

以上の中、各動脈の転位は腫瘍による圧排に起因し、蛇行の減少・消失も腫瘍の圧迫によるものであり、分布が疎となる事は腫瘍による血管の蚕蝕に基くもので、この他数例においては眼窩下、前・後上歯槽、蝶口蓋動脈の消失が見られたが、それも腫瘍による血管の蚕蝕に原因を求めてよいものと考ええる。

VI. 結 語

30例の上顎癌患者に前記の諸種X線撮影法を行い、手術・摘出標本・大切片標本所見と比較検討し、次の結論を得た。

1) 単純・断層の各撮影においては上顎癌特有の所見として、上顎洞陰影の増強、洞骨壁の厚化、その進んだ断絶・消失が見られ、それに伴って増強した洞陰影の中に明澄部が現れる。

2) 篩骨蜂窠でも同様な所見が見られる。

3) 蝶形洞の所見は軸位撮影・前頭断層撮影で良く観察できる。

4) 前頭洞では炎症性変化としての洞陰影の増強と洞骨壁の厚化が見られる。

5) 上顎洞後壁及び翼状突起の所見は軸位撮影、Rhese 氏法、矢状・水平断層撮影でも良く観察できる。

6) 鼻腔内各部及び頬骨の所見も単純・断層の各撮影所見と良く一致する。

7) 涙道造影撮影では鼻腔前上部への癌腫侵襲の状態が観察できる。

8) 外頸動脈造影撮影では頸動脈及びその各分枝の転位・蛇行減少等から癌腫侵襲の方向を知り得る。

主要参考文献

- 1) Ackerman, R.V.: Carcinoma of the maxillary sinus, Cancer, 241, 1962.
- 2) Albrecht, W.: Die Bedeutung der Roentgenographie für die Diagnose der Nebenhöhlen Erkrankungen, Arch. f. Laryngol., 20; 175, 1908.
- 3) 網野三郎他: 上顎癌手術前放射線治療に対するレ線断層撮影の意義, 東医大誌, 17; 521, 1959.
- 4) Andrews, J.R.: Planigraphy, Am. J. of Roentgenol. and Rad. Therapy, 48; 625, 1942.
- 5) Arslan, M.: Collagen diseases of the upper respiratory tract, Ann. of Oto-Rhino-Laryngol., 67; 279, 1959.
- 6) 浅井良三他: 上顎腫瘍の断層撮影について, 耳臨, 51; 692, 1958.
- 7) 浅井良三: 上顎及びその附近の悪性腫瘍, 日耳鼻, 61; 416, 1958.
- 8) Boczon, S.: Möglichkeiten der Tomographie in der Otolaryngologie, Zent-blatt f. H-N-O., 48; 143, 1953.
- 9) Bouchet, M. etc.: Zur systematischen Tomographie bei der Roentgen untersuchung der Sinus des Gesichtsschaedels, Zent-blatt f. H-N-O., 52; 163, 1955.
- 10) Caldwell, E.W.: Roentgenographie der Nebenhöhlen der Nase, Ref. Fortschr. a.d. Geb. d. Roentgenstr., 11; 299, 1907.
- 11) Coakley, C.G.: Skiagraphie als ein Heilmittel bei Diagnose und Behandlung von Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase, Zent-blatt f. Laryngol., 1906.
- 12) Cone, A.J. etc.: Relationship of paranasal sinus disease to ocular disorders, Laryngoscope, 49; 374, 1939.
- 13) Denker, A. etc.: Roentgenuntersuchung der Nase und der Nasen Nebenhöhlen, Handbuch d. Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 1; 953, 1925.
- 14) Dodd, G.D. etc.: The systematic use of tomography in the diagnosis of carcinoma of the paranasal sinuses, Radiology, 72; 379, 1959.
- 15) Eckstroem, G. etc.: Gehirnschaedigungen nach cerebraler Arteriographie mit Thorotrast, Zent

- blatt Neurochir., 3; 227, 1938. 16) *Epstein, B.S.*: Skull laminagraphy, Radiology, 38; 22, 1942. 17) *Epstein, B.S.*: Laminagraphy of the sphenoidbone, Am. J. of Roentgenol. and Rad. Therapy, 48; 625, 1942. 18) *Fraser, R.H.*: Iodized oil in otolaryngologic diagnosis, J. Michigan M.Soc., 25; 270, 1926. 19) *Gilmore, J.H.*: Malignancies of the nose and nasal accessory sinuses, A.M.A.Arch. Oto-Rhino-Laryngol., 66; 595, 1956. 20) *Goldmann, E. etc.*: Über die Verwendung der X-Strahlen für die Bestimmung der nasalen Nebenhöhlen und ihrer Erkrankungen, Beitr. Z. Klin. Chirurgie, 54; 1, 1907. 21) *Gordon, I.R.S.*: The radiology of malignant tumors of the nose, J. Laryngol. and Otol., 69; 786, 1955. 22) *Haas, L.L.*: Secondary alterations of the frontal sinuses in cancer of the paranasal sinus, Am. J. of Roentgenol. and Rad. Therapy, 62; 797, 1942. 23) *Haike, H.*: Die Roentgenuntersuchung der Nasennebenhöhlen der Kinder, Arch. f. Laryngol., 23; 206, 1911. 24) 浜崎靖: 鼻腔・副鼻腔悪性腫瘍のX線診断に関する研究, 日医放誌, 21; 30, 1961. 25) *Haemmerli, F. etc.*: Über die Arteriographie der Extremitäten und Hirngefäße mit Athyltrijodatearat, Zent-blatt: 66, 45, 2433, 1939. 26) 橋本泰彦: レ線口腔内撮影法による深部副鼻洞の観察並に立体撮影法の一考案, 耳咽, 15; 325, 1942. 27) 服部浩他: 上顎癌の断層撮影像, 日耳鼻, 65; 335, 1962. 28) 菱山博文: 副鼻腔癌のX線像特に前頭洞の形態との関係, 日耳鼻, 62; 602, 1959. 29) *Holvey, E.H. etc.*: Tomography in the region of the maxillary sinuses, Radiology, 42; 458, 1944. 30) *Holvey, E.H. etc.*: Tomography of the skull, Radiology, 44; 425, 1945. 31) 本庶正一: 上顎癌の早期診断, 医学, 9; 120, 1950. 32) 本城明朗他: 上顎洞悪性腫瘍のレ線の観察, 耳臨, 35; 189, 1940. 33) *Houser, K.M.*: Diagnosis and treatment of primary malignant neoplasms of the maxillary sinus, Arch. Otolaryngol., 18; 643, 1933. 34) 飯森堯: 上顎癌のレ線学的観察, 日耳鼻, 63; 2112, 1960. 35) 片桐圭一他: X線横断撮影法による上顎疾患の観察, 日耳鼻, 57; 255, 1954. 36) 小山三郎他: 上顎疾患の断層撮影, 耳臨, 53; 149, 1960. 37) 久木田民三: 耳鼻咽喉科領域における断層撮影の研究, 日耳鼻, 62; 1901, 1959. 38) *Küttner, A.*: Die entzündlichen Nebenhöhlen Erkrankungen der Nase im Roentgenbild, Atlas u. 20 Photogr. Tafeln, 1908. 39) *Law, F.M.*: Nasal accessory sinuses, Ann. of Roentgenol., 15; 32, 1933. 40) *Loehr, W. etc.*: Die kombinierte Encephalo-arteriographie, Arch. klin. Chir., 173; 1932. 41) 松田豪一他: 上顎癌に対する断層レ線像の価値, 耳臨, 47; 89, 1954. 42) *Moniz, E.*: A prova da encefalografia arterial, Lisboa Med., 4; 1927. 43) *More, S.etc.*: Body section roentgenography with the laminagraphy, Am. J. Roentgenol. and Rad. Therapy, 30; 514, 1938. 44) 本村宏: 涙道のレ線学的研究知見補遺, 千葉医誌, 33; 995, 1958. 45) 二之湯栄: 上顎癌に際する断層撮影, 名市大医誌, 4; 216, 1953. 46) 野中貞二郎: 顔面の断層写真, 日耳鼻, 56; 284, 1953. 47) 太田良夫: 上顎疾患に対する断層撮影の応用, 日耳鼻, 61; 1382, 1958. 48) 太田良夫: 上顎疾患に対する断層撮影の応用, 日耳鼻, 62; 577, 1960. 49) *Peyser, A.*: Die Roentgenuntersuchung der Nasennebenhöhlen, Arch. f. Laryngol., 21; 126, 1909. 50) *Pfahler, G.E.*: The roentgenographic study of the accessory sinuses with special reference to the new technic for the examination of the sphenoid sinuses, Ann. of Oto-Rhino-Laryngol., 30; 379, 1921. 51) *Pfahler, G.E. etc.*: Roentgendagnosis of cancer of the accessory sinuses, Arch. of Otolaryngol., 31; 561, 1940. 52) *Pfeiffer, W.*: Beitrag zum Wert des axialen Schaedelskiagramms, Arch. f. Laryngol., 30; 1, 1916. 53) *Pfeiffer, W.*: Eine neue roentgenographische Darstellungsmethode der Keilbeinhöhlen, Arch. f. Laryngol., 23; 420, 1911. 54) *Rhese*: Die chronischen Entzündungen der Siebbeinzellen und der Keilbeinhöhle, Arch. f. Laryngol., 24; 383, 1911. 55) *Riechert, T.*: Die Arteriographie der Hirngefäße, 1949. 56) 酒井俊一他: 上顎悪性腫瘍を疑わせた症例についての考察, 耳臨, 53; 617, 1959. 57) 笹尾政之輔: 副鼻腔断層撮影の経験, 日耳鼻, 57; 1028, 1954. 58) 佐藤幹雄: 副鼻腔断層撮影について, 日耳鼻, 63; 884, 1960. 59) *Scheier, M.*: Zur Anwendung des Roentgenverfahrens bei Schussverletzungen des Kopfes, Dtsch. Med. Wochenschr., 40; 648, 1896. 60) *Scheier,*

図 1 後頭前頭撮影

症例 27. K.S., ♂ 57 才, 右上顎癌
上顎洞側壁の崩壊 (大矢印)
同内壁の厚化 (小矢印)

図 2 後頭頤撮影

症例 8. T.N., ♂ 60 才, 右上顎癌
上顎洞内・側壁の崩壊 (小矢印)
眼窩下孔の崩壊 (大矢印)

図 3 軸位撮影

症例 4. H.K., ♂ 50 才, 右上顎癌
上顎洞後壁の崩壊 (小矢印)
翼状突起の崩壊 (大矢印)

図 4 Rhese 氏法撮影

症例 8. T.N., ♂ 60 才, 右上顎癌
上顎洞側後壁の崩壊 (大矢印)
同上壁の崩壊 (小矢印)

図 5 前頭断層撮影(第3面)

症例 18. S.O., ♀ 63 才, 左上顎癌
上顎洞側壁の崩壊(大矢印)
同内壁の厚化(小矢印)

図 6 前頭断層撮影(第4面)

症例 15. M.I., ♀ 46 才, 右上顎癌
翼状突起の崩壊(大矢印)
蝶形洞への腫瘍の侵襲(小矢印)

図 7 矢状断層撮影(第2面)

症例 8. T.N., ♂ 60 才 右上顎癌
上顎洞上壁の崩壊(大矢印)
同後壁の崩壊(小矢印)

図 8 矢状断層撮影(第4面)

症例 図 7 と同じ
健側上顎洞とその周辺部

図 9 矢状断層撮影 (第2面)

症例 15. M.I., ♀ 46 才. 右上顎癌
上顎洞上・下壁の崩壊 (小矢印)
翼 状突起の崩壊 (大矢印)

図 10 水平断層撮影 (第2面)

症例 9. T.I., ♀ 70 才, 右上顎癌
上顎洞前壁の崩壊 (矢印)

図 11 水平断層撮影 (第3面)

症例 9. T.I., ♀ 70 才, 右上顎癌
上顎洞側壁の崩壊 (大矢印)
同内壁の崩壊 (小矢印)

図 12 涙道造影撮影 正面像

症例 6. O.M., ♂ 49 才 左上顎癌
鼻涙管の狭窄 (矢印)

図 13 涙道造影撮影 側面像

症例 図 12 と 同じ
鼻涙管の狭窄(矢印)

図 14 外頸動脈造影撮影 正面像

症例 12. C.H., ♂ 79 才, 左上顎癌
顎動脈の側方転位(大矢印)
蝶口蓋動脈分枝の分布の疎と蛇行の減少(小矢印)
点線は顎動脈の正常走行を示す

図 15 外頸動脈造影撮影 側面像

症例 図 14 と 同じ
顎動脈の後上方転位(大矢印)
眼窩下動脈の上方転位と前方歯槽動脈の前方転位(小矢印)
点線は顎動脈とその分枝の正常走行を示す

図 16 外頸動脈造影撮影 側面像

症例 8. T.N., ♂ 60 才, 右上顎癌
眼窩下動脈の消失(矢印)

M.: Über die Photographie der Nase und des Kehlkopfes mittels Roentgenstrahlen, Laryngol. ges., 4; 12, 1896. 61) Scheier, M.: Über die Verwertung der Roentgenstrahlen in der Rhino-und Laryngologie, Arch. f. Laryngol., 6; 57, 1897. 62) Scheier, M.: Die Diagnostik der Empyem der nasalen Nebenhöhlen und das Roentgenverfahren, Arch. f. Laryngol., 21; 525, 1909. 63) Scheier, M.: Zur Untersuchung der Keilbeinhöhlen mittels Roentgenstrahlen, Arch. f. Laryngol., 24; 185, 1911. 64) Scheuneman, H. etc.: Angiographische Untersuchungen über die Architektur der A. carotis externa, Fortschr. d. Kiefer u. Gesichts Chir., 108; 1957. 65) Scheuneman, H. etc.: Zur Methodik der Angiographie der A. carotis externa, Dtsch. Zahn u.s.w. Heilk., 28; 414, 1958. 66) Schrüdde, J. etc.: Angiographische Untersuchungen bei Geschwulsten im Kieferbereich unter bsd. Berücksichtigung d. Seriographie, Fortschr. d. Kiefer u. Gesichts Chir., 112; 1957. 67) Spiess, G.: Roentgenuntersuchungen der oberen Luftwege in Atlas und Grundriss der Roentgendiagnostik, Herausg. von F.M. Groedel M. München, 1909. 68) 高橋角次郎: 脳血管撮影法, 1942. 69) 高須賀信夫他: 副鼻腔疾患のレ線断層撮影について, 耳咽, 28; 729, 1956. 70) 高須賀信夫: 副鼻腔のレ線断層撮影に就て, 日耳鼻, 59; 1127, 1956. 71) 高須賀信夫: 上顎癌のトモグラフ, 耳鼻と臨, 4; 96, 1957. 72) 高須賀信夫: 進行方向より見た上顎癌の Tomography,

日耳鼻, 61; 1123, 1958. 73) 寺田勝光: 鼻腔副鼻腔に関する断層撮影法, 日耳鼻, 62; 2649, 1957. 74) Toennis, W.: Fortschritte in der Gehirnochirurgie, Jahr. kurse aerztl Fortb., 12; 1, 1933. 75) Val-lebona, A.A.: A modified technique of roentgenographic dissociation of shadows applied to the study of the skull, Radiol. Med., 17; 1090, 1930. 76) Waters, C.A etc.: Rontgentgenology of the accessory nasal sinuses describing a modification of the occipitofrontal position, Am. J. of Roentgenol., 2; 633, 1915. 77) 山本宗路: 上顎癌のレ線学的観察, 耳臨, 35; 189, 1940. 78) 山本忠邦他: 上顎癌のレ線検査, 日耳鼻, 59; 1970, 1956. 79) 吉川泰: 上顎洞悪性腫瘍のレ線撮影方法特に斜位法に就て, 耳臨, 36; 799, 1941. 80) 吉川泰他: 上顎洞悪性腫瘍のレ線撮影方法特に斜位法に就て, 耳臨, 37; 1, 1942. 81) 吉井正清他: 上顎洞後壁の断層撮影法, 日耳鼻, 64; 490, 1961.

稿を終るに臨み、終始御懇篤なる御指導、御校閲を賜った恩師北村武教授に深甚なる謝意を捧げると共に、絶えず御鞭撻、御協力戴いた水流博士、並びに教室員各位に厚く御礼申し上げます

本論文の要旨は第65回日本耳鼻咽喉科学会総会において発表した。

(原稿到着＝昭和 39. 8. 24 日)