EXPERIMENTAL STUDIES OF THE TRANSPLANTATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE NOSE IN THE RABBIT

By

YUTAKA NOGUTI

*From the Department of Oto-Rhino-Laryngology, Chiba University,
School of medicine (Director: Prof. T. Kitamura)*

Many cases of metaplasia to stratified squamous epithelium are seen in the atrophic rhinitis. The maxillary epithelium also falls in metaplasia after the transplantation to the inferior turbinate by Kubo's maxilloturbinal plasty. We suppose that these changes are caused by many factors but the decrease of the blood supply in the mucosa plays an important role.

A small graft from the septal mucosa of the nose in the rabbit was transplanted to the maxillary sinus. In 4 days the the transplanted graft falls in necrobiosis, but in 14 days regenerates a squamous like epithelium. In 30 days pseudostratified columnar epithelium and a few glands are

seen and in 90 days the columnar epithelium matures containing many goblet cells and the glands increase in number.

These regenerative changes co-relate closely with the reconstruction of the vascular network, which was confirmed quantitatively by the photomicrogram of the vascular network of the graft produced by injecting the latex solution from the carotid artery.

The vascular network and the gland in the graft resemble to those in the original maxillary mucosa, and the epithelium becomes that of the nasal membrane.

家兎鼻粘膜移植の実験的研究

千葉大学医学部耳鼻咽喉科学教室（主任：北村武教授）

野 口 愼
の ぐち ゆたか

目 次

I 緒 言

II 実験材料及び実験方法

1. 実験材料

2. 実験方法

1) 移植手術

2) 組織標本の作製及び観察

3) ラテックス注入標本の作製及び観察

a 灌流液及び灌流装置

b 灌流実験

c 標本作製

d 観察方法

e 小括及び考按

III 実験成績

1. 組織標本

1) 対 照

2) 移植粘膜の組織所見

3) 鼻中隔の粘膜採取部の修復

4) 小括及び考按

2. ラテックス注入標本

1) 対 照

2) 小括及び考按

3) 移植片のラテックスによる血管像

4) 小括及び考按

IV 総括及び考按

V 結 論

I 緒 言

Fränkel (1879) の発表以来、萎縮性鼻炎の鼻粘膜の病変については多くの研究があり、北村によればその主病変は鼻粘膜の萎縮で、下甲介に著しく、組織学的変化

は上皮の扁平化，化生，上皮下組織の線維化，腺の萎縮・消失，血管の炎症性変化等である。これらの変化はすべての症例に必ず見られるというものではなく，その一部を欠くものも多い。病因についても局所説（Lautenschläger），素因説（Wittmaack, Fleischmann），内分泌障害説等々の角度から論議が行われているが，そのいずれをとつても単独で萎縮性鼻炎の原因とは見做し難く，われわれは2,3の原因が重なつて上述の如き変化を表わすと考えるに致つた。

一方移植粘膜及び粘膜欠損部の再生の過程においては一般に上皮の扁平化，化生の生ずることがよく知られている。これらの場合最も強い障害を受ける組織の一つに血管系が考えられる。萎縮性鼻炎においても中村（1957）は血管の減少をあげている。著者は家兎を用いて鼻中隔粘膜を上顎洞へ移植し，移植粘膜及び鼻中隔粘膜欠損部の再生過程の組織学的観察を行い，又ラテックス注入標本により血管の修復過程を観察し，移植粘膜についてはその数量的観察を行い，組織学的所見との比較を試みた。

II 実験材料及び実験方法

1. 実験材料

同一条件で飼育した雄の健康成熟白色家兎（2.0～2.5 kg）67羽を使用した。夫々に次に述べる移植手術を施行し，表1の如く組織標本作製群とラテックス注入標本作製群とに分けた。その他に対照として各群に3羽宛無操作家兎による標本作製した。

表 1

実験群	術後日数	組織標本作製群	ラテックス注入標本作製群
I	4	5羽	3羽
II	7	4	3
II'	10	4	
III	14	6	4
III'	17	4	
IV	21	6	4
V	30	4	4
VI	60	4	5
VII	90	3	4
計		40	27

2. 実験方法

1) 移植手術

上記の家兎の背筋内に25%ウレタン7cc/kgを注射

し，30～60分後に充分麻酔が効いてから家兎を固定し，鼻背部を剃毛，消毒後，正中切開を行い，皮膚及び骨膜を左右に剝離して鼻背部及び上顎洞前壁の骨面を広く露出し，先ず右側上顎洞前壁を削開して，上顎洞粘膜を骨膜下に自然口付近まで可及的完全に剝離除去した。次いで左側鼻腔前壁の鼻骨及び上顎洞前壁を削開し上顎洞粘膜及び鼻腔側壁を除き，左側鼻中隔粘膜のほぼ中央部を鼻背部に近く7～8mm四方の四辺形に軟骨膜を含めて採取し，これを遊離移植粘膜片として，先に粘膜を除去した右側の上顎洞の内側の骨面上に粘膜片の軟骨面が接するように置いた。更に，前壁の骨欠損部より洞内への肉芽組織の侵入による移植粘膜片の吸収を防止する目的で手術用ゴム手袋の小片を滅菌して移植片を覆い更にその上に軟くガーゼタンポンを施し固定した。皮膚及び骨膜の切開創は一次的に縫合して移植手術を終つた。術後は感染防止のため3日間クロラムフェニコール100mgの筋注を行った。14日以上長期観察群ではゴム片による異物反応防止のため移植粘膜片の着床を待つて10日目に鼻背正中中部を再切開し，右上顎洞内のガーゼ及びゴム片を除去鼻背創を縫合した。以上の操作を通じて麻酔覚醒後家兎は元に復し摂食を行い，一部くさめ等を行うものもあるが数分後には安静になる。

2) 組織標本の作製及び観察

実験動物の一部は夫々術後所定の日数を経てから空気栓塞により屠殺し，直ちに皮膚を剝離し，鼻根部より切斷，10%ホルマリン液で固定しブランク・リチュロの迅速法で脱灰し，大部分の例は移植粘膜部を通る前額断，一部は水平断としてパラフィン包埋後，その方向に6～8μで薄切し，H・E染色，マロリー染色，PAS染色，バツプの鍍銀染色，ワンギーソン染色を行い検鏡し，主として鼻中隔粘膜（移植片採取部），移植粘膜の上皮，粘膜下層，特に血管の状態を観察した。

3) ラテックス注入標本の作製

前記の粘膜移植手術を行い，所定の日数を経た実験動物の中から，組織標本作製したもの以外の動物を用いた。

a 灌流液及び灌流装置

灌 流 液

i) 日本薬局方リンゲル液を使用し，リンゲル液500mlに7%の割にゼラチン，0.5mlのヘパリン液，0.05%の割にカフェイン末を加えた。

ii) 相模ゴム工業株式会社製のラテックス液を使用した。同液は安定剤としてアンモニアを加えアルカリ性

に保ち自然凝固を防いであり、白色乳濁状で pH 10.6～10.4、比粘度 27～30、比重 0.97～0.98 で熱を加えると 100°C で凝固する。灌流にはこのラテックス液を蒸留水で 20% に稀釈し、同液 500ml にホルマリン原液を 16ml 加え、pH 7.27、比粘度 1.5 に調製した。

灌流装置

2 個の温度自動調節装置付恒温槽を一定の高さに吊し、その各々に i) 及び ii) の灌流液を入れ、恒温槽より点滴静注用ゴム管を接続させ、Y 字型ガラス管により合流させ、末端にガラス製動脈カニューレを、その回路中にコック付点滴装置、水銀マンオメーター、温度計及びタコ管を取付けた。又灌流液流出には 2 本の静脈カニューレを使用した。

b 灌流実験

実験動物の背筋内に 25% ウレタン 7cc/kg を注射し、30 分～60 分待ち麻酔が充分効いてから仰臥位に固定し、頸正中に縦切開を加え、総頸動脈及び頸静脈を露出し、右総頸動脈、左右頸静脈にカニューレを挿入、左総頸動脈を結紮し、直ちに灌流を開始した。灌流液を入れた恒温槽は家兎の生理的血流状態に可及的に近ずけるため予め 40°C に調節しておき、灌流圧が 80～100mmHg になるように吊し、灌流液は i) 最初はリンゲル液を用い 500～700ml を右総頸動脈より注入し、両側頸静脈より流出せしめ、流出液が殆んど透明となつたところで ii) のテックス液を 350～500ml 灌流した。灌流終了時に生ずることのある全身痙攣を防止するため、5% オロパソード液 3ml を灌流完了の直前に注入して死亡させた。完了後、両側の総頸動脈及び頸静脈を結紮し、5～10 分間そのまま静置し、血管内ラテックスの安定を待ち断頭した。

c 標本作製

断頭後 50% 氷酢酸液に浸漬し、24 時間後に鼻骨を除去し、液がよく粘膜に浸漬し得るようにして引続き同液に 2～3 日浸漬し透明標本を作つた。この間に骨部は脱灰されて軟弱となり、操作が容易となる。鼻腔粘膜及び移植粘膜を注意深く骨より剝離し、日本光学製立体顕微鏡で血管を観察し、透過光線で撮影した。

d 観察方法

対照とした無操作家兎では粘膜を鼻中隔前、中、後部、側壁前、中、後部、上顎洞に分け、その部の任意の場所 5 カ所を測定し、その平均値を算出した。移植手術を施行した家兎では鼻中隔の粘膜採取部位の再生粘膜は軟骨からの剝離困難なため軟骨をつけたまま観察した

が、その写真撮影は行わなかつた。上顎洞の移植粘膜の剝離も困難であつたが、これ等は立体顕微鏡下に観察しながら、鈍的あるいは鋭的に剝離を進め、移植粘膜を可及的損傷しないように努力した。移植群の家兎でも左側の鼻中隔及び側壁の粘膜には操作が加えていないので対照とした家兎と同様の方法で観察した。写真は全て 35 mm 版のフィルムを用い、立体顕微鏡の拡大率は 24 倍として撮影し、印画紙に引伸し焼付けるに当つては、印画が実物の 48 倍となるように引伸し倍率を調節した。網状毛細管の網眼数は印画上で直径 5cm の円内の数で表わし、実物では 0.85mm² の円内の数に相当する。

E 小括並びに考按

鼻粘膜の血管分布に関する報告は Zuckerkandl (1884) 以来多数の業績があり、本邦でも久保、武田、橋本等により詳細に研究されている。微細血管分布に関しては古来ベルリンブルー、墨汁等の色素が用いられたが、近年に至つて合成樹脂、ラテックスを用いて血管系の鑄型を作製して観察する研究が多い。ラテックスは土居の肝血管、Trueta 等の腎血管、Marjorie 等の舌血管、Dawes 等により犬、家兎等の鼻腔血管の研究等に屢々用いられ、河野もラテックスを用いて正常家兎及び実験的に副鼻腔炎に罹患せしめた家兎の微細血管について詳細な研究を行つている。河野も述べている如く、ラテックスは物理化学的性状を血液にはほぼ等しくでき、生理的に無為な水を分散媒とする膠質で血液に最も似ており、血管壁にもよくなじみ、その形態を比較的忠実に示し、強靱で操作中でも損傷が少く、乳濁色のため透過光線での観察に適し、酸で軽度収縮し、アルカリで膨潤して元に戻るという性質のため、著者の実験には墨汁等の色素より優れている事を確認した。家兎の体温その他を予め測定したが、体温 38°C、頸動脈圧 90mmHg、血液の pH 7.3、血清の比粘度 1.5、血流量 50cc/分という河野の測定値を再確認し、灌流にはこれ等の値を基準として、可及的家兎の生理的狀態を保つように努めた。麻酔に用いたウレタンは広く家兎実験に用いられ、白井、山中等は無麻酔の状態と大差ないとし、河野はやや拡張を示したようだと述べている。微細血管の各部位に関する名称は西丸の分類した如く、小動脈、毛細動脈、分岐毛細管、網状毛細管、集合毛細管、毛細動脈、小静脈の名称が適当であろうが、白岩、河野等も指摘している如く、その境界を形態から把握することは難しい。

立体顕微鏡下での計測は粘膜片が浮遊液中のため困難なのですべて写真印画上で行い、骨面よりの血管出入等

はその観察のみに止め、小動静脈、毛細動静脈は部位により、又写真により不鮮明なのでその計測は行なわなかった。

III 実験成績

1. 組織標本

1) 対 照

鼻中隔の背側部及びこれに対応する鼻腔側壁の粘膜で、肉眼的に暗褐色を呈する部分が嗅部で、嗅上皮に覆われている。上皮細胞は脊の高い多列線毛円柱上皮で、間に細長い嗅細胞を混ずる。杯細胞はみられない。基底膜は鍍銀染色、PAS 染色で明瞭に染色される。粘膜固有層は疎性結合組織からなり、少量の膠原線維が見られる。血管は比較的豊富で深層に太いものが多く、静脈の内腔には多量の血球がある。浅層には多数の嗅腺があり、その多くは漿液腺で嗅上皮を鉛直に貫いて開口している。鼻中隔軟骨との間には比較的多くの結合組織を含む層があり軟骨と接している。

鼻底側の呼吸部では上皮は高さのやや低い2列線毛円柱上皮で、杯細胞を豊富に含む。粘膜固有層は疎性結合組織からなり比較的太い動静脈を有し腺は多数で粘液腺の占める割合が多い。

本実験で移植に利用したのは嗅上皮の部及び呼吸部の一部である。

上顎洞は家兎の副鼻腔の中で最もよく発育している洞で、前頭洞、蝶形洞、篩骨蜂窩の発育は悪い。上顎洞は上顎骨中にあり、尾側は眼窩に達し、矢状方向に長く、自然口は嗅鼻甲介の前部に広く鼻腔に開口する。上顎洞の血管は自然口から洞粘膜に分布するものがその主たるものであるが、鼻腔側壁、上顎洞前壁の骨を貫いて直接に分布するものもある。洞粘膜は単層線毛円柱上皮に覆われ、高さは鼻腔粘膜の約半分である。粘膜固有層は極めて疎な結合組織の基質からなり、少量の粘液腺及び血管を有する。粘膜固有層をも含めて上顎洞粘膜の厚さは鼻腔粘膜の約半分である。

2) 移植粘膜の組織所見

移植手術施行後予定の日数を経ずに死亡したものは死後変化による修飾を考えて除外した。各群の組織所見の概要は表2に示し、各群に特異的な所見を日数別に記述する。

第Ⅰ群（術後4日目）

上皮は nekrotisch で染色性が悪く、好中球、円形細胞の強い浸潤及び線維芽細胞の増生がある。基底膜は一部欠除するものもあるが大部分はよく保存されてい

表 2 移植粘膜の組織学的所見

術後日数	4	7	10	14	17	21	30	60	90
上 皮	線 毛	—	—	—	—	±	+	+	+
	円柱上皮	—	—	—	—	±	±	+	+
	杯状細胞	—	—	±	±	±	±	+	+
	立方上皮	—	—	+	±	+	+	±	±
	扁平上皮	—	±	+	+	+	+	—	±
皮	剥 脱	++	++	±	+	—	++	+	+
	再 生	—	+	±	+	±	++	++	++
基 底 膜		±	+	+	+	+	+	+	+
	線 維 化	—	±	+	+	+	++	++	++
血 管	拡 張	—	±	±	±	+	+	++	±
	新 生	±	±	±	+	++	++	++	++
	血 球	±	±	±	+	+	++	++	++
腺		—	—	—	—	—	+	+	+
	細胞浸潤	++	+	+	+	+	±	±	±
	肉芽増生	±	+	+	±	±	+	±	+
	浮 腫	++	++	+	±	±	+	±	—
	壊 死	++	+	+	±	±	—	—	—
骨	吸 収	+	+	+	±	+	+	±	+
	新 生	—	—	—	+	±	+	+	+

(—) 全く見られぬもの

(±) 一部に見られるもの（あるいは軽度のもの）

(+) 大部分に見られるもの（あるいは中等度のもの）

(++) 著しいもの（あるいは高度のもの）

る。粘膜下層は出血、壊死、浮腫、炎症細胞浸潤が著明で、壊死に陥つた太い動脈もみられる。骨面の近くには毛細管の新生を認めるが固有層内には余りない。骨は吸収像を見るものもあり、その部から移植片への毛細管の侵入及び線維芽細胞の出現がみられる。腺は全く認められない。

第Ⅱ群（術後7日目）

一部に凝血塊もあるが、移植片の中央部に扁平化した上皮の出現を認める。自然口付近に残存した上顎洞粘膜との接合部では杯細胞をもつ線毛円柱上皮があり、移植片へ移行するに従い次第に高さを減じ、立方上皮から扁平上皮に移行し、線毛及び杯細胞はない。中央部では上皮を欠き基底膜が露出している部分もある。腺は全くない。毛細管の新生は上皮直下にまで認められる。血管拡張は接合部に見られる。上皮下層では好中球及び円形細胞浸潤は急速に減少して線維化が現われている。

第Ⅱ'群(術後10日目)

凝血塊は全く消失し、大部分は1~2層の扁平化した上皮に覆われる。極く一部には杯細胞を含む円柱上皮もみられるが線毛はない。残存粘膜との接合部は線毛円柱上皮から高さを減じて扁平上皮の移行している。基底膜はよく認められる。上皮下層の線維化はやや強くなる。血管は余り多くないが拡張しており、内腔の血球は少い。腺は全く認められない。骨は所々吸収され消失し、その部には結合組織の増殖がある。浮腫は高度である。

第Ⅲ群(術後14日目)

上皮は2~3層の扁平上皮で、一部に立方上皮から線毛円柱上皮への移行がみられる。円柱上皮の部分には杯細胞も少数ながらみられる。基底膜は明瞭である。上皮下層には血管の拡張、新生が目立ち、内腔の血球は増加している。線維化はⅡ'群より高度である。浸潤細胞は少数の好中球、円形細胞で線維芽細胞の増生もあり線維化の進行を思わせる。浮腫は軽度である。骨には吸収、不規則性増殖のみられるものがあり、骨欠損部には円形細胞浸潤が著しい。これは移植片部の炎症が固有鼻腔側へ波及したためと思われる。肉芽組織の増殖した部分は上皮を欠くがその周辺部は残存粘膜からの新生扁平上皮で覆われている。

第Ⅲ'群(術後17日目)

上皮は第Ⅲ群の如く2~3層の扁平上皮が大部分で、移植片の辺縁部の線毛円柱上皮及び高さを減じて扁平上皮へ移行する部では杯細胞が増加している。所々にみられる肉芽組織増生部では上皮を欠く。粘膜下層は線維化が高度で血管の拡張、新生像をみるが、内腔の血球は多くない。腺は全くみられないが、一部上皮が上皮下層に入り込んで腺形成のような所見がみられる。

第Ⅳ群(術後21日目)

上皮の大部分は2~3層の扁平上皮で、円柱上皮は辺縁部に極くわずかに認められるに過ぎない。粘膜下層の線維化は増強し、骨との結合が強固となつている。血管の増加は著明でなく、血球も少い。対応部の鼻腔側壁粘膜には海綿体の充血が著しい。腺の出現、細胞浸潤、浮腫は殆んどみられない。鼻背に近い部には骨の増殖があり不規則化している。

第Ⅴ群(術後30日目)

上皮は大部分線毛円柱上皮となり、その高さも正常の上顎洞粘膜のものより高く、固有鼻腔粘膜上皮と同じ位となる。杯細胞も増加し、固有鼻腔粘膜にみられると同

程度のところもある。一部には依然扁平上皮の部もあり、残存粘膜との接合部には、第Ⅲ'、Ⅳ群に見られたように線毛円柱上皮から扁平上皮に移行している例もある。基底膜は明瞭である。上皮下層の線維化は一層高度となつている。血管は動静脈共その数を増し、拡張は強く、管腔内の血球も増加している。この群ではⅠ~Ⅳ群に見られなかつた上皮下層内の腺を少数ながら認める。その細胞質はH・E染色で暗調に染色され、マロリー染色では赤染され、粘液性分泌物の貯留を認める。骨の新生像も著明なものがあり、随所に血管が貫通し、骨髓の形成もみられる。対応する固有鼻腔粘膜にも血管の拡張がある。即ち固有鼻腔と移植片間の血管の連絡を物語っている。

第Ⅵ群(術後60日目)

5例中3例は脊の高い線毛円柱上皮に覆われ、杯細胞は増加し、鼻腔粘膜より遙かに多い。所々に intraepitheliale Drüsen の形成が見られる。基底膜は明瞭である。上皮直下には多数の太い動静脈の新生があり、血球も多い。腺も増加し、その周囲には毛細管の新生が多い。線維化の程度は減じている。骨増殖が高度で骨髓形成のみられるものもある。

第Ⅶ群(術後90日目)

上皮はほぼ完全な線毛円柱上皮となり、細胞の配列は密で、杯細胞の数はⅥ群より減少している。基底膜は明瞭でPAS染色でやや膨化している。上皮下層の線維化はⅥ群に似ている。血管はⅥ群より増加し、管内の血球も豊富である。腺も増加しているが本来の上顎洞粘膜におけるよりも少い。細胞浸潤は極く軽度で浮腫も殆んど見られない。骨の増殖はⅥ群と同程度で新生の傾向はない。一部に異所性軟骨の新生がある。

3) 鼻中隔の粘膜採取部位の修復

観察結果の概要を表(3)に示す

第Ⅰ群(術後4日目)

上皮は線毛円柱上皮から急激に高さを減じて扁平上皮となり露出した軟骨面に延びている。軟骨面は大部分露出し、一部好中球をもった膿性被膜に覆われる。切除縁には炎症細胞浸潤があり、毛細管の新生、線維化が始まつている。

第Ⅱ群(術後7日目)

辺縁部で円柱上皮から移行した扁平上皮はⅠ群より延びている。上皮下層は辺縁部を除き血管の新生は明瞭でない。軟骨面は大部分線維性被膜に被われる。

第Ⅱ'群(術後10日目)

表 3 鼻中隔粘膜採取部の組織学的所見

術後日数	4	7	10	14	17	21	30	60	90
上皮	線毛	—	—	—	—	+	+	+	+
	円柱上皮	—	—	—	±	+	+	+	+
	杯細胞	—	—	±	+	+	+	+	+
	立方上皮	±	+	+	±	+	±	+	±
	扁平上皮	±	±	±	+	+	±	+	±
皮	再 生	+	+	+	+	++	++	++	++
	基 底 膜	—	±	±	±	+	+	+	+
血 管	線 維 化	—	±	+	±	+	++	++	++
	拡 張	—	—	—	—	+	+	++	+
血 球	新 生	—	±	±	±	+	++	++	++
	血 球	—	±	±	++	±	++	++	++
腺	腺	—	—	—	—	—	—	±	+
	細胞浸潤	—	+	+	—	+	++	+	—
	肉芽増生	—	+	+	+	+	++	+	+
	浮 腫	+	±	±	±	±	+	±	±
	膿 死	+	±	—	—	—	—	—	—
軟 骨	吸 収	—	—	++	±	±	—	—	+
	新 生	—	—	—	+	—	—	±	+

(一) 全く見られぬもの

(±) 一部に見られるもの (あるいは軽度のもの)

(十) 大部分に見られるもの (あるいは中等度のもの)

(++) 著しいもの (あるいは高度のもの)

鼻底部では円柱上皮からの移行像がみられ、鼻背部では肉芽組織の増生があり、中央部は上皮を欠き、線維性被膜のみに覆われている。基底膜は再生部の先端では不明瞭であるが、基部では菲薄ながら認められる。上皮下層の線維化は更に進んでいるが、部分的にはなお浮腫を呈している。毛細血管の新生がみられる。

第Ⅱ群 (術後 14 日目)

扁平な新生上皮は大部延びているが未だ全面を覆うには至らない。上皮下層の線維化が著しい。鼻背部に近く増生した肉芽組織では血管の拡張が目立ち多数の血球を含み、軟骨は一部吸収され、肉芽組織に置換されている。

第Ⅲ群 (術後 17 日目)

上皮の再生は更に進み、密に線維化した結合織の上に延びているが未だ中央部では上皮を欠く。再生上皮の基部では上皮細胞は円柱上皮で少数の杯細胞を混じ線毛を認めるが、尖端部に行くにつれ次第に高さを減じ扁平化

している。上皮下層には拡張した新生血管がある。腺は全くみられない。鼻背部に近い肉芽組織は線維化し、その部の血管拡張は著しくない。上皮化された部及び肉芽組織の部に軟骨が吸収され、結合織に置換された像があり、一部には骨増殖がみられる。

第Ⅳ群 (術後 21 日目)

鼻背に近い肉芽組織部を除き粘膜採取部の殆んど全面に線毛円柱上皮が再生し、杯細胞も出現している。しかし上皮の高さは不揃いで、一部には扁平上皮もみられる。基底膜は明瞭で、上皮下層の血管はⅢ群より増加し、内腔の血球も増加している。再生部の基部では腺のみられるものもある。軟骨と上皮下層の間には明瞭な軟骨膜を欠き軟骨との境界が不鮮明で、軟骨から直接に上皮下層に移行しているように見える。

第Ⅴ群 (術後 30 日目)

上皮の再生はほぼ完全に行われ、すべて円柱上皮で、高さも、杯細胞の割合も正常鼻中隔呼吸部上皮と変りない。上皮下層の線維化は更に進み、血管の数もわずかながら増加を見る。

第Ⅵ, Ⅶ群 (術後 60 日, 90 日目)

再生上皮の所見及び上皮下層の線維化の状態はⅤ群と変りがない。腺は散在的であるが新生を見る。

4) 小括及び考按

上 皮:

上顎洞内側壁に移植した鼻中隔粘膜上皮は 4 日目では nekrotisch の状態で染色性に乏しいが基底細胞は大部分認められる。7 日目に移植片の中心部に扁平化した上皮が認められることは、上皮の再生が、移植片に保たれた基底細胞から行われることを示している。移植片の辺縁部に接して腺を多数にもつた線毛上皮に覆われた粘膜があり、この上皮は移植片の方に延び、次第に高さを減じて移植粘膜上で消失している。恐らくこれは上顎洞内に残存した粘膜が移植片と相接し、その部からも上皮化が行われたものと考えられる所見である。14 日目では移植粘膜のほぼ全面が上皮化されるが未だ殆んどが扁平上皮であつた。再生上皮が線毛上皮となるのは 30 日目以後で、この頃には杯細胞も認められる。60 日目には杯細胞もその数を増し、上皮は鼻腔呼吸部粘膜に酷似してくる。

鼻中隔の粘膜採取部では 4 日目に辺縁部の残存粘膜から扁平化した上皮が伸展し始め、17 日目には欠損部のほぼ全面が上皮化され、30 日目には線毛上皮となる。

上皮の再生に要する期間と再生上皮の形態の推移に関

しては移植粘膜と鼻中隔の再生粘膜の間には余り著しい差はないように思われる。

杯細胞については移植粘膜では30日目に、鼻中隔再生粘膜では21日目に出現をみているが、60日目以後では著しく増加し、その数は対照の呼吸部上皮に匹敵し、intraepitheliale Drüsenの形成も見られる。又一部には腺の形成を思わせる上皮の陥入も認められる。

基 底 膜：

移植片では移植直後の上皮及び固有層に nekrobiosisch な変化の強い時期にも PAS 染色、鍍銀染色で大部分に基底膜を認め、移植のような強い侵襲に対してもよく抵抗し存在することが分つた。以後経過を追つても特に著しい変化は見られなかつた。

鼻中隔再生粘膜では辺縁から再生する上皮の先端に菲薄ながら認められ、上皮の再生が進むと共に明瞭になる。肉芽組織が增生し、仲々上皮化されない部では認められない。再生上皮が線毛上皮となれば対照の鼻粘膜上皮と同様に明瞭に認められるが、著明な肥厚はみられなかつた。

血 管：

移植粘膜における血管の新生は移植床である上顎洞内側の骨壁から起ることは想像に難くないが、4日目の組織標本で一部にそれを思わせる所見が認められた。毛細管の新生は7日目に上皮直下にまで見られるが、この時期には上顎洞内に残存した粘膜あるいは增生した肉芽組織と移植片との接合部からも血管の新生が行われていると考えられ、この状態はラテックス注入標本で確かめられた。比較的太い血管が見られるのは14日目からで、以後次第にその数を増している。しかし血管内腔に多くの血球がみられるようになるのは21日目からで、血行の増加を思わせる。微細血管の分布密度は組織標本では把握し難く、ラテックス注入標本でよく観察される。血管壁自体の肥厚、炎症等の所見は余り見られなかつたが、血管の拡張は7日目から見られ、30日目に最強であつた。

鼻中隔では粘膜再生部の周囲に血管の拡張がみられ、未だ一部上皮化が完了していない17日目では軟骨面を覆う線維性組織内に少数の血管新生を認めるが、鼻背部に近い肉芽組織内には多数の血管の新生がみられる。鼻中隔の再生粘膜では、移植粘膜に比して各群の固有層は薄く、血管も少い。

上 皮 下 層：

移植片では4日目に高度の細胞浸潤があり、7日目に

は線維化が現われ、21日目以降では高度の線維化が認められた。鼻中隔の粘膜再生部では細胞浸潤は遙かに少く、線維化は上皮化された部分に強い観があり、上皮化が全面に及んだ21日目においては上皮下層の線維化はかなり高度である。鼻中隔の再生粘膜と移植粘膜の上皮下層を比較すると、移植粘膜は2～3倍の厚さをもつ。細胞間質の浮腫は移植粘膜に強く、10日目までは高度であるが線維化の進行と共に減ずる。

腺：

移植粘膜では4日目には腺は認められず、腺細胞は乏血、炎症等に対して抵抗の弱いことが考えられ、多くの報告にある如く萎縮性鼻炎で腺の減少、萎縮、変性等の生ずる原因の一つにも同様の機序が想像される。上皮が線毛上皮となる30日目に少数の腺が出現し、以後次第にその数を増すが、90日目でも鼻粘膜嗅部、呼吸部に比し遙かに少く、本来の上顎洞粘膜より少い。又 H・E 染色では暗調に染色され、呼吸部及び上顎洞粘膜に見られる腺に類似し、移植粘膜に移植前にあつた嗅腺とは異なる。マロリー染色ではアゾカルミンの色をとつて腺細胞の内腔が杯細胞の如く赤く染まるのが目立つ。即ち粘液を産生している。

鼻中隔の粘膜再生部では腺の再生は移植片より遅れ、60日目からみられ、その数も少い。腺の種類は移植片と同様である。

骨・軟骨：

移植床である上顎洞内側壁の骨は極めて薄い表面平滑な骨板で、個々の家兎で特に著しい差異は認めなかつた。移植後における骨の変化は区々で、骨が消失して移植粘膜と鼻腔側壁粘膜が骨膜を境に相接しているようなものから上顎洞側に不規則に増殖し肥厚した部に骨髓が形成されているもの、又一部に軟骨形成のみられるものもある。

鼻中隔の粘膜採取部でも採取側に軟骨の不規則な増殖のあるもの、逆に軟骨が消失して削り取られたようなものまであり、骨・軟骨の変化を術後日数を追つて整理するのは困難である。

2. ラテックス注入標本

1) 対 照

家兎の鼻腔を灌流する動物は2つに分けられ、主として外頸動脈から一部は内頸動脈からの血流を受けている。外頸動脈からは翼口蓋動脈が出て楔状口蓋動脈及び眼窩下動脈となる。前者は鼻腔側壁を通つて前甲介、上顎洞、鼻中隔に分枝し、篩骨動脈と吻合する。後者は顔

面に出る前に鼻腔、上顎洞をうるおす 内頸動脈からは前節骨動脈が出て楔状口蓋動脈の枝と吻合する。

鼻粘膜の血管は浅層に毛細管、深層に比較的大い血管がみられ、動静脈については Swindle (1937) の云うように浅層が静脈、深層に動脈のみられる V/A 形態を示している。

鼻中隔及び側壁の後部は小動静脈が多く、浅層の毛細管網の形成は比較的少ない。中部では小動静脈が少くなり、毛細管網の形成が増加し、前部ではこの傾向は更に強く、毛細管網の形成は密になる。上顎洞では血管が細く、少く、分布も鼻中隔、側壁に見られるより平面的である。

血管壁は全般的に平滑で、著しい蛇行、拡張、狭窄等の所見は見られない。

各部の計測結果は表 4 の通りで、網眼数は中隔前部が最多で 195、次いで側壁前部の 149 で毛細管網の密なることを示しており、中隔後部では 86、側壁後部では 72、

表 4 鼻粘膜各部の計測値
対 照 群

部 位	網 眼 数	網眼の大きさ	管 径
鼻 前 部	195	60.6 × 45.6 μ	16.1 μ
中 部	111	92.4 × 41.8	23.6
隔 後 部	86	118.0 × 68.4	26.9
側 前 部	149	72.2 × 47.6	20.9
中 部	120	81.8 × 42.6	19.6
壁 後 部	72	116.1 × 64.2	24.6
上 顎 洞	81	116.4 × 66.4	12.0

網眼数は 0.85mm² 当りの数

上顎洞では 81 で毛細管網が疎である。網眼の直径はこれとは逆に比例の関係で中隔前部では長径 60.6 μ 、短径 45.6 μ 、側壁後部では長径 116.1 μ 、短径 64.3 μ 、上顎洞では長径 116.4 μ 、短径 66.4 μ である。毛細動脈も鼻腔では 20 μ 前後であるに比し、上顎洞では 12 μ と細くなっている。

2) 小括及び考按

鼻粘膜の微細血管分布については Swindle, Dawes 等 (1953) が家兎、犬等を用いて観察しているが、各部位別のものではない。本邦では佐藤が猫で墨汁を注入、河野が家兎でラテックスを用いて詳しく観察している。著者も河野の方法によつた。正常家兎についての観察結果は表 4 の如くでよく河野の成績と一致した。このよう

に安定した成績の得られるラテックス注入法は鼻粘膜の微細血管の観察には優れた方法であると考えられる。

3) 移植片のラテックスによる血管像

ラテックス注入群の家兎を表 1 に示した如く術後日数により 7 群に分け、主要な所見を表 5 に示し、各群に特徴的な所見を順に記述する。移植片では動、静脈の区別が他の鼻粘膜におけるようには判然とせず、又走行が不規則である。

表 5 移植粘膜の所見 (ラテックス注入群)

群	術後日数	網眼数	網眼の大きさ	管径	血管新生	断絶	蛇行	拡張	狭窄	漏洩	備 考
I	4	—	—	—	±	++	—	—	—	++	細部不明
II	7	150	100 μ	16 μ	+	++	+	+	+	++	
III	14	49	186 × 129	23	++	++	++	±	+	+	骨と癒着のラテックス
IV	21	59	168 × 89.0	20	++	+	+	+	+	+	〃
V	30	72	156 × 92.5	20	++	±	+	++	++	+	〃
VI	60	82	135 × 77.6	16	++	±	++	++	+	+	〃
VII	90	86	111 × 68.8	20	++	±	+	+	±	+	〃

網眼数は 0.85mm² 当りの数

斜線は計測不能を示す

(±) 一部に見られるもの

(+) 大部分に見られるもの

(++) 著しいもの

第 I 群 (術後 4 日目)

移植片全体にラテックスの漏洩がつよく、殆んど血管の走行は認められないが、極く一部に 25 μ 前後の細い血管が見られる。網眼の形成はみられない。移植片の剝離に際し骨面との癒着は著しくなく、又周囲より移植片と交通する太い血管も見られなかつた。

第 II 群 (術後 7 日目)

ラテックスの漏洩は依然広範囲に及び、血管の認められる部分は少いが、断絶した太い血管にラテックスが充満している像や、血管が新生して網眼を形成している像も見られる。その網眼は楕円形あるいは不正多角形で、長径 150 μ 、短径 100 μ 前後のものが多く、網状毛細管の直径は細く 16 μ 前後であるが、単位面積当りの網眼数を問題にし得る程には網眼形成は完全でない。

第 III 群 (術後 14 日目)

前群で見られた断絶した太い血管は見られず、自然口より移植片と交通する太い血管のみみられるものがある。移植片には最大 80 μ にも達する血管の新生像があり、

あるものはその末端が急激に細くなり、消失したりその儘の太さで急に断絶しているところもみられ、全般に不規則に蛇行している。浅層、深層共にこのような血管があり、他の鼻粘膜部に見られる浅層は毛細管網、深層は比較的太い毛細動脈という規則性も乱れている。毛細管網の形成は随所に見られるようになり、その形は不正多角形で計測値の平均は長径 186μ 、短径 129μ であり、網眼数は 49 であった。ラテックスの漏洩はこの群では著しく減少している。

第Ⅳ群(術後 21 日目)

内径 95μ 前後の比較的太い血管が樹枝状に新生し、拡張、狭窄、蛇行が見られ、更に細い血管に分れ、網眼を形成している。その数は 59、長径 168μ 、短径 89μ と前群に比しその数を増し、大きさを減じている。移植片と骨との癒着は高度になる。

第Ⅴ群(術後 30 日目)

移植片と骨との癒着は高度となり、剥離は困難で、剥離にさいし骨と交通する血管と思われる数条の細い索状のラテックスを切断した。比較的太い血管はその内径が 85μ と前群に比し細くなっているがその数は増加している。拡張、狭窄、蛇行も認められる。網眼数は 72、大きさは長径 156μ 、短径 92.5μ と前群よりその数を増し、大きさを減じている。

第Ⅵ群(術後 60 日目)

移植片と骨との癒着は前群と同様高度である。血管の拡張、蛇行、狭窄は本群でもかなり強く、ラテックスの漏洩もなお僅かに認められる。血管の走行は規則的となり、太い血管は深層を、毛細血管は浅層を走る傾向が認められる。網眼数は 82 と増加し、長径 135μ 、短径 77.6μ と小さくなっている。

第Ⅶ群(術後 90 日目)

移植片の剥離に際しての癒着は高度で骨から流入する索状のラテックスも数を増している。自然口から移植片に至る血管も太く、内径 450μ に達するものもある。この血管より分枝する血管も太いものでは 100μ 前後のものもある。この群でも太い血管は深層に、毛細血管は浅層にみられる。網眼数は 86、長径 111μ 、短径 68.8μ となつている。

4) 小括及び考按

術後 4 日目では移植片全体にラテックスの漏洩が強く、血管系の再生は未だ極めて僅かにみられるに過ぎないと考えられる。組織像で出血、壊死等がみられ血管が殆んど見られない所見と一致する。

7 日目ではなお漏洩は強いが一方網眼形成も見られ、移植片の血液灌流が一部で行われるようになったものと考えられる。組織所見では炎症像が相当強く見られるところから、ラテックスの漏洩の強いことも肯ける。

14 日目で自然口から移植片に流入している太い血管のみみられることは自然口からの血液供給路の成立を示す所見で、移植片内の血管新生像と共に移植片の上顎洞への定着と考えられる。又組織像でも自然口の粘膜より移植片への粘膜の連続的な再生像を見ている。

21 日目に索状のラテックスが骨面との間にみられた。これは移植片が定着し、骨面からも血流をうけることの証左ともなろう。剥離が困難なことは組織像で骨面との線維性結合が強くなっている所見と符合する。

30 日目以後では毛細管網は日を追つて密となる。移植片に供給される血液は自然口よりのもの、骨面よりのものも共に次第に増加していると考えられる。

90 日目では毛細管網の数は 86、大きさは長径 111μ 、短径 68.8μ 、毛細動脈の直径 20μ となり、対照の上顎洞における網眼数 81、長径 116.4μ 、短径 66.4μ 、管径 20μ と似てくる。組織像では上皮については完成されており、血液供給の面から考えれば、上顎洞粘膜と同様となつている。

なお Tiedemann (1957/8)、白岩 (1959) 等の云う動静脈吻合と思われる所見は対照群では見られるものもあつたが、移植粘膜には見られなかつた。

IV 総括及び考按

粘膜の移植は粘膜欠損部の上皮化の促進や粘膜の容積を増す目的等で各科領域で広く行われている。耳鼻咽喉科領域でもその例は多く、粘膜上皮の強い再生能力が各種疾患の治療に利用されている。例えば久保式上顎下甲介整形手術や、慢性副鼻腔炎手術の赤池法等、又遊離移植としては石井等の萎縮性鼻炎手術に上顎洞粘膜を用いる方法や、北村の喉頭部分切除後に鼻中隔粘膜を用いる方法等である。

粘膜上皮の再生力は強く、粘膜を除去したのみで移植を行わずにも再生が行われる。即ち副鼻腔炎手術により粘膜を除去した場合がその好例で Tonndorf (1928)、Gorham (1930)、Kistner (1931)、McGregor (1931)、鈴木 (1932)、本郷 (1958)、青木 (1961) 等多数の報告がある。

動物実験では粘膜移植の実験はそれ程多くはないが、松田等 (1956) は家兎の鼻中隔粘膜を上顎洞に移植し、移植片の化膿がない限り移植は成功すると述べ、友田

(1957)は術後性頬部嚢腫の成因を研究するため家兎で鼻中隔粘膜を大腿部に移植し、約1週後に移植床に生着することを認めている。

粘膜を除去したのみの例では Knowlton (1928) が犬の上顎洞で Coats (1930), Hilding (1933) が犬の前頭洞で夫々粘膜の再生を観察し、Boling (1935) は羊の鼻粘膜上皮を掻破してその再生像を、又 Greenberg (1962) は犬の気管粘膜の再生を観察している。又腐蝕性薬物による粘膜損傷の動物実験も Grossmann (1922), Burian (1958), 市川 (1964) 等により報告されている。

上記の実験で使用された動物は犬、家兎、羊等種々であるが、本実験には粘膜移植及び灌流実験に利用できる動物として比較的適当な大きさをもち、同一条件で飼育することの便、入手の容易さ、又先に述べた如く、自律神経に対する影響が少く、血管の研究に適する麻酔剤ウレタンを用い得ること等を考慮して家兎を用いた。

人では粘膜移植には上顎洞粘膜が多く使われるが、正常家兎の上顎洞粘膜は極めて菲薄で、移植片としての利用は殆んど不可能に近く、たとえ成功しても手術操作による損傷が甚しく本実験の目的には不相当と考えられるので、採取が比較的容易で損傷のおそれの少い鼻中隔粘膜を使用した。又上顎洞への移植は術後前壁から侵入する肉芽組織により移植片が吸収され、上顎洞が肉芽組織で充満する事が多いので、肉芽組織の侵入を防止するため前記の如くゴム片を使用し、10日目に除去した。これにより肉芽組織の侵入は防止しえたが、ゴム片による異物反応が予想された。しかし本実験の結果から、ゴム片挿入はそれ程重大な影響を与えなかつたようである。

上 皮:

線毛上皮の再生は、粘膜の変性の影響を受け難く、線毛細胞や杯細胞に分化する潜在能力をもつ基底細胞の分裂、分化によることは容易に想像されるが、Thanhoffer (1929) は線毛細胞も退化、分裂して再生に関与するとし、Boling は羊の鼻粘膜上皮の再生を4段階に分け、

- ① 辺縁部の上皮細胞の逆分化 (受傷後6時間位に開始)
- ② 逆分化した細胞の分裂及び移動による欠損部の上皮化
- ③ 再生上皮の重層化
- ④ 重層化した上皮細胞の再分化

とし、③の細胞分裂は辺縁でのみ行われ、欠損部の上皮化は分裂によつて生じた細胞の移動によつてのみ行われると述べている。本実験の移植片辺縁部、あるいは鼻

中隔粘膜再生部の所見は Boling の説と一致するが、一方移植片の中部においても早期に上皮再生像がみられた。これは移植時に保たれた基底細胞からの再生を意味しよう。細胞の分裂方式としては Grossmann, Hoffer は損傷の程度により間接分裂あるいは直接分裂を行うとし、Burian 等は DOCA 使用により再生を促進された上皮に無糸分裂による plasmodium の形成を報告しているが、著者の実験では間接分裂のみのようであつた。

再生上皮の形態及び再生に要する期間は移植片では中村 (1957) は久保式整形手術施行例で10カ月、15カ月で多列線毛円柱上皮を認め、長野 (1963) は赤池法で移植した上顎洞粘膜で30~50日で扁平上皮に化生し60~80日で線毛上皮となると述べ、動物では友田は家兎鼻中隔粘膜大腿部移植例で10日前後に分裂像を見、扁平化の傾向を示したとし、著者の実験では2週間前後で扁平化し、30日で線毛上皮となつた。

又粘膜除去部の再生についてみると、人の上顎洞では、Tonndorf は2週間後に扁平化した上皮の侵入を認め、鈴木、青木は夫々30日前後で扁平上皮となり、60日前後で線毛上皮となるとし、本郷は篩骨洞で5カ月で円柱上皮の完成をみたと報告している。動物では Knowlton は1カ月で線毛上皮を認め、著者の実験の鼻中隔では2週間で創面は扁平上皮で覆われ、30日で線毛上皮になつた。又 Greenberg は犬の気管粘膜で10日で扁平化した上皮を、21日で線毛上皮を認めたと報告している。腐蝕性薬物を使用した例では、Grossmann 等はクロロホルムの吸入麻酔の動物気管粘膜で浅い上皮欠損は遅くも3日で完全に修復されるとし、市川は家兎でホルマリンを用い、気管では10~14日で、上咽頭では4週間で線毛上皮ができた述べ、Burian 等は白ネズミの鼻粘膜に硬酸亜鉛等で化学的に損傷を与え、損傷が深層に及べば再生上皮は扁平上皮に化生し、表層のみの場合には直接に線毛上皮が再生すると述べている。

本実験の移植粘膜では基底細胞は比較的よく保存されていたにも拘らず線毛上皮の再生に30日を要した。これは移植により血流が一時絶たれ、血管系の修復と共に完全に再生されることを示している。

又術後の粘膜欠損部の治癒過程においては感染等が加わつた場合、瘢痕組織が生じ、上皮化されない例も報告されている (Hilding, 名越)。本実験でも肉芽組織増生の強い箇所の上皮化には相当の日時を要した。

杯細胞は線毛細胞と同様に基底細胞を母細胞にもち、種々の刺激時にその数を増し、刺激の消退と共に数を減

ずるとされ（片山, Latta, Schall 等）, 中村は老人性変化に杯細胞の増加を認めている。杯細胞と線毛細胞の相互移行については古来議論の多いところで, Latta, Schall (1934) は線毛細胞の粘液変性により杯細胞が生じ得るとし, Sternberg (1924), Eggston (1947) 等は両者の相互移行を認めている。又鼻腺と杯細胞の多寡は代償的關係にあるとも言われ, Knowlton は人では杯細胞が多く, 腺は少いが犬では逆に杯細胞が少なく, 腺が多く, 粘膜を除去した犬の上顎洞再生粘膜では未だ腺の再生の少い時期には杯細胞が多く, 腺の増加と共に杯細胞は減少すると述べている。杯細胞の増多の著しい時には intraepitheliale Drüsen の形成が見られるとされ Zarniko (1903), Schaffer, (1927), 又 Messerklinger (1958) はピロカルピン注射によりモルモットの気管上皮に intraepitheliale Drüsen の形成を見ている。

本実験の移植片では 30 日目に線毛細胞がみられるが, 60 日目には杯細胞の著しい増加があり, 90 日目ではやや減少を示している。線毛細胞との相互移行, 固有層の腺の増加等との関係は興味ある問題である。

基 底 膜:

萎縮性鼻炎の如く上皮に強い障害があれば消失するといわれ, 中村は化生の認められる場所では消失するが, 化生のない場所では基底膜は認め得るとし, 北川 (1954) は鼻茸の PAS 染色で重層扁平上皮に化生した部で部位により消失しているとしている。Braun-Falco (1959) は高度の肥厚性鼻炎で基底膜の高度の肥厚を報告している。Schumacher (1925) は表層の結合織層の硝子変性に肥厚の原因を求め, 中村は上皮の機能殊に粘液産生能力と基底膜の肥厚, 消失は密接な関係ありとし, Messerklinger は抗原抗体反応による硝子様分質の沈着だと述べている。

本実験において, 移植粘膜では上皮欠損部も基底膜はみられ, 上皮の再生と共に明瞭になった。北川の言う如く炎症と基底膜の関係の複雑さが想像される。

血 管:

萎縮性鼻炎に見られる血管の変化は, 動脈内膜炎 (Schönemann 1902), 慢性動脈周囲炎 (Lautenschläger) 閉鎖性動脈内膜炎 (Ruskin 1932, Lautenschläger), 内膜の肥厚 (Krause 1881, Minkovsky 1931) 等々で中村の言うように通常の慢性鼻炎においても屢々みられる所見であり, 萎縮性鼻炎に特有なものではないが, その変化の強さ, 即ち血液供給不足をきたす度合が重要であろう。

萎縮性鼻炎の原因の 1 つと考えられるものに内分泌の異常があるが, 萎縮性鼻炎が女性に多く, 思春期に発病することから oestrogen が注目され, Dorochenko (1937) 等は oestrogen を使用し萎縮性鼻炎の治療に効果を認め, Bernheimer (1940) 等は局所に血管拡張剤を使用しても oestrogen と同様な効果ありとし, Harrison (1957) は oestrogen の長期大量投与は粘膜の扁平上皮化を生じたと報告したが, Tailor (1961) は試験切除による損傷が原因であるとし, oestrogen の血管拡張作用を強調している。又 Hollender (1944), Meserklinger は乾燥と血液供給不足を上皮化生の主要素と見做し, Hilding (1932) は, 犬, 家兎で片側の鼻腔を縫合し, 他側の鼻腔に 2 倍の呼吸を強制し, 上皮化生を認めている。

本実験において, ラテックス注入標本の示す血管系の新生の極めて僅かな時期には上皮, 腺に退行的変化がつよく, 新生がやや進むと扁平化した上皮がみられ, 血管系の新生が更に進めば線毛上皮及び腺の再生が見られたことは血管系と上皮, 腺の間に密接な相関のあることを示している。鼻中隔の粘膜再生部ではラテックス注入標本による数量的観察は行わなかつたが, 移植粘膜に比し, 血管の数も少く, 網眼数も少いようである。

腺:

Peter (1912), Wustrow (1959) は腺の発生は人では胎生 4 カ月頃に上皮の陥入により intraepitheliale Drüsen の像を呈し, 後に腺を形成すると述べ, Boling は動物実験の再生粘膜で同様の所見を報告している。Boling によれば羊の再生鼻粘膜の腺は 30 日目では極めて少く, 上皮細胞の線維化のために腺を形成すべき上皮の陥入が妨げられるためとし, 僅かに認められる腺は上皮下層の線維化が未だ高度とならない初期に陥入した上皮がその原器となると述べている。

本実験では 30 日目では未だ腺は少数で, intraepitheliale Drüsen の形成が目立ち, 上皮の陥入による腺の形成を思わせる所見があり, 以後比較的深層の腺の数も増加することから上皮下の線維化が高度であつても上皮の陥入による腺の形成はあり得ると考えざるを得ない。

中村の指摘している如く, 腺は粘膜の生理機能の点から上皮, 血管と共に最も重要な要素であり, 再生粘膜の完成の度合を知る一つの目標と考えられるが, 90 日目の上顎洞内の移植粘膜においては腺は対照の呼吸部鼻粘膜より遙かに少い。又この時期のラテックス注入標本における血管の所見がほぼ上顎洞粘膜に匹敵している。腺

と血管については移植 90 日目では本来の上顎洞粘膜に近くなる。しかし上皮は呼吸部鼻粘膜に酷似しているので、更に長期間の経過を観察すれば上顎洞内という場で上皮、血管、腺の 3 者の間がいかなる組合せとなるか興味ある問題である。又、移植片に再生した腺は移植時にあつた漿液腺ではなく粘液腺であつたが、移植床である上顎洞に普通に見られるもので、移植床の条件に対しての順応と考えるべきである。

粘膜固有層:

固有層の線維化は慢性炎症に通常見られるもので、勿論萎縮性鼻炎に特有なものではない。組織学的には膠原線維の増殖である。

粘膜欠損部の修復に当り、結合組織の増殖は古来病理学総論の教えるところであり、移植粘膜でも赤池等は移植片は強い線維化を示したと報告し、友田も固有層の強い線維化を認めている。一方中村は久保式整形手術では線維化は比較的弱いと述べている。線維化の強さは移植後の反応性炎症の強さや、移植片の血流状態に左右されるものと思われる。

骨、軟骨:

骨及び軟骨の変化は一定しない。恐らく使用した家兎の個々の体質、又移植手術時の操作に多少共不均一があつたためと思われる。

Zöllner (1953) は外耳道皮膚弁を用いた鼓室整形術で、一部に骨の異所性増殖を認め、外耳道皮膚弁の骨膜ではなく骨片が移植床に骨の増殖を促すのであろうと述べているが、本実験で見られた移植片内の異所性軟骨増殖も移植片の軟骨膜に附着した軟骨片が原因となつている可能性も考えられる。

IV 結 論

家兎の鼻中隔嗅部膜を上顎洞に移植し、移植片及び鼻中隔の再生粘膜を組織学的に観察し、移植片については更にラテックス注入標本で血管の状態を観察し、これを正常家兎と比較して次の結論を得た。

(1) 鼻中隔粘膜の上顎洞への移植は洞内への肉芽組織の侵入を防止すれば成功する。

(2) 移植粘膜の上皮は移植粘膜上皮の基底細胞及び周囲に残存した上顎洞粘膜上皮から再生され、14 日で扁平上皮、30 日で線毛上皮となり、60 日で上皮の再生は完了する。再生完了上皮は鼻腔上皮に酷似する。

(3) 鼻中隔の粘膜欠損部は辺縁部の上皮から再生がおこり、21 日で扁平上皮に、30 日で線毛上皮になる。

(4) 移植粘膜及び鼻中隔再生粘膜の腺は主として粘

液腺で嗅腺とは異なり、その数は 90 日目でも夫々鼻中隔呼吸部粘膜におけるよりも少い。

(5) ラテックス注入標本では移植粘膜における血管系は移植により一時荒廃するが、次第に骨面及び周囲組織から新生し、90 日で本来の上顎洞の血管に匹敵する。

(6) 移植粘膜における上皮、腺の再生は血管系の新生と密接な相関を有する。

参考文献

- 1) Akaike (赤池清美): 病的上顎洞粘膜有茎移植法, 日耳鼻, 65: 1403, 1962 (昭 37).
- 2) Aoki (青木恭子): 副鼻腔炎多洞手術創に関する病理組織学的研究, 共済医報, 10: 9, 1961 (昭 36).
- 3) Boling, R., R. Leroy: Regeneration of nasal mucosa. Arch. Otolaryng. 22: 689, 1935.
- 4) Braun-Falco, F.: Ueber die Basalmembran normaler und pathologisch veränderten Schleimhaut der oberen Luftwege. Z. Laryng. usw. 38: 689, 1959.
- 5) Burian, K. et al.: Die Reaktion der Nasenschleimhaut auf lokaler Schädigung bei DOCA- und cortisonbehandelten Ratten. Mschr. Ohrenh. 92: 22, 1958.
- 6) Coats, G.M. et al.: Regeneration of the mucous membrane of the frontal sinus, after its surgical removal (in the dog). Arch. Otolaryng. 12: 642, 1930.
- 7) Dawes, J. D.K. et al.: Studies of the vascular arrangement of the nose. J. Anatom. 87: 311, 1953.
- 8) Doi (土井改良): 肝臓の血管像及び血行について, お茶の水医誌, 4: 701, 1956 (昭 31).
- 9) Dorochenko, I.T.: Un nouveau principe de la thérapeutique de l'ozæne. Acta. Oto-laryng. 25: 524, 1937.
- 10) Eggs-ton, A. et al.: Histology of nose and accessory sinuses, Histopathology of the ear, nose and throat. 53, 1947, Baltimore.
- 11) Fleischmann: Angeborene Schweissdrüsenmangel und Ozaena. Z. Laryng. usw. 20: 503, 1931.
- 12) Fränkel, E.: Pathologisch-anatomische Untersuchung über Ozaena. Virchow, Arch. 75: 45, 1879.
- 13) Glas, E.: Ueber intraepithelie Drüsen, Cysten und Leukozytenhäufchen der menschlichen Nasenschleimhaut, Arch. Laryng. usw. 16: 236, 1904.
- 14) Gorham, C.N. et al.: Regeneration of human maxillary antral lining. Arch. Otolaryng. 11: 763, 1930.

- 15) *Greenberg, S.D.*: Regeneration of respiratory epithelium. *Arch. Path.* 73: 53, 1962.
- 16) *Grossmann, B. et al.*: Zur Regeneration des Trachealfimmerepithels. *Zb. f. HNO.* 1: 357, 1922.
- 17) *Harrison, D.F.N.*: Familiar haemorrhagic teleangiectasis, a survey of series of cases treated by oestrogen therapy. *J. Laryng. etc.* 71: 577, 1957.
- 18) *Hashimoto* (橋本泰彦): 副鼻腔の血管分布について, 耳喉, 28: 827, 1956 (昭31).
- 19) *Hilding, A.*: Experimental surgery of the nose. I. Changes in the morphology of the epithelium following variations in ventilation. *Arch. Otolaryng.* 16: 9, 1932. II. Gross results following the removal of the intersinus septum and strips of mucous membrane from the frontal sinus of the dog. *Arch. Otolaryng.* 17: 321, 1933. III. Results following partial and complete removal of the lining mucous membrane from the frontal sinus of the dog. *Arch. Otolaryng.* 22: 760, 1935.
- 20) *Hollender, A.*: Histopathology of the nasal mucosa of the older persons. *Arch. Otolaryng.* 40: 92, 1844.
- 21) *Hongo* (本郷裕): 病理組織学的に見た慢性篩骨蜂窩炎の手術経過, 耳鼻展望, 1: 132, 1958 (昭33).
- 22) *Ichikawa* (市川瑞雄他): 家兎鼻咽腔炎の剥離細胞学的並びに病理組織学的研究, 日耳鼻, 67: 730, 1964 (昭39).
- 23) *Ishii* (石井英雄): 萎縮性鼻炎の手術療法, 日耳鼻, 66: 225, 1963 (昭38).
- 24) *Katayama* (片山正一): 上顎洞炎殊に蓄膿症における下鼻道側壁粘膜の病理組織学的変化について, 京府医大誌, 4: 475, 1930 (昭5).
- 25) *Kistner, F.B.*: Histopathology and bacteriology of sinusitis with comments on post-operative repair. *Arch. Otolaryng.* 13: 225, 1931.
- 26) *Kitagawa* (北川和男他): 鼻茸における酸性多糖類の組織化学的研究, 日耳鼻, 57: 52, 1954 (昭29).
- 27) *Kitamura* (北村武): 萎縮性鼻炎, 耳鼻咽喉科学, 後藤敏郎, 上, 719, 1960 (昭35), 医学書院.
- 28) *Knowlton, C.D.*: How and when the mucous membrane of the maxillary sinus regenerates. *Arch. Otolaryng.* 8: 647, 1928.
- 29) *Kono* (河野寿): 家兎鼻微細血管に関する研究, 特に炎症の影響について, 日耳鼻, 63: 16, 1960 (昭35).
- 30) *Krause, H.*: Zwei Sektionsbefunde von reiner Ozaena. *Virchow Arch.* 85: 325, 1881.
- 31) *Latta, J.S. et al.*: The histology of the paranasal sinus under various conditions. *Ann. Ot. etc.* 43: 945, 1934.
- 32) *Lautenschläger, A.*: Die Rhinitis atrophicans. *Hb. Hals- usw. Heilk. von Denker-Kahler* 2: 604, 1926, Berlin.
- 33) *Marjorie, M. et al.*: Arterio-venous anastomoses in the tongue of the dog, *J. Anatom.* 87: 66, 1953.
- 34) *Matsuda* (松田豪一他): 副鼻腔内粘膜移植の試み, 日耳鼻, 59: 1141, 1956 (昭31).
- 35) *McGregor, G.*: Further proof of regeneration of mucous membrane in the human antrum. *Arch. Otolaryng.* 14: 309, 1931.
- 36) *Messerklinger, W.*: Physiologische und pathologische Veränderung des Nasenepithels. *Arch. Ohr- usw. Hk.* 165: 475, 1954.
- 37) *Minkovsky, A.*: Atrophie der oberen Luftwege. *Acta oto-laryng.* 16: 525, 1931.
- 38) *Nagano* (長野幸雄): 慢性副鼻窦炎手術創に対する上顎洞粘膜有茎移植, (赤池法)における組織学的観察, 日耳鼻, 66: 301, 1963 (昭38).
- 39) *Nagoshi* (名越好古): 副鼻腔炎手術後の治療機転とその障害について, 耳喉, 36: 977, 1964 (昭39).
- 40) *Nakamura* (中村信成): 萎縮性鼻炎に関する知見補遺, その病理組織学的研究, 千葉医会誌, 33: 82, 1957 (昭32).
- 41) *Nishimaru* (西丸和義): 体液循環の研究, 63, 1952 (昭27), 医学書院.
- 42) *Peter, K.*: Entwicklung der Nasenmuscheln bei Menschen und Säugtieren. *Arch. mikro. Anat.* 80: 478, 1912.
- 43) *Ruskin, I.L.*: A differential diagnosis and therapy of atrophic rhinitis and ozaena. *Arch. Otolaryng.* 15: 222, 1932.
- 44) *Sato* (佐藤保信): 耳鼻咽喉科領域における微細血管分布の研究, III. 鼻腔側壁における所見, 慈恵医誌, 66: 175, 1952 (昭27).
- 45) *Schaffer, J.*: Spezifität der Becherzellen. *Hb. der mikro. Anatom. des Menschen v. Möllendorf* 2: 115, 1927, Berlin.
- 46) *Schönemann, A.*: Die Umwandlung (Metaplasie) des Cylinderepithels zu Plattenepithel in der Nasenhöhle des Menschen und ihre Bedeutung für die Aetiologie der Ozaena. *Arch. path. Anatom. u. Physiol.* 168: 22, 1902.
- 47) *Schumacher, S.*: Histologie der Luftwege und der Mundhöhle. *Hb. Hals- usw. Heilk. von Denker-Kahler* 1: 277, 1925, Berlin.
- 48) *Semenov, et al.*: Repair in the paranasal sinuses of man following removal of the mucous lining. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.* 27:

野口論文付図(Ⅰ)

第1図 移植手術 移植前

第2図 移植手術 移植完了

第3図 鼻中隔嗅部粘膜(移植片) HE. 強拡

第4図 上顎洞粘膜(上), 鼻腔側壁嗅部粘膜(下) HE. 弱拡

第5図 4日目, 移植片, 上皮は nekrobtisch. 固有層に強い細胞浸潤, PAS. 弱拡

第6図 7日目, 移植片中部, 基底細胞よりの上皮再生を思わせる像, HE. 強拡

野 口 論 文 付 図 (Ⅱ)

第7図 14日目, 移植片(上), 上皮は扁平化, HE. 弱拡

第8図 21日目, 移植片, 一部に円柱上皮がみられる. 上皮下層の強い線維化, HE. 強拡

第9図 30日目, 移植片(上), 円柱上皮となる. 上皮下層に腺の出現. HE. 弱拡

第10図 30日目, 移植片, 上皮の陥入による腺形成. 左方は肉芽増生. HE. 弱拡

第11図 60日目, 移植片, 上皮は円柱上皮, 杯細胞の増加. HE. 弱拡

第12図 90日目, 移植片, 円柱上皮, 腺, 骨増殖がみられる. HE. 弱拡

野口論文付図(Ⅲ)

第13図 4日目, 鼻中隔粘膜採取部, 切除縁から扁平化した上皮の伸展, HE. 弱拡大

第14図 14日目, 鼻中隔粘膜採取部, 上皮下の線維化, HE. 弱拡大

第15図 30日目, 鼻中隔粘膜採取部, 上皮は円柱上皮となる。HE. 弱拡大

第16図 60日目, 鼻中隔粘膜採取部, HE. 弱拡大

第17図 90日目, 鼻中隔粘膜採取部, HE. 弱拡大 (左方は粘膜採取部, 右方は本来の鼻中隔粘膜)

野口論文付図(Ⅳ)

ラテックス注入標本

第18図 対随, 鼻中隔前部粘膜血管.

第19図 対照, 上皮洞粘膜血管.

第20図 4日目, 強いラテックス漏洩.

第21図 7日目, 網眼の形成が一部にみられる.

第22図 21日目, 樹枝状の血管新生. 拡張, 蛇行.

第23図 90日目, 上顎洞に匹敵する血管新生.

- 322, 1930. 49) *Shirai* (白井豹他): 動物実験の実際, 206, 1933 (昭8), 金原商店. 50) *Shiraiwa* (白岩俊雄): 原因的因子の鼻腔, 咽頭領域の出血に関する研究分析の研究, 日耳鼻, 62: 2640, 1959 (昭34).
- 51) *Sternberg, H. et al.*: Beitr. zur Physiologie und Pathologie der Schleimhaut der Luftwege. 1. Die Veränderung der Nasenschleimhaut bei ausgeschalteter Nasenatmung. Z. HNO-hk. 7: 432, 1924. 52) *Suzuki* (鈴木貞一): 慢性上顎炎根治手術後における治癒機転に関する研究, その2, 病理組織学的研究, 京府医大誌, 6: 715, 1932 (昭7). 53) *Swindle, P.F.*: The architecture of the blood vascular networks in the erectile and secretory lining of the nasal passage. Ann. Ot. etc. 44: 913, 1935. Nasal blood vessels which serve as arteries in some mammals and as veins in some others. Ann. Ot. etc. 46: 600, 1937. 54) *Taylor, M. et al.*: The influence of the endocrine system on the nasal respiratory mucosa, J. Laryngo. 75: 1048, 1961. 55) *Takeda* (武田元一郎): 鼻血管の研究, 日耳鼻, 30: 74, 1924 (大13). 56) *Thanhoffer, L. V.*: Untersuchungen über die Mitose der Flimmerzellen und der Regeneration des Wimperepithels. Z. Anat. Entw. 90: 713, 1929. 57) *Tiedemann, R.*: Ueber der glomuläre Gefässe der Nasenschleimhaut. Arch. Ohr-usw. Hk. 172: 257, 1958. 58) *Tomoda* (友田洋一): 副鼻腔の慢性炎症並びに粘液囊腫に関する実験的研究, 第2編, 鼻粘膜移植の実験, 日耳鼻, 61: 548, 1957 (昭32). 59) *Tonnendorf*: Beitrag zur Ausheilung der nach Luc-Caldwell operierten Kieferhöhle. Z. HNO-hk. 22: 54, 1928. 60) *Trueta*: Studies of the renal circulation 1947. 61) *Wright, C.F.*: Radical maxillary sinus operation, clinical and histologic findings on one hundred patients. Arch. Otolaryng. 12: 63, 1930. 62) *Wustrow, F.*: Die Funktionsentwicklung der menschlichen Nasenschleimhaut. Z. Laryng. usw. 38: 689, 1959. 63) *Yamanaka* (山中康正): 生体における粘膜毛細血管の観察, 耳鼻臨, 50: 371, 1957. 64) *Zarniko*: Ueber die intraepitheliale Drüsen der Nasenschleimhaut. Internationales Zb. f. H.N.O. 1: 440, 1903. 65) *Zöllner, F.*: Knochenbildung aus Periostallappen bei Tympanoplastik. Mschr. Ohrenk. 97: 51, 1953. 66) *Zuckerkandle, E.*: Gefäss der Nasenschleimhaut. Anatomie der Nasenhöhle. 1: 125, 1893, Wien.
- 稿を終るに臨み御指導御校閲を賜わった恩師北村武教授に深甚なる謝意を捧げると共に本研究にあたり直接労を共にし終始御指導御協力を頂いた河野寿博士に衷心から感謝の意を表します。そして適切な御助言を頂いた奥田稔助教授に深謝し、組織標本作製に当り御指導頂いた佐藤俊一博士、並びに研究に御協力頂いた教室員各位に感謝いたします。
- 本論文の要旨は日耳鼻関東地方会第46回大会において発表した。

(原稿到着＝昭和39.12.22日)